





إِدْوَارُ غَالِبِ الْمَوْسُوعَةِ

٢٤٢٠ صفحة • ٣١٤٦٤ ضلقة

٦٩٦٢ رسمًا • ٢٤ لوسعة ملونة

فِي عُلُومِ الطَّبِيعَةِ

تَبْحَثُ فِي الزَّرَاعَةِ وَالنَّبَاتِ وَالْحَيَوَانَ وَالْجَيُولُوجِيَا



دارالمشرق بيروت



الموسوعة في علوم الطبيعة

مَشْهُورَاتُ
دَارِ الْمَشْرِقِ ش.م.م
ص.ب: ٩٤٦ - بَیْرُوت، لُبْنَان

السَّوْدَانُ
المَكْتَبَةُ الشَّرْقِيَّة - سَاعَةُ الْجَمْعَةِ
ص.ب: ١٩٨٦ - بَیْرُوت، لُبْنَان

الرسوم :

جورج ديب

جورج غنتوس

جان فرطباري

جهاد جبر

سليم غصن

المجموعة : ISBN 2-7214-2148-4

المجلد الثالث : ISBN 2-7214-2151-4

يحتوي هذا المجلد من

الموسم الرابع عشر

١٠١٠٤ مواد

٢٠٧٧ رسماً

٨ لوحات ملونة

الأوزان غالباً

مهندس زدايجي


الموسوعة في علوم الطبيعة

تبحث في الزراعة والنبات والحيوان والطير والسمك والحشرات والفطور
وأجلاشيم والأمرض الحيوانية والنباتية والمصطلحات العلمية على اختلافها
أخصها الفيزياء والكيمياء والرياضة والجيولوجية والطبيعة والحقائق
وتألف من أربعة مجلدات يحتوي آخرها على مسارد للمصطلحات باللغات :
الألمانية ، الإنكليزية ، الإيطالية ، الفرنسية ، اللاتينية ، واليونانية

طبعة ثانية محدّدة

المجلد الثالث

من القاف إلى الياء



ق

٢١٣٧٠ - قابِل الإِنْفِلَاق Fissile, Fissile (F).
Fissile (E).

تعت تعريفني يطلق عل ما كان يحمل في تكوينه ميزة الانفلاق .

٢١٣٧١ - قابِل الانهضام Digestible (F).
ما كان حفسه هيئاً كاملاً .

٢١٣٧٢ - قابِل التمثيل Assimilable (F).
هو السائغ من الغذاء .

٢١٣٧٣ - قابِل القسمة Divisible (F).
هو ما كان مقدور القسمة .

٢١٣٧٤ - قابِلِيَّة ، اسْتَعْدَاد Aptitude (F).
Taste (E). ميل طببي او آفتابي نحو شيء معين .

٢١٣٧٥ - قابِلِيَّة الإِنْطِلال ، بَطْلان Annulabilité, Nullité (F). Nullity (E).
هو انتقاص عقد بسبب فقدانه أحد الشروط الجهرية او الشكلية اللازمة لصحته .

٢١٣٧٦ - قابِلِيَّة الاغْتِذَاك Faculté nutritive (F).
Nutritive faculty (E). هي المقنور الذَّائِي .

٢١٣٧٧ - قابِلِيَّة الإِنْتِاش ، خاصِيَّة الإِنْتِاش Faculté germinative (F). Germinal faculty (E).
هي المقدار السبيي ال ما ينتش من عدد بزور معين . فإذا نثشت سبعون برة من اصل مائة برة يقال ان قابلية الانتاش في تلك البزور هي سبعون من المئة .

٢١٣٦١ - قَاب ، قَيْب Rayon (F). Radius (E).
نصف قطر الدائرة .

٢١٣٦٢ - قَابَ Troisième année (F).
القَابَ اسم السنة الثالثة بعد الحافرة . يقال انك لا تستغل ارضك لا العام ولا القابل ولا القاب .

٢١٣٦٣ - قَابَكَة Couvi (F).
القابَة والقابَة : بيضة الطير المحفونة .

٢١٣٦٤ - قَابِس Récepteur (F). Receiving (E).
كل جهاز قابل أو آخذ كما في التلغراف والتلفون .

٢١٣٦٥ - قَابِض ، عَقِص Astringent
القابِض من الطوم ما يتقبض اللسان منه . والقابِض من الادوية ما يحبس الفضلات المنثقة من المعدة .

٢١٣٦٦ - قَابِض ، مُقَلِّص Contractif (F).
Contractive (E). ما يجمع اجزاء العضو ويكثفه .

٢١٣٦٧ - قَابِض ، مُكْسَم Accipiens (F).
هو من يقبض المقيود عليه أو الملكية .

٢١٣٦٨ - قَابِعَات الأَسْثَان Pleurodonte (F).
Pleurodotes (E). نعت تعريفني توصف به العظام من ذوات الاسنان القابية المرتزة في الحالة الداخلية من الفك . يقابلها شارقات الاسنان .

٢١٣٦٩ - قَابِل An prochain (F). Next year (E).
اسم لعام المقبل بعد العام الحاضر .

Rémige primaire, Flèche (F). ٢١٣٩٢ - قادمة
Wing primary (E).
ريشة من أرياش مقدم الجناح. ج. قوام. والأشعار
والمواسر. ب. القوام.

Trémie (F), Hopper (E). ٢١٣٩٣ - قادوس
هو عين الطاسون. ثقب أو فرجة أو شق يلقح الحب
الذي يمر به شيئاً فثيقاً.

Albastro ٢١٣٩٤ - قادوس
طائر بحري كبير القد مشهور باسم قطرس، أظله.

Asphalte (F), Asphalt (E). ٢١٣٩٥ - قار
هو الزفت أو الأسفلت، نوع من الحجر المتدنج الأسود
الجامع. يستعمل في ترصيف الطرقات.

Carya (S), Caryer (F), Hickory (E). ٢١٣٩٦ - قار
جنس أشجار حرجية وزراعية من فصيلة الجوزيات.
أنواعه عديدة أعطائها البلاد الحارة. جميعها كبيرة القد،
دائمة. أوراقها مركبة، حاملة. أزهارها الذكورية أبوية
الارتكاز، سنبلية التجميع، دقيقة متدلية. أزهارها
الانثوية طرفية الارتكاز، ثلاثية التجميع. ثمارها جزوية،
جامدة الغلاف، رباعية الفلق || أحرف أنوعه
وأشهرها ما يتبع.

Carya aquatica (S). ٢١٣٩٧ - قارة المتابع *
Caryer des marais (F), Swamp hickory (E), Sum-
phickorybaum (D), Caria palustre (I).
نوع من القار ثمرته كبيرة القند فارشة تملو من ٢٥ إلى
٣٠ سم. وريقاتها كبيرة القند وريّة التجميع براوح
مدعها بين ٩ و ١٣. نصلها أعليسي الشكل ذات الزام
الايخر وهو بارز المروق سنن الحافة || ثمارها بيضية
مقلوبة عادمة الجناح.

٢١٣٩٨ - قارة بيضاء، قارة بيضية
Carya alba, C. ovata (S), Caryer blanc (F), White
hickory (E).
نوع من القار ثمرته سبروتية تملو من ١٥ إلى ٢٠ سم.
براعمها متراكبة الحراشف الجزوية اللون. أوراقها كبيرة
القند. وريقاتها سنائية النصل تطول نحو ٢٠ سم. وتعرض
نحو ٨ سم. || ثمارها بيضية، لونها صغير القند،
مستحب الطعم.

٢١٣٩٩ - قارة زيتونية *
Carya pican, C. olivaeformis (S), Caryer pacanier,
Noyer pican (F), Pecan-nut tree (E), Pekanbaum (D),
Caria (I).
نوع من القار ثمرته كبيرة القند فارشة تملو من ٢٥ إلى
٥٠ سم. براعمها حادة الحراشف. أوراقها كبيرة القند.
وريقاتها وريّة التجميع براوح مدعها بين ١١ و ١٧
سم. ويعرض من ٣ إلى ٦ سم. وهو سنن الحافة
مزينير المروق. ثمارها بيضية الشكل مقلوبة العقب
تطول من ٣ إلى ٤ سم. قشرة الثمرة تنفلق عند الإدراك
عن ٤ لوزات زيتونية الشكل لباها أبيض اللون مستحب
الطعم والنتكهة.

٢١٣٩٨ - قابلية التصرف، قابلية التملك
Allénabilité (F), Allenability (E).
صفة قانونية عائدة بمال يمكن نقل ملكيته بموس أو بلا
عوض.

٢١٣٩٩ - قابلية التسلل، قابلية العزل
Amoribilité (F), Removability (E).
تقال عن موظف يجوز نقله أو استبدال وظيفته أو عزله
بقرار.

٢١٣٩٠ - قابلية الانهزام
Digestibilité (F).
مقدور الشيء على الانهزام. وهو ما يسبب فوارق
الانهزام في الأغذية.

٢١٣٩١ - قابليق
Kapoquier (F).
هو الكايك، أظله.

٢١٣٩٢ - قات *، شاي العرب، حرايبه مأكولة
Catha edulis, Celastus edulis (S), Célastre comestible,
Catho comestible, Gât (F), Cafca, Khâc, Kâc,
Arabian tea plant (E), Kaspflanzen (D), Catha (I).
نوع من الحرايبه يعي جنبه وريّة وزراعية من فصيلة
القاتيات. ساقها فريدا تملو نحو ٣ أمتار. أوراقها معتقة،
مقابلة، أعليجية النصل، يقال أنها طيبة. أزهارها
صفودية، طرفية الارتكاز، غصراء اللون، صفراء المويج،
خاصية الفصل والبلات والاسدية. ثمارها دقيقة مستديرة
حاملة الطعم مأكولة || زرع في البين وأخيشه حيث
يمضون أوراقها المنبة المنهضة ويستخرجون من تقطير
ثمارها مشروب كحولي شديد الوقع على الأعصاب.

٢١٣٩٣ - قاتل أبيه
Arbousier (F).
هو القنطاب، أظله.

٢١٣٩٤ - قاتل أخيه
Orchis (F).
هو السحلب، أظله.

٢١٣٩٥ - قاتل البق *
Climacore (F).
هو الآقي المنقودية، أظله.

٢١٣٩٦ - قاتل البقر
Cigu des marais (F).
هو الشوكران الشام، أظله.

٢١٣٩٧ - قاتل الحشرات، حاشوشه
Insecticide
كل مادة تصلح للقضاء على الحشرات.

٢١٣٩٨ - قاتل الكتك *
Colchique d'automne (F).
هو سورجان الحريف، أظله.

٢١٣٩٩ - قاتل التير
Aconit napal (F).
هو الاكوينت أهرسي، أظله.

٢١٣٩٠ - قابليات
Celastraceae (S).
Célastracées (F), Celastraceae (E).
هي الحرايبات فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين. أشهر
اجناسها الحرايبه وبها القات.

٢١٣٩١ - قاحل *
Asperme (F), Asperous (E).
القاحل من النبات العادم البذور.



قات



.....



قارة زيتونية (الباز)

اسطائها معظم اقالم البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي. تعتبر من اسماك سطح اليم والمداشب الهيدرافية || جسما وشبي الشكل، يطول من ٦٠ الى ١٠٠ سم. ويزن من ٤ الى ١٢ كيلو. ثوبها الى الصبغة الفضية يسمر عند الظهر ويملو تبقيج مستدير اسود في الظهر وفي الجانين. رأسها مستدل الجرم، غرظي العظم. ذنبها رحب الانفرج. فكها متعادلان. اسنانها صغيرة، ذرية. صياها كيرتان، جاسطتان. زعانفها الظهرية الى الحرة، الصدرية صفراء اللون والخصوية كذلك. زعنفتها الشرجية حمراء. اما الذيلية فسوداء وعلاية التعير || لحمها فاخر الصنف، مرغوب فيه.

٢١٤١٠ - قارون Acore (F).
نبات جسنوري عطر يقال له عود الودج. اطلبه.

٢١٤١١ - قاري، كودكي Continental
هو ما يمت الى قارة. كوكك مناخ قاري او كودني.

٢١٤١٢ - قاريه Rollier (F).
هي الشقراق. قال فيها الجاحظ والكساوي: طائر اخضر الظهر، اسود للثقل الطويل، قصير الرجلين، اخضر من الخلفات. ج. قواري.

٢١٤١٣ - قاريط Graine de tamarin (F).
حب التمر الهندي.

٢١٤١٤ - قاري، برماني Amphibie (F).
Amphibious, Amphibian (E).
كل حيوان مسكنه الماء لكنه يستطيع الخروج منه بعض الوقت كالقطة وفرس البحر والتساحل الخ.

٢١٤١٥ - قاس، قدر، متور، ذرع، مسح، صاع، كمال
Mesurer (F). To measure (E).

اغذ قياس مختلف ويؤد الشيء لمعرة مقداره. كقياس الطول والعرض لمعرة المساحة وقياس الطول والعرض والارتفاع لمعرة الحجم.

٢١٤١٦ - قاسح Exertile
لعت تعريفي يوصف به الفضو القابل للانتشار ان في الحيوان او في النبات.

٢١٤١٧ - قاسم، مقسوم عليه Diviseur (F).
Divisor (E).

٢١٤١٨ - قاسم مشترك Diviseur commun (F).
Common divisor (E).

٢١٤١٩ - قاسيات الجلد Sclérodermes (F).
قاسيات الجلد أو متصلبات الجلد. مرتبة في الاسماك للمصنومات الفركية.

٢١٤٢٠ - قاشرة Oculée (F).
نعت تعريفي توصف به اللطخة الشبيهة بالعين.

٢١٤٢١ - قاصير Mineur (F). Minor (E).
هو الذي لم يبلغ الحادية والبشرين من عمره فهو حديم اهلية الاداء الا في حالات فيها القانون.

٢١٤٢٢ - قاصوصة Siève (F). Hamper (E).
جونة من القصب او القصب.

٢١٤٠٠ - قارة قطنيّة Carya tomentosa (S).
Caryer cotonneux (F).

نوع من القار شجرته تملو من ٢٠ الى ٢٥ م. براعمها متراكبة الحراشف الجوزية اللون. اوراقها متوسطة الكبر. وريقاتها سباحية او تساحية التركيب، جميعها لاطئة، نصلها لخل الصغمة السفلى. ثمارها صغيرة القد، لوزها سكري العظم المستحب.

٢١٤٠١ - قارة مرّة، قارة قطنيّة Carya cordiformis, C. amara (S). Caryer amer (F).
نوع من القار شجرته سبروتية تملو من ٢٠ الى ٣٠ م. براعمها عادمة الحراشف صفراء اللون. اوراقها تطول من ٣٠ الى ٤٠ سم. وريقاتها وريّة التجميع، عدها يراوح بين ٧ الى ٩ نصلها يطول نحو ١٦ سم. ويرعى ٣ سم. لونه الى الخضار الزاهي، حناره منشاري التفرغ. ثمارها مكورة، جامدة الغلاف، بمنجحة القرب. لوزها قليبي الشكل مر العظم، قلوبى المادة.

٢١٤٠٢ - قارح Coin (F). Corner tooth (E).
سنّ قاطعة تلي الرابية. وهما عند الخيل قارحان في كل فك || ترتيب اسنان الخيل يتبدل بالتناوب ثلثها الرباعيات ثم القوارح.

٢١٤٠٣ - قارح Cniquier (F).
هو البندق الهندي، اطلبه.

٢١٤٠٤ - قاروص
هو الهرم نبات طيب من الدفليات، اطلبه.

٢١٤٠٥ - قاروص، قاصم Rongeur (F). Rodent (E).
نعت تعريفي يطلق على كل حيوان يتغذى الى رتبة القوامص.

٢١٤٠٦ - قاروص، قارودي
Acarostoxique, Acaricide (F). Acaricide (E).

نعت تعريفي يطلق على كل مادة تستعمل للقضاء على القراد والحلم.

٢١٤٠٧ - قارورة Ballon en verre (F).
Glass receiver (E).
آنية زجاجية لقياسية الحجم والسعة تستعمل في المختبرات.

٢١٤٠٨ - قاروس *، قاروس Morone labrax (S).
Bar, Loup, Loubine (F). Sea bass (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الفرغيات. أنواعه المعروفة ٧ اصلها مياه المتوسط والاطلسي. جميعها كبيرة القد نحو ١٢ كيلو. انسابها الى الصبغة الفضية المولج يملونها في بعض الانواع تبقيج اسمر مستدير || وهي تألف الشواطئ الصخرية. قوتها الاسماك الصغيرة والقشريات. تغلق غور الانهر وتترهل صعداً في طلب المراس وقد يكون ذلك في الشتاء قسراً وتعود الى البحر في الربيع || وهي من الاسماك المأكولة لحمها لذيق العظم مرغوب فيه.

٢١٤٠٩ - قاروس مبدول *، قاروس مبدول، بركه مبدول Labrax lupus (S).
Bar commun, Loup de la Méditerranée, Loubine vulgaire (F). Common sea bass (E).

نوع من القاروس. سمكة بحرية يروض من فصيلة الفرغيات.



قاروس



قاروس مبدول

وتعرض من ٣ الى ٥ سم. نصلها جاهد الصفة، بحري
الون ثنائي القصبة الصلبة الناعضة. ازهارها خافتة الون.
ثمارها قرمزية || يستخرج من ساقها عصارة صمغية حارة
الون شائعة الاستعمال.

٢١٤٣١ - قاطير عطر Dracona fragrans (S).
Dragonier balsamique, D. odorant (F).
شجرة زيتية تفل من ٣ الى ٦ امتار. اوراقها سنانية
الشكل تفل نحو ١٠٠ سم. نصلها اسنن الصفة، فسقي
الحصار اللامع. ازهارها فواصة العرف العلوي. ثمارها
كرزية ارجوانية الون || تزرع في المراكم والمصارى
ترغب في الاربة الدبانية.



قَطَّامُود

٢١٤٣٢ - قاطع Interruptif (F). Interruptive (E).
عمل قانوني يطل معقول عمل آخر.

٢١٤٣٣ - قاطع Interrupteur (F).
اداة يقطع بها التيار الكهربائي. Switch, Cut-out (E).

٢١٤٣٤ - قاطع Sécante (F). Secant (E).
خط مستقيم يقطع الدائرة.

٢١٤٣٥ - قاطع حاكم Pérémptoire (F).
نعت الحكم القيصلي الذي لا يقبل الاجدل. Peremptory (E).

٢١٤٣٦ - قاطع التمام Cosécante (F).
Cosecant (E).

٢١٤٣٧ - قاطع التثاقب Caisis الدم.
Hémostatique (F). Haemostatic (E).
كل دواء يقطع النزف او السيلان.

٢١٤٣٨ - قاطعة Incisive (F). Incisor (E).
هي اسنن الاسنان الاسامية في كل من الفكين. والقرنيل
صت التحليل مثلاً ست اسنان: ثنيتان ورباعيتان وقارحان.

٢١٤٣٩ - قاطوب موشع Anthribus nebulosis (S). Anthrbe nébuleux (F).
Anthrbus nebulosis (E).

حشرة وائمة قانصة وأثمة من فصيلة القاطوبيات وربة
مفصلات الاجنحة. موطنها بعض اقاليم حوض البحر
الايض المتوسط. تألف ارجاج الصنوبر. خنثاهن
واثمة تعيش على اعداد الثباتات البرية تقضم الثباتات
والكؤوس والفاير. يرقاتها قانصة تعيش على ما تقرمه
من البرقات الخاشية التي تعمرى الصنوبر والشرين ||
جسمها صغير القند يطول من ٢ الى ٤ م. ثوبها الى
البراد القصبي يطول خل اشهب يمتكس عليه النور
فيبدو كأنه موشع. رأسها معتدل الحجم. قصير الخلم.
عينها كبيرتان. زباناها خطيان. فكاهها ذريان.
غدها شديقتا الصلابة. شيدانها التميزيز. ارسافها
ثلاثية المقل || الانثى اكبر قدماً من الذكر وابنت ثوباً
سه واقصر زبناً || لها جيل واحد في الحول. تظهر
الحشرة الجملانة في اوائل الربيع وتعيش حتى اوائل الصيف.
تسرح في النهار وبيت في الليل تحت قشور الصنوبر ||
الطور البرقي يستمر نحو ٣٦ اسبوعاً. والبرقة عند ادراكها
التكامل الجسدي تفل نحو ٦ م. جسمها وشي الشكل،
مستطيل القدم، مستطيل القوس. ثوبها الى الغلي
الاصفر المواج. رأسها ورباعيتها وبشرها وشرجهما الى
السرة || طور الاكمال الذي يستمر نحو اربعة اسابيع

٢١٤٣٣ - قاضيوم Rongeur (F).
هو القارض، آكله. Gnawing, Biting (E).

٢١٤٣٤ - قاضي، حصاص Ester en justice, Agir en justice
التسبا الى القضاء

٢١٤٣٥ - قاضي الجبل Agame (F).
هو الحرزون، آكله ومنه الارزاق والاخير.

٢١٤٣٦ - قاط Elacates (S).
Elacate (F). Elacate (E).

الاسم العلمي والفرنسي والانكليزي من العربي القاط.
جنس اسماك بحرية من فصيلة الاسقمريات شالكاك
الزعانف. انواحه المعروفة قليلة العدد. اسطائها مجار
البلاد الحارة || اجسامها مستطيلة وشية الشكل. رؤوسها
اسنينة ذلقة. اشداها كبيرة. عينها صغيرة، ماسحة.
زعانفها الظهرية تمتد من اواسط الظهر الى مؤخره فتقدمها
بعض المناقص الحادة. زعانفها الذيلية مقعرة || طويها
متوسطة الصنف، مأكولة.

٢١٤٣٧ - قاط أسود Elacates nigricans (S).
Elacate noir (F). Black elacate (E).

نوع من القاط. سمكة بحرية بيوض. اسطائها البحر
الاحمر والمحيط الهندي || جسمها وشي الشكل يطول من
٨٠ الى ١٠٠ سم. ثوبها الى السرة السوداء يطويها خطوط
فضية، قاطية، مستعرضة || رأسها معتدل الحجم. ذلق
الخلم. فكها الاسفل يتقدم الاعل بعض الشيء. شفاها
رسمب الانفراج. عينها مستديرتان صغيرتان، ماسحتان.
زعنفتها الظهرية مستطيلة فتقدمها ثمانية مناسخ حادة.
زعنفتها الشرسية تقابل الظهرية. وتمائلها شكلاً. زعنفتها
الذيلية مقعرة الطرف || جسمها متوسط الصنف، مأكول.

٢١٤٣٨ - قاطير * دم الثنين، دم الثعبان Dracons (S). Dragonnier (F). Dragon tree (E).

جنس اشجار ونبات برية وزيتية من سبط الهليونيات
وفصيلة الزنبقيات. انواحه المعروفة نحو ٢٠ اسطائها البلاد
الاستوائية جميعها بطيئة النمو مديدة العمر. بعضها يشبه
التخل. اوراقها طرية الارتكاز يكثر فيها الشكل السني.
ازهارها عشكوية الصنيع، تاجية الارتكاز، يضاء الون.
ثمارها كرزية القند والشكل، ورتقالية الون او حمراء.
من خصاصها انها لا تزهق قبل بلوغ ٢٥ سنة من العمر.
يستخرج من سوق بعض انواعها عصارة صمغية حارة
تتحول بعد تجفيفها وصفيها الى دقيق احمر الون كبير
الاستعمال الصنائي || اعرف انواعها واشهرها ما يلي.

٢١٤٣٩ - قاطير أرجواني Dracons terminalis (S). Dragonnier pourpre (F).

جنية زربينة صغيرة القند، مثقلة، بطيئة النمو، ليفة
الجلد. اوراقها سيفية الشكل مستطيلة. نصلها اسنن
الصفة ارجواني الون || منبها الصين. تزرع في المراكم
ترغب في الاربة الدبانية.

٢١٤٣٠ - قاطير جبار Dracons draco, Pleomele draco (S). Dragonnier

sang-drakon, D. gigantesque, Sang-drakon (F).
sang-drakon, blood tree (E). Drackenbaum, Blutbaum
(D). Dragone, Dragoncello, Sanguis di drago (I).
شجرة افريقية جبارة تفل نحو ٢٠ م. قطر جلعها يبلغ
٤ امتار. اوراقها سيفية الشكل تفل نحو ٦٥ سم.



قَطَّامُود

اي يوم من القمر يقابل ٢٥ حزيران سنة ١٩٦٦. اتبع الطريقة التالية : القاعدة ٨ اخف اليها علامة شهر حزيران اي ٤ ثم اخف ٢٥ اي ايام الشهر الشمسي فيصح المجموع ٣٧ ، اسقط ٣٠ يبقى ٧ وهو المطلوب .

Base de triangle (F). **قَاعِدَةُ المثلث** ٢١٤٤٩
Base of a triangle (E).
السطح الذي يرتكز عليه الخط العمودي .

Base de prisme (F). **قَاعِدَةُ الموشور** ٢١٤٥٠
Base of a prism (E).
السطح الذي يرتكز عليه الخط العمودي .

Basilaire, Basique (F). Basilar, Basic (E).
صفة الجسم الذي يحوي قاعدة . ونمت تعريفي يطلق على كل ملح سوى شطآن من القاعدة .

Basicité (F). Basicity (E). **قَاعِدِيَّة** ٢١٤٥٢
صفة الاجسام التي تمثل دور القاعدة في التراكيب الكيماوية .

Collemboles (F). **قَالِفَات الذئب** ٢١٤٥٣
هي الكهديات . اطلبها .

Lepidocyrtinus incertus(S). **قَالِفَةُ القطن** ٢١٤٥٤
هي كهمل القطن ، اطلبه .

Drépanure du bananier(F). **قَالِفَةُ الموز** ٢١٤٥٥
هي كهمل الموز ، اطلبه .

Spatha (F). **قَاقُور ، قَاقُور** ٢١٤٥٦
هو الكافور ، وعاء ملغ لتخل .

Cornelle cendrée (F). **قَاق** ٢١٤٥٧
هو القراق الابيض . يعتبر من الطيور المؤذية .

Corbeau de mer (F). **قَاق البَحْر** ٢١٤٥٨
سمكة بحرية تدعى قرية سواد ، اطلبها .

Cormoran (F). **قَاق الماء** ٢١٤٥٩
هو الباق ، اطلبه .

Cacalia (S). Cacalie (F). **قَاقَالِيَا ، قَاقَالِيَا** ٢١٤٦٠
Cacalia (E). Kakalie (D). Cacalia, Cacano (I).
جنس نباتات عشبية معمرة ، برية وزراعية من فصيلة المركبات . انواعها عديدة بعضها طبي وزرعي . اوراقه متناوبة ، لاقطاسية الشكل . ازهارها حلقية التجميع ، بيضاء اللون . يزور مهدية ، اهدابها وحيدة الصف . اشهر انواعه ما يلي .

٢١٤٦١ - **قَاقَال سِرْمَكِي الْوَرَق**
Cacalia stripticifolia (S). Cacalia à feuilles d'arroche (F).
نوع من القاقال وهو جنبة معمرة تعمل من ٩٠ الى ١٨٠ سم . اوراقها مفصصة ، حادة التنتين . نصلها اخضر الصفحة العليا ، بحري السفلى . اهدابها مستعرضة ، لاقطاسية التركيب . ازهارها بيض | ازهارها يستمر من آب تشرين الاول .

٢١٤٦٢ - **قَاقَال طَبِي ، قَاقَالِيَا بُوَصْرِيَّة الْوَرَق**
Cacalia verbascifolia (S). Cacalie sacrée (F).
نوع من القاقال وهو جنبة طيبة صغيرة معمرة تعمل من ٦٠ الى ١٨٠ سم . اوراقها بيضية الشكل ذلقة ؛ نصلها يطل

يقضي في آخر سرداب دخلته البرقة ضمن غشاء رقيق هزيل .

٢١٤٤٠ - **قَاطُوبِيَّات**
Anthribidae (S). Anthribidae (F). Anthribidae (E).

فصيلة حشرات واسمة دائمة قائمة والنجمة من رتبة غديات الاجنحة | اجسامها وانواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم اقطار البلاد المعتدلة الحرارة . تألف الاجراج وتميز عن المواد النباتية المنطوعة وما تقتصره من يرقات الحشرات الخاشية | اجسامها متباينة الاحجام بين الصغيرة والوسطى . اشكالها قرية الشبه بالسوسيات . رؤوسها صغيرة . اخطاها مستعرضة وقصيرة . زباناها خيطية نحلة وقد تنتهي بفصل صقبة متطاوله . كواسلها لاقطاسية الشكل . اعمادها لاحقة . جرائزها نسيطة . ارسافها ثلاثية العقول | اشهر اجناسها القاطوب والطحاعة .

٢١٤٤١ - **قَاطُور العنب**
Tordeuse de la grappe (F).

حشرة مؤذية تدمر عناقيد العنب تدعى ادويس اطلبها .

٢١٤٤٢ - **قَاع**
القاع : ارض سهلة مسطحة قد انفرجت عنها الجبال والاكمام .

٢١٤٤٣ - **قَاعِدَة**
Base
هي الاساس . اطلبه .

٢١٤٤٤ - **قَاعِدَة**
Règle (F). Rule (E).
الخط الواجب اتباعه للوصول الى الهدف .

٢١٤٤٥ - **قَاعِدَة ، نظريّة**
Théorie (F). Theory (E).

٢١٤٤٦ - **قَاعِدَة السَّنَوَات السَّابِقَة**
Règle de la pénultième année

٢١٤٤٧ - **قَاعِدَة السَّنَوَات المسيحية والمجرية**
هي القاعدة النظرية لمتبة لمرقة السنة الهجرية اعتباراً من السنة المسيحية او السنة المسيحية اعتباراً من الهجرية .

١) السنة الهجرية = $\frac{X}{33} + 33$
٢) السنة المسيحية = السنة الهجرية - ٣٣

٢١٤٤٨ - **قَاعِدَة النَمَر**
Epacte (F). Epact (E).

علم القاعدة الحالية وقدورها ٢٧ منذ اول اذار ١٩٦٥ واضف اليها علامة الشهر كما تراه اذانه ثم اضف عدد يوم الشهر الشمسي المراد معرفة ما يقابله من القمري فان كان المجموع اقل من ثلاثين فهو المطلوب وان زاد فاسقط منه ثلاثين وبالي يكون المطلوب | وهذه علامات الاشهر :

اذار نيسان ايار حزيران تموز آب ايلول تشرين الاول تشرين الثاني كانون الاول كانون الثاني شباط

٩ ١٠ ١١ ١٢ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨

واعلم ان العدد الواجب اضافته ابتداء من اول اذار في كل سنة هو ١١ وان قاعدة السنة القابلة ستكون ٨ كاهمين : ١١+٢٧=٣٨-٣٠=٨ || فلو شئت معرفة



قَاقَال

Moule (F). Mould (E).

٢١١٧٤ - قَالِب
الجهاز الخاسر بالسبك .

Fibrophage (F).

Fibrophagous (E).

القائف من الحيوان والحشرات ، الذي يقضي على قشور
النبات واليافها .

Madrus (S).

٢١١٧٦ - قَائَة ، مَكْلُورَة

Madrus, Maclure (F). Osage tree (E).

جنس اشجار وغطيات ممررة فراء من فصيلة التوتيات
انواعها قليلة منها البرية والزراعية . فروعها شائكة . اوراقها
معتقة متعاقبة . نصلها يبيض الصلعة الكاملة او لثلاثي
التفصيص . ازهارها ثنائية المسكن ، الاكبرية منها
عنقودية التجميع اما الاثريه فطبقية . احشاشها قوية ،
متينة ، لينة ، لونها الالفجار الحلي ، تستعمل في
صناعة القسي || اشهر انواعها القائة البرتقالية .

قائم ، هربين

٢١١٧٧ - قَائَة بَرْتَقَالِيَّة ، مَكْلُورَة بَرْتَقَالِيَّة

Madrus aurantiaca, Toxylon pomiferum (S). Ma-
drus oranger, Oranger des Osages, Bois d'Arc (F).
Bow-wood tree, Osage orange (E). Osagedorn,
Osagenapfel (D). Madura aurantiaca (I).نوع من القائة وهي شجرة سبروتية فراء داخلة تعلق من
١٥ الى ٢٠ م . اوراقها تفلط من ٧ الى ١٦ سم . وتعرض
من ٣ الى ١٠ سم . نصلها اخضر الصلعة اللامعة البشرة ،
بارز المروق الباعثة اللون . ازهارها يستمر من سزيران
الى تموز . ثمارها مأكولة وهي برتقالية الشكل والحجم
واللون .

Géler (F). Gizzard (E).

٢١١٧٨ - قَائِصَة

ثالث جيب في جهاز هضم الطير . وهي حدة دون القبة
تعرف بالاختلاف والجربنة والحوصل والحوصلة والفرقة
والقائمة والمغفلة ...

Canon

٢١١٧٩ - قَائُون

مجموعة شرائع كنسية متباينة المصادر بعضها يرتكز على
التقاليد السابوية وبعضها يجاري الحقوق الطبيعية والمعروف
والتقاليد والقانون المدني .

قائة برتقالية

Lol (F). Law (E).

٢١١٨٠ - قَائُون ، شَرِيعَة

القائون او الشريعة بالتوسع معناها مجموعة القواعد القانونية
التي منها المشرع || والقائون بمعناه القوانين مجموعة القواعد
الاجتهادية الثابتة التي تسنها السلطة العامة وتكفل الفقرة
تنفيذها .

٢١١٨١ - قَائُون ، مَجْمُوعَة الْقَوَائِن

اسم شامل يطلق على مختلف فروع علم القانوين وتصومه
التشريعية للمسقة والمجموعة في ابواب ودوا .

٢١١٨٧ - قَائُونِ الْاَحْوَالِ الْشَخْصِيَّة

Code du statut personnel (F).

هو القانون الذي ينظم حالة المرء الشخصية من
الولادة الى اللبنة وذلك من حيث الارتباط الاجتماعي والاعلى
والخصائص .

٢١١٨٣ - قَائُونِ التِّجَارَةِ

Code de commerce (F). قَائُونِ التِّجَارَةِ

هو القانون الذي ينظم المعاملات التجارية .

من ١٠ الى ٢٠ سم . وهو جامد الصلعة ، بارز المروق
التوازية . اذقاتها صفيرة اللند خمسية التركيب || ازهارها
يستمر طوال شهر حزيران .

٢١٤٦٣ - قَائِلْ عَطْرِي

Cacalia suaveolens, Synosma suaveolens (S). Ca-
calle odoriférante (F).نوع من القائل وهو جنبة صفيرة اللند ممررة تعلق من
١٠٠ سم . اوراقها السفل حراية الشكل بمنجمة المماثل ،
اوراقها العليا مثلثة الزوايا . اذقاتها كبيرة اللند ، لاثمسية
التركيب تقسم من ٢٥ الى ٣٠ زهرة عرفها عطر فواح .
ازهارها يستمر من آب الى تشرين الاول .

٢١٤٦٤ - قَائِلْ كَبِيرِي الْوَرِّي

Cacalia reniformis (S). Cacalie réniforme (F).

نوع من القائل وهو جنبة ممررة تعلق من ١٥٠ الى ٣٠٠ سم .
اوراقها السفل كلوية الشكل ، كبيرة اللند تعرض نحو
٦٠ سم . اوراقها العليا اعليلجية مستطيلة . نصلها خضر
الصفائح المسننة المختار . اذقاتها صفيرة اللند ، خمسية
الازهار البيض || ازهارها يستمر من تموز الى آب .

Amome (F).

٢١٤٦٥ - قَائِلَة ، قَائِلِي

في الحال ، اطليه .

٢١٤٦٦ - قَائِلَة تَيْشِ الْفِيل

في الحال الجوزي ، اطليه .

٢١٤٦٧ - قَائِلَة حَبَشِيَّة

Amome de Madagascar في الحال الجبشي ، اطليه .

٢١٤٦٨ - قَائِلَة ذَكْرِيَّة

Mélégucette (F). في الحال الذكر ، اطليه .

٢١٤٦٩ - قَائِلَة صَغِيرَة

Cardamome petit (F). في الحال الصغير ، اطليه .

٢١٤٧٠ - قَائِلَة عُنُقُودِيَّة

Amome cardamome (F). في حال حما ، اطليه .

٢١٤٧١ - قَائِلَة مَجْتَمَعَة

Cardamome allé de java (F). في حال جاوا ، اطليه .

٢١٤٧٢ - قَائِلَات

Amomaceae (S). قَائِلَات

Amomacées (F). Amomaceae (E).

في الحالات سبط من فصيلة الزنجبليات . نباتاتها
جسمورية ، صحرالية ، ممررة . بعضها طبي وبعضها
عطري وزراحي ودرجي .

٢١٤٧٣ - قَائِم ، قَائِم ، هَرْمِين

Ictis ermine, Putorius arminas (S). Hermine, Be-
lette hermine (F). Ermine, Stoat (E). Hermelin (D).حيوان من السراحيب اطنانه البلاد الجبلية العالية . ثوبه
الاصبي الى الابيض المائلة . اما الشتوي فابيض اسفر او
ابيض يلق الا طرف ذنبه الذي يبقى على لونه الجوزي
يطوه ملج اسود . جسمه اهيف اللند ، قصير الجرازم ،
طوله يراوح بين ٢٤ و ٢٧ سم . وذنبه من ١٠ الى ١١ سم .
وهو من الحيوانات الشجاعة الشرسة . يسرح في الليل ،
يسمر على الارض ويتسلق الانجار . قوته القزاع والارنب
والظفر والزحافات على اختلافها من الانعام الى العظام .
انثاه تقسم ممررة في الحول من جروين الى ثمانية . فروته
جيدة الصنف ثينة القدر .

القد؛ قشوره مستسمة، غلومة، بارزة الصلوع، ولها الى الصفرة || يرغب في التربة المروية الخفيفة الغنية بالناصر العضوية .

٢١٤٩٨ - قانون المير - هو القبطين الأقرع، اطلبه .

٢١٤٩٩ - قانون هندي *

Cucumis anguria (S). Angurie, Anguria, Concombre des Antilles, C. marron (F). Beer-gherkin, West Indian gherkin (E). Birgurke, Angurilingurke (D), Anguria, Cocomero anguria (I).

نوع من القرعيات الحولية، غروبها عديدة منها البرية والزراعية، اصنافها البلاد الحارة. جميعها عذابة ومتسلقة. اوراقها كثيفة ثلاثية التخصيص، حية النصل حل صفحتيه. ثمارها بقلية مأكولة وهي مستطيلة المالحق، رنية الشكل والحليم، مسلمة القشور الخزولية الشاذية. الوانها تختلف باختلاف الصروب منها الاخضر والاصفر والمخمد والموشم والاخضر.

٢١٥٠٠ - قايمة * Coccomyces

جنس فطور مجهرية من الرنيات وفصيلة الفشاريات. يتميز ببدائه النائرة في ونيمته الرسية. بونه غطيلى او مخروطي الشكل مستقيم الانتصاب او احسين، إزلاقه كيدي وكتائده حمية الشكل. بوفياته كيفية التجميع شفاقة غطيلى مستقيمة او منعققة || انواعه قليلة منها واحد مؤدى يسمى قايوة الكرز.

٢١٥٠١ - قايوة الكرز *

Coccomyces hiemalis, Cylindrosporium hiemale (S). قطر مجهرى ركب انناد الكرز وأوراقه وأمن ثماره. مظهره الخارجى حل الاوراق زرقه كيفية، لونها الى الجوزة تركب صفحة النصل العليا ويحجب الصلع والورق. قطر البقعة منها براوح بين ١ و ٣ م. وهي شبه مستديرة او مقربة الزوايا || يسبب جفاف النصل والأحيال الباكر بعد ان يوقف التبادل النسسى قبل زمن التركيد الطبيعي، وهو على الاذن يقع صغيرة ميمرة لونها الى الحمرة تسبب جفاف النسج الواصلة وتمزق نقل النسج الى التبار فتجهم وتسقط || أما على الفروع والافناد فهو يقع قرصية وسادية الشكل متوسطة الكثافة ميمرة بدون انظام ركب البشرة وتضرب اللحاء فتدخل الاويمة وتمطها وتمتصها عن القيام بوظيفتها || يكافح باستمال احد الوسائل السلفوكلسية التجارية بعد تخفيفها ٥٠ ٪ وتزويدها نحو ٠,٦ ٪ من سلفات الحديد. تلصق الانجبار حل مرتين او ثلاث مرات، الاول حل اثر العقد والثانية بعد الاول بأسبوعين والثالثة بعد الثانية بثلاثة اسابيع .

٢١٥٠٢ - قاييد Alkalid (F). Alkalid (E).

القائد آخر نجم من كوكبة بنات لمش الصفرى .

٢١٥٠٣ - قايقة * Morphologie interne (F).

Internal morphology (E). هي ديس تركيب الاجسام ويعيها الداخلية في الحيوان والنبات .

٢١٥٠٤ - قايمة Membre (F). Member (E).

٢١٥٠٥ - قايض Troquer (F). To truck (E).

استامض سلمة سلمة .

٢١٤٩٤ - قانون الحراج ، قانون الأحرار

Code forestier (F). Forest rule (E).

هو القانون الذي ينظم ملكية الأحرار وصيانتها واستغلالها الى آخره .

٢١٤٩٥ - قانون الصناعة Droit industriel (F).

Industrial law (E). هو القانون الذي ينظم الشؤون الصناعية ويحميها .

٢١٤٩٦ - قانون الضرائب Droit fiscal (F).

Fiscal law (E). هو القانون الذي ينظم الضرائب حل الإعيان الثابتة والمنقولة فيقدرها ويفرضها ويمن طرق جبايتها .

٢١٤٩٧ - قانون الطرق Code de la route (F).

Rule of the road (E). هو القانون الذي ينظم السير حل الطرق .

٢١٤٩٨ - قانون العرف والعادات

Droit coutumier (F). Unwritten law sanctioned by usage (E). مجموعة التواعد القانونية التي تفرها العرف .

٢١٤٩٩ - قانون العقوبات Code pénal (F).

Penal law (E). هو القانون الذي يبين الجرائم وعقوباتها والاشخاص الذين تصح معاقبتهم .

٢١٤٩٠ - قانون المحكمة Lex fori

صفة لاتينية تشمل في القانون الدولي الخاص دلالة حل نصوص القانون الذي تأخذ به المحكمة المطروح عليها النزاع .

٢١٤٩١ - قانون زراعى Droit rural (F).

Rural law (E). هو الذي ينظم الملكية الزراعية ويحمي الزراعة .

٢١٤٩٢ - قانون مكان التعاقد

Lex loci contractus صفة لاتينية تشمل في القانون الدولي الخاص دلالة حل قانون البلد الذي انعقد فيه العقد .

٢١٤٩٣ - قانون موقع المال Lex rei sitae

صفة لاتينية تشمل في القانون الدولي الخاص دلالة حل قانون البلد الذي يقع فيه المال . وهو يسري حل الاموال الخاصة بجماع .

٢١٤٩٤ - قانوني Légal (F). Legal, Lawful (E).

نمت يستعمل دلالة حل مطابقة القانون او حل صدور النصوص بعن القانون .

٢١٤٩٥ - قانون Martin-pêcheur (F).

هو القزل ، اطلبه .

٢١٤٩٦ - قانون شائع Martin-pêcheur vulgaire

هو القزل الشائع ، اطلبه .

٢١٤٩٧ - قانون * ، قانون سنطايوي

Cucumis angulatus (S). Melon santavi (F). Santawi melon (E). Santavische melon (D). Melone santavi d'Egypte (I).

نوع من الثيام الزراعي للأكل ، وهو من نبات البلاد الحارة تكثر زراعته في مصر . ثماره رنية الشكل، كبيرة



قارون



قارون هندي



قايوة الكرز

٢١٥٠٦ - قَبْ

آخر حلقة من بطن القشريات .

Telson

٢١٥٠٧ - قَبْ

قب النبات ؛ ييس .

Sécher (F). To dry (E).

٢١٥٠٨ - قَبَا

Apside (F), Apsis (E).

كل طرف من طرفي فلك المحور الأكبر في الكواكب الخلس أي السيار .

٢١٥٠٩ - قَبَا

Pleurotomaria (S).

Pleurotomaria (F), Pleurotomaria (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مهدبات الأرجل وفصيلة القبابيات . أنواعه المرفوعة كثيرة العدد ، منها نحو ٥٠٠ من متحجرات الاحقاب الاول ، وأربعة أنواع ماصرة منتشرة في مجار البلاد الحارة || أصدانها كبيرة ، عتلية ، زهية ، صابحية الدورة الخلوية التي تعيش مع الاقتراب من القلب .

٢١٥١٠ - قَبَاب ، قَبَاب

Polyprion (S).

Carnier (F).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الصرايات شاككات الزمائف . أنواعه عديدة معظمها من اسماك البحر المتوسط . جميعها كبيرة القد ، طول اجسامها يراوح من ٧٠ الى ٢٠٠ سم . فلونها مستدرة ، جامدة ، مراكية . زعانفها شاككة . يستطيل افراسها الى السرة البنية يعلوها تيجيج ابيض . وهي من الاسماك المأكولة المستحبة للعلم .

٢١٥١١ - قَبَاب أَسْمَر * ، كَسْعَد ، دَبَّح

Polyprion carniun (S), Carnier brun (F).

Brown Stone-bass (E).

نوع من القباب . سمكة بحرية بيوض من فصيلة الصرائيات . كانت ، في التصنيف السابق ، تتبع فصيلة القرشيات . اعطائها معظم اقاليم البحر الابيض المتوسط || جسمها اطيحي الشكل ، كبير القد ، يطول من ٧٠ الى ١٠٠ سم . حراشفها صغيرة ، معدنية ، مسننة الحوافي . لوها الى السرة البنية يعلوها تيجيج ابيض || رأسها مخروطي الشكل ، ذلق الخط . شلقتها واسع الانفتاح . فكها الاسفل يتقدم الاعل . عيناها كبيرتان ، مستديرتان ، نائزتان || زعانفها متباينة الاشكال والاحجام ومنها المنخسية الشاككة ومنها المفصلة السرحة || عليها جبه الصفت ، مخروطي فيه الا في زين مرض الخرجان الذي يمتد من شواط الى نيسان ومن ايلول الى تشرين الثاني .

٢١٥١٢ - قَبَابِيَّات *

Pleurotomaridae (S), Pleurotomaridae (F), Pleurotomaridae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات مهدبات الأرجل اماميات الخياشيم . اجناسها وأنواعها المرفوعة كثيرة العدد معظمها من متحجرات الاحقاب الاول وبعضها معاصر || اصدانها متباينة الاحجام والاشكال معظمها مستطيل الخزانة التي تبدو كأنها قَبْ متراكبة || اعرف اجناسها واسمها القباب والشرمة .

٢١٥١٣ - قَبَاة ، قَبَاة

عشبة تنبت في الفلظ ولا تنبت في الجبل ترتفع عن الارض قيس الاعلى او اقل ارتفاعها الموائى (١ م.) ج قبا .

٢١٥١٤ - قَبَاح *

Tetraophasis (S), Tétrapphase (F), Tetraophasis (E).

جنس طير من فصيلة التربيات . ثوباء المرفوقا ييشان في جبال التبت . شكله قريب الشبه بالفرفر . جسمه متوسط القد . ثوبه الى السرة المنمرة بالافخر . زوره اسود مطوق بالابيض . ذنبه متوسط الطول ، مستدير الطرف . منقاده ورجلاه الى الجوزة السوداء .

٢١٥١٥ - قَبَاح

القباح طرف عظم المقعد عما يلي المرفق .

٢١٥١٦ - قَبَاح

Ours (vieux) (F), Bear (old) (E).

القباح : اللب الحرم .

٢١٥١٧ - قَبَّار

Claprier commun (F).

هو الكبر الشاكك ، اطله .

٢١٥١٨ - قَبَاة

Monogénie (F), Monogeny (E).

القباة منقش تتألف من اجسام المتماثلة المتماثلة تتلف اجساماً تتفصل عنها وتتفصل بذاتها .

٢١٥١٩ - قَبَاح * ، قَبَّع ، قَبَّع

Aulacodus (S), Aulacode (F), Cane rat (E).

جنس حيوانات لبونة قاضية ، من فصيلة الداغيات . أنواعه عديدة قريبة الشبه من الجربان . اجسامها ربة قوية تطول من ٥٠ الى ٦٠ سم . وذانها من ١٤ الى ٢٢ سم . ورؤسها صغيرة . مناقمها قصيرة وعريضة . اذنانها نصف مستديرة . جرابها قصيرة خلسة الاصابع . اطرافها منجلية الشكل ، اذنانها حليلة الشعر شاككة || افراسها الى السهبة السوداء تعقب مع اقترابها من الظفر وتبيض عند البين . صوفها غثن للعلم قبل الكفافة || موطنها بعض الاصقاع الافريقية تكثر في المناطق الجنوبية والوسطى . تألف مختلف الاقاليم الزراعية . اجبرتها افاحيص تنفصدا في الادغال والمقاصب وبين الصغور القريبة من الحقول المزروعة . قوتها الفستق وسائر النباتات الصغيرة ونقص السكر والجزران .

٢١٥٢٠ - قَبَاح

صوت الخنزير .

٢١٥٢١ - قَبَان

Bascule (F), See-saw (E).

جهاز توزن به الاشياء .

٢١٥٢٢ - قَبَب *

Cordylina (F).

جنس نباتات برية وزينية من فصيلة الزنبقيات ، أنواعه عديدة مهداة البلاد الحارة . اوروبها خضرة ، جذوعها منتخبة ، اوراقها عصفية الشكل مستطيلة . ازهارها حامية الارتكاز ، عتقية للتجميع ، صغيرة القد يكثر فيها الابيض والبيكلي || اشهر أنواعه ما يلي .

٢١٥٢٣ - قَبَب أَحْمَر

Cordylina rubra (S).

Cordylina rouge (F).

نوع من القباب وهو شجيرة زينية سرولية ، تطول من ٣٠٠ الى ٤٥٠ سم . اوراقها عصفية الشكل منقطة . نصلها يطول من ٣٠ الى ٤٠ سم . وهو جامد الصلابة المائلة ، شديد الخضار . مقلها صغير القد ، اطول الشراخ . ازهارها الى الحمرة يعلوها موج بنفسجي .



قب



قَبْ اسمر



قَبَّاح



قَبَا



قَبْ

مقاره إلى السرة الزيتونية || موطنه هضاب وسهل الشرق الأوسط وروية. يكثر في المراق || انفاه تبيض من ١٢ إلى ١٨ بيضة تحضنها بعدها ثلاثة أسابيع .

٢١٥٣٠ - قُبَّة ، قُبَّة ، قُبَّة ، قُبَّة

Alauda (S). Alouette (F). Lark (E).
ج. قبر وقنار. جلس طير من فصيلة القبريات، أنواعه عديدة، أعطانها فصحة الأرجاء تشمل معظم البلاد الحارة والمعتدلة. جميعها ناعمة. أجسامها صغيرة اللد تطلو من ١٤ إلى ٢٥ سم. مناقيرها مخروطية قصيرة. أجنتها مستطيلة. أذنانها فارقة. أوتابها موشة مرقشة || قوتها الحشرات واليدور البرية. أشهر أنواعها مايلي .

٢١٥٣١ - قُبَّة الحَقْل * ، قُبَّة مَعْرُوفَة

Alauda arvensis (S). Alouette des champs, A. commune (F). Skylark (E).
نوع من القبرة وهو طائر صغير اللد ، طوله نحو ١٨ سم. فوهه متداخل الألوان ، رأسه وظواهره إلى الكعبة الموشة بالأسود والأصهب والأخضر . بطنه وشرابه إلى البياض الأخر تملو رشفة سمره . حنار صوته الإعل مستطيل الشكل اشقر اللون . عيانه جوزيتان . مقاره إلى السرة . يئن في القربة بين الزروع وفي المراعي والناظر . انفاه تبيض من مرتين إلى ثلاث مرات في السنة . حنيتها تتبلى أربع بيضات أو خمس ، أما الحفن فينوم ١٤ بيضا تقوم به الإثنى بمناوبة الآخر .

٢١٥٣٢ - قُبَّة النَبَاش *

Alauda arborea, Lullula arborea (S). Alouette lulu, A. des bois (F). Wood lark (E).
نوع من القبرة ، وهو طائر صغير اللد يطول نحو ١٥ سم. فوهه ثوب قبرة الحقل ، لكنه أنصع بياضا وأشقر صهبة . يألف الورد والحساب والنباش والمجرة الأشجار ، يرغب في مراعات الخلل والصمر . انفاه تبيض ثلاث مرات في السنة والحفن يكون بمناوبة الذكر .

٢١٥٣٣ - قُبَّة سَمَرَاء * ، قُبَّة ، عَلْبَعَلَة

Alauda brachydactyla (S). Alouette calandrella (F).
نوع من القبرة ، صغيرة اللد تطلو نحو ١٤ سم. فوهها ثوب قبرة الحقل إلا أنه أشقر صرة . وهي أطول جنسا من قبرة النباش وأقصر رسا منها || تألف الأراضي الكلبة والرميلة . انفاها تبيض ثلاث مرات في السنة . بيضها أصهب اللون تملو رشفة حنطية .

٢١٥٣٤ - قُبَّة مَنُوحَة *

Alauda cristata, Galerida cristata (S). Alouette cochervia, Cochevis huppé (F). Tufted lark (E).
نوع من القبرة ، ومنهم من جعلها جنسا مستقلا . جسمها يطول نحو ١٨ سم. رأسها مستطيل القنزعة . ظهوها اسمر اللون ، وريدي الملوخ ، حنار ريش رأسها وظهوها وجنتها إلى الصهبة الحنطية . صندرها وبنها وشرابها إلى البياض الأصهب تملو رشفة مستطيلة سوداء اللون . أعطانها البلاد الحارة والمعتدلة . تألف المناطق البوادية والمراعي والحقل والزروعة ويوانب القنارات . قوتها الحشرات والمراوم واليدور والجويوب || تدن شها في القربة بين الاشجار أو تحت التلع . وهي لا تبيض أكثر من مرتين في الحبل . حنيتها تتألف من ٥ أو ٦ بيضات تقوم بها الإثنى بمناوبة الذكر .

٢١٥٣٤ - قُبَّ الجَنُوب (S). Cordylone australis (S). Cordylone australe (F).

نوع من القُبَّ وهو شجرة سرورية برية وتربيتية تملو من ١٠ إلى ١٢ سم. ساقها فراء . أوراقها تشبه أوراق البيركا. تصلها بطول من ٨٥ إلى ١٢٠ سم. وهو مائل البشرة جبل الأخضر الزاهي يعلو ثوب أخضر أو أحر . انفاها إلى البياض الأخضر . أحداقها كبيرة اللد متوسطة الكثافة . أزهارها يستمر من آذار إلى نيسان .

٢١٥٣٥ - قُبَّ كَثِيف الزَّهر

Cordylone dense (S). Cordylone dense (F).
نوع من القُبَّ وهو شجرة تربيتية تملو من ١٥٠ إلى ٣٠٠ سم. ساقها نحيلة فراء . أوراقها تطلو من ٣٠ إلى ٧٠ سم. نصلها جامد الصلصة من الحافة أحسن الزام الأخير ، لونه إلى الأخضر القمايق || شراخها الزهري قرمزي اللون ، حلقها كثيف التجميع ، أزهارها ليلية .

٢١٥٣٦ - قُبَّة Azda

القبة بعض نجوم كوكبية الأكليل الجنوبي . سميت قبة لاستوائها . بين العرب من يسميها أدسى التمام لأنها على جنوب التمامين .

٢١٥٣٧ - قُبَّة ، قُبَّة ، حِفْث Feullet (F). Third stomach of ruminantia (E).

هي من كلف وأشلامه ذات أطباق متصلة بالكروش وهي البواء الذي يتنلى إليه الفرف .

٢١٥٣٨ - قُبَّوَر * ، جَمَل مُكَرَّم

Ateuchus laticollis (S). Scarabée à large dôme (F). Ateuchus laticollis (E).

حشرة ناعمة من فصيلة الجمليات ورتبة خدليات الإحضة . يألف المزارع والبراري يعيش على التني والروث والكبر . ماراه يدعى كبرتل يتألف من نفق أو نفقين وسجيرة فصية لسانه لايزود القممولة التي يعيش عليها || جسمه متوسط اللد يطول من ١٦ إلى ٢٢ سم. فوهه إلى السوداء اللامع . رأسه صغير الحجم . قصير الخطم . زبانه صديران دقيقان . عيانه صديرتان ماصحتان . ظهره انسه محدد الشكل ، بالغ التقصيد البهدي ، مقطوم المؤخر ، لا يلف كابل اللحن || اللحن أصفر لدا من الذكر واجت فويا منه وأكبر سراً || له جبل واحد في الحبل . تظهر الحشرة الجملانية في أيار وتعيش حتى أيلول . تسرح في النهار . تسلك في حيزان . تنجح مكنة واسعة في القممولة || البرقة عند بلوغها الإدراك تمام تطلو نحو ٢٢ سم. جسمها غليظ البيل والطرف ، مقوس الشكل ، قصير الأرجاب ، ضلع التآخير يوجبها إلى القربة السمره . رأسها اسود اللون ، أحر الملوخ . تعيش في أول عهدنا على المواد البصورية الموجودة في القممولة ثم على التزبل حتى زين الأكمال .

٢١٥٣٩ - قُبَّ ، قُبَّ ، حَجَل أَرَبْدَة ، حَجَل عِرَاقِي

Sterna (S). Sterna, Perdrix grise (F). Sand partridge, Bonham's (E).
طائر وحيد الجنس والنوع من عمارة الجمليات وفصيلة الطيوريات . وأسدته قبيجة للذكر والأنثى ، وهي طائر ربع الجففة ، متوسط اللد ، طوله نحو ٢٨ سم. فوهه إلى الربعة الرصاصية الضفعية الملوخ يعلوها جميع وتؤم وتنبج .



قُبَّوَر



قُبَّ



قُبَّة الحَقْل



قُبَّة النَبَاش



قُبَّة سَمَرَاء



قُبَّة مَنُوحَة

الحافة . شراعيها الزهري يعلو من ٢٠ الى ٤٠ سم .
ازهارها ال الصفار المابن يعلو توشم سطحي يستقر صه
المختار || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

٢١٥٤٣ - قيس
Type
هو النموذج المثال الذي يجمع اللامع الشكلية الرئيسية
المالدة الى الضرب او السلالة او الفرع .

٢١٥٤٤ - قيس * ، بوليمونيم
Polemonium (S). Polémoine (F).
جنس نباتات برية وزراعية زينة من فصيلة القديسات
انواعها عديدة جميعها عشبية معمرة . اوراتها متعاقبة ،
مركبة ، مستطيلة . ازهارها عتقدي او عككولي التجميع .
اشهر انواعها الزراعية الزينة ما يتبع .

٢١٥٤٥ - قيس الأزرق
Polémoine bleue (F).
هو عشبية المغرب ، اطاليا .

٢١٥٤٦ - قيس بيجي
Polemonium pulcherrimum (S). Polémoine
superbe (F).
عشبة معمرة صغيرة لثة زياه . تملو نحو ٢٥ سم . ساقها
فرماة منتصبه قليلة الورق . وريقاتها وريعية وريعية التجميع
عندما يروح بين ١٧ و ٢٧ عتاقدها الزهري متصلة
الكتافة . ازهارها ثنائية اللون منها الازرق والاصفر ومنها
الازرق والابيض ومنها الازرق والابيض الموشم بالاحمر .
ازهارها يستمر من تموز الى ايلول .

٢١٥٤٧ - قيس صوفي
Polemonium lanatum (S). Polémoine laineuse (F).
عشبة معمرة صغيرة لثة . مهبطها البلاد الباردة . تملو من
١٠ الى ٢٥ سم . ساقها وارقاتها وازهارها زينة البشرة .
ساقها نحلة . اوراتها قليلة العدد . وريقاتها وريعية التجميع
تألف من ١٧ الى ١٩ او ٢١ وريقة . ازهارها لبنة
زرقاء اللون || ازهارها يستمر من تموز الى ايلول .

٢١٥٤٨ - قيس قليل الزهر
Polemonium pauciflorum (S). Polémoine pauci-
flore (F).
عشبة معمرة زياه الفروع تملو من ٢٥ الى ٣٥ سم . ساقها
منتصبه . اوراتها نظامية . وريقاتها ٢٧ عتقدها
الزهري قليل الازهار . ازهارها صفراء اللون مستطيلة الشكل .
ازهارها يستمر من حزيران الى تموز .

٢١٥٤٩ - قيس مسطح
Polemonium reptans (S). Polémoine couchée (F).
عشبة معمرة صغيرة لثة . تملو من ١٥ الى ٢٥ سم . ساقها
منبطحة . اوراتها مرطاة المتصل ، صغيرة الحجم . وريقاتها
وريعية ، خلسية او سباعية او تساعية العدد . عتاقدها
الزهري رطلة التجميع ، ازهارها الى القرحة اليلكية || ازهارها
يستمر من حزيران الى تموز .

٢١٥٥٠ - قيسي
Endémique (F). Endemic (E).
نمت تعريف ي يطلق على النباتات والامراض التي تعيش
وتتكاثر في محيط مناخي معين محصور .

٢١٥٥١ - قيسي
Monogénique (F).
Monogenic, Monogenetic (E).
نمت تعريف ي يطلق على كل ما هو عائله الى القيسية .

٢١٥٣٥ - قديسات
Alaudidae (S). Alaudidae (E).

فصيلة القديس ، من الطوائف المغرطيات المنقرض . اجناسها
عديدة منها القديسة واللبل والمكاه والرمحل والرمحل والقديس .
معظمها من الطوائف ويصنف اليه || جميعها تألف الحفيس
اكثر من الاجواء والاشجار . اجناسها ربعة . رؤوسها
كبيرة ، متعاقبة لا قياسية . اجنحتها مستطيلة ، اذناها
قصيرة || قوتها الحطرات والجزور البرية .

٢١٥٣٦ - قديسة * ، قديس
Corydalis (S). Corydalis (F). Corydalis (E). Klee-
terder (D). Coralliflora (I).

جنس نباتات برية وزينة من فصيلة الحشائشيات
انواعها عديدة معظمها جديسوري ويصنف دوسي . اوراتها
جلدية الازنكار او قرصية ، نصلها كثير التفريش
والتشريح . ازهارها عتقدي التجميع ترتكز على شراخ
يقوم مقام الساق || اشهر انواعها ما يتبع .

٢١٥٣٧ - قديسة جوفاء
Corydalis cava (S). Corydalis creuse (F).

عشبة جذمورية معمرة . جذورها دوفسية جوفاء . ساقها
شراخ يعلو من ٢٠ الى ٣٥ سم . ينهي بالعتقدي الزهري .
ازهارها حر او بيض || ازهارها يستمر من اذار
الى ايار .

٢١٥٣٨ - قديسة سد كايعة الورق
Corydalis rupestris (S). Corydalis à feuilles
de rue (F).

عشبة جذمورية معمرة . جذورها دوفسية مفلطحة جامدة
اللباب . اوراتها ساقية الشكل . ازهارها وريعية كبيرة
القد . شراعيها يعلو نحو ١٥ سم . || ازهارها يستمر
من نيسان الى ايار .

٢١٥٣٩ - قديسة صفراء
Corydalis lutea (S). Corydalis jaune (F).

عشبة جذمورية معمرة . اوراتها متوسطة التفريش
والتشريح ، مالة البشرة . شراعيها الزهري يعلو من ٢٥
الى ٣٥ سم . ازهارها ذهنية اللون ، بزوها نمسية لامة .
ازهارها يستمر من ايار الى ايلول .

٢١٥٤٠ - قديسة قديسة الورق
Corydalis cheilanthifolia (S). Corydalis à feuilles de
cheilanthus (F).

عشبة جذمورية معمرة . اوراتها قديسة الشكل ، مالة
البشرة تملو نحو ٢٠ سم . شراعيها الزهري يعلو نحو
٢٥ سم . ازهارها كثيرة العدد ، جللة الصفار القاتم .
ازهارها يستمر طويلا فصل الربيع .

٢١٥٤١ - قديسة مزخرفية
Corydalis tomentosa (S). Corydalis tomentosa (F).
عشبة نمسية نحلة . اوراتها قرصية الانتشاح ، نصلها
يعلو من ١٠ الى ١٨ سم . وهو متباح التفريش ، كثير
التشريح ، مزهر الصلصة . ازهارها ال الصفار الكبيرتي .
شراعيها يعلو نحو ٢٠ سم || ازهارها يستمر طويلا
فصل الربيع .

٢١٥٤٢ - قديسة نيسلة
Corydalis nobilis (S). Corydalis noble (F).
عشبة جذمورية معمرة . اوراتها متباحة التشريح ، مسنة



قديسة



قيس

٢١٥٦٠ - قُبَّيَات (S). Dermochelidae
٢١٥٦١ - قُبَّيَات (F). Dermochelidae

فصيلة حيوانات بحرية بيوضة من رتبة السلاحف. النوع المعاصر الوحيد من هذه الفصيلة هو القُبَّيَّس || يتبين القُبَّيَّس بفقاره وضلوعه الطويلة غير الممتدة بالذبل. وبذيله المركب من صفائح صلبة متتالية تنقسم في السفن. ويخلو من السهف القرني المادة الذي يتكون ذبال سائر السلاحف || الانثى وحدها تأتي الى البر من مرتين الى ثلاث مرات في الحول وذلك في زين الاشلاق حيث تقبع في كل مرة من ١٠٠ الى ١٥٠ شلفة تنفث بعد وضعها بنحو ثمة اسابيع. والقُبَّيَّس فور نلقه يتوجه تراء نحو البحر.

٢١٥٦١ - قُبَّيَات (F). Málanger
To mix, To mingle (E).
 قُبَّيَات القُبَّيَّس : خلطه جيداً. يقال قُبَّيَات الاسمدة الكُباوية.

٢١٥٦٢ - قُبَّيَات (F). Aulacode
 هو القُبَّيَّس حيوان لبون قاضم اطلبه.

٢١٥٦٣ - قُبَّيَّة (F). Alouette calandrelle
 هي القُبَّيَّة السراء. صفور ابقع ارض تكثر اقامته قرب اجساد الجردان فاذا فرغ اتبع فيها.

٢١٥٦٤ - قُبَّيَّة (F). Petasites
 جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة المركبات. انواعه عديدة منها البرية والطيبة والتزيينية. اوراقها جلدية معتقة متراكبة فارقة التصل المستدير او القلبي الشكل. ازهارها سبلي التجميع رأسي الارتكاز قاعدته مخراج غليظ متصطب تكسو الحراشف. ازهارها متعددة الالوان. اشهر انواعه ما يتبع.

٢١٥٦٥ - قُبَّيَّة بَيْضَاء (S). Petasite albus
Pétasite blanc (F).
 عشبة جبلية معمرة تملو نحو ٨٠ سم. اوراقها كبيرة فارسة طويلاً. نحو ٧٠ سم. وعرصها ٥٠ سم. نصلها ازغب البشرة اطول اللون اخضر العروق السفلى. شمراخها الزهري. يملو نحو ٨٠ سم. حراشفه خضر، ازهاره صفر.

٢١٥٦٦ - قُبَّيَّة لَبْجِيَّة (S). Petasite niveus
Pétasite neigeux (F).
 عشبة جبلية معمرة تملو نحو ٦٠ سم. اوراقها كبيرة، مثثة ازواياً، نصلها غش الصفحة العليا البحرية اللون ازغب الصفحة السفلى الطحال. اللون. شمراخها يملو نحو ٦٠ سم. ازهارها الى البياض اللبني.

٢١٥٦٧ - قُبَّيَّة عَطْرَة (S). Petasite fragrans
Nardoosmia fragrans (S). Pétasite odoriférant. Héliotrope d'hiver (F).
 عشبة معمرة تملو من ٢٠ الى ٣٠ سم. اوراقها صلبة، كلوية الشكل، خضراء التصل عل صفحتها، مسنة الحافة. ازهارها بنفسجية اللون عطرة. عرفها يشبه الونيل. تزدهر الترين. ازهارها شوي.

٢١٥٦٨ - قُبَّيَّة مَخْزُونِيَّة (F). Pétasite officinal
 هي حشيشة القرمز، اطلها.

٢١٥٥٢ - قُبَّيَات (S). Polemoniaceae
٢١٥٥٣ - قُبَّيَات (F). Polemoniaceae

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة مظهرها بري وبعضها زراعي تزييني.

٢١٥٥٣ - قُبَّيَّة (F). Monogénisme
Monogenism (E).

وحدة الاصل والدرية. نظرية علمية، ركيزتها التسلسل المنطقي، توضح ان الاجناس البشرية تنفرع من قبس اصلي واحد.

٢١٥٥٤ - قُبَّيَّس (F). Gononourrhálie
 تصالب فرزي تكون انثى انثاه عاقرة أما ذكره فنائرة.

٢١٥٥٥ - قُبَّيَّس، قُبَّيَّس (F). Fourmière
Ant-hill, Ant's nest (E).
 مجتمع النمل الكبير الكثير. وهو ما يدعى قرية وبشلة.

٢١٥٥٦ - قُبَّيَّة (S). Truxalus
Truxale, Truxalis, Tryxalis (F). Truxalus (E).

حشرة قاضية نشاطها من فصيلة الجرذيات. اطلها جميع الاصقاع الحارة والمعتلة الحارة من العالم القديم || جسمها كبير القذ يطلو من ٣٥ الى ٤٠ سم. عته الذكر ويطلو من ٥٥ الى ٦٠ سم. عته الانثى. قوبها الى الكهبة البراء يملو سواج اعصر ويخضع اسر. زباناها قلابيا الشكل، مستطبا اطول. اجنتها شفافة ملونة حراء القاعدة، وردية الشجاع، حطليبة الحاشية || تجوب المراعي والمواقع الرطبة من حزيزان الى آب || اغزلها زعيدة لانها قليلة العدد.

٢١٥٥٧ - قُبَّيَّس (F). Truxalus
 هو الانثى، اطله.

٢١٥٥٨ - قُبَّيَّس (S). Dermatochelys coriacea
Dermatochelys coriacea (S).

سلحفاة بحرية بيوضة من فصيلة القُبَّيَّيَّات. اطلها كانت في التصنيف السابق تتبع فصيلة القُبَّيَّيَّات || اطلها معتم بحار العالم. قوتها الاسماك والرخويات والنباتات البحرية والمرجان. لا تقرب من الشطوط الا في زين الاشلاق. محاضنها المشهورة شواطئ الهند والخليج والبرازيل || جسمها كبير القذ، يطلو من ١٨٠ الى ٢٥٠ سم. وزنها يراوح من ٥٥٠ الى ٩٠٠ كيلو. ذيلها سفلي المادة والتركيب، سبابي الاكثار القاطية المسترسعة عته قواعدها، الضيقة والقصية التجميع عته اطرافها. زعظها منبسطة الصفحة، رأسها معتدل الجرم، شبه اقلس. عتها غليظ، معتدل الطول. قوامها خبطلة، زعظية الشكل، عادمة المقانب، قائمتها الاماميتان كبيرتان، ضليمتان، مخروتا الى مقلتين مجذائيتين لا يقل طولها من ٣٠٠ سم. ولا يتجاوز ٣٦٠ سم. || عويلها عته اقتناصها زماق صاصب شديد النقع || لها ما كويل.

٢١٥٥٩ - قُبَّيَّيَّان (S). Strombus lambis
 نوع من الدلاع وهو من الحلازين الكبيرة يحثف فيكون منه اطباق الطيب.



قُبَّيَّة




قُبَّيَّس



قُبَّيَّان



قُبَّيَّة



قبيل

وحيدات الاجهزة وفصيلة القبيويات. انواعها المعاصرة المروفة عديدة منتشرة في معظم بحار العالم. تعيش على الصخور المغمورة قرب الشاطئ || اصنافها غريبة قبيية الشكل. اجسامها تأخذ اشكال الاصداف. رؤوسها بيضاء. افواهها مستعرضة تنتهي باعظام متفاعة الطول. لواسها مستطيلة ذلقة. حيواتها تحتل قواعد الاواس. خياشيمها وحيدة النصف تملأ الحناجر الانامي من الرداء قرب الفتق. ارجلها وحيدة ، كبيرة ورفيقة .

٢١٥٧٧ - قبليات ٥
Capulidae (S).
Capulidae (F). Capulidae (E).

لمسلة حيوانات بحرية من الرخويات مديات الارجل وحيدات الاجهزة. اجنتها وانواعها المروفة عديدة منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحارة || تتميز باصنافها الغريبة التي يكثر فيها الشكل القبي وبانواعها المستعرضة || اعرف اجناسها واشهرها القبوة والبابوبية والمقنة والوفس .

٢١٥٧٨ - قبيل ٥
Vent d'Est (F). Easterly wind (E). قبيل ٥
القبيل : ريح الصبا.

٢١٥٧٩ - قبيل ٥
Acceptation (F). Acceptance (E). قبيل ٥
هو الرضا بما يمرض .

٢١٥٨٠ - قبيل ٥
Acquiescement (F). Acquiescence, Compliance (E). قبيل ٥
هو الرضا بعمل تم أو حكم صدر .

٢١٥٨١ - قبيل ٥
Levée d'option (F). قبيل ٥
عقد يقسم فيه من كان غيراً في الشراء يهد مكتوب عن قبول الشراء بالشروط التي توافق عليها الطرفان .

٢١٥٨٢ - قبيل ٥
Réception de caution (F). قبيل ٥
قبول كفالة شخص قسمه المدين الى اثنين .

٢١٥٨٣ - قبيل ٥
Acceptation de donation (F). قبيل ٥
تصريح الموهوب له في القصد بقبول الهبة .

٢١٥٨٤ - قبيل ٥
Acceptation du succession, A. d'un legs (F). قبيل ٥
هو قبول الوارث أو الموصى له بما لجا أو عليه .

٢١٥٨٥ - قبيل ٥
Acquiescement conditionnel (F). قبيل ٥
هو اظهار الرضا أو القبول شرط ان يؤدي الراضي أو الغير الآخر عملاً معيناً .

٢١٥٨٦ - قبيل ٥
Acquiescement exprès (F). قبيل ٥
هو القبول الذي يقرره القابل صراحة .

٢١٥٨٧ - قبيل ٥
Acquiescement implicite (F). قبيل ٥
قبول يدل عليه تفويت الاجال المحددة للعلن في مقد أو طلب أو حكم .

٢١٥٨٨ - قبيل ٥
Acquiescement tacite (F). قبيل ٥
قبول تدل عليه ، لزماً ، بعض التصرفات ان كان معصدا صاحب الشأن أو غيره .

Anastina (S).
Anastine (F). Anastina (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات فصليتها الخياشيم وفصيلة القفاليات. انواعها المعاصرة المروفة متوسطة العدد يكثر وجودها في بحار الهند ثم البحر الاحمر فالبحر الابيض المتوسط || اصنافها متباينة الاحجام ، لاقامية الشكل ، قبيانية ، قارفة ، رفيقة ، مالة ، شغافة ، عادمة الخزونة والتعدد .

٢١٥٧٠ - قبيل ٥
Cave (F). قبيل ٥
بناء او دهلين وما اشبه يصلح لحفظ بعض الحاصلات الزراعية الصناعية كالخمر والبن الخ . ج انباء .

٢١٥٧١ - قبليات ٥
Fressure (F). Pluck, Harriet (E). قبليات ٥
هي السطيط بمجموعة اعضاء الحيوان الداخلية التي تسقط من حساب الدم الغائم كالقلب والكسر والسمال الكرش ، الخ .

٢١٥٧٢ - قبيل ٥
Blettissement, Blettissure (F). Becoming over-ripe or sleepy (E). قبيل ٥
هو ابتداء دور اللدبر في الثمار وقد يكون ذلك بعد فطر الايناع || وهو في الاوراق دور اللدبر بعد الازديباب .

٢١٥٧٣ - قبيل ٥
Anaxilus pedestris (S).
Sauterelle des champs (F).
جنس جنادب من فصيلة القبيويات . انواعه خمسة . انوعها الى السمرة البنية الغمضة المرقطة . طولها يراوح من ١٧ الى ٢٧ سم . اقفاؤها الخلفية تطول من ١٧ الى ٢٦ سم . اقفاؤها عند الذكور نحو ٤ سم . وعند الاناث نحو ٢ سم . مرزاتها تطول من ١٣ الى ١٨ سم . حذافرها هليية ، كواسلها لاحقة . اسراك ذكورها مغلطحة مسنة الصفحة الداخلية . تألف الارض البور ويكثر وجودها في القسم الثاني من فصل الصيف .

٢١٥٧٤ - قبيل ٥
Homorocoryphus nitidulus (S). Sauterelle verte (F). قبيل ٥
نوع من القبيوط اخضر اللون تحمل الجسم يطول من ٣ الى ٥ سم . رأسه غريبتي الشكل . رواشه كبيرة ، رفيقة ، شغافة . زبانا دقيقان مستطيلان . اشتره تطول نحو ٢٢ سم . تألف المراعي والحقول المزروعة . يرغب في النباتات التجيلية وسها الزروع .

٢١٥٧٥ - قبليات ٥
Phasgonuridae, Tettigonidae (S). Phasgonuridae, Tettigonidae (F). Phasgonuridae, Tettigonidae, Long-horned grasshoppers, Geen meadow grasshoppers, Kacydidae (E). Laubheuschrecken (D).
فصيلة حشرات من مستطيات الاجنحة . اجنتها عديدة اشهرها القبيوط . اجسامها متباينة الاحجام والالوان . قرونها الاستشعارية طويلة . ارجلها الخلفية قاذفة . اسرارها رباحية المقل . قرونها الشرجية لا عقدية . اشهرها مؤلفة من ثلاثة ازواج مستطيلة . ملاسها الشرجية عامة توجد في الذكور كما في الاناث .


٢١٥٧٦ - قبليات ٥
Pileopsis (S).
Capule, Cabochon (F). Pileopsis (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات مديات الارجل



قبيل



قبيل



قبيل

اجناسها وأنواعها المعروفة عديدة بعضها من متحجرات الاسحاق النابرة . جميع أنواعها الماصرة يمية قل ما تقترب من الشريط . أسراها وأفره العدد . زعانفها رقيقة شفافة متفارة الانفلاق عادمة التضخيم الشفائي . اصداها كلسية المادة رقيقة الصفحات || احرف اجناسها واشهرها اقنابة والقصمعة والذوامة .

٢١٥٩٨ - قنات ، قنات Acacia du Sénégal (F). هو سبط السنغال ، اطليه .

٢١٥٩٩ - قنات الصمغ Astragal gommlifère (F). هو الاسطرافالوس البديق ، اطليه .

٢١٦٠٠ - قنار Neocosmospora (S). جنس تطور مجهرية من السناخيات لفصيلة المشويات احصائها سطحية الارتكاز حر الششاء ، تكاثرها مخروطية الشكل تحضن بيوضاً مستديراً اسير القرن || انواعها عديدة جميعها حيودة كانوا يتخذون انها مفطرة ويطون اليها بعض امراض الثعلب والبطنخيل والتخيل .

٢١٦٠١ - قنار Orque (F). هو الاركة ، اطليا .

٢١٦٠٢ - قناب Bêc (F). هو الاكاف او الرسل .

٢١٦٠٣ - قناب Intestin, Boyau (F). Bowel, Gut (E). هو المى . يقال أبو هيده : « القناب ما تحوى من البطن اى ما استدار منه وفي الحوايا واما الامعاء فهي الاقصاب » . ج . اقناب .

٢١٦٠٤ - قنرة ، قنوم Affût (F). Stand for wait (E). ناموس الصائد الذي يشيده ليستر فيه عند الصيد .

٢١٦٠٥ - قنزال Calurus resplendens (S). Quetzal, Calure resplendissant (F). Quetzal (E). طائر من فصيلة الطوقنويات . موطنه بعض مناطق المكسيك وامريكة الوسطى . يألف الاصلاح الجبلية التي يراوح ارتفاعها بين ١٥٠٠ و ٢٥٠٠ متر عن سطح البحر || طوله نحو ١٠٠ سم . منها ٨٠ سم . الذنب و ٢٠ للجم . ثوبه متداخل الالوان الساطعة . رذاه وصدرة الى الخفصة اللحية الموج . يطن الى الحرة القريزية القائمة . عينه كستنية اللون . حواشيها سود . متقاده وساقه الى الصفار الاسمر . عزالان ذنبه محبنا الاطراف || قوته الثار البرية والجزور والحشرات والدنويات الصغيرة || يطن عشه في صدفوع الاججار الحرة . الاثني تبين من ٤ الى ٥ . يبيضات تحضنها بمثابة الذكر نحو ثلاثة اسابيع .

٢١٦٠٦ - قتع الإبحاص ، حمار ساق التفاح Zeuzera pyrina, Z. aesculi (S). Zeuzère, Z. du poirier, Z. de l'olivier, Z. du marronnier, Coquette (F). Wood leopard, Leopard moth, Wood leopard moth (E). Kastanienbohner, Blausie, Roskastanienbohner, Apfelbohner (D). حشرة من فصيلة القتيصات جيفاء القد طولها نحو ٣ سم . ثوبها الى البياض الاخير . رواشها غيرة اللون تعلوها رقعة حنطية سوداء المواج . ريقها تطول نحو ٥ سم . ثوبها اخير

٢١٥٩٩ - قتيب Foïn (F). Hay (E). هو القش ، ما ينس من الخيش وجع وانخزن كملف .

٢١٥٩٠ - قتيبوس Jusan (F). Ebb (E). القتيبوس حركة المياجة عند ابتداء الجزر وسرعة تقلصه واماها .

٢١٥٩١ - قتيبوس Polyplecton (S). Eperonnier (F). Asietic pea-cock (E). جنس طير من فصيلة الطيريات انواعه المعروفة ١٠ جميعها من طيور الزايج والمند الصيفية . تألف المناطق الحرجية الجبلية . ابياسها قرية الشبه من التلوج ، اذبالها مستطيلة منقطة كاذبال الطلوس . تتميز بصيص اسرافها التي يراوح مدها بين ٢ و ٦ . قنارها تاجية منتصبة . اثنائها عديدة الالوان يكثر فيها الاخضر الاسفع والاريد الخشنى الاظفرى القتيصج والتضيم || انثاها تضع من ١٢ الى ١٦ بيضة تحضنها رسدا في اناسيص رصمها بالفس والورق اليابس بين الادغال الكثيفة .

٢١٥٩٢ - قتيبوس Mimeux (F). Mimous (E). تمت تعريفي يطلق على كل نبات تفتيش اولاهه من القس .

٢١٥٩٣ - قتيبم ، قتيبم ، قنبرم Narine du porc (F). Nostril of the pig (E). هي ثغرة فظية الخنزير .

٢١٥٩٤ - قليل Calypse Helene (S). Calypse Hélène (F). طائر من فصيلة القريسيات . اعطاه بعض مناطق امريكة الجنوبية . يعتبر اصغر صفور في العالم || جسمه يطول نحو ٥ سم . ثوبه متداخل الالوان الزاهية ، فيه الرمادي والاسفر والاصفر والاصفر . متقار وريق مستطيل || قوته اللذاب والحوام ورسوق الاقزام . يطن عشه في الادغال . انثاها تحضن من مرة الى مرتين في الحول . حشنتها من ٣ الى ٤ يبيضات ترخها بمثابة الذكر نحو ١٣ يوما .

٢١٥٩٥ - قن Luzerne Sauvage (F). هي الفصة البرية ، اطليا .

٢١٥٩٦ - قنابة Cavolinia (S). Cavolinia, Hysle (F). Cavolinia (E). جنس حيوانات مجهرية من الرضويات مجنحات الارجل

وفصيلة القنابات . انواعها المعروفة نحو ٣٠ منها ٢٠ منتشرة في جميع مجار البلاد الحارة والمعتدلة الحارة ، وشرة انواع من متحجرات الاراضي الهسائية والبيسانية || اجسامها صغيرة القد ، مكورة الصفة البطنية ، ثلاثية الانسان او الحيات ، كبيرة الزمانف القمية القليلة التضخيم ، لونها الى الصفرة يطولها موج يختلف مع الانواع يكثر فيه الازرق والبنفسجي || اشهر انواعها قنابة البحر الاخر الثلاثة الاثبات الحادة .

٢١٥٩٧ - قنابيتات Cavolinitidae (E). Cavolinitidae (E). فصيلة حيوانات مجهرية من الرضويات مجنحات الارجل .



قتيب



قناب



قنزال



قنع الإبحاص



قَتِيبُ البَصْلِ

الرمادي والخضلي الاسمر . قرونها الإستثمارية قصيرة القدة، مشطية الشكل . أنثاها أكبر قَدًا من ذكورها . مكنا مختلف الأشكال والألوان تحتمل الإناث من سوا القَتِين .

٢١٦١٢ - قَتِينُوت *Chetodon saxatilis* (F).

هو يحمل الصفور ، أظلمه .

٢١٦١٣ - قَتِمُ الواحدة قَتَمَ . راجع ميرمين .

٢١٦١٤ - قَتَمَةُ

القَتَمَةُ نبات كزبرة الرائحة . (عجمل الحيط) .



قَتِيبُ الجَنَفَةِ

٢١٦١٥ - قَتَمِيَّات هي الميرسينيات ، أظلمها .

٢١٦١٦ - قَتْنُ * *Xerophile* (F). *Xarophilous* (E). نمت تعريني يطلق على النباتات التي ترغب في المناخات الجافة .

٢١٦١٧ - قَتَنُ * *Gerris* (S). *Gerre* (F). *Gerris* (E). جنس اسماء بحرية من فصيلة القَتِينات . أنزاعه المحروقة نحو ، أظلمها بجار البلاد الحارة أعصها اليسر الأحمر وشواطي الهند وسريلديب . أجسامها مبطلة ، عريضة ، قدو رأسه الكف . زنايفها بإذرة أعصها الظهيرة الشائعة للمقدم وللحرجية القارية .



قَتِيبُ السَّاقِ

٢١٦١٨ - قَتَنِيَّات *Gerridae* (S).

Gerridae (E).

فصيلة اسماء مبطلة من شائكات الزنايف أجنتها وأنواعها عديدة . أظلمها بجار البلاد الحارة . أصرف أجنتها وأشهرها القَتَن .



قَتِيبُ الصَّفَصَاتِ

٢١٦١٩ - قَتَرَايَةُ ، قَتَامَةُ

Anemopaegma miranda, *Catuaba* (S). *Catuaba* (F). *Folhas catuaba* (E). *Katuaba* (D).

جينة برية طيبة معمرة من فصيلة البنغوليات ، مهدها بعض أصفاغ البرازيل إلى ساقها فراء تملو نحو ٤ أمتار . فروعها مستطلة فناء . أوراها أبيض ، متعاقبة ، منفعة ، ستاقية التصلب الجانبة العابق الخضار . أنزاعها عتقوي التجميع ، طرني الأرتكار . أنزاعها جريسية الشكل ، وردية اللون ، مرتقبة بالأبيض والأصفر . ثمارها كاليسر شكل وقد لا كنها لا توكال إلى أشهرت بأنها أقوى منط نباتي وعضادة لفسلس .

٢١٦٢٠ - قَتِينُوت *Pteropterus* (S). *Péropete* (F).

جنس قردان من فصيلة القَتِينات . أنزاعه قليلة جميعها عماء صغيرة القدة يضيئة الشكل مبطلة طويلا نحو ملستر واحد . أنزاعها إلى الصفرة المخططة يملو بعض الزراكش الجلوية . يركبها البليز والخفاش .



قَتِين

٢١٦٢١ - قَتِينُوت *Glyciphagus* (S).

Glyciphage (F). *Glyciphagus* (E).

جنس حشرات مجهرية من فصيلة السكيات . أنزاعه المرفقة ثمانية . أجسامها مبطلة تطول من ٤ إلى ٥ أمتار المليمتر . أظلمها ثمانية ماصة . ظهورها مشطية حباب دقيق مستطيل . قوائمها أربعة أزواج . أنزاعها تراوح من أنفيرة السمراء إلى السمرة المخططة الملوحة || يركب جمع الملوحة الصورية والثلاثية والربيع عته عته وبعد تحه وفتح الجفوع الجافة . وقد تصيب الإنسان في يديه ورجليه تسبب له الجافة .



قَتِين

اللون تشوبه حرة أرجوانية ورشقة سوداء . رأسها وذوقها الصدرية والدرجبة كستنية اللون . وهي تعيش من ٢٤ إلى ٣٠ شهراً تركب سوق الاجاص والفراخ والسفرجل والزيتون والورداء ... تنتفخها وتعلبها || تظهر الفراشة من حزيران إلى تموز . الذكر منها أصغر قَدًا من الأنثى . زمن كويها يدوم نحو الشهر ينتهي بفتح الممكن على السوق ثم ينقث الكن بعد ذلك ببضعة أيام من يرقات دقيقة يتأثر حملها التخريبي فور اتصالها بالآلة .

٢١٦٢٢ - قَتِيبُ البَصْلِ * ، دَسِيْسَةُ البَصْلِ

Dyspessa ulula, *Endagria ulula* (S). *Dyspessa des olignons* (F).

حشرة من القَتِينات صغيرة القدة طويلا نحو ١٠ م . وبسطها ٢ م . ثوبها أبيض اللون خطلي الملوحة . ورشها بالاسمان إلى الأبيض الأطلح يملوها تبييض خطلي وأصفر . ورشها الخلفيات سم العروق بيض الاهداب || تظهر الفراشة من نيسان إلى أيار ومن تموز إلى آب . لها جيلان في الحول . يرقاتها صغيرة القدة سمراء اللون تركب مختلف الأنواع يصل إلى ثلثيات . يكثر وجودها على البصل في حزيران وفي أيلول .

٢١٦٢٣ - قَتِيبُ الجَنَفَةِ * *Paropeta paradoxa* (S).

Paropeta paradoxal (F).

حشرة من القَتِينات . فراشها متوسطة القدة سمراء اللون مبقعة البراوش المهدية . يرقاتها قصيرة ، غليظة ، حنطية اللون جلوية الملوحة تركب الجفنة قسرها تحت القشور .

٢١٦٢٤ - قَتِيبُ السَّاقِ * ، حَقَّارُ السَّاقِ

Cossus cossus, *C. ligniperda*, *Trypanus cossus* (S). *Cossus gâte-bois*, *Gâte-bois* (F). *Gout-moth* (E). *Weidenbohrrer* (D).

حشرة من القَتِينات ، فراشها خضمة غليظة سمراء اللون . ورشها حنطية يملوها تبييض ودي ، وتوش ، وتجنيس . وأيضاً يرقاتها تعيش من سنتين إلى ثلاث سنوات وهي جلوية اللون ، سمراء الظهر ، مشطية اللب . تركب سوق وأغصان وإنزاع بعض الأشجار المشرة والخارجية فتفترها وتعلبها ، منها الاجاص والتفاح والكرز والخوخ والمشمش والقوز والاكينديا والربان والزيتون والسنديان والحور والصفصاف .

٢١٦٢٥ - قَتِيبُ الصَّفَصَاتِ *

Cossus henleyi (S). *Cossus du saule* (F).

حشرة من القَتِينات . فراشها صغيرة القدة طويلا نحو ٢٥ م . أما بطلها فتراوح بين ٤٢ و ٥٥ م . ثوبها إلى الربة العلوية ورشها بالاسمان إلى الكلبة الخنطية الملوحة تتخللها حروق سم . ورشها الخلفيات أفتح لوناً من جسمها || يرقاتها مستطيلة الشكل ، تليغ ، عته كالك دونها الحياتية ، نحو ٦ م . ثوبها في أول عهدا يدي ودي اللون ثم ينصرف تدريجياً نحو الجلوية تشوبها صفرة شاملة ويقيم سيد وريمية تملو جميع صفقات الجسم ما عدا الحلقة الصدرية الأول || وهي تركب الصفصاف والسبط والأطل والحور . تحفر السوق في شكيرها تحت القلف فتقضيها أشد الآذني .

٢١٦٢٦ - قَتَمِيَّات *Cossidae*, *Zeuzeridae* (S).

Cosidae, *Zeuzeridae* (F). *Cosidae*, *Zeuzeridae*, *Carpenter moths* (E). *Holzbohrrer* (D).

فصيلة حشرات من رتبة حشرقيات الاجنحة . أجنتها وأنزاعها زهاء ٦٥٠ مظهرها جلوي للرمح . أجنتها لا قياسية القدة . ورشها كبيرة . وأنثاها عديدة ينقلب لها

٢١٦٢٧ - **فَتَاءُ ثُجْبَانِيَّةٌ** * - زَهْرَةٌ شَعْرِيَّةٌ
Thrichosanthes angula (S). *Thrichosanthes* serpent,
Patole, *Serpent végétal* (F). *Serpent gourd*, *Serpent*
gourd, *Viper gourd* (E). *Haarblume*, *Silvestcher*
kürbis (D). *Serpentone*, *Zuccetta cinese* (I).

نوع من قمرع الخش وفصيلة القرعيات وهو نبات عشبي
 حولي حاشئ ساقه تطلو نحو ٥ أمتار. أوراقه ثلاثية أو
 خماسية التفتيس، انزعاج جميلة الشكل مهدبة البتلات
 البيض، ثماره اسطوانية مستطيلة ملتصقة ملتصكة طولاً
 بأرواح بين ٧٠ و ١٠٠ سم. وقطرها من ٤ إلى ٥ سم.
 لوفاً في أول عهدا إلى الخضار البحري يطبو تسليج
 ايض، ثم ينحرف تدريجياً إلى أن يستقر عند النضج
 على الاصفر البرتقالي || ثماره مأكولة وتطبخ كالقوياء
 وفيها من البقول.

٢١٦٢٨ - **فَتَائِيَّاتُ الْبَحْرِ**
Holothuridae
 رتبة حيوانات بحرية من شعبة الفوكيات.

٢١٦٢٩ - **فَقْدَد**
Concombras (F).
 هو الخيار وأحدته قلدة.

٢١٦٣٠ - **فَقْدَرْد**
Moignon sec (F). *Dry stump* (E).
 النشاء اليابس في أصل الشجرة والكرمة.

٢١٦٣١ - **فَقْعَبَانٌ** * - **فَقْعَبَانٌ** *
Lixus (S).
Lixe (F).

جنس حشرات قارضة ناعرة من فصيلة السويات. أنواعه
 نحو ٣٥٠. جميعها مستطيلة الشكل مقطعة، طولاً بأرواح
 بين ٨ و ٢٢ سم. أطرافها عديدة يكثر فيها الاسود والاسمر
 والحطبي يطولها طليل أصفر أو اسقم. رقافتها دقيقة
 غبراء اللون متشعبة تظهر تموش داخل الراديب التي
 تحفرها في سوق النباتات البقلية والصناعية والمزرعية التي
 تركبها أعصها الشوذر والمفوف والتنج والبرسيم والنخل
 الخ.

٢١٦٣٢ - **فَقْعَبٌ مُسْتَطِيلٌ**
Lixe elongé (F).
 حشرة تدعى لكسون مستطيل، أطولها.

٢١٦٣٣ - **فَقِيْثٌ** ، **وَدِيْهٌ**
Pousse (jeune) (F).
Shoot (young) (E).

الفصيلة الفتية جاز اقتلاها من أروبيتها.

٢١٦٣٤ - **قَيْمَة البُوط** *

Phragmatiphila typhae, *Nonagria typhae* (S).
Phragmatiphile des massettes (F). *Phragmatiphila*
typhae (E).

حشرة من الفسقيات حشرقيات الاجتمعة. موطنها يمتد
 من الشرق الأقصى إلى أروبة وإفريقية الشمالية. الفراءة
 بياضاً قوياً رقيق الاظهار. السرقة خاضعة كثيفة تمش
 في أول عهدا على أوراق النباتات المقتنية ثم على البوط
 والقصب فتضبط صلاحياتها وتعيش في داخلها حتى نهاية
 طور الاكمال || جسمها مستطيل الجرم يطول نحو
 ٢٢ سم. بطنها نحو ٢٦ سم. رأسها حطبي اللون يطلو
 منخس قرني المادة. عيناها كبيرتان. زباناها خفيفان.
 جوشها وبطنها إلى الحطبي الصناعي المواجه || روارشا
 صغيرة الحجم. الأزواج الامامي، عند التقاء، إلى
 الحطبي الصناعي يطلو تمشج وتبيض وتنشيط كسني.
 روارشا الخلفيان إلى الحطبي الانشعج المواجه يسر بعض

حكاكاً منضجاً ينج بشره الجله. يقضى على الحكاك
 باستعمال الكمحل عيار ٧٥°.

٢١٦٢٧ - **فَتَاءٌ** ، **فَتِي** ، **مِفَتِي** ، **فَقْعُوسٌ** ، **فَقْعُرٌ**
Cucumis sativus flexuosus (S). *Concombre serpent*,
C. flexueux, *Melon serpent* (F). *Serpent cucumber*,
Curving cucumber (E). *Schlaugengurke* (D). *Cocomero*
serpente, *C. di turchia* (I).

نبات عشبي حولي زراعي من فصيلة القرعيات اصماره
 اربعة او خمسة ممدادة. أوراقها طويلة الزناد مفصصة.
 ثمارها اسطوانية، مستطيلة، خلية البشرة في أول عهدا.
 طولاً بأرواح بين ٣٠ و ١٠٠ سم. وقطرها من ٣ إلى ٨
 سم. لوفاً إلى الخضار المايق وبها البشري والاغبر الاصفر.
 طعمها بين الحار والكوي || تكثر زراعتها في البلاد
 اطارة. ترطب في الارربة المتوسطة الانساج والرطوبة.

٢١٦٢٣ - **فَتَاءُ الْبَحْرِ** * - **عَمِيْكَارُ الْبَحْرِ** ، **دُجْبٌ**
الْبَحْرِ
Holothuria (S).

Holothurie, *Biche de mer* (F). *Holothurian*, *Sea-*
Slug, *Sea-cucumber* (E).

جنس حيوانات بحرية من فتائيات البحر. انواعه عديدة
 جميعها اسطوانية عديمة الجسم المستطيل، مدمية الطرف،
 مخنوقة التمت، فارشة الحواس القمية التي بأرواح عدها بين
 ١٦ و ٢٠ || اعرف انواعه واشهرها. الثلاثة التالية:

Holothuria tubulosa (S). **فَتَاءُ الْبَحْرِ الْأُبْرِي**
 يكثر وجوده في المتوسط يعيش بين صخور للشواطي.

Holothuria edulis (S). **فَتَاءُ الْبَحْرِ الْمَأْكُول**
 يكثر في بحار الصين وإستراة والخليج الفارسي والبحر
 الاحمر.

Holothuria intestinalis (S). **فَتَاءُ الْبَحْرِ الْمَصْرَافِي**
 موطنه بحار الشمال وهو مستطيل الجسم النثيق.

٢١٦٢٤ - **فَتَاءُ الْخِطَارِ**
Ecbale (F).
 هو الفتاء البري نبات يمدل ثمرأ كالفناء من العلم
 كونه الرائحة يسقط بخصارته ليرقان الاصفر فيقلد
 من الانفة مادة صفراء يزول البرقان باستعمالها. (أ. م.)

٢١٦٢٥ - **فَتَاءُ الْهِنْدُ**
Bel indien (F).
 هو الايكل أو البل، أطولها.

٢١٦٢٦ - **فَتَاءُ الْخَمَارِ** ، **فَقْعُوسٌ** ، **فَقْعُرٌ**
الْقَمِيرُ ، **عَوَزُورٌ** ، **أَطْرِيُونٌ**

Ecballium elaterium, *Momordica elaterium*, *Elaterium*
officinale, *E. agreste* (S). *Ecbale*, *Cornichon*
d'âne, *Concombre sauvage*, *Giclet* (F). *Squirting*
cucumber (E). *Echte Springgurke* (D). *Cocomero*
asolino, *Elisario*, *Ponocini salvatici* (I).

نبات عشبي بري من فصيلة القرعيات. يعيش في المزارق
 الرطبة. أوراقه تشبه أوراق الفتاء والخبر تطلبها وتأكلا.
 ثماره رنية، مستطيلة، جسمها حيم يبيض الوز، تنفصل
 عند الساق منه تفصيحاً وتقلد بزورما بعيداً عند الضغط
 عليها وهي سامة يستخرج من صميمها مادة قمالة تدعى
 أيلاندر يوم تعبر من المسهلات المنيفة وما استعمالها الطبي
 المعروف.



فتاء البحر



فتاء بري



فتاء ليمانية



تعب



قَيْمَة البُوط



فُحَّاج

Houppler (F). **٢١٦٤٥ - قَحْمَة ، يَفَّاح**

Crown (E).
الشجرة اقتطعت أغصانها حتى السنة . ج قحام ويحرق .

Maroute (F). **٢١٦٤٦ - فُحْرَان**
هو الاقمارون الحُصن ، اطلابه .

Décroptitude (F). **٢١٦٤٧ - فُحْمُونَة**

Decreptitude (E).
القنوصة حالة الهرم وما ينتج عنها من وهن .

Cranis (S). **٢١٦٤٨ - فُحْمِيَّة ٥**

Cranie (F). Cranie (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات عضديات الارجل
وفصيلة القحفيقيات . انواعها المعاصرة المرفوعة قليلة العدد
بعضها من صلب البحر الابيض المتوسط والبيض الآخر
يوجد الى المحيط الهندي || امداها لانتشارية المضاربع ،
شبه مستديرة الشوزن ، مسطحة الصفحات السفل الثلاثة
التقريب ، محبة الصفحات العليا المجهزة من الداخل بكتابين
نلشرين || تعيش لاصقة بالصخور المدورة القليلة العمق .

Cranidae (S). **٢١٦٤٩ - فُحْمِيَّات ٥**

Cranidés (F). Cranidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات عضديات الارجل .
اجناسها وانواعها المعروفة عديدة معظمها من متحجرات
الطبقة الارضية الاول وبعضها يعود الى الطبقة الطباشيرية .
اما الانواع المعاصرة قليلة وتعيش في بحار البلاد الحارة
والمعتدلة الحارة . جميعها ملتحمة باصدانها ، عادية
والويقات العلوية || اعرف اجناسها واشهرها التحفينة
والقنوصة .

Cottus (S). Cotte (F). Bull-head (E). **٢١٦٥٠ - قَدَّ**

جنس اسماك صغيرة القند مسطحة الشكل من فصيلة
الطريخيات الشائكات الزعانف || انواعه عديدة منها
البحرية والبرية جميعها تعيش في السق . حولها دون المادي .

Chaboissau (F). **٢١٦٥١ - قَدَّ بَحْرِي ٥**

Short-spined (E).

نوع من القند موطنه البحار يعيش قرب الشواطئ الصخرية
المسوية القنور . جسمه ادليبي الشكل مستطيل الزعانف
الشائكة . رأسه كبير القند طوله يمازي الزام الاول من
الجسم . ثوبه متراكب الالوان فيه الازيوش والاسمر والجزوي
والاشقر || اشواكه زمالته حادة مؤذية غشائها الصيادين .

Cottus gobo (S). **٢١٦٥٢ - قَدَّ تَهْرِي ٥**

Chabot (F). Father-lasher (E).

نوع من القند يعيش في المياه العذبة . وهو سمكة صغيرة
القند ، كبيرة الرأس والزعانف الحادة الشائكة . ثوبه
متداخل الالوان المراكية . لحمه كرهه الطعم لا يترك .

Arôme (F). Aroma (E). **٢١٦٥٣ - قَدَّآ**

الرائحة الطيبة . يقال فاح قداه .

Fleurs de bigaradier (F). **٢١٦٥٤ - قَدَّاح**

Flowers of a Seville-orange tree (E).

القداح هو زهر التارنج او التفاح . ويهم من قال نور
النبات قبل ان يتفتح . اطراف الثبت النفس .

التي . عند اقترابه من الحمار الخارجي || لها جيل واحد
في الحول . تظهر الفراشة في تموز وتبقى حتى اواخر
ايلول . تسرح في الليل . تماثل بعد ظهورها بنمو ستة
اسباح ويقتصر المكان لطفا على الصفحات السفلى من فصال
الاوراق || السرة تقطع نحو ٣٤ سم . جسمها شبه اسطواني
الشكل ، حاجي اللون ، تنهي الموج يطول بعض الحلب
القصر الاغبر . رأسها اسود منها ورواجها الى السرة ||
طور الاكمال الذي يستمر نحو اربعة اسابيع ينقضي
داخل سلامة البوط او القصب .

Pagrus (S). **٢١٦٣٥ - فُحَّاج ٥**

Pagre (F). Braize, Porgy (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الاسبوريات الشائكات
الزعانف . انواعه نحو ١٥ اصنافها بحار البلاد الحارة .
اجسامها بيضوية الشكل مسطحة طولا يراوح بين ٢٥
و ٧٥ سم . زعانفها كبيرة ، الشرجية منها غارقة . فلوها
ريقة مسنة . ألوانها متداخلة الالوان ، ظهورها وردية
او مرجانية ، بطونها فضية . حولها قليلة الطعم مرغوب
لها || اشهر انواعه :

Pagrus vulgaris (S). **الفحاج المبذول**

Pagre commun (F).

سمكة شبيه بالمرجان . شائعة في المتوسط .

Pagrus orphus (S). Pagre orphe (F).

سمكة مسطحة القند مسطحة الخلف تكثر في شمال المتوسط
رغل شراطي الاطلي .

٢١٦٣٦ - فُحَّاب شمال الخيل .

٢١٦٣٧ - فُحَّار شمال الايل .

٢١٦٣٨ - فُحَّاف هو السيل الجارف .

Benne préneuse (F). **٢١٦٣٩ - فُحَّالَة**

Grab-bucket (E).

جهاز آلي يستعمل لرفع التراب والحجارة ونقلها من مكان
الى مكان .

٢١٦٤٠ - فُحَّال داه يصيب القم تجفف جلودها .

Catabolisme (F). **٢١٦٤١ - فُحَّامَة ٥**

Catabolism (E).

علم يبحث في دور انحطاط الكائنات الحية .

Orontium (S). **٢١٦٤٢ - فُحَّط**

Oronce (F). Floating arum (E).

جنس نباتات عشبية برية معمرة من فصيلة القلقاسيات .
انواعه قليلة ، اصنافها متنوع وضفاف بحيرات البلاد الحارة
اغصانها ضفاف العاصي . اوراقها قرصية الانتشاح
منقطة اعليجية ، نصليها يطول من ١٢ الى ٣٠ سم .
ويخرج من ه الى ١٢ شمراخا الزهري يطول نحو ٥٠ سم .

Crine (F). **٢١٦٤٣ - فُحْف**

القحف هو الاعمصة او عظما .

Aspermie (F). **٢١٦٤٤ - فُحْف ٥**

Aspermatism, Aspermia (E).

التعلل اعدام الحويثات التنوية في المذي وانعدام البزور
في ثمار النبات .



قَدَّ



قَدَّ بَحْرِي



قَدَّ سَهْرِي

Altise du tabac (F).

٢١٦٦٥ - قَدَادَانِ التَّبَاقِ

راجع التَّبَاقِ .

Altise des céréales (F).

٢١٦٦٦ - قَدَادَانِ الزَّرْعِ

راجع التَّبَاقِ الزَّرْعِ .

Altise de la vigne (F).

٢١٦٦٧ - قَدَادَانِ الْكَرْمَةِ

راجع التَّبَاقِ الْكَرْمَةِ .

Chaton (F). Setting of a gem (E).

٢١٦٦٨ - قَدَادَةٌ

هي الحُريرة ، نظام هجومة يرتكز على سبله مركبة من ازهار وحيدة البثق .

Gobelet, Vase (F).

٢١٦٦٩ - قَدَاحٌ *

شكل من اشكال التعلب في الازهار . (E). Goblet, Vase (E).

٢١٦٧٠ - قَدَرٌ

القدر دائرة نجوم من كوكبة قيفاوس .

Puissance (F). Power (E).

٢١٦٧١ - قَدْرَكَةٌ

هي القوة على الشيء والتمكن منه .

Interligne (F).

٢١٦٧٢ - قَدْرَكَةٌ

Interlining, Space-line (E).

هي الفراغ أي المسافة بين الزردق والزردق في الغرس المنسق .

Kadsura (S).

٢١٦٧٣ - قَدَصُورَةٌ

جنس جنبات برية وريضية من فصيلة المنطريات . أنواعه عديدة منها البرق الاصفر . سيقانها خضراء تعلو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم . اوراقها بيضاء ، متعاقبة ، متعقبة ، ازهارها فردية التجميع ، بسيطة الارتكاز . ثمارها نورية ذلولية القشور || اشهر انواعه واعينها زراعة القصوره اليابانية .

٢١٦٧٤ - قَدَصُورَةٌ يَابَانِيَّةٌ *

Kadsura japonica (S). Kadsura du Japon (F).

نوع من القصوره الزراعية والريضية وهي جنبة جاحدة تعلو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم . اوراقها اعطليجية ذرية ، تصلها جامد المنقطة مائل البشرية . ازهارها الى البياض الاخير يطعمه موج اصفر . ثمارها الى الحرة القرمزية . افتادها واوراقها تستعمل في صناعة الورق . تنبع افنانها واوراقها يستعمل في تنظيف الشعر من مواده الضمنية .

Anthèse (F).

٢١٦٧٥ - قَدَفٌ *

نمن فطر الزهرة أي زمن افتتاح فجرة الطلع .

Ceramx trachurus (S).

٢١٦٧٦ - قَدَقُودٌ

نوع من الشم وهو سمكة بحرية مستطيلة الشكل طولها نحو ٥٠ سم . مرتها المياه الاقليمية ، توجد في المتوسط . لحمها مستحب الطعم مأكول .

Lignée (F). Issue, Progeny (E).

٢١٦٧٧ - قَدَرُودٌ

السلالة المنتجة من صرم معرف الصفات الشريفة .

Plophila (S). Plophile (F).

٢١٦٧٨ - قَدُودُحٌ *

جنس حشرات صغيرة القدر ثنائية الجناح من فصيلة القنوصيات . انواعه عديدة انواعها الى البصرة اللامعة ،

Astragale (F).

٢١٦٥٥ - قَدَادٌ

هو الاسطراغاليس . اطلية .

Cricetus (S). Cricet (F).

Cricetus (E).

جنس حيوانات لبونة قاضية من الثأريات . انواعه عديدة موطنها العالم ، منها ١٣ مهدا العالم القديم . اجسامها رمية . رؤسها مخروطية . قاضها مقطوعة . آذانها متوسطة القد . جرائدها واذنانها قصيرة . انواعها مختلفة الاخوان . بينها ناعم قصير ، صفوها جامد مستطيل || اعرف انواعه واشهرها :

Cricetus nigricans (S).

٢١٦٥٧ - قَدَادٌ أَسْمَرٌ

Cricet noirâtre (F).

نوع من القداد موطنه شرقي البحر المتوسط . يوجد في جبال لبنان من حلو ١٢٠٠ الى ١٨٠٠ م . طوله نحو ٣٠ سم . وذنيه ٣ سم . ثوبه الى الزبد السرا . يطعمه موج اسود ، ظهره احمر من بطنه || يألف الاسراج والاحفال قوته المواد النباتية والمقصية .

Cricetus arenarius (S).

٢١٦٥٨ - قَدَادٌ الرَّمَالِ

Cricet des sables (F).

نوع من القداد موطنه الشرق الاوسط والقفاس واروبة . ثوبه الى الزبد البطلح . طوله الكامل نحو ٢٧ سم . يألف المناطق الرملية والجرف المغلة المليحة .

٢١٦٥٩ - قَدَادٌ هَمَامُحِرٌ ، قَدَادٌ أَلْمَانِي

Cricetus frumentarius (S). Cricet Hamster, Hamster (F). Hamster (D).

نوع من القداد طوله ٣٠ سم . وذنيه ٣ سم . ثوبه الى الصفار الخفي يطعمه موج اخضر . مقصه ابيض . جبهة موشية خط اسود . خداه الى الصفرة . عنقه الى الصبغة الصنائية . بطنه الى البصرة الباقية || موطنه بعض المناطق الاروبية انحصا الماتيه والاعزك || جمره رطب الارباء يقينه في الحرم حل عنق يراوح بين المتر والمترين . وهو مؤلف من جرة وسطى فسيحة ونفق مستطيل تعرضه من اليمين واليسار عدة دهاليز مستطيلة يحزن فيها ما به من سطة وفيها من الحبوب || انشاء تقع من ٤ الى ٨ ادواس رضعها ثلاثة اسابيع .

Cricodéens (F).

٢١٦٦٠ - قَدَادِيَّاتٌ

عمارة حيوانات لبونة قاضية من فصيلة الثأريات اجناسها وانواعها كثيرة موطنها العالم . انواعها الامريكية فقط تمه ٨٢ جميعها رمية الجسم قصيرة الجرايز والاذن . قوتها الحبوب وبائر المواد النباتية .

Yanne (F). Wester-gate (E).

٢١٦٦١ - قَدَاسٌ

القَدَاسُ حاجز ينصب على مصب الماء لتقنين كمية المياه .

Altise (F).

٢١٦٦٢ - قَدَادَانِ

هي الاتيز جنس حشرات من النضاريات .

Altise bleue (F).

٢١٦٦٣ - قَدَادَانِ اَزْرَقِي

راجع التَّبَاقِ زَرْقَا .

Altise potagère (F).

٢١٦٦٤ - قَدَادَانِ الْبُقُولِ

راجع التَّبَاقِ الْبُقُولِ .



قَدَادٌ



قَدَحٌ



قَدَصُورَةٌ يَابَانِيَّةٌ

٢١٦٩٠ - قُدْكَالِي ، قُدْكَالِي Occipital
نمت تمرني يطلق على كل ما هو غصص بالقدال .

٢١٦٩١ - قُدْكَائِيَات

Aphaniptères, Siphonaptères (F). Aphaniptera, Siphonaptera (E).
رَبَّة حشرات صغيرة القند من طبقة دميات الجناح .
فصائلها خمس أما أجناسها وأنواعها فنحو ٥٠٠ || أجناسها خائفة الجوارب المصغرة ، هليّة الرَبَّة المنسجبة الى الوراء . روثها صغيرة القند ، حرياتها بسيطة . قرونها الاستشعارية تحيلة مركبة من ثلاث فواصل . متاك أخطاها ثاقبة ماصة . أربطها قوية مدة القفز || وتتميز افراد بعض فصائلها بصفت أو صفين من الانسان تعرف بالمشط وهذا المشط قد يكون عدي أو صفري الاثكساز . ذكرها أصغر من أنثىها تحمل هذه الكروم في قصبتها المتعقبة نحو العلاء || أشهر فصائلها البرغوثيات .



قُدُوح الجبن

٢١٦٩٢ - قُدْكَو Vexille (F). Vexillum (E).

القُدَّة فصل الرِيثَّة . وهما قُلَّتَان ، القُدَّة الوحشية اي الخارجية والقُدَّة الانسية اي الداخلية .

٢١٦٩٣ - قُدْكَع Ejaculation

راجع انفاق .

٢١٦٩٤ - قُدْكَعِيَّة Balistique (F). Ballistic (E).

القُلَّةِيَّة علم يبحث في ربي القذائف اي في ضبط حساب متى الحرس وتسليحه .

٢١٦٩٥ - قُدْكَو هو حبل القتر .

٢١٦٩٦ - قُدْكَو Froid (F). Cold (E).

هو البرد الشديد .

٢١٦٩٧ - قُدْكَو Poussin (F). Chick (E).

صغير الدجاج . هو الصوص ولكتكتوت .

٢١٦٩٨ - قُدْكَو ، قُدْكَو ودَاقِي

Chaleurs, Durée du rut (F). Heats, Duration of the rut (E).
مدة استمرام انثى الحيوان أو زمن ودَقْها وقد يدوم عادة نحو ٤٨ ساعة وهو يعاود كما يلي :

بعد الوضع

- بستة أيام عند الفرس
- بعشرين يوماً عند البقرة
- بأربعين يوماً عند الخنزيرة
- بأربعة أو ستة أشهر عند الشاة
- عند الانثى غير الحامل
- كل ٢٥ يوماً عند الفرس
- كل ٢٠ يوماً عند البقرة
- كل ٢٠ يوماً عند الخنزيرة
- من ١٥ الى ٢١ يوماً عند الشاة

٢١٦٩٩ - قُدْكَو Caranx Korab (F).

سمكة بحرية تدعى شم قراب ، أظلمها .

٢١٧٠٠ - قُدْكَو بَيْضِي Gain ovarique (F).

Ovaric sheath (E).

حضر من شوار أنثى الطير وأخشرات وهو وهاء جراي الشكل يتكون فيه البيض



قُدْكَو

جربها هراكة نائلة تركب مختلف المواد العضوية أخصها الجبن والذهن || أشهر أنواعه قُدُوح الجبن .

٢١٦٩٩ - قُدْكَو الجبن * Piophilie casei (S).

Piophilie du fromage, Mouche du fromage (F).
نوع من القُدُوح وهو ذبابة صغيرة القند طولها نحو ٣ مم .
توجهها الى السمرة السوداء ، مقدمها وأرجلها الى السمبة ،
حرياتها حر . تجمع مكها في الجبن فينفض عن رِقَات دقيقة تحيلة تعيش على الجبن فتخره وتطعمه .

٢١٦٨٠ - قُدْكَو حِيَّات * Piophilidae (S).

Piophilidae (F). Piophilidae (E).
فصيلة حشرات من رَبَّة ذوات الجناسين . أجناسها وأنواعها قليلة ، جميعها من الذباب الموراك النائل الصغير القند المستطيل الاصيل || رِقَاتها تعيش على المواد العضوية الخسرة وصل الحوم المقتدة والجبن والسمك ...

٢١٦٨١ - قُدْكَائِيَات Cottidae (S).

Cottidae (F). Cottidae (E).

فصيلة سمك من شالكات الزعانف . أجناسها وأنواعها قليلة العدد تقسم الى تسين قسم الاسماك البحرية التي تقضي حياتها في البحار وقسم الاسماك البحرية التي تعيش في المياه العذبة . جميعها من الاسماك المسنجة الشكل ، كبيرة الرووس ، صلبة الاجسام المسنجة ، مستطيلة الزعانف الحادة الشائكة لحومها دنيئة الصفت .

٢١٦٨٢ - قُدْكَائِيَات

فصيلة نباتية تعرف بالخرماط ، أظلمها .

٢١٦٨٣ - قُدْكَيد Vande desséchée (F).

Dried meat (E).

لحم مقدد .

٢١٦٨٤ - قُدْكَيسِيَّات

هي القُرْدِيَّات ، فصيلة نباتية ، أظلمها .

٢١٦٨٥ - قُدْكَيُون * لامارِكِيَّة Lamarkie (S).

Lamarkie, Codion, Elaeodendron (F).

جنس نباتات عشبية برية من التبليات المكروشيات .
أنواعها المعروفة عديدة منها براري حوض البحر الابيض المتوسط || أورالها صفية النصال المسطحة . أزهارها سليل التجميع . سليلاتها صغيرة .

٢١٦٨٦ - قُدْكَو * Branchipus (S).

Branchipe (F). Branchipus (E).

درية من القشريات الدنيا غشيميات الاطراف . تعيش في المياه العذبة . جسمها عديم الحافات ، مستطيل الشكل ، طويل نحو ١ مم . عينها مزنةتان . زباناها مستطيلان عند الذكر . قوائمها الصدرية صفيمية الشكل . تنوم على ظهورها .

٢١٦٨٧ - قُدْكَأَف Branchyne (F).

هي الرئاة ، أظلمها .

٢١٦٨٨ - قُدْكَأَف أحمر الرأس * Brachyne crépizant

هو الرئاة الحمراء الرأس ، أظلمها .

٢١٦٨٩ - قُدْكَأَل ، قُدْكَأَل Nuque (F). Nape (E).

جامع مؤخر الرأس وقيل ما بين فقرة القفا الى الاذن .
والقدال من الفرس معقد المذار غلفت الناحية . ج قُدْكَو وأقذلة .

٢١٧١٤ - قَرَاص - هو البراد، اعليه .

٢١٧٠١ - قَرَاكَة - هي الصبابة ، اعليه .

٢١٧١٥ - قَرَاص ، قَرَقِص ، حَرَقِيق ، اَنْجُرَة

Urtica (S), Ortie (F), Nettle (E).

جنس نباتات عشبية برية طيبة من فصيلة القرصيات
انواعها المعروفة ٣٠ اصيلها البلاد المعتدلة الحارة . سواها
منتسبة فراء . اوراقها معتقة متقابلة او متعاقبة . نصلها
مؤنفة الصماء زيفها حليبي دقيق يفرز عصارة حمرة ترتكز
على الحامض التل وهو يثقب بين ومن يحسه يتهيج الجلد
ويظهره || اضرارها خضراء القلح وسيدة او ثنائية المسكن .
يزورها طيبة صديقة الفوائد مثيرة لرغبة الجلوس وقد تصاف
في العطاراة الى اكثر الادوية المنبهة المستعملة لهذه الغاية .
والقرص الجاف يفقد الخواص اللامعة بعد اغتسال الحامض
التل || اعرف انواعها واشهرها الكاري والكبير ومارق .

٢١٧١٦ - قَرَاص كَاذِب - Lamier blanc (F).

هو اللابيين الابيض ، اعليه .

٢١٧١٧ - قَرَاص كَاو ، قَرَقِص رُوْمَانِي ،

Urtica pilulifera (S).

Ortie à pilules, O. romaine (F), Roman nettle (E).

Pillennessel (D), Ortica romana (I).

نوع من القراص وهو نبات عشي بري طيب يحول يكثر
في البساتين والحقول . ساقه دقيقة زباء . اوراقه معتقة ،
متعاقبة ، احليلبية ؛ نصلها حشن اللبشرة ، سنن الحافة ،
كثيف الحلب الشاك . اثماره وحيدة المسكن خضراء اللون .

٢١٧١٨ - قَرَاص كَبِير *

Urtica dioica (S), Ortie dioique, Grande ortie,

Ortie puante (F), Stinging nettle, Large nettle (E).

Grosse Brandnetel, G. Nessel, Brennessel (D), Ortica

grande, O. maschia, Orticeone (I).

نوع من القراص وهو نبات عشي بري طيب حولي يكثر
في اليبور وقرب السياجات . ساقه فراء صالية . اوراقه
مستطيلة الزاخم الاخير ، سنلة الحافة ؛ نصلها كثيف
الحمل الثقيل مبهر الحلب المستطيل . اثماره ثنائية
المسكن .

٢١٧١٩ - قَرَاص مُحَرَّق ، قَرَقِص التَّجَوُز

Urtica urens (S), Ortie brûlante, Petite ortie (F).

Small nettle, Dwarf stinger (E), Kleine Nessel (D),

Piccola ortica, Ortica ardente (I).

نوع من القراص وهو نبات عشي بري طيب حولي يعيش
ايها كان وفي اي تربة كانت . ساقه قصيرة فراء زباء .
اوراقه بيضية الشكل منشارة الحافة نصلها لبد الحمل
الحلي الشاك . اثماره وحيدة المسكن .

٢١٧٢٠ - قَرَاصِيَا *

Prunus cerasifera (S).

Prunier cerise (F).

نوع من الفروع شجرة صغيرة القند تلون من ٣ الى ٤ امتار .
ساقها فراء . اوراقها احليلبية النصل شديدة الخضراء العابق .
ثمارها مأكولة وهي كرزينة الشكل والقند ، بنفسجية اللون ،
خضراء المواج .

٢١٧٢١ - قَرَاصِيَات

Urticaceae (S).

Urticacées, Urticées (F), Urticaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين هامة القناعات اناجها
وانواعها عديدة معظمها لياتات عشبية وحشنة وبعضها
شجري . جميعها حادة الحلياب . اوراقها حليبة النصل .
اثمارها رباعية او خلبية التركيب . ثمارها فقيرة او
نوعية ، صغيرة القند .

Guéret (F).

Ploughed but unsown land (E).

ارض حرثت ولم تزرع ولم تفرس . وقيل للزراعة التي
لوس عليها بناء ولا فيها شجر . وقيل الارض الخالصة لزراع
لو تفرس .

٢١٧٠٣ - قَرَاد ، قَرَادَة ، حَكَم . Tique (F), Tick (E).

اسم شامل يطلق عادة لا عرفاً على معظم أنواع الطلحيات .
الواسعة قرادة وحلوة .

٢١٧٠٤ - قَرَاد الجَرَب * Symbiose

جنس قراد يعمد جرباً في الخيل والمجترات .

٢١٧٠٥ - قَرَادِيَّات ، حَكَمِيَّات

Acarions (F), Spiders (E), Milben (D).

رتبة حشرات من التكنيكيات فصائلها واجنسها وانواعها
كثيرة العدد . جميعها صغيرة القند . اجسامها حادة الفروسل
والحلقات . رؤوسها وصودرها ويطونها مندمجة . مضغها
ازب الجلد . ملاسها الفككية لانياسية الشكل منها الملقطة
والبيضة ... غاطمها قارضة او ثاقبة ماصة . ارجلها
ثمانية في الحشرات الكاملة . مداسية في البقرات وهي عجينة
الاطراف او غطية || اشهر فصائلها : الارغشيات
والبراميات والجربيات والحليشيات والسكيات والشيشيات
والطلحيات والفشيات والكهدييات .

٢١٧٠٦ - قَرَار Arrêté (F), Order in council (E).

هو آخر ما استقر عليه الرأي في تعين الاجراءات التي
يقضها نشر القوانين وتنفيذها || اما السلطات التي
يؤمها القانون حق استصدار القرارات فهي سلطة القضاء
والوزير والمخلف والبلدية .

٢١٧٠٧ - قَرَار Décision (Jur.) (F), Decision (E).

هو الرأي النهائي الذي تستقر عليه الآراء ، وهو من الحكم
منطوقه بين السلطات التصريح بها .

٢١٧٠٨ - قَرَار الاتهام Réquisitoire (F).

Lest of charges, indictment (E).

هو مرافعة النيابة العامة وطلبها تطبيق مواد معينة من القانون .

٢١٧٠٩ - قَرَار الإحالة Ordonnance de renvoi (F), Sending ordinance (E).

هو القرار الذي يصدره قاضي الاحالة .

٢١٧١٠ - قَرَار التحصيل Mise en recouvrement

قرار تصدره الادارة او مصلحة الضرائب يحمل قسام
التحصيل ثلثة منذ صدورها .

٢١٧١١ - قَرَار الرَفْض Décision de rejet (F).

Carrying decision (E).


هو القرار القاضي برفض الطلب المقدم .

٢١٧١٢ - قَرَار تَعْيِين التَّالِف Arrêté de cessibilité (F), Transferability order (E).

قرار تعين فيه الادارة المقاررات التي ستوزع ملكيتها من
اصحابها في سبيل تنفيذ عمل تقتضيه المنفعة العامة .

٢١٧١٣ - قَرَار النَّالِف Décision exécutoire (F).

هو القرار الواجب تنفيذه .



قراد الجرب



قَرَاص كَاو



قَرَاص كَبِير



قَرَاص مُحَرَّق



قَرَاصِيَا

معظم أنواعها عصارة حليابية حراء اللون سريمة الجفاف تستعمل استعمال الكينور والكاشور .

Cornouiller (F).

٢١٣٣٢ - قُرَالِيَا

هي القزوينس ، اطلبه .

Cornuscées (F).

٢١٣٣٣ - قُرَالِيَّات

هي القزوينسات ، اطلبها .

٢١٣٣٤ - قُرَيْبَة . هي الزق ، اطلبه .

Corvina (S).

٢١٣٣٥ - قُرَيْبَة

Corb (F). Corvina (E).

جنس اسماك بحرية بويضة من شائكات الزعانف وفضيلة الجارديات || أنواعها المروفة نحو ٢٥ منظرها من اسماك المحيط الهادي والهندي والمحيط الاخر ، وبعضها يعيش في البحر الابيض المتوسط || اجسامها متغايرة القد ، اطوالها تراوح من ١٢ الى ٣٥ سم. اذنيها متباعدة الانوارن يكثر فيها الرصاصي والاسمر القاتم || لحمها جيدة الصنف مأكولة || اصرف انواعها واشهرها القرية السوداء .

٢١٣٣٦ - قُرَيْبَة سَوْدَاه * ، قَلَقُ الْبَحْرِ

Corvina nigra (S).

Corb noir, Corbeu de mer (F). Crow fish (E).

نوع من القرية . سمكة بحرية بيوض . اصطناع البحر الابيض المتوسط || جسمها احليجي الشكل يطول من ١٨ الى ٣٥ سم. ثوبها الى السرة السوداء المواج . ظهرها اسود . بطنها قضي . زعانفها الى السواد الارث المواج يطولو تنطبق ذهبي . رأسها مخروطي الشكل ، قصير الخطر . فكها متعادلان . شفتها متدل الانفراج . عيناها كبيرتان ناشرتان . زعانفها متباينة الاشكال . الظهيرة الارب محرس . الظهيرة الثانية مستطيلة . السدوية مجاذية . الحوضية تديية . الشرجية مستطيلة . الذيلية مجوفة الطرف || لحمها جيد الصنف ، مرغوب فيه .

٢١٣٣٧ - قُرَّت الْجِلْد . Kératose (F). Karatosis (E).

علة في الجلد تنشط الطبقية القرنية تشقق وتتصلب .

٢١٣٣٨ - قُرَّة * ، قُرَّة الْعَيْن

Nasturtium officinale (S). Cresson de fontaine, Santé du corps (F). Water cress, Water grass (E). Brunnenkresse, Brunnenwasserkrasse (D). Crescione di fonte, Nasturcio, N. acquatico, Sisembrio aquatico (I).

بقلة معمرة من فصيلة الحليبيات تعيش على سطح الماء سوتها عشية . اوراقها منتقة ، مركبة ، ثلاثية الوربيات . ازهارها متفردية التجميع ، بيضاء اللون . فروصها واراقها وازهارها مأكولة ، نافعة (راجع جداول الفيتامين).

٢١٣٣٩ - قُرُنْج *

Cyclostrema (S).

Cyclostreme (F). Cyclostrema (E).

جنس حيوانات بحرية من القزوينسات مملوكة الارجل وفضيلة القزوينسات . انواعها الماعصرة المروفة مدينة منتشرة في جميع بحار المال || اصطناعها صخرية القند قمرية ، معزولة ، متدلة الانعقاد ، جانبية القوقعة المستديرة كالبيق . لونها الى البياض الاخير تملو زخرفة جؤوية متناقة تمتد من القوقعة والقاعدة الى القمة .

٢١٣٣٩ - قُرَامِيَّاتُ الْبَحْرِ Acaláphes (F).

رئة من المحفقات تنتمي الى صف المحفقات اللوسية . فصائلها واجناسها مدينة تتميز بشكلها القضي التركيب تملو اعداب شائكة اذا لامست الجلد اقمته كما يفعل القراص . اصطناعها جميع بحار البلاد الحارة والمتحدة تعيش على الصخور .

٢١٣٣٩ - قُرَامَة *

Karata (S). Karata, Karatas, Caratas, Ananas à feuilles longues (F). Curra-cowplant (E). Karatas Ananas (D). Karatas (I).

جنس نباتات معمرة برية وزراعية تربيتية من فصيلة الانتاسيات . اوراقها لحمية ليفية مستطيلة طعمها اللون شائكة الاطراف والمقصعة . ازهارها جميلة الشكل والانوارن ، سليبة التجميع || انواعها قليلة الشهرة ما يتبع .

٢١٣٣٤ - قُرَامَة سَانْ دُومِنْجُك

Karata de St. Domingue

نوع من القرامطة اوراقها صلابة نسيجية وقد تستعمل تنج الجلود بعد صفها في تدويج السلك لمبيد .

٢١٣٣٥ - قُرَامَة غُويَان ، شَجَرَة الْفَتَالِيل

Karata de la Guyane, Bois de mêche

نوع من القرامطة لها كالمصفان يستعمل استعمال الفتائل . ثمارها صلبة القند رنية الشكل تملو ليمون الارض لانها حازنة العلم وتنضج في الزربة .

٢١٣٣٦ - قُرَام * ، قُرَام * ، قُرَامَة

Picus (S). Pic (F). Woodpecker (E).

طائر جسم الدورلر يتنشق جلود الاشجار وينقرها لاستخراج الحود من ثغورها . راجع نقار .

٢١٣٣٧ - قُرَام

Dermatomycosis (S).

Dermatomycose (F).

مرض جلدي سببه القراد .

٢١٣٣٨ - قُرَامَة

Ecorte (F). Bark (E).

هي اللحاء يوبه حام وفي التخصيص لحاء سوق النباتات الحولية والخولة .

٢١٣٣٩ - قُرَام

Phalaris noueux (F).

هو البشعة المعقدة نبات عشبي علني من النجيليات .

٢١٣٣٩ - قُرَام *

Rhizophora (S).

Rhizophora, Manglier (F). Mangrove tree (E). Gemeiner Wurzelbaum, Mangelbaum (D). Rhizophora (I).

جنس اشجار منتقية من فصيلة القراميات . انواعه ٥ اشجارها كبيرة القند . اوراقها منتقة ، متقابلة ، جلدية النصل اللامع . ازهارها محورية الارتكاز ، نورية التجميع ، مستطيلة الزناد . ثمارها خلدونية الشكل ، مأكولة الحب . يستخرج من عصارة ثمارها بعد تخميرها مشروب خري لا بأس به .

٢١٣٣٩ - قُرَامِيَّات

Rhizophoraceae (S). Rhizophoraceae (F). Rhizophoraceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الملتين مستقلة التعاللات . اجناسها ٥ وانواعها ٥٥ اصطناعها المناطق الاستوائية . جديسها اشجار وجنبات . اوراقها منتقة ، متقابلة ، بسيطة ، كاملة . ازهارها نورية التجميع ، ابغية الارتكاز او ناجية . ثمار بعض اجناسها مأكولة ويستخرج من سوق



قُرَامَة



قُرَام



قُرَامَة سوداء



قُرَّة

أزهاره عصفودية التجميع ، كبيرة القد ، تبدو يضاء اللون ثم تتحول شيئا فشيئا إلى الأحمر || أزهاره يستمر من تموز إلى أيلول .

٢١٧٥٢ - قُرْدَبِ المَنَاقِعِ

Renouée à feuilles de patience (F).
يمر بالدَّار ، أظله .

٢١٧٥٣ - قُرْدَبِ شَرَقِي

Polygonum orientale (S). *Renouée d'Orient*, *Bâton de St Jean*, *Cordon de cardinal*, *Monte au ciel* (F).
نوع من القردوب التزييني شروبه عديدة سوقه سرحة قليلة الفروع تملو من ١٠٠ إلى ٣٠٠ سم. أوراقه كبيرة القد ، نصلها يبيض الشكل ، ذات الزوايا الأخير . أزهاره سنبلية التجميع ، طرفية الارتكاز ويحورية ، مستطيلة الزنأد متدلية ، لونها يختلف باختلاف الضرب منها الأبيض والوردي والآخر والموشج || أزهارها يستمر من آب إلى أيلول .

٢١٧٥٤ - قُرْدَبِ صَوْبِي

Polygonum lanigerum (S). *Renouée laineuse* (F).
نوع من القردوب التزييني ساقه زياء اللحاء ، ملحاء اللون . سنبلية ، نصلها خلى الصفحة القصية الموج . أزهارها سنبلية التجميع ، متبادعة ، يضاء اللون أو وردية . أزهارها يستمر طوال شهر أيلول .

Polygonum chinense (S). *قُرْدَبِ صيني*.
Renouée de Chine (F).

نوع من القردوب التزييني ساقه فروعاً تملو من ١٥٠ إلى ٣٠٠ سم. أوراقه أهليجية مستطيلة ، نصلها قصير الملق ، سنن الحافة ، أخضر البشرة أو أحر . أزهاره عصفودية التجميع ، تاجية الارتكاز ، قمرية اللون . أزهاره يستمر طوال الصيف .

Guenon (F). *She-monkey* (E). *قُرْدَة*.
أنثى القرد .

Papion (F). *قُرْدُوح*.
هو القردوح ، أظله .

Philopterus (S). *قُرْدُوع ، نَمَء*.
Philoptère (F). *Philoptère* (E).
جنس حشرات جلدية صغيرة من فصيلة اللشمانيات . أنواعه عديدة جميعها مفلطحة الجسم . مستطيلة الرأس . طولها يراوح بين ١ و ٤ سم. ألوانها إلى الحنطي يسمر أو يفسفر مع الأنواع . وهي من الحشرات المؤذية ، تركب البعير فتضيقه بامتصاصها الدم .

Philopterus atratus (S). *قُرْدُوعِ اسْمَر*.
Philoptère noir (F).
نوع من القردع طوله نحو ٢ سم. جسمه يبيض الشكل ، كثيف الحلب المستطيل . ثوبه إلى السرة يطغى بفتح مثلث الزوايا حنطي اللون || يركب الفربان انحصها البنات .

Anaticola anseris (S). *قُرْدُوعِ البَطِّ* * ، *نَمَء البَطِّ*.
Anaticola des anserides (F).
نوع من القردع طوله يراوح بين ٢ و ٣ سم. جسمه نحبي الشكل . ثوبه إلى الصفار أخنطي . طيه صغير القد ، كثيف التجميع || يركب البط ويؤذيه .

Cyclostrematidae (S). *قُرْدُوعِيَات* * .
Cyclostrematidae (F). *Cyclostrematidae* (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات مهديات الأبريل حشبات الخياشيم . اجناسها وأنواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار العالم انحصها بحار البلاد الحارة والمعتدة الحرارة || أمداها منقطة أو شفافة ، عديمة المادة الأولية ، متبادعة الارتكاز ، قليلة الارتفاع ، مستديرة الفتحة . اجناسها الارتكاز القرنية المادة || أشهر اجناسها القرني .

قُرْدَحَانَة.
شرب من الكساء . ج. قردحان . والقردحان يبيض صفار ذوات رؤوس كروئيس القطر .

قُرْدَحَة ، قُرْدَحَة.
Ulcère (F). *Ulcer* (E).
تريه نسيجي لاثاني الشكل والشان يمل في الاجسام الحيوانية والنباتية فيطبخ .

قُرْدَحَة العنق ، قُرْدَحَة الحراشيف.
Becqueriau du mouton, *Chancr des lèvres* (F).
مرض عضال يصيب العنق . مظهره الحارضي بثور بضع مقرحة تملو مراثف الحيوان المصاب .

قُرْدَحَة العنقا.
Mal de nuque (F).
عارض يصيب الخيل .

قُرْد ، سَحْدَان.
Singe (F). *Ape* (E).
اسم شامل يطلق على كل حيوان لبون من القرديات . كنيته أبو خالـه وأبو حبيب وأبو خلف وأبو ربة وأبو قشة . جمه قردة وقردة . والاثني قردة جمها قرد . وتسمى لفة ودحية .

قُرْدِ المغرب.
Magot (F).
هو الشقيم ، أظله .

قُرْدِ الهند المقدس.
Singe saint des hindous (F).
هو حمار التليس . أظله .

قُرْدِ أميركي.
Saki (F).
هو السائي ، قرد كثر الذنب واللحمية .

قُرْدِ مقدس.
Semnopithecus (F).
هو الحبار ، أظله .

قُرْدَب ، عصا الراعي.
Polygonum (S). *Persicaria*, *Renouée* (F). *Persicaria* (E). *Knöterich* (D). *Persicaria* (I).
جنس نباتات معمرة من فصيلة البيطاطيات . أنواعه عديدة منها البرية والتزيينية والشبية والجبئية والعارضة . سوقها عقدية ، أوراقها لافسية الشكل ، أزهارها عصفودية التجميع أو سنبلية ، أشهر أنواعه ما يلي .

قُرْدَبِ التُرْكْمَنِيَّان * .
Polygonum badschuanicum (S). *Renouée du Turkestan*, *R. du Badschouan* (F).
نوع من القردوب التزييني . ساقه عارضة تطول من ٥ إلى ٨ أمتار ، فروعها رطلة ، أوراقها أهليجية الشكل ، قليلة القناعة ، نصلها ملس البشرة ، سنن الحافة .



قردب التركستان



قردب شرقي



قردب صوبي



قردع اسمر



قردع البطل

٢١٧٦٩ - قُرْدُوعُ شَحَوْت ، رُبَاعُ أَبُو الْحَوَل ، دَهَاب

Papio sphinx (S).
Papion sphinx, Papion grand (F). Cynocephalus mormon (E).

نوع من القردايع كبير الجثة افضل الزقردوم . موطنه يمتد من التيل الى النيجر والكنغو . ثوبه الى الجؤرة الياضه يبن مع اقترابه من ثيج الظهر ونقرة الرأس . حاجبه اوبط الشعر الابيض . اخذه متوسطه القرد مواء . صوته يشبه نباح الخنزير || جماعته متوسطه البدن .



قردع الحام



قردع الجوام

٢١٧٧٠ - قُرْدُوعُ عَشْتَرِي * ، شَحْمَكَة

Papio porcarius (S). Papion chacma (F). Chacma (E).
اكبر القردايع جثة واطولاً زلقياً وهو عادم الفرة صغير الكتاب . ثوبه الى الكهبة السراء يطولها موج اخضر . حمار ابيض اللون وشعر حاجبيه كلك || بألف الحصاب والجبال والمناقع . يعيش جماعات كبيرة كمد بعض العشرات .



قردع النور



قردع الزنج

٢١٧٧١ - قُرْدُوعُ مَزْوَاج ، مَيْمُون

Mormon malmom (S). Papion mandrill (F). Papio malmom, Mandrill (E).

نوع من القردايع ويواضع القردود وادها واثيرها واسهلها وانسحقا واشرها خلقتا واشدعا بأسا . موطنه البلاد الافريقية يكثر في القافون والكنغو || جسمه صمغوي يطول نحو ١٠٠ سم . ويبلغ ١٠٠ سم . ذنبه ١٠٠ سم . قوامه شديدة النشط . رأسه متوسط الحجم . زلقوه مستطيل مقطوم . عيناه خائزان . انفه احمر اللون . كتابته غدة ، بارزة ، زرقاء اللون || ثوبه الى السرة الزرقية الخفيفة الخيل ، يبق حته الظهر والرأس || يعيش جماعات كبيرة كمد بعض العشرات .



قردع الحيفة

٢١٧٧٢ - قُرْدُوعُ يَمْتِي * ، رُبَاع

Papio hamadryas (S). Papion hamadryas, Hamadryas Tartarin (F). Hamadryas (E).

اعرف وحشرات جلدية صغيرة من فصيلة النشانيات افرام حنينة جيمها دقيقة . طول اجسامها يراوح بين ١ و ٢ م . ورونها مستطيلة ، عليها خيل وكثيف . اقوالها الى التبرة الطول . تركب النشانيات على اختلاف انواعها تختلجها لانها تحمص الدم .



قردع بيزان



قردع خنزيري

٢١٧٧٣ - قُرْدُوعُ * ، لِيْپُور

Lipeurus (S). Lipeure (F).
جنس حشرات جلدية صغيرة من فصيلة النشانيات افرام حنينة جيمها دقيقة . طول اجسامها يراوح بين ١ و ٢ م . ورونها مستطيلة ، عليها خيل وكثيف . اقوالها الى التبرة الطول . تركب النشانيات على اختلاف انواعها تختلجها لانها تحمص الدم .

٢١٧٧٤ - قُرْدُون

Chardon (F).

هو الحرفش ، اطبه .

٢١٧٧٥ - قُرْدِي

Simien (F). Simian (E).

نعت تعريفي يطلق على كل ما يتعلق بالقرد .

٢١٧٧٦ - قُرْدِيَّات

Simiens (F). Simians (E).

مرتبة القردود وهي حيوانات لينة من الرئيسات . فصائلها واجناسها وانواعها كثيرة العدد تقسم الى مجموعتين :

٢١٧٦١ - قُرْدُوعُ الْجَوَالِمِ * ، تَمَّ الْجَوَالِمِ

Philopierus sublivascens (S). Philopière des passereaux (F).

نوع من القردود طوله يراوح بين ١ و ٢ م . ثوبه الى الصفار الخشن . جسمه كثيف الحلب الحقيق || يركب الجوام اعصها الشروريات .

٢١٧٦٢ - قُرْدُوعُ احْتِمَام * ، تَمَّ احْتِمَام

Columbica columbae (S). Colombica (F).

نوع من القردود طول ذكوره نحو ٢ م . واثانه ٣ م . جسمه ورأسه وزبانه وعليه الى الاستطالة . ثوبه حشلي اللون ، اصفر المويج || يركب الحام على اختلاف انواعه .

٢١٧٦٣ - قُرْدُوعُ الزُوج * ، تَمَّ الزُوج

Degeneriella ornata (S). Dégérie ornée (F).

نوع من القردود طوله نحو ٢ م . رأسه مخروطي الشكل . جسمه بيضي مفلطح . عليه دقيق مستطيل . ثوبه الى الصفرة يملوه تشويح سترش اسمر || يركب الزوج رنيج الماء .

٢١٧٦٤ - قُرْدُوعُ النُّسُور * ، تَمَّ النُّسُور

Ethiopterum monile (S). Ethioptérme (F).

نوع من القردود يطول نحو ٤ م . ثوبه الى الحشلي الاسمر . زبانه عادية الاطراف ، عليه صغير القرد ، متوسط الكثافة || يركب النسور على اختلاف اجناسها وانواعها .

٢١٧٦٥ - قُرْدَمَات

Cardamine amère (F).

هي الحسرة ، اطها .

٢١٧٦٦ - قُرْدُوعُ ، قُرْدُوع

Papio (S). Papion, Cynocéphale (F). Baboon, Cynocephalus (E).

جنس قردود من فصيلة الببرسيات . انواعه ٩ تتميز ببقاها منظرا وسفالة اخلاقتها وهدارتها وقدراتها واحتياها . اجسامها صمغوية ، عضلاتها قوية ، ورونها ضخمة ، اجسامها زلقوية الشكل مقطوعة . اذانها صغيرة . قوائمها قصيرة وقوية تمكها من العدو السريع وتحمل دون خفة التسلق . اذانها لاقياسية الشكل والعليل || موطنها قسح الاربعاء يمت نصف القارة الافريقية وكال الجزيرة العربية . تألف المناطق البصرة تنجب الاحراج والغابات . تعيش جماعات كبيرة العدد قوتها ما استطاعت اليه سبيلا من الحبوب والفاور والجذور والحشرات والمظار ويروض الطير || اعرف انواعه واشهرها ما يلي .

٢١٧٦٧ - قُرْدُوعُ احْمِشَة * ، قُرْدُوعُ دُجِيْرَة

رُبَاعُ دُجُوِي

Papio doguera (S). Papion doguera (F). Doguere baboon (E).

نوع من القردايع موطنه يمتد من الجفة الى الكنگو ثوبه الى الصفار الزيتوني ، قوامه سيد . مفره ذكره عادية اللون يطولها موج اسمر || يأنف المناطق الجبلية البعيدة من كل حران . جماعته متوسطه البدن .

٢١٧٦٨ - قُرْدُوعُ بَبُون * ، بَبُون ، رُبَاع

Papio babuin (S). Papion babouin, Babouin (F). Baboon (E).

نوع من القردايع العادم المفره والكنائب . موطن الحيفة وجوارها . ثوبه الى الصفار الخشن يبق حته الظهر وينير حته الرأس والعليل || يأنف الاماكن القريبة من الحقل الزردرة اعصها حقل القرد والبدن || يعيش جماعات كمد بعض العشرات .



قردوع بني

من ٤٦ إلى ٤٨ م. رأسها حطلي اللون. عيناها كيرباتن. زياناها عيطيان. جوشها ويطنا إلى الحطلي الاسمر المواج || روشنها الامانيان إلى الحطلي الجوزي المواج تملو مجموعات من الزراكش والازاريق الجروية. روشنها الخلفيان إلى الحطلي الاسمر المواج. اهدائها إلى الحطلي الاسمر || لها جبل واحد في الحطلي. تظهر الفرائش في اوائل تموز وتبقى حتى اواخر ايلول. تسهر في الليل. تماثل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع ويتمتع المكن لعداً على الصفحات السفلى من نصال الأوراق || السرعة قطول نحو ٤٥ م. جسمها شبه اسطواني الشكل يعلو في السكة بالمشرة نحو هربي. ثوبها إلى الخضار الاصفر تملو جده قاطبة سواء يتخللها تنقيط ابيض ويحدها من الجانبين خط اصفر. رأسها اسود يعلو تمشيع اصفر. عليها ورواجيها إلى الخضار الداكن || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً يتقضي في التربة حيث تنفس السرعة ملتصقة بجلباب من الطين.

٢١٧٨٥ - قُرْدِس ، فُجْرُوس ، فُيْقُوس

Simulium (S). Simulium (F).
جنس حشرات صغيرة القند من فصيلة القرسيات تملو الذباب. انواعها عديدة منتشرة في جميع اقطار العالم. تألف الاكامن الربطية. ذكورها تعيش على الانزعاج. اناثها لاسمة تمتص الدم.

٢١٧٨٦ - قُرْدِس اَحْمَر الراس

Simulium erythrocephalum (S). Simulium à tête rouge (F).
حشرة مؤذية من فصيلة القرسيات. جسمها مستطيل صغير يطول نحو ٤ م. رأسها كبير. عيناها متقاربتان. زياناها اسطواني، قصيران. روشنها كيرباتن شفافان. رأسها احمر. صدرها إلى السرة البنية. بطنها اصفر الزام الاولي والاخير، بني الزام الثاني والثالث. قوائمها بيضاء. تظهر الحشرة الجبلانة من ايار إلى تموز. قوائمها كيرباتن. رصيق الازهار. الاثني لاسمة، ماصة، تهاجم كيرباتن ولا تمتص من الانسان. تقتسم بنوع خاص الأنث والعين والاذن والرجل.

٢١٧٨٧ - قُرْدِس الخيل

Simulium equinum (S). Simulium du cheval (F).
نوع من القُرْدِس طوله يراوح بين ٢ و ٤ سم. اناثه تلسع الدواب اغصانها الخيل وقد لا تمتص من الانسان فترضيه وتكبله || يكالغ باستماله ا ل د د ت . واشالها من الادوية التي لا تقيي الانسان والحيوان.

٢١٧٨٨ - قُرْدِسَة

Crassatella (S). Crassatella (F).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات صليحيات الخياشيم وفصيلة القرسليات. انواعها المعروفة تناهز المئة، اكثرها من متحجرات الاباج الثاني. انواعها الحاصرة وقدرها نحو ٣٠ تعيش في بحار البلاد الحارة || اصداؤها منتوسطة الحجم، مهيمنة الشكل، ثنائية المضاربع المتساوية. مزخرفة السطوح الخارجية المائلة.

٢١٧٨٩ - قُرْدِسِيَّات

Crassatellidae (S). Crassatellidae (F).
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صليحيات الخياشيم اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد اصطناعها بحار البلاد

مجسومة قردو العالم القديم المعروفة بسفليات المنخرفين .
ومجسومة قردو العالم الجديد المعروفة بالبحارات اولفانطاسيات
٢١٧٧٧ - قُرْدِيَّكَة خط ثيج الظهر .

٢١٧٧٨ - قُرْدِيَّس *

Cardina (S). Cardine (F). Cardine (E).
جنس دويبات مائية من القشريات ، عشاريات الارجل ، طولان الليل ، وفصيلة القريدسيات . انواعها المعروفة قليلة العدد ، بعضها نهري يعيش في المياه الطيبة وبعضها بحري || اجسامها متوسطة القند . صدرها مستطيل المنك . مؤخرها معتدل الخانة والتخطيط . تمضيخ عمتاشها المغالية الاطراف || اشهر انواعها واكبرها قُدْا القرديس الهندي (*C. fossarum*) الذي يكثر وجوده في نهر جنيس .

٢١٧٧٩ - قُرْدِيَّكَة

Ochradenus (S). Ochradène (F).
جنس نباتات برية عجيبة مصرة من فصيلة الخريزانيات . انواعها المعروفة قليلة مهددا بعض مناطق حوض البحر المتوسط . سيقانها مشتبكة القروع مستشيكها . اوراقها غريزة النصل او خطية ، قليلة العدد ، متباعدة الاوتكار . ازهارها حادة القممالات . خالصة او سداسية الفصل ، لا نظامية الابدعية التي يراوح عددها بين ١٥ و ١٠ .

٢١٧٨٠ - قُرْدُوح *

Atraphaxis (S). Atraphace (F).
الواحدة قرزية . جنس نباتات حينية مصرة صغيرة القند من فصيلة البيلابيات . انواعها قليلة . اوراقها بيضية ، كاملة ، صغرة ، جلدية النصل . فصل ازهارها الداخلية تطول وتتلون بعد التورر || اعرف انواعها ما يلي .

٢١٧٨١ - قُرْدُوح سناني

Atraphaxis frutescens (S). Atraphace lanceolée (F).
نوع من القزوح وهو حينية سرطوية سرسة تملو من ١٠ سم الى ١٥٠ سم . اوراقها سنانية الشكل ، صغيرة القند ، بحرية اللون . ازهارها إلى البياض الناصع || ازهاره يستمر من تموز إلى ايلول .

٢١٧٨٢ - قُرْدُوح شاكلي

Atraphaxis spinosa (S). Atraphace épineux (F).
نوع من القزوح وهو بحلية سرطوية شاكلة تملو نحو ٥٠ سم . ساقها مبرصية غير السواء . اوراقها صغيرة القند ، سمكية النصل ، بحرية اللون ، ازهارها وردية || ازهاره يستمر من ايار إلى آب .

٢١٧٨٣ - قُرْدُوح شمخادي

Atraphaxis buxifolia (S). Atraphace à feuilles de buis (F).
نوع من القزوح وهو بحلية صغيرة سرسة تملو من ٥٠ الى ١٠ سم . اوراقها بيضية شمخادية الشكل والتلجج . ازهاره يستمر من ايار إلى سزيان .

٢١٧٨٤ - قُرْدُوبَة هَرْمِيَّة *

Amphipyra pyramides (S). Amphipyre pyramidal (F). Amphipyra pyramides (E).
حشرة من فصيلة السقيات سرشقيات الاجنحة . موطنها يشمل معظم اقاليم حوض البحر الابيض المتوسط والناطق الداخلية المتاخمة . قراشها واشعة قويا رصيق الانزعاج . سرشها خاضعة تمضيخ على اوراق الاجشمار الوريفة || جسمها متوسط القند يطول نحو ٢٥ م . يسلطها قزواح



قردوس



قرديس



قزوح



قردومة هرمية



قردس الخيل

مسكها مدون القشار ، جيد الصنف ، شائع الاستعمال .
لحمها متوسط الصنف مأكول . ويستخرج من كبدها
زيت مرغوب فيه .



قُرَشِ أَسَهْت

٢١٧٩٤ - قُرَشْ شَالِكْ * ، كَلْبْ بَحَرْ شَالِكْ

Squalus acanthias (S). *Alguillat* (F).
Picked dog-fish, Hound-fish, Spiny dog-fish (E).

سكة بحرية ولود مفترسة من فصيلة القرشيات . اعطائها
البحر الأبيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي ||
تعتبر من الاسماك البية . سرورها الاغواط والثقات ||
جسمها وشي الشكل بطول نحو ١٢٠ سم . رأسها مخروطي
الشذن ، معتدل التبطيط ، ذلق الخلف المستدير الطرف .
انسانها ثلاثية الصفوف ، متباينة الاشكال بين الفكين
تكثر فيها الاطراف المشارية الحادة || ثوبها الى الطحلة
السراء ويلونها موانع ازرق يبق عند الظهر . جانبها الى
الطحلة الموهجة بالأزرق تبرز مع الاقتراب من البطن
الابيض || تتميز بانعدام الزعنفة الخرجية وبالمتمنض
الصلب القرني المادة الذي يستيق الزعنفة الظهرية الاولي
والثانية || الاثني مثانة تقع في فصل الصيف نحو ٧٠
جيرا || لحمها قاس ، كثير الالياف ، كامن الصنف .
مسكها مرطوب فيه ويستخرج من كبدها زيت جيد
شائع الاستعمال .



قُرَشِ خَنْزِيرِي



قُرَشِ شَالِكْ

٢١٧٩٥ - قُرَشَامْ * *Hoplocampa* (S).

Hoplocampe (F).

جنس حشرات صغيرة القد من فصيلة المشاريات . انواعه
المعروفة ١٦ جميعها وحيدة الجبل الحولي انواها ملوكة
تكثر فيها السرة . رواشها شافة . رقاتها جلوية تركيب
النار وتطليها || لشهر انواهم واضرها قرشامة التفاح
والاجاص والموخ .



قُرَشَامَةُ الْاجَاصِ

٢١٧٩٦ - قُرَشَامَةُ الْإِجَاصِ *

Hoplocampa brevis (S). *Hoplocampe des poires* (F).
Pear sawfly (E). *Birnensagwespe* (D).

حشرة من القرشام طولا يراوح بين ٤ و ٥ سم . ثوبها
حطلي اللون تملوه بقع سمر . ارجلها الى الصفار المايق
انائها تمتع المكن على زهر الاجاص فينتفخ من رقات
دقيقة نحيلة تنخر الثمرة عنه بدء تكوينها فتقرض المبيض
وقسب الانعلاص .



قُرَشَامَةُ التَّفَاحِ

٢١٧٩٧ - قُرَشَامَةُ التَّفَاحِ *

Hoplocampa testudina (S). *Hoplocampe des pommes* (F). *Apple sawfly* (E). *Apfelsagwespe* (D).

حشرة من القرشام . طولا يراوح بين ٦ و ٧ سم . رأسها
ورزبانها ويوشها الى الصفرة تلمها رقة سوداء . بطها
اسود اللون مطوق بالاصفر || رقاتها حطلية شبراء المواج ،
كروية الرائحة تركيب ثمار التفاح قشرها سطحيًا تحت
القشور ثم تنقبها باتجاه الحزور .

٢١٧٩٨ - قُرَشَامَةُ الْفَيْخَوْخِ *

Hoplocampa minuta (S). *Hoplocampe des prunes* (F).
Plum sawfly (E). *Schwarze Pflaumensagwespe* (D).

حشرة من القرشام طولا يراوح بين ٤ و ٥ سم . ثوبها الى
السرة السوداء . انائها تمتع المكن داخل قشور الثار
فينتفخ من رقات دقيقة تتابع الثقب والنخر حتى يبلوغ
العجالت .



قُرَشَامَةُ الْخَوْخِ

الحارة || اصداها متشابهة ، مألوسة ، مزعجة ، شبه
عمرسة الشكل ، ثنائية المصارع ، حادة المادة القلوية ||
اعرف اجناسها واشهرها القرسة .

٢١٧٩٠ - قُرَشِيَّات

Simulidae (S).

Simulididae (F). *Simulididae, Sand flies, Buffalo gnats* (E).

فصيلة حشرات من ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها
كثيرة العدد عينة الاشار . جميعها صغيرة القد طولا
يراوح بين ٢ و ٦ سم . اجسامها غليظة الشكل . خلية
المرشفت المستطبة ، رؤوسها وجواشها كبيرة . قرونها
الاستشارية قصيرة ، ارجلها قوية ، رواشها شافة
كبيرة || ذكورها تميش على رقيق الانعام . انائها
لاسعة منخص الدم ، لفها مؤلم يلذذي ، لعابها يبعج البشرة
وقد يسبب حدة امراض ومجات تغلفها الحشرات من الاجسام
المريضة الى السلية .

٢١٧٩١ - قُرَشِيْ ، كُونَسْج ، لَحْم ، بُلْبُكْ ،

Squales (S).

Requin (F). *Shark* (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة القرشيات . انواعه المعروفة
٣٥ جميعها كبيرة القد مستطبة الشكل ، مفترسة لا تمر
بني . الاقصمت باستانها الى شطرين .

٢١٧٩٢ - قُرَشِيْ أَسَهْتْ *

Centrophorus squamosus (S). *Centrophore squameux, Requin chagrin* (F). *Porpoise* (E).

سكة بحرية ولود مفترسة من فصيلة القرشيات . اعطائها
البحر الابيض المتوسط . تعتبر من الاسماك البية .
سرورها الاغواط والجباج ولا تقترب من الجاهج الا نادرا
جدا || جسمها وشي الشكل بطول نحو ١٥٠ سم . رأسها
معتدل الحجم ، مستطيل الخلف الذلق . فها سفلي الزنكاز ،
صغير القد ، معتدل الشق ، متباين الانسان بين الفكين
المروي والسفلي . ثوبها الى الطحلة السوداء المويج يسمر
ويميق عند الظهر ويابر ويبيض عند البطن || تتميز
بمسكها الميعش السهف الاثنياسي الحجم والترتيب وبانعدام
الزعنفة الخرجية وبالمتمنض الصلب القوي الذي يتقدم
كل من الزعنفتين الظهرين || الاثني مثانة تقع في فصل
الصيف نحو ٧٠ جيرا || مسكها شائع الاستعمال . لحمها
كامن الصنف قل من يربف فيه . ويستخرج من كبدها
كية من الزيت الجيد .

٢١٧٩٣ - قُرَشِيْ خِنْزِيرِيْ *

Oxynotus centrina (S). *Centrâne, Humantîn, Cochon de mer* (F). *Seahog* (E).

سكة بحرية ولود مفترسة من فصيلة القرشيات . اعطائها
البحر الابيض المتوسط || تعتبر من الاسماك البية .
سرورها الاغواط واحالي الجاهج ولا تشاهد قرب الجاهج
الا نادرا || جسمها شبه وشي الشكل ، مستطبي الحوض ،
بطول نحو ١٢٠ سم . رأسها معتدل الحجم ، مبسط المقدم
والخلف القصير . فها سفلي الزنكاز ، قصير الشق
العريض ، متباين الانسان بين الفكين المروي والسفلي .
اعكاسها الخيشوية خاسية الفلوج اللصيقة . ثوبها الى
الحمرة القرميية تميز عند الظهر وتبرز عند البطن .
زعنفتها الظهرية شراعية الشكل ، كبيرة القد ||
الاثني مثانة تقع في فصل الصيف نحو ٥٠ جيرا ||

للتوصلة الارتفاع . ساقه ليفية دقيقة فراء عادمة الازراق تملو من ٢٠ الى ٤٠ سم . اوراقه جلدية الالتشاب متراكبة ، نصلها متموج الصفحة الجامدة المقرصة الشائكة الاسنان . ازهاره عطرية التجميع ، تاجية ، زرقاء اللون || اوراقه مأكولة وقد تحنل .

Cyclostome (S). * قُرْصُكَة ٢١٨٠٨

Cyclostome (F). Cyclostome (E).
جنس حيوانات برية من الرضويات مديات الارباع وفصيلة القمصيات . انواعها المعروفة قليلة البدن منتشرة في معظم اقطار العالم || اشهر انواعها القمصنة المحددة (C. sulcatum) التي يكثر وجودها في معظم مناطق حوض البحر الابيض المتوسط . صدفها صغيرة ، بطينة ، حلزونية ، قصيرة القصب ، برفالية اللون .

Cyclostomidae (S). * قُرْصُكِيَّات ٢١٨٠٩

Cyclostomidae (F). Cyclostomidae (E).
فصيلة حيوانات برية من الرضويات مديات الارباع امنيات الخياشيم ومديات الاجهزة . اجناسها وانواعها المتمايزة المعروفة عديدة . جميعها برية تعيش على الارض في المواقع الرطبة || اصداؤها شبه غلورية الشكل ، متباينة الحلزونة ، صغيرة الاسقاب ، اسطوانية القواعد ، كلصية الاسقاط || اعرف اجناسها واشهرها القمصنة .

Cerianthus (S). * قُرْصُوع ٢١٨١٠

Cérianthe (F). Cerianthus (E).
جنس حيوانات دنيا من المزهاريات وفصيلة القمصيات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة والمتحدة الحرارة || مداخنها لحمية تنشب في رمال القاع وحولها مستطيلة ، عصفية الشكل كاوراق التنبليات || اشهر انواعها قُرْصُوع المتوسط (Cérianthe de la Méditerranée) .

Ceriantidae (S). * قُرْصُوعِيَّات ٢١٨١١

Cérianthidae (F). Ceriantidae (E).
فصيلة حيوانات دنيا من المزهاريات . اجناسها وانواعها عديدة منتشرة في معظم بحار العالم || مداخنها اسطوانية ، مستطيلة ، هريضة أو مفلجة ، تنتهي بمخاريط متعاقبة القواس || اعرف اجناسها واشهرها القُرْصُوع .

Discoide (F). Discoid (E). * قُرْصِي ٢١٨١٢

لغت تعريفي توصف به الاجسام القرصية الشكل كالثاير وغيرها .

Discomycetes (F). * قُرْصِيَّات ٢١٨١٣

فصيلة الفطور القرصية تعرف بالفشاريات ، اطليا .

Erosion * قُرْص ، تَحْت ٢١٨١٤

اختناج وجف جزء من شي . سببه العوامل القارصة كالنياه التي تقرض التربة وتجرفها .

Prêt (F). * قُرْص ، إِعَارَة ، عَارِيَة ٢١٨١٥

Lending (E).
عقد يقع به المرء الى غيره متقرباً او حياً او شيئاً معيناً ليستعمله زمناً محدداً ثم يردّه . فدافع القرض قارض او معير وآخذهُ مستقرض او مستعير .

Paederia (S). Pédérie (F). * قُرْشُوم ٢١٧٩٩

جنس جنباث عارضة ملطقة حمرة من فصيلة الفريات انواعها قليلة اصحابها البلاد الحارة . سيقها تطويل من ٤ الى ٦ امتار . اوراقها عابلة معتقة متعاقبة . نصلها بيضي الشكل ، ذائق الزام الاخير وهو غلي الصلصة السفلى ، كرهية الرائحة عند البس . ازهارها عقودية التجميع ، حلجية البشرة ، كرهية الرائحة ، انايبها وردية اللون ، ابواقها الى البياض الاخضر المالح .

Squalidae (S). * قُرْشِيَّات ٢١٨٠٠

Squalidae (F). Squalidae (E).
فصيلة اسماك مفترسة من رتبة الاشلاق . اجناسها وانواعها عديدة ، اجسامها مستطيلة وشبه الشكل . اشطامها ذلقة ، شاذة . اسنانها حادة متشارية تقطع كل شي . زعانفها كبيرة . اصحابها بحار البلاد الحارة وقد تجوب اعوار الانهر العميقة الغور .

Gaufre, Rayon (F). * قُرْصِي ٢١٨٠١

Honeycomb (E).
مجموعة غرابيب السطح الواحد في خلية النحل .

Placement (F). Nipping (E). * قُرْصِي ٢١٨٠٢

هو القرمز اي قطع رؤوس الانضاض او الانفان الطرية .

Ranard corsac (F). * قُرْصَاق ٢١٨٠٣

هو الصليب الثعري ، اطليه .

Myletes (S). Mylète (F). * قُرْصَانَة ٢١٨٠٤

جنس اسماك ثورية من مفتوحات الخياشيم وفصيلة القمصانيات انواعها المعروفة خمسة منها نومان يمشان في انهر الهند وسيام وبنيتام وثلاثة انواع تعيش في انهر امريكة الاستوائية || اجسامها متوسطة القد ، بيضية اللون ، مستطيلة ، تطويل من ١٨ الى ٢٤ سم . رؤوسها صغيرة . زعانفها الظهرية كبيرة ورومية يتجمعا زعنفتان ضخمة صغيرة . زعانفها الشرجية مستطيلة مقعرة . زعانفها الذيلية منفرجة القوس ، قريبة الشبه بالحلل . اثوابها الى الخضار الاطحل المتفاوت الممايات || حولها مأكولة ، متوسطة الصنف .

Characidae (S). * قُرْصَانِيَّات ٢١٨٠٥

Characidae, Characnidae (F). Characidae (E).
فصيلة اسماك ثورية من مفتوحات الخياشيم . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة اصحابها انهر وبحيرات المناطق الاستوائية الاسيوية والافريقية والامريكية || اجسامها لاقيايسية الشكل واللقد . حراشفها صغيرة متراكبة . رؤوسها هريضة فتكرها مرصوة الاسنان الصغيرة الحادة . زعانفها الظهرية والذيلية لانفاضة || اعرف اجناسها واشهرها القرصانة والمردون والمسين والبيشوش والوفيف .

Scrofalaire du désert (F). * قُرْصَة ٢١٨٠٦

هي خنازيرة الصحراء ، اطليا .

Eryngium creticum (S). Eryngie, Panicaud de Crète (F). Field eryngo (E). Feldmannstren (D). Eringio (I). * قُرْصَمَنَة ، قُرْصَمَنِي ، شَوْلْ ٢١٨٠٧

عَقْرَبَانِي ، شَنْدَابْ إِكْرِيش
نوع من الشنداب وهو نبات حشيشي بري يكثر في الجبال



قُرْصَمَنَة



قُرْصَة



قُرْص



قرط



قرط مور



قرطب الورع



قرطب البط



قرطب الدجاج

٢١٨٢٦ - قُرْط ، قُرْص ، جُتْم Pinement (F).
Nipping (E).

تقطع رؤوس الاغصان أو الانداد أو الانثان .

٢١٨٢٧ - قُرْط مَوْز * ، طَرْح مَوْز Régime de bananes (F). Bunch of bananas, Cluster of bananas (E).

هو السنبلة الثمرية المشطية المتتابعة المتدللة التي يتألف منها حل الموزة .

٢١٨٢٨ - قُرْطَب Melampyrum (S).
Mélampe (F).

جنس نباتات برية حشوية حولية من فصيلة الحمازريات. أنواعه ٦ جميعها اشباح منتصبه فناء . اوراقها سنانية او خطية النصل . ازهارها صفراء اللون او بنفسجية . اشهرها واضرها قُرْطَب الزرع .

٢١٨٢٩ - قُرْطَب الزَّوْع * Melampyrum arvense (S). Mélampe des champs, Blé-de-vache, Cornette, Queue de loup, Queue de renard, Rougeole (F). Purple cow-wheat (E). Roter Wachtelweizen (D). Melampiro, Grano di vacca, Coda di volpe (I).

نوع من القُرْطَب ينمو من البساتين الفسادة لانه يكثر في زروع الحنطة فينبش جنوده في جنولها ويقامها الغذاء . يزدهر الى السرة ، دقيقها احمر اللون مر الطعم .

٢١٨٣٠ - قُرْطَب Ménopon (F). Menopon (E).

جنس حشرات جلدية من فصيلة القُرْطَبات . انواعه نحو ٦٠ جميعها مؤذية تركب الطيور قضيه || امرف انواعه واضرها الثلاثة التالية .

٢١٨٣١ - قُرْطَب الِوَرَع Ménopon pectinatum (S). Ménopon des oles (F).

نوع و القُرْطَب وهو حشرة صغيرة اللد طويلا براوح بين ١ الى ٢ سم . رأسها مستعرض الشكل ، مقعر القفن . ثوبها الى الوردية يطولها قشيش اشقر . تركب الازور وتؤذي .

٢١٨٣٢ - قُرْطَب البَط * Trinoton anserinum (S). Trinoton des canards (F).

نوع من القُرْطَب يركب البط فيؤذي . جسمه الى الوردية السمراء يطول من ٤ الى ٥ سم . رأسه مثليث الزوايا المستديرة . جوشه وبطنه متساويان في الطول والشكل ، ترجأت بطنه مجلدة بالحنطي .

٢١٨٣٣ - قُرْطَب الدَّجَاج * Ménopon gallinae (S). Ménopon des poules (F).

نوع من القُرْطَب وهو حشرة صغيرة اللد طويلا نحو ٢ سم . جسمها احليبي الشكل ، كثيف الحلب البقيق . رأسها محدب القيد ، مقعر القفن ، رباعي الحلب المستطيل . ثوبها الى الوردية الصفراء المزاج || تركب جمع الطيور الباذنة اخصها الدجاج .

٢١٨٣٤ - قُرْطَبِيَّات Ménoponidae (S). Ménoponidés (F). Menoponidae (E).

فصيلة حشرات جلدية من رتبة القُرْطَبات . اجناسها وازواجها عديدة جميعها صغيرة اللد اجسامها مغطاة ، بيضيه الشكل او احليبية . طويلا براوح بين ١ و ٦ سم . رؤوسها مستديرة او مثثة الزوايا . ارساغها مستطيلة عذاشة .

٢١٨١٦ - قُرْص ، صِلْفَة Emprunt (F).
Borrowing (E).

عقد تبرم به صلفه قانونية يدفع بمقتضاها عادة مبلغ من المال او اي شيء آخر الى أحد طرفيه الذي يصبح مدينا به بشرط يتفق عليها . والقرض اشكال منها :

قرص جبري او اِزْامِي Emprunt forcé (F).
Forced borrowing (E).

قرص طويل الاجل Emprunt à long terme (F).
Long-dated borrowing (E).

قرص قصير الاجل Emprunt à court terme (F).
Short-dated borrowing (E).

قرص مجده Emprunt consolidé (F).
Funded borrowing (E).

قرص مقدور الاستهلاك Emprunt amortissable (F).
Redeemable borrowing (E).

٢١٨١٧ - قُرْصُ الْمُخْطَمَةِ Prêt à la grosse aventure (F). Bottomry lending (E).

قرص يسري حل اشياء معرضة لاختطاف البحر . شرطه انه اذا هلكت هذه الاشياء كلياً او جزئياً كان المقرض في حل من رد مقابل ما هلك منها .

٢١٨١٨ - قُرْصُ يَصَالِيدَة Prêt à l'insérêt (F).
Lending in interest (E).

نوع من انواع الاعارة الا انه يعاقب اي ان المستير يدفع للامير فائدة قدرها ما جرى عليه الاتفاق .

٢١٨١٩ - قُرْصُ زِرَاعِي Crédit agricole (F).

هو التسليل الزراعي .

٢١٨٢٠ - قُرْصَاب Xérophage (F).

Xerophagous (E).
نمت تعريبي يطلق على الحيوانات والحشرات التي تعيش على المواد الجافة .

٢١٨٢١ - قُرْصَب

ما يبقى في الغرابل ريمى به مع الرذالة .

٢١٨٢٢ - قُرْصِيم قشر الريان يستعمل في التدبغة .

٢١٨٢٣ - قُرْصِيَّة

القُرْصِيَّة ج. قُرْصِيَّة . من غريب شجر البر شكل ولوناً زهره اشد صفرة من الووس . قال ابو حنيفة : و القُرْصِيَّة شلق بالشجر وينبت في اصل السرة والعُرْط وزهره اشد صفرة من الورس ورقه لطاف رقيق .

٢١٨٢٤ - قُرْط * ، ثَوْم مُعَمَّر Allium schaeoprasum (S). Ciboulette, Cive (F).

نبات دولسي معمر من فصيلة الزنبقيات . قصوه خلبية الشكل غليظة . اوراقه قرصية الانتشاب . دقيقة ، ضيقة ، جواء النصل ، منتصبه ، تطول نحو ٢٠ سم . شماريعه الزهرية تطو نحو ٣٠ سم . ازهارها حمراء اللون ، هامية الانكسار ، صويالية التجميع .

٢١٨٢٥ - قُرْط

Mélilot à petites fleurs (F).
هو الحنطوق الصغير الزهر . نبات مرهوي تطفله القذواب بشوة .

Panellus (S).

٢١٨٤٢ - قَرْطُوب

Panelle (F). Panellus (E).

جنس فطور من فصيلة السميات. أنواعه المعروفة قليلة العدد أصلها بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة. جميعها تتركب جلود الأجسام وأغصانها دون أن تؤذيها. تتميز بسوقها القصيرة وبكثافتها الفارشة، المكثفة الاطراف، الدبقة أو الحليمة السطح || أحراف أنواعه وأشهرها القربوب الحلو والقربوب المخمار.

٢١٨٤٣ - قَرْطُوب حَلَو *
Panellus mitis (S).
Panelle douce (F).

نوع من القربوب. يعيش على جلود الصنوبر دون أن يؤذيها. مجموعته لا تقتل عن ثلاث وحدات ولا تتجاوز السبع. ساقه شديدة القصير. نكتته غارشة لزجة داكنة مكثفة الاطراف، طحلا اللون كالكافور، قطرها يراوح من ١ إلى ٢ سم. اطراسه دقيقة، حلابة المادة || لحيته كاعنة الصف غير مرغوب فيها.

٢١٨٤٤ - قَرْطُوب مِشْخَر *

Panellus serotinus (S). Panelle tardive (F).

نوع من القربوب. يعيش على جلود وأغصان الأشجار المروية لخصبها السناني. مجموعته تتألف من ثلاث إلى خمس وحدات. ساقه شديدة القصير. نكتته غارشة، مكثفة الاطراف، خلية السطح في أبل عدها ثم لزجة. قطرها نحو ٢ سم. لونها إلى الطحلة الصفراء الخضراء المواج || لحيته كاعنة الصف غير مرغوب فيها.

٢١٨٤٥ - قَرْطُوزَة *

Cortusa (S). Cortuse (F). Cortusa (E).

نبات عشبي معمر من فصيلة الربيديات. معقود الصمغ على اسم العلامة «قربوزي». ينبت في بعض جبال الشرق الأدنى وأروية. أوراقها جلدية لائشانه، مدقة، كبيرة القد، مقصصة وسننة المختار. أزهارها شبه صولاني التجميع، يتركز على غصن يرتفع من ١٥ إلى ٢٥ سم. أزهارها صغيرة القد، وردية اللون، قصيرة المئاليق || تنويرها يستمر من حزيران إلى تموز.

٢١٨٤٦ - قَرْطُوط *

Euchoreutes (S). Euchoreute (F).

حيوان لين قاصم وحيد الجلس والذئب من فصيلة البير بويحات موطنه يمتد من إيران إلى تركستان || جسمه صغير القد يتميز ببساطة أذنيه وقائحيه الخلفيتين. أما ذنبه فيبالغ الطول. قويته إلى الشبه بعلها مواج اشجع يسير في الرأس والظهر ويشقر في الصدر والبطن، ذنبه أسود الزام الأخير الذي ينتهي بالابيض.

٢١٨٤٧ - قَرْط

Acacia sbrabique (F).

هو السط العربي الواحدة قرطة.

٢١٨٤٨ - قَرْع

Teigne (F). Tinea (E).

علل جلدية مختلفة تصيب الحيوانات والطيور الداجنة فتتقي على أسوأها ووربا وريشها. أسبابها فطور مجهرية تتركب الجلد وبصل الشعر والريش.

٢١٨٤٩ - قَرْع البَقَر

Teigne des bovins (F).

Cattle tinea (E).

نوع من القرع يركب رؤوس البقر وأغصانها.

أنواعها تختلف باختلاف الاجناس والانواع يكثر فيها الرمادي الاسفر المواج.

٢١٨٤٥ - قَرْطُف

بقلة وقيل ثمرة الرث.

٢١٨٤٦ - قَرْطُف، قَرْطُف، إِحْرِيض، بَسْمَر،

بَهْرَمَان، مَرْيَق

Carchamus (S).

Cartame, Cartame (F).

جنس نباتات عشبية وجنية، برية وزراعية، طبية وصباغية من سبط الحشريات وفصيلة المركبات. أنواعه عديدة منها الحولية والحرية والمعمرة. سوقها متصبية. أوراقها متعاقبة مستطيلة لا تخلو من الحشف. أزهارها نارية اللون، سرفلية التركيب. بزورها مضطمة بيضاء اللون طيبة يستخرج منها مادة زيتية تستعمل لعلاج داء المفاصل. أحراف أنواعه وأشهرها ما يتبع.

٢١٨٤٧ - قَرْطُف الصَّبَاغِي *، تَرْبَاغِي، عَصْفُر

Carchamus tinctorius (S). Cartame officinal, C. des teinturiers, Safran bâtard, S. d'Allemagne (F). Safran, Bastard safran, False safran (E). Färb-safflor, Bastardsafran (D). Cartamo officinale, Croco bastardo, Zafferano falso (I).

نوع من القربوب الحولي أو المحول يزرع للتزيين أو لاستخراج القربطين، مادته الفعالة الصباغية الصفراء اللون. ساقه متصبية سرسة تملو من ٢٠ إلى ٦٠ سم. أوراقه يضيئة الشكل مستطيلة الزام الأخير. نصلها بارز المرقق، سن الحافة، قصير الحشف. أزهاره برتقالية اللون ذهية المواج || أزهاره يستمر من تموز إلى أيلول.

٢١٨٤٨ - قَرْطُف بَرِّي *

قَرْطُف صَوْبِي، شَوْلِب، عَشْتَر

Carchamus lanatus, Kentrophophyllum lanatum (S). Cartame laineux, Chardon jaune, Kentrophyle (F). Woolly safflower, Distaff thistle (E). Wolliges Spornblatt (D). Cartamo lanoso, Ceeceprete, Scardicione salvatico (I).

نوع من القربوب الحولي البري القوي. ساقه متصبية زياء تملو من ٣٠ إلى ٦٠ سم. صارتها حراء اللون، كرسية الرائحة، جيلة الخضاب الزاوي. أوراقه مقصصة، نصلها غدي الصفصه، لزوج البثرة. أزهاره إلى الصفار البرتقالي. أزهاره يستمر من تموز إلى آب.

٢١٨٤٩ - قَرْطُف جَنْبِي *

Carchamus arborescens (S). Cartame arborescent (F).

نوع من القربوب السبروتي المعمر. جنينه تملو نحو ٢٠٠ سم. ساقها خشوشية. أوراقها سنانية مسترسية القاعدة. نصلها جبل الخضاب الزاوي، سن الحافة الشائكة. أزهارها إلى الصفرة الوردية المواج || أزهاره يستمر طوال شهر آب.

٢١٨٤٠ - قَرْطُومَان

Avoine cultivées (F).

هو الحطافل الزراعي، اطليه.

٢١٨٤١ - قَرْطُوب

Orang-utan melle (F).

He orang-utan (E).

ذكر السحالي ارتفاعه واقفاً على رجله يراوح بين ١١٨ و ١٢٢ سم.



قَرْطُف الصَّبَاغِي



قَرْطُف بَرِّي



قَرْطُوب حَلَو



قَرْطُوب مِشْخَر



قَرْطُوب

٢١٨٥٧ - قرع طويل * ، ذبءاء ، كزيب ، حريف

Lagenaria vulgaris (S). Calebasse, Gourde, Bouteille, Courge d'ornement (F). Bottle-gourd, Calabash cucumber (E). Echter Flaschenkürbis (D). Zucca lunga, Z. bottiglia, Z. fiasco (I).

نوع من القرع الحلوى ، شروبه حديدية منها البرية والزراعية المأكولة والثرائية . سوه مادة حارسة . اوراقها كبيرة اللد لا قياسية التخصيص والتفريش . ثماره مختلفة الاشكال والاصابع منها الايطالية والمغلطة والبرمية والناوروية والمردنية ، الخ .



قرع اسود البزور

٢١٨٥٨ - قرع كبير * ، يقطين مفلح

Cucurbita maxima (S). Potiron, Citrouille, Grosse courge (F). Large gourd, Spanish gourd, Winter squash (E). Spätskürbis (D). Popone, Cetrinollo, Zucca potirone (I).

ويدعى قرع حلو وقرع مالح . نوع من القرع الزراعي المشهور . شروبه حديدية لونها قمر واشكال ثمارها المصنعة المستديرة المفلحة التي يراوح قطرها بين ٢٥ و ١٠٠ سم . ووزنها من ٤ الى ٦٠ كيلو . لهاها جلد المكرس حادم الالياف يحوي نحو :

- ٩٥,٩٠ ٪ من الماء
- ١٧,١ ٪ من المواد الازوتية
- ١٢,١ ٪ من المواد المعدنية
- ٦٧,٣ ٪ من المواد الاستخلاصية

٢١٨٥٩ - قرع مسكي * ،

Cucurbita moschata (S). Courge musquée, Carabacette (F). Musky gourd (E). Moschuskürbis, Bismkürbis (D). Cetriolo muschiato (I).

نوع من القرع الزراعي الشائع الاستعمال . شروبه حديدية . سوه مادة طويلة . اوراقه مستديرة ، خلية النصل ، لا قياسية التفريش . ثماره مستطيلة مخنوقة الوسط يبلغ طولها في بعض الشروب نحو ١٠٠ سم . ووزنها ٢٠ كيلو . لهاها اصفر اللون ، قليل الالياف ، مسكي الرائحة .



قرع طويل

٢١٨٦٠ - قرعاه

Céraste (F).

هي الحادية من اخبث الحيات .

٢١٨٦١ - قرع عليل

« دوية حريفة بحبنة الظهر والبطن (السان) .

٢١٨٦٢ - قرعكة ، يقطينة

Citrouille, Courge (F). Pumpkin, Gourd (E).

هي ثمرة القرع أو اليقطين اشكالها واصحابها متباينة تختلف باختلاف النوع .



قرع كبير

٢١٨٦٣ - قرع صوس ، قير صوس ، قرع صوس

هو الفالغ جل ذو ستاين .

٢١٨٦٤ - قرع صي

Pépou (F). Pepo (E).

نمت وصي يدك على ما شكله شكل القرع المستدير .



قرع مسكي

٢١٨٦٥ - قرعيات ، يقطينيات

Cucurbitaceae (S). Cucurbitaceas (F).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين متحدة القبايلات . اجناسها واوراها كثيرة العدد . سواها مادة او حارسة . اوراقها متعاقبة ، حوالقها متشعبة . انزاعها وسيرة المسكن ، خاسية الاكام . ثمارها لياوية مخنوقة الاشكال والاصحاب . اشهر انواعها القرع والبطيخ والشام والخيول والقشاه والحظيل ، الخ .

٢١٨٥٠ - قرع الخيل

Taigne du cheval (F).

Horse tinea (F).

نوع من القرع يركب صهوة الفرس ومنه وكفه .

٢١٨٥١ - قرع الغنم

Taigne du mouton (F).

Sheep tinea (E).

نوع من القرع يركب لسان الماعز فيسبب احمالها

اصولها وله يمتدح غالبا في اصنافها .

٢١٨٥٢ - قرع شهدي

Taigne favosse (F).

Tinea favosa (E).

نوع من القرع يركب الخيل والارانب والستائر والكلاب .

٢١٨٥٣ - قرع ، يقطين

Cucurbita (S).

Courge (F). Gourd (E).

جنس نباتات حولية او معمرة من فصيلة القرعيات . انواعه عديدة . سواها مستطيلة مدادة او حارسة . اوراقها متفكة كبيرة اللد متشعبة الزناد الاجوف . نصلها قلبي القاعدة لا قياسي التخصيص . حوالقها متشعبة . انزاعها وسيرة المسكن ، كبيرة اللد ، صفراء اللون . ثمارها مخنوقة الاشكال والاصحاب || اشهر انواعها الزراعية ، المأكولة الثمار ، ما يتبع .

٢١٨٥٤ - قرع اسود البزور *

Cucurbita ficifolia (S). Courge à graines noires (F).

نوع من القرع الزراعي المعمر . ساقه لينة ، حقيقة ، مستطيلة حارسة ، فراء . اوراقه خماسية التخصيص ، نصلها عايق الخصار يملو تمتدح وتتسج اصفر . ثماره بيضية الشكل كالبطيخ ثمرها صلبة خضراء اللون تملوها رشفة بيضاء . لهاها ابيض اللون كثير الالياف متوسط تركيبه يشمل :

- ٩٠,٩٠ ٪ من الماء
- ٢٢,١ ٪ من المواد المعدنية
- ١٤,٣ ٪ من المواد الازوتية
- ١٤,٠٦ ٪ من السيلولوز
- ٩٣,٤ ٪ من الرباد
- ٥٩,٥ ٪ من المواد الاستخلاصية

زوره سوية اللون الاسود لهاها يحوي ما قدره

٢٢,٨٠ ٪ من المواد المعدنية

١٨,٩٥ ٪ من المواد الازوتية

٢١٨٥٥ - قرع الحشيش

Trichosanthe (F).

جنس نباتات مدادة حارسة من فصيلة القرعيات . انواعه نحو ٣٠ معظمها حولي وبعضها معمر . اعطائها البلاد الاسيوية الحارة وبعض مناطق استراليا . سواها عشية او ليلية مستطيلة . اوراقها كبيرة منقصة . انزاعها حديدية البتلات . ثمارها وزورها لا قياسية الشكل والحجم . اشهر انواعها الفتاة الثيبانية ، العليا .

٢١٨٥٦ - قرع رومي * ، قرع مغربي ، عسامة

Cucurbita pepo (S). Courge pépon, Girsamon, Courgeron (F). Pumpkin, Gourd (E). Schmuckkürbis (D). Geron. Zucca Indiana (I).

نوع من القرع الزراعي شروبه حديدية منها المكور والمستدير والمسطيل والقمبي والصنبر والكبير والمالسي والفصل والهند || لباها ثماره جيد الصنف عادم الالياف

المواج. ازهارها عذقي التجميع. محوري وطرفي الازتكاز. ثمارها عنية ، لاصقة السطح واللحم ، للذة الطعم ، قطرها نحو ١٠ م. || قرفها سمراء اللون. غبراء المواج ، جيدة الصنف. يستخرج منها وين الاوراق والازهار والثمار طيوب وادهان فاعلة .

٢١٨٧٤ - قَرْفَة كَذَابَة (F). *Fausse cannelle*.
هي دريس بجلان ، اطبله .

٢١٨٧٥ - قَرْفَة مَلَبَار * ، سَكَاچ (F). *Cinnamomum citrodorum* (S). *Cannelier de Malabar* (F). *Malabar cinnamon* (E). *Malabarischer Zimmetbaum* (D). *Cannelli di Malabar* (I).
شجرة زراعية من الافاوية. مهدا بلاد ملبار وقد انتشرت زراعتها في جزر الزانج وغيرها من جزر المحيط الهادي . ثمرتها صغيرة اللد ، فراء ، يستخرج منها اجود الطيوب والادهان . اما قرفها فنادية .

٢١٨٧٦ - قَرْفَة مَلَبَار * ، قَرْفَة مَلَبَار * (F). *Caryophyllia* (S). *Caryophyllie* (F).
جنس حويئات بحرية من الرجان عنية المدافع ، مستطيرة التريجات المفردة || اشهر انواعها القرفول الجملي (C. cyanthus) الذي يكثر وجوده في البحر الابيض المتوسط .

٢١٨٧٧ - قَرْفَة مَلَبَار * (F). *Cannellaceae* (S). *Cannellacées* (F). *Cannellaceae* (E).
فئة من فصيلة الاناريات تشمل القرفة والبيلون وغيرها .

٢١٨٧٨ - قَرْفَات (F). *Manidae* (S). *Manidés* (F). *Manidae* (E).
فصيلة حيوانات من الدرد اجناسها وانواعها عديدة اعرفها ام قرفة .

٢١٨٨٠ - قَرْف (F). *Gloussement* (F). *Clucking* (E).
صوت للدجاجة عندما تدعو فراخها .

٢١٨٨١ - قَرْف (F). *Liège* (F).
هو القلين ، اطبله .

٢١٨٨٢ - قَرْف (F). *Mésange* (F).
هو القرفقز جنس طير من الجرائم .

٢١٨٨٣ - قَرْف (F). *Apocyn* (F).
هو الخوشان ، اطبله .

٢١٨٨٤ - قَرْفَدَان (F). *Gulmauve jauns* (F).
هو الابوتيلان الاسرج ، اطبله .

٢١٨٨٥ - قَرْفَدَان * ، قَرْفَدَان * ، قَرْفَدَان * (F). *Myroxus* (S). *Loir* (F). *Dormouse* (E). *Siebenschläfer*, *Bilch* (D).
جنس حيوانات قانسة من فصيلة القرفقديات . انواعها قليلة . اجسامها صغيرة اللد مسطيلة . اذناها سوية اللون. اذنانها جبيلات الصفوف . رؤوسها اسطوانية الشكل . سالها طويلة قانية . عيونها كبيرة . اذناها مستديرة رصية . تسرح في الليل . تتسلق الاشجار . قوتها النار والبلوط

٢١٨٦٦ - قَرْف (F). *Ecimage* (F).
هو الصنف ، اطبله .

٢١٨٦٧ - قَرْف (F). *Ecorce* (F). *Bark* (E).
لحاء الشجر ، وكل قشر قرف* منه قرف الزمان .

٢١٨٦٨ - قَرْف الزَوَالِد ، تَكَرِيف (F). *Epamprage* (F). *Lopping off*, *Pruning* (E).
تقليم الفسنان او السروع الزائدة في الكروية .

٢١٨٦٩ - قَرْفَة (F). *Brou* (F). *Husk*, *Peel* (E).
هي غلاف صمالي الشرة قبل جفافه او عند انفصاله بعد تمام الجفاف .

٢١٨٧٠ - قَرْفَة (F). *Cannelle*, *Cannelier* (F). *Cinnamon-tree* (E).
جنس اشجار وعجيرات برية وزراعية من القرفيات وفصيلة القرفيات . انواعها عديدة منها بلاد الاسيرية . سوقها منتسبة فراء . اوراقها ابيدة متفكة . ازهارها صغيرة اللد لاقياسية التجميع والازتكاز || جميعها من الافاوية

ازهارها وثمارها واوراقها ولباء سوقها وفروعها وجيلورها عطرية للمادة ، لاذعة الطعم . يستخرج منها طيوب وادهان طيارة شائعة الاستعمال الطبي . وهي تقيح اللثة ولكنها تلبه الاصاب وتقتطها وتضيق بها . وين منافها انها مفادة للنتنح . اشهر انواعها ما يلي .

٢١٨٧١ - قَرْفَة بَيْشَاء (F). *Cannelle blanche* (F). *Canella* (E).
هي البيلون ، اطبله .

٢١٨٧٢ - قَرْفَة مَرْتَدِب * ، قَرْفَة سِيلَان * ، دَارُصِيَنِي (F). *Cinnamomum Zeylanicum* (S). *Cannelier de Ceylan*, *Cinnamome* (F). *Common cinnamon tree*, *Cinnamon* (E). *Zimmetbaum*, *Zimmet*, *Zimmetrinde*, *Kaneel* (D). *Cannella*, *C. del Ceylan*, *Cinnamon* (I).
شجرة زراعية من الافاوية مهدا سرتديب (سيلان) ساقها منتسبة فراء تمل نحو ١٠ اطار . فروعها متعاقبة الانتشاب ، مستقيمة الزوايا ، اوراقها متفكة ، متعاقبة ، بيضية الشكل ، ابيدة ؛ نصلها جامد التسيج ، مائل البشرة . اخضر الصفحة العليا ، بحري السفلي ، ثلاثي السروع الرئيسية || ازهارها صغيرة اللد ، غبراء اللون ، عديدة الالامدية ، سداسية البلات . ازهارها عقديية التجميع ، تاجي الازتكاز . ثمارها عنية لاصقة السطح واللحم . جمع اعضاء الشجرة عطرية تستخرج منها الطيوب والادهان اما لحاء السوق والفروع فتصبر من الافاوية الفاعلة الصنف .

٢١٨٧٣ - قَرْفَة صِيْنِيَّة * ، دَارُصُوِي * ، سِيْجِيْنَة (F). *Cinnamomum obtusifolium*, *C. cassia* (S). *Cannelier casse*, *C. de Chine*, *C. d'Annam*, *C. du Tonkin*, *Laurier casse* (F). *Chinese cinnamon tree*, *Cassia tree* (E). *Kassien Zimmetbaum* (D). *Cinnamo cassia*, *Lauro cassia*, *Cassia lignea* (I).
شجرة زراعية من الافاوية . اصلها فسيحة الارتداء تمتد من الالام الى الصين ويتش حتى ارتفاع ٢٠٠٠ م. من سطح البحر || ساقها منتسبة تمل نحو ١٣ الى ١٧ م . اوراقها ابيدة اهليجية متعاقبة متفكة . نصلها جامد الصفحة ، ثلاثي السروع الرئيسية . لونه الى الخضار البحري || ازهارها صغيرة اللد لونها الى البياض الاخضر



قَرْفَة مَرْتَدِب



قَرْفَة صِيْنِيَّة



قَرْفَة مَلَبَار



قَرْفُول



تَرَقْدَنُ البَلُوط



تَرَقْدَنُ شَالِق



تَرَقْس



تَرَقَا اَبَقَةُ الْكَلْ



تَرَقَا النُّور



تَرَقْ اَزْرَق

شديد الصفر ، متكاثف الحلب ، بطول من ٢ الى ٣ سم. ثوبها الى الكلسية . زباناها مطوكان بالاسود والابيض . ريشانها كبير اللقد ، متكاثفا الخمل || ظهورها الخشنة الجلجلة لا ينقطع طول السنة ، وهي مبالغة في كل مكان من القابات الى المسكن المأهولة || الانثى اكبر قدًا من الذكر . تنجع مكنتها في كل مكان مظلم رطب . ينقث المكان بعد متحه باسويين من بركات مستطيلة ، بسيطة القدم والمخبر ، مستطيلة الاذن ، حليلة الجسد والرأس والشرج || تعيش على المواد النباتية المتحللة حتى الاكمال .

٢١٨٩٥ - قَرَقِيسَةُ الْمَتَوَسِّطِ *

Phlebotomus papatasi (S).
Phlebotome papatasi (F).

حشرة من ذوات الجناحين وفضيلة القرقيسيات . جسمها صغير الحجم ، بطول من ٢ الى ٥ سم . ثوبها الى الصفار الباهت ، خالي القشاد . رأسها مخروطي الشكل . خطها معتدل اللقد ، صدرها بيضي القالب ، بطنها اسطواني . زباناها كثيفا الحلب العقيق . صينها صغيرتان . ريشانها كروان ، مهدبان || تظهر الحشرة الجلجلة من نيسان الى تشرين الثاني . تألف جميع المراتع الرطبة والشلط الرطبة . تسرح في الليل وتختفي في النهار وراء كل شيء لانها تخشى وقع النور || تنجع الانثى مكنتها في كل مكان مظلم رطب ويخت الاختافى والحصارة . ينقث المكان بعد متحه بمدة ارباع من لسويين الى ثلاثة || البقرة مستطيلة ، شبه اسطوانية الشكل ، حليلة الجسد . فراء الاذن ، صمراء الرأس ، وعلوها في مخزها زوج من الحلب الجملد المستطيل . تعيش على المواد النباتية المتحللة حتى الاكمال .

٢١٨٩٦ - قَرَقِيسِيَّاتٌ ، سَكَبَتِيَّاتٌ

Psychodidae (S). *Psychodidae* (F). *Psychodidae* (E). فضيلة سحرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها عديدة جميعها صغيرة اللقد زبد الجسم والرواشن والقرقون الاستعمارية || اشهر اجناسها القرقس .

Loir (F).

٢١٨٩٧ - قَرَقْدَمُون

هو القرقدن ، اطلبه .

٢١٨٩٨ - قَرَقُفٌ ، قَرَقُوبٌ

Parus (S).

Mésange (F). *Tit* (E).

جنس طير من فصيلة القرقفيات انواعه كثيرة العدد اعطاهها العالم . اجناسها صغيرة اللقد . مناقيرها مخروطية الشكل ، جالسة ، قصيرة ، قوية . اجنحتها مخططة اللقد . اذنانها مقطوعة او نازقة . ارسافها صغيرة مسطوية الجلد || تألف القابات والخلات . قوتها الحشرات ويكسبها ورقاتها والوزور البرية والثمار || انثاتها تحضن مرتين في العام ، الاولى في نيسان والثانية في تموز . عدد بيض الحفنة ارباع بين ٦ و ١٦ اما الترسيم فيستمر من ١٤ الى ١٥ يوما . اعرف انواعه واشهرها ما يتبع .

٢١٨٩٩ - قَرَقُفُ الزَّرَق *

Parus coruleus (S).

Mésange bleue, *M. azuree* (F). *Blue titmouse* (E).

نوع من القرقف ، طولها ارباع بين ١١ و ١٢ سم . قوتها جبل الالوان . قة رأسه وجناحاه وذنبه الى الزرقة السنجابية يعلوها في الجناحين تبيج ابيض . ظهوره زرقوني ، بطنه اصفر ، صمراء الى البياض الناصع . طوقه متق اسود اللون ازرق المواج || وهو طائر ابد يالاف الاسراج والخلات والجنان .

والجزر واللينق والكسنة ويبيض المصانير ... || اجناسها اركان ترتيبها بين شقوق الصخور او في صدوع الاشجار . انثاتها تنجع من ٤ الى ٦ ادواس تبصر وتكتفي بعد اسبوع وترضع نحو الشهر || اعرف انواعها ما يلي .

٢١٨٩٩ - قَرَقْدَنُ الْبَلُوط *

Myoxus nitidula (S). *Loir dryade* (F).

نوع من القرقدن ، طولها نحو ١٥ سم . وذنبه ٨ . ظهره اريد اصفر . بطنه ابيض اقبر || موطنه معتدل من البحر الى اربعة . يالاف اسراج السنين لان ركيزة قوته البلوط .

٢١٨٩٧ - قَرَقْدَنُ اَبَقِي

Myoxus elegans (S).

Loir élégant (F).

نوع من القرقدن . موطنه اليابان . طولها نحو ١٥ سم . وذنبه ٤ . ثوبه الى الصبغة الصنابية يميل مع اقترابه من نج النظر . رأسه جزوي المواج ، بطنه وسواي جراسه الى الصفرة || قوته الثار على اشغلهها .

٢١٨٩٨ - قَرَقْدَنُ شَاكِسْ *

Myoxus glis (S). *Loir commun* (F).

نوع من القرقدن . طولها نحو ١٦ سم . وذنبه ١٤ . ظهره الى الصبغة الريداء يعلوها مواج اسود . بطنه وسواي جراسه الى البياض القضي . خداه وصغته واسفل ذنبه بيض . موطنه شبح الاربعاء معتدل من الشرق الى اطراف اربعة . يوجد في لبنان وسورية .

٢١٨٩٩ - قَرَقْدَنِيَّاتٌ ، قَرَقْدَنِيَّاتٌ

Myoxidae (S). *Myoxidae* (F). *Myoxidae* (E).

فضيلة حيوانات لينة قاضة من مرتبة قرقدنات الشوزب ورتبة القواضم . اجناسها ثلاثة القرقدن والزغبة والقرقب . موطنها العالم القديم || اجناسها صغيرة اللقد مستطيلة الشكل والذنب . راسها العليا مخططة ، جراسها قصيرة . جميعها شاجرة تسرح في الليل . قوتها الثار والحشرات . يالها الششوي يلوم نحو ستة اشهر .

٢١٨٩٠ - قَرَقْدَنِيَّاتُ الشُّوزَبِ *

مرتبة حيوانات لينة من رتبة القواضم تشمل خس فصائل القرقدنات والقاربات والمخلديات والجوبيسيات والبريحيات

٢١٨٩١ - قَرَقْدَنُ قَدَرٍ

Puteolus fideus (F).

هو ابن حرس مدن ، اطلبه .

٢١٨٩٢ - قَرَقُفُسٌ

Curcus (F).

هو الدند البري ، اطلبه .

٢١٨٩٣ - قَرَقِيسٌ ، سَكَبَتٌ

Phlebotomus (S).

Phlebotome (F).

جنس حشرات من فصيلة القرقفيات . انواعه عديدة جميعها صغيرة اللقد ، طولها ارباع بين ٢ و ٥ سم . اجناسها ورواشنها وقوتها الاستعمارية حليلة اللقد ، صفراء الاذن ، حليلة المواج . اعطاهها البلاد الحارة . ذكروها تعيش على رصق الاذعار والافرازات السكرية النباتية . انثاتها تحضن اللحم حيثما تستطيع . لسنتها مزجبة يقال انها تنقل الحصى الباردة ربعة حلب .

٢١٨٩٤ - قَرَقِيسَةُ اُرْبِيَّةِ الْفَسْكَسْ *

Psychods phaeinoides (S).

Psychode phalénoide (F).

حشرة من ذوات الجناحين وفضيلة القرقفيات . جسمها

Alcedinidae (5).

٢١٩٠٨ - قُرُفَاتِيَّات

Alcedinidae (F). Alcedinidae (E).

فصيلة طير من الجواثم المتصقات الاصابح تتميز بخصر جرمها وحدة صبرها وسرعة اختطافها. رؤوسها غليظة. اجسامها ريمية منكشحة. منقريها قوية مستطيلة ذلقة. اجنحتها متوسطة القد. اذنانها واربعها قصيرة. الوهاج قزسي الاوان الزاهية || اجنحتها والوهاج عديدة تتجمع الى حمارتين القريات والمزوريات .

Alcedo (5).

٢١٩٠٩ - قُرُفَاتِيَّ ، قَاوَكْد

Martin-pêcheur (F). Pied kingfisher, Ceryle rudis (E).

جنس طير من القريات . انواعه ٣٠ موطنها العالم . ذكره في المناطق الحارة والمعتدلة . تتميز باستطالة منقريها السود . اجنحتها متوسطة القد مستدرة . اذنانها واربعها قصيرة . اثارهاا قزسية الالوان الزاهية الجميلة || وقد قيل فيه : طائر مزوم يهوى باسحق عليه الى قمر الماء طمعاً في ما يمسده ويغض الاخرى حذراً بما يصيبه منه المثل || هو اسزم او احلر من قرق ان رأى خيراً نذل وان رأى شراً تولى || وذلك لانه اذا ابصر في الماء ما يستل يحمله انفض عليه كالسم المرسل فاصرخه من قمر الماء واذا ابصر في البحر كاسراً دخل لير هرأ به بسرعة البتلة. اصرف انواعه واشهرها ما يتبع .

Alcedo cyanotis (5).

٢١٩١٠ - قُرُفَاتِيَّ اَزْرَقْ *

Martin-pêcheur bleuâtre (F).

طائر من القرق . ثوبه الى الزرقه الجميلة اخضرار الموج . منقاره اسيد . ريشه الى الجفوة . موطنه افريقية الغربية . اخلاقه اخلاق القرق الشائع .

Alcedo bengalensis (5).

٢١٩١١ - قُرُفَاتِيَّ بَنْغَالِي

Martin-pêcheur bengalais (F).

طائر من القرق . ثوبه قزسي الالوان الحاررة الجلال . موطنه يمتد من الهند الى اقصى الشرق . ارياشه مزرقه ، ثميته ، مرغوب فيها || اخلاقه اخلاق القرق الشائع .

٢١٩١٢ - قُرُفَاتِيَّ شَالِعْ * ، قَاوَكْد شَالِعْ ، ابي

الرَقَص ، صَلاَب طِيلَه

Alcedo ispida (5). Martin-pêcheur vulgaire (F). Common kingfisher (E).

طائر من القرق . منقاره اسير . رأسه مرطف . ذروه واعل عنقه الى البياض العاجي . حمراره الى الصهبة القاتمة . ظهوره لائزودي . قنقه وبتناحه الى الزرقه اخضرار الموج . صدره وبتله الى الشبه السفاء . ذنبه الى الزرقه المختلفة الموج . ريشه الى الجفوة || موطنه يمتد من الهند الى بلاد فارس والشرق الاوسط واروبه وافريقية الشمالية . يالفت جرف مجاري الماء وصفات الصفاء . قوته الاسماك والفقريات واخترات || اثناء تبيض من ٦ الى ٨ يبيضات تحضنها وسحها من ١٩ الى ٢١ يوما .

Alcedo cristata (5).

٢١٩١٣ - قُرُفَاتِيَّ قَنْبَرَالِي *

Martin-pêcheur huppé (F).

طائر من القرق . ثوبه قزسي الالوان الجميلة . رأسه قزسي الريش . موطنه افريقية الشرقية والشمالية || اخلاقه اخلاق القرق الشائع .

Alcedinini (F).

٢١٩١٤ - قُرُفَاتِيَّات

جماعة طير من القريات تشبه القرق والرفاز وخطب الماء . جميعها صغيرة الجرم ، زاهية الالوان المتراكبة .

٢١٩٠٠ - قُرُفَتِ الْمَقَابِيبِ

Mésange des roseaux (F).

طائر من القريات يدعى سبال ، اطلبه .

٢١٩٠١ - قُرُفَتِ قَنْبَرَالِي *

Parus cristatus (5).

Mésange huppée (F).

نوع من القرق، طوله يراوح بين ١٠ و ١٢ سم . رأسه قنبري الريش الاسود المنق بالاكهيب . ظهوره الى الصهبة الرماد . بطنه الى الصهبة النبراه الصفراء الموج . ذروه اسيد ، عنقه مطوق بالاسود والابيض . حمراره الى البياض الاغبر تملوه رقشة سراه || يالفت احراج الصنوبر .

٢١٩٠٢ - قُرُفَتِ كَبِير *

Parus major (5).

Mésange charbonnière, Mésangère (F). Grest titmouse, Ox-eye (E).

نوع من القرق، طوله يراوح بين ١٢ و ١٥ سم . ثوبه متراكب الالوان . ظهوره الى اخضرار الزرقى يملوه موج اصفر . بطنه الى الصفرة الباهتة يملوه خط قاطب اسود يمتد من طوق العنق الى اوسط البطن . رأسه وعنقه الى السود اللامع ، حمراره وقنقه ببيض ، جتناحه وذنبه الى الزرقه الزرادية . قوامه يفيض الحار || يالفت الحدائق والجنائن والغبابات والافلاك .

٢١٩٠٣ - قُرُفَتَتِه

Fauvette orphée (F).

طائر من الدخال . اطلب دحلة غريبة .

٢١٩٠٤ - قُرُفَاتِيَّات

Paridae (5).

Paridae (F). Paridae (E).

فصيلة طير من الجواثم الغرطيات المتانير ، اجناسها وانواعها كثيرة العدد . اصطناعها العالم . مظهرها غريد . ذكورها واناثها متشابهة . تعيش على الاشجار . قوتها الحشرات ويكتها ويرقاتها والبارد والمزور || تكثر في تجاريف الاشجار وارقاب الصنوبر والابنية للمهجورة . اوكنها كروية الشكل تحيكها بمهارة وتفرشها بالورب والصفوف .

٢١٩٠٥ - قُرُفَتَهَان

Calendula officinale (F).

هو الاذرين الهزني ، اطلبه .

٢١٩٠٦ - قُرُفُور *

Pristipoma stridens (5).

Pristipoma strident (F).

سمكة من الشجرم تنتمي الى فصيلة القزريات . طولها نحو ٥٠ سم . ثوبها الى الكهبة القزسية للمواج . حراشها مبهدة . زانفتها كبيرة . الظهريه مستطيلة شائكة والشرجية فارقة . يكتر وجوده في المنطوق والبحر الاحمر .

٢١٩٠٧ - قُرُفُوس *

Coriscus rostratus (5).

Sublet groin, Sublet, Sublaire (F).

Coriscus rostratus (E).

سمكة بحرية ينزف من فصيلة الككدييات . اصطناعها البحر الابيض المتوسط . مسرهما حشاش المباحد والاغواط || جسمها احليلبي القزوين يطلو من ١٠ الى ١٥ سم . ثوبها الى اخضرار الخجلي الموج يملوه شمشع وردي واصفر . رأسها مخروطي ، ذلق القبط المنفخ . زعنفتها الظهريه مستطيلة تنتهي بمستوى الشرجية . زعنفتها الشالية شبه منطوية || لحمها جيد الصنف مرغوب فيه .



قُرُفَتِ قَنْبَرَالِي



قُرُفَتِ كَبِير



قُرُفُور



قُرُفُوس



قُرُفَاتِيَّ اَزْرَقْ



قُرُفَاتِيَّ شَالِعْ



قُرُفَاتِيَّ قَنْبَرَالِي



قُرْمَة البرازيل



قُرْمِزِيَّة أستراليا




قُرْمِزِيَّة البرتقال البيضاء



قُرْمِزِيَّة البرتقال السوداء



قُرْمِزِيَّة التفاح



قُرْمِزِيَّة الثَوْتُ

الولج . مكثاتها غُمد الصفحة ابيض اللون يحوي من ٦٠٠ الى ٨٠٠ مكثة قُرْمِزِيَّة اللون مُرَامَة الست . لها جيلان في الحول، الاول يستمر من آذار الى تموز والثاني من آب الى شباط || تركيب الحفصيات والورد والبسطة والدار واللوبياء والبطاطا || تكاثر عند نفث مكن الجليل الاول وذلك في خلال شهر نيسان .

٢١٩٢١ - قُرْمِزِيَّة البُرْتُقَالِ الْبَيْضَاء * مُغْفِرِيَّة الْحَفْصِيَّاتِ الدَّقِيقِيَّة ، كُوْشِيْلُ الْبُرْتُقَالِ الْاَيْضِ

Pseudococcus citri, *Dactylopius citri* (S). *Cochanilla blanca de Foranger*, *C. farinosa de Foranger* (F). حشرة من القُرْمِزِيَّات . اثنائها حمراء اللون ، حواء الموج، بيضية الشكل ، منشارية الخمار، تقايط من ٢ الى ٦ م. جسمها منفي بمادة دقيقة بيضاء، مكثاتها يحوي من ٤٠٠ الى ٥٠٠ مكثة صفراء اللون || اسيالها الحولية يراوح بين ٤ و ٥ تركيب الحفصيات والكمية والتين والخرنوب والصبار ... وهي شديدة الاذى تقضي على الاوراق والاغصان والثمار || مكافحتها صعبة تستلزم رعاية خاصة قوامها التطهير بالمخازن السامة . وقد تم الاذابة الحشرات المضادة التي تقضي عليها اغصانها الكريبتولاموس (*Cryptolomus*) .

٢١٩٢٢ - قُرْمِزِيَّة البُرْتُقَالِ السُّودَاء *، مُكْثَكَة البُرْتُقَالِ السُّودَاء ، حَشَرَة قُضْرِيَّة سُودَاء ، كُوْشِيْلُ الْبُرْتُقَالِ السُّودَاء

Aspidiotus azonidum, *Parlatoria ziziphi* (S). *Cochanilla noire de Foranger*, *Aspidiot de Foranger* (F). حشرة من القُرْمِزِيَّات . دروبها مستطيلة الشكل قائمة الزوايا تقايط نحو ١ م. رتة خطوط وتومض نحو ٦ خطوط. قوامها الى السوداء اللامع . مكثاتها مخروطي الشكل يجمع الخمار الابيض يحوي نحو ٣٠ مكثة ريفية الشكل، بنفسجية اللون || اسيالها الحولية من ٢ الى ٣ تركيب الحفصيات دون غيرها وهي لا تقرب الثواب ابدًا في حين ان تسميتها العلمية تشير اليه || تكاثر باستعمال مزيج من الازيت النباتية والبيضاء .

٢١٩٢٣ - قُرْمِزِيَّة التَّفَاح * ، وَغَمَّ حَمَكَارِي ، مُغْفِرِيَّة التَّفَاحِ الْمَدَكَّة ، كُوْشِيْلُ التَّفَاحِ كُرْمِيسِ التَّفَاحِ ، دُسْبُونِ التَّفَاحِ

Lepidosaphes ulmi, *L. ceratoniae*, *Mytilaspis flava*, *M. pomorum*, *Diaspis pomorum* (S). *Cochanilla du pommier*, *C. virgule du pommier*, *Kermès virgule*, *Diaspine du pommier* (F). *Mussal scale* (E). حشرة من القُرْمِزِيَّات فاصلية الشكل ، دقيقة . طويلا من ٣ الى ٤ م. قوامها الى الخشنى الابرص تغسله مادة شمعية بيضاء . مكثاتها يحوي من ٤٠٠ الى ٦٠٠ مكثة حنطية اللون || جبلها الحولي واحد وهي تركيب التفاح والاصاص والخوخ والمشمش والجوز والرزق واللاذيرت والحوذر والصنصنات ... || تكاثر على اثر نفث الممكن وقد يكون ذلك في حزيران .

٢١٩٢٤ - قُرْمِزِيَّة الثَوْتُ * ، مُكْثَكَة الثَوْتُ ، دُسْبُونِ الثَوْتُ

Diaspis pentagona, *Pseudaulacaspis pentagona* (S). *Cochanille du mûrier*, *Diaspine du mûrier* (F). حشرة من القُرْمِزِيَّات . دقها صابية قوامها يراوح من

روسيها خفيفة . مناقيرها حمراء مستطيلة . ارسافها قصيرة . تألف خطوط الجمار وحرف الانهار وصفات البحيرات . قوتها الاسماك والثغريات والحشرات || تكثر في افانيس تحضرها في الاماكن الرطبة المشرقة على مجاري الماء .

٢١٩١٥ - قُرْم * ثَوْتُ كَالْدَبْ غُلْفًا وَيُضَاعُ يَنْتِثُ فِي جَوْثِ الْبَحْرِ (السان) .

٢١٩١٦ - قُرْم * الْفَحْلُ الْكُرْمِجُ مِنْ الْاِبِلِ الَّذِي تَرَكُ الْفَحْلَةُ لِيَمْسَ حَبْلَ وَلَمْ يَحْمِلْ عَلَيْهِ || وَيُقَالُ السِّيدُ الْعَظِيمُ عَلَى التَّشْبِيهِ بِالْفَحْلِ . قَالَ التَّنْبِي : وَلَكِنَّا نَذْهَبُ مَسْلُكَ قُرْمًا تَرَاجَمْتَ الْقُرُومُ لَهُ حَقَاقًا

٢١٩١٧ - قُرْمَاط * *Curimatus* (S). *Curimatus* (F). *Curimatus* (E).

جنس اسماك بُرْمِيَّة مِنْ مَعْتَرِجَاتِ الْحَفَاةِ وَفَصِيلَةِ السُّلْمُونِيَّاتِ .
انواعها المعروفة لا تتجاوز عشرة . اصلها المياه السطحية
الامريكية انحصار امريكا الجنوبية || اجسامها اهلبيجية
الشكل ، مستطيلة القد . تتميز باغصانها الحادة الاطراف
الدورة للقاذبة وبفكوكها الخالية من الاسنان || الثور
انواعها قُرْمَاطَة البرازيل .

٢١٩١٨ - قُرْمَاطَة الْبِرَاذِيل * *Curimatus laticeps* (S). *Curimatus à large tête*, *C. du Brésil* (F). *Curimatus laticeps* (E).

نوع من القُرْمَاط . مبدؤها انهر البرازيل وبحيراته وقد
شاعت تربيتها في اكثر سماءك العالم لانها سرورية ،
قليلة التسلطيات ، جيدة اللحم || جسمها اهلبيجي الشرن
يطول نحو ٣ م. رأسها مخروطي الشكل ، مستعرض
القاعدة . قوامها الى انضمار القضي يدين مع اقترابه من
شبح الظفر ويبدو عند البطن . زعنفتها الظهرية واحدة
شبه شراعية الشكل يقيمها في مؤخر الظهر جذعة فضرفية .
زعنفتها الشريفة تقابل الجذعة . زعنفتها الذيلية فارقة ||
لحمها جيد الصنوف مغلوب فيه .

٢١٩١٩ - قُرْمِزِيَّة ، مُغْفِرِيَّة ، حَشَرَة قُضْرِيَّة ، مُكْثَكَة الثَبَات ، كُرْمِيس ، كُوْشِيْل ، مُغْفِرِيَّة الثَبَاتِ ، كُرْمِيس ، كُوْشِيْل

Cochanilla, *Kermès*, *Céroplase* (F). *Cochineal*, *Kermès* (E).

اسم شامل يطلق على مختلف انواع القُرْمِزِيَّة والمغفريه
وحشرات صغيرة القد تقضي الى فصيلة المغفريات . تركيب
الاغصان المشرفة ويغمرها من الثباتات الزراعية والحرجية
تقوينا وتوقع بها الاصفرار || اعرف انواعها المؤذية
ما يلي .

٢١٩٢٠ - قُرْمِزِيَّة أستراليا * ، كُوْشِيْل أستراليا ، لِيْسَقَار

Icerya purchasi, *Pericarya purchasi* (S). *Cochanilla australienne*, *Icerya* (F).

حشرة من القُرْمِزِيَّات طول الاكثر فيها يراوح بين ١ و ٢ م. ثوبه الى الحمرة، جناحها الى البياض الشفاف .
الانثى تقايط من ٤ الى ٥ م. ومكثاتها يطول من ٣ الى ٤ م. جسمها وردي اللون تغشاها خيوط زغبية شمعية فضية

٢ م. وتصل إلى ٢ م. وأربعة خطوط. ثوبها إلى البياض الأخير. الذكر يطول نحو ١ م. وخسة خطوط وهو يتغاليق اللون، وشفاف الجناح. سريع الحركة. الأنثى مستعرضة الشكل، صفراء اللون. أجيالها الحولية ثلاثة، مكثها أصفر اللون تمتد على السوق والأضراس والأفنان ابتداء من أواخر نيسان فينتفج ابتداء من أواخر أيار || تركيب الثوب والذوائب والفرش والفرز والكشمش والياعين والصفصاف || تكاثف باستعمال الحشرات المضادة أو بعض الحواشير الفعالة أعصها الملوأكين الشفوية كالزيت النباتية المركزة بمعدل ٢٪.

٢١٩٢٩ - قرمزية الصبار ، كوشيل الصبار
Disaspis echinocacti (S). Cochenille des cactées (F).
حشرة من القرمزيات. درفها صابجية الشكل قطرها نحو ٢ م. أناتها مستعرضة، مبطلة، ثوبها إلى الخضرة السمرام. أجيالها الحولية ثلاثة. تركيب نباتات الصبار على اختلاف أجناسها وأنواعها || تكاثف باستعمال أسد الحواشير الفعالة حل حدة دلمات متتالية فترتها تراوح من ١٥ إلى ١٢ يومًا.

٢١٩٣٠ - قرمزية القرونوس
Eulecanium corni (S). Lecanium du cornouiller, Cochenille du cornouiller (F).
حشرة صغيرة من القرمزيات. أناتها بيضية الشكل مبطلة، تطول نحو ٦ م. وتعرض ٤ م. ثوبها إلى الجلالة الالامسة. زيانها سباحية الفواصل. مكثها بحوي من ١٥٠٠ إلى ٣٠٠٠ مكثة تنقف بعد معتها باسويين إذا كان ذلك في حزيران أو في تموز || وهي من الحشرات البهجة المؤذية. تركيب القرونوس والكريمة والخوخ والذرائق والجوز والبندق والورد والسديان واللبية. تصطب الانواع وتصيب الآثار وتسبب البثان || تكاثف في الشتاء باستعمال سائل الكريوتيل المركز من ٤ إلى ٥ ٪ وتكاثف في الصيف من تموز إلى آب باستعمال مركبات الباراثيون أو أسد الحواشير الفعالة أو الزيتية البيضاء المركزة من ١ إلى ٢ ٪ حل إن يتجه النضج من أسفل إلى أعلى ليم جميع صفحات الأوراق السفلى.

٢١٩٣١ - قرمزية الكرم القبراء ، كوشيل الكرم القبراء
Hellecococcus hysrix, Phenacoccus hysrix (S). Cochenille farineuse de la vigne (F).
حشرة من القرمزيات. طيلها نحو ٤ م. ثوبها وردي. زفها الشمعي يلحف الظهور دون سواء. مكثها شمعي بحوي من ٤٠ إلى ٦٠ مكثة ريفية الشكل حراء اللون. أجيالها الحولية ثلاثة. تركيب الكرم والغلب.

٢١٩٣٢ - قرمزية الكرمسة البيضاء ، دمة
Dactylopius vitis (S).
Cochenille blanche de la vigne (F).
حشرة من القرمزيات. جسمها بيضي مفلطح. ذكرها مجنح يطول نحو ١ م. لونه إلى الصفرة. أناتها عديدة الجناح، تطول نحو ٤ م. ثوبها إلى الجلالة الصفراء. تقرز مادة شمعية بياض اللون تنفثها بكاملها. تمتع مكثها على صفحة النصل السفلي في خلال حزيران فينتفج من رقات همة تحمص حصاره الأوراق ولا تنف من الثوب. ثم تقضي بياتها الشتوي في شقوق غلاف الجلود ويصد انتشارها الجلود في التربة || تكاثف يكشط الحاء القديمة البايبة وبطرس الجلود بماء الكلور أو بسائل سلفات ألحميد المحلول ١٠٪.

٢١٩٣٣ - قرمزية الكرمسة الحمراء ، قرمزية الكرمسة الطوطية ، كوشيل طوطي
Pulvinaria vitis (S). Cochenille floconneuse de la vigne, C. rouge de la vigne (F). Grape scale (E). Wollige Rebschildlaus (D).
حشرة من القرمزيات. درفها بيضية الشكل تطول من ٤ إلى

٢ م. وتصل إلى ٢ م. وأربعة خطوط. ثوبها إلى البياض الأخير. الذكر يطول نحو ١ م. وخسة خطوط وهو يتغاليق اللون، وشفاف الجناح. سريع الحركة. الأنثى مستعرضة الشكل، صفراء اللون. أجيالها الحولية ثلاثة، مكثها أصفر اللون تمتد على السوق والأضراس والأفنان ابتداء من أواخر نيسان فينتفج ابتداء من أواخر أيار || تركيب الثوب والذوائب والفرش والفرز والكشمش والياعين والصفصاف || تكاثف باستعمال الحشرات المضادة أو بعض الحواشير الفعالة أعصها الملوأكين الشفوية كالزيت النباتية المركزة بمعدل ٢٪.

٢١٩٢٥ - قرمزية الحمضيات ، وعف الحمضيات ، وعف أزجواني

Lepidosaphes citricola, L. pinnaeformis (S). Cochenille virgule des oranges (F).
حشرة من القرمزيات. درفها مبدية الشكل ثوبها إلى السمر. حصارها أخضر، وغلانها شمعي للمادة خلي التركيب. طيلها يراوح من ٢ م. وخسة خطوط إلى ٤ م. وخسة خطوط. عرضها نحو ٢ م. مكثها مستطيل الحراب بحوي من ٣٠٠ إلى ٤٠٠ مكثة وشعية الشكل حطية اللون. أجيالها الحولية تراوح من ثلاثة إلى أربعة. تركيب أوراق الأفنان وثمار الحمضيات أعصها البرتقال واليوسفي وليوسون الجنة || تكاثف باستعمال الفنازات السامة لأن الحواشير والزيت البيضاء لا تقضي عليها تمامًا فطرًا لكثرة وجودها على صفحات الأوراق العليا.

٢١٩٢٦ - قرمزية الخرنوب ، كوشيل الخرنوب
Chionaspis ceratoniae (S).
Cochenille du caroubier (F).

حشرة من القرمزيات، أجاجية الشكل مفلطحة. الذكر حاجي اللون طوله نحو ١ م. الأنثى يتغاليق اللون تطول نحو ٣ م. || يقال إن جيلها الحولي واحد، تركيب أوراق الخرنوب والذوائب والزيت || تكاثف باستعمال الزيت النباتية والبيضاء.

٢١٩٢٧ - قرمزية الزيتون السوداء ، قنبودة الزيتون المخططة ، كرميس الزيتون
Saissetia oleae, Lecanium oleae (S). Cochenille noire de l'olivier, Lécaine de l'olivier, Kermès de l'olivier (F).

حشرة من القرمزيات. درفها بيضية الشكل تطول من ٣ إلى ٤ م. وتعرض من ٢ إلى ٣ ثوبها إلى السمره الشمعية. مكثها مكثور الشكل بحوي من ١٥٠٠ إلى ١٦٠٠ مكثة ريفية، حطية اللون || جيلها الحولي واحد. تمتع مكثها ابتداء من أيار ويستم إلى أواخر تموز. أما القنف فينتفج بعد المتع بنحو ثلاثة أسابيع || تركيب الزيتون والحمضيات والذوائب واليوسون... تسبب البثان الاسود بالإضافة إلى أضرارها || تكاثف باستعمال الحشرات المضادة أو الزيتية الشفوية البيضاء أو الحواشير الفعالة الصيفية.

٢١٩٢٨ - قرمزية السديان ، كرميس السديان
Lecanium ilicis (S).
Cochenille du chêne vert, Lécaine du chêne vert, Kermès du chêne (F).
حشرة من القرمزيات. درفها مستديرة. سواد القرمس صفراء الجسم، مرققة الحمار تحوي مادة شمعية لزجة،



قرمزية الحمضيات



قرمزية الخرنوب



قرمزية الزيتون السوداء



قرمزية الكرم القبراء



قرمزية الكرمسة البيضاء



قرمزية الكرمسة الحمراء

باستعمال اسد الحواشير الفعالة موزعاً بالزيت الابيض .
وقد تجري المكافئة حل عدة مرات ابتداء من زين القملة .

٢١٩٣٨ - قزمية لوزية * ، مفترسة صيدية

Lepidosaphes gloweri (S). Serpentes (F).
حشرة من القزميات . مقسية الشكل سمراء الثوب طولها يتوسط من ٣ سم . الى ٣ م . وخمسة خطوط ، بينها عرضها من خطين الى ثلاثة خطوط غشاء بطنها شمعي المادة ، نحيل النسيج ، ابيض اللون . مكنتها بجوي نحو ٢٠٠ مكنة رنية الشكل ، وردية اللون || ابيها الحولية ثلاثة . تركيب اوراق الحشويات ولكنكالية . تكاليف مكافئة قزمية الحشويات .

٢١٩٣٩ - قزميات ، مفترسات ، كرميات

Coccidae (S). *Coccidae* (F). *Coccidae*, Scale insects (E). *Schildläuse* (D).
نصيلة حشرات من رنية متجانسات الانجته . اجناسها وانواعها كثيرة الاعداد جميعها صغيرة الله . مزدوجة الشكل ، لا نظامية التناسل منها البيوضة والبيضة والسرودة || ذكورها مستطيلة الشكل مجنسة . اجناسها شائعة ، ثنائية المروك القاطبة . اناتها عادمة الجناح ، مستعرضة مبطلة ، وروسيه وجوانها متدخية ، متاكها ثالثة ماسة . قوائمها قصيرة ، ارجلها وصيدة المقلعة ، مقاطها فردية ، مدبية . اغشية اجسادها هذبة . تغرز بقض المواد ابراقية كالشمع والشمع واللغن والخرير وما اشبه || اشهر اقسامها القرمز والخلعير .

٢١٩٤٠ - قزميل

Chamaenx (F). *Camels* (F).
الابل الصغار الكثيرة الاورار ذات السنتين .

٢١٩٤١ - قزمكة

Capselle (F).
ليات شبي بري يلقى كيس الرائي . اطبله . ج . قزل .

٢١٩٤٢ - قزمود

Tragelaphus selousi (S).
Tragelaphe de Selous (F). *Sitatunga* (E).
نوع من الجبل قدمه قدر الملب . ثوبه اشبه اصغر يطلو تجلج وتيج || يألف المنافع ويقيم كئامه بقرها . ج . قرايمد . والاني قزمية .

٢١٩٤٣ - قزموس ، أحموس

Nid en terre (F). *أحموس* (F).
Nest in land (E).
وكر الطائر حيث يلصق في الارض .

٢١٩٤٤ - قزموط ، سلور النيل

Clarias anguillaris (S). *Clarias commun*, C. du Nil (F). *Common catfish* (E).
نوع من السلور يكثر ويتجدد في النيل وهو قريب الشبه بالكنكليس الا انه مفلطح الرأس . طوله نحو ٦٠ سم . ثوبه الى السمرة الزيتية يطلو موج اعضر || لحمه حادي الصنف والمذاق .

٢١٩٤٥ - قزميدكة

Bouquetin femelle (F).
She ibex (E).
هي انثى الويل . ج . قرايمد .

٢١٩٤٦ - قزميدكة

Tulle (F). *Tile* (E).
نصينة من الصلصال الجاهد او المستن المشوي .

٢١٩٤٧ - قرن

Accouplement, *Accouplement*, *Attelage* (F). *Coupling*, *Harnessing*, *Yoking* (E).
هو شد او ربط البهائم السموت او كبير ...

٥ م . وتعرض من ٣ الى ٤ م . ثوبها الى السمرة اللعابية . مكنتها كبير اللد طولي المادة اللعابية البيضاء يموي من ١٥٠٠ الى ٢٠٠٠ مكنة رنية الشكل ، سمراء اللون ، جزوية المواج || جيلها الحولي واحد . تنجح مكنتها من اواخر ايار الى اواخر تموز فيقتف في تموز وكب . تركيب الكرية والبيضة والملت . تكاليف كثيرها من القزميات باستعمال اسد الحواشير الفعالة .

٢١٩٤٨ - قزمية اللوز * ، كوشيل اللوز

Lecanium amygdali (S). *Cochenille de l'amygdalier*, *Lécane de l'amandier* (F).
حشرة من القزميات . مستدرة الشكل قطرها نحو ١ م . وخمسة خطوط . ثوبها الى الرمادي . افرازها لزج اسمر . مكنتها مركزي ، احمل اللون ، يموي نحو ٢٠٠ مكنة وشعية الشكل ، حطيلة اللون || جيلها الحولي واحد . تركيب اثنان واوراق جميع الاشجار الوردية انحصا اللوز . تكاليف في الشتاء باستعمال مزيج من الزيت الابيض والنيابي المركز بمعدل ٢٪ .

٢١٩٤٩ - قزمية النخيل * ، وكمة النخيل ، كوشيل النخيل

Parlotes blanchardi, *Websteriella blanchardi* (S). *Cochenille du dattier* (F).
حشرة من القزميات . احطائها تشمل نخيل العالم . اذكر دقيق نخيل ابيض اللون يطول نحو ١ م . الاثني بنفسية اللون ريمية الشكل تطول نحو ١ م وثلاثة خطوط . رديتها سمراء اللون يحوطها حمار من الرطب شمعي المادة احمل اللون . مكنتها يموي من ٤٠ الى ٨٠ مكنة كروية الشكل وردية اللون || ابيها الحولية ثلاثة او اربعة . تركيب عموم النخيل نثوية اشه الاثني || تكاليف باستعمال الزيت النباتية او بعض الحواشير الفعالة الجبرية .

٢١٩٥٠ - قزمية الورد * ، ديسوس الورد ، قملة الورد ، كرميس الورد ، كوشيل الورد

Dispis rosae, *Aulacaspis rosae* (S). *Cochenille du rosier*, *Diapsina du rosier*, *Kermès du rosier*, *Pou du rosier* (F).
حشرة من القزميات . رديتها صاجية الشكل قطرها يراوح من ٢ الى ٣ م . ثوبها الى الجوزة حنايا ابيض . اذكر خري اللون . ابيض الجناح ، يطول نحو ١ م . الاثني مستطيلة الشكل حمراء اللون . مكنتها جراب مستعرض يموي نحو ١٠٠ مكنة رنية الشكل خرية اللون || جيلها الحولي واحد . تركيب الوردة والشمج . تكاليف باستعمال الزيت البيضاء موزجة بالزيت النباتية بمعدل ١٥ ٪ .

٢١٩٥١ - قزمية فتاككة * ، قملة سكان جوزة ، كوشيل سكان جوزة

Aonidiella perniciosus, *Aspidiotus perniciosus*, *Quadrasipterus perniciosus* (S). *Pou de San José*, *Cochenille de San José* (F).
حشرة من القزميات . رديتها صاجية الشكل قطرها نحو ٢ م . ثوبها الى الرمادي الاسمر تملو رقة بيضاء . الاثني سرودة سمراء اللون ، حطيلة المواج تنقص بطرف سنة اسابع ما قدره ٤٠٠ رقة || ابيها الحولية تراوح من ٣ الى ٤ تركيب التناع والواجص والدرائن والخرق والمشمش والكروز والصربة والقرونس والوردية ... || تتمركز حل سوق ولعاصن يروع النبات حيث تمص النسج || تكاليف



قزمية اللوز




قزمية النخيل



قزمية الورد



قزمية فتاككة



قزمية لوزية



قزمود

حيات سامة من فصيلة الانعام لها نتوان صغيران في رأسها كأنها قرنان . أنواطها اربعة جميعها خفيفة تسرح في الليل . موطنها الصحاري من مراکش الى جنوب الهند . تكثر في تونس وليبيا ومصر والجزيرة العربية حيث تنسج في الرمل لذاذا مر بها احد لدنته || أنواطها : ابن قرة ، حارية ، قرنا مصرية ، قصرى .

٢١٩٥٦ - قُرْبَى **لُوتِر**
Locier cultivé (F).
هو اصابع العرس ، راجسه .

٢١٩٥٧ - قُرْبَى **كَبْرِي**
Capricorne, Longicorne (F).
Longicorn, Long horned beetle (E).
جنس حشرات من فصيلة القرنبيات . انواعه كثيرة العدد تتميز باجسامها الكبيرة القدح الهديبة الظهور وبجرامها وقربها الاستثنائية المستطيلة . قال الاخطل يصف جارية ويعلها :

الا يا عباد الله قلبي ميم
ياحسن من صل واتجهم بعل
ينام اذا نامت حل عكناها
ويلم فساءاً كالسلالة او اسل
يلدب الى اسنانها كلى ليلة
ديبب القرني بات يملو نقاً سهلا

٢١٩٥٨ - قُرْبَى **الدَّب** *
Xystrocera globosa (S). Xystrocera globuleux (F).
حشرة من القرنبيات . رنية الشكل . عجيبة الظهر . طولها نحو ٢٢ سم . ثوبا الى البني تشوبه حرة قائمة واخايد خضر تملو الاغاد || يرقاتها تركب الدلب والسنت والقيح فتتشر السوق وتعلها .

٢١٩٥٩ - قُرْبَى **السنديان** * ، قُرْبَى **كبيرة**
Cerambyx cerdo (S). Capricorne (le grand). Capricorne du chêne (F). Great capricorn beetle (E). Grosser Eichenbock (D).
حشرة من القرنبيات . طولها نحو ٥ سم . ثوبا الى السمرة ، ماجتها خطية لامة . زباناها مستطيلة . تصرح عند الغروب || يرقاتها كبيرة القدح تعيش اربع سنوات داخل السرايد التي تحفرها في خشب السنديان .

٢١٩٦٠ - قُرْبَى **الصنصاف** * ، **لامية**
الصنصاف
Lamia textor (S).
Lamie des saules (F).

حشرة من القرنبيات طولها نحو ٢٧ سم . ثوبا الى السواد اللبسي || يرقاتها نحيلة القدح تركب جدود وسوق الصنصاف وأخود قندسها وتعلها .

٢١٩٦١ - قُرْبَى **صغيرة** *
Cerambyx scopolii (S). Capricorne (le petit) (F). Capricorn beetle (E). Buchenbock (D).
حشرة من القرنبيات طولها نحو ٢٢ سم . ثوبا الى السمرة الداكنة . تعيش حل ازهار الفروديات والغيصيات والبساتين . تسرح في النهار || يرقاتها تركب سوق الاشجار الحرجية ولا تمت عن الاشجار للشمرة اعصها التفاح والكرز والتين .

٢١٩٦٢ - قُرْبَى **مِسْكِيَّة**
Aromie musquée
هي الاروية المسكية ، اطلها .

٢١٩٤٨ - قُرْن هو السطة ، اطلها .

٢١٩٤٩ - قُرْن
Corne (F). Horn (E).
ج قرن . والقرن بوارز قاسية خضلفة الاجسام والاشكال تنشا حل رؤوس بعض الحيوالات كالبقر والتمم والظلياء والماعز وغيرها ...

٢١٩٥٠ - قُرْن **إِسْكِيْشْكَاري** ، **زُبَانِي** ، **زُبَانِي**
Antenna (F). Antenna (E).

عضو مفصل متحرك شكله كالقرن يكون في رأس الحشرات وبعض الحيوالات الدنيا . وما قرنان وزبانيان تستعملها الحشرات للمس كما في الجراد او القمل كما في الذباب او التسع كما في اليموس او لتضام كما في النمل || والقرن الاستثنائية عديدة الاشكال خضلفة الاجسام والتركيب وقد وضع لكل شكل منها كلمة تعريف خاصة . أشهرها :

أرسي
Aristée (F). Aristata (E).
عيطي
Filliforme (F). Filliform (E).
رأسي
Capitulée (F). Capitata (E).
رأسي
Pennée (F). Pinnata (E).
شوكي
Sétacée (F). Setaeous (E).
صيني
Lamellée (F). Lamellar, Scaly (E).
صولياني ، صقي
Calviforme (F). Calviform (E).
قلادي ، سبيحي
Moniliforme (F). Moniliform (E).
غزاري
Stylée (F). Stylata (E).
مرفقي
Coudée (F). Bent (E).
مشطي ، عالي
Pectinée (F). Pectinata (E).
مشطي مزدوج
Bipectinée (F). Bipectinata (E).
منشاري
Serrulée (F). Serrate (E).

٢١٩٥١ - قُرْن **الأرّوس**
Platycerium bifurcatum (S). Platycerium à cornes d'élan (F). Common staghorn fern, Elk's horn fern (E). Gewelhfarn (D). Aldorne (I).

نبات عشبي يساهي بمعر من السرخسيات يزرع للزينة . أوراته قرصية الانتشاب ، فستقية اللون ، حنطية الفلح ، منشعية كقرون الاروس .

٢١٩٥٢ - قُرْن **الأيل**
Coronopa (F).
هو لسان الحمل القرني ، اطلها .

٢١٩٥٣ - قُرْن **الغزال**
Locier corniculé (F).
هو القوس القرني ، اطلها .

٢١٩٥٤ - قُرْن **أ**
Ceratoccephalus (S).
Cératocéphale (F).

جنس نباتات شجيرة ، حولية ، برية من فصيلة الشقيقيات . انواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها جبال البلاد المحتلة الحارة من الشرق الاذن || سوقها قصيرة فراء . اوراقها متعاقبة . معنقة . كفية ، مفروسة وبشيرة . انشاها صغيرة صفراء اللون ، خامسة التركيب ، قليلة الاسدية ، مشرقة . يحرسها النمل || تنويعها ديمي || أشهر انواعها القراء المبجلة والمنحيلة .

٢١٩٥٥ - قُرْن **أ** ، **حريش**
Ceratost (S).
Céraste (F). Ceraste, Horned viper (E).

ويدهونها مرققة وذات القرنين وذات الزبطين . جنس



قردوط



قرنا



قُرْبَى الدلب



قُرْبَى السنديان



قُرْبَى الصنصاف



قُرْبَى صغيرة

٢١٩٦٣ - قَرْنُفَلَاتٌ ، زُهَقُفَلَاتٌ

Carambycidae (S). Carambycidae, Capricornes, Longicornes (F). Carambycidae, Longicornes, Longhorned beetles (E). Bockkäfer (D).

فصيلة حشرات من رتبة غدييات المنحاج. حمارياتها واجنتها وانوارها نحو ٢٠ ألف. اجسامها مستطيلة، اشكالها مختلفة، اطولها تمتد من ١٠ الى ٨٠ سم. اثنائها غديية الالوان. قرونها الاستشعارية خيطية مركبة من ١١ فاصلة وهي في الذكر اطول ما هي عليه في الاناث. ارساها خاصة اما تيمر كاتها رباعية لان خالصها صغير القد لاسي الاوتكاز. غالبا حادة. تطير في الليل او في النهار. قوتها الازهار وجميع المواد النباتية. جيلها يمتد من سنتين الى اربع سنوات. مكنتها لانياسي الشكل، اصفر اللون، تجمعه الانثى في لحاء النبات او تحت قشورها او ترز في الثرة قرب الجلود || رقاتها مردنية الشكل، غليظة الروس والمنطقة الصدرية، تحية الاطراف والمنطقة الشرجية. قوتها المواد الخفيفة والخشبية، تسردب الانفاد والفرور والمقصون والسوق والجفوع والجذور. حورياتها تتلصق بفخاوة خشنة تصنعها من فضات الخشب المصين بالوراك في آخر سرداب سفرتة عند آخر الانسلاخ.

٢١٩٦٤ - قَرْنُفِلَيْطٌ ، قَرْنُفِلَيْطٌ

Brassica oleracea botrytis (S). Chou-fleur (F). Cauliflower (E). Blumenkohl (D). Cavolfiore, Cavolflore (I).

بقلة زراعية حولية شائعة الاستعمال من فصيلة الميليبيات. ترغب في الارابة المسفونة التركيب الحكسي، للمنتلة الاندماج والميعة الفور، القنية بالمواد الازوتية والنضوية. تتكاثر بالبزور. تنقل التفتول من الاكواد الى المستقل عند بله لشرة المادة البقية وتقرس حل ابعاد ترواح من ٦٠ الى ٧٠ سم.

٢١٩٦٥ - قَرْنُفَلٌ

Coriandrum (F). Coriandrum (E). حجير من الالوين الصوف وهو اصلب الاجسام بمعد الناس. انواعه عديدة منها الحجارة الكريمة كالسفير. كسره يستعمل في صيغ المادان.

٢١٩٦٦ - قَرْنُفَلُكَ

Mus des oiseaux de proie (F). Moulting (E).

الفرقة زين تحير الريش عند الجوارح.

٢١٩٦٧ - قَرْنُفَلٌ

Dianthus (S). Œillet (F). Pink (E). Nelke, Sommernelke (D). Garofano (I). جلس نباتات شبيهة بممر من فصيلة القرنفليات. انواعه ابرية والزراعية نحو ٨٠٠ اما ضروبه المشهورة فزهاء ٥٠٠ جميعها زراعية تزيينية. سوقها عقدية فراء. اوراقها حاشية متقابلة. نصلها سنائي الشكل ثخين الازتكاز، البحرية اللون. ازهارها جميلة الشكل، تاجية الازتكاز، مختلفة التجميع والالوان، عطرية العرف الفواح. بزورها صلبة القد، مستديرة الشكل، رقيقة الجرم، صمره اللون || يتكاثر بالبزور والمقل. يرغب في الارابة المتوسطة الاندماج والظروية الغنية بالمواد النضوية والملمسوة العناصر المعدنية || اشهر انواعه الرئيسية ما يتبع.

٢١٩٦٨ - قَرْنُفَلُ احْمَرٍ زَهَّافِيٍّ

Dianthus cinnabarinus (S). Œillet rouge cinabre (F). نوع من القرنفل مهدد اليونان، ساقه فراء تملو من ٣٠

الى ٤٠ سم. اوراقه شديدة الخضار، خالصة العروق. ازهاره الى الحسرة الزهفرية، كاسها تطلو نحو ٣٥ سم. وقطر تلاتها ايضا || ازهاره يستمر من تموز الى آب.

٢١٩٦٩ - قَرْنُفَلُ اُرْصِيرِيَّةٍ

Dianthus armeria (S). Œillet velu, O. armeria (F). Armeria pink, Deptford pink (E). Rauhe Nelke (D). Armeria, Garofano peloso, Viola da lepre (I).

نوع من القرنفل ضروبه وهاله عديدة، سوقها فراء خلية تملو من ٢٠ الى ٣٥ سم. اوراقها الجليضة مستطيلة. اوراق سوقها وفروها اقصر من سلاحياتها، نصلها ثلاثية العروق، بحرية اللون. ازهارها صغيرة القد، وديدة، ملونة الزرقاء || يرغب، مع سائر ضروبه، في الارابة الرملية. ازهاره يستمر من حزيران الى ايلول.

٢١٩٧٠ - قَرْنُفَلُ اُزْرَقٍ

Dianthus caesius, D. gratianopolitanus (S). Œillet bleuët (F).

نوع من القرنفل ساقه فراء مسطحة. اوراقه قصيرة بحرية اللون، نصلها سنن الخلفة، ثلاثي العروق. ازهاره عطرية العرف، تلاتها وديدة اللون، مسنة الخبار الحاربي، قلوها يتفرج من ٢٠ الى ٢٥ سم. || ازهاره يستمر من ايار الى تموز.

٢١٩٧١ - قَرْنُفَلُ اسْفَقٍ

Dianthus ferrugineus (S). Œillet ferrugineux (F).

نوع من القرنفل مهدد ايطاليا. ساقه منتصبه فراء تملو من ٣٠ الى ٤٠ سم. اوراقه الجليضة ضيقة. اوراقه الساقية والفرعية اقصر من السلاحيات، نصلها حلق اللفسار البحري || ازهاره صغيرة القد، تلاتها ثنائية التفصيص، ثلاثية السنين، صفر الصفحات الحاربية، صمر الناخلية، مسع المواج || ازهاره يستمر من تموز الى ايلول.

٢١٩٧٢ - قَرْنُفَلُ البَلْقَانِ ، قَرْنُفَلُ بَتْسِيَمِيٍّ

Dianthus Pancici (S). Œillet de Pancic (F).

نوع من القرنفل مهدد البلقان. ساقه فراء تملو من ٣٠ الى ٤٠ سم. اوراقه خيطية، ضيقة، نصلها مالمش البشرة، صميك الصفحة، بحري اللون. ازهاره صغيرة القد، مستطيلة الكأس، ارجوانية اللون، صمر المواج. ازهاره يستمر من حزيران الى آب.

٢١٩٧٣ - قَرْنُفَلُ الرِّمَالِ

Dianthus arenarius (S). Œillet des sables (F).

نوع من القرنفل منته اليرال. ساقه قليلة الفروع تملو من ٢٠ الى ٤٥ سم. اوراقه قصيرة النصل الضيق الاخضر. ازهاره فردية التجميع، متوسطة القد، تلاتها الى البياض الناصع تملو شمة وسطى خضراء || ازهاره يستمر من حزيران الى آب.

٢١٩٧٤ - قَرْنُفَلُ الزَّهَّارِينَ

Dianthus caryophyllus (S). Œillet des fleuristes, O. flamand, O. remontant, O. perpétuel, O. fantaisie (F). Carnation, Glove pink, Picotee (E). Gartennelke, Gartennelken gefüllte, Nelke (D). Garofano dei fioristi, G. scempio (I).

نوع من القرنفل الزهري المشهور. ضروبه واسمره كثيرة العدد. سوقها فراء. اوراقها بحرية، نصلها جامد الصفحة. ازهارها مكعبة، فواحة العرف العطر،



قَرْنُفَلٌ



قَرْنُفَلٌ احْمَرٌ زَهَّافِيٍّ



قَرْنُفَلٌ اُرْصِيرِيَّةٍ



قَرْنُفَلٌ اَزْهَارِيٍّ

٢١٩٨١ - قرنفل صيني *

Dianthus chinensis (S). *Œillet de Chine*, O. régence (F). *China pink*, *Indian pink* (E). *Chinesische Nelke*, *Indisches Niglein* (D). *Garofano della Cina*, *G. della reggenza* (I).

نوع من القرنفل المحول. مهد الصين. ضروب عديدة سيقا فراء تملو من ٢٠ إلى ٤٠ سم. أوراقها مستطيلة تعرض نحو ٢ سم. نصلها شديدة الخضار البحري. أزهارها بسيطة أو مكبسة، بتلاتها مهدبة الخمار. ألوانها مختلفة منها السوية والبهاء والموشة والمروشة || أزهارها يستمر طوال الصيف.

٢١٩٨٢ - قرنفل منقصب

Dianthus strictus (S). *Œillet dressé* (F).

نوع من القرنفل فراء منتصب، قليلة النمو، مستطيلة السلائط النحيلة، تملو من ١٥ إلى ٢٥ سم. أوراقها ضيقة النصل، بحرية اللين. أزهار فردية أو ثنائية التجميع، مستطيلة المائل، خاتمة العرف. بتلاتها بيضاء اللين متصلة الانتساب مقرصة الأطراف. أزهارها يستمر من حزيران إلى تموز.

٢١٩٨٣ - قرنفليات

Caryophyllaceae (S). *Caryophyllées*, *Caryophyllées*, *Dianthées* (F). *Caryophyllaceae* (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة القنالات. اجناسها وأنواعها كثيرة العدد تجسمها ثلاثة أسباط: السيلانيات والفلقيات والنخنيات. جميعها عشبية، معظمها معمر وبعضها محول وسوي. ومنها أيضاً البرية والبطية والصناعية والقرينية.

٢١٩٨٤ - قرنفل *

Eugenia aromatica, *E. caryophyllata*, *Caryophyllus aromaticus* (S). *Groffier*, *Géroffier* (F). *Clove tree* (E). *Gewürznelken* (D). *Garofano*, *G. aromatico*, *Eugenia aromatica*, *E. coriifolia*, *Chiodo flore* (I). جنبة معمرة من فصيلة الآسيات. مهدا البلاد الحارة ساكها وأغصانها سوسة. أوراقها متعابلة، نصلها جامدة، وريشة العروق. أزهارها صغيرة القد، كروية رباعية التخصيص، بتلاتها ثمانية، أسديتها كثيرة العدد، مبيض مفتحة ثنائي الحياء المنظم، عثمها نورية متعوبة، زهورها قليلة. تزود لأزهارها الطريقة الشائعة الاستعمال المعروفة باسم « كيش القرنفل ».

٢١٩٨٥ - قرنوس *

Chorinus (S). *Chorine* (F). *Chorinus* (E).

جنس دوبيات بحرية من القرشيات مشاربيات الأبرجل قصيرات الذليل وفصيلة الجيايات، أنوعها المعروفة ستة، اصطفاها بحار البلاد الحارة || أجسامها صغيرة شبه رباعية الشكل. حناكها تنتهي بزوائد. قرنية المادة، جالسة الانتساب، قوائمها الامامية ملقطة الأطراف، لامتناوية الطول والنخانة. ألوانها متباينة الألوان تكثر فيها الألوان الباردة والحديدية المولج.

٢١٩٨٦ - قرنوس *

Cornus (S). *Cornouiller* (F). *Cornel-tree* (E). جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة القرنوسيات. أنوعها المعروفة نحو ٢٥ منها الأشجار والشجيرات والجنبات والأغصان. أوراقها كاملة حاملة. أزهارها

كبيرة القد، قطرها ينال من ٦ إلى ١٢ سم. ألوانها عديدة تغلب فيها السوية.

٢١٩٨٥ - قرنفل الشاعر *

Dianthus barbatus (S). *Œillet barbu*, O. de poète, *Bouquet parfait*, *Jalousie*, *Tête de chat* (F). *London tute*, *Sweet William* (E). *Bartnelke*, *Samtelke* (D). *Garofano barbuto*, *G. poeta*, *Mazzetto perfetto* (I).

نوع من القرنفل، ساقه منتصبه فراء، دقيقة السلائط المستطيلة، تملو من ٣٠ إلى ٦٠ سم. أوراقها سائبة النصل تعرض نحو ١٠ سم. لونها إلى الخضار المائل، أزهارها كبيرة العدد، بتلاتها تطول نحو ٢ سم. وهي مستعرضة الطرف المسنن. ألوانها مختلفة متعاطلة عديدة || أزهارها يستمر من أيار إلى آب.

٢١٩٨٦ - قرنفل الصخور

Dianthus petraeus (S). *Œillet des rochers* (F).

نوع من القرنفل البري يعيش بين الصخور وفي الجبال. ساقه دقيقة نحيلة قليلة الفروع تملو من ٢٠ إلى ٣٠ سم. أوراقها لينة نصلها ثلاثي العروق، أخضر اللين، مدبب المقصبة الشاككة. أزهاره وردية، صغيرة القد، فردية التجميع، عديمة العرف. يوجد منه في لبنان || أزهاره يستمر من أيار إلى تموز.

٢١٩٨٧ - قرنفل الهند

Tagetes touffu (F). هو الخشبية الأجنبية، لطيلة.

٢١٩٨٨ - قرنفل برقي

Dianthus sylvestris (S). *Wood pink* (E). *Steinnelke*, *Wilde Nigeli* (D). *Garofano salvatico* (I).

نوع من القرنفل، ساقه فراء تملو من ١٥ إلى ٣٥ سم. أوراقها جامدة النصل الأخضر المدبب الطرف، أزهارها عديمة العرف، فردية التجميع، بتلاتها مسطحة الخمار الحاربي، وردية اللين أو حمراء. يوجد منه في لبنان حتى ارتفاع ٧٠٠ م.

٢١٩٨٩ - قرنفل بهي *

Dianthus superbus (S). *Œillet superbo*, O. *frangé* (F). *Fringed pink* (E). *Prachtnelke* (D). *Garofano frangato*, *G. superba* (I).

نوع من القرنفل، ضروبه عديدة سيقا فراء تملو من ٣٠ إلى ٦٠ سم. أوراقها تطول من ٤ إلى ٧ سم. وتعرض من ١٠ إلى ١٠ م. نصلها ثلاثي العروق، أخضر المقصبة. أزهارها عديدة، متوسطة القد، فواحة العرف، قطرها يراوح من ٢ إلى ٤٠ سم. ألوانها سوية مختلفة منها الأبيض والبيجي والوردي والاحمر والبنفسجي || أزهارها يستمر من أيار إلى أيلول.

٢١٩٩٠ - قرنفل ريشي، قرنفل عطري

Dianthus plumarius (S). *Œillet mignardise*, O. *musqué* (F). *Feathered pink*, *Garden pink* (E). *Feder-nelke* (D). *Garofano a plumino*, *G. pennino*, *Garofani* (I).

نوع من القرنفل ساقه منتصبه فراء تملو من ١٥ إلى ٣٠ سم. أوراقها لينة تطول نحو ٥ سم. نصلها جامد المقصبة مدبب المقصبة، ياحت الخضار البحري. أزهاره فواحة العرف الطري قطرها نحو ٥ سم. بتلاتها مستطيلة التتفرج مختلفة الألوان السوية || أزهارها يستمر من أيار إلى آب.



قرنفل الشاعر



قرنفل برقي



قرنفل صيني



قرنفل



قرنوس

٢١٩٣٣ - فُرْتُوسٌ كَبِيرُ الرَّقِّ

Cornus macrophylla, *C. brachypoda* (S). Cornouiller à grandes feuilles (F).

شجرة سبروتية تملو من ١٠ إلى ١٥ م. أثمارها وأغصانها رطبة التصليب. أوراقها متعاقبة طول نحو ١٦ سم. وتعرض نحو ٨ سم. نصلها مثلث البصرة على صفحته. حروفه سداسية أو خمائية الأزواج. أزهارها بيضاء. ثمارها الالساود الأزرق المالح.

٢١٩٩٤ - فُرْتُوسٌ كَنْدَاكُ (F). *Cornus canadensis* (F). Cornouiller du Canada (F).

حشية سبروتية عمرة تملو من ١٢ إلى ١٦ م. أوراقها السفل لاطئة متعاقبة اما العليا فضية ثلاثية. أزهارها نورية التصليب، بيضاء اللون، خضر المزاج. ثمارها شوية الشكل، حامزة الطعم، مأكولة. يستمر من حزيران إلى آب.

٢١٩٩٥ - فُرْتُوسٌ مُحْبِرٌ

Cornus controversa (S). Cornouiller discuté (F). شجرة فناء تملو من ١٠ إلى ١٥ م. أثمارها وأغصانها زباد السماء. أوراقها متعاقبة مستديرة المقامدة، نصلها طول نحو ١٥ سم. ويعرض ٨ سم. حروفه شضية سداسية أو خمائية الأزواج. أزهارها بيضاء اللون. ثمارها زيتونية الشكل واللذ، سوداء اللون، رزقاء المالح، حامزة الطعم، مأكولة. أثمارها شديدة الصلابة، ناعمة الرقة، فائرة الصف.

٢١٩٩٦ - فُرْتُوسِيَّاتٌ، قَرْبَاتِيَّاتٌ

Cornaceae (S). *Cornacées* (F). *Cornaceae* (E). فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة القائلات. أجناسها وأنواعها عديدة جميعها نباتات معمرة منها الأشجار والجنات والاشجار. أوراقها بسيطة لكنها لا تقياسية الارتكاز منها المتعاقبة والمتعاقبة. أزهارها عشوية، صبوابة أو عقدية التصليب. ثمارها نورية صغيرة لثمة مأكولة. أثمارها شديدة الصلابة، صناعية، مرغوبة فيها.

٢١٩٩٧ - فُرْتُوسٌ هو لشوكة الصفراء، أطلها.

٢١٩٩٨ - قَرْبِيَّةٌ *Cératoide* (F). *Caratoid* (F). تمت تعريفي بوصف به ما كان شكله كالقرف.

٢١٩٩٩ - قَرْبِيَّاتٌ، قَلْعَاتِيَّاتٌ

Leguminoceae (S). *Légumineuses* (F). *Leguminosae* (E). فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين مستقلة القائلات. أجناسها وأنواعها كثيرة العدد تنقسمها ثلاثة أسباط: القربيات والتمسنيات والسطيات || نباتاتها غظلة الاشكال والاحجام فيها الأشجار والجنات والاشجار. أوراقها مركبة لا تقياسية الارتكاز. أزهارها عشوية. أثمارها عقدية عقدية || وهي تشمل العديد من ثنائيات الأزواجية الثلاثية والعلفية أشهرها الفول والبس والحصى واللوبيا والبرسيم والفول والبيقية والتيل والست.

٢٢٠٠٠ - قَرْبِيَّةٌ *Cornée* (F). *Cornée* (E). الجزء الخارجي الشفاف من العين.

٢٢٠٠١ - قَرْهَبٌ *Taureau corpuient* (F). *Stout bull* (E). الثور اللسن الضخم. وقيل الثور الكبير الضخم.

٢٢٠٠٢ - قَرْهَدٌ ولد البطل ج. قزاهيم.

عشوية، رباعية التركيب، صغيرة اللذ، صبوابة التصليب. ثمارها نورية مستطيلة مأكولة. يزورها دهنية يتخرج منها زيت حاد يستعمل في صناعة الصابون أثمارها شديدة الصلابة، صناعية || أشهر أنواعها ما يصح.

٢١٩٨٧ - فُرْتُوسٌ أَيْبَسُ *Cornus alba* (S). Cornouiller blanc (F).

جنبة سبروتية تملو من ٢٠٠ إلى ٣٠٠ م. أثمارها مرجانية اللون أو صفراء. أوراقها فضية، تطول نحو ١٠ سم. وتعرض ٧ سم. نصلها خلي الصفحة السفل، حروفه خمسية أو سداسية الأزواج. أزهارها غبراء اللون. ثمارها حامية اللذ والشكل، بيضاء اللون، حامزة الطعم، مأكولة.

٢١٩٨٨ - فُرْتُوسٌ السُّوَيْدُ *Cornus suecica* (S). Cornouiller de Suède (F).

حشية معمرة تملو نحو ١٥ سم. أوراقها لاطئة متعاقبة. أزهارها نورية التصليب، جزوية اللون تحضبا أربع قنابات بيضاء. ثمارها صغيرة اللذ حامزة الطعم مأكولة. أثمارها يستمر طول شهر حزيران.

٢١٩٨٩ - فُرْتُوسٌ ذَكَرٌ، فُرْتُوسٌ مَبْدُولٌ *Cornus mas* (S). *Cornouiller mâle*, *C. commun*, *Courgeiller* (F). *Common cornel tree*, *Cornelian cherry* (E). *Kirschenhartriegel*, *Kornelkirsche*, *Kornelbeern*, *Kornelbaum* (D). *Corniole*, *Corniale*, *Cornio* (I).

شجرة سبروتية مبذولة تملو من مترين إلى خمسة أمتار. أثمارها حطية اللذاء مبشرة الزغب. أوراقها متعاقبة، صغيرة اللذ، حامة البصرة، خمسية أو سداسية العروق المزدوجة. أزهارها صفراء التبرجات، خضر القنابات. ثمارها حامزة مأكولة، رقيقة الشكل تطول نحو ١٥ م. لونها الالحمرة.

٢١٩٩٠ - فُرْتُوسٌ عُنُقُودِيٌّ

Cornus racemosa (S). *Cornouiller à grappes* (F). جنبة تملو من ٢٠٠ إلى ٥٠٠ م. أثمارها وأغصانها حطية اللون، سرسة. أوراقها متعاقبة تطول نحو ١٠ سم. وتعرض ٣ سم. نصلها خلي الصفحة السفل، حروفه رباعية الأزواج. أثمارها عقدية هري. أثمارها وثمارها بيضاء.

٢١٩٩١ - فُرْتُوسٌ فُلُورِيْدَاكُ، فُرْتُوسٌ كَبِيرُ الزَّهْرِ

Cornus florida (S). *Cornouiller de Floride*, *C. à grandes fleurs* (F). *Dog-wood*, *Flowing dog-wood* (E). *Blumen Hartriegel*, *Hartriegel* (D). *Corniole florido* (I).

شجرة سبروتية تملو من ١٢ م. إلى ١٢ م. أوراقها متعاقبة تطول نحو ١٤ سم. وتعرض ٨ سم. نصلها ذات الزام الأخير، مذهب البصصة، خلي الصفحة السفل، سداسي أو سداسي العروق المزدوجة. أزهارها وردية اللون، كبيرة القنابات الحامسة. ثمارها زيتونية اللذ والشكل، جزوية اللون، حامزة مأكولة.

٢١٩٩٢ - فُرْتُوسٌ قَلِيلُ المَرْوِقِ

Cornus paucinervis (S). *Cornouiller paucinerve* (F). جنبة صغيرة تملو نحو ٢٠٠ م. أثمارها رباعية التصليب، زباد اللذ. أوراقها متعاقبة، صغيرة، ضيقة، نصلها بطول نحو ٥ سم. حروفه ثنائية أو ثلاثية الأزواج، حلية البصرة من الجهة السفل. أثمارها بيضاء اللون. ثمارها رقيقة الشكل حامية اللذ، حراء القشرة واللباب، حامزة الطعم، مرة المذاق.



فُرْتُوسٌ

٢٢٠١٤ - قُرَيْس هي الصابونية ، اطلمها .

٢٢٠١٥ - قُرَيْسِيَّات

هي الصابونيات ، فصيلة اسماك بحرية ، اطلمها .

٢٢٠١٦ - قُرَيْس *Ortie (F)* . هو القراس ، اطلمه .

٢٢٠١٧ - قُرَيْسِ أَحْمَر *Lamier pourpre (F)* . هو اللاميون الارچوني ، اطلمه .

٢٢٠١٨ - قُرَيْسِ الصَّجُور *Ortie brûlante (F)* . هو القراس المحرق ، اطلمه .

٢٢٠١٩ - قُرَيْسِ رُوْمَانِي *Ortie à pilules (F)* . هو القراس الكاوي ، اطلمه .

٢٢٠٢٠ - قُرَيْس * ، يُوْرِيْسَا *Urena (S)* . *Urena* , *Herbe aux paniers (F)* . *Indian mallow (E)* . *Urena (D)* . *Urena (I)* .
جلس نباتات جنينية ليفة من فصيلة الخبازيات . اطلمها بلاد الشرق . انواعها المزروعة اربعة ، بعضها منتصب . اوراتها ممتدة متعاقبة ، نصلها مستعرض الشكل ، خماسي الفصوص . جامد الصفة . ازهارها فردية التجميع ، ابضية الازتكاز ، خامسة التركيب || ذرع لايانها الخشنة المتينة الشاملة الاستعمال الصناعي .

٢٢٠٢١ - قُرَيْق *Coryphaena (S)* . *Coryphène (F)* . *Dolphin, Dorado (E)* .
جنس اسماك بحرية من الاسقمريات شاككات الزعانف . انواعها المروفة نحو ١٥ اطلمها بحار البلاد الحارة والمتدلة الحارة . جميعها من الاسماك البية || اجسامها اعليجية الشكل ، كبيرة القد ، تطول من ٨٠ الى ١٦٠ سم .
انواعها متعاطلة الالوان المتباينة تكثر فيها الرتبة القصبية المنسقة بالانحصر والاصفر الذهبي . زعانفها الظهرية قاطبة ، الذيلية قارئة او بعيدة الفلقة || لحومها جيدة الصنف مرغوب فيه .

٢٢٠٢٢ - قُرَيْقِي مَوَاكِب *

Coryphaena pomplius (S) . *Coryphène pompile* , *Lampuge* , *Sourcil d'or (F)* . *Pompil (E)* .
نوع من القُرَيْق . سمكة بحرية بيوض . اطلمها البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي والحادي . جسمها اعليجي الشكل يطول من ٨٠ الى ١٠٠ سم .
ثوبها الى الشبهة الزيتية المنسقة بالانحصر والاصفر الذهبي . ظهرها الى الخضار الالامع المروج ، رأسها متدل الجرم ، قصير الخلف المستدير . ميتاها كيرقان . حاجباها مذهبان . زعنفتها الظهرية قاطبة . الشرجية مستطيلة ومقبعة . الذيلية قارئة || لحمها جيد الصنف ، مرغوب فيه .

٢٢٠٢٣ - قُرَيْن *Cornicule (F)* . *Cornicle (E)* . هو السرك ، اطلمه .

٢٢٠٢٤ - قُرَيْسَا *Ambrevade (F)* . هي الكنجوس الهندي ، اطلمه .

٢٢٠٢٥ - قُرَيْسَا هي المارلية الزراعية ، اطلمها .

٢٢٠٠٣ - قُرُوح

الخنقة للماء الطويلة التي انجد كرمها ج . قرواح .

٢٢٠٠٤ - قُرُوة المَنفُوف * ، لَفِيق المَنفُوف

Pissmodiophora brassicae (S) . *Hernie du chou* , *H. des crucifères* , *Maladie digitale* , *Gros pied (F)* . *Clubroot of cabbages (E)* . *Kohlhernie* , *Kohlkropf (D)* .
وصم ظري يترى معظم الصليبيات واعصها المنفوف . شته تركيب من الجذور فيسبب فتح اللبج وارتفاعها . الموالد التي تنشط انتشاره وفكته : تربة متدجحة وحرارة معتدلة ورطوبة تفوق ٩٠ ٪ || يكاثف بتطويع البذار والثرية وباستبدال الارربة المتدجحة والمواقع الرطبة بغيرها اقل انتماساً ورطوبة .

٢٢٠٠٥ - قُرُود دَيْبِيَّة ، أَقْرَام القُرُود

Hapalidae (S) . *Arctopithèques* , *Hapalidés (F)* . *Arctopitheci* , *Hapalidae (E)* . *Kraitaffen (D)* .
فصيلة قرد من الحياتيات موطنها امريكا الوسطى والجنوبية . انواعها المروفة ٢٨ تضم الى جنسين : اليمداس والهبال . اجسامها مسنونة القد ربة ، اذنانها جنتة مستطيلة . اوتواها سوية الالوان ، وافر الشعر اللين المستطيل . تعيش حياة السحاب . جاماتها كبيرة الممد . قوتها اثار والخرش اثنائها تقص من جرو الى جروين وربما ثلاثة .

٢٢٠٠٦ - قُرُود ذِيَالَة ، قُرُود مَدَنِيَّة

Cercopithecidae , *Cercopithèques (F)* . *Cercopithe-* *cidae* , *Cercopithecus* , *Tailed apes (E)* . *Meerkatzen (D)* .
هي الحميريات فصيلة قرد من سفليات المنقرنين تشمل ستة اجناس : الحمير والحوادل والمكاك والشديم والقشة والقدود .

٢٢٠٠٧ - قُرُوس *Bar (F)* . هي القاروس سمكة مأكولة من القرشيات .

٢٢٠٠٨ - قُرُوس مَبْدُون *Loubine vulgaire (F)* . سمكة بحرية تدعى قاروس مبدول ، اطلمها .

٢٢٠٠٩ - قُرَيْة التَمَل *Fourmillière (F)* . *Ant-hill (E)* . هي جرثومة التمل حيث يبيت ويتكاثر ويخزن التمل . وتسمى ايضاً للزربة والمنسلة .

٢٢٠١٠ - قُرَيْث *Anguille (F)* . هو الانقليس ، اطلمه .

٢٢٠١١ - قُرَيْثِي الشَكَل *Anguilliforme (F)* . *Anguilliform (E)* .
نعت تعريفي يطلق على كل حيوان مائي او قارب شكله كالقُرَيْث أي الانقليس .

٢٢٠١٢ - قُرَيْدِي *Crevettes (F)* . هو الاربيان ، اطلمه .

٢٢٠١٣ - قُرَيْدِي سِيَّات *Carididae (S)* . *Carididés (F)* . *Carididae (E)* .
فصيلة حيوانات بحرية من القشريات المشاريات الاقدام . اجناسها وانواعها كثيرة العدد . اطلمها بحار الدام . جميعها صغيرة القد ، مستطيلة الشكل ، منمققة المتوسر .



قُرَة المنفوف



قُرَيْس



قُرَيْن مَوَاكِب

٢٢٠٢٦ - قزينة ، شبهة

Adminicule, Présomption, Contexta (F). Presumption, Context (E).

عنصر من عناصر الاثبات قد لا تقوم به الحجة تماماً ولكنه يساعد .

٢٢٠٢٧ - قزينة عدم التمييز

Présomption de non-discrimination (F). Presumption of not discernment (E).

قزينة قانونية يستدل بها ما اذا كان القاصر الذي اقررت جرمه يمي او لا يمي مسؤولية جرمه . وفي القانون اللبناني اذا لم تتجاوز سن القاصر الجرم ثلاث عشرة سنة عقيب بتأديبه وبقايته .

٢٢٠٢٨ - قزوح

مرض يصيب الدم ليلزما ويذهب بدمها .

٢٢٠٢٩ - قزاسمي °

Iridescent (F). Iridescent (E).
نمت تعريفياً بوصف به الشيء الذي يعكس ألوان قوس قزح .

٢٢٠٣٠ - قزحجي ، قسطناني

Iris (F).
Irisated, irisad (E).
نمت تعريفياً يطلق على ما كان لونه كألوان قوس قزح .

٢٢٠٣١ - قزحجية

Iris (F).
راجع حقله .

٢٢٠٣٢ - قزق

Alto-cumulus
قزق من السحاب المهيبد الجيد الارتفاع . وهو من النجوم الماطرة . القطعة منه قزقة .

٢٢٠٣٣ - قزوق °

Deverra (S). Deverre (F).
جنس نباتات شبيهة معمرة بيرة من فصيلة الخيميات . انواعها المعروفة قليلة العدد جميعها من ثبوت بعض وسائل البصر الابيض المتوسط || سطوها فروعها قليلة الازواك أو عادمها . والازواك عند وجودها ، في بعض الانواع تكون متعاقبة ، مركبة ريشية التفصيل . ازهارها صوباني التجميع . ازهارها شبيهة الانواع منها الابيض والبنّي والاصفر والاعصر الاصفر . تنويرها ربيعي .

٢٢٠٣٤ - قزول °

Polypier de Corail (F).
Polypary of Coral (E).
القزول دكرية البسد ، اي المرجان ، حيث تنشب المذبة .

٢٢٠٣٥ - قزوي

Séricicole (F). Silk-producing (E).
نمت تعريفياً يطلق على ما هو مختص بتربية دود القز .

٢٢٠٣٦ - قزبات

Bombycidae, Liparidae (S).
Bombycidae, Liparidae (F). Bombycidae, Liparidae (E).

فصيلة حشرات من حشريات الاجنحة اجناسها وانواعها كثيرة العدد . فراشاتها متوسطة الحجم ، خفيفة الجسم ، عديمة الخيط ، قصيرة الحياة ، لا تتولى . اجسامها كثيفة المرافش الزباء . وراثتها الى اليباض الاخير تملو رشفة سمره خفيفة . قزتها الاستعمارية شطية مزدوجة || مكها كروي الشكل ، فردي المنح ، وراثتها كبيرة القد ملء الجلود وحيدة القرن الترسجي . خادواتها تقتل بشرا في حريرة المحيط || اشهر اجناسه القزبة .

٢٢٠٣٧ - قزينة ، بمبيكس

Bombyx
جنس حشرات قزينة من فصيلة القزيات . انواعها عديدة معظمها ضار وبشها اقتصادي . تالق كدودة القز . اشهر انواعها ما يلي .

٢٢٠٣٨ - قزينة الحرير ° ، قزينة الثوت

Bombyx mori, Sarcicaria mori (S). Bombyx du mûrier, Var à sole (F). Silk-moth (E).
قزينة من القزيات متوسطة القد لا كدرة لما حل الطيران تعيش نحو عشرة ايام . تساقه بعد اليوم الرابع . اناتها تبيض بعد السواد بنحو ٢٤ ساعة . زين متحيا ينمو من يوبين الى ثلاثة ايام . عند مكها لا يقل عن ٥٠٠ يرف عنه المربين (بالبور) || جسمها نحني حشني . طولها نحو ٣ سم . ويسهلها ٤ سم . زاناباها مشطية مزدوجة . ثوبها الى اليباض الاصل ملو باية سفراء . تحمل على الجناحين الامامين بعض الخطوط المتفرعة السمره اللون . لا تارق خارجي بين الذكر والانثى سوى الجسم فالانثى اكبر واخلف من الذكر . مكها كروي الشكل ينمو اصفر اللون ، عند تنحه ، ثم ينصرف الى البسة ويبدو قبيل التفت || البرقة ترمف بعودة الحرير ، اطلسها ، براوح طولها عند تمام انسلختها من ٧ الى ٩ سم . جسمها مائل البشرة . رأسها صغير القد اسود اللون . قزها الترسجي دقيق ويهدب . ثوبها الى اليباض الاضر . يملو حقلات جسمها من جانبيها سمت سود تدعى سمام التسم وتطبعها التفتس || ضرورها عديدة فوارقها الجسم وتلوي وتلفر الشرنقة ولونها وشكلها .

٢٢٠٣٩ - قزينة القزوق ، بمبيكس القزوق ، دودة حرير آريا

Bombyx ricini, B. arrindia, Attacus arrindia (S). Bombyx du ricin (F).
موطنها البلاد الحارة اخصها الاسيرية . ترى على ورق الخروع . صليجتها متوسطة الحجم والصفت . حريرها اقبر اللون .

٢٢٠٤٠ - قزينة القزوق ° ، بمبيكس القزوق

Bombyx cecropia, Saturnia cecropia (S). Bombyx du prunier, Var à sole du prunier (F).
موطنها بلاد امريكا الجنوبية . ترى على ورق الخروع ، والزيتون . صليجتها متوسطة الحجم ، حريرها قوي الخيط ، خفيف ، اسر اللون .

٢٢٠٤١ - قزينة السنديان ° ، قزينة البسوط ، بمبيكس السنديان

Bombyx mylitta, Saturnia mylitta (S). Bombyx du chène, Var à sole du chène (F).
موطنها الهند . ترى على ورق السنديان . صليجتها صغيرة القد مستطيلة . حريرها براق الخيط متوسط الصنت .

٢٢٠٤٢ - قزينة السنديان الجزارية ° ، بمبيكس السنديان الجزار

Cnethocampa processionnes (S). Bombyx processionnaire du chène (F). Oak processionary caterpillar (E). Eichen-Processionsspinner (D).
حشرة ملهولة قزينة في جميع البلاد المعتدلة الحارة . ريقها سمره اللون . كثيفة الملب ، لسها يبيج الجله كالقزاس . تركب اوزاكن السنديان على اختلاف انواعها فتقرضها وتؤذيها .



قزينة الحرير



قزينة الخروع



قزينة السنديان



قزينة السنديان الجزارية

المائل || السرة تطول من ٣٢ إلى ٣٨ م. جسمها شبه اسطواني الشكل ، كثيف الملب القصير ، ميسر الملب الطويل الضفي التجميع . اطحل اللون ، اريد الموج ، يملو خط ليجي ابيض وسطان جانبيان احمران وسطان متعلقان اصفران . رأسها جوزي اللون . مدنها ورواجها الى السرة || طول الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوما ينقص ضمن صلصلة تحبها على النبات المائل .

٢٢٠٤٧ - قُوَّةُ الْكَرَزِ * ، مُمِيكْسُ الْكَرَزِ

Porthesia similis (S). *Bombyx cul doré* (F).
Gold-tailed moth (E). *Schwan* (D).

حشرة من القزيات يرقها شجرة تركب اوراق الكرز والنفاح تفترضها وقد تقضي عليها .

٢٢٠٤٨ - قُوَّةُ شَارِدِ * ، مُمِيكْسُ شَارِدِ

Liparis dispar, *Lymantria dispar* (S). *Bombyx disparis*, *Spongheuse* (F). *Gipsy moth*, *Gypsy moth* (E). *Schwammspanner* (D).

حشرة من القزيات يرقها شجرة تركب اوراق الاجنار الحرجية وللشجرة اصغها السندان والصفصاف والفتح .

٢٢٠٤٩ - قُوَّةُ مَبْرَقَةِ * ، مُمِيكْسُ مَبْرَقَةِ

Liparis monacha (S). *Bombyx nonne*, *Nonne*, *Bombyx moine* (F). *Nun moth*, *Black arches moth* (E). *Nonne*, *Fichtenspanner* (D).

حشرة مبيولة موطنها البلاد المعتدلة الحارة . يرقها شجرة تركب اوراق عدة نباتات اصغها اجنار الفصيلة الصنوبرية

٢٢٠٥٠ - قُوَّةُ يَمَامَايَ * ، مُمِيكْسُ يَمَامَايَ

Bombyx yamamai (S). *Bombyx yamamai* (F).
حشرة من القزيات موطنها الصين . ترى على ورق السندان ، صلجتها متوسطة القد ، سررها جيد الصنف نجح الخيط .

٢٢٠٥١ - قُوَّةُ رَدِي التمر .

٢٢٠٥٢ - قُوَّةُ رَدِي التمر .

Rétractilité (F). *Retractility* (E).

٢٢٠٥٣ - قُوَّةُ الْقِسْبَارِيَّاتِ

Cuspariées (F).
سبط من فصيلة السبائيات . اجناته وانواعه عديدة جميعها اجنار ونباتات . اطانها البلاد الحارة اصغها امريكا الجنوبية . بعض انواعها طبي دافع للحيات .

٢٢٠٥٤ - قُوَّةُ الْخَمِي * ، قُوَّةُ الْقِسْبَارِيَّةِ فَتْرُوِيَا

Cusparia febrifuga (S). *Cusparia* (F). *Cusparia* (E). *Cusparia* (D). *Cusparia* (I).

شجرة من القسباريات . ساقها منتصبه فروع تملو من ٧ الى ١٥ م . اوراقها عايلة ، معتقة ، متعاقبة ، مركبة ، ثلاثية الورديقات . ازهارها معتقودية التجميع ، يضاء اللون ، خامة البلات ، جيلة الشكل ، مستحبة الريف . يزورها سد احادية || لحاء الشجرة عطري رائحة غزير المركبات الفعالة يستخرج منه مادة القسبارين التي تستخرج من القزويات المرموقة ومن دوائف الحيات المشهورة .

٢٢٠٥٥ - قُوَّةُ قُسْتِ * ، قُسْتِ

Costus (S). *Costus* (F). *Costus*, *Kust-root* (E). *Kostus* (D). *Costo* (I).

جس نباتات جفمورية عقولية برة وزراعية من فصيلة الزنجبيليات . انواعه المعروفة ١٥ منها المناطق الحارة .

٢٢٠٤٣ - قُوَّةُ الصَّنَوْبَرِ الْجَرَّارَةِ * ، مُمِيكْسُ الصَّنَوْبَرِ الْجَرَّارِ

Cnethocampa pityocampa (S). *Bombyx processionnaire du pin* (F). *Pine processionary caterpillar* (E). *Pinien-Prozessionsspanner* (D).

حشرة شديدة الاتى . يرقها كثيفة الملب تركب نباتات واهداب الصنوبر تقضي عليها .



قزو الصنوبر الجارارة



قزو الصنف



قزو الكرز



قزو شاردة



قزو مبرقة



قسبارية الحسى



قست

اوراقها خضراء ، لائقة ، متعاقبة . ازهارها كبيرة اللثة ، ناجية الارزكان ، لا قياسية التجميع منها التورية والسلبية . جذليها طيبة ، كانت ولا تزال تستعمل في الترياق .

٢٢٠٥٦ - قُسُوس
هو اللادن ، اطلبه .

٢٢٠٥٧ - قُسُوس لَادِي (F).
هو اللادن الاسباني ، اطلبه .

٢٢٠٥٨ - قُسُوس بَرِّي (F).
هو البارة ، اطلبه .

٢٢٠٥٩ - قُسُوس شَامِي (F).
هو الراس الشبي ، اطلبه .

٢٢٠٦٠ - قُسُودَان ، قُوس قُزَح

Arc-en-ciel (F). Rainbow (E).
ويدهي أيضاً قوس السحاب . ظاهرة جوية تشاهد في أثناء سقوط المطر أو تنجم الجو بقطرات الماء . ذلك ان اشعة الشمس عند مرورها خلال هذه القطرات تنكسر كما ينكسر الشعاع الضوئي النازل الى مشور زجاجي ويتمثل في اللون الغليظ فيشاهد في السماء قوس يتكون من الاحمر والبرتقالي والاصفر والاحمر والازرق والنيلي والبنفسجي . ويشاهد القوسان أيضاً في بعض الايام المنتشرة السحب نفساً .

٢٢٠٦١ - قُسُودَانِي (F).
راجع قُوسِي .

٢٢٠٦٢ - قُسُودَرَان (F).
هو البطريقا ، اطلبه .

٢٢٠٦٣ - قُسُودَل (F).
هو الكتنة ، اطلبه .

٢٢٠٦٤ - قُسُودَل الْأَرْضِي (F).
هو الجوز الشرقي ، اطلبه .

٢٢٠٦٥ - قُسُودَل الْمَاء (F).
هو السكر ، اطلبه .

٢٢٠٦٦ - قُسُودَل هِنْدِي (F).
هو القندل المبلول ، اطلبه .

٢٢٠٦٧ - قُسُودَلَة (F).
هي الكتنة ثمرة الكتنة .

٢٢٠٦٨ - قُسُودَرَة ، قُسُودَرِيوم ، قُسُودَرِيُون (F).
هو الجندبادستر ، اطلبه .

٢٢٠٦٩ - قُسُودَرِيُون (F).
هو اللادن ، اطلبه .

٢٢٠٧٠ - قُسُودَرِيُون الْإِيطِي (F).
هو اللادن الاكريني ، اطلبه .

٢٢٠٧١ - قُسُودَرِيُونَة (F).
Echiostoma (F). Echiostoma (E).
جنس اسماء بحرية من مفتوحات المائة فصيلة الرغاسيات . انواعها الممرقة قليلة العدد اعطائها بحار البلاد المعتدلة الحرارة . مسرحها الاغوار البعيدة والبعج . تتميز بجهازها

الفسفوري المخي ، اجسامها مستطيلة الشكل ، قريبة الشبه بالرغاس تطول من ٢٠ الى ٣٥ سم . رؤوسها غليظة ، مقطوعة الاطراف ، كبيرة الاشدان ، ستة الفكين . اسنانها مستطيلة ذرية . فكوكها السفلى وحيدة المدية . حيزها جاحظة . قشورها مائل الصفحة . زعانفها الظهرية وسعيدة ، صغيرة الحجم ، خلفية الارزكان ، تقابل الشرسية ومماثلها قداماً وشكلاً . زعانفها الخلفية صغيرة غارقة . اذنيها الى السرة مستطيلة . زعانفها البطنية صغيرة غارقة . اذنيها الى السرة السوداء يعلوها موج اسفح .

٢٢٠٧٢ - قُسُودَرِيُونَة ، مَهْرُ الْجَنَّة

Iris oratoria (S). Iris orateur (F).
حشرة غاصلة من مستطيات الاجنحة فضيلة السرموفيات اصطناعها المناطق الحارة من الشرق الاوسط والاندلس وادوية العربية وافريقية النيلية . تألف البراري والمواقع الدنلة || جسمها مستطيل نحيل يطول نحو ٤ سم . قويه الى السرعة . الخفراء الموج . رأسها صغير مستعرض . عينها جاحظتان . زباناها حديقتان مستطيتان . قوائمها مستطيلة ، الزوج الامامي مستعسف ضليح . اجنسها مثدلة الطول قسطانية الالوان الزاهية الجميلة ، تلحف العين عند الذكر ولا تلحف عند الانثى . الانثى اكبر قدماً من الذكر وابت لوقتاً منه ، ترز مكها في التورية قرب جفونع الثبات .

٢٢٠٧٣ - قُسُودَرِيُونَة

نبت كالكرش اخضر غييث الريح ينبت في سبل الماء له زهرة بيضاء .

٢٢٠٧٤ - قُسُودَرِيُونَة (F).
هو الكرز ، مرض غييث . اطلبه .

٢٢٠٧٥ - قُسُودَرِيُونَة (F).
Division, Embranchement (F).
Division (E).
يأتي التقسم في التصنيف العام بعد المملكة وهو يتألف من صفوف والفصول من طوائف والطوائف من سبب والسبب من طبقات والطبقات من رتب والرتب من مراتب والمرتبات من فصول والفصول من اصناف والاصناف من عائلات والعائلات من اجناس والاجناس من انواع والانواع من صروب والصروب من اصرام وسلالات يعرف .

٢٢٠٧٦ - قُسُودَرِيُونَة (F).
To divide into lots (E).
جزأ الملك الى عدة عقارات تجهل ليه .

٢٢٠٧٧ - قُسُودَرِيُونَة (F).
Division (F).
عملية يقرر بها ملاكو اموال حل الشيوخ ازالة حالة المشاع وتخصيص حصة مميزة لكل مالك بنسبة ما كان يملكه في عموم الاموال المنصوبة || وهذه النسبة قد تكون وثيقة او نهائية وودية او قضائية .

٢٢٠٧٨ - قُسُودَرِيُونَة (F).
Partage (F). Sharing (E).
عملية يقرر بها ملاكو اموال حل الشيوخ ازالة حالة المشاع وتخصيص حصة مميزة لكل مالك بنسبة ما كان يملكه في عموم الاموال المنصوبة || وهذه النسبة قد تكون وثيقة او نهائية وودية او قضائية .

٢٢٠٧٩ - قُسُودَرِيُونَة (F).
Cosmos (F).
جنس نباتات عشبية حولية وبعمرة من فصيلة المركبات الشماعية . انواعها عديدة جميعها زراعية تربوية . اوردها متعاقبة ثنائية التفلق الريشي ، تقووت ازهارها مزينة بالظباب الحرفي الملون || اشهر انواعها الثلاثة التالية .

٢٢٠٨٠ - قُسُودَرِيُونَة (F).
Cosmos (F).
جنس نباتات عشبية حولية وبعمرة من فصيلة المركبات الشماعية . انواعها عديدة جميعها زراعية تربوية . اوردها متعاقبة ثنائية التفلق الريشي ، تقووت ازهارها مزينة بالظباب الحرفي الملون || اشهر انواعها الثلاثة التالية .

٢٢٠٨١ - قُسُودَرِيُونَة (F).
Cosmos (F).
جنس نباتات عشبية حولية وبعمرة من فصيلة المركبات الشماعية . انواعها عديدة جميعها زراعية تربوية . اوردها متعاقبة ثنائية التفلق الريشي ، تقووت ازهارها مزينة بالظباب الحرفي الملون || اشهر انواعها الثلاثة التالية .

٢٢٠٨٢ - قُسُودَرِيُونَة (F).
Cosmos (F).
جنس نباتات عشبية حولية وبعمرة من فصيلة المركبات الشماعية . انواعها عديدة جميعها زراعية تربوية . اوردها متعاقبة ثنائية التفلق الريشي ، تقووت ازهارها مزينة بالظباب الحرفي الملون || اشهر انواعها الثلاثة التالية .

٢٢٠٨٣ - قُسُودَرِيُونَة (F).
Cosmos (F).
جنس نباتات عشبية حولية وبعمرة من فصيلة المركبات الشماعية . انواعها عديدة جميعها زراعية تربوية . اوردها متعاقبة ثنائية التفلق الريشي ، تقووت ازهارها مزينة بالظباب الحرفي الملون || اشهر انواعها الثلاثة التالية .

٢٢٠٨٤ - قُسُودَرِيُونَة (F).
Cosmos (F).
جنس نباتات عشبية حولية وبعمرة من فصيلة المركبات الشماعية . انواعها عديدة جميعها زراعية تربوية . اوردها متعاقبة ثنائية التفلق الريشي ، تقووت ازهارها مزينة بالظباب الحرفي الملون || اشهر انواعها الثلاثة التالية .

٢٢٠٨٥ - قُسُودَرِيُونَة (F).
Cosmos (F).
جنس نباتات عشبية حولية وبعمرة من فصيلة المركبات الشماعية . انواعها عديدة جميعها زراعية تربوية . اوردها متعاقبة ثنائية التفلق الريشي ، تقووت ازهارها مزينة بالظباب الحرفي الملون || اشهر انواعها الثلاثة التالية .



قُسُودَرِيُونَة



قُسُودَرِيُونَة

٢٢٠٩٢ - قَشَاب * Toxicifera, Toxicophora (F).

Toxiferous (E).

نمت ثمريني يطلق على كل حيوان أو مكنة أو طائر يأكل مواد سامة فلا تؤذيها أما تؤذي الإنسان أن أكل من لحمه .

٢٢٠٩٣ - قَشَار Pellicule, Tégument (F).

Pellicle, Tégument (E).

بشرة جلد الحية ومائل الزخافات التي تسلك مرة كل عام .

٢٢٠٩٤ - قَشَامَة Relief

هي التواء الذي يبدو على الاجسام المنبسطة .

٢٢٠٩٥ - قَشَب، قَشِين، ذِيْقَان Toxine (F).

Toxin (E).

كل مادة سامة، مها كانت عناصرها، تفردا بالميكروبات او البكتيريا .

٢٢٠٩٦ - قَشَب Kerria (S), Kerrie, Corète (F).

جنس نباتات برية وزراعية تريينية من فصيلة الورديات منهاها الشروق الاقصى . اوراقها متعاقبة ، معنقة ، ازهارها لوانها الوردية تتجمع ، كبيرة القد ، جميلة الشكل كل اشهر انولها الوردية قش اليايان .

٢٢٠٩٧ - قَشَب اليابان Kerria japonica (S).

Kerrie du Japon, Corète du Japon, Spirée du Japon, Corchorus (F). Jew's-mallow, Summer-rose (E). Japanischer Ranunkelstrauch (D). Kerria japonica (L).

نوع من القش وهو جنبة معمرة صغيرة القد تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . جلورها مدادة ، فروعها جالسة ، متصبغة ، سرسجة ، لامة البشرة الخضراء . اوراقها متعاقبة ، صلها يطول نحو ١٠ سم . ويخرج ٥ وهو لامع البشرة ، جبل الخضار الزاهي . ازهارها فردية تتجمع ، ذهبية اللون ، تحورها نضجا ودية الشكل تستقيت اخضرار || ازهاره يستمر من نيسان الى ايار .

٢٢٠٩٨ - قَشَبَة * Ashbia gossypii, Nemastopora corylli, Spermothora gossypii, Eramothecium ashbyi (S). Stigmatomycose (F).

وصم يصيب ثمار القطن والبرتقال والأتروج واليوسني والبنورة والفاصوليا والصوبه سبه لطر مجهرى من الحشرات يتدخل نسيج الثمار حل أثر ويترى بعض الحشرات فيمطها ويغفلها .

٢٢٠٩٩ - قَشَة Guenuche (F).

Young she-monkey (E).

هي النسية الصينية اي القردة الاثني الفتية .

٢٢١٠٠ - قَشَة Cynopithecus niger (S).

Cynopithecus niger, Singe à coupet (F).

قرود وسيد الجنس والنوع من فصيلة المجرسيات . مركزه بين المالك والقرودج . جسمه يطول نحو ٦٥ سم . ويرتفع ٥٠ سم . ذنبه جملة طولا ٢٠ سم . ثوبه الى السواد القاتم . شعره قصير ، ناعم ، ابيض ، وجهه جقوي اللون . راسه مكمل بشفة متصبغة هدنية الشعر || قوته الثار والحبوب والجلود والحشرات . انشاء تنفس جروا واسدا ترسمه نحو ٦ شهور .

٢٢١٠١ - قَشَدَة ، قَشَطَة ، كَشَاة ، قَشَدَة ، كَشَدَة Crème (F). Cream (E).

مادة شمعية في الحليب تسلك عنه بالفرز الحلي (الميكانيكي)

٢٢٠٨٠ - قَشَسُ جُورِي ، أَصَالِيَا كُشْمُوس

Cosmos atrosanguineus (S). Cosmos rouge-brun, Dahlia zimapani (F).

عشبة تريينية سرورية معمرة تملو نحو ٦٥ سم . جلورها جنبي خليط ، ساقها متصبغة فراءه . اوراقها فردية للتشريح . ازهارها حشوكية التجميع ، تحورها الزهرية جوية الطباب . ازهاره يستمر من تموز الى تشرين .

٢٢٠٨١ - قَشَسُ كَبْرِيّ Cosmos sulphureus (S). Cosmos jaune soufre (F).

جملة تريينية سرورية معمرة تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . ساقها فراءه زباه . اوراقها سنانية التشريح مهدبة . ازهارها فردية متتامة . تحورها الزهرية كبريتية الطباب والسينات . ازهاره يستمر من آب الى تشرين الاول .

٢٢٠٨٢ - قَشَسُ مُزْدَوِج الرئش Cosmos bipinnatus (S). Cosmos bipinné (F).

عشبة تريينية سرورية حولية تملو من ٤٠ الى ١٢٠ سم . ساقها متصبغة فراءه فناء . اوراقها مزدوجة التشريح الريشي . ازهارها فردية التجميع . تحورها الزهرية صفر الطباب ، ودية السنات قفرا نحو ٦ سم . || ازهاره يستمر من تموز الى ايلول .

٢٢٠٨٣ - قَشَل Lionceau (F). Young lion (E).

وله الاسد لم يبلغ الول .

٢٢٠٨٤ - قَشَوَة Chasmanthère (F).

جنس نباتات برية طيبة عارضة من فصيلة القمريات . انولها عديدة اصطنائها البلاد الاستوائية والحارة . سقها متشكلة تطلو من ٣ الى ٧ امتار . اوراقها معنقة ، كفية ، خالصة التفصيص . ازهارها حشوية سداسية التركيب . جلورها طيبة يستخلص منها يهد التجفيف والسحق مادة الكوليين ومادة البر برين . واسحة قسوة .

٢٢٠٨٥ - قَشَوَس Iris à l'all (F).

هو السون المنتر ، اطله .

٢٢٠٨٦ - قَشَوَس هو شاي المروج ، اطله .

٢٢٠٨٧ - قَشَوَس مُسَلَق Lierre commun (F).

هو الشقة المبولة ، اطله .

٢٢٠٨٨ - قَشِيح Rétractile (F). Retractable (E).

نمت ثمريني توصف به الاحشاء القابلة الانتشار والانبثاق .

٢٢٠٨٩ - قَشِيَمَة ضَامِيَة هي مند الحزن ، اطله .

٢٢٠٩٠ - قَشَر Paille (F). Straw (E).

هو قصب الزرع اليابس الذي يصبح نيباً بعد دوسه .

٢٢٠٩١ - قَش السُت Glut (F).

Straw for chatching (E).

هو قصب السلت اليابس يستعمل كراياط . وقد يستعمل في تليفت ثنائي الحمر وما اشبه لفظها من السط عند الصدم .



قشور



قش اليايان



قشبة



قشة

وقشورها حلينة المنافع والنفائات الصعبة || انواعها الزراعية المأكولة البار نحو ١٢ اشهرها ما يتبع :



نشطة

٢٢١١٦ - قِشَّة سَهْنِيَّة * قِشَّة سَكَاوُونَا

Anona squamosa (S). Attler, Anone écailleuse, Pomme-cannelle (F). Custard-apple, Sugar-apple, Sweet-sop (E). Honigapfel, Zuckersapfel (D). Anona scailosa, Pomo cannella, Mala cannella (I).

نوع من القشطة، تصنفه يأتي بعد السكاوونا. ثمرته تشبه التفاح شكلاً وثالثاً وهي تملو نحو أربعة أمتار. اوراقها بيضية النصل مستطيلة، ازهارها نضفية اللون، ثمارها كاكاز الصنوبر، لبها ابيض المادة غزير العصارة السكرية، يزورها سود كبيرة.



نشطة سَهْنِيَّة

٢٢١١٧ - قِشَّة شَاكِكَة *

Anona muricata (S). Corosseller, Anone hérissée, Corosol épineux (F). Sour-sop, Prickly custard-apple (E). Soursobbe, Sorer bissen (D). Anona spinosa, Caslmentaria (I).

نوع من القشطة، ثمرته متوسطة الحجم. اوراقها مستطيلة، مساه، لامعة، شديدة الخضار، فريضة اللون. ازهارها قصيرة القد، غليظة الشكل. ثمارها كبيرة مستطيلة، شكلها شكل كوز الصنوبر جرهاته ناضرة مرفوعة شاككة. اما طول الثمرة فيراوح من ٢٥ الى ٣٠ سم. ووزنها من ٨٠٠ الى ١٠٠٠ غرام. قشورها صميكة، رائحتها العف، حامزة المذاق، لبها ابيض اللون، حلو العلم لا غلو من الحامضة المستعجة.



نشطة شَاكِكَة

٢٢١١٨ - قِشَّة شَبْكِيَّة *

Anona reticulata (S). Anone cœur de bœuf, Cachimau (F). Bullock's heart, Common custard-apple (E). Gustardapfel, Rahmapfel (D). Anona cuore di bus (I).

نوع من القشطة، تصنفه يأتي بعد السكاوونا. ثمرته كبيرة الحجم تملو نحو ثمانية أمتار. اوراقها مستطيلة زغبية الصفحة السفلى. ازهارها كبيرة، بيضاء اللون يشوبها حمى من الخضار. ثمارها كبيرة القد، قلبية الشكل. قشورها الى الصفار اللثاري. لها جامد المادة، متوسط الصف، ابيض اللون او احمر.



نشطة شَبْكِيَّة

٢٢١١٩ - قِشَّة شَرْمِيْمِيَّة *

Anona cherimolla (S). Chirimoller, Chirimoya (F). Chirimoya, Purple-apple (E). Chirimoya, Purpapfel (D). Anona cherimolla (I).

لوع من القشطة وهو اجودها صفاء، ثمرته صغرى القد تملو نحو خمسة أمتار. اوراقها بيضية فضاء، زبده، جميلة الخضار. ازهارها محورية متدلية، بتلاتها مستطيلة تشكل ابيض الصفحة العليا الداخلية، خضر السفلى الخارجية. ثمارها ردهاء اللون حبيها حجم البرتقال. لبها حاجي المادة، غزير العصارة، حلو المذاق، لذيق العلم، فواح العفوف المستعج.



نشطة شَرْمِيْمِيَّة

٢٢١٢٠ - قِشَّة مُنْجِيَّة *

Anona palustris (S). Corossolier des marais, Corosol des marais (F). Alligator apple, Cork wood (E). Alligatorapfel, Wasserpapfel (D). Anona di stagno (I). نوع من القشطة يجود في الاماكن الرطبة. ثمارها صغرى القد قلبية الشكل، عادية الصف، خضراء الالباب اللزير القصيرة المعتدلة الحلاوة.

نظراً لغنىها التسمية. وهي دسمة، للذيق العلم، بيضاء اللون. ومنها تستخرج الزبدة بعد غسها.

٢٢١١٢ - قِشَّة هِنْدِي Cavequi (F). هي البرساء الهندي، اطلبها.

٢٢١١٣ - قِشَّة يَات Annonacées (F). هي القشطات فصيلة نباتية، اطلبها.

٢٢١١٤ - قِشَّر Ebonage (F). هو قششر الحبوب لاسياً للزور.

٢٢١١٥ - قِشَّر، حِخَاء، قِرْق، قِلْث Ecorces (F). Barks (E). هو في النبات الجزء الخارجي الذي يلف الخشب من الجلود والسوق والاغصان والاغنان.

٢٢١١٦ - قِشَّر Latis (F). جش اسماك ثورية تلى لاس.

٢٢١١٧ - قِشَّر عِثَر Cascarille (F). هو الكركن العثري، اطلبه.

٢٢١١٨ - قِشَّرَان Altes de sauterelles (F). Wings of the locust (E). جناح الجراد الزرقان كالنشاء الشفاف.

٢٢١١٩ - قِشَّرَة Pellicule (F). Pellicle (E). شفاء الشيء، حلقة او مرضاً. ج قشر وقشور.

٢٢١٢٠ - قِشَّرِي Cortical نمت تعمرني يطلق على كل ما له صلة بالقشور او يشبهها.

٢٢١٢١ - قِشَّرِيَات Crustacea (S). Crustacés (F). Crustacea (E). صف حيوانات منفصلة مائية عديدة الرتب والصفات والاجناس، التي تنتم الى طائفتين: حشريات الصدف ولبينات الصدف.

٢٢١٢٢ - قِشَّرِيَات دُنْيَا Crustacés inférieurs (F). Inferior Crustacea (E). طائفة من القشريات كانت تدعى في التصنيف السابق «حشريات الصدف».

٢٢١٢٣ - قِشَّرِيَات عَلْيَا Crustacés supérieurs (F). Superior crustacea (E). طائفة من القشريات كانت تدعى في التصنيف السابق «لبينات الصدف».

٢٢١٢٤ - قِشَّة Crème (F). Cream (E). هي القشدة، المادة السنية في الحليب.

٢٢١٢٥ - قِشَّة *، قِشَّة Anona (S). Annona, Anone (F). جنس نباتات يوية وزراعية من فصيلة القشطات. انواعها نحو ٥٠ جميعها اثمار وحبيرات وجينات. اوراقها متناقية، مسطحة، بيضية او اهليلجية. نصلها جامد الصفعة، بارز العروق. ازهارها فردية محورية او جاعية تاجية. ثمارها كوزية لحمية || معظم انواعها البرية طلي. اوراقها

تركب جلود وسوق التجليات اخضا الشعر والثوفان والنخن والأذرة .

٢٢١٢١ - فُشَيات ، فُشَبَات

Anonaceae (S). Annonacées, Anonacées (F). Annonaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقين عديدة الثمرات . اجناسها المعروفة ١٠ أنواعها نحو ٣٢٠ . اصلها البلاد الحارة . منها الاجبار والشعيرات والنباتات . اوراقها معتقة ، متعاقبة ، بسيطة . ازهارها ثلاثية التركيب او سداسية . ثمارها اكواز خشية ، يزورها دعتية .



فُشام ارش

٢٢١٢٢ - فُشَبَان اَرْبَع

Dascillus pubescens (S). *Dascille pubescent* (F). *Dascillus pubescens* (E).

حشرة واشية غاطسة من فصيلة الفُشَبَانِيَات رتبة مفدمات الاجنحة . تألف الموائل القريبة من الماء . خنافسها تعيش على ازهار الصبوراتيات . يرقاقها تركب جلود النباتات التي تنمو في الاراضي الرطبة || جسمها صغير القد يطول من ١٠ الى ١٢ سم . ثوبها الى الوردية الخطفية الموج . رأسها صغير الحجم . فكها ضليمان . عينها صغيرتان زباناها خطيوان ، مستطيلتان . ظهورها مستدير الطرف الاصح ، بين التصديق الغندي القاطب . ارساغها لحاسية المقل || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اوائل ايار وتعيش حتى اواخر تموز . تسرح في النهار تملأ به ظهورها بنحو ستة اسابيع . تمتع المكان تحت الجملانة والمبل وبين اشطاء الاشباه الحولية || البرقة عند بلوغها الاندراك الجسموي تطول من ١٦ الى ١٩ سم . جسمها مردي الشكل ، سداسي الرواجب القصيرة ، اخضر اللون اصفر الموج ، اسمر الرأس ، ضليح التأثير الفكية || طور الاكمال الذي يستمر نحو ٣٠ يوما ينقضي في التربة تحت الجملانة او تحت ارومات النباتات المشية .

٢٢١٢٣ - فُشَتام ، فُشَبَان

Gyps جنس طير من الكواسر وفصيلة النسريات . انواعه ثلاثة جميعها كبيرة القد . رؤسها مستطيلة غفيرة . محاسرها ضلع . صيها سود المقل ، صفر الاسحاق . مناسرها قصيرة ، خيلطة ، متشققة البهر . اعناقها مستطيلة غفيرة . سواقلها كبيرة شارفة . اذنانها قصيرة || والفُشَتام شرس الاخلاق قوي الشكبة يسود يطول على جميع انواع السور التي تباه وتغشاه . طيراته معتدل القوط يفرق برصته سرعة جميع السور لكنه لا يجاري المتحان . يألف الحياة الجاهية ، سره يمد من ١٠ الى ٥٠ سنة . الجيف . مأواه الجبال العالية .



فُشام اكلف

٢٢١٢٤ - فُشَتام اَرْش * فُشَبَة

Gyps rupellii (S). *Gyps de Ruppell, Vautour-épervier* (F).

طائر من الفُشَتام طول نحو ١٥٠ سم . بسطته نحو ٢٧٥ سم . ثوبه الى السمرة الزاهية . عنقه اصهب . طوق جزئيو طويل الزغب اغمر اللون ، ظهوره وبطنه وباطن سطيحه ونفذه الى السمرة . ظاهر سطيحه الى الرقعة الموشة يعلوها تجذع ابيض ممتلئ || موطنه البلاد الاقريقية . يطن وكرو في اوتاب الصغور الفسحة . الانثى تبيض رفته واحدة فُشَها يتناولها الذكر نحو خمسة اسابيع . سره يمد من ٤٠ الى ٥٠ .

٢٢١٢٥ - فُشَبَانِيَات

Dascillidae (S). Dascillides (F). Dascillides (E). فصيلة حشرات من غمديات الاجنح اجناسها واتواعها عديدة جميعها ست عمارات . اصلها العالم جميعها ثارية خاضعة . اجسامها مستطيلة الشكل ، متوصلة القد او صغيرة .

٢٢١٢٦ - فُشَمر

Concombre serpent (F). هو الفشاء ، اطلبه .

٢٢١٢٧ - فُشَوش * ، حُسام المَوسَط ،

هَفَة المَوسَط ، تَرِيك

Atherina hepsetus (S). *Athérine de la Méditerranée, Sautet* (F). *Silvridae, Sand smelt* (E).

سمكة بحرية يبيض من فصيلة الحبسات شاكلات الارغاف اصلها معظم اقالم البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي . تنحدر من املاك النفاث . مسرعا الهامد والسطوط || جسمها شبه وشي الشكل يطول من ١٠ الى ١٥ سم . ثوبها الى الشبيه يعلوها في جانبها تمشيح ازيق ومواج فصي يسمر في الظهر ويغير ويبيض في البطن || رأسها معتدل الحجم ، يرمي الشكل . فكها السفلي يتقدم العلوي بعض الشيء . عينها كبيرتان ، مستديرتان ، جاحشتان . زعانفها نظامية الترتيب . زعنفتها الذيلية فارقة || لحمها جيد الصنف ، مغروب فيه .

٢٢١٢٨ - فُشَتام اَكلف * عَقَق

Gyps fulvus (S). *Gyps fauve, Vautour fauve, Griffon* (F). *Griffon-vulture* (E).

طائر من الفُشَتام طول نحو ١٢٠ سم . بسطته نحو ٢٧٠ سم . ثوبه الى الكلفة الغبراء زخرف في الظهر وتعلق في البطن . سطيحه واقل كبير تفرغ خطوط يبيض || اعطانه تسمية الارباء تحته من اشد الى الروبة والفرقية الشمالية والشرقية || يطن وكرو في صنوع الصغور الشائعة الموشة . الانثى تبيض رفته واحدة فُشَها يتناولها الذكر نحو خمسة اسابيع . سره يمد من ٣٠ الى ٥٠ وهو من الطيور القواطع .



فُشام حندي

٢٢١٢٩ - فُشَتام حندي * هَرَوَب

Gyps indicus (S). *Gyps des Indes* (F).

طائر من الفُشَتام طول نحو ١١٠ سم . بسطته نحو ٢٥٠ سم . ثوبه الى السمرة القاتمة . عنقه اصهب . سطيحه جملان بالحلي ويطولها خط ابيض ممتلئ . ذليه جمد بالابيض . موطنه جبال الهند وجوارها . انثاء تبيض رفته واحدة . سره يمد نحو ٢٠ .



فُشبان

٢٢١٣١ - فُشَلْب

Cladanthus (S). *Cladantha* (F). جنس نباتات عشبية سولية من فصيلة المركبات الابوبية الزهر . سوقها غبراء تطول من ٣٠ الى ٩٠ سم . فرصها متعاقبة فرقة . اوراقها مغرقة خلية النصل على فصعته . ازهارها رؤسية ، عطرية العرف ، صفر الطياب والقيسنتا الثنائية الصف || اشهر انواعه قلب الجزيرة .

٢٢١٣٢ - فُشَبَان * ٥

Dascillus (S). *Dascille* (F). جنس حشرات من فصيلة الفُشَبَانِيَات انواعه ١٢ اجسامها اهليجية الشكل مغاطسة . قرونها الاستشارية خبيطة ، مسنة ، مركبة من ١١ فاصلة . سداقها ضيقة . البطن خمسية الاقسام . الزوايا سوية الالوان يكثر فيها الالوا الرمادي . اتحادها مخددة خلية || خنافسها وراقها



فُشوش

٢٢١٣٢ - قُصْبُ الجَزِيرَةِ ، أَلْحُوَانُ الجَزِيرَةِ

Cladanthus arabicus, *Anthemis arabica*, *A. proleptus* (S). *Cladanthus d'Arable* (F).

نوع من القُصْبِ الحولي يملو نحو ٧٠ سم. ساقه كثيرة الفروع المتعاقبة الفرقة . أوراقه لسنة التلويش . خلية النصل . أزهار عديدة ، صفراء اللون ، فواصة العرف . ازهاره يستمر من حزيران إلى أيلول .

٢٢١٣٣ - قُصْبُ

Lit d'un ruisseau (F).

Brook bed, Stream bed (E).

القُصْبُ مجرى النهر وسهم من قال سيله .

٢٢١٣٤ - قُصْبِيَّةُ

Chloroë andive (F).

واحدة القُصْبِيَّين ، بقلة مشهورة تعرف بالهذب ، أطليه .

٢٢١٣٥ - قُصْبُ

في القنوية ، أطليه .

٢٢١٣٦ - قُصْبُ

Légume sec (F).

Dried vegetable (E).

القُصْبُ ج ثُغْرُ هي البقول الناضفة . القُصْبُ منها كالبايما أو الحبي كالفلو والمُدس والحمص والفاصوليا .

٢٢١٣٧ - قُصْبُ ، قُصْبُ

Sturnum

هو في الطير عظم مقدم الصدر الذي يرتكز عليه هيكل القُصْبُ الجُرْشِي .

٢٢١٣٨ - قُصْبِيَّةُ

Boucherie (F).

هي صنعة القُصْبِ أي الجزار .

٢٢١٣٩ - قُصْبِيَّةُ

Tubicoles (F).

Tube-worm (E).

اسم يطلق على الحفريات الملازمة لخلات أقبانها والتي تعيش ضمن قصبات كلسية الملمة أو دويلة أو ششائية .

٢٢١٤٠ - قُصْبُ الأَعْمَادِ

Brachélytres (F).

Brachelytron (E).

اسم يطلق على كل حشرة من غدييات الجُتْلُح الحادها تلحف جزءاً من بطونها فقط .

٢٢١٤١ - قُصْبُ الأَلْسِنَةِ

Brévilingues (F).

Brevilingual (E).

لُيَّة من العظائيات اجناسها وأزهارها عديدة تجتمع إلى فصليتين المستقرديات والصفريات . دويباتها تتميز بقصر السُتْها وصغر قوتلها وقرب سبها من المياه .

٢٢١٤٢ - قُصْبُ الدَّيْلِ

Brachyours (F).

Brachyours (E).

رُيَّة من القُصْبِيَّات المشاريات الارجل ، أشهر اجناسها السرطان .

٢٢١٤٣ - قُصْبُ السَّوَالِقِ

Brachypètres (F).

Brachypters (E).

رُيَّة من الطير تتميز بقصر سواقطها مما يجعلها عاجزة عن الطيران ولذا فيضع طيورها مائة قوتلها الاسماك . أشهرها الطريق والطرُوس والنطاس والنفاس ...

٢٢١٤٤ - قُصْبُ القُرُونِ

Brachycères (F).

أطلب قُصْبَاتُ القُرُونِ .

٢٢١٤٥ - قُصْبُ ، قُصْبُ

هو القُصْبُ الشجرية ، أطليه . الواحدة قُصْبَاة وهو نبات مثثري تجمره النمل فيقال لساها حبل قُصْبُ .

٢٢١٤٦ - قُصْبَاةُ

Epinastie (F). *Epinasty* (E).

حالة كل عضو نباتي ينمو الجزء الباقي منه على حساب الجزء الظاهري كالورقة المقمرة الصفحة العليا المتعددة النصل .

٢٢١٤٧ - قُصْبَاةُ

Coniocybe (S).

جنس فطور مجهرية من الرطبات وفصيلة الحشاريات . يتميز بنكهته القلنسوية التي تملو الرُيَّة . نكهاته مستطيلة يوفها قرصي الشكل ثنائي الخلية . نكهاته غطية مفصيلة تشابه النكات || له نوع واحد ملا يهوى قُصْبَاة الكروية .

٢٢١٤٨ - قُصْبَاةُ الكَرْمَةِ

Coniocybe pallida, *Pilacre pallida*, *Rosleria hypogaea*, *Coniocybe nives* (S).

فطر مجهرية يصيب بطور الكروية وقد يصيب عرفاً وفي ظروف بيئية خاصة بطور الاجسام المتكاثرة والذرات والخروج والورد والقشيب والمُتْث || ظهوره الجاري على الكروية في اضعائها الطولية ، يتميز شاملاً يتيه ووث في النمو وتجمع في الاوراق . وهو في الجلول غفن خفي ناشف اصهب اللون يلحم الجرادات فيسبب تزيدها وتفجير طريدها المكاثرة || لم يكلف حتى الآن لان فوضه وانتشاره منوطان بعدة عوامل منها الرطوبة الموضعية ، وطعم القوية ، وتركيب التربة وتساكها .. لذلك فالاعمال الحرفية والعناية بالربة هي انجع علاج له .

٢٢١٤٩ - قُصْبِيَّةُ

Aphélie (F). *Aphelion* (E).

القُصْبِيَّةُ البعد الاقصى لسيارة عن الشمس . الكرة الارضية تكون في قُصْبِيَّتِها في اول شهر تموز من كل عام .

٢٢١٥٠ - قُصْبُ ، قُصْبُ ، قُصْبُ

Equarrissage (F). *Squaring* (E).

هو قطع الشيء وتقسيه وتزييمه كالجوارق ويطوع الاشجار الخ .

٢٢١٥١ - قُصْبُ ، قُصْبُ

Arundo phragmites (S). *Roseau*, *R. commun*, *R. à balais* (F). *Common reed*, *Ditch reed* (E). *Deckrohr*, *Teichrohr* (D). *Canna*, *C. a spazzola*, *Spazzole* (I). ويسمى غاب وقُصْبُ المكائن . نبات كمبروري من فصيلة النجيليات ، ساقه قصبية ، جامدة ، متشابكة السلاسل الجوفاء . أوراقه صفية كبيرة اللد مملدة متداقبة . ازهاره مجتمعة عناقيد عالية ترتكز على سراج واحد . يكثر في المنائق وعلى ضفاف الماء . يستعمل للسياج وفي صناعاتي السلال والمكائن .

٢٢١٥٢ - قُصْبُ الدَّرِيَّةِ

هو حرد الوج ، أطليه .

٢٢١٥٣ - قُصْبُ الرِّمَالِ

Arundo arenaria (S).

Arunde, *Gourbet* (F). *Cane*, *Reed grass* (E). *Mahbrohr*, *Rohr* (D). *Cannuccia marina* (I). نبات كمبروري قصبي من فصيلة النجيليات . اعطانه البلاد الحارة والمعتدلة . يكثر ويبروه في الرمال الرطبة وفي المنتقع . ساقه تستعمل في عدة صناعات زراعية اعصها البواتير .



قُصْبَاةُ الكَرْمَةِ



قُصْبُ



قُصْبُ الرِّمَالِ

قَصَب بوردون ، قَصَب أوتاھي

Canne de Bourbon, C. d'Otahtiti (F).
ساقه كبيرة مستطيلة غبراء اللون غزيرة العصارة السكرية .
والقصب يحد في جميع الأثرية المرورية الثانية بالمواد المضوية
والناصر الغاذية غوط أن لا تغتفر إلى الكلس وأن لا
تكون كثيرة الانفعال || أما كمية السكر الممكن
استخراجها من عود القصب فتراوح من ١٠ إلى ١٥ ٪
من وزن العود .

22156 - قَصَب النَّيْلِ
Rousseau canne (F).
هو القصب الرومي ، أطله .

22157 - قَصَب بَلَكْدِي
Canne de Provence (F).
هو القصب الرومي ، أطله .

22158 - قَصَب دَرَاكُو
Jong de l'Inde (F).
هو أصل الهند ، أطله .

22159 - قَصَب ذَهَبِي
Lysimaque commune (F).
هو السراجية ، أطله .

22160 - قَصَب رُومِي * ، قَصَب بَلَكْدِي ، قَصَب
النَّيْلِ
Arundo donax (S).

Canne, Canne de Provence, Rousseau canne (F). Giant
reed-cane (E). Echtenpflrohr Grosses-schiff (D).
Canna comune, Canna di giardino (I).
نوع من القصب الكبير المستطيل يكثر وبيده في المناطق
المعتدلة وإفريقية في الأماكن الرطبة أنحصر أنواع الأنهر
حيث يظل ويوجد تمامًا || يستعمل كسائر القصب.

22161 - قَصَب قَارِسِي ، بُوَص قَارِسِي
Arundo isia (S). Canne de Perse (F). Persian cane
(E). Persische Pflrohr (D). Canna di Persia (I).

نوع من القصب الكبير القند . يكثر في المناطق وعل
ضفاف الأنهر والجداول الرطبة || يستعمل في مختلف
الصناعات القصبية .

22162 - قَصَب هَرَّ
هو السوروبيا ، أطله .

22163 - قَصَبَات
Bronches (F). Bronchia (E).
هي مجموعة الشعب الرئيسية والثانوية التي تزين الاتصال
بين الحويصلات الرئوية والرقاضي فتضخ الجبال لتسهيل
الحواء وشروجه .

22164 - قَصَبَة
Bronche (F). Bronchi (E).
اسم تعريفي يطلق على جزء من الجهاز الانبوبي التنفسي
الذي يوصل الرغامى أي قصبة الرئة بالحويصلات الرئوية .

22165 - قَصَبَة
Paspale (F).
هي أبو يبيص ، أطله .

22166 - قَصَبَة
Rorezu (F). Reed (E).
وأحدة القصب .

22167 - قَصَبَة ، قَلَم
Chaume (F). Thatch (E).
ساق التجليات كالحنطة والشعير والشرافات والذرة وغيرها .
وهي مجوفة مركبة من عدة سلاحيات وطقة ينشأ عليها النصف
أي الورق .

22168 - قَصَبَةُ الْأَنْفِ
Chanfrein (F).
Forehead (E).
جزء من رأس الدابة يمتد من بين عينها إلى منخرها .

22164 - قَصَب الرَّمْل * ، غَرَاكُو

Calamagrostis (S). Calamagrostida (F). Small reed,
Sea sand-reed (E). Schilf, Rohrgress (D). Calama-
grostis (I).

جلس نباتات كمبودية قصبة من فصيلة التجليات .
أنواعه نحو ٨٠ أصلها البلاد الحارة والمستتلة . ترفب في
الاراضي الرملية ولا تنحش المناطق البحرية . بعضها يستعمل
في تثبيت رمال الكثبان القاسلة لأنه لا ينحش الطش .

22166 - قَصَب السُّكَّر ، مَصَان ، بَرَسُوم
Saccharum officinarum (S). Canne à sucre, Canna-
melle (F). Common sugar cane (E). Zuckerrohr (D).
Canna da zucchero, Cannamelle (I).

نبات زراعي من فصيلة التجليات مهدد بالاندثار الآسيوية
الحارة ونسبها انتقل ونقش في ثلاثة أقطار العالم الباقية لأنه
كان حتى عام ١٨٠٠ النبات الوحيد الذي تستعمل حصارته
في صناعة السكر . أما الإقليم الصالحة لزراعته فهي مبدئياً
أقاليم البرتغال التي لا يقل متوسط حرارتها الوسطى من ٢٣°
وإلى لا ينخفض متوسط حرارتها الدنيا عن ١٠° سن .
ساقه منتصبه مسقوفة تعلو من ٢٠٠ إلى ٤٠٠ سم .

سلاحياتها تعلو من ١٠ إلى ٣٠ سم . وقطرها يراوح
من ٣ إلى ٨ سم . ألوانها الخارجية خشية التركيب جامدة
تلفها مادة شمعية يغطها اللون . أما الألياف الداخلية
فأصفرية النسيج غزيرة العصارة السكرية . أوراثه متطابقة ،
عصيفة الشكل ، حافضة . فصلها يطول من ١٠٠ إلى
٢٠٠ سم . وهو جامد المنفعة سنن الحافة . أفراده حثويدي
التجميع ، هامس الارتكاز . أنواره صغيرة الحجم ، فضة
اللون ، ثنائية ، متعاقبة ، كثيفة الأزغب للمستطيل || حمراء
بر نخيل دقيق || ضروب القصب الزراعي عديدة أشهرها
وأهمها ما يلي :

قصب أزرق ، قصب جاييك
Canne bleue, C. jamaïque (F).
ضرب سروتي قوي المنفعة يتحمل الطش وهو متوسط
القند والانتاج السكري .

قصب أسود
Canne noire (F).
ساقه صلبة جوية اللون سماء ألوان متوسطة العصارة
السكرية . تكثر زراعته في ملقا وجزيرة موريس .

قصب أصفر ، قصب صيني
Canne chinoise, C. de Penang (F).
متوسط القند ، أصفر اللون ، أخضر الملوخ ، كثيف
الماندة الشمية غزير العصارة السكرية تكثر زراعته في
الصين وفورموزا وجزر الملايو .

قصب الصين
Canne de Chine (F).
صغير القند ، حنطي اللون ، أصفر الملوخ متوسط العصارة
السكرية لكنه سروتي وقوي المنفعة ضد الأوصام الفطرية .
تكثر زراعته في الصين والهند والهند الصينية .

قصب الكوششين
Canne de Cochinchine (F).
ساقه خفيفة غبراء اللون متوسطة العصارة السكرية .

قصب الهند
Canne guinghan (F).
كبير القند يطول نحو ٦ أمتار . يملك الرية ويسترب
حناصرها الغاذية . ساقه غزيرة المادة السكرية ، صفراء
اللون مجلعة بالنسجي .

قصب بتافيا
Canne de Batavia (F).
أصرامه عديدة موطنها كبيرة القند ، مجلعة بالألوان
الباقية واللحافة ، غزيرة العصارة السكرية .



قصب الزمل



قصب السكر



قصب رومي

٦٠ سم. اوراته احليبية قليلة القامة نصلها شغل
المس اذنب البشرة. ازماره ودية اللون زرق الملاج.
ثمارة تقاسية الشكل حقة التركيب.

Frangible (F). **قَصِيْب** ٢٢١٨١
Frangible, Breakable (E).
نمت تمريني يطلق عل ما كان سهل الانكسار او
الانحلال.

٢٢١٨٢ - **قَصَب** هو الياه ، اطليا .

Brize (F). ٢٢١٨٣ - **قَصْبَة**
هي البريزه ، اطليا .

Conceptacle (F). ٢٢١٨٤ - **قَصَمَة**
حق يحسن اعضاء التناسل في بعض اجناس الفطور .
ج قسم .

Osteoclaste (F). ٢٢١٨٥ - **قَصِيل**
Osteoclasty (E).
يعن يسحب العظم في الحيوانات اخصها الحمية فتهش ويسهل
انصاعها وكسرها .

Cirsium (S). ٢٢١٨٦ - **قَصَوَان**
Cirse (F). Horse-thistle (E).
جنس نباتات شائكة ميلولة برية من فصيلة المركبات .
انواعه عديدة منها الحولية والمحولة والمعرة . سرقها اسطوانية
تعلو من ٥٠ الى ٣٠٠ سم. اوراتها ساعدة شائكة .
ورئيساتها كبيرة اللد . ازمارها انبوية . قناباتها مهدية
الاطراف . بزورها مغلفة مستطيلة || اعرف انواعه
واشهرها ما يتبع :

Cirsium afrum (S). **قَصَوَان افريقي**
Cirse d'Afrique (F).

C. arvense (S). Cirse des champs (F). **قَصَوَان الحقل**

C. oleraceum (S). Cirse potager (F). **قَصَوَان الخنازير**

C. lanceolatus (S). Cirse lanceolé (F). **قَصَوَان سنائي**

C. ferox (S). Cirse féroce (F). **قَصَوَان كسك**

C. spinosissimum (S). **قَصَوَان كثير الشوك**

C. très épineux (F). **قَصَوَان لنباني**

C. libanotifum (S). Cirse du Liban (F). **قَصَوَان مصوف**

C. eriophorum (S). Cirse laineux (F). **قَصَوَان الجبال**

٢٢١٨٧ - **قَصَوَان الجبال** هو الصلحاج ، اطليا .

Textor (S). ٢٢١٨٨ - **قَصُوص**
Alecto (F). Textor (E).

جنس طير من فصيلة التوتويات . انواعه المرحولة قليلة
العدد موطنها بعض مناطق افريقية البطل والجنوبية .
تألف المراهي والاحراج البصرة الانهار . ملجئها الجبال
جامي افريقيا قليلة البند || اجسامها متوسطة القد تعلل
من ٢٢ الى ٢٦ سم. مناقبها كبيرة غرطية الشكل .
اجنحتها مستطيلة . اذناها مغلفة الاطراف او مستديرة ||
قوتها الحشرات والديدان وبعض البزور البرية || اعرف
انواعه واشهرها قصوص احمر الخنقار .

٢٢١٨٩ - **قَصُوصُ أَحْمَرُ الْوَيْثَاد**

Textor erythrorhynchus (S). **قَصُوصُ أَحْمَرُ الْوَيْثَاد**
Alecto à bec rouge (F).
طائر من القصوص . موطنه يمتد من افريقية الجنوبية الى

٢٢١٩٠ - **قَصْبَةُ الرِّثَّة ، وَخَامِسِي**

Trachée-artère (F). Trachea, Windpipe (E).
النضو في الجسم الذي يوصل الحنجرة بشقي القصبة .
وهي التي يمر منها الهواء الى الرئة ان داخلا او خارجيا .

Tubiforma (F). ٢٢١٩٠ - **قَصْبِي**
Tubiform, Tubular (E).
ما كان شكله كالقصبة او الانبوب .

Trachées (F). Trachees (E). ٢٢١٩١
هي المصليات التي تتحلل بجهاز تنفسي انبوي يقابله جهاز
تنفسي شعبي .

Petite centaurée (F). ٢٢١٩٢ - **قَصَّةُ الْحَبَّة**
هي مرارة الحش ، اطليا .

Ronce (F). ٢٢١٩٣ - **قَصْد**
القصد الموج . وقصد الموج فروعه الثانية .

Etain (F). Tin (E). ٢٢١٩٤ - **قَصْدِير**
معدن معروف منذ زمن الفينيقيين الذين نقلوه الى مصر
قبل عهد موسى . لونه الى البياض الفضي الازرق الملاج .
يصهر في ٢٢٨٠°م ويغل في ١٢٠٠°م. رمزه (Sn-).
وزنه الانبوي ١١٨,٧ ثقله النوبي ٧,٢٩ واصلته
الكهربائية في ٢١/٢٢ سم. تبلغ في ١١,٤٥ || وهو اطرى
من الزنك واشد صلابة من الرصاص كما انه لا يتأثر
بالخامض النيتري والمصارات العضوية || يوجد في الطبيعة
على هيئة اكسيد القصدير « قصديريت » Cassitérite
Oxyde d'étain .

Base du cou (F). ٢٢١٩٥ - **قَصْرَة ، ذَسِيع**
قاعدة العنق او ممرز العنق في الكاهل .

Gammule (F). ٢٢١٩٦ - **قَصْرَكَة**
هي الباردة ، اطليا .

Cerastes cornutus (S). ٢٢١٩٧ - **قَصْرَمِي**
القصرى والقصرى نوع من القرناء صغيرة القد غريبة
تنسج في الرمال .

٢٢١٩٨ - **قَصْمَةُ الْمَاء ، سَرَّةُ الْبَحْر ، هيدروكوتيل**
Hydrocotyle (S). Hydrocotyle, Ecuelle d'eau (F).
Marsh pennywort, Sheep-bane, White-rot (E).
Nabel Necke, Wassernabel (D). Idrocotile, Scodella
d'acqua (I).

جنس نباتات عشبية برية مائية من فصيلة الخبيبات كثر
في المناطق وفي المراتع المستدرة الرطاب . الوراها عديدة.
سوقها مدادة . اوراتها ثنائية الالتشاب ، مستطيلة الزناد،
دقيقة النصل المستدير المدام الانقسام . ازمارها صغيرة
خامسة البتلات .

٢٢١٩٩ - **قَصْمَل ، قَصْمَل**
Scorpion
هو القرب . وقيل ولعاب .

٢٢١٩٠ - **قَصْمِين**
Salvia pommaria (S).
Sauge pommaria (F). Sage apple (E). Salbeispfel (D).
Salvia baccifera, S. Spirea (I).
نوع من القوصية . يقال ان منافعه الصمية عديدة . يكثر
في الاراضي البرية الملساة . ساقه فراء تعلو من ٣٠ الى



قصة الماء



قصة من



قصور

٢٢٢٠١ - قُصْبِيَّة نبت ينبت في اصول الكفاة (أ. م).

Pygidium ٢٢٢٠٢ - قُصْبِيَّة هي آخر مفصل بطي من جسم الحشرة .

Tardif (F). ٢٢٢٠٣ - قُصْبِيَّة ، لُقْبِيَّة ، مِثْخَار Tardy, Late (E). هو ما كان بطيء النمو أو ما طُلحَ زِنَ نموهُ أن في الحيوان أم في النبات . م. قصبة .

Epinaete (F). ٢٢٢٠٤ - قُصْبِيَّة نمت تعريفياً يطلق على كل نبات أو جزء منه اصابتها القضاة .

Biscutella (S). ٢٢٢٠٥ - قُصْبِيَّة * Biscutelle (F). Biscutella (E).

جنس نباتات عشبية حولية من فصيلة الباسليات . أنواعها المعروفة قليلة العدد . منها : بعض مناطق حوض البحر الأبيض المتوسط || سوقها فراء منتصب . أوراقها متعاقبة . نصلها ملقحة ، مقلوبة ، مستطيلة النصال ، مسننة الحتار . أزهارها طرفي . أزهارها صفراء اللون . ثمارها قصبية الشكل .

أعرف أنواعها وأشهرها :

٢٢٢٠٦ - قُصْبِيَّة العمود ، قُصْبِيَّة جَبَل طَارِق

Biscutella columnea (S). Biscutelle de Gibraltar (F). أوراقها الجاهية ملقحة الشكل ، مستطيلة النصال ، متعاقبة التنوين . أما الساقية والفرعية فرمحية الشكل متقاربة الإسنان . تنويرها ربيعي .

٢٢٢٠٧ - قُصْبِيَّة حَقِيقَة

Biscutella genuina (S). Biscutella vraie (F). منها : بعض المناطق الجافة من لبنان وسوريه . أوراقها الجاهية متراكبة ، أما الساقية والفرعية فقليلة العدد متعاقبة التنوين . تنويرها ربيعي .

٢٢٢٠٨ - قُصْبِيَّة مُسَنَّنة

Biscutella dentata (S). Biscutelle dentée (F). منها : بعض المناطق الجبلية ، تتميز بكثرة عدد أوراقها الساقية والفرعية ويكثر استنابها الحادة الشائكة ، تنويرها ربيعي .

Patella (S). ٢٢٢٠٩ - قُصْبِيَّة * Patelle (F). Patella (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مبدلات الأرجل أمليات الخياشيم الجاهية وفضلية القصبليات . أنواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار العالم . تعيش على الصخور المنورة || اصداؤها جلونية أو صاجية أو مظلية أو أهليلجية . جميعها وسيدة المضارم ، مألوفة للشاء الداخل القلبي المادة ، غفدة الشفاء الخارجي الختيان الألوان ، مسنة الحتار || اجسامها متباينة الاحجام التي تراوح من ٣ الى ١٠ سم . ارضيتها رمية فضفاضة . رؤوسها صغيرة ثنائية القواس الميونة القواعد الخارجية . غياشيمها صفيحات متساوية الترتيب تغطي الجسم تحت الرداء || جميع أنواعها مأكولة مستحبة الطعم .

الشرقية . يالفت المراعي وضايف مجاري الماء حيث تكثر طعان البقر الرستني والظباء . ملجته الحيائي جماعي ، فويجه يد من ١٠ الى ٣٠ زوجاً || جسمه مستدل القدر يطول نحو ٢٥ سم . ثوبه الى السواد القمعي . قوامه جتانه يبيض الصمغ الاخاربية . متفاده مرجاني اللون . حدة عينه كسنتية . رصاف الى السرعة الجلتية || قوته الخشرات والظيدان والبلور ويلتقط القراد والطلح من على ظهور الظباء والافئار || يدفن حقه في السند المشوك . حقه شارف الرجاية والكبر ، قطره نحو ١٢٠ سم . شكله كالصالح يملو طوي يرتفع نحو ١٥ سم . الاثني تضع من ٥ الى ٧ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو ١٣ يوماً .

٢٢١٩٠ - قُصُوع ، إِذْبَاس Lovée (F). Gathering (E). عروج الزرع من الارض او ظهور بوادر البرور على سطح التربة .

٢٢١٩١ - قُصْبِيَّة * Phragmites (S). Phragmite, Canne à balais (F). Reed (E).

لبات لمجوري من فصيلة النجيليات . ساقه قصبية ، متعاقبة السلاحيات والكماير ، تطول نحو ٣ امتار . أوراقها غمدية ، حاشية ، صفيقة النصل الجاهية ، المسن الحافة ، البحري اللون || ازهاره عامي الاوتكاز ، يشكل مجموعة من السنايل المتعاقبة . ازهاره بنفسجية اللون || منتبه جميع الاصناف المتعددة الحارة من العالم القديم . يكثر بوجوه في المواقع الرطبة وعلى ضفاف مجاري الماء || ويدعى في مصر والسودان « الحنطة » .

٢٢١٩٢ - قُصْبِيَّة Tube هي في بعض النباتات انبوبة الزهرة التي ترتكز عليها البتلات . ج. قصاب .

٢٢١٩٣ - قُصْبِيَّة الجَذع Bréviscape (F). Breviscape (E).

٢٢١٩٤ - قُصْبِيَّة الجِنَاح Brévipenne (F). Brevipennate (E).

٢٢١٩٥ - قُصْبِيَّة الرُسْع Court-jointé (F). Shors-paterned (E).

من كان رسنه دون المعدل الوسط وهو من صوب الخيل .

٢٢١٩٦ - قُصْبِيَّة العُمر Brachybiote (F). نمت تعريفياً يطلق على كل حيوان قصير العمر من أي جنس كان .

٢٢١٩٧ - قُصْبِيَّة القَدَم Brévipède (F). Brevipède (E).

٢٢١٩٨ - قُصْبِيَّة المِثْخَار Brévirostre (F). Brevirostrate (E).

٢٢١٩٩ - قُصْبِيَّات التَرْتُون Brachycera (S). Brachycères (F). Brachycera (E).

لثة حشرات من ذوات الجناسين فصائلها واجناسها وانواعها نحو ٢٥٠٠٠٠ اصنافها جميع اصناف العالم || اشهر فصائلها : اللبابيات والبريات والمتريرات والبريات والمجيبات .

٢٢٢٠٠ - قُصْبِيَّة القَلَم Brachystylée (F). نمت تعريفياً يطلق على كل زهرة قصيرة قلم السمة .



قُصْبِيَّة



قُصْبِيَّة



قُصْبِيَّة



قَصَب أَحْمَر لِلْعَاد

٢٢٢١٧ - **قَصَب لُبَانِي** (S).
 Vinca libanotica (S).
 Pervanche libanale (F). Lebanon Periwinkle (E).
 نوع من القصاب. عشية طيبة ممررة. منبتها تمتد من السواحل اللبنانية حتى ارتفاع ٢٠٠٠ متر من سطح البحر. ساقها مسطحة لا مجذرة. أوراقها متعاقبة، حاشية، مسطحة الاثنا، نصلها شبه قلبية الشكل، جملة الخصار، جرداء البشرة. أزهارها محورية الأركان، متعقة، خماسية البتلات، زرقاء اللون، وقد تكون بيضاء في بعض المواقع || أرواقها الخصار والجلفة لا تخلو من المنافع الطبية أعصها في السيلان وانتفاخ الطمث. وقد تحوي بعض النباتات الكثيرة النفع.



قَصَب صَنِير

٢٢٢١٨ - **قَصَب مُسَطَّح** (S).
 Vinca herbacea (S).
 Pervanche herbacée (F).
 عشية برية ممررة قليل وتلوي في الشتاء. ساقها مسطحة تطول من ٣٠ إلى ٦٠ سم. أرواقها أحليجية مهدبة الختار. أزهارها على الزرة البنفسجية || أزهارها ينسمر من أيار إلى حزيران.

٢٢٢١٩ - **قَصَب وَرْدِي** (S).
 Vinca rosea (S).
 Pervanche rose, P. de Madagascar (F).
 نوع من القصاب المسمر وقد يزرع كزهر في البلاد المنتجة الحاررة. ساقه مستقيمة لينة تطول من ٣٠ إلى ٤٠ سم. أوراقها أحليجية مقبولة القاعدة. أزهاره عرسطة القد، وردية اللون || أزهاره ينسمر من الربيع إلى الخريف.

٢٢٢٢٠ - **قَصَابَة** (F).
 Volis (F). Lop and top (E).
 الاغصان والافئاد المفصلة عن الشجرة.

٢٢٢٢١ - **قَصَابَة *، قَصَب الْمَاء، قَصَبُ** (S).
 Lutra (S). Loutre (F). Otter (E).
 جنس حيوانات لبونة من السرمويات وردية الرأس. أنواعه ثمانية موطنها ضفاف وبحير بعض الأنهار الآسيوية والاروية والاركتية، جميعها قازية. قوتها الأسماك. أجسامها مستطيلة، وروبيها عريضة، قوائمها قصيرة، حطب أصابها تميمها هل الباسية، أذناها طويلة. أؤلواها كيفية الورير القصير. ألوانها إلى الجوزة موانجها يختلف باختلاف الأنواع.

٢٢٢٢٢ - **قَصَابَة، هَبَج** (F).
 Etiollement (F).
 Etiolation, Sickness (E).
 اصفرار النبات ونحوه من جراء فقدان الخصب سبه التلل أو الطمر أي قلة النور أو انعدامه.

٢٢٢٢٣ - **قَصَام** (S).
 Lutra (S). Loutre (F). Otter (E).
 لبث من الحنفى وثيل هو الطهام.

٢٢٢٢٤ - **قَصَابِي** (F).
 Judiciaire (F). Judiciary (E).
 كل ما هو مختص بالقضاء.

٢٢٢٢٥ - **قَصَب** (F).
 Luzerne (F).
 هو القصة. الحلبا.

٢٢٢٢٦ - **قَصَب** (F).
 Recéper (F).
 To cut down close (E).
 قصب الكر. قلع اغصانه أيام الربيع.

٢٢٢٢٧ - **قَصَبَة** (S).
 Dendrochalcid (S).
 Dendrochalcid (F).
 جنس طير من الجواثم مشروب الماتير وقصيلة البساتين. ألوانه المعروفة خسة. أطاها تمتد من الهن إلى جزر

٢٢٢١٠ - **قَصَبَات *، قَصَبَات** (S).
 Patellidae (S).
 Patellidae (F). Patellidae (E).
 فصيلة حيوانات بحرية من الرغويات مملات الاربل اميات الخياشيم الحظية. اجناسها قليلة العدد اما انواعها لكثيرة منتشرة في جميع بحار العالم. تعيش على الصخور المغمورة قرب الشواطئ || أحرف اجناسها وأشهرها القصبة والشنكولة.

٢٢٢١١ - **قَصِيل** (S).
 Zرع الشمر يحرق اغصان لعلل الدواب.

٢٢٢١٢ - **قَصْن *، قَصْن** (F).
 Gravier pour béton (F). Gravel of concrete (E).
 حصى صلبة القد متساوية الحجم عادة المكسر تستعمل في الباطون.

٢٢٢١٣ - **قَصَب أَحْمَر الْمَنَادَة *، أَو قَصَام** (S).
 Xiphorhynchus procursus (S).
 Falcirostre à bec en sabre (F).
 نوع من القصاب. طائر من فصيلة الفلويات. موطنه بعض مناطق أمريكا الجنوبية وأغصها النريان. يألف الأراجح الجبلية حيث يكثر الرقل والوقل || جسمه مستدل القند بطول نحو ٢٥ سم. بما فيه الخنق الذي يبلغ ٧ سم. ينسج بمنقاده المستطيل الأحسن كالحسام العربي وبذيله المستطيل المستدير الطرف. ثوبه متداخل الألوان. وراقه ويطه إلى السمرة الزيتية الموحج. زوره أبيض. رأسه وقنقه وصدره إلى البياض الأصفر يملوه تشيز مستطيل احمر. جناحاه وذنبه إلى الجوزة. حدة عينه كسنية اللون. منقاده وساقه إلى الخسفة السوداء || طيرانه خفيف الحركة. قصير القنوط. قوته البندان وإساريع الخشرات يتلسمها إنها كانت بمسقة منقاده المستطيل || يدن عنده في تجاريف الأجارح. الآتي تقع من يفضين إلى ثلاث بيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو ١٥ يومًا.

٢٢٢١٤ - **قَصَب، عَنَابِيَة، وَنَكَا** (S).
 Vinca (S). Pervanche (F). Periwinkle (E). Stinngrün (D). Pervinca (I).
 جنس نباتات عشية وعشوية من فصيلة الفلويات. أنواعه ١٢ معظمها بري وبعضها زراعي. تربتي. أرواقها متعاقبة متعقة كاملة. أزهارها أبليية فردية طويلة الزناد قيمة الكأس خماسية البتلات، يكثر فيها اللون الأزرق. أشهر أنواعها ما يتبع:

٢٢٢١٥ - **قَصَب صَغِير *، قَصَب مِصْرِي** (S).
 Vinca minor (S). Petite pervanche, Violette des serpents (F).
 نوع من القصاب المسمر غروب حديد. ساقها عشوية فرعاء تملو من ١٥ إلى ٢٠ سم. أرواقها سنجة بالابيض أو بالأصفر. أزهارها عادية أو مكسبة منها الابيض والأزرق والبنفسجي والوردي والاحمر || أزهارها ينسمر من شباط إلى حزيران.

٢٢٢١٦ - **قَصَب كَبِير *، قَصَب** (S).
 Vinca major (S).
 Grande pervanche, Violette des sorciers (F).
 نوع من القصاب المسمر. ساقه عشوية فرعاء تملو من ٣٠ إلى ٥٠ سم. أرواقه صلبة القد، نصلها سنانى الشكل، قلمي القاعدة، مسنج الصلصة أو مطوق الختار بالأصفر. أزهاره كبيرة القند قطرها نحو ٥ سم. لونها إلى الزرقاء الجبلية || أزهاره ينسمر من آذار إلى حزيران.



قَصَابَة

S. sempervirens (S). **قصيب الذهب الدائم الخضار**
Verge d'or toujours vert (F).

S. latifolia (S). **قصيب الذهب العريض الورل**
Verge d'or à larges feuilles (F).

S. graminifolia (S). **قصيب الذهب المصني الورل**
Verge d'or à feuilles de graminées (F).

S. multiflora (S). **قصيب الذهب الكبير الزهر**
Verge d'or multiflora (F).

S. canadensis (S). **قصيب الذهب الكندي**
Verge d'or du Canada, Gerbe d'or (F).

S. serotina (S). **قصيب الذهب المختار**
Verge d'or tardive (F).

S. virga-aurea (S). **قصيب الذهب المبلول**
Verge d'or commune (F).

S. nutans (S). **قصيب الذهب المنحني**
Verge d'or penchée (F).

Bactériacées (F). **٢٢٢٢٧ - قَصِيَّاتٌ**
Bacteriaceae (E).

فصيلة من البكتيريا تتميز بشكلها القفصية . خلاياها
اسطوانية مستقيمة تنقسم حودياً وباتجاه واحد . اجناسها
ثلاثة : البكتيريوم والبليسلوس والثرانف . اما الانواع
فمديدة وهي مذكورة في مواقعها التسلسلية .

Procès (F). Law-Suit (E). **٢٢٢٣٨ - قَضِيَّةٌ**
هي النزاع الذي يعرض على المحكمة .

Affaire en état (F). **٢٢٢٣٩ - قَضِيَّةٌ مُعَدَّةٌ لِلْحَكْمِ**
هي القضية التي استوفيت فيها المرافعات .

Chat (F). **٢٢٢٤٠ - قَطٌّ**
هو السنور ، اظله .

Serval (F). **٢٢٢٤١ - قَطٌّ سَمِيرٌ**
هو البج ، اظله .

Ganges, Ptérocles (F). **٢٢٢٤٢ - قَطَا**
Ptérocles, Sandgrouse (E).

جنس طير من فصيلة الجوبيات وأحد قطاة قطاط . انواعه
مديدة جميعها قريبة الشبه من الحمام تتميز باستطالة ردة
ريشتين من اخفيهما تكنتان الذهب . وهي سريرة
الطيران تطير مسافات شاسعة في طلب القوت والماء .
تألف الثنائي ، قوتها الجيوب واليزور ونواحي بعض
النباتات . تعيش اسراباً كبيرة . تثن في ادموس ترصه
مرقطة || وقوصف القطا بالهداية والعرب تصرب بها الخلل
في ذلك . ومن قول الشاعر :

« والتاس احدى في القبح من القطا
واضل في الحسنى من الغربان »

ويقول في وصفها :

« اما القطاة فاني سرف انتها
نمناً يوافق متى بعض ما فيها »

« سكا مخفورية في ريشها طرف
سود قوادها صهب غوانها »

اعرف انواعه واشهرها ما يتبع .

انزاج وبعض الاقاليم الافريقية || اجسامها صغيرة تطير
من ٢٥ الى ٢٢ سم . اجنتها ضيقة مستطيلة . اذناها
فاقة . رالها بالغة الطول . اذواها الى السواد الاسع يملو
مراج اخضر او بنفسي . حاسرها غططة بالابيض .
صدورها وبطنها الى البياض الاشر || ملاجئها الخياطة
جماعية . تكئن عشاقها في قر الانجار الباسقة . الاثى
تحضن من بيضة الى يشتين ثلاث مرات في الحبل .

٢٢٢٢٨ - قَضِيَّةٌ ، سَمِيرٌ ، طَرِيحٌ
Cadaba (S). Cadaba (F). Esel-wood (E). Eszelbaum
(D). Cadaba (I).

جنس نباتات معمرة من فصيلة الكبريات . انواعه قليلة .
جميعها مجبريات ونباتات سرحة او شائكة . اوراقها كاملة
متتالية ، تملها جامد النسيج ، بحري اللون . ازهارها
فردية ، عذرية وتاجية . ثمارها قرنية اسطوانية ، لونها
الحامزة المرة || يقال ان عصارتها تلثم الجرح وتطرد
الديدان المعوية .

٢٢٢٢٩ - قَضِيَّةٌ
نبت من الحشيش ينبت في السهل . ج قصات .

Terrain peu caillouteux (F). **٢٢٢٣٠ - قَضِيَّةٌ**
Pebbley ground (E).
هي التربة القليلة الحصى . اما التربة الكثيرة الحصى
فتسمى حصية .

Pépins de raisin sec (F). **٢٢٢٣١ - قَصِيٌّ**
هو زرد الزبيب اني العنب المجفف . (E). Raisins-stones

Pénis (F). **٢٢٢٣٢ - قَصْبٌ**
اسم شامل يطلق على ذكر كل حيوان .

Branche (F). Branch, Bough (E). **٢٢٢٣٣ - قَصْبٌ**
كل نبت من الاضمان يقصب . ج قصب وقصبان .

Ente (F). **٢٢٢٣٤ - قَصْبٌ التَقْطِيعُ**
Graft, Branch bearing a graft (E).
قصب او فصن دقيق له من زيمة واسدة الى ثلاث زيمات
وهو يصلح لتقليم وقت يستعمل لعملاً للشرة .

٢٢٢٣٥ - قَصْبٌ الحَمَلُ
Courson, Coursonne (F). Shoe cut down to three-
or four eyes (E).
كل قصب قلم ورلك منه في ثلاث الى اربع براعم ثمرة .

٢٢٢٣٦ - قَصْبٌ الذهب ، عَصَا الذهب
Solidago (S). Solidage, Verge d'or (F). Golden-rod,
G. wings (E). Goldruta (D). Solidago, Verga
aurea (I).

جنس نباتات معمرة من فصيلة المركبات الشامية الزهر .
انواعه نحو ٦٠ منطها عشبي وبعضها جبني . اوراقها
متعاقبة رهيبة . ازهارها غصية شامية متتالية جميلة الشكل
صفراء اللون || اعرف انواعه واشهرها :

S. glabra (S). **قصيب الذهب الامرد**
Verge d'or glabre (F).
S. bicolor (S). **قصيب الذهب الثنائي اللون**
Verge d'or bilocore (F).
S. rigida (S). **قصيب الذهب الجامد**
Verge d'or rigide (F).



قَصْبٌ



قَصْبٌ الذهب



قطاة كدرية

٢٢٢٥٢ - قُطَاس * ، قُوتَاش ، خُشْطَاء ، يَاك

Poephagus (S). Yack (F). Yak (E).

جنس حيوانات لبونة من فصيلة البقرليات انزوا المهرقة
اثنتان موطنها جبال التبت من ارتفاع ٢٤٠٠ الى ٥٥٠٠ م.
من سطح البحر || والقطاس حيوان كبير الخنث يملو
من ١٦٠ الى ١٨٠ سم. ويزن من ٥٠٠ الى ٦٠٠
كيلو. شكل جسمه يأخذ من البيسون والجاموس والثور.
رأسه كراس الثور الا انه محدد التقص ، مستطيل القرون
للمتصصة . خنثايتان متبادلتان ، عينايتا كيرتات ، اذناه
مستطيلتان . قوائم قوية . ثوبه الى السرة الباقية السوية
تملحوا رقيقة صهابة ، خطمه وذخرته ونبمة ذنبه بيض .
ذنبه يشبه ذنب الفرس وكان الترك يزبنون فيه العلم . قوته
الاضطراب . سره كبير المدد . اثناء تنعم يقفورا واحدا
في الحقل يسير وراء امه فور وضعه || اما ثوباء فيها :

P. musus (S). Yack musus (F).

القطاس الاخضر

P. grunniens (S). Yack commun (F).

القطاس الخفيف

ومثلك القطاس الداكن وهو قريب من الخفيف يشمل
بعض الفروق . يستعمل في الجبل واقتل بالراجلة . حليب
انائه غزير المادة السكرية ، مستحب العرف .

Secteur, Domaine (F).

قُطَاع

Sector, Domain (E).

Coupe (F). Cutting (E).

قُطَاعَة

٢٢٢٥٥ - قُطَاف ، خِرَاف ، صِرَاف

Cueillette (F). Gathering (E).

اجتباء الكثير او خلافة من الانتاج النباتي عند الادراك .

Vendange (F).

قُطَاف الكَرْمَة

Vintage, Grape-gathering (E).

اجتباء مناقيد العنب او وزن قطاف العنب .

Polyandrie (F).

قُطَامَة

Polyandry (E).

القُطَامَة تعدد الأزواج عند المرأة الواحدة .

Rostrhamus (S).

قُطَامِي * ، قُطَامِي

Rostrhème (F).

جنس طير من حماره الحذاء وقصيلة الصقريات . اقوامه
ثلاثة موطنها البلاد الحارة . وهو عزيز الوجود ، كبير
الجملة ، يكثر من اضطر الطيور التي يصاد بها || يألف
الحيوانات ويجاري الله . يثنى عنه في الانجبار القرية
من الماء . اثناء تبيضه وتحسن من رقتين الى ثلاث رفات
مستطيلة الشكل حطباء اللين .

Légumineuses (F).

قُطَانِيَّات

هي الفزريات فصيلة نباتية ، اطليا .

Henné (F).

قُطَب

هو الحناء ، اطليا .

Pôle (F). Pole (E).

قُطَب

القطبان ، جغرافياً ، هما طرفا محور الارض الذي يمر
بمركز الكرة الارضية ، وهما القطب الشمالي والقطب الجنوبي .
ويبلغ للسافة بين خط الاستواء وبين كل من القطبين نحو
عشرة الاف كيلومتر . اما القطر القطبي للارض فهو



قطاس

Catapodium (S).

٢٢٢٥٣ - قُطَاب

Catapode (F). Catapodium (E).

نبات عشبي بري معمر من فصيلة النجيليات . يألف
الربال البحرية . يكثر من النباتات الطولية في لبنان .

٢٢٢٥٤ - قُطَاة الرمال ، دُيَلَم

Pterocles arenarius (S). Ganga des sables (F).

اكبر انواع القطا . طولها نحو ٣٥ سم . ثوبها الى الصبغة
الخمرية يملو توشيح يراعي واصفر . بطنها عاتق اللون .
متقاربا اسود . موطنها شاسع الاطراف يمتد من رمال آسية الى
ومال افريقية .

٢٢٢٥٥ - قُطَاة شَرْيَافِيَّة ، جُوتِيَّة

Pterocles orientalis (S). Ganga oriental (F).

طائر من القطا . طولها نحو ٣٠ سم . ثوبه الى الصبغة
الخطية يملو توشيح ابيض ارقط . صدره الى الجؤرة الباهتة ،
بطنه الى السرة ، متقاربا وبطن جناحيه وقوادع الى السود .
موطنه فياني الشرق الاذن .

٢٢٢٥٦ - قُطَاة كَهْمَرَاوِيَّة ، خُطَاط

Pterocles exustus (S). Ganga brûlé (F).

طائر من القطا . متوسط القد طولها نحو ٣٠ سم . ثوبه الى
الصبغة الخطية تملو رقيقة الى الجؤرة الفاتحة الزاوية .
صدره وبطنه الى الصفرة الموشة بالاسمر || سره متوسط
المدد . موطنه الصحاري .

٢٢٢٥٧ - قُطَاة كُدْرِيَّة * ، كُدْرِيَّة

Pterocles alchata (S). Ganga cata (F). Large pintail-sandgrouse (E).

طائر من القطا . طولها نحو ٢٧ سم . ثوبه الى البنية
اكثر الظاهر والبطن . اسفر الخلق . اسود الحمار .
موطنه فياني صحاري الشرق الاوسط وافريقية الشمالية
والغربية . اسراهه كثيرة المدد .

٢٢٢٥٨ - قُطَاة مَرْقَلَة

Pterocles senegalus (S). Ganga du Sénégal (F). Spotted sandgrouse (E).

طائر من القطا . صغير القد طولها نحو ٢٥ سم . ثوبه الى
الصبغة المرقطة بالاسمر والاخر || موطنه رمال السنغال
والصحراء الكبرى .

٢٢٢٥٩ - قُطَاة مُكَتَلَة

Pterocles coronatus (S). Coronated sandgrouse (E).

طائر من القطا . صغير القد طولها نحو ٢٦ سم . ثوبه الى
الصبغة الغبراء تملو رقيقة سمر . رأسه ناش بعض الريش
الذي يبدو كالاكليل . سره متوسط المدد . موطنه المناطق
الاستوائية الافريقية .

٢٢٢٥٠ - قُطَاة مَرْفَحَة ، دُليم

Pterocles lichtenheini (S). Ganga rayé (F). Close-barred sandgrouse (E).

طائر من القطا متوسط القد ، طولها نحو ٢٨ سم . ثوبه
الى الصبغة الغبراء يملو توشيح اسمر يقطب البسائط
والليل . صدره اطلل ارقش . بطنه وزمكا الى البياض
التي . سره متوسط المدد . موطنه افريقية الاستوائية .

٢٢٢٥١ - قُطَارَة ، خُشْطَاء

Compte-gouttes (F). Drop-tube (E).

انبوب من قزاز مذهب الطرف المستطع يستطاع بواسطته
تنقيط المواد السائلة نقطة نقطة .

نشوية مأكولة. شراخها يعلو من ٦٠ إلى ١٢٠ سم. ازهارها عاجية البتلات، صفراء الاسدية. اوراقها قرصية الانتشاب، كبيرة القد، زنادها يطول نحو المتر. ازهارها صيني.

٢٢٢٧٥ - قُطْبَة عَالِيَة ، سَهْمُ الْمَاءِ الْعَالِمِ

Sagittaria natana (S). *Sagittaire flottante* (F). عشية سبروتية تريينية معمرة تعيش في الأكواريوم. شراخها يعلو من ٣٠ إلى ٦٠ سم. اوراقها قرصية الانتشاب، طويلة الزناد، نصلها لا تقاسي الشكل والحجم يوم حل سطح الماء. ازهارها ضمية التجميع، بتلاتها يضاء اللون شفافا || ازهارها صيني.

٢٢٢٧٦ - قُطْبَة تَجِيلِيَّة ، سَهْمُ الْمَاءِ التَّجِيلِي

Sagittaria graminea (S). *Sagittaire graminée* (F). عشية تريينية زهية. شراخها دقيق نحيل يعلو من ٣٠ إلى ٦٠ سم. اوراقها قرصية فالقرصية مستطيلة الزناد، نصلها متوسط الحجم عايق الخصار اما الشراخية الهوائية فضيقة النصل الاطوي اليابات الخصار. ازهارها معلانية. اسديتها كبيرة رافعة الجسم، حليلة البتلة. ازهارها صيني.

٢٢٢٧٧ - قُطْبَة هَائِكَة ، سَهْمُ الْمَاءِ الْهَائِكِ

Sagittaria heterophylla (S). *Sagittaire hétérophylle* (F). عشية جاذبة معمرة مهدا امريكية الثشالية. شراخها يعلو من ٦٠ إلى ١٠٠ سم. ازهارها السفلى لاطقة مربعة، ازهارها العليا مسطحة مجدية. اوراقها قرصية الانتشاب، مستطيلة الزناد. نصلها هالك للشكل والحجم والون. ازهارها صيني.

٢٢٢٧٨ - قُطْبَرُوس

Catabrosa aquatica (S). *Catabrose aquatique* (F). نبات عشبي يربي حولي من فصيلة النجيليات. منيته ضفاف مجاري الماء. يعتبر من النباتات الطوعية في لبنان.

٢٢٢٧٩ - قُطْبِي

نبات يصنع منه جبل مرم وهو غير من الكنبار (السان)

٢٢٢٨٠ - قُطْبِي

نمت تحريتي يطل على كل ما له صلة بالقطب.

٢٢٢٨١ - قُطْبِيَّة

خاصة اتجاه الايزة المنخفضة الى القطب.

٢٢٢٨٢ - قُطْبَة

التحقيرة من البليخ وغيره. تقول حات قطة من البليخ.

٢٢٢٨٣ - قُطْر

خط مستقيم يمر بمركز الدائرة وينتهي عند طرفيها المتقابلين فيقسمها الى قسمين متساويين. وهو في مساحته ثلث المحيط. قطر المربع والمستطيل والمعين والشبه بالمعين هو الخط المستقيم الواصل بين الزاويتين المتقابلتين من هذه الاشكال.

٢٢٢٨٤ - قُطْرَاس حَقْلِي

Lycotocoris campestris (S). *Lycotocoris campestris* (F). حشرة مفترسة من فصيلة القترسيات. جسمها صغير القد.

اتصر من قطرها الاسرائلي بنحو ٤٣ كيلومتراً. والقطبان منطوسياً يتجاذبان اذا كانا مختلفين، موجب وسالب، ويتقاربان اذا تشابها.

٢٢٢٦٢ - قُطْب جُتْرِي

Pôle sud (F). South pole (E).

٢٢٢٦٣ - قُطْب حَيْرَاقِي

Pôle animal (F). Animal pole (E).

٢٢٢٦٤ - قُطْب سَالِب

Cathode (F). Negative pole (E). هو المحيط، اقلية.

٢٢٢٦٥ - قُطْب حَقْلِي

Pôle nord (F). North pole (E).

٢٢٢٦٦ - قُطْب مَتَوَكَّد

Pôle conséquent (F). Consequent pole (E).

٢٢٢٦٧ - قُطْب مَنَظِّطِي

Pôle magnétique (F). Magnetic pole (E).

٢٢٢٦٨ - قُطْب مُوجِب

Anode (F). Positive pole (E). هو للصدء، اقلية.

٢٢٢٦٩ - قُطْب لَبَاقِي

Pôle végétal (F). Vegetal pole (E).

٢٢٢٧٠ - قُطْبَان

Brachypodium (S).

Brachypodium, Bromes chiendent (F). False brome grass (E). Kurzstamm, Zwenke (D). Páleo, Pennacchi (I).

نبات عشبي يربي من فصيلة النجيليات قريب الشبه من المكروش يكثر في البور وفي الاراضي المنحادة رصاء المال ويسكن عليه. وهو اذا كثر بين الزروع وفي الاراضي المزروعة استوجب الابادة.

٢٢٢٧١ - قُطْبَة ٥

Ketupa (F). هي الخروز، طائر من البويات.

٢٢٢٧٢ - قُطْبَة ، سَهْمُ الْمَاءِ

Sagittaria (S). *Sagittaire, Fléchière* (F). *Adder's tongue, Arrow-head* (E). *Peilkrout* (D). *Sagittaria, Barba silvana* (I).

جنس نباتات عشبية، جلسمورية، مائية، معمرة، من فصيلة الزمراريات. انواعه ١٧ جميعها من نباتات البلاد الحارة والمعتدلة اوراقها صموية الشكل، مستطيلة الزناد قرصية الانتشاب. ازهارها ثلاثية التكوين والتجميع يطل منها اللون الابيض ثم الاحمر || اشهر انواعه ما يلي.

٢٢٢٧٣ - قُطْبَة شَالِيَة ، سَهْمُ الْمَاءِ الشَالِكِ

Sagittaria sagittifolia (S). *Sagittaire commune, Sagette, Flèche d'eau* (F).

عشبة تريينية سبروتية معمرة مبلولة في المناطق والاحواض. تملو من ٤٠ إلى ١٠٠ سم. اوراقها قرصية وشراخية فالقرصية طويلة الزناد كبيرة القد مستعرضة اما الشراخية الهوائية فضيقة السنان حادة الزناد. ازهارها ضمية، ثلاثية او خاسية التجميع. بتلاتها شفافا للفسج، يضاء اللون، وردية الحمار || ازهارها يستمر من ايار الى آب.

٢٢٢٧٤ - قُطْبَة صِيْنِيَّة ، سَهْمُ الْمَاءِ الصِيْنِي

Sagittaria sinensis (S). *Sagittaire de Chine* (F). عشبة تريينية سبروتية معمرة مهدا الصين. جذاميرها



قطبان



قطبة

Lagotis (F).

٢٢٢٩٠ - قَطْرِب

نبات عشبي بري ، طبي ، من السكيات يدعى لغوتيا ، اطلبها .

٢٢٢٩١ - قَطْرِب

القطرب ، ويدعى أركطين ، نبات شائك الازهار ، ينشعب بمن يمر به . واسع اركطين .

Cilbanarius (S).

٢٢٢٩٢ - قَطْرِبَة

Cilbanarius (F). Cilbanarius (E).

جنس دويبات بحرية من القشريات عشاريات الارجل طوال الذيل وصليحة الباغوريات . انواعها المروفة مدينة منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة || تعيش في الاطوار قرب الشواطئ . ملجأها الحيائي جاعي ، جاماتها متوسطة العدد || اجسامها تظل من ٤ الى ٦ سم . اذواها زاحية الالوان الجلدية وبعضها مجلح .



قطرب

Alkahuraps

٢٢٢٩٣ - قَطْرَبُوس

القطربوس نجم من كوكبة المواء مركزة على رأس البقار اي المواء .

Diomedea (S).

٢٢٢٩٤ - قَطْرَس *

Albatros (F). Albatross, Diomedes (E).

جنس طيور بحرية من كليات القدم . موطنها البحار الجنوبية من جميع خط الاستواء . انواعها سبعة جميعها كبيرة الحجم - عظيمة القدة ، طولها يراوح من ١٦٠ الى ١٨٠ سم . ويصلها تراوح من ٣٠٠ الى ٤٠٠ سم . وهي طيور فصحاء وتقوم قشور وتسرع وتنقض فتصيد ذلك . اوتولها الى البيضاء الناصع بلمسكته اجنحتها السوداء اللون او الطملاء . منتقياها كبيرة القدة ، منتقفة المنسر ، حنطية اللون ، صفر المولج || قوتها الاساك والقشريات والجمف البحرية . تكثر في افصوس ترصه بالثقل . حنطتها بيضة واحدة ترخمها نحو حبة اسابع .

٢٢٢٩٥ - قَطْرَس مَرْتَبِك *

Anthocoris confusus (S). Anthocoris confus (F).

حشرة مفترسة من فصيلة القطرسيات . جسمها صغير القدة ، يطول نحو ٤ سم . رأسها صغير الحجم ، اسود . غطتها معتدل الطول . عيناها صغيرتان ، نازحان ديققان ، مبشرا . الحلب . كوسلها اسود وصحبتها كلك . ظهرها لاسن يتجاوز البياض بزاوين . يطنها الى السرة السوداء . قوائمها الى الشقة السوداء || تألف المواق التي يكثر فيها الحور والصفساف . تعيش تحت القشور . قوتها ما تقتنصه من حشرات .



قطرس

Anthocoridés (S).

٢٢٢٩٦ - قَطْرَسِيَّات *

Anthocoridés (F). Anthocoridés (E).

فصيلة حشرات من رتبة خنطليات الاجنحة وطيفة لخصيات الجناح . اجناسها وانواعها المروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم اصقاع البلاد الحارة والمعتدلة الحارة والباردة || اجسامها صغيرة ، متدلة التباطيط ، ملونة . رؤوسها صغيرة . اعطائها نشطة ، لثائية الاجزاء . عيناها جانبية ، نازحة . قربتها الاستعمارية رباعية الفصل . كوسلها محبة . حياضها صغيرة . ظهرها وروافها لاسقة في معظم الاقتران . حناجب ظهرها لاقية ، تكثر فيها الاضطالة . قوائمها صغيرة || الحشرة الجلجلة مفترسة في

يطول نحو ٤ سم . رأسها محرم ، جزوي اللون . غطتها معتدل الطول . عيناها صغيرتان ، نازحان . زباناها ديققان ، موهبان . كوسلها بني اللون ، جزوي المولج . حنطتها صغيرة . ظهرها لا يلمس كامل البطن ، حنطتها بلون الكوسل بعلوها تدبج حنطي ونعته سمراء . يطنها الى الجفوة الباهتة . قوائمها حنطية || تألف الغابات . قوتها الحشرات الصغيرة والحوام .

Goudron, Polx (F).

٢٢٢٩٥ - قَطْرَان ، قِير

Tar, Pitch (E).

مادة راتنجية تستخرج بالقطار من اعشاب الصنوبر والتنبوب والسزو . ويورسا . ومن القسم الحجري .

Goudron de bols

قطران الخشب

Goudron de houille, Cositar

قطران الفحم الحجري

يحمس في الهواء ويستعمل لطلاء جروح الشجر .

Sapin gracieux (F).

٢٢٢٩٦ - قَطْرَانِي

هو التنوب الجليل ، اطلبه .

Sapin de Cilicia (F).

٢٢٢٩٧ - قَطْرَانِي اَمَصَر

هو التنوب الاناضولي . اطلبه .

٢٢٢٩٨ - قَطْرِب

جاء في كتاب الجلسط : || القطرب طائر يحل الليل كله لا ينام . وقالوا اجدل من قطرب واسهر من قطرب .

Colobus (S).

٢٢٢٩٩ - قَطْرِب * ، قَطْرُوب

Colobe (F).

جنس قرد من فصيلة الهباريات . انواعها المروفة ١٢ جميعها افريقية تألف فاهات واسراج المناطق الاستوائية وما جاورها || اجسامها رفيقة القوام تظل من ١٠ الى ٨٠ سم . تتميز بالندام اهام اذنها . اذواها جطة الشعر . الرأيا تختلف باختلاف الانواع فيها الاسود والابلق والاسمر والاصهب . اذنها تظل من ٥٠ الى ٩٠ سم . || قوتها الثمار والحبوب والجلود . تعيش جماعات كبيرة يراوح عددها من ٤٠ الى ١٥٠ . اناثها تضع جرأ واحدة ترصه نحو ٥ شهر || اما انواع القناري فهي :

C. palliatus (S).

قطرب ابيض الماكب

C. à épaules blanches (F).

C. angolensis (S). C. d'Angola (F).

قطرب انكولا

C. ferrugineus (S).

قطرب حديدي اللون

C. ferrugineux (F).

C. ursinus (S). C. ourson (F).

قطرب دلي

C. kirk (S). C. de Zanzibar (F).

قطرب زنجبار

C. Satanas (S). C. satan (F).

قطرب ساتان

C. guereza (S). C. guérza (F).

قطرب فروزه

C. vellerosus (S). C. à fourrure (F).

قطرب فروي

C. foal (S). C. de Foa (F).

قطرب فوا

C. cristatus (S). C. à huppe (F).

قطرب تنبراني

C. fuliginosus (S). C. fuligineux (F).

قطرب كتي

C. polycomus (S). C. à camail (F).

قطرب مردن

قليلة العدد . تألفت الاغوار والمناقع وضفاف مجاري المياه الدلبة || اجسامها مستطيلة ، اسطوانية الشكل او قرصية . رؤوسها مبطلة الجرم ، شبه مخروطية الشوذن . جميعها رباعية القوائم والاصابع || اعرف اجناسها واشهرها القنطروس والتقطور .

٢٢٣٠٣ - قَطَرُوف * Chotorhoa (S).

Chotorhé (F). Chotorhoa (E). طائر وحيد الجنس والنوع من فصيلة الدفائيات . موطنه يمتد من الهند الى جزر الزايج . يألف الرياض والحراج القريبة من مجاري الماء || جسمه متوسط القد يطول نحو ٢٧ سم . يتميز بكون منقاده الصليح لشبه مخروطي الشكل وباسطالة سباله التي تمتد حتى الزور . جناحه معتدلا الطول . ذنبه عشاري الزوال ، مستدير الطرف . قوبه الزرقه . عيناه كبرتان ، مملوحتان بالافبر . حلقه عينه ذهبية اللون . عنقه وأمل صدره الى الزرقه المرقوشة بالابيض . بطنه وافيخه الى الخضار الاصفر المواج . منقاده ورسده واصابعه الى الطحله السمراء || قوته الحشرات من صغيرها الى كبيرها وبعض البآر اعصها النعنية وبعض البذور || يدخن اقصومه في حبر محتفزه في القرية . الانثى تبيض ٣ الى ٤ بيضات تحضنها متناوبة الذكر نحو ١٣ يوما .

٢٢٣٠٤ - قَطَرُوي Diamétral (F). Diametrical (E).

ما كان تابعا لقطر كوكب خط قطري .

٢٢٣٠٥ - قَطَع ، قَطْل Abattage, Coupe (F).

Felling (E). فصل الاشجار عن اروعها وطرسها على الارض .

٢٢٣٠٦ - قَطْع الودج Jugulation

اسعى طرائق جزر الماشية .

٢٢٣٠٧ - قَطْع طولي Section longitudinale (F).

Longitudinal section (E).

٢٢٣٠٨ - قَطْع منطوي Section conique (F).

Conic section (E).

٢٢٣٠٩ - قَطْع ناقص Ellipse

٢٢٣١٠ - قَطْعَاوَات هي دمجات الاربجل ، اطلبها .

٢٢٣١١ - قِطْعَة Parcelle (F). Parcel, Portion (E).

هي القطعة من الارض التي تولدت في مفهوم المساحة وحدة مقاربة .

٢٢٣١٢ - قِطْعَة الفرس ، قَرَس صَبر Petit cheval (F). Equuleus (E).

قطعة الفرس او الفرس الصغير كوكبة نجوم شمالية المربع مركزها بالقرب من كوكبة الفرس الاوسط || نجمة ثمانية الشكل . عيناه شديدتا الصغر لذلك يبدو كأنه اكد . ثوبه الى الياض الوردي الباهت ، خصه الحوشوية حراء اللون || قوته الكبدان والذويبات الصغيرة .

٢٢٣١٣ - قَطَفَتْ ، قَطَفَتْ ، قَطَفَتْ ، قَطَفَتْ Cuéillir (F).

جَتَى To gather, To cull, To pluck (E).

اقتطع الانتاج من صدره كالثآليل من الاجمار والامازار من السوق والاخصان والاوراق من الثبات ، الخ .

جمع الانواع . اما البرقة فانما تعيش على الثبات وتحت لواء الاجمار حيث تقترس ما تستطيع من حشرات ودويبات .

٢٢٢٩٧ - قَطَرَم Nepeta (S).

Népète, Cataire, Chataire (F). جنس نباتات عشبية عطرية برية ممرسة من فصيلة الشفويات . انواعه نحو ١٥٥ معظمها الغربي المبت يكثر في البراري الرطبة . سيقانها مستقيمة فراء . اوراقها متقابلة متنفقة يضيية الشكل ، نصلها سنب الحافة ، خلى الصفحة السفلى . ازهارها عقديي التجميع . ازهارها فواصة العرف الاغاذ لونها الى الزرقه المتباينة المواج || اعرفها واشهرها ما يتبع .

٢٢٢٩٨ - قَطَرَم اهر * ، حَشِيصَة اهر ، قالدنج جبكي Nepeta cataria (S). Népète cataire, Herbe aux chats (F). Catmint, Catnip, Nep (E). Echtes Katzenkraut, Nept (D). Cataris comune, Erba gattaja, Gattala (I).

نوع من القطرم المينال يعيش في الموائع الرطبة . ساقه منتصبه فراء تملو من ٣٠ الى ٧٠ سم . اوراقه عطرية الرائحة ، زياء النصل . عقايد لينة . ازهاره صغيرة القد ، يضاء اللون زرقا المواج || ازهاره يستمر من ايار الى آب .

٢٢٢٩٩ - قَطَرَم بنفسجي * ، زهر مرثيم Nepeta mussini (S). Cataire violet, C. de Mussini (F).

Violet catmint (E). Nepepflanze (D). Cataria violacea (I). نوع من القطرم . ساقه مسطحة تملو نحو ٤٥ سم . فروعها منتصبه تملو من ٣٠ الى ٥٥ سم . جميعها خلية الماء ، طحلاء اللون . اوراقه يضيية الشكل ، قليلة القاعد . نصلها غشخن اللبس اغضر الصفحة العليا ، خلى السفلى الغراء اللون . عقايد ازهاره رهلة . ازهاره بنفسجي . ازهاره يستمر من ايار الى آب .

٢٢٣٠٠ - قَطَرَم كبير الزهر Nepeta grandiflora (S). Cataire à grandes fleurs (F).

نوع من القطرم ساقه منتصبه تملو من ١٥٠ الى ١٧٠ سم . اوراقه كبيرة القد مزخفة النصل . عقايد رهلة . ازهاره كبيرة زرقا اللون فواصة العرف || ازهاره يستمر من حزيران الى آب .

٢٢٣٠١ - قَطَرُوس Proteus anguinus (S).

Proteé anguillard (F). حيوان قارب وحيد الجنس والنوع من فصيلة القنطروسيات وريقة السرفويات . موطنه بعض اغوار يوفولايفه واعصها لحامسة || جسمه قرني الشكل ، رباعي القوائم ، يطول من ٢٠ الى ٣٠ سم . رأسه مبط الجرم ، شبه مخروطي الشكل . عيناه شديدتا الصغر لذلك يبدو كأنه اكد . ثوبه الى الياض الوردي الباهت ، خصه الحوشوية حراء اللون || قوته الكبدان والذويبات الصغيرة .

٢٢٣٠٢ - قَطَرُوسِيَات Proteidae (S).

Proctidéas (F). Proteidés (E). فصيلة حيوانات قاذية من الضفديات وريقة السرفويات وفرة مستقرات الخيلس . اجناسها وانواعها المعاصرة المعروفة



قطرم اهر



قطرم بنفسجي



لطرؤف



قطن



قطن شائع



قطن



قطن

٢٢٣٢٤ - قُطْلَب مَنزِيَس

Arbutus menziesi (S). Arbousier de Menzies (F). نوع من القُطْلَب، مِهْدَة البلاد الأمريكية. ثَمَرُهُ تَمَلُّو من ١٥ إلى ٣٠ م. أَوْرَاقُهُ كَبِيرَة القَد. اِزْهَارُهُ عَنُقُودِي التَّجْمِيع. اِزْهَارُهُ بَيْض. ثَمَارُهُ وَرْدِيَّة تَمَلُّو نَحْو ٣ م.

٢٢٣٢٥ - قُطْلَبَة ، مَلَاعِيْلِيَّة * Cactleya (S).

Cactleya (F). Cactleya (E). جَنْسُ نَبَاتَات حَمَلِيَّة مِنْ الْجَوْثَلِيَّات. اِنْبَاطِهَا الْمَرْبُوعَة عَدِيدَة، مَتْنِبُهَا أَمْرِيكِيَّة الْاِسْطَوِيلِيَّة || أَوْرَاقُهَا مَسْطِيطَة النِّصَالُ لِمَتَسَاكِلَةِ الْمُقَرَّرَةِ كَالْمَلَاخِيقِ، نِصَالُهَا جَمْلَةٌ الْخَضِرَاءُ الْبَحْرِي. اِزْهَارُهُا كَبِيرَة الْبَيْضَات الْفَارِشَة الْخَضِيعَة || تَزْدَرُجُ فِي الْمَرَاكِن لِكُنْهَا تَحْضِي الْبَرْد.

٢٢٣٢٦ - قُطْمُ Orgame (F). Orgame (E).

حَالَة الشَّقِيقِ اَي الْاَعْمَاطِ الْمَطْلُوقِ اَي تَعَقِبِ التَّجِيعِ وَتَسْقِيهِ الرِّزْقِ.

٢٢٣٢٧ - قُطْمِيلَار Hille (F). Hilleum (E).

هُوَ الْفَلَقَةُ اَلَّتِي فِي الثَّلَاةِ يَحْيِي نَكْتَةً يَضَاءُ عَمُودَةً الْاَلْبَاتِ.

٢٢٣٢٨ - قُطْمِيمِ Tégmen, Tégumen (F).

Tegument (E). هُوَ السِّبْرَاءُ اَي الرِّشَالُ الْبَاطِنِي الَّذِي يَغْلِفُ الْوَبْرَةَ وَالْبَزْرَةَ.

٢٢٣٢٩ - قُطْن Croupion (F). Parson's nose (E).

هُوَ مَنَتِ ذَنْبِ الْمَلَأَرِ رَاجِعِ ذَنْكِ ج. اَقْطَانِ.

٢٢٣٣٠ - قُطْن ، حَقْوُ Lombes (F). Lumbar (E).

٢٢٣٣١ - قُطْنِي ، بَرْنَس ، طُوطُ ، عَقْبُ ، كُرْسُف Gossypium (S).

Cotonnier (F). Cotton plant (E). Baumwolle (D). Cotone (I). جَنْسُ نَبَاتَات زُرَاعِيَّة صِنَاعِيَّة مِنْ فَصِيلَةِ الْاَلْبَازِيَّات. اَنْوَاغُهَا عَدِيدَة مَتْنِبُهَا ثَمَرِيَّة مَصْرُوعَة تَعْمِشُ عِدَّة اَحْوَالٍ وَهِيَا سَوِيلَةُ تَعْمِشُ بَعْضُ الشُّهُورِ اِلَّا اَنْ تَمَ دَوْرَتُهَا الْحَيَاتِيَّة وَتَقْبِيسُ.

تَعْرِيفُهُ - الْفُطْنُ الزَّرَاعِي، يَرْبَعُ حَامٍ، يَنْصَفُ بِالْحَمَلِيَّةِ اَلتَّالِيَةِ : جَنِيَّةُ فَرْوَاهُ تَرْتَفِعُ مِنْ ٨٠ اِلَى ٢٠٠ م. تَزْكُرُ عَلَى جَنْثٍ مَسْتَقِيمٍ تَمَلُّو سَاقٍ لَدِيَّةٍ ثَمَّ غَشِيَّةِ التَّرْكِيبِ تَنْفَرَعُ مَتْنِبُهَا الْفُتُونُ وَالْاَلْفَانِ || اَوْرَاقُهَا مَعْتَقَةٌ كَثِيَّةٌ مُقَصَّصَةٌ رَاجُوحٌ عَدَدُ نَفْسُومِهَا مِنْ ٣ اِلَى ٩ || اِزْهَارُهَا وَرْدِيَّة ، كَبِيرَةٌ الْقَد ، جَرِيَّةُ الشَّكْلِ تَزْكُرُ عَلَى مَسَالِقِ

مَحْوَرِيَّة . اَلْوَنَانُ خَضِيَاءُ اَحْمَرُ الْاَسْفَرُ وَالْاَحْمَرُ وَالْاَبْيَضُ . اَلْوَزْرَةُ كَامِلَةٌ التَّرْكِيبِ ، عَشْوِيَّةٌ ، خَاشِيَةُ الْقَعَالَاتِ وَالْبَيْضَاتِ ، عَدِيدَةُ الْاَسْمَانِيَّةِ وَالْمَقَاتِ . عَمَلُهَا يَحْرِي مِنْ ثَلَاثَةِ اِلَى خَمْسَةِ مَصَارِيحٍ يَتَأَلَّفُ مَتْنِبُهَا الْمِيْشُ الْفَلَاثِي اَوْ الْخَامِي الْفَلَقِ || ثَمَارُهَا اَرْبُوعِيَّةُ الْاَلْوَنِ تَعْمِشُ فَتَاةً ثَمَّ كَثِيَّةً . وَالْمَالِزَةُ يَمْدُ لِكُونِ زُرُوعِهَا وَبَدَنُهَا اَلتَّالِيَةُ تَنْتَعِجُ عَنْ ثَلَاثَةِ اَوْ خَمْسَةِ اَرْوَاحٍ مَلُوءَةٍ بِالتَّيْلِ يَجْعَلُ كُلَّ مَتْنِبٍ مِنْ خَسِ اِلَى عَشْرِ زُرُورٍ وَفِيهِ الشَّكْلُ سَوِيْدٌ لَلْفَلَوْنِ يَشْفَاوُ

الزُّبَابَ الْاَلْمَاسِيَّ بِهَا . اَمَّا نَسَبَةُ التَّيْلِ اِلَى الزُّرُورِ فَشَفَاوُ مِنْ ٢٦ اِلَى ٩٢ ٪ . وَالتَّالِيَةُ هَلْهُ لِلْمَادَّةِ الصِّنَاعِيَّةِ الْخَامِ اَلَّتِي تَصْبِغُ بِهَا زُرُوعُهَا وَنَسَبُهَا ثَلَاثُ الْاَلْفَةِ الْقُطْنِيَّةِ الْمَشْهُورَةِ اَلَّتِي تَبْلُغُ نَسَبَةَ اِسْتِخْلَامِهَا فِي الْعَالَمِ نَحْو ٧٠ ٪ مِنْ سِيْنِ اَنْ سَائِرَ الْاَلْفَةِ الْاُخْرَى مِنْ حَرِيرِيَّةٍ وَصُوفِيَّةٍ وَفِيهَا لَا يَرُودُ اِسْتِخْلَامُهَا مِنْ ٣٠ ٪.

٢٢٣٣٢ - قُطْنَف ، اِغْتِرَاف ، جَنْبِي Cueillage, Cuellaison (F). Gathering, Gathering-time (E).

هُوَ اِقْتِطَاعُ الثَّمَرِ مِنْ الْاَشْجَارِ وَهُوَ اَيْضًا اَلْعَرَفُ وَالْعَطَافُ وَالْمَرَامُ وَالْجَزَارُ اَي وَقْتُ الْقُطْفِ .

٢٢٣٣٥ - قُطْنَف Grappe (F). Bunch (E).

الْمَقْدُودُ سَاعَةً يَقْطَفُ .

٢٢٣٣٦ - قُطْنَف * Commiphora katal, Balsamodendron katal (S).

Baumier de Katal (F). Balsam of Katal (E). Katal Myrrhenbaum (D). Balsamo di Katal (I). نَوْعٌ مِنَ الْبَلْسَامِ يَنْتَشِي اِلَى فَصِيلَةِ الْيُسُورِيَّاتِ . ثَمَرُهُ مَتَوَسِّطَةُ الْقَدِ رَاجِعِيَّةُ الْمَصَارَةِ يَسْتَخْرَجُ مِنْهَا صَوْرُغٌ وَادْعَانٌ مَطْرِيَّةٌ شَالِمَةٌ اِسْتِخْلَامُهَا اَنْشَاطُهَا مَتْنِبِيَّةٌ، صِنَاعِيَّةٌ.

٢٢٣٣٧ - قُطْنَف Arroche (F).

هُوَ السَّرْمَقُ ، اَطْلُسِيَّة . اَلْوَالِدَةُ قُطْلَبَة . وَهِيَ الْاَبْيَضُ وَالْبَحْرِي .

٢٢٣٣٨ - قُطْنَاط Pluvien (F).

هُوَ التَّوْدُمُ ، طَائِرٌ يَدْخُلُ فَمَ التَّسْنِجِ قِيَاكُلُ مَا فِيهِ مِنَ السُّودِ .

٢٢٣٣٩ - قُطْنَاطَة صوت القطن.

٢٢٣٤٠ - قُطْل Blanc éloc, Blanc estoc (F).

Falling clear (E). قَطْعُ شَجَرٍ اَلْحَرِيَّةِ مِنْ اَسْمَالًا قَطْلًا كَامِلًا .

٢٢٣٤١ - قُطْلَب ، قُطْلَبِي ، بِيْج ، قَائِلُ اُيْبَة Arbutus (S). Arbousier (F). Arbutus (E).

جَنْسُ نَبَاتَات حَرِيْمِيَّة مِنْ فَصِيلَةِ الْخَلْسِيَّاتِ، اَنْوَاغُهَا عَدِيدَة مَتْنِبُهَا اَلْاَشْجَارُ وَالشَّجَرِيَّاتُ . سَوِيلُهَا مَتْنَسِبَةٌ فَرْوَاهُ . اَوْرَاقُهَا اَبِيدَة، شَبِيْهِةٌ بِضِيَّة، مَسْطِيطَة، مَسَلَّةٌ اَلْحَالَةُ؛ نِصَالُهَا مَالِسُ الْبُشْرَةِ، لَاصِقُ الصَّفِيحَةِ اَلْيَا اَنْفَرَاةِ الْوَيْنِ، اَلْحَمْلُ الْبَسْفَلِ . اَوْرَاقُهَا عَدَّةٌ تَمْلَحُ لِدَلَاةٍ لَانَهَا غَزِيْرَةُ الْمَادَّةِ الْمَاعِصَةِ . اِزْهَارُهَا جَلْبِيْلِيَّةُ الشَّكْلِ . ثَمَارُهَا خَضِيَّةٌ نَافِثَةٌ يَحْيِي بِلِطَةِ النِّصْجِ حَامِزَةً الْمَذَاقِ ، لِلْبَيْدَةِ اَلطَمِ || اَشْهُرُ اَنْوَاغِهِ مَا يَتِيْعُ .

٢٢٣٤٢ - قُطْلَب شَائِع * ، عَصِيْر الدُّبِّ ، جِيْنَاءُ اَخْمَرِ Arbutus unedo (S).

Arbousier commun, Arbre aux fraises (F). Arbutus, Strawberry, Cane apple (E). Echter Erbeerbaum, Laudbeere (D). Albato, Corbezzolo, Brichello (I). نَوْعٌ مِنَ الْقُطْلَبِ الْمَلْبُولِ فِي الْاَسْرَاجِ الْاَلْبَانِيَّةِ . ثَمَرُهُ تَمَلُّو مِنْ ٣ اِلَى ١٥ اَسْتَار . سَاقُهَا وَخَضَانُهَا حَرُ الْبَهِادِ . اَوْرَاقُهَا مَتَنَاقِيَّةٌ مَعْتَقَةٌ، نِصَالُهَا جَامِدٌ الصَّفِيحَةِ اَللَامَةِ الْمَسَلَّةِ الْاِطْرَافِ . اِزْهَارُهَا عَنُقُودِيَّةُ التَّجْمِيعِ وَرْدِيَّةُ الْاَلْوَنِ . ثَمَارُهَا شَكْلِيَّةُ الشَّكْلِ اَرْبُوعِيَّةُ تَمَلُّو نَحْو ٢ م. لَهَا نَافِثٌ اَلْمَادَّةُ .

٢٢٣٤٣ - قُطْلَب عُنُقُودِي Arbutus andrachne (S). Arbousier paniculé (F).

نَوْعٌ مِنْ الْقُطْلَبِ، مِهْدَة اَلشَّرْقِ الْاَسْطَوِيلِيَّةِ . ثَمَرُهُ تَمَلُّو مِنْ ١٢ م. اَوْرَاقُهُ خَضِيَّةٌ جَوْوِيَّةُ اَلْبَهِادِ . اَوْرَاقُهُ يَضِيْعُ الشَّكْلِ ، قَلْبِيَّةُ الْعَادَةِ، جَامِدَةُ النِّصْلِ . اَنْزَارُهُ عُنُقُودِي التَّجْمِيعِ . اِزْهَارُهُ نَسْفِيَّةُ الْوَيْنِ . ثَمَارُهُ قَرْمِزِيَّة .

تقتضي الى ثلاثة عناصر رئيسية هي الازوت والفسفور والبوتاس . افضلها لقطع تلك التي تركيبها يشمل ما يحتاج اليه القطن دون نقص او زيادة || ولما كانت الحاجة تختلف باختلاف مقتضيات التربة ولتباين ذلك فلا بد من احتياذ صيغة وسطية يميزها التعميل وفقاً لحالة التربة والصيغة الفضل الممكن اعتماداً تركب من ١/٢/١ اي واحد ازوت واثنين فسفور وواحد بوتاس . وقد يميز نحوها ما يزيد اذوت من واحد الى اثنين او يتخفيض البوتاس من واحد الى ثلاثة ارباع الواحد || اما الكمية اللازمة للدم الواحد فتراوح من ٧٥ الى ١٠٠ كيلو.

حراثة - يجب ان تكون الارض المعدة لزراعة القطن خالية من الاعشاب ، معتدلة الرطوبة ذات تربة ناعمة لا تلغ فيها ولا من || ولكي تاتي الحراثة بالنتيجة المنشودة يجب القيام بها في الاوقات المناسبة وفقاً لحالة التربة والموائل الجوية .

زراعة - من مستلزمات زراعة القطن العناية المستمرة والسرور الدائم . ومن الواجب ان تكون كثيفة لان الكلفة تموت النسب وتتساق الشواثل والارصام وتسبب املاس الازهار والكناج .

مهده الزراعة - ليس لزراعة القطن وقت معين كل من تقدمه او جاوزه كان نصيبه الاخفاق . ولكن الزراعة في اي نوع كانت اوقات ملائمة لا يميز الاستثمار بها . بحيث ان القطن يتطلب الكثير من الحراثة فوصول الى كامل انتاجه ، وهو يخشى امطار الخريف وسقيته . لذلك يحسن مهده باكرًا للاستفادة من الاسواق الجوية الملائمة اطول مدة ممكنة . وانسب وقت لبدء برامج من ٢٠ اذار الى ٢٠ نيسان || وان يدر باكرًا في العقد الاول من اذار وكانت زراعته تقراً لا بد من تعطفية البزور بالرمل منماً لتسلك التربة

تحديد المسافات - لتحديد المسافات شروط عديدة اولها الصرم المستحب ثم طريقة البذر ان آية او يدوية ثم حالة التربة وظرفها الخاصة ثم الاقليم ومواصله المناخية ثم الموقع والمعرض ثم نوع الزراعة ان مروية او حدية || لذلك فانسب المسافات تلك التي تراوح خطوطها من ٥٠ الى ٧٠ سم . ولا تقل فسماتها البيئية في الخط الواحد من ٤٠ سم .

البذر - يبذر القطن اما نثراً او لقطاً او نثراً فالبذر نثراً لا يلائم اقاليم البلاد العربية ومواصلها الجوية وطرق دجا وظروف زراعتها || اما لقطط حل فرقة التلم او بواسطة المبادئ الآلية فهو عملية شائعة مرسومة لكنها تستلزم الكثير من البذار وتستوجب عناية خاصة تامة قلما يقوم بها المزارع || اما طريقة البذر لثراً فبسه التخطيط فهي الاحسن اما يجب ان تكون البذر ان في فلق التلم ان كانت الزراعة يدوية او في الربع الاخير من سقمه اذا كانت الزراعة نصف مروية او حل غارب التلم اذا كانت مروية || وكيفية كانت الطريقة المختمة فلق بد من الانتباه الكلي لوضع البزرة في التربة في العمق المناسب لانباتها ونشروها لان البزرة الصلبة تكثر الرطوبة عليها ويقل عنها الهواء ويقل فوقها الغطاء فتضيق من البذر . والبزرة الطائفة يحف عليها الغطاء ويكثر حولها الهواء ويحس عنها الرطوبة فيسبب بعد الاثناش او لا تنبت اصل || اما البزرة التي صار طمرها حل العمق الانسب وهو نحو ٤ سم . فانها تكون في محيطها الطبيعي الواجب بميدة من تأثيرات العوامل الجوية الضخامة ومن الطيور التي تلتقطها والرطوبة الزائدة التي تهللكها .

تاريخه - من المؤرخين من قال ان القطن ائتمن من التاريخ . ومنهم من يقول انه قدم العهد غير ان قلمه لا يتعمد احاط بالصور الفرضية . والدليل حل ذلك عدم استعماله في اقله القراصة بينما كانوا يستعملون الكتان والقنب || لكن صدقوا او موهوا فالخريد والقرس عروق فزروه واستعملوا وكذلك العرب منذ ان استولوا ما بين البحرين . والربرم هم الذين نقلوا الى سورية فسر فاجازت صقلية فالاندلس . ومن الذين عروف بجميع شروب شواطئ البحر المتوسط . فادخله الاوروبيين كملهم الخلفه بلطفه العربي (قطن cotton) دون تحريف .

القيمة - ينمو القطن في جميع الاقاليم التي لا يقل متوسط حرارتها مدة نمو الخصري وادراك ثماره من ١٨ او ٢٠ درجة مع بشرط ان لا تكون فوارق الحرارتين القصوى والحدية كبيرة ونباتية . وهو يخشى الصقيح في نيسان وايار وهما الحريف الجارد المساطر . وكل زراعة تخرج من نطاق هذه القنوس المناسبة تعتبر من المغامرات الخطرة هذا ان لم يتوصل العلم في الآتي القريب الى استنباط هماغ جديدة سريعة النمو الخصري والذرة الحياتية تفوق بتكثيرها وادراكها الاسرام المعروفة حالياً .

زراعة - يميز القطن في الآرية الطبيعية الرملية والرمالية الطبيعية التي لا تقتصر الى الكلس والتي يربو غورها من ١٠٠ سم . لان نموها جهور القطن ونشروها يلقح هذا القاع || وقد تلازمه ايضا كل تربة عميقة الغور قليلة الانتاج بشرط ان لا تنفذ منها الرطوبة بسرعة || وصحت انه من النباتات المفروضة فيها سرعة النمو والادراك ، لا يستحسن زرعها في الآرية المنجعة المتأسكة خوفاً من تاخير نمو واستطالة دورته الحياتية || اما الاراضي الرملية والقلبية التي لا تحتفظ برطوبة الري اكثر من ستة ايام فلها لا تصلح ابداً لزراعة القطن وكذلك الآرية الكثيرة الحمص لان الحمص تمتع التربة من استيعاب كامل مغنوها من الحرارة القصوى .

لسمده - يميز القطن من النباتات القشرة التي تميزه التربة وتسنرف خواصها . فتكرار زراعته في التربة حينها يفقد هذه التربة جزءاً من عناصرها الاولى والثانوية . لذلك لا بد من البحث عن انجح طرق الاخصاب واتباع افضلها حفاظاً حل التربة وزراعتها || وسيت ان الذرة الزراعية والتسديد حل المبادلان الاسمان الذان يركز عليهما محور الحصب . فنقول في الذرة الزراعية انها ضرورية جداً بشرط ان لا تكون ثنائية لانها تصعب قليلة الفائدة . اما الذرة الثلاثية التي تلحج التربة التي التزم لتتيز نشاط جراثيمها وتجنده بعض ما فقدته من العناصر . فانها اصلح البزرات || اما التسديد والفاية منه اعادة العناصر التي صدرتها التربة مع حاصلها فهو حل شكلين مضوي ومعدني.

١ - الامدة القصوى : الامدة القصوى اشهر من ان تعرف وهي شاملة الاستعمال اهمها غني البقر والجاموس فزوت الميل وصائر الدواب فيبر الثمن والمناز || والحي الذي يصير من الامدة الباردة يستعمل في الآرية القليلة الانتاج لانه يخفف من مقدار استيعابها الحرارة ويقوي فيها خاصة الانتاج وينشط حل الجرائم المفيدة فريسي . البيئة الدالية الثلاثية الحصب فضلاً عما يتركه من غذاء متمصري النبات || اما الرورث ليستعمل في الآرية المنتجة لانه يعدها بحرارة ويخفف من انتاجها ورطوبتها به لان يمينها حل القيام بجميع اعمالها الجوفية والكليوية .

ب - الامدة المعتدلة : الامدة المعتدلة كما هو معروف

تربيته - تظهر عادة بوادر القطن بعد القطف أو التفرع بنحو عشرة أيام . ويصار الى التربيعة بعد ظهور البوادر بيوين ولا يجوز تأخير هذه العملية خوفاً من اتساع فارق النمو بين النباتات الاولى ونباتات التربيعة فتأتي هذه الاخيرة متخلفة ضعيفة وقد لا تسلم من شر الحشرات والأمراض .
عليه - الخلف أو التفرعية عملية لا بد منها من أجل تزياس النبات على الغذاء وتشكيلها لنباتات الإنتاج . وقد تم على مرحلتين في الاول يفصل بين ظهور البوادر بنحو ٢٠ يوماً ينتزع من التفرعة كل ما هو ضعيف ويؤخذ من الثلاثة . وفي المرحلة الثانية وذلك بعد الاولى بمسرة أيام تنتزع النباتات الضعيفة ولا يترك في التفرعة الواحدة الا نبات واحد || ولا يجوز تأخير الخلف عن الزمن المعلن خوفاً من النباتات المنافسة من الضعف والسقم || وإذا كانت الزراعة لثقلها فلا موجب لخلفها على مرتين بل يباشر تغريضها منسلا بمراس ارتفاع نباتاتها من ١٢ الى ١٥ سم .
وهـ - ليس لري موانيد مقررة ثابتة لانه مرتبط بمحالة جفاف التربة والجفاف يبين عليه شئ العوامل الجوية من رياح وسرارة ويتغير وطبيعة جوية نسبية وضج ووضاء... ومن المستحسن ري القطن بمسدة يلو بنحو ٢٠ يوماً الا في حالة التربيعة || وقد يتطلب القطن مبدئياً ثلثي ريات . التربة الاولى بعد البذر بنحو ٣٠ يوماً ومن ثم كل اسبوعين مرة حتى اواسط شهر آب حيث يجب تثبيت الري خوفاً من تجفيف التربة الضعيفة الذي يؤثر الادراك ويعرض للتواهي الحدية الى خشك التربة القفرغلية التي تكثر في هذه الفترة || اما اذا كانت الزراعة بحاجة ماسة الى الماء ولا خوف عليها من العودة القفرغلية فلا مانع من ردها من جديد .

٢ - معاد الجني : يستمر الجني عادة من اواخر آب الى اواخر تشرين الاول وهو منوط بمعدل كمية وموسمية تسير عليها عناصر المناخ || وفي سبيل التذكير نقول انه لا يجوز ابدأ جني الكتان قبل اسوداد زهورها لان الاطكان التي يتخللها بذر اخر يمن عن علم اكثال نضجها لا يمكن اعتبارها من الاصناف الجيدة العادسة الشلوقة .
 ٣ - طرق الجني : يعني القطن اما باليد او آلياً بواسطة القطارات . لذلك طرقت منه تختلف مع البلاد المنتجة لانها منوطه بالكمالات اليد العاملة وسهولة النقل والجمع والحفظ .

١ - طريقة الجني الشامل : انها لا شك اهم الطرق استعمالاً في البلاد العربية، تقوم على ترك القطن حتى اكثال نضج جميع ثمارها فيصار اذا ذلك الى جني وجمع كل ما تقطع من الكتانجيا وسقط ما على الارض فتضل الى مكان الفرز حيث تقطف من الشفوف والادراك والفصوص المبرومة . جوب هذه الطريقة مهيئة لان كثرة تغليب القطن في اثناء مختلف عمليات الفرز لانواع الفصوص المبرومة والشفوف والادراك بسبب التفتاف الفصوص الجيدة وتقلوبها بجرائل الفلن الاسود المنجود في الفصوص المبرومة تنشط من ذلك رتبة القطن فيفسد معه وتقل اتانوته .

ب - طريقة الجني المتتابع - قوامها جني الكتانجيا تماماً . وهي عملية موفقة تزيد في وزن الحصول لانها تمتد التيلة من اشمس الشمس اللاحقة ومن مداخل السدى والشمس المبرومة فتصطفها من انحطاط سفيتها الرئيسية . اللون والرائحة ، وتحمل دون سقط الكتانجيا على الارض .
 ج - طريقة الجني الآلي - عملية اقتصادية تقوم بها القطارات الآلية لكنها تقع بالمخاطر عنها الى ذكرناها في طريقة الجني الشامل

د - جمع القطن وفرزه : يجمع القطن بعد جنيه في المكان المده لفرزه وهذا المكان قد يكون اما ثابتاً ويبنى المستودع او نقلاً ويبنى المحطة . والمحلة كالمتدج يجب ان تكون نظيفة مفرقة بالخشيش منسلاً من ثلوث القطن يبقى الاقدار . يتتبع عملية الفرز حته وصول القطن الى المحطة الا اذا كان القطن من جني الصالح للباكر ولا يزال رطباً من الندى فمتحدا يقتضي نشره بعض البث ردياً بحيث تم يفرز || يفرز القطن عادة اما باليد او بواسطة .

عليه - ان كانت رطوبة التربة تحجب النباتات فمزق التربة الذي يظفنها من الاعشاب الضارة ويحافظ على رطوبتها عمل واجب جليل النفع || يزق القطن عادة على ثلاث مرات . المرة الاولى بعد الخلف وتقبل التربة الثانية . من الضروري ان تكون سطحية ، طائفة ما يمكن ، خوفاً من اقتلاع النباتات الفتية او قطع شروشها الدقيقة || والمرة الثانية تم عادة بعد التربة الرابعة . الغاية منها اقتلاع الاعشاب الضارة وتفكيك التربة وتهيئتها وتصلحها لخطوط ومجاري الماء وتضيق النباتات اذا كان ذلك واجباً || اما المرة الثالثة المبرومة بالسقم فنورها يأتي بعد التربة السادسة . قوامها ركش التربة لتجديد عزم الجرائم المنافسة ثم كتم النبات وضعفه بالقرب ليقوى على استحالة مصف الرياح || وإذا كانت الزراعة حدية فن الواجب ايضاً حرثها وكهسا في الاوقات التالية : يباشر بالمرة الاولى بعد الخلف بأسبوع وليس أكثر خوفاً من ان تفتقد التربة الكثير من رطوبتها . ومن الافضل ان تكون هذه المرة سطحية || اما المرة الثانية والتصفين فيباشران بعد المرة الاولى بنحو ثلاثين يوماً ومن الواجب ان يكون الفرق حقيقاً لتصرفه كل ما يمكن من الناييب استملااب الرطوبة

جنيه - ١ - معلومات عامة : القطن كما ذكرنا جنية فناء يستمر ازهارها نحو ثلاثة اشهر . وهي تبشر حته استعمالها نحو ٢٠٠٠ مسرة وقد يتم ذلك في غضون ثلاثة اشهر . ومن التيلير الى اكثال البرعمة الزهرية وانلاجها عن زهرة كاملة نحو ٥٥٠ مسرة التي يمكن الحصول عليها بمدة ٢٥ يوماً . وتستمر الزهرة نضرة زاهية نحو ٤٨ ساعة الى ان يتم ثايرها فيحمر لونها وتبدل بضع ساعات

٢٢٣٣٨ - فُطْن مُشَجَّر

Gossypium arboreum (S). *Cotonnier en arbre* (F). *Tree cotton* (E). *Baumwollbaum* (D). *Cotone arbusto*, *C. dipietra* (I).

نوع من الفُطْن المعمّنة الحد. شجرته تعلو من ٤ الى ٦ أمتار. أوراقه ثلاثية أو خاسية التفصيص. ساقها قليلة القاعدة، خالية الصلابة السفلى. كنانته كبيرة القد، قصيرة التيلة، ناعمة اليباس، محدودة الاستعمال الصناعي.

٢٢٣٣٩ - فُطْنَجِيَّة ٥
Ampelis (S). *Cotinga* (F). *Cotinga* (E).

جنس طير من فصيلة الفُطنجيات ورتبة الجوارثم سنيات التأثير. أنواعه المعروفة نحو ٢٠ موطنها غابات ومنتاح أمريكا الوسطى والجنوبية. أجسامها صغيرة القد طولها من ١٤ الى ١٨ سم. ألوانها ساطعة الألوان الجميلة. مناقيدها صغيرة مستعرضة القواعد. قوتها البار البانمة والخشرات الصغيرة والنمل. أشهر أنواعها الفُطنجية الزرقاء القلادة.

٢٢٣٤٠ - فُطْنَجِيَّة زُرْقَاء الفلادة ٥

Ampelis cincta (S). *Cotinga cordon-bleu* (F).

طائر من الفُطنجية. موطنها بعض مناطق أمريكا الجنوبية. تألف الغابات والحدائق القريبة من الأماكن الأكلة. جسمها صغير، معتدل الرقعة يطول نحو ١٦ سم. ثوبها العلوي الى الزرقة البحرية السفاه المروج. ثوبها السفلي الى الخضار البنفسجي المروج تملوه في الصدر قلادة من لون الظهر يطوقها الأحمر. علائها مشيرة بالأحمر. رأسها وأطراف جناحها وذنبها موشة بالأسود الاسف. طيراتها غريفة الحركة طويل الشوط. قوتها البار البانمة والخشرات الصغيرة والنمل. تدنن عشها في شكل كبر فناء قليلة الارتفاع. الاثنى تقص من ٤ الى ٥ بيضات حل مرتين في الحول. التزويج يستمر نحو ١٥ يوماً تقوم به الاثنى بتأدية الذكر.

٢٢٣٤١ - فُطْنَجِيَّات ٥
Cotingidae (S). *Cotingidae, Ampelidae* (F). *Cotingidae* (E).

فصيلة طير من الجوارثم سنيات التأثير. اجناسها وأنواعها المعروفة عديدة. موطنها القارة الأمريكية اخصها أمريكا الجنوبية والوسطى. تألف غابات المناطق الحارة. ملجئها الحارثي زوجي باستثناء بعض الانواع الجابية. أجسامها متوسطة القد أو كبيرة. تميز برسابة اشدقها وبالوانها الجميلة الألوان السقاء اللمعة. أعرف اجناسها وأشهرها الفُطنجية والطُرغُيب.

٢٢٣٤٢ - فُطْنِي، حُفَوِي
Lombaire (F). *Lombar* (E).

٢٢٣٤٣ - فُطْنِي ٥
Catops (S). *Catops* (F). *Catops* (E).

جنس حشرات من فصيلة القوطيات ورتبة غديات الإجنسة. أنواعه المعروفة نحو ١٠٠ منتشرة في جميع مناطق البلاد المعتدلة الحارة والمشمرة نحو البادية. أجسامها صغيرة القد، اهليجية الشكل، تعلو من ٤ الى ٨ سم. رؤوسها مستعرضة. عيونها صغيرة، مائحة. تأثيرها ولكونها نظامية. ملامحها مستطيلة. قوتها الاستعارة غطية. كاسلها مستعرضة. عذبة. اغداها عذبة، لاسفة. قوتها مستطيلة. ألوانها تراوح

الفرزات أو الترابيل الفارزة وعلى حال الفرز ان يقتربوا جيداً لتفانفة الفُطْن وتختلف مراتبه لانها اساس لشترى وطلي التحويل. وبعد فرز الفُطْن وتقسيمه الى الرتب والدرجات المطلوبة يصار الى تميته ضمن اكياس خاصة نظيفة ثم ينقل الى حابر المالح حيث يفرز من جديد قبل تقديمه الى الماكنت الحالجة التي تفصل التيلة عن البذور.

٢٢٣٤٢ - فُطْن آزَب، فُطْن امريكي

Gossypium hirsutum (S). *Cotonnier américain*, *Coton à courte soie*, *C. velu* (F). *Upland cotton plant* (E). *Amerikanische Baumwolle*, *Kurze Baumwolle* (D). *Coton peloso* (I).

نوع من الفُطْن الأمريكي المنت. ساقه وقبره وأوراقه مزينة. ضروبه واسراره وماله كثيرة العدد معظمها زراعي وافر الانتاج الجيد. تيلة متوسطة القد مشكوة الصنف.

٢٢٣٤٣ - فُطْن البَرَبَاد، فُطْن مِصْرِي، فُطْن جَزِيرَة البَحْر

Gossypium barbadense (S). *Cotonnier égyptien*, *Coton à longue soie*, *C. d'Egypte* (F). *Egyptian cotton*, *Sea Island cotton* (E). *Ägyptische Wollpflanze* (D). *Cotone egiziano* (I).

نوع من الفُطْن الشري تيلة في مصر واتصف بمخاض بيزة منها استمالة التيلة واستمالة الثورة الحياتية وكثرة الانتاج. ضروبه واسراره وماله عديدة لكنها محدودة الانتشار نظراً لطول مدة بقائها في التربة.

٢٢٣٤٤ - فُطْن البِيرُو
Gossypium peruvianum (S). *Cotonnier péruvien* (F). *Peruvian cotton plant* (E). *Peruvian Baumwolle* (D). *Cotone peruviano* (I).

نوع من الفُطْن، متوسط التيلة جيد الانتاج، مهد أمريكا الجنوبية. ضروبه واسراره عديدة معظمها وافر الانتاج لكنه مستطيل الثورة الحياتية.

٢٢٣٤٥ - فُطْن الهند
Gossypium indicum (S). *Cotonnier indien*, *Indian cotton plant* (E). *Indische Baumwolle* (D). *Cotone indiano* (I).

نوع من الفُطْن الزراعي الجيد الانتاج المتوسط الثورة الحياتية. اسراره عديدة منها الهند والهند الصينية.

٢٢٣٤٦ - فُطْن حَشِيشِي، فُطْن الشَّرْقِي، فُطْن مُلْتَكَب

Gossypium herbaceum (S). *Cotonnier d'Asie* (F). *Levant cotton plant* (E). *Kurze Georgia Baumwolle* (D). *Cotone erbaceae*, *C. annua*, *Bambagia* (I).

نوع من الفُطْن الشري الفاخر الصنف القليل الانتاج. كنانته كبيرة القد قليلة العدد. تيلة مستطيلة ناعمة ويتينة. ضروبه واسراره لا تحصى لانه دخل في تهجين معن اقلان العالم اخصها الاقلان المصرية والامريكية.

٢٢٣٤٧ - فُطْن شَرَقِي

Gossypium obtusifolium (S). *Cotonnier oriental* (F). *Oriental cotton plant* (E). *Nanking Baumwolle* (D). *Cotone orientale* (I).

نوع من الفُطْن الصناعي المعتدل الانتاج والجودة. مهد البلاد الاميرية تكثر زراعته في الصين والنام، تيلة متوسطة القد يضاء اللون.



فُطْنَجِيَّة زُرْقَاء الفلادة



فُطْن



نعل



نعل



نعلان أزرق



نعلان مسجس

نعليان . اجتمعتها خبيقة . مستعرضة القديس . ثوبها الى كوسلها ويطبخا كثيرا الخمل اللطيف الناعم . ثوبها الى السرة || الاثني اميز قدام من الذكر وابت وثوبا منه || السرة لاجلة تبيض حل وثن النصال . تركب الكثير من النبات اخضها البندق والستيان .

٢٢٣٦٠ - فُطَيْيَات * Eriocranidae (S).

Eriocranidae (E). Eriocranidae (E). فصيلة حشرات من رتبة حشرغيات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد ، نحو ٣٥ منتشرة في معظم الاجسام المعتدلة الحرارة من الشرق الاقصى واوروبا وامريكا || اجناسها صغيرة ، نحيلة . رؤوسها مستعرضة ، حيرتها بارزة . اعطائها وملابسها شديدة القصر . قرونها الاستشارية غليظة . اجتمعتها خبيقة ، شبه سنائية الشكل مهددة الخاطر . بطونها وشية الشكل ، متكاثفة الخمل . الاطراف ملونة || اساربها دقيقة ، عادمة الراجب ، تلم الاوراق وتبيض في وثن النصال || اشهر اجناسها القطعية .

٢٢٣٦١ - قَعَا Couvrir (F).

To couple with , To serve (E). قما القمل الاثني وقما عليها : اصل نفسه عليها .

٢٢٣٦٢ - قَعَاد Immobilité (F). Immobility (E).

داه يصيب الخمل فيقتضه عن العمل اذ يجمل بعض حركاتها متدرا احيانا . وقد يصير من الصوب المبطلة للبع .

٢٢٣٦٣ - قَعَا، قَعَا، قَعَا Clavelée (F).

هو جديري القدان ، اطبله .

٢٢٣٦٤ - قَعَاعَة Saunage (F). Salt-making (E).

القناعة استخلاص الملح من مياه البحر ، وتصنيع الملح وللتجارة به .

٢٢٣٦٥ - قَعَاعِي Halophyte

هو النبات الذي ينمو في الارابة للملحية او التي تنقص لتأثير المياه للملحية .

٢٢٣٦٦ - قَعَالَة Pétale (F).

هي البتلة ، اطبلها .

٢٢٣٦٧ - قَعَالِي، قَعْنَب Renard mille (F).

هو الثعلب الاكبر He fox (E).

٢٢٣٦٨ - قَعْبَارُون هو السليبي الاسود ، اطبله .

٢٢٣٦٩ - قَعْبِيل * Actinomma (F).

Actinomma (E).

جنس شعاعيات بحرية تتميز ببيكلها الصواني التركيب الخيول من ثلاث كرات شبكية الشكل متلاحقة تركيز على مناس شعاعية مخروطية تجمع بين الكرات || انواعها عديدة يكثر ويوجدوا في البحر الابيض المتوسط .

٢٢٣٧٠ - قَعْبِيل * (زهرة الزولوا الافريقية)

Dimorphotheca (S). Dimorphothèque (F). African orange daisy (E). Kaganblume, Kapkürbchen (D). Dimorfotece (I).

جنس نباتات حولية من فصيلة المركبات . انواعها عديدة

منها البرية التي تنابت الكماء في الربيع تجي يبيضها فتشوي وتطبخ فتفرك . ومنها الزينة الشائعة الاستعمال || سفيها فراءه ، اوراقها متعاقبة ، رؤوسها الزهرية كبيرة القند مستعرضة . بذورها غريزية الشكل ، ثنائية الجناس ، عادمة الاغرة || اشهر انواعها الزينة ما يلي .

٢٢٣٧١ - قَعْبِيل المطر

Dimorphotheca pluvialis (S). Dimorphothèque pluviale, Souci pluvial, Souci hygrométrique (F). نوع من القعويل الزينة الحولي . ساقه منتصبه كثيرة الفروع تمل نحو ٤٥ سم . اوراقه سنائية الشكل ، مصنفة الحافة ؛ نصليا خمل البشرة دبق اللمس . رؤوسها الزهرية كبيرة القند قطرها نحو ٦ سم . طبها اصفر اللون ، لسانها يرض الصفعة العليا حر السفل . تتليج وزهر في النهار من الساعة السابعة صباحا الى الخامسة بعد الظهر وتتكشف في الليل وفي الايام الماطرة || ازهاره يستمر من تموز الى آب .

٢٢٣٧٢ - قَعْبِيل برنقالي

Dimorphotheca surantiaca (S). Dimorphothèque orangée (F).

نوع من القعويل الزينة . ساقه منتصبه فراءه تمل من ٣٠ الى ٤٠ سم . اوراقه السفلى كبيرة القند مقطوعة الاطراف قليلة الزغب . اوراقه العليا سنائية صغيرة . رؤوسها الزهرية كبيرة القند قطرها نحو ٥ سم . طبها اصفر اللون ، لسانها برنقالية || ازهاره يستمر طوال فصل الربيع .

٢٢٣٧٣ - قَعْبِيلَانِ اَزْرَق *، قَعْبِيلَانِ بَنَفْسَاجِي * Xylocopa violacea (S). Xylocope violet, Abeille charpentière (F).

حشرة عاشية من فصيلة القعبيات قريبة الشبه من النحل طولا يراوح من ٢٥ الى ٣٥ سم . لونها الى الزرقة يملها مزاج اسود || تشيد خلياتها في الاغشاب التي تحفرها وقد شاعدها مرارا في غيب اليمون المصنوع والاذينعت والازن .

٢٢٣٧٤ - قَعْبِيلَانِ مُسَجَس *، قَعْبِيلَانِ مَعَجِجِي * Xylocopa aestuans (S).

Xylocopa agité (F).

حشرة عاشية من القعبيات طولا نحو ٢٢ سم . تركيب الاغشاب المصنوعة والاعمدة تصفرها وتشيد فيها خلياتها . الاثني اكبر قدام من الذكر ، ثوبها الى السرة السوداء يملها مزاج ازرق . جوشها كثيف الحلب اصفر اللون . الذكر صغير القند اصفر اللون اخضر المزاج . اجتمعته مستدلة الطول عاقبة الزرقة السراء .

٢٢٣٧٥ - قَعْبِيلَانِيَات * Xylocopidae (S).

Xylocopidae (F). Xylocopidae (E).

فصيلة حشرات عاشية من رتبة غشائيات الاجنحة . اجناسها وانواعها عديدة معظمها متوسط القند قريب الشبه من النحل . اجناسها بكثافة الحلب . بطونها غليظة . تكثرها قوة جذبه تحبها من ثقب وغفر الاغشاب اليابسة اخضها المصنوعة والاعمدة تصفر فيها الانفاق المستطيلة والسراريب المنزوعة .

٢٢٣٧٦ - قَعْد

القند : النخل الصنار . وقعدت النسيلة وهي قاعد :

٢٢٣٨٧ - قُفَّاعُ الْإِجَامِ * ، زَمَّارُ الرَّمْلِ

Actitis hypoleucos (S). Guignette vulgaire (F).
طائر من القُفَّاع طوله نحو ٢٠ سم. ثوبه إلى السمرة
الزيتونية يعلوه موج جزوي وبقعة سوداء. بطنه أبيض.
صدره موشع بالأسود. منقاره رمادي. سيقله إلى الحفار
الزيتوني || أقليمه فسح الإرياء يحيط البلاد الاسبورية
والأروبية والأفريقية. يرتاد النالغ وصفات المياه العذبة
ورمال أخوال الأثر.



نقش

٢٢٣٨٨ - قُفَّاعُ مُلْطَحٍ

Actitis macularia (S).
Guignette griselee (F).
طائر من القُفَّاع طوله نحو ١٨ سم. أقليمه البلاد
الامريكية. يتصف بميزات وإخلاق وصفات قُفَّاع
الاجام. ثوبه أقل سمرة وبقعة. منقاره أحمر اللون. سيقله
رمادية.

٢٢٣٨٩ - قُفَّاعَةُ

Cri du facon (F).
Cry of the falcon (E).
صوت الصقر.

٢٢٣٩٠ - قُفَّاعُ صَرْبٍ

قُفَّاعُ صَرْبٍ من الكدابة.

٢٢٣٩١ - قُفَّاعُ

قُفَّاعُ أصل اللطخ. ج. قس.

٢٢٣٩٢ - قُفَّاعُ

قُفَّاعُ لشاة التي تمنع البدة.

٢٢٣٩٣ - قُفَّاعُ

القعيد: الجراد إذا لم يستر جناحاه بعد.

٢٢٣٩٤ - قُفَّاعَةُ

Perdrix chukar (F).
هي الحجل الشقر، أطلبه.

٢٢٣٩٥ - قُفَّاعُ

Bouquin (F). Buck-rabbit (E).
هو الخنزير أي الأرنب الذكر.

٢٢٣٩٦ - قُفَّاعُ

Monticule (F). Hillcock, Knoll (E).
القُفَّ ج. قُفَّاع وأقنات: ما ارتفع من الأرض دون
الحضبة.

٢٢٣٩٧ - قُفَّاعُ

Nuque (F). Nape (E).
هو القذال الجزء الخلفي من المتى مركزه تحت القف.

٢٢٣٩٨ - قُفَّاعُ الْجَلُوزِ *

Apodorus coryli (S).
Apodère du coudrier (F).
حشرة من فصيلة السوسيات طوطها ٧ م. رأسها أسود،
ثوبها وسائر جسمها إلى الحمرة || تركب أوراق الجوز
فتضللها وتعيش عليها تتسلقها.

٢٢٣٩٩ - قُفَّاعُ مَرَّيْمٍ

Campanule gantée (F).
هو جريس الت، أطلبه.

٢٢٤٠٠ - قُفَّاعُ

Bouquetin d'Abyssinie (F).
هو الوول الحبشي، أطلبه.

٢٢٤٠١ - قُفَّاعُ

داه يصعب النواص قتيص قوتها.

٢٢٤٠٢ - قُفَّاعُ

داه في قوائم الشاة يوسجها.

٢٢٤٠٣ - قُفَّاعُ

Diolite (S). Diotide (F).
جنس نباتات عشبية برية معمرة من فصيلة المُرَكَّبات.
أنواعه المروقة قليلة. سطها خلية زباد تملن من ١٠ إلى
٥٠ م. لورائها متعاقبة، حاضنة، أعليجية، صغيرة.

صار لها جلع تغد عليه. وفي أرض فلان من القاعد
كلها وكلذا...

٢٢٣٩٧ - قُفَّاعُ

كل اسيل مذكق لقرابة إلى البة.

٢٢٣٩٨ - قُفَّاعُ

Déracinement (F).
Rooting up, Eradication (E).
هو الانجاء. يقال قُفَّاع الشجرة: انتلعها مع جلجورها.

٢٢٣٩٩ - قُفَّاعُ

قُفَّاعُ القس: الأراب المن.

٢٢٣٨٠ - قُفَّاعُ

Formica animosa (S).
Fourmi féroce (F).
نوع من النمل الحربي كبير القد أحمر اللون أسمر الموج
يكثر وجوده في غابات وإسراج البلاد الاستوائية والحارة.

٢٢٣٨١ - قُفَّاعُ

Saprolegnisacae (S).
Saprolegnisacées (F). Saprolegnisacae (E).
فصيلة فطور مجهرية من مرتبة التنسبات ورتبة البيضيات.

٢٢٣٨٢ - قُفَّاعُ

Arceus (F). Arching (E).
قُفَّاعُ العود: حطفه كما تحطف عروش الأكرم.

٢٢٣٨٣ - قُفَّاعُ

Extirpation
القُفَّاع هو تلغ البنة إن جنة أو شجرة من أصولها.

٢٢٣٨٤ - قُفَّاعُ *

قُفَّاعُ طَيْرُ الْقُفَّاعِ

Serpentarius secretarius (S). Serpentinaire, Secr-
taire (F). Secretary bird (E).
طائر من فصيلة القُفَّاعيات وسيد الجنس والفرع، كبير
الجثة، ريش القوام، أخيف اللد، طوله نحو ١٢٠ سم.
رأسه قصير وعريض. قذته متخرج يكتشف من الريش
الضيق المستطيل. وهو أشبه العين الكبيرة. أحمر الجفن.
خفيف المنسر الإحفظ الأحاد. طويل المتى واللذنب والساك.
كبير السط. كثيف الريش. ظهره أريد اللون يعلوه
مواج أزرق. صفه ويطقه ويتكاه إلى الحلقة الزاهية.
قوامه إلى السمرة الباذخة. ذنبه جلع الطرف || الأثر
أكبر حبساً من الأثر لكثا صغيرة الكثرة. نبيش
من ٣ إلى ٤ رفنات تحضها نحو ٦ أسابيع في أنحوص
تشبه بالطين وتبته بالقش والريش التام || أطلانه
البلاد الحارة. يألف الإنسان الأكلة ويدفن بسهولة.
قوته الأفاقي حل اختلاط أجنتها وأنواعها يقتصها
أينما ناهدا ولا ينف من سائر الزحافات والقوائم اغصها
الجردان والقفران والإبريق وتربها.

٢٢٣٨٥ - قُفَّاعُ

Gypogéraniidae (S).
Gypogéraniidae (F).
فصيلة طير من كواسر الجوار ورتبة الجوارح، وحيدة
الجنس والفرع يملها القُفَّاع.

٢٢٣٨٦ - قُفَّاعُ ، قُفَّاعُ ، رَيْبَةُ

Actitis (S).
Guignette (F). Small hoe (E).
جنس طير من مارة اللوطانيات وفصيلة دجانيات
الأرض. صغير اللد منسج الشكل. ثوبه مرهق الرأس
والظهر، أبيض البطن. منقاره معتدل الطول. رسته دقيق
وقصير. ذنبه كثيف الأنفك مستدير || يرتاد النالغ
وصفات المياه العذبة. قوته الحشرات والديدان والصناك
والذباب. يدفن حته في الأجارج القريبة من الماء اغصها
الحلوف والصنصناف والأثل || الأثر قتيص ويضات
تحضها بمناءة الذكر نحو الأسبوعين || له ثومان قُفَّاع.



قُفَّاعُ الْجَلُوزِ

٢٢٤١٦ - قَفَصٌ Cage (F). Bird-cage (E).
عجس الطير وقد شاع استعماله للصائير البيئية .

٢٢٤١٧ - قَفْطٌ، قَمَطٌ Couvrir (F). To cover (E).
قفط وقط الطائر أثناء : سفدها . وقطط الماطر : رزا .

٢٢٤١٨ - قَفْصَاءٌ
عشية عذراء ثمارها قرون دقيقة تستدير كالحلق دون ان
تلتقي أطرافها . وهي من أسرار البقول (البنان) .

٢٢٤١٩ - قَفْلٌ Claveau (F). Arch-stone (E).
كل من الحجارة الواقعة بين الفلق والحجرين الأسفلين في
العمد .

٢٢٤٢٠ - قَفْصَلٌ Balsamodendron kafal (S).
Baumier de Kafal (F). Balm of Kafal (E). Kafalischer
Balsambaum (D). Balsamo di Kafal (I).

نوع من البلسان، شجرته صغيرة القند فروعها غارشة . أوراقه
مركبة . أزهاره غليظ التجميع . أزهاره صغيرة القند بيضاء
اللون فواحة العرف الطري . أخشابها بخورية الرائحة .
يستخرج من سوقها بالحز حصاراة راتنجية بخورية طيبة
الاستعمال .

٢٢٤٢١ - قَفْلَة ، قَفْلَة Arbre desséché (F).
Dried tree (E).

هي الشجرة اليابسة وقد كثر استنادها الى الشجرة الحرجية
اليابسة .

٢٢٤٢٢ - قَفْلُوطٌ هو الكراث الاندلسي ، اطلبه .

٢٢٤٢٣ - قَفْنٌ Occiput
الجزء الخلفي الأسفل من رأس الحيوان يعرف عنه بالبحق
في الحشرات .

٢٢٤٢٤ - قَفْصِيٌّ Occipital
كل ما له صلة بالقفن .

٢٢٤٢٥ - قَفُور ، قَفْصِيَّة Fontanesia (S).
Fontanéia (F).

قَفُور هو الاسم العربي ، أما العلمي فيقود التعريف على
اسم العلامة « Desfontaines » . جلس جنبا وتجميرات
برية وزراعية صابغية وتزيينية من فصيلة القفورييات ||
انواعها المعروفة قليلة العدد ، مهددا بحد من الشرق الأدنى
الى الصين || سيقها فروعها تملو من مترين الى اربعة امتار .
شكلها قريب الشبه بالياسم . اذنتها نجيلية متدلية . أوراقها
متصالبة ، متناحية النصال اللرية . أزهارها صغيرة ، رباعية
الثلاث الضيقة ، عاجية اللون . لحاء سيقها وفروعها
صابغية ، صابغها الى الصفار الكبريتي الجميل || تنويرها
يستمر من حزيران الى آب .

٢٢٤٢٦ - قَفُورِيَّاتٌ Desfontainacées (F).
Desfontainaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين متصلة العائلات مرتفعة
المبيض . اجناسها وانواعها قليلة العدد . اعطائها تمتد من
الشرق الأدنى الى الاصل || جميع نباتاتها جميرات وجنبات
برية . سيقها فروع . اغصانها متبسطة او متدلية . أوراقها
متعاقبة ، قصيرة الاصلان ، متناحية النصال . أزهارها
رباعية الثلاث ، صغيرة القند ، عاجية اللون او تبتية ||
اشهر اجناسها القنفوز .

القند . رؤسها الزهرية صفراء اللون ، عادمة السينات .
توريجاتها فايزة استقبية التجميع . يزورها مضلة عادمة
الجنح والافرة .

٢٢٤٠٤ - قَفَالَة ° Mya (S). Mya (F).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم
وفصيلة القفاليات . انواعها الماصرة المعروفة قليلة العدد
جميعها من صطل عمار المناطق الشالية || اصداؤها بيضاء
اللون ، شبه يغبية الشوزن تملوها تنوات صغيرة ||
اجسامها مستطيلة الخائض المزدوجة التجميع . مصاريها
لامتسارية القند ، منفصلة الاطراف || تمشي في الرمال
والاصمال المنسورة . لحومها مأكولة .

٢٢٤٠٥ - قَفَالِيَّاتٌ Myidae (S).
Myiidae (F). Myidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم .
اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في صطل
بحار العالم || اصداؤها لاصابية الشكل والقند ، قليلة
الاحديداب ، مائلة السطوح . تتميز بمصاريها
الامتسارية المنفصلة الاطراف || اعرف اجناسها واشهرها
القفالاة والقيقب والكربولة .

٢٢٤٠٦ - قَفْةٌ Couffie, Couffin, Cabas (F).
Hamperfrall, Basket (E).

وعاء ثنائي القطع من الاسل او القنب او الكيف او
الكروشك يستعمل في نقل الاشياء .

٢٢٤٠٧ - قَفْرٌ راسع يادية .

٢٢٤٠٨ - قَفْرُ البود ، قَفْرُ البود Bitume de Judée (F).
Bitumen of Judaea (E).

نوع من الحمر جيد الصنف يكثر في البحر الميت .

٢٢٤٠٩ - قَفْرِيٌّ Xérophyte (F). Xerophyta (E).
نمت تمريني يطلق على كل نبات يستطيع مقاومة الجفاف .

٢٢٤١٠ - قَفْرَاتُ الطِبَاءِ

قفرات الطباء كوكبة من ستة نجوم وتسمى قفرات النزلان
ايضا .

٢٢٤١١ - قَفْرَة اولى القفزة الاولى نجم ثير من كوكبة الدب الاكبر .

٢٢٤١٢ - قَفْرَة ثالثة القفزة الثالثة نجم ثير من كوكبة الدب الاكبر .


٢٢٤١٣ - قَفْرَة ثالثة القفزة الثانية نجم ثير من كوكبة الدب الاكبر .

٢٢٤١٤ - قَفْرِيٌّ Salsolre (F). Salsolre (E).

نمت تعريفى يطلق على كل عضو من اعضاء القفز او
صالح القفز عند الحشرات .

٢٢٤١٥ - قَفْسَاءٌ Estomac des ruminants (F).
Stomach of the ruminants (E).

معدة الحيوانات الهجرة تشمل الكرش والفلسوة وامثالها
والجلوت .



قفالة

٢٢٤٣٥ - قُفُول هو التَّمْ، الطَّيْ .

Caldie (F).

٢٢٤٣٦ - قُفُول

جلس نباتات حشوية حرولية برية من فصيلة السليبيات .
أعطائها الشطوط الرملية .

Muretta (F). Small wall (E).

٢٢٤٣٧ - قُلْ

هو الحائط القليل الارتفاع .

Zygophyllum (S). Zygophylle (F). ٢٢٤٣٨ - قُلَاب

جلس نباتات جنينية من فصيلة الفردييات . أنواعه نحو ٦٠ معظما بري وبعضها زُرْبِي . سيقانها فرعاء جالسة .
أوراقها متقابلة حركية ريشية . أزهارها نظامية خماسية التركيب . ثمارها حنطة || أشهر أنواعه الزُرْبِيَّة قُلَاب القرم .

Zygophyllum fabago (S). ٢٢٤٣٩ - قُلَاب القرم

Zygophylle de Crimée, Fabagelle, Faux caprier (F).
Syrian bean caper (E). Bohnenkapsen (D). Fabaria, Favaggina (I).نوع من القلاب وهو جنس زُرْبِيَّة شائعة الاستعمال .
موطنها بلاد القرم وقد عمت زراعتها الزُرْبِيَّة جميع البلاد
المعتلة الحرارة . أزهارها كبيرة القند جميلة الشكل أبيضانية اللون .

٢٢٤٤٠ - قِلَادَة

القِلَادَة ستة كَوَاكِب يمرقن بالقوس .

Moniliforme (F). ٢٢٤٤١ - قِلَادِيّ ، سُبْحِيّ

Moniliform (E).
شكل من الزباني فواصله كمحب القِلَادَة أو السبحة .

Figue (F). Flg (E).

٢٢٤٤٢ - قِلَار

ضرب من التين أبيض إذا جف أصفر لونه وهو أجود
من الطليار .

Merycote (F).

٢٢٤٤٣ - قِلَاس

القِلَاس من استعمال القِلَاس القليلة .

Muguet, Stomatite (F).

٢٢٤٤٤ - قِلَاع

Stomatite (E).
القِلَاع مرض معد يعرف بالتهاب غشاء اللسان . يصيب البشر
والثمن . سببه فطر مجهري شديد الانحناء . مظهره الخارجي
يقتضي بيض تركب اللسان ودخله أكله .

Brunella (S). Brunella (F).

٢٢٤٤٥ - قِلَاع

Self-heal, Sickle-wort (E). Brunella (D). Brunella (I).
جلس نباتات حشوية برية عطرية معمرة من فصيلة الشفويات .
أنواعها عديدة جميعها صغيرة القند . سيقانها فرعاء . أوراقها
متقابلة منتظمة كاملة . أزهارها مثلج التجميع طرفي
الارتكاز . أزهارها عطرية متوسطة الحجم خطفة الألوان
سُهَا الأحمر والأزرق والبنفسجي والأبيض || أرف
أنواعها وأشهرها ما يلي .

Brunella hyssopifolia (S). Brunella à feuilles d'hy-

sop (F).
نوع من القِلَاع البري الزُرْبِيّ ساقه فرعاء تملو نحو ٤٠
سم . أوراقها شقيقة كاملة تشبه أوراق الزُرْبَة . سبله

Blattissement, Blattissure (F). ٢٢٤٢٧ - قُفُول

Becoming over-ripe or sleepy (E).

القُفُول كالقُفُول والحرارة أو تمام نضج الثمر .

Ruche à cadres (F). Frame hive (E).

٢٢٤٢٨ - قُلْبِيّ ، حَلْبِيّ ، حَبَاة
هو مأوى النحل صنع من الخشب ويجهز بالنحالت
والأقراص الشمسية .

Hapiophyllum (S).

٢٢٤٢٩ - قُفُول

Hapiophylle (F).

جلس نباتات حشوية برية معمرة من فصيلة السليبيات .
أنواعها المعروفة عديدة منها حُضَاب وحماد الشرق الأوسط
وبعض الأصناف الأروبية || سيقانها متصلة فرعاء
متنصبة . أوراقها بسيطة أو ثلاثية التفرع . أزهارها
مثلج التجميع ، طرفي الارتكاز . أزهارها متجانسة الإجماع
والألوان || أرف أنواعها وأشهرها الخمسة التالية .

٢٢٤٣٠ - قُفُول حَرَجِيّ

Hapiophyllum sylvaticum (S).

Hapiophylle de Syrie (F).

نوع من القُفُول . منته أرحاج المناطق الجبلية . ساقه
فرعاء ملسة . أوراقه ريشية النصال الحادة الأطراف .
أزهاره صغيرة القند ، يضاء اللون . تنموه صيفي .

٢٢٤٣١ - قُفُول سُورِيّ

Hapiophyllum syriacum (S).

Hapiophylle de Syrie (F).

نوع من القُفُول . منته معظم الأصناف السورية باستثناء
القلب البحري . ساقه متنصبة فرعاء تملو نحو ٦٠ سم .
أوراقه شبه بيضية الشكل ، ملوكة . أما العليا فثلاثية
التفرع . أزهارها صفراء اللون . تنموه منه من الربيع إلى
أوائل الصيف .

٢٢٤٣٢ - قُفُول مُسْتَطِيل الْوَرَق

Hapiophyllum longifolium (S).

Hapiophylle à feuilles longues (F).

نوع من القُفُول . منته جلاد الأروبية . ساقه فرعاء متجانسة
للند الخضراء المزجة . أوراقه سنانية النصال النسيقة
تطلى من ٤ إلى ٥ سم . أزهارها صغيرة متشككة ، لونها إلى
الحمرة المرجانية . تنموه ربيعي .

٢٢٤٣٣ - قُفُول مَهْدَب

Hapiophyllum villosus (S) Hapiophylle velu (F).

نوع من القُفُول . ساقه مزينة اللحماء فرعاء . أوراقه السفلى
أطليجية النصال أما الوسطى والعليا فثلاثية التفرع .
أزهارها مهدبة الكورس ، وردية اللون ، معتدلة الحجم .
تنموه في أوائل الصيف .

٢٢٤٣٤ - قُفُول تَجْمِيّ

Hapiophyllum fruticosum (S).

Hapiophylle branchu (F).

نوع من القُفُول . منته الحُضَاب والنجاد . ساقه كثيرة
الفروع المراكية . أوراقه السفلى بيضية الشكل أما العليا
فرعجية . أزهارها صغيرة القند لونها إلى الأبيض الأصفر
المليح . تنموه صيفي .

قُفُول

Cambium

٢٢٤٥٥ - قَلْبٌ ، كَسْبِيوم

الطبقة المولدة في النبات. ج قلوب .

٢٢٤٥٦ - قَلْبٌ ، جُمَارَةٌ ، شَحْمَةٌ

Bourgeon terminal du dattier (F). Terminal bud of date-tree (E).

البرعمة الحامية الطرفية في النخلة وهي شطبة يمشاء برصعة طيبة الطعم تكون في أصل جلد النخلة. وقد سمي قلباً لبياحه. ج قلبية .

٢٢٤٥٧ - قَلْبُ الْأَسَدِ

قلب الأسد نجم ثير من كوكبة الأسد الاصغر .

٢٢٤٥٨ - قَلْبُ الْأَسَدِ الْمَلِكِيِّ

قلب الأسد الملكي نجم ثير من برج الأسد وهو النور النجم الجبهة .

٢٢٤٥٩ - قَلْبُ الشُّجَاعِ

قلب الشجاع نجم ثير من المرتبة الثانية ينتمي الى كوكبة الشجاع الاثني .

٢٢٤٦٠ - قَلْبُ الْعَقْرَبِ

Antares, Coeur du Scorpion (F). Antares (E).

قلب العقرب أو القلب منزل من منازل القمر البانية . وهو نجم ثير آخر الصوم من كوكبة برج العقرب . مركزي في اواسط البدن وراء الكليل بين كوكبين يقال لهما التباط . وقبب القلب يعني الدبران || وقلب العقرب يبعد من الأرض نحو ٤٠٠ سنة ضوئية وهو من نجوم الجبارة التي يترى حجمها ٧٠ مليون مرة حجم الشمس .

Plebeus (S).

٢٢٤٦١ - قَلْبِيوس *

جنس حشرات فراشية من فصيلة القنليات . أنواعه عديدة منتشرة في معظم اصقاع العالم . جسمها صغيرة القد طويلاً يراوح من ٢٥ إلى ٢٨ سم . أجسامها سمراء اللون رواشها مختلفة الألوان المتداخلة يكثر فيها الأزرق والبنفسجي والاصلع الموشق والمتقط بالأسود والأحمر || أنثاها أكبر قدماً من ذكورها وأقدم لوناً وأقل رقة ونحوشاً || يرقاها تركب أرواق نباتات الفصيلة القرنية .

٢٢٤٦٢ - قَلْبِيُوس القَطَائِيَّات *

Plebeus idas (S). Argus bleu des légumineuses (F). Plebeus idas (E).

حشرة من فصيلة القنليات ودية حشرغيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اوروبا وأفريقية الشمالية فراشها راضعة قوتها مشر الأناهار . سرها خاضعة قوتها أرواق القنطاريات || جسمها صغير القد بطول نحو ١٠ سم . يسبحها نحو ٢٧ سم . رأسها صغير الحجم . جنيها كيرتات . زباناها مستطيلان ، شبه صرطانيان . جنيها أزرق اللون اطبلع المراج عند الذكر ، كسنيها اللون عند الانثى . بطنها أدب اللون عند الذكر ، كسنيها اللون الداكن القائم عند الانثى || رواشها عند الذكر الى الزرق البنفسجية بطيها اطار اسود ينتهي بهامش ضيق أبيض . وهي عند الاقلى الى الكسنيها الاصمر يطوق اطار جميل أبيض تنفذه نقط حر رسود || لها جيلان في الحول . تظهر فراشة الجبل الاول في ايار وتظهر فراشة الجبل الثاني في آب . تسرح في النهار . تماثل بعد ظهورها بحسبة أسابيع وتتمح

الزهرية متوصلة القد تحمل ست زهرة || ازهارها يستمر من ايار الى آب .

٢٢٤٦٧ - قَلْعٌ شَائِع *

Brunella vulgaris (S). Brunelle commune (F).

نوع من القلاع الصبروتي البليوط . ساقه متصببة فروعها تملو نحو ٢٠ سم . اوراقها اهلالية الشكل . سبلته الزهرية قصيرة . ازهارها صغيرة بنفسجية اللون || ازهارها يستمر من حزيران الى آب .

٢٢٤٦٨ - قَلْعٌ كَبِيرُ الزَّهَرِ

Brunella grandiflora (S). Brunelle à grandes fleurs (F).

نوع من القلاع البري الزبني رطب في الارربة الكلسية ساقه فروعها تملو من ٢٠ الى ٤٠ سم . اوراقها بيضية الشكل مسلبة الحافة . سبلته الزهرية مسطيلة . ازهارها كبيرة القد ، متباعدة ، ارجوانية اللون || ازهارها يستمر من حزيران الى آب .

٢٢٤٦٩ - قَلْعَةٌ

Aphtho (F). Aphtho (E).

بثرة صغيرة يمشاء اللون تظهر في فم الحيوان المريض .

٢٢٤٧٠ - قَلْعَةٌ

هي الحفلة . اطلبها .

٢٢٤٧١ - قَلْعَةٌ

Involucre

مجموع القنليات حول قاعدة الخية الزهرية أو الرؤس الزهري .

٢٢٤٧٢ - قَلْعٌ

Palissade (F). Palissade (E).

اعمدة من الباطون أو الخشب تنصب عليها الاسلاك لتعرض الكرمة ورونها عن الأرض .

٢٢٤٧٣ - قَلْعَم

Conopseon (S). Conandre (F).

جنس نباتات جملهورية عشية نمرة من فصيلة الجسنيريات . أنواعه قليلة . اوراقها قرصية التجميع ، شبيهة . نصاها سنائية شعدة ومسلة الحار . ازهارها ثورية التجميع ليلية اللون ، خاسية القيقع الوردي || ازهارها يستمر طول فصل الصيف .

٢٢٤٧٤ - قَلْبٌ

Coeur (F). Heart (E).

عضو عضل الجوف . وهو العضو الرئيسي في الجهاز التنفسي لان مل عمله تتوقف حياة الانسجة والجسم . مركزة عند الانسان والحيوان في تجويف الصدر بين الرئتين من اليسار والقلب مركب من جزئين : ايمن ، يسوي الدم القاسد واليسر ، يسوي الدم النقي ويتكون كل جزء من تجويفين يفران بالاذنين والبطين . ويتصل الاذنين بالبطين الذي يقابله بقصبة صمامية . ويتصل الاذنين الايمن بالوردين الايمنين السلي والعلوي . ويتصل البطين الايمن بالشريان الرؤوي الذي يتفرع الى فروع اصغر فاصغر تعرف بالشعيرات الدموية . ويتصل الاذنين اليسر بالوردين الايمنين السفلي والعلوي . ويتصل البطين اليسر بالشريان الايمن . اما الدورة الدموية التي تستغرق نحو ثمانية اعمار الثانية فتعبري حل الشكل التالي : يرد الدم الى القلب بواسطة الوردين الايمنين الى الاذنين الايمن ثم يتدفق الى البطين الايمن ومنه يخرج من طريق الشريان الرؤوي الى الشعيرات الرؤوية التي تتجمع في فروع اوسع فتكون الاوردة الرؤوية التي تحمل الدم المتأكسد ونصبه في الاذنين اليسر ومنه يتدفق الى البطين اليسر ثم يتدفق الى الاخير الذي يفرغ وصوله الى جميع الشعيرات الدموية المنتشرة في الجسم .



قَلْعٌ شَائِع



قَلْبِيوس



قَلْبِيُوس القَطَائِيَّات

٢٢٤٧٢ - فَلَكَ يَات

Mallophages

رَبَّةٌ حشرات قارضة من طبقة القمليات ، فصائلها عديدة جميعها عادمة الجناح . أجسامها صغيرة ملفحة . رؤوسها كبيرة وحريضة . تكاثرها قوية ، قربها الاستعمارية قصيرة || تميش طفيلية على الخيل وبعض الحيوانات البيرة فتقرض الريش والصوف والوبر وبشرة الجمل والتم الجاث . ضنها وبشي للشكل غير اللون تلصق حيث تمتص إن بالريش أو بالصوف أو بالشر فيقتف عن حوريات تلصق عدة مرات قبل اكتمال تطورها || أشهر فصائلها القرطيات والمفرنيات والتمناتيات .



فلبوس الرزال

٢٢٤٧٣ - فَلَز

Alrain (F). Briss (E).

سبيكة من معادن مختلفة انحصار انحصارها والقصدير .

٢٢٤٧٤ - فَلَز

Régurgitation (F).

Regurgitation (E).

القلس طريقة تغذية خاصة ببعض الحشرات انحصارها التمل . راجع للتغام .

٢٢٤٧٥ - فَلَز

Drainage (F).

هي عملية تصريف المياه من الآلية الربطة .

٢٢٤٧٦ - فَلَسة ، فَلَسة ، فَلَسة

Calotta (F).

هي الاروسة ، اطليا .

٢٢٤٧٧ - فَلَوس

Fleas (F).

جاء في السان : نبات يكون منه اللاذن .

٢٢٤٧٨ - فَلَوس

Cyon dukhunensis (S).

Coleon (F). Colson (E).

نوع من الكلاب المتوسطة المقترنة . ومنهم من جملة نوما من الضهل . موته غابات غفاف المحتوس وادية حلايا وكشير وأسام . جماعته تد من ٧ الى ١٢ زوجا يرأسها ذكر سن . يقتصر الايل الاقلط وايل المسك وادية الشرق وجميع الحيوانات الضعيفة || جسمه منقسم التقاطع ، اعقب القذ ، يطول نحو ١٠٥ سم . ذنبه نحو ٥٠ سم . وارتفاعه ٥٠ سم . اذنه ٨ سم . ثوبه الى الشقة الصناية تسمر بعض التي ، في الصيف . بطة تبي اللون . سباله اسود الملب . ذنبه جزيل الوبر الكثيف ، منخفض الطرف || يسرح في النهار ويبيت في الليل .

٢٢٤٧٩ - فَلَطُوسُ أَسَدِ الرِّاسِ

Malathus melanoccephalus (S). Malatha melanoccephala (F). Malathus melanoccephalus (E).

حشرة داسنة من فصيلة البقريات وربة غديلات الاجنحة . موطنها بعض اصقاع البلاد المشتلة الحارة من الشرق الاذق ولاروية . تألف الاراضي المسحلة والباراري الكثيرة الصغور حيث تترك المواد النباتية من اوراق وميل فطش ونظام ... || جسمها صغير القذ يطول من ٦ الى ٨ سم . رأسها اسود اللون ، قصير الخط . زبانا عيطيان مستطيلان . عينها كيرتان جاسفتان . كيرلها معيوب السطح ، احر اللون . ظهراتها جزوي اللون ، محتدل الاحاديث ، مستدير الطرف الاثمت ، ثنائي التحزيز التمددي القاطب . ارسافها خامية الغفل || الانثى اصفر قذا من الذكر وابيت ثوبا منه واقصر ثوبا || لها جيل



فلبوس أسود الرأس

المكن مباحدا على الصفحات السفلى من نصال اوراق النبات المائل || السرة تطول نحو ٧٢ م . جسمها شبه اسطواني الشكل ، خلي الشعار . ثوبا اخضر يطلو جميع منفرص اصفر . رأسها كسني اللون . مدبها ورواجبها الى الصلحة الخمره || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوما ينقضي ضمن صلبة تحببها السرة على النبات المائل حيث تتدل .

٢٢٤٨٠ - فَلَطُوسُ الرِّزَالِ

Piebleus argus (S).

Argus bleu des genets (F). Piebleus argus (E).

حشرة من القناتيات وربة حرشيات الاجنحة . موطنها بعض المناطق المعتدلة الحارة من الشرق الاذق واربوية . فراشها واحة قربها رحيق الازهار . سرتها تميش على اوراق الرزال والقصور والشيح والتندول || جسمها صغير القذ يطول نحو ٩ م . سبطها نحو ٢٥ م . رأسها صغير الجرم . عينها كيرتان . زباناها مستطيلان ، شبه صولجانيان . حرشها ويطنها الى الزقة يطلوها مواج غير عنه الذكر والى السرة الكسنية عند الاثى || رواش الذكر الى الزقة البنفسجية يطلوها حمار اسود وتهيب ابهى . رواش الاثى الى السرة الكسنية يطلوها تهيب حنلي ويطلوها في الزوج الامامي ثلاث نقط صناية || لها جيل واحد في الخول . تظهر الفراشة في حزيان . تسرح في النهار . تماطل بمد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتمتد المكن مباحدا على الصفحات السفلى من نصال الوراق || السرة تطول نحو ٢٢ م . جسمها بهي الشكل ، كثيف الحمل القصير . اخضر اللون اصفر المواج تملو حمة خطوط سود . رأسها اسود . مدبها ورواجبها الى السرة القاتمة || طور الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع ينقضي معلقا في النبات حيث تتدل السرة .

٢٢٤٨١ - فَلَسي

Cordiforme (F).

Cordiform, Heart-shaped (E).

نمت تعريتي يوصف به الشكل الذي يشبه القلب .

٢٢٤٨٥ - فَلَسيات

هي فصيلة البقريات ، اطليا .

٢٢٤٨٦ - فَلَنت

القلت النقرة في الجبل يشقح لها الماء . ج قلات .

٢٢٤٨٧ - فَلَنت

Salière (F). Eye-pit (E).

القرة فوق عين الفرس .

٢٢٤٨٨ - فَلَنت

هو الحجر ، اطليا .

٢٢٤٨٩ - فَلَنت

Ano âgé (F). Aged ass (E).

القلع : اخلار اسن .

٢٢٤٩٠ - فَلَنت

Irriguer (F). To irrigate (E).

قلد الزرع : سقا .

٢٢٤٩١ - فَلَنت

Arrosage, Part d'eau (F).

Watering, Share of water (E).

القلد هو البتي ويوم البتي ويقال : ما بين القلدين ظرم . وهو التصيب من الماء . يقال اخذ قلدا اي نصيب من الماء . ج قلد واقلد .

٢٢٤٨٨ - قَلَّوْةٌ هَلَالِيَّةٌ *

Calophasia lunata (S). Calophasie à croissant (F). Calophasia lunata (E).

حشرة من فصيلة النسيقات وربيّة حشرشيات الاجنحة . موطنها المناطق المعتدلة الحارة من العالم القديم . فراشها واحة قوتها رقيق الازهار . سرقها تمش على اوراق نباتات الفصيلة الخنازيرية || جسمها متوسط القد بطول نحو ١٢ م . بسطها نحو ٣١ م . رأسها حطلي اللون . عيناها كبيرتان . زباناها عظيمان . جوشها وبطنها الى الحطلي الاسمر المواج || روشها الاماميان ، عند الشقين ، الى الحطلي يطوى علاد ابيض ويثقب اسمر ويجعل بني . روشهاا الخلفيان الى الحطلي يطوى مواج اسمر عند الذكر || لها جيلان في الحول . تظهر فراشة الجيل الاول في نيسان . وتظهر فراشة الجيل الثاني في تموز . تسرح في الليل . تعاظم بعد ظهورها باسبوعين وتمنع المكن لطفاً على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرعة تطول نحو ٣٠ م . جسمها اسطواني الشكل ، ماس للتشار . ثوبها الى الزبداء السوداء ملوكة خسة عطلوط مزدوجة قاطبة جزوية . رأسها الى الحمرة المرجانية . مدنها ورواجها الى السرة || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينتهي في التربة حيث تلتحف بجلباب من الطين .

٢٢٤٨٩ - قَلَّع

و ما تقرر من اسفل مياه السيول مشققاً بعد نضوبها . والقلمقة : قشرة الارض التي ترتفع عن الكساء فقل عليها (الانسان) .

Colophane (F). **قَلَّوْةٌ ، قَلَّانَة** Colophany (E). هو صمغ البطم .

٢٢٤٩١ - قَلَّاس *

Colocasía antiquorum, C. esculenta, Arum esculenta (S). Colocase, Colocasie, Arum colocasie, A. d'Egypte, Taro, Mon, Sonje, Madère (F). Colocasia, C. estable arum, Egyptian arum, Egyptian colocasia, Taro (E). Echte Blattwarz, Agyptisches Arum, Colocase (D). Colocasia, Aro egiziano, Gichero (I).

نبات صفولي زراعي معمر من فصيلة القلقاسيات . اصطناعه للبلاد الحارة . ساقه ارضية صقرلية خفيفة . اوراقه قرصية التجميع تقوم على مائليق مسطيلة منصبة تملو من ٨٠ الى ١٢٠ سم . وفي كبره القد ، قليلة الشكل ، نصلها جامد الصفة المتواجبة قائم الخضار يطول من ٥٠ الى ٧٠ سم . ويعرض من ٣٠ الى ٤٠ سم . ضروبه اتراعية عديدة جميعها ترغب في الارربة الدبالية الرطبة . زراعتها تستقيم في التربة من ٧ الى ١٤ شهراً . محصوله وافر الانتاج . لباب صقاله يتركز بعد طبخه او نغمة بلماذ لزوال ما فيه من مواد قارصة كاديه . ولبابه هذا يحوي نحو :

- ٢,٦٥ ٪ من المواد الازوتية .
- ٥,٩ ٪ من المواد الدهنية .
- ١٦,٨٢ ٪ من المواد الميخروكربونية .

٢٢٤٩٢ - قَلَّاس رُومِي

هو عباد الشمس الصفولي ، اطله .

واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اوائل الربيع وتعيش حتى اواخر الصيف . تسرح في الليل وتبيت في النهار . قوتها المواد النباتية المنحلة والصالبة نحو الانخلال || البرقة عند بلولها الادراك الجسودي تطول من ١٢ الى ١٦ م . جسمها شبه اسطواني الشكل . رأسها وصدرها وتظهر سكهما وشرجها الى السرة الكسنتية القائمة . بقعها الظورية تصفق وتصدر تدريجياً من سكة الى سكة مع ابتعادها عن الرأس . مدنها ورواجها اقل سمة من رأسها . درتها بجوهر باستان حادة . فكها ضليمان || طور الاكمال الذي ينتهي بظهور الحشرة في اوائل نيسان يستمر نحو اربعة اسابيع وينتهي في هجر البرقة طليقاً من كل فلات .

٢٢٤٨٠ - قَلَّع Arracher (F). To pull (E). قلع النبات : استخرج من التربة .

٢٢٤٨١ - قَلَّع ، حَكِي ، اِحْتِفَاف Arraschage (F). Pulling up (E). استفرج النبات من التراب .

٢٢٤٨٢ - قَلَف Phloem القلف هو اَبْزَرُ الداعلي من لحاء الشجر يتميز بيسود الازمية الثريالية المقطع التي تنقل النسج التذالي الكامل .

٢٢٤٨٣ - قَلَّفَ Ecorcer (F). To bark, To strip (E). قلف الشجرة : زرع منها لحاءها .

٢٢٤٨٤ - قَلَّفَاق Colophaca (S). Colophaque (F). Colophaca (E).

جنس نباتات بحلية معمرة من فصيلة السليانيات . موطنها يمتد من الشرق الاذل الى اواسط القباي الروسية . سوقها قرماء تملو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . اوراقها مركبة وثرية العدد . اثمارها صفراء اللون ، عشقودية التجميع || انواعه المعروفة قليلة العدد ، اشهرها التالية :

٢٢٤٨٥ - قَلَّفَاق السُّوْلُوكَا *

Colophaca Wolgarica (S). Colophaque de la Volga (F).

نوع من القلقاف . موطنه القباي الروسية . ساقه تملو نحو ١٠٠ سم . افئاده منسقة الاعتداد ، الحولية منها حلية اللحاء ، مبشرة اللند الدهنية . اوراقها مركبة وثرية العدد الذي يراوح من ١١ الى ١٩ سم . وريقاتها صغيرة ، حلية النصال . اثمارها صفراء اللون ، تطول نحو ٢ سم . || تنويره يستمر من ايار الى حزيران .

٢٢٤٨٦ - قَلَّفَاق كَبِير الزَّوْهر *

Colophaca grandiflora (S). Colophaque à grandes fleurs (F).

نوع من القلقاف . موطنه يمتد من جبال تركية الى ايران وافغان . ساقه تملو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . افئاده جرداء اللحاء ، عادمة اللند الدهنية . اوراقها مركبة وثرية العدد الذي يراوح من ٢١ الى ٢٧ سم . اثمارها صفراء اللون ، تطول نحو ٣ سم . || تنويره يستمر من حزيران الى تموز .

٢٢٤٨٧ - قَلَفَة

نبات اخضر له ثمرة صغيرة وللال عليها حريس (السان) .



لفزة ملاّبة



قلقاس

٢٠ إلى ٤٠ سم. أوراقها تشبه ورق الخراب. أزهارها صغيرة القند صويالية التجميع || أزهارها يستمر طوال فصل الصيف.

٢٢٥٠٢ - فُلَسِيَّة مَلَسِيَّة

Minuartia laticifolia (S). *Aleine à feuilles de mûle* (F).
نوع من الفللسية منبها الأترية الرملية. ساقها تملو من ١٢ إلى ٢٠ سم. أوراقها ملسبة الشكل صجينة النصل النقي. أزهارها صافية الزرنيخ على الساق، كبيرة القند مستطيلة البتلات || أزهارها يستمر من تموز إلى آب.



فللة

Alsnées (F).

٢٢٥٠٣ - فُلَسِيَّات

سبط من فصيلة الفللسيات.

Geotropes (S). *Géotrupe* (F). **فُلُورِيَّة**
جنس شجرات من الجملليات. أنواعه عديدة جميعها راسية نائلة تسرح في الليل وتعيش على البراز وتضلف المواد العضوية المنحلة || أشهر أنواعها فللورة البراز.

٢٢٥٠٥ - فُلُورِيَّة الْبَرَاكُز *

Geotropes starcorialis (S). *Géotrupe starcoriale* (F).
نوع من الفلورورة طولا يراوح من ١٨ إلى ٢٥ سم. جسمها يشبه الشكل مفلطح الجرم صفحتها العليا إلى السواد الأخضر المزاج صفحتها السفلى إلى الزرقاء الخضراء المزاج. تسرح من غروب الشمس إلى أواخر أو أواخر الخريف. اللثاني من الليل. قوتها البراز اصعب ووث العواب. يحجرها سرداب ينور من التربة ترصف فيه كامل مكها بعد أن تلتفه بلحاف تحين من الروث يمد الحرارة اللازمة حتى تنفخ ثم القوت الفردوى حتى الانسلاخ.

٢٢٥٠٦ - قَلَم ، قَلَم السِمْع ، حَكِيل السِمْع

Styla
أحد أجزاء مدقة الزهرة وهو غيط اجوف يحمل السمة ويوصلها بالمبيض.

Grefion (F). *Graft* (E). **قَلَم**
هو العلم.

Bouture (F). *Slip* (E). **قَلَم**
القلم والمقلعة والفلسة تقصيب أو جزء من تقصيب ينقل من النبات ويغرس. راجع مقلة.

٢٢٥٠٩ - قَلَمَت

هو تمنع البر ، أظله.

٢٢٥١٠ - قَلَمَتَاق ، رَشْدِيَّة

Averrhon
جنس أشجار مشرة من فصيلة الحمانيات. أنواعها المعروفة اثنان. منبها البلاد الحارة اعصها الهند. سورها منتصب. اصنافها دائمة منفردة. أوراقها صافية مركبة ريشية. ورقها طابعا ملطحية شبيهة. أزهارها صغوية التجميع محورية الزرنيخ ، طرية. ثمارها يشبه مستطيلة ، لهايا حامز العلم مستحب النكهة يؤكل رطباً وورباً. وهو من النباتات البهرية التي تجود في جميع الأترية القليلة والمتوسطة الانتماع || يتكاثر بالبذر. الأنهار زهر وتثمر طوال السنة.



فللورة البراز

٢٢٤٩٣ - فُلَسِيَّات

Aracées, Aroidées, Aroïdées (F). *Araceae, Aroidaceae* (E).

فصيلة نباتية من وحدات الفللة. اجناسها وأزهارها كثيرة ألعند تجتمع إلى ثلاثة أساط: الرسيات والزرسيات والروبيات. نباتاتها صمودية أو صغولية معمة. مظهرها بري وبضها زراعي وتربي || حسانها لا تتخلو من المواد الكاوية السامة التي يضمحل مفعولها بعد القتل أو الضغ بالماء أو التخميص على النار.

٢٢٤٩٤ - فُلُفُلَانِي كَوْبِيَّة

Starnes cyanoccephala (S). *Colombi-perdrix cyanocéphale* (F).

طائر من الفللسانيات وفصيلة الحاميات. طوله نحو ٢٠ سم. قمة رأسه وصافية اللون زرقاء المزاج ، محاسره وقته وزوره سود. ثوبه مخلي اللون المايق يعلو مخرج جثوي. صدره إلى الجذوة الخمرية. منقاره احمر الانتساب أزرق الكرافت. أربله هو || يألف الإخراج والمناطق الصخرية. اسرابه صغيرة يراوح عدد أفرادها من ١٢ إلى ٤٠. قوته الثار والحليب والبلور. يش في الجينات والأشجار القليلة الارتفاع. اناته تبقي بيضين.

٢٢٤٩٥ - فُلُفُلَانِيَّات

Colombi-perdrix (F).
جنس جحر من فصيلة الحاميات. أنواعه قليلة تتميز بشكلها الذي يشبه شكل الحجل. منقارها قوية مخدة. اجنسها قصيرة شبه مستديرة ، أذناها حريضة مستديرة. أرسافها طويلة ، اصابعها قصيرة. غالباً قوية || لشهر أنواعها قلقتي كوي.

٢٢٤٩٦ - فُلُفُلَسِيَّات

Vitriol vert (F).
هو الزجاج الأخضر ، أظله.

٢٢٤٩٧ - فُلُفُلَسِيَّة

Vitriol vert calciné, Calcite (F).
هو الزجاج الأخضر المكلس.

٢٢٤٩٨ - فُلُفُل ، فُلُفُل

هو السنا البري. شجرة تغاروب الريان تحمل حياً اسود مستديراً في سيم الفلل أو أكبر يبرأ ألس فيه لزوجة وصلابة حسن الثم ورق هذا لشجر اللغات.

٢٢٤٩٩ - فُلُفُلِيَّة *

Minuartia, Alesne (S). *Aleine* (F). *Alein* (E). *Steinmiero* (D). *Alesne, Centocchio* (I).

جنس نباتات عشبية برية مصرة من فصيلة الفللسيات. أنواعها المعروفة نحو ١٢ منبها الفرق الأدنى وأدوية الجنوبية. جميعها صغيرة القند قليلة الفروع. أوراقها مقابلة نصافاً مخززية أو عدية الشكل. أزهارها صلبة الحليم يبيض اللون || أفرعها ما يتبع:

٢٢٥٠٠ - فُلُفُلِيَّة كَنَدِيَّة

Minuartia iliflora (S). *Aleine à fleur de lin* (F).

نوع من الفللسية ، منبها الأترية الكلسية. ساقها تملو من ١٥ إلى ٢٠ سم. أوراقها منتصبه جلدة مهدية. أزهارها صغيرة القند صغوية تشبه زهر الكتان. أزهارها يستمر من تموز إلى ايلول.

٢٢٥٠١ - فُلُفُلِيَّة زَرَايِيَّة

Minuartia juniperina (S). *Aleine à feuilles de genévrier* (F).

نوع من الفللسية ، منبها الحضاب والجبال. ساقها تملو من

في المراكب وفي المواقع الرطبة شرط ألا تتعرض للصقيع في فصل الشتاء. أوراقها مجانية الأشكال وبها المصفية. أزهارها بحيلة ملونة.

٢٢٥٢٠ - قُلْبَاقِيَّاتٌ ٥
Stylidiaceae (S).
Stylidiaceae (F). Stylidiaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين متحدة القممات منخفضة المبيض. أجناسها وأنواعها المعروفة متوسطة العدد جميعها نباتات عشبية وعشوية ترطب في المواقع الرطبة والمناطق أشهر أجناسها القلقة.

٢٢٥٢١ - قُلْبَاقِيَّةٌ هي القصور، نبات بري طبي معمر.

٢٢٥٢٢ - قُلْبُوصُ
Otardeau (F).
Young bustard (E).
فرخ الجباري (السان).

٢٢٥٢٣ - قُلْبُوصُ
Chamelle jeune (F).
Young she-camel (E).

قال الجلاط : « الشاة من النوق. وهي أول ما يركب من أنثى الإبل إلى أن تنثي فإذا أنثت فهي ناقة ».

٢٢٥٢٤ - قِلْوِيٌّ ، قِلْوِيَّةٌ
Alcalin (F).
Alkaline (E).

نسبة إلى القلي. يقال أربة قلوية وسائل قولي وأملح قلوية.

٢٢٥٢٥ - قِلْوِيَّةٌ ، قِلْوِيَّةٌ ، قِلْوِيَّةٌ
Alcalinéd (F). Alkalinity (E).
خاصية المواد القلوية. وهي اعتماد مقدار الدائل في محلول ما أو محيط ما، من رقم الاحتمال المئين وقدره سبعة إلى ما فوق ذلك الرقم. راجع دالف.

٢٢٥٢٦ - قِلْوِيْدٌ ، شَيْءٌ قِلْوِيٌّ
Alcaloide (F).
Alkaloid (E).

مادة عضوية تتميز بنوعها المشابهة لخواص القلي.

٢٢٥٢٧ - قِلْيٌ هو اشتان القلي أو الحرس، اطلبها.

٢٢٥٢٨ - قِلْيٌ ، قِلْيٌ ، قِلْرٌ
Alcali (F).
Alkali (E).

مواد مركبة من معدن وكسجين كالكلس والبيتاس والصودا والمُنْتِزِبا.

٢٢٥٢٩ - قِلْبِيبٌ
Pâcurin commun (F).
هو تف البر، اطلبه.

٢٢٥٣٠ - قِلْبِيَّةٌ عَطَمَاءُ ، قِلْبِيَّةٌ الزَّرْعُ ٥
Aelia rostrata (S). Aelia rostré, Punaise des céréales (F).

حشرة مؤذية من فصيلة القاسيات. جسمها مفلطح، أحليجي اللون، يطول نحو ١٢ م. قوفا إلى الخلف الاصفر المواج يملو تيشير اسمر يمتد من الرأس إلى الكويل فالهيفة فالخنجين. رأسها مخروطي. عظمها مستطيل. عينها صغيرتان. زباناها مستطيلتان. كوسلها قصي اللون. حجبها وحجبها سنانة الاطراف، ومقاربة الطول. قشراتها شفافة. يعلها وقوفاها إلى الخلف الاصفر الاسمر المواج. مرثها النباتات النجيلية وبها الزروع. راجعها كربة.

٢٢٥١١ - قُلْبَاقٌ لَدِيدٌ *

Averrhoa carambola (S). Averrhoa carambole, Carambolier (F). Caramba, Carambola (E). Karambolabaum, Karambole (D). Averroa carambola, A. acellare (I).

لوع من القلبيات. شجرة صغيرة القد تملو نحو ٤ أمتار. أوراقها مائلة. وريقاتها ثلاثية أو خماسية الأزواج. تصلها مائل البشرة، قائم الخضار. أزهارها صغيرة القد، بيضاء اللون أو وردية. ثمارها أحليجية الشكل، خماسية التضديد، صفراء اللون، غصراء المواج. لهاها غزير العصارة، ذكي العرق، مأكول.

٢٢٥١٢ - قُلْبَسُوكَةٌ
Bonnet, Réssu (F). Placus (E).
قسم من أقسام معدة المختبرات صغير الحجم يتصل بالكرش من جهة وبألم للتلايف من الجهة الثانية. راجع معدة.

٢٢٥١٣ - قُلْبَسُوكَةٌ هي الايسوة، اطلبها.

٢٢٥١٤ - قُلْبَسِيَّةٌ
Collinsia (S). Collinsie (F).
جنس نباتات عشبية حولية من فصيلة الحنازريات. أنواعه عديدة منها البرية والزراعية الصياغة والزيينية. مهدها البلاد الامريكية. أوراقها كاملة متعابلة. أزهارها زاهية الألوان فسية التجميع متتالية. تتكاثر بالزور. ترطب في الأتربة الحولرة الجافة المواد الغذائية. امرف أنواعها وأشهرها ما يلي:

٢٢٥١٥ - قُلْبَسِيَّةٌ ثَلَاثِيَّةُ اللون
Collinsia bicolor (S). Collinsia bicolor (F).
عشبة زينة زياء تملو من ٣٠ إلى ٥٠ سم. أوراقها معتقة تصلها سنانة الصفحة، سنان الحافة، قلمي القاعدة. أزهارها ثنائية اللون فيها البنيجي والاييض. أزهارها يشتر من أيار إلى تموز.

٢٢٥١٦ - قُلْبَسِيَّةٌ رِبِّيَّةٌ
Collinsia verna (S).
Collinsie printanière (F).
عشبة زينة مزهرة. ساقها منتصبه فرعاء تملو نحو ٤٠ سم. أوراقها معتقة تصلها خلي البشرة سنان الحافة. أزهارها إلى الزرق. اطراف بتلاتها ييض وهي متوسطة القد مستطيلة الأذن. أزهارها يشتر من نيسان إلى حزيران.

٢٢٥١٧ - قُلْبَسِيَّةٌ صَيَاغِيَّةٌ
Collinsia tinctoria (S). Collinsia tinctoriale (F).
عشبة صناعية زياء. ساقها منتصبه تملو نحو ٣٠ سم. أوراقها لائقة، أحليجية، تصلها غدي الصفحة الزرقية. أزهارها إلى البياض الاصفر المواج يملو توضيح أرجواني. أزهارها صيني.

٢٢٥١٨ - قُلْبَسِيَّةٌ كَبِيرَةٌ الزَهْرُ
Collinsia grandiflora (S). Collinsie à grandes fleurs (F).
عشبة زينة سرسة. ساقها تملو من ٢٠ إلى ٤٠ سم. أوراقها أحليجية سمكة النصل البادم التسين. أزهارها إلى الزرق الموشة بالوردي. بتلاتها كبيرة مستطيلة مجتمة. أزهارها يشتر من أيار إلى تموز.

٢٢٥١٩ - قُلْبَسِيَّةٌ ٥
Styldium (S).
Styldie, Styldier (F).
جنس نباتات عشبية معمرة برية وتزيينية من فصيلة القلبيات. أنواعها المعروفة ثلاثة جميعها زينة تزور



قلْبَاقٌ لَدِيدٌ

وأجناسها وأنواعها قليلة العدد جميعها عشوية . انماثل
بم الأبل على البعل واست الواحد في قم الآخر || الحمر
فصائلها الخرطونيات .

Callanthemum (S).

٢٢٥٣٩ - ثَلْبَة

Callanthemum (F).

جنس نباتات عشية معمرة من فصيلة الشفويات . أنواعه
المعروفة قليلة جميعها اشجار جبلية برية تعيش في المناطق
التي يراوح ارتفاعها من ٢٠٠٠ الى ٣٠٠٠ م . جلدها
جلدية يتوصلها شراخ يملأ حسب الأنواع من ١٥ الى ٣٠
سم . ويتهيأ زهرة متوسطة القند يفضاء اللون او وردية
ارواح عدد بتلاتها ٦ الى ١٦ . اولها جلدية
الانتشاب مستطيلة الزناد مشرمة وخرقة . احرف انواعه
للبنث ملاني الورق
C. rutae-folium (S).
للبنث كزيري الورق
C. corlandrifolium (S).

Sallir (F). To serve (E).

٢٢٥٤٠ - قم

قم وائم الفحل الايل : اشتعل عليها وضربها كلها .

٢٢٥٤١ - قِطَام

القِطَام : الأماكن التي لا تصيبها الشمس . الواحدة قِطَام .

Ectopistes

٢٢٥٤٢ - قِطَامِي

جنس طير وحيد النوع من فصيلة الحياتيات . يتميز
بامتلاكه جناحيه واثنكبه . مغاره دقيق البنية . رسته
قصير وسرود . غلبه الاوسط بين الانعكاف . واسمه
قري اطلية .

Reproduction des oiseaux (F).

٢٢٥٤٣ - قِطَام

Reproduction of the birds (E).

القِطَام : سفاد الطير . وقيل زين راسع الطير .

Acidie (F). Acidium (E).

٢٢٥٤٤ - قِطَامَة

عارض جسمودي يكثر في الماهج ، يشو اوراق انبات
بزياداته النصيلة التي تشبه القمع او البرق او الاناء .

Polycarpon (S).

٢٢٥٤٥ - قِطَامَة

Polycarpon (F). Polycarpon (E).

جنس نباتات عشية حولية برية من فصيلة النوماتيات .
انواعها المعروفة ستة منها بعض اصناف اليلاد الحارة
والمعتدلة الحارة من العالم القديم || سيقانها خضراء . معطها
متنصب وبسطها مستطيل . اوراقها مفصصة . فصالحا
لحمية . متالية الشكل ، مخنجة ، خلية البشرة . ازهارها
لاقامية للتجميع ، منها الفردية والثنائية والثلاثية والارباعية .
الوانها تراوح بين الوردي والوردي الاحمر او الازرق
المواج .

٢٢٥٤٦ - قِطَامِي

ايام من آخر ايلول بقدر شهور السنة يستدل منها فيما قيل
من حالة الهواء في كل شهر من السنة القابلة .

٢٢٥٤٧ - قِطَام

هو الاس المذهب الورق ، اطلية .

Vaccinium (S).

٢٢٥٤٨ - قِطَام

Airelle, Vaccinier (F).

جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة الخلنجيات أنواعه
نحو ٤٠ فيها الشجيرات والنباتات والجنات . سيقانها
فصاحة . اوراقها متعاقبة متبادلة . ازهارها وزية التجميع ،

Kaliya (S).

٢٢٥٣١ - ثَلْبَة

Kaliya (F). Kaliya (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات صفحيات الخياشيم
وفصيلة البرسويات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في
معظم بحار العالم . اجناسها صغيرة . اصدانها قبابية شبه
صويانية الشكل . تعيش لاصقة بالصخور . ليفها غزير
المادة .

٢٢٥٣٢ - ثَلْبَة

ما يترك من السبل عند اشتياؤه او ما تحبه النمل من السبل
في ظروف معينة .

٢٢٥٣٣ - ثَلْبَة مُتَشَبِّهَة

Callistus lunatus (S). Calliste orné (F).

Callistus lunatus (E).

حشرة رانجة قانصة من فصيلة القليسيات وربة مخدبات
الاجنحة . تألف الاراضي الكلسية في التهام والحضاب
البحرية المرض || جسمها صغير القند يطول من ٦ الى ٧
م . رأسها قصير الخيط ازرق اللون فكها ضلحيان .
زبانها ضلحيان ، مستطيلان . صينها صغيرتان . كسلها
احمر اللون . ظفرها الى الحفرة الزاغية تملو اربع بقع
كبيرة ويقبجان صغيرتان لونها الى البواد الازرق المواج ||
ها جبل واحد في الحول . تسرح في التبار وتبيت في الليل ||
يرتقيا تطول من ١٥ الى ١١ م . جسمها مربع السك ،
احمل القرن اسمر اللب ، اسود الرأس والشرج ، ضلع
التأثير الحادة . قوتها المواد الصبوية تسمى اليها بدون
انقطاع لانها شديدة النهم || طور الاكمال يستمر نحو
خسة اسابيع .

Callistidae (S).

٢٢٥٣٤ - قَلْيَسِيَّات

Callistidae (F). Callistidae (E).

فصيلة حشرات لاحة وقانصة من ربة مخدبات الاجنحة .
اجناسها وانواعها كثيرة العدد منتشرة في جميع اصناف
العالم واخصها اليلاد الحارة || جميعها صغيرة القند او
متوسطة الطول الذي قلما يتجاوز ٢٥ م . اجناسها خلية
القشار ، جملة الالوان الزاغية الحامة . رؤوسها شبه
اسطوانية الجرم ، ناشزة الميون ، مستطيلة الزبان ،
معتلة الكوكل اللاباقسية الشكل ، لاحقة الانجاد التساعية
الاعاديد الخنازونية || تسرح في التبار وتبيت في الليل .
تسمى بصره ورشاقة وتعتبر بطة || قوتها المواد الصبوية
المختلفة المصاد ولا تست في فريسة تستطيع اليها سيلا ||
اشهر اجناسها القليسة والثلنوس .

٢٢٥٣٥ - ثَلْبَة

هو ابلق القلع ، صفور من الجوامث صغير القند ابلق الثوب
يكثر من الزوف مل الصنخور ولذا سمي قليسي .

Fruits deséchés (F).

٢٢٥٣٦ - ثَلْبَة

Dried fruits (E).

هي الثيار المخلقة المرسية .

٢٢٥٣٧ - ثَلْبَة

هي البهرولة ، اطلية .

Oligochaetes (F).

٢٢٥٣٨ - قَلْيَلَات الْهَلْب

Oligochaeta (E).

ربة من الحليقات المفرديات تتميز بمخلوطها من الواس
والايل والفاشيم . اما حلها فتشيد القصر ، قليل العدد
اذ لا يتجاوز اربعة ازواج في كل فتحة || فصائلها



ثَلْبَة



ثَلْبَة مَهْجَة

اوراقه ابيدة نخيلة ملقطة الاطراف تطول نحو ١٠ سم. ازهاره الى الحمرة الفاتحة. ثماره وردية اللون مأكولة ويستعمل ثمرها مشروب كحمولي للذئب الطم. اوراقه رافقانه ويجذره عاصمة تستعمل في الدبابة.

٢٢٥٥٥ - قِيَامُ كَبِيرِ الثَّصَر

Vaccinium macrocarpum, *Oxycoccus macrocarpa* (S). *Airelle à gros fruits*, *Canneberge à gros fruits* (F). نوع من القيام، جنينه مثمرة تطول نحو ١٠٠ سم. اوراقه ابيدة سائنية تطول نحو ٣ سم. نصلها جامد الصفعة ملئت الحنار. ازهاره لافحامية التجميع فيها الاحادية والثلاثية وانحاسية والسبانية والتساعية. ثماره مأكولة قطرها نحو ٢ سم.

Vaccinium arboreum (S). *قِيَامُ مَشْجَر*. *Airelle en arbre* (F).

نوع من القيام، شجرته تطول من ٤ الى ٨ امتار. فروعها واقفاها خلية البعاد. اوراقها عابطة سائنية تطول نحو ٦ سم. وتعرض نحو ٣ سم. نصلها جامد النسيج، مالم الصفعة العليا للامعة الحنار، خلي السفل البحرية اللون. ازهارها الى البياض الودي. ثمارها سود حامزة حافصة لا تؤكل.

Ordures des villes (F). *Ordures of city* (E). **٢٢٥٥٧ - قَمَاق**

بقايا الماطين وكناسة البيوت والشوارع تستعمل في تسميد التربة وهي من الاسمدة العضوية.

Vacciniées (F). **٢٢٥٥٨ - قَمَاقِيَات**

سبط من قصبية الخنثيات يشمل بعض الاجناس والالتواع. معظمها من نباتات جبال البلاد المعتدلة الحرارة. اشهر اجناسه القيام.

Nanisme (F). *Nanism* (E). **٢٢٥٥٩ - قَمَاقَة ، قَمَاقَة**

خاصة في بعض النباتات والحيوانات تنمها من اتخاذ حجمها المألوف فتلبث صغيرة. من اسبابها الرئيسية في النبات فقر التربة ببعض العناصر الغذائية.

Vertex **٢٢٥٦٠ - قَمَة الرَّاس**
هي النافوخ، اطلبه.

Triticum (S). **٢٢٥٦١ - قَمَح ، حِنْفَة**
Blé, *Froment* (F). *Wheat* (E). *Weizen* (D). *Fromento* (I).

جنس نباتات عشبية زراعية حولية من فصيلة النجيليات بطورها جرزة دقيقة. سورها شطاه، قصبية، اسطوانية، مستقيمة، فارقة، سلاية التركيب، مصمتة القعد والاطراف التي تنتهي بالسنايل. سنايلها بحورية مركبة من حدة سقيليات متتالية. اما الاشطاء فانها ترسية الانتشاب وهي حل فتبين امهات وبنيات فالامهات تلك التي سورها وسنايلها تطول قدر السيلة الرئيسية اما البنات فتلك التي تتأخر عن الامهات وقد تكون سنايلها جامدة البر. اوراقها متعاقبة مستطيلة مركبة من قسمين، غمد طويل ملئت رنكز حل القعدة ويخفف السلاي ونصل ضيق مستطيل بدعي المصعة يرتكز عند قاعدة انفصاله عن القعد على لسن مسن الحنار وعلى اذنين تكتنفان الساق. اما ثمارها فيايسة لانفرجة تدعى البر. الواحدة برّة. تاويغه - راجعه - كلمة حنفة.

بحورية الارتكاز. ثمارها عتية الشكل، حامزة الطم. مأكولة || احرف ازهاره واطرها ما يلي.

٢٢٥٦٩ - قِيَامُ أَحْمَر

Vaccinium vitis-idea (S). *Airelle rouge*, *Myrtille ponctuée*, *Vigne de l'ida* (F). *Cow-berry*, *Whim-berry* (E). *Preiselheidebeere* (D). *Bacari vite idea*, *Mortella ponteggias*, *Vigna d'orso* (I).

نوع من القيام جنينه شباه البلاد المعتدلة الحرارة. جنينه تطول من ١٠٠ الى ٢٥٠ سم. اوراقه سائنية صغيرة تطول نحو ٣ سم. نصلها بحري اللون على صفحته. ثماره الى الحمرة القريزية يستخرج منها بعد تحميرها وتقطيرها مشروب كحمولي للذئب الطم.

٢٢٥٧٠ - قِيَامُ آسِي

Vaccinium myrtillus (S). *Airelle myrtille*, *Abreder*, *Myrtille* (F). *Bilberry*, *Blackberry*, *Whortle-berry* (E). *Echte Heidelbeere* (D). *Bacari mirtillo*, *Mirtilla*, *Uva ursina* (I).

نوع من القيام. جنينه فناء تطول من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم. اوراقها صغيرة القد آسية الشكل، نصلها جامد النسيج أحمر الصفعة. ازهارها وردية، خماسية الفصوص، حشارية الاسدية. ثمارها خرة اللون مأكولة ويستعمل منها كحول للذئب الطم || جلوره وانفاته واوراقه تستعمل في الدبابة.

٢٢٥٧١ - قِيَامُ الْمَنَاقِع

Vaccinium uliginosum (S). *Airelle des marais*, *Canneberge* (F). *Crauberry*, *Moss-berry* (E). *Mosshatdelbeere* (D). *Mortella di palude*, *Mortellina di lago*, *Scopa fructifera* (I).

نوع من القيام الملبول يكثر في المنائق الرطبة، ساهه فراءا تطول نحو ٨٠ سم. اوراقه عابطة صغيرة، القد، نصلها سائي الشكل يطول نحو ٣ سم. صفحته بحرية اللون. ازهاره احادية او ثلاثية التجميع. ثماره سكرية الطم مأكولة وصالحة للتقطير.

٢٢٥٧٢ - قِيَامُ جَبَلِي

Vaccinium arctostaphylos (S). *Airelle de Cappadocia*, *Thé de Trébizonde* (F). *Oriental whortle-berry*, *Trebizond tea* (E). *Broussatee* (D). *Tà di Brousse*, *Vaccinio di Cappadocia* (I).

نوع من القيام يكثر في بعض مناطق البلاد التركية. اوراقه ابيدة، نصلها جامد الصفعة الضيقة المسنة الاطراف. ازهاره قصبية الشكل بياض اللون احادية او ثلاثية التجميع. ثماره حامزة عصصة حراء اللون || اوراقه صعبة تستعمل استعمال الشاي.

٢٢٥٧٣ - قِيَامُ عَشْكَرِي

Vaccinium corymbosum (S). *Airelle à corymbes* (F). نوع من القيام جنينه تطول من ١٥٠ الى ٤٠٠ سم. ساقها وفروعها واقفاها سرحة. اوراقها عابطة تطول نحو ٧ سم. نصلها مفند الصفعة، قليل القصة. ازهارها وردية اللون، خماسية او سبانية التجميع، عشكورية الترتيب. ثمارها الى الزرقة السوداء وهي مأكولة وصناعية كحمولية.

٢٢٥٧٤ - قِيَامُ صَبِير

Vaccinium oxycoccus, *Oxycoccus palustris* (S). *Airelle commune*, *A. à maurets*, *Canneberge commune*, *Brimbelle* (F). *Small crauberry*, *Bog-berry*, *Fau-berry* (E). *Moosebeere* (D). *Bacari canneberg*, *Vaccinio dei paduli* (I).

نوع من القيام، ساهه مسطحة تطول من ٢٠ الى ٨٠ سم.



قام احمر



قام آسي



قام المنافع



قام جبلي



قام صبير

٢٢٥٦٧ - قَمْحُ صَبْ ، قَمْحُ قَسِر

Triticum durum (S). Blé dur (F).

من الأنواع الجرد تكثر زراعته في بلاد حوض البحر المتوسط. ضروبه وأصرامه كثيرة العدد. ساقه مسنة أو جوفاء. سنابلها مسقوية. برء مستطيل الشكل صلب المكسر.

Triticum sativum (S).

٢٢٥٦٨ - قَمْحُ تَيْن

Blé tendre (F). Common wheat (E). Saatweizen (D).

Fromento comune, Frumento, Blada, Grano (I).

من الأنواع الجرد تكثر زراعته في البلاد الأوروبية والأمريكية ضروبه كثيرة العدد وأصرامه أيضاً. ساقه جوفاء سنابلها كبيرة القند منها البقوية وللأقوية. لانياس الشكل واللون. لين المكسر اللينقي.

٢٢٥٦٩ - قَمْحُ تَشْوِي

Triticum dicoccum, T. amyaleum (S). Blé de Jérusalem, Amidonnier (F). Two grained wheat, Emmer wheat (E). Emmer, Emmerweizen, Emmerkorn (D).

Fromento di Gerusalemme (I).

من الأنواع المكسية. زراعته محصورة ببعض جهال أروبة الوسطى والشرق الأدنى. ضروبه وأصرامه قليلة. ساقه فارغة. سنابلها كثيفة مسقوية. برء حنطي اللون، أبيض المكسر، غزير اللادة التوشية.

٢٢٥٧٠ - قَمْحُ وَحِيدُ الْحَبَّةِ

Triticum monococcum (S). Blé locular, Engrain, Petit épeautre (F). One grained wheat, Small spelt (E). Einkorn, Einkornweizen (D). Fromento loculare, Piccola spelta (I).

من الأنواع المكسية. زراعته موزعة في ألمانيا وبغارتيا وروسيا. ساقه فارغة. سنابلها مستطيلة مسقوية. سنابلها وسيدة الحبة. برء حنطي اللون اسمر المواج.



ح

Lune (F). Moon (E).

٢٢٥٧١ - قَمْحَر

جرم سمائي كروي الشكل يشهد ضوؤه من الشمس ويكسبه حل الأرض. وهو أقرب الأجرام إليها قمره يبلغ نحو ٣٥٠٠ كلم. وحجمه نحو ثلثي من حجم الأرض وهو يدور حولها في فلك اهليلجي بعد أوجه منها، وهو المسافة القمرية، يبلغ نحو ٣٥٤٥٨٠ كلم. وحجمه قمره، وهو المسافة البعيدة، يبلغ نحو ٤٠٤٧٥٠ كلم || ولقمر ثلاث حركات، اليومية واليلية والصمودية وهو ينتج دورته حول الشمس في أربعة أسابيع. والحركة الصمودية هي التي يشهد عليها في حساب السنة القمرية التي يبلغ عدد أيامها ٣٥٤ يوماً أي أنها تتقصر ٥٨ دقيقة من السنة الشمسية || أما الشهر القمري فلدته ٢٩ يوماً و١٢ ساعة و١٤ دقيقة.

Caranx lune (S).

٢٢٥٧٢ - قَمْحَر

لوح من الشم. وهو مسكة بحجرة مأكولة كبيرة القند تطول نحو ٦٥ سم. أعطانها مياه بحار البلاد المطلة توسد في المتوسط. تكثر في مناطقه النيلية.

Echadure lenticulaire (F).

Lenticel spotting, Apple scald (E).

عارض يصيب ثمار التفاح والأجاص الخفزية في البراد منه جميع بعض الفنازات الناتجة من تنفس الثمار في أثناء خزنها || مظهره الخارجي بقع صغيرة بيضاء اللون تملأ سطح البشرة ثم تنتشر رويداً رويداً إلى أن تغطيها بكاملها فتتسبب عندئذ صلب الالباب على عمق يراوح من ٢ إلى

القلبي - يحتاج القمح في دورته الحياتية القائمة بين انتائه واستحصاده إلى كمية من السرعات الحرارية يراوح قدها بالنسبة إلى مختلف ضروبه وأصرامه من ١٧٠٠ إلى ٢٢٠٠ سرعة. ولا يحصل انتاش إذا كانت الحرارة دون قلت درجتان سخ. أو فوق ٤٥ درجة سخ. أما أصلح حرارة لانباته فهي التي يراوح معدلها من ٢٢ إلى ٢٨ درجة سخ. لذلك يمكن القول أن أقلم الحنطة يشمل العالم باستثناء المناطق القطبية والجبالية العالية ومناطق خط الاستواء التي يراوح ارتفاعها من سطح البحر من صفر إلى ٢٠٠٠ م. تربه - يثبت القمح في مختلف الأتربة التي ألهاها بالزراعة المتتالية لكنه يرغب في الأتربة العميقة القدر المنسوبة التركيب الحكمي المتوسط الاندماج التي تستحب الانطار وتحافظ على الرطوبة ولا يبعد في الأتربة الكلسية والربوية لأنها تجف سريعاً وهو يخشى الأتربة الطينية المنتجة لانه يتضرر من تماسكها بين مفاهيم يفيضها الرطوبة المفرطة والجفاف الزائد.

أنواعه - أنواعه الزراعية سبعة أما ضروبه وأصرامه فكبيرة العدد. وأنواعه الرئيسية هذه قسم إلى قسمين : الأنواع الجرد وعددها أربعة والأنواع المكسية وعددها ثلاثة. فالأنواع الجرد التي تنفصل فيها البر من صفاته والتي تتميز بلبين قمار سنابلها ولدانتها وعدم انفصالها : أروبة : القمح الصلب والقمح القين والقمح البولوني والقمح الششين. أما الأنواع المكسية التي لا يتفصل برها عن صفاته والتي يسهل انقسام سنابلها وقسمها فهي : القمح الربوي والقمح النشري والقمح الوحيد الحبة.

٢٢٥٦٢ - قَمْحُ الْبَقَرِ

Sarrasin ménager, Bucali (F).

هو السرازان المرووف، اعطيه.

٢٢٥٦٣ - قَمْحُ الْبَقَرِ الْهَنْدِي

Blé de Tartarie (F).

هو السرازان النثري، اعطيه.

٢٢٥٦٤ - قَمْحُ بُولُونِي

Triticum polonicum (S). Blé de Pologne, Froment de Pologne (F). Polish wheat (E). Polnischer Weizen (D). Fromento di Polonia (I).

من الأنواع الجرد تكثر زراعته في بعض مناطق أروبة وأفريقية النيلية. ضروبه وأصرامه عديدة. برء شديد الاستطالة. جامد المكسر الصلب.

٢٢٥٦٥ - قَمْحُ تَحْنِيْن ، قَمْحُ عَرَبِي

Triticum turgidum, T. vulgare (S). Blé renflé, Froment renflé, Poulard, Gros blé (F). Humpy grained wheat, Turgid wheat, River wheat (E). Englisches Weizen (D). Fromento turgido, Grani grosso (I).

من الأنواع الجرد. تكثر زراعته في الشرق العربي لكنه يرغب في الأتربة الخوارة الوافرة المواد الغذائية. ساقه مسنة في أصلها. سنبلته مرعبة الاصلع، كثيرة البر. برء غليظة مخدبة، سلبة المكسر.

٢٢٥٦٦ - قَمْحُ رُبُونِي، قَمْحُ مَكْتَسَر، عَدَس، عَدَسْ رُونِي

Triticum spelta (S). Blé vètu, Epeautre, Grand épeautre (F). Spelt wheat, Dinkel wheat (E). Spelz-Weizen (D). Spelta, Marzolo, Fromento rosso (I).

من الأنواع المكسية. زراعته محصورة بالأقاليم الباردة والجبالية. ضروبه وأصرامه معقدة. ساقه عالية فارغة. سنابلها فرقة، مستطيلة، مسقوية، لونها يختلف باختلاف الضروب منها الأبيض والاحمر والاسمر.

٢٢٥٨٠ - قمرته هو الاربيان ، اطلبه .

٢٢٥٨١ - قمرته رشيق (F). *Gnatophylla elegante*

دوية من القشريات وفصيلة القريدسيات مشهورة باسم هوبر . اطلبه .

٢٢٥٨٢ - قمرته (F). *Lunaria* (F). *Lunar* (E).

٢٢٥٨٣ - قمرته (F). *Lunifforme*, *Lunulaire* (F). *Lunifrom* (E).

لمت تعريتي يوصف به ما كان شكله شكل القمر .

٢٢٥٨٤ - قمرته (F). *Ectopistes migratoria* (S).

Ectopiste migrateur (F). طائر من القهارى وفصيلة الحاميات كنيته ابو ذكري وابر طلحة . الانثى قريه والجمع قاري وقرى . يروى ان هبة الرحمن بن ابي بكر الصديق لما تلقى زوجته حاتكة ، زولوا عنه رغبة ابيه ، كان يشد :

احاتك لا اتسكك ما ذر شارق

وسا نلق حامي الحمام المطوق

ولم ار مثلي طلق اليوم قطعا

ولا مثله من غير جرم يطلق

احاتك قلبي كل يوم ولى

ليك يسا تحتي النفوس معلق

ها خلق جزل ورأي وينصب

وعلق سوي في الحياة ومنلق

فرق له ابوه وامره ان يربحها || والقري طائر طوله نحو ٤٠ سم . ظهره الى الزرقه الرصاصية متفك بنفسجي المواج . صدره وبيضه الى الصبغة الصفائية . زكاه ابيض الريش . انفيكه رصاصي الانتشاب اربد الطرف متفرقه بقع سود . جناحه اسود الوسط رمادي الاطوار والحافة . منقاره اسود . عيناه برتقاليان ، جفونها حر . الانثى اصفر قدام الذكر وادكن قويا واقل مابية || موطنه فسح الاربعاء يم جميع البلاد . وهو من الطيور القواطع التي تجوب البلاد سميا وراء الرزق وليس في سبيل المصيف والمشي . اسرايه كيفية يراوح عدد افرادها من ٥٠ الى ١٠٠٠٠ . قوته الحبيب والبؤور . يدن حته في الاجنار . اناته تبيض من المزين الى الثلاث مرات في السنة .

٢٢٥٨٥ - قمرته (S). *Menispermaceae* (S).

Menispermaceae (F). *Menispermaceae* (E). فصيلة نباتية من ذوات الفلقين . اسماها ٤ اجناسها ٣٠ وانواعها ١٠٥ . اصلها البلاد الاسيوية والامريكية تكثر في المناطق رطب وشفات الانهار . معظمها من اجنات المارسة . اوراقها متعاقبة معتمة . ازهارها صغيرة القد ، متقوية التجميع ، محورية الارتكاز . ثمارها نورية صغيرة الحبر .

٢٢٥٨٦ - قمرته هي حشيشة القمر ، اطلبه .

٢٢٥٨٧ - قمرته ، حب الهلال ، سم الحوت

Menispermum (S). *Ménisperme* (F). *Moonseed* (E). *Mondsand* (D). *Menispermum* (I).

جنس نباتات عارشة من فصيلة القمريات . انواعها عديدة معظمها بري وبضها زريبي . اوراقها متعاقبة معتمة كاسلة او مفصصة . ازهارها صغيرة القد ، ثنائية المسكن ، متقوية التجميع ، ثمارها نورية لا تظفر من المواد المتسمل في صيد السمك || اشهر انواعها ما ي :

٥ م . || يمكن اجتنابه : ١ بالبريد المستظم والتهوية الجسيمة . ٢ بعدم الافراط في ري الاشجار قبل زمن الجني . ٣ بجني الثمار حته يده اذراكها حيث تكون نسبة المولد الاثيرة المختلفة على احسن حال .

٢٢٥٧٤ - قمر الليل (S). *Citharinus Geoffroyi* (S). *Citharine du Nil* (F). *Citharinus* (E).

قر الليل هو الاسم المصري . سمكة نهريه ييوس من مفتوحات المائنة وفصيلة السمليات . موطنها النيل من منتهى الى مصبه . تعيش في الاسمال والاورحال || جسمها كبير القد ، مبط الجرم ، بطول نحو ٥٠ سم . عرضها من حافة بطها الى قاعدة زعنفتها الظهرية الاولى ، نحو ٢٥ سم . رأسها صغير الحجم ، شبه اسنفي الشكل . شدتها قليل الانفرج . انتابها صغيرة حادة ، على صف واحد . زعنفتها الظهرية الاولى كبيرة القد شبه هرية الشكل ، اما الثانية صغيرة . زعانفها الصدرية والخصوية صغيرة الجرم . زعنفتها الشرجية مستطيلة ناعقة المقدم . زعنفتها الذيلية فائقة ، رحية الانفرج || نوبا الى الشبة الغضبية مما دس الى تسميتها بقمر الليل || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

٢٢٥٧٥ - قمرته (F). *Fauvette des Jardins*

القمره طائر من الدغاعيل يدعى دخلة البساتين ، اطلبه .

٢٢٥٧٦ - قمرته (S). *Glomeris* (F).

Glomeris (E). جنس دويات من فصيلة القمرونيات . انواعه عديدة جميعها شبه اسطوانية الشكل طولها يراوح من ١٢ الى ٢٠ م . اجسامها من ١٢ سقة . جرانها ٢٤ . اثرها الى السرة . تعيش تحت الحجارة . قوتها المواد النباتية المتحللة تسرح في الليل وتتكور في النهار .

٢٢٥٧٧ - قمرته مهدب (S). *Glomeris marginata* (S).

Glomeris bordé (F). *Margined glomeris* (E). دوية دامت من فصيلة القمرونيات وربة الدغاعيات شغوفات الاحتكاك || جسمها صغير القد ، محبب السطح الملوي ، متوسط الملب . الذكر اصفر قدام الانثى يطول نحو ١٢ م . والانثى تطول نحو ٢٠ م . || رأسها متعرج الشكل ، قليل التنوع . حيثما زرعنا . متكاها قارض قاصم . زباناها صغيران خيلان . جرانها قصيرة تعد ١٧ زوجا عنه الذكر و١٩ زوجا عنه الانثى . ثوبا اسود البين ، اطحل الحمل الكثيف . مدبها الى البعللة للبراء || تعيش تحت الحجارة وفي المواقع المعتدلة الرطوية وفي الاقنية والمساكن الارضية . تسرح في الليل وتتكور في النهار . قوتها المواد النباتية المتحللة || تعتبر من الدويات اللامؤدية .

٢٢٥٧٨ - قمرته (S). *Glomeridae* (S).

Glomeridae (F). *Glomeridae* (E). فصيلة دويات من الدغاعيات الشغوفات الاحتكاك . اجناسها وانواعها عديدة اشهرها واعها القمروش .

٢٢٥٧٩ - قمرته (F). *Amande dure* (F).

Hard almond (E). هو الفوز الصلب الذي يوجب الكسر .



قر الليل



قروش



قروش مهدب



قري



قريه

٢٢٥٨٨ - قَمْزِيَّةُ الصَّيْنِ

Menispermum dauricum (S). Ménisperme de Daourie, M. de Chine (F).

جنية زُرْبِينَة عارضة تملو نحو ٤ أمتار ، أوراقها مستطيلة المسك ، أهليجية الشكل ، خماسية التفصيص ، نصلها مائل البشرة اللامعة على صفحتيه . ثمارها إلى الجلوة الغالطة ॥ انزعاجها يستمر من حزيران إلى تموز .

٢٢٥٨٩ - قَمْزِيَّةُ كَنْدَا

Menispermum canadense (S). Ménisperme du Canada (F).

جنية زُرْبِينَة عارضة تملو نحو ٤ أمتار . أوراقها قلبية الشكل خماسية أو سباعية التفصيص ، نصلها مائل الصفحة العليا ، خلي المروق على السفلى ، ثمارها إلى السواد اللامع ॥ انزعاجها يستمر من حزيران إلى تموز .

٢٢٥٩٠ - قَمْصُ اسْوَدَّ

Tipula nigra (S). *Tipula noire* (F). Black tipula (E).

حشرة من فصيلة القمصيات . جسمها اسطواني الشكل ، مستدل القدر ، يطول من ١١ إلى ١٥ سم . ॥ ثوبها إلى السواد الاسمر . ورشاتها إلى السرة العاقبة ، زباناها عيطيان ، مهدبان ॥ الأنثى اكبر قدماً من الذكر واصغر ورشاً منه ॥ تظهر الحشرة الجملانة في حزيران وتبقى حتى ايلول . تألف المئات والغابات الظليلة ॥ تمتع الأنثى كمكها في التربة تقيت من يرقات تعيش على المواد النباتية والمضوية المنحلة .

٢٢٥٩١ - قَمْصُ الْبُقُولِ *

Tipula cleracea (S). *Tipule potagère* (F). Leatherjacket (E). Wiesenschnake (D).

حشرة من القمصيات طولها يراوح من ١٥ إلى ٢٣ سم . جسمها واجنحتها وارجلها مستطيلة . لونها إلى الخطي تشوبه صفرة زيتية . ذكرها اصفر حسيماً من انثاء . والأنثى تمتع كمكها في ايارن الربيع على سوق الزروع وغفلت نباتات المرامي والمروج تقيت من يرقات صفرة نمة تلثم الجلود وقد تركب الاوراق وتؤذيها . وهي تسرح في الليل وتبيت في النهار . لها جيلان في الحول ، الاول في الربيع والثاني في الصيف .

٢٢٥٩٢ - قَمْصُ كَبِير

Tipula maxima (S). *Tipule maximale* (F). Major tipula (E).

حشرة لامؤذية من فصيلة القمصيات . جسمها مستطعم كبير ، يطول من ٢٧ إلى ٤٠ سم . ॥ ثوبها إلى الخطي الاسمر . ورشاتها مهدبان بالابيض والوردي الباهت ॥ زباناها مرفقيان ، مهدبان . تتميز بكبر القدر وبامتدالة للقران ॥ الذكر اصفر قدماً من الأنثى . تظهر الحشرة الجملانة من ايارن إلى تشرين الثاني . تألف الاسكن الرطبة وصفاف مجاري الماء . تمتع الأنثى كمكها في التربة . يرقاتها تعيش على المواد المضوية والنباتية المنحلة .

٢٢٥٩٣ - قَمْصِيَّة

Sauterelle à l'éclotie (F). الجرادة عند تفلقها . ج. قص .

٢٢٥٩٤ - قَمْصِيَّات

Tipulidae (S). *Tipulidae* (F). *Schnaken*, *Riesenschnaken* (D).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها

عديدة لا تقل عن ٥٠٠ من معظمها من الحشرات الثائفة او القليلة الضرر . تعيش على رقيق الانهار وارفاز الارباق . تكثر في الاسكن الرطبة القليلة وعلى صفات الانهار . يرقاتها تعيش في الماء او قرب الماء في التربة والريال على مختلف المواد المضوية والنباتية المتخرسة .

٢٢٥٩٥ - قَمْطُول

Antedon (S). *Antédon, Comastule* (F). *Comastule* (E).

جنس حيوانات بحرية من زنايق البسر وفصيلة القمطوليات . انواعها المعاصرة المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار العالم ॥ جميعها عشارية الاصابع القابلة للانطواء والتمصيص . احادية الساق النحيلة المنخفضة عند الادوك ॥ نسج بواسطة اصابعها . يكثر وجودها حيث يكثر الخث والطرح ॥ اعرفت انواعها القمطول الاجر والقمطول الوردي .

٢٢٥٩٦ - قَمْطُولِيَّات

Comatulidae (S). *Comatulidae* (F). *Comatulidae* (E).

فصيلة حيوانات بحرية من زنايق البسر . اجناسها وانواعها المعاصرة عديدة منتشرة في معظم بحار العالم ॥ جميع انواعها ثابثة مستقرة حتى نهاية زين قوتها ثم تتحول إلى متغلة مجولة تقوم وتلتصق بالاشياء بواسطة زوائد هدية ॥ اشهر اجناسها القمطول .

٢٢٥٩٧ - قَمْص

Entonnoir (F). *Funnel* (E). جهاز يوضع على ثم الاناء فيصب فيه الماء ويغير . ج. انقاع .

٢٢٥٩٨ - قَمْص ، قَمْص

Cupule كأس صفرة قلمية غشبية التركيب تحيط بجوار بعض الاشجار كالبلوط والبتدق .

٢٢٥٩٩ - قَمْصَة

ذباب يركب الايل والظباء اذا اشتد الحر . ج. مقاع وق (السان) .

٢٢٦٠٠ - قَمْصَل

Bourgeonner (F). *To bud* (E). قبل الثبات : خرجت قاصيلة اي براعم .

٢٢٦٠١ - قَمْصَلَة

Bourgeonnement (F). *Budding, Sprouting* (E).

هي نمو قاصيل النبات وزمعاها . وهي مجموعة المناشع التي

تتابع تكوين البراعم وتوحيها .

٢٢٦٠٢ - قَمْزُونَةُ حَمْرَاءُ *

Catocala nupta (S). *Lichénée rouge, Mariée* (F). *Catocala nupta* (E).

حشرة من الفصليات مرشقات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الأوسط إلى اوروبا . يرقاتها وائمة قوتها رقيق الانهار . سرقتها تعيش على اوراق الخور والصفصيات ॥ جسمها كبير القد يطول نحو ٣١ مم . بسطها تراوح من ٧٤ إلى ٧٨ مم . رأسها كسني الين . صيادها كيرنان . زباناها عيطيان . جوشها وبطنها إلى الكسني الاكلت ॥ ورشاتها الاماميان إلى الريدة السمره يطولها زراكن وتزاورق خلفه الالوان البني والكسني والازرق الاطلح . حناها انخاري متتابع الاقواس الحلقية السمره . ورشاتها الخلفيان إلى الحمرة القرمزية يطولها طرق مجوري وبيدة وسطى من اللون نفسه ॥ لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في تموز وتبقى حتى ايلول . تسرح في الليل . تماثل بعد ظهورها بنمو سمة اصابع وتمتص الحنك مبادياً



قص البقول



قَمْزُونَةُ حَمْرَاءُ



فُصُونَةُ زَرَقَاءَ



قُمُيَحِي التَّيْنِ

الاستشعاري مركب من ٥ فواصل صغيرة. رسلها وسيد
المقلعة ينتهي بمقلع حاد قروي || قميش طفيلية حسل
الانسان والحيوان البهين. | تنحس الدماء وتسبب الامراض
التي تنقلها || اشهر فصائلها القزليات والقزليات.

٢٢٦٠٩ - قُمُيَحِي Flacon (F). Case-bottle (E).
انه من نحاس او زجاج يحكم السد يحفظ فيه السائل

٢٢٦١٠ - قُمُيَحِي الجُبَيْنِ راجع سكية البهين .

٢٢٦١١ - قُمُيَحِي الحِشْيَانِ Cyane (F).

هو القشور ، هوية بحرية من القشريات ، اطلبه .

٢٢٦١٢ - قُمُيَحِي الرَّأْسِ هو القرعة ، اطلبه .

٢٢٦١٣ - قُمُيَحِي الصَّالَةِ هو الطيور ، اطلبه .

٢٢٦١٤ - قُمُيَحِي الكُتْبِ هو ناسم الكتب ، اطلبه .

٢٢٦١٥ - قُمُيَحِي الدِّمَةِ هي الدمة ، اطلبه .

٢٢٦١٦ - قُمُيَحِي البَرْتَقَالِ السُّودَاءِ

هي قزمزية البرتقال السوداء ، اطلبه .

٢٢٦١٧ - قُمُيَحِي الصَّخَّاحِ هي وزية التفاح ، اطلبه .

٢٢٦١٨ - قُمُيَحِي الثُّوتِ هي قزمزية الثوت ، اطلبه .

٢٢٦١٩ - قُمُيَحِي التَّبَاتِ هي القزمزية ، اطلبه .

٢٢٦٢٠ - قُمُيَحِي الزُّودِ هي قزمزية الورد ، اطلبه .

٢٢٦٢١ - قُمُيَحِي سَانَحُورِ

هي القزمزية الفتاكَة ، اطلبه .

٢٢٦٢٢ - قُمُيَحِياتِ Psocopteroïdes (F).

Psocopteroïdes (E).

طبقة حشرات صغيرة القذ ثنائية ماصة وقارضة من شعبة

العلقيات. تطورها تدريجي. لا ملامس شرجية لها. قوتها المواد

المضوية والنباتات القطرية || رتبها ثلاث القهليليات

والقذليات والقذليات .

٢٢٦٢٣ - قُمُيَحِياتِ الماء Hydrachnidae (S).

Hydrachnidae (F). Hydrachnidae (E).

فصيلة حشرات صغيرة القذ من رتبة القهليليات اجناسها

وانواعها كثيرة العدد جميعها مائية معظمها طفيلي .

٢٢٦٢٤ - قُمُيَحِياتِ Tique (petite) (F).

Tick (small) (E).

القرادة اول ما تكون صغيرة ثم تصير حنفاة ثم قرادة .

٢٢٦٢٥ - قُمُيَحِياتِ * Calceola (S).

Calceola (F). Calceola (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات عضديات الارجل

وفصيلة التحشيبات . انواعها المعروفة قليلة العدد معظمها

من مستحبرات الاحساب الاول والطبقة البياشيرية ،

في شقوق لحاء السرق والافصان || السرة تطول نحو ٧٠ م .
جسمها شبه اسطواني الشكل . ثوبها الى الطلحة الخضراء
يملوها تنميش دقيق اسود ونقط جانبية فردية حراء اللون .
راسها الى الجلاوة . مدنها ورواجبها الى النطلة السراء ||
طور الاكمال يستمر نحو ثلاثة اسابيع وينتهي ضمن
صلبة تحبها السرة بين الوراق التي تحبها الى بعضها
بعض .

٢٢٦٠٣ - قُمُيَحِيَةُ زَرَقَاءَ * Catocala fraxini (S). Lichenée bleue, Lichenée

bleue (F). Catocala fraxini (E).

حشرة من النعقيات حشرغيات الاجنحة . موطنها يمتد

في الشرق الاتص الى اوروبا وافريقية الشمالية . فراشها

واحدة قوتها مفر الاضرار . سرفتها تعيش على نصال الوراق ||

جسمها كبير القذ يطول نحو ٣٥ م . يسطها تراوح من

٩٢ الى ٩٩ م . راسها كخني اللون اسمر المواج . صناعها

كبرتات . ذواتها عجيلان . جوشها ويطنها الى الكسني

الاسمر تطول ماجة غبراء || روشاها الاماميان الى الطلحة

السراء يملوها ستة صفوف من الزراكش الكسنية اللون .

روشاها الخلفيان الى الكسني الكلف تطول جدة

مقوية قابلية زرقاء اللون || لها جبل واحد في الخول .

تظهر الفراشة في تموز وبقي حتى ايلول . قسرح في الليل .

تعاظم بعد ظهورها بنحو خمسة اسابيع وتضع المكن مبيدات

في شقوق لحاء السرق والافصان || السرة تطول نحو ٨٠ م .

جسمها شبه اسطواني الشكل . ثوبها الى الطلحة

تضع زرقاء ونقط سود جانبية . راسها الى الطلحة

مدنها الى السرة . عليها دقيق اشتر || طور الاكمال الذي

يستمر نحو ثلاثة اسابيع ينتهي ضمن صلبة تحبها

السرة بين طيات القشور او تحت الحاء .

٢٢٦٠٤ - قُمُيَحِيُوطِ ، قُمُيَحِيُوطِ دوية (السان) .

٢٢٦٠٥ - قُمُيَحِيُوطِ Bourgeon à feuille (F).

في البرعة الورقية . ج قاحيل . Leafy bud (E).

٢٢٦٠٦ - قُمُيَحِيُوطِ Infundibuliforme (F).

Infundibular, Infundibuliform (E).

نمت تعريف يطلق على ما كان شكله كالقبع . ويطلق

في علم النبات على التوريجات و متحدة القممالات و القمية

الشكل .

٢٢٦٠٧ - قُمُيَحِيَةُ التَّيْنِ * ، حَشْرَةُ التَّيْنِ

التَّيْنِيَّانِيَّةِ كوشيل التَّيْنِ Astrolecanium

sambuci (S). Cochenilla du figuier (F).

حشرة صغيرة من القزليات . جسمها مستدير الشكل ظهره

نحو ٣ م . لونها الى الصفرة الخضراء المواج . تركب في

التين الانسية اللبنة قسبب حيث تكل تجاويف صغيرة

يزداد ارتفاع حافتها مع طول اقامة الحشرة .

٢٢٦٠٨ - قُمُيَحِيَّاتِ Anasplores

رتبة حشرات من طبقة القهليليات . فصائلها واجناسها

وانواعها عديدة، زهاء ٢٠٠ منها ٢٤ نوعا مركب الانسان

والحيوانات البينة الداجنة . اما الانواع البائية فضرري

الحيوانات البرية من القردة الى الفئران || والقهليليات

حشرات مدممة التطور والاجنحة، جسمها صغير القذ مفلطح

الشكل . راسها وتذي . متكها ثقب ماص . قوتها



قُمُيَحِيُوطِ

٢٢١٣٧ - **فيمس** ، **كوميض** ، **كوميض** (F). Kousis, Koumys (F).
 هي البقول الجافة من أي نوع كانت .
 ٢٢١٣٨ - **قنأ** - هو النمر ، البيت المد الدجاج .

٢٢١٣٩ - **قنأ** * Canna (S).
 Canna, Balsier (F). Flowering reed (E). Blumenrohr, Krebsblume (D). Canna, Cannacoro (I).



لبنة

جنس نباتات عشبية جلمودية معمرة من فصيلة القنويات .
 أنواعها عديدة منها البرية والزرينية والبنفسجية . بعضها متسببة ، أوراقها متعاقبة كبيرة ، نصلها جامدة . أزهارها سنبلية التجميع حامية الارتكاز || أهراف أنواعها وأشهرها ما يلي .

٢٢١٤٠ - **قنأ الهند** ، **مكارزون** Canna indies (S).
 Canna d'Inde, Balsier d'Inde (F).

نوع من القنأ ضروب وأصرامه ويهتبه عديدة جميعها زرقانية . بعضها خضراء تملو من ١٠٠ إلى ١٨٠ سم .
 أوراقها تطول نحو ٥٠ سم ، وتعرض من ٢٠ إلى ٢٥ سم .
 أزهارها حراء اللون أو وردية يعلوها شمع أصفر متفاوت الاتساع || أزهارها يستمر طوال الصيف .

٢٢١٤١ - **قنأ رهمل** ، **قنأ سحلي** Canna flaccida (S). Canna à fleurs d'orchidées, Balsier flasque (F).

نوع من القنأ الزرقاني . ضروب وأصرامه عديدة .
 ساقه فسقية اللون تملو من ٨٠ إلى ١٦٠ سم . أوراقه بيضية الزام الأول ثم سنائية تطول من ٢٠ إلى ٦٠ سم .
 أزهاره تشبه أزهار السحلب ، لونها إلى الصغار الكبري .
 وهي كبيرة الشريقات المستديرة المتسببة للوسلة .
 أزهارها يستمر طوال السنة .



قيلة النمر

٢٢١٤٢ - **قنأ زنبقي** Canna filiflora (S).
 Canna à fleurs de lys, Balsier à fleurs de lis (F).

نوع من القنأ الزرقاني الرفيع الطرف . ضروب وأصرامه قليلة البعد . ساقه خضراء اللون غليظة تملو نحو ٢٠٠ سم .
 أوراقها كبيرة اللد تطول من ٩٠ إلى ١٢٠ سم . وتعرض من ٤٠ إلى ٥٠ سم .
 أزهاره زنبقية الشكل ، حجابية اللون ، فواصة العرف الطوي ، كبيرة اللد تطول نحو ١٥ سم .
 أزهارها يستمر طوال فصل الصيف .

٢٢١٤٣ - **قنأ سوسني** Canna lridiflora (S).
 Canna à fleurs d'iris, Balsier à fleurs d'iris (F).

نوع من القنأ الزرقاني . ضروب وأصرامه عديدة .
 ساقه حراء اللون حتى تملو نحو ٢٠٠ سم . أوراقها كبيرة اللد ، سنائية الشكل ، نصلها خالي الصلبة السفلى . أزهاره قمرزية تطول نحو ١٦ سم . شرباتها ثنائية التفصيص .
 أزهارها يستمر طوال فصل الربيع .



قنأ

٢٢١٤٤ - **قنأ مأكول** Canna comestible (S).
 Canna comestible, Balsier comestible (F).

نوع من القنأ الزرقاني . ساقه كبيرة اللد ، لبوها نشوي للمادة شائع الاستعمال النذالي . ساقه حراء اللون مستطيلة تملو من ١٢٠ إلى ٢٠٠ سم . أوراقها حراء اللون والأخضر سنائية النصل الذي يطول نحو ٦٠ سم . ويعرض نحو ١٨ .
 أزهاره متوسطة الحجم تطول نحو ٨ سم . لونها إلى الحمرة السابقة ، باطنها يرتقالي || أزهاره يستمر من حزيران إلى تشرين الأول .

٢٢١٣٧ - **فيمس** ، **كوميض** ، **كوميض** (F). Kousis, Koumys (F).
 مشروب يستخرج من لبن الخيل الحضر وهو شائع الاستعمال في بعض الأقطار الآسيوية .

٢٢١٣٨ - **قنيس** ، **جلباب** Cape
 قلعة من نصل ورقة التبع ألجأت تصلع لتغليظ السيكار ،
 اطلب كاب .

٢٢١٣٩ - **قنيس** ، **بنت الملك** اطلب ملو لبيب .

٢٢١٤٠ - **قنيس** Scyphole (F). Scyphus (E).
 جزء من شرة بعض أنواع الحزاز قوي الشكل متسبب الارتكاز .

٢٢١٤١ - **قنيس** *
 نمت تحريف يطلو على الأوراق المصابة بمرض القنيس .

٢٢١٤٢ - **قنيس** * Scrobilanthos (S).
 Scrobilanthos (F). Scrobilanthos (E).

الاسم العلمي من اليوناني بمعنى « التمتع » . جنس نباتات عشبية أو لبغية خشوية معمرة من فصيلة الاقنثيات .
 سوطها تملو من ٣٠ إلى ١٥٠ سم . أوراقها متعاقبة .
 أزهارها قمية الشكل ، زرقاء اللون أو بنفسجية || تزرع للزينة بين المراكب وأحاديثي .
 أنواعها المعروفة ستة ، أشهرها الثلاثة التالية .

٢٢١٤٣ - **قنيس** ، **لامتساوية الورق** Scrobilanthos anisophyllus (S).

Scrobilanthos à feuilles Inégales (F).
 نوع من القنيس . جنسية معمرة تملو من ٦٠ إلى ١٠٠ سم .
 ساقها فراء كثيرة الافناد . أوراقها مركبة ، وريقاتها سنائية النصل ، لامتساوية الطول والعرض بين الأجزاء المتشابهة . أزهارها إلى الزرقاة الليلية الملوحة ، قطرها نحو ٣ سم .
 تنويرها يستمر من الصيف إلى الخريف .

٢٢١٤٤ - **قنيس** ، **مستساوية الورق** Scrobilanthos isophyllus (S).

Scrobilanthos à feuilles égales (F).
 نوع من القنيس . جنسية معمرة تملو من ٣٠ إلى ٦٠ سم .
 ساقها فراء . أوراقها مركبة ، سنائية ، تطول من ٦ إلى ١٢ سم . وتعرض من ٢ إلى ٣ سم .
 نصلها مشابة باير دقيقة بلورية . وريقاتها متساوية الأجزاء . أزهارها زرقاء اللون ، قطرها نحو ٢٥ سم .
 تنويرها يستمر من الصيف إلى الخريف .

٢٢١٤٥ - **قنيس** ، **مططحة** Scrobilanthos maculatus (S).

Scrobilanthos maculés (F).
 نوع من القنيس . جنسية معمرة تملو من ٦٠ إلى ١٢٥ سم .
 ساقها فراء مجتمرة الافناد . أوراقها بيضية الشكل ، تطول من ١٢ إلى ٢٠ سم . وتعرض من ٦ إلى ١٠ سم .
 نصلها إلى الخضار اللامس يملو تلطيخ فني . أزهارها بنفسجية اللون ، قطرها نحو ٤ سم .
 تنويرها يستمر من الصيف إلى الخريف .

٢٢١٤٦ - **قنيس** ، **قنيس** * Melophagus ovinus (S).
 Melophagus du mouton, Pou du mouton (F).

حشرة عادمة الجنان من فصيلة الشراويات . صغيرة اللد مبطلة سمراء اللون تعيش على جلد النعم تحت الصوف .

Connaraceae (S).

٢٢٦٥٦ - قناريات ٥

Connaracées (F). Connaraceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقين . مركزها التنسيقي يأتي بين الورديات والقطانيات . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد ، اطاحتها معظم المناطق الحارة من المابين القديم والجديد باستثناء أستراليا || نباتاتها جنبت شائكة . اوراقها صغيرة ، متقابلة فصالحا سنانية الشكل ، مجرية الخصار . ازهارها محورية ، صغيرة ، متعقة || أشهر اجناسها القنارة .

Pimelia (S).

٢٢٦٥٧ - قنار ٥

Pimélie (F). Pimelia (E).

الواحدة قنارة . جنس حشرات من غمديات الاجنحة مختلفة الاجزاء وفصيلة البشيات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار العالم القديم || اجسامها مختلفة الاحجام يكثر فيها الاعتدال ويقلب فيها الشكل الاهليبي ورؤوسها صغيرة . قرونها الاستشعارية معتدلة الطول . كوتسلها خروطية . الحماها لاحقة ، منها المنددة ومنها الهززة . جزامها بين المنددة والمستطيلة . انواها تراوح من السمرة القاتمة الى السواد الاسفر .

Pimélie géante (F).

٢٢٦٥٨ - قنارة جبارة ٥

هي الدسلول حشرة من غمديات الاجنحة ، اطليا .

Rhinopterus (S).

٢٢٦٥٩ - قناسة ٥

Rhinoptère (F). Rhinopterus (E).

جنس اسماك بحرية من السفنقيات وفصيلة الشفنيات البحرية . انواعها المعروفة ستة منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة . جميعها كبيرة القد . اجسامها شبيهة باجسام المورية . رؤوسها اسطوانية يملؤها ميزاب قليل العمق يقسمها الى شطرين متساوين . اذنانها مستطيلة كالمساطر تحمها عند قواعدها مناشرة التركيب قاعدتها الزعنفة الشرجية . قوتها الاسماك . تألف المهاجم الصغرة حيث تكمن للانقضاض عل فراثها || لحومها كاعنة الصنف ، قل من يرض في اكلها .

Masque (F). Mask (E).

٢٢٦٦٠ - قناع ٥

جهاز يوضع عل الرأس لوقاية حواسه أو بعضها .

Radiesthésiste (F).

٢٢٦٦١ - قناني ٥

Dowser (E).

من عالج اشعاع التفتنط الكهربي ويعرف بروجود الماء والمعادن في جوف الارض .

Alléger (F). To ease (E). قناب ، قناب ٥

قنب الكرمية : قلمها وقطع ضها ما يؤدي حملها .

Fournreau (F). Sheath, Cover (E). قناب ٥

جراب قنصيب الدابة ، ويقل وعاء قنصيب كل ذي حافر . كقنرك قنب الحمار : وعاء جردانه . وقنب الجمل : وعاء ثيله .

Epanouir (e) (F).

٢٢٦٦٤ - قناب ٥

To blow, To expand, To open (E).

قنب الزهر : خرج عن اكامه .

Cannabis sativa (S).

٢٢٦٦٥ - قناب ٥

Chanvre commun, Chanvriier, Pantagruillon (F).

Bractée (F). Bract (E). قنابة ، قنابة ٥

كل ورقة شذت في شكلها أو تركيبها ليردها قرب الزهرة كالكنافور في البتل والمصيفة في التسع . الخ .

Bractéaire, Bractéal (F).

٢٢٦٦٦ - قنابي ٥

Bractéal (E).

لمت تعريفه يطلق عل كل ما له صلة بالقنابة .

Ostrya (S).

٢٢٦٦٧ - قنابية ، قنابية ٥

Ostryer, Iron-wood (F). Lever-wood (E). Hopfenbaum (D). Ostria, Legnoferro (I).

جنس اشجار حرجية وريزية من فصيلة السوليات . انواعها قليلة العدد هيكلها واوراقها وازهارها تشبه الشرم (الحريينوس) . سوقها تملن من ١٥ الى ٢٠ م . اغصانها شديدة الصلابة ، ثقيلة الوزن اللسي . اوراقها عابلة متعاقبة طولن من ٦ الى ١٣ سم . وتعرض من ٣ الى ٦ م . تفصلها مژبة الصفة ، متقارب المروق المتقابلة التي يراوح عددها من ١١ الى ١٧ . ثمارها كوزية الشكل كثار الجنجل . زبروها خلية الطرف البقيق || احرف انواعها واشهرها : قنابية اليابان

Ostrya japonica (S).

Ostryer du japon (F).

Ostrya carpinifolia (S).

قنابية شرمية الورق

Ostryer à feuilles de charme (F).

Ostrya virginiana (S).

قنابية فيرجينية

Ostryer de Virginie (F).

Dalot (F). Scupper (E).

٢٢٦٦٨ - قنقة ٥

جبرى ماء من صنع الانسان يستعمل لنقل وتوزيع مياه الري .

Canal axygos (F).

٢٢٦٦٩ - قنقة الزكبة ٥

Axygous canal (E).

جبرى انبوي شعري ينقل زكبه ذكور الحشرات من تلاميها الى قنصباتها .

Oviducta (F). Oviduct (E).

٢٢٦٧٠ - قنقة المبيض ٥

جبرى انبوي ينقل البيض من المبيض الى خارج الجسم الحيواني .

Canal cystique (F).

٢٢٦٧١ - قنقة المرارة ٥

Cystic canal, Cystic duct (E).

هي قناة المرصلة الصفراوية .

Canal marginal (F).

٢٢٦٧٢ - قنقة حافة ٥

Marginal canal (E).

Canal rachidien (F).

٢٢٦٧٣ - قنقة فقرية ٥

Rachidian canal (E).

هي القناة التي يمر بها الفقار الرشيدي .

Canal rachidien (F).

٢٢٦٧٤ - قنادة ٥

القنادية أو القنادة هي زهرة المرجان ، اطليا .

Connarus (S).

٢٢٦٧٥ - قناركة ٥

Connarac (F). Connarus (E).

جنس نباتات جنبية ، برسة ، معمرة ، من فصيلة القناريات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم مناطق البلاد الحارة || سوقها وفروعها شائكة . اوراقها متقابلة . ازهارها متعقة ، صغيرة ، جميلة الشكل ، يكثر فيها اللون الاصفر . ومنها انواع زرقاء الزهار او ليلكية .



قنار



قناسة

٢٢١٧٧ - **قَنْبَرُ** Chênevis (F). Hemp-seed (E).
هو بَرْد القنب ويصنع شنداج يأكله الطير ويستخرج منه زيت صناعي لبسة ترواح من ٢٠ الى ٢٤ ٪ كسبه يستعمل في تدبيل التربة .

٢٢١٧٨ - **قَنْبَمَكَة** Glumelia (F). Glumelia (E).
القنبينة قنابة تحبب بريرة التجهيلات وملياً ينشأ السفا وما قنبنتان لكل زهرة من زهورات السليولة .

٢٢١٧٩ - **قَنْبَل** Pavonia (S).
Pavonie (F). Scarlet mallow (E). Pavonie (D). Pavonia (I).

يجلس اشجار ونباتات برية وتربنتين من فصيلة الحليزيات. انواعه قليلة المدد، اعطائها البلاد الحارة، جميعها مسرة فراءه فنواء. اوراقها ابيدة منقطة ، يفضية او ريفية النصل، عطرية العرف عند السس . ازهارها لا قابلية التجميس والارتكاز، طويلة الزناد مخفلة الالوان . ثمارها رباعية الفلق . يزورها ذفبة القشور ا عرف انواعه واشهرها ما يلي .

٢٢١٨٠ - **قَنْبَل دَائِم الزهر**

Pavonia semperflores (S). Pavonie toujours fleurie (F).
شجرة تربينية فراءه فنواء تملو نحو حشرة امتار . اوراقها سنانية الشكل ، نصلها جامدة الصفحة سنن الزام الاخير . ازهارها متدلية ، كبيرة القند ، حاملة الكيم ، نائزة الاسدية ، لونها الى الحمرة القانعة || ازهاره يستمر طوال السنة .

٢٢١٨١ - **قَنْبَل كبير الزهر**

Pavonia multiflora (S). Pavonie multiflora (F).
جنية تربينية سروقية تملو من ٢٠ الى ٣٠٠ سم. ساقها فراءه فنواء . اوراقها سنانية النصل ، مششابة الحافة، تعلو من ١٥ الى ٢٠ سم. وتعرض نحو ٦٠ م. ازهارها حشوكية التجميس ، تاجية الارتكاز ، اوجوانية اللون ، كيم ازهارها كثيف الورديات الفقية الحليقة || ازهاره يستمر طوال شهر ايلول .

٢٢١٨٢ - **قَنْبَل مَكُونَا** Pavonia mackoyana (S).
Pavonie de Mackoy (F).

جنية تربينية سروقية تملو من ٦٠ الى ١٧٥ سم. ساقها غليظة فنواء . اوراقها كاملة مائسة سنانية النصل خلية المقي . ازهارها خبيسة التجميس ، تاجية الارتكاز ، قرمزية اللون . كيم ازهارها خاسي الورديات القليلة الشكل . ازهاره يستمر من ايار الى آب .

٢٢١٨٣ - **قَنْبَل صَمِير** Pavonia speciosa (S).
Pavonie specieuse (F).

جنية تربينية زهية تملو نحو ٢٠٠ سم. ساقها فراءه فنواء . اوراقها يفضية الشكل ، قلبية القانعة؛ نصلها سنن الحافة ، مزغب الصفحة السفلى فنواء اللون . ازهارها ينغمسية الظاهر حر الباطن . قطرها نحو ٥ سم. نصلها تعد من ٧ الى ٩ يكتسها كيم يحمل ذات المدد || ازهارها يستمر طوال فصل الصيف .

٢٢١٨٤ - **قَنْبِيَّات** Cannabinaceae (S).
Cannabinaceae (F). Cannabinaceae (E).
منهم من جعلها فصيلة ثنائية مستقلة ومنهم من قال انها سبط من فصيلة القرصيات || اشهر اجناسها القنب والجنبل .

٢٢١٨٥ - **قَنْبِيْط** هو الترنيط ، اطلبه .

Common hemp (E). Echter Hanf, Riesen Hanf (D). Canapa, Canape (I).

نبات عشبي حولي زراعي لبني صناعي من فصيلة القنبيات. وهو نبات وحيد الجنس والتنوع عديد القروب اشهرها الهندي والجنبل . ساقه منتصبه تملو من ١٥٠ الى ٣٥٠ سم. اوراقه كلبية مركبة ومنقطة. السفل منها متقابلة والمدا متناحية . جميعها خاسية او سباعية الورديات الفقية اللدبية . نصلها عشن للملس، ازغب الصفحة المششابة الحافة . ازهاره ثنائية المسكن، للذكورة منها عطرية التجميس اما الانثوية ففسية || ثماره فقيرة منتفخة تلمى القنبر والشنداج وهي مأكلة بعض المصافير ويستخرج منها زيت صناعي لا بأس به قبلغ نسيته نحو ٢٢ ٪ || يزرع القنب لاستخراج الياق سوف التي تستعمل خاصة في صناعة الاكياس والحبال .

٢٢١٦٦ - **قَنْبِ الْمَنَافِعِ** هو البتولا المنقوية، اطلبها .

٢٢١٦٧ - **قَنْبِ جَبَّار**

Cannabis sativa gigantea (S). Chanvre géant (F).
عرب من القنب منبت المدد . ساقه فراءه تملو من ٣ الى ٥ امتار . فروصها افقية فارشة مستطيلة يحمل قطر دوسمة النباتات الطول من ارتفاعه || الياق ساقه وفروصها صناعية تستعمل في جدل حبال القنب .

٢٢١٦٨ - **قَنْبِ سِيَام** هو الراسي ، اطلبه .

٢٢١٦٩ - **قَنْبِ كَلْكُوْه** هو الجوت ، اطلبه .

٢٢١٧٠ - **قَنْبِ مَتِيلِيَا** هو الابن ، اطلبه .

٢٢١٧١ - **قَنْبِ هندي *** حشيشة الكيف

Cannabis sativa indica (S). Chanvre indien, Bang, Hachisch (F). Indian hemp (E). Indischer Hanf (D). Canapa indica (I).
عرب من القنب ساقه تملو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم. يزرع لاستخراج ما تفرزه النباتات الاثنى من مادة وانسيبة تكثر في عناقيدها الزهرية واوراقها اللبلى يصنع منها والحشيش او الحشيشة او الكيف الذي يستعمل لتخبيثا فيقدر احصاب منمنينه ويحلل عقولهم || زراعته محظورة في لبنان .

٢٢١٧٢ - **قَنْبَر** هو القبرية ، اطلبها .

٢٢١٧٣ - **قَنْبَرَة ، قَنْبَرَة ، قَنْبَرَة ، قَنْبَرَة**

Huppa (F). Crest (E).
هي فضل ريش قائم . اطلب قنطرة .

٢٢١٧٤ - **قَنْبَرَة ، قَنْبَرَة** هي القبرة ، راجعها .

٢٢١٧٥ - **قَنْبَرَة الماء ***

Arenaria incarper, Strepellia incarper (S). Tourne-pierre incarper, T. vulgairs (F).
طائر من طوائف القاطع . صابر القند طوله نحو ٢٢ سم. لونه ابيض اللون كثير البياض والازغافز للتداخلة المركبة من الاسود والاحمر || يأنف الشطوط البحرية ، قوته القشريات والديدان يلتقطها بين الحصى . يدن اقصومه في الكشيان . حشسته تراوح من ٣ الى ٤ يضاف .

٢٢١٧٦ - **قَنْبَرَو** هو ابو متقار ، اطلبه .



قنب



قنب هندي



قنبرة الماء



قنبيل

٢٢٦٨٦ - **قَنْبِيل** * وَرْس مَلَوَن
Mallotus (S). Rottlère, Rottlerie (F). Kamala tree (E). Kamelabaum (D). Kamala (I).
جنس شجيرات برية من فصيلة البتويات. منها المناطق الاستوائية الآسيوية. أنواعه قليلة جميعها متوسطة القد. يستخرج من ثمارها صباغ احمر قريدي مرغوب فيه.



قنبيل

٢٢٦٩٣ - **قَنْج**
Arquer (F). To bend, To arch (E).
قنج البود : حلقه حتى يصير كالخمين.

٢٢٦٩٤ - **قَنْدَاش** *
Candacus (S). Candace (F). Candacus (E).

جنس دوبيات بحرية من القشريات مجذبات الارجل وفصيلة الكلنوسيات. انواعه المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار البلاد الاستوائية والحرارة والممتدة الحارة.

٢٢٦٩٥ - **قَنْدَاق**
Sucre candie (F).
هي الابلوج ، اطليه .

٢٢٦٩٦ - **قَنْدَاقَة** *
Potologie (F). Potology (E).
القندقة علم يبحث في المشروبات الروحية وفي تراكيبها.

٢٢٦٩٧ - **قَنْدَرُ**
Castor (F).
هو الخارود ، اطليه .

٢٢٦٩٨ - **قَنْدَرُوس** *
Chondrus (S). Chondre (F). Chondrus (E).

جنس نباتات بحرية من الخليات الحمر . انواعه المعروفة نحو ٣٠ منتشرة في معظم بحار العالم || اعرف انواعه واشهرها القندروس المتقيش Chondrus crispus (S). والاشعر Chondrus crispus الذي يستعمل طبيا في معالجة بعض الامراض الصدرية .

٢٢٦٩٩ - **قَنْدُس**
Loutre commune (F).
هو القنفصة ، حيوان من المروحيات .

٢٢٧٠٠ - **قَنْدُكِي**
Aesculus (S). Marronnier (F). Horse-chestnut-tree (E).
جنس نباتات معمرة من فصيلة القندليات. انواعه نحو ١٥ جميعها اشجار وشجيرات ونباتات فارشة ، غضة ، حيلة الشكل . اوراقها عابلة ، متقابلة ، منقطة ، مركبة ، كثيفة خامسة او سباعية او تساعية الوريقات . ازهارها عشقونية التجميع او عطقية ، عديدة الالوان منها الاصفر والبنفسج والوردي والاحمر || اشهر انواعه ما يلي :

٢٢٧٠١ - **قَنْدُكِي حَنْزُوسِي**
Aesculus turbinata (S).
Marronnier à fruit turbiné (F).

شجرة دائمة فارشة مهدها اليابان تملو من ٢٠ الى ٣٠ م. اوراقها خامسة او سباعية التركيب وريقاتها كبيرة القد ، نصلها خلي الصفحة السفلى ، مسن الحافة . ازهارها كبيرة القد ، لونها الى البياض الاخضر تملو رقة حراء . ثمارها اجاصية الشكل حلزونية ، قشرها مثاقلة شاذكة ، لبها حطلي اللون .

٢٢٧٠٢ - **قَنْدُكِي مَبْدُول** * ، **قَسْطَل هندي**
Aesculus hippocastanum (S). Marronnier commun (F). Common horse-chestnut-tree (E).

شجرة مبدولة دائمة فارشة تملو من ٢٠ الى ٣٥ م. اوراقها خامسة او سباعية التركيب . وريقاتها لا متساوية الطول والعرض ، نصلها مابق الحصار . ازهارها كبيرة القد لونها الى البياض الناصع تملو رقة حراء او صفراء . ثمارها كستنية الشكل والقد قشرها شاذكة ، لبها اسمر .

٢٢٦٨٧ - **قَنْه**
Cime (F). Cyme, Summit (E).
القن : شمع يقع من رأس الجبل واصل ما يكون في الشجرة . ج قن وقنان وقننة وقنات .

٢٢٦٨٨ - **قَنْه مَبْدُولَة** * ، **كَنْج**
Ferula communis (S). Férule commun, Pameller, Grand fenouil (F). Giant fennel (E). Gemelnes Steeukruut (D). Ferula comune, Ferola, Fregola (I).
نوع من الانجذان وهو نبات عشبي بري معمر مبدول. ساقه تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. اوراقه كثيرة التفرع والتفرع نصلها اخضر الصفحة العليا بحري السفلى . بطوره غليظة يستخرج منها بعض العناصر الطبية الصحية النافعة . ويستخرج من ساقه صمغ يدعى الحلتيت لكنه دون الحلتيت الاصل خواصا ونفعا .

٢٢٦٨٩ - **قَنْه مَهْجُولَة** * ، **بَرْزَادَة** ، **قَنْسَا وَشَق**
Ferula ferulago, F. galbanifera (S). Férule bitarde, Galbanum (F). Galbanum plant (E). Galbanpflanze, Galbenkraut (D). Galbano (I).
نوع من الانجذان وهو نبات عشبي طيب بري معمر. ساقه تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. يستخرج من ساقه عصارة صمغية لزجة تدعى الباربد وتلوث وتورف عند الطائر بالرشق تستعمل في الامراض الصدرية وخلفها وهي مفادة للقتلج .

٢٢٦٩٠ - **قَنْشَر** * ، **قَمْلُ الحَيْثَان** *
Cyamis (S). Cyame, Cyamide (F). Cyamis (E).

جنس دوبيات بحرية من القشريات العليا وفصيلة القشريات . انواعه المعروفة قليلة البدد جميعها عطقية تنشب في جلود الحيتان وفي طيات رؤوسها وثنايا زانفها || اجسامها متباينة الاحجام يغلب فيها الصغر ، جميعها بسيطة . قوائمها الصدرية خامسة الازواج ، نشطة ، تنتهي بمخاط ذرية . قرونها الاستقامية ثلاثية الفصل . لولاسها رباعية الازواج متغايرة الطول ، شبه انبوية الشكل . اثنائها الى الشبهة او الشقة .



قن مبدولة



قن مهجولة



قنر



قنجل

٢٢٦٩١ - **قَنْشَرِيَّات** *
Cyamidae (S). Cyamidae (F). Cyamidae (E).

فصيلة دوبيات بحرية من القشريات العليا مزدوجيات الارجل . اجسامها وانواعها المعروفة قليلة البدد . جميعها عطقية تركب الحيتان || تتميز بانجسامها المبطة وبانوسها او لمساتها المتغايرة الطول والجمع . قوائمها الصدرية مجهزة بمخاط محببة ذرية || اشهر اجناسها القنشر .

٢٢٦٩٢ - **قَنْجُول** *
Abacetis (S). Abacete, Astigis (F). Abacetis (E).

جنس حشرات من فصيلة السلكوتيات ورثة معدقات الاجنحة . انواعه المعروفة نحو ٤٠ اعطائها بعض مناطق البلاد الحارة من العالم القديم اجساما افريقية الثنائية وبعض الانواع يعيش في الشرق الادنى وفي اودية الجنوبية ||



قندوس



قندلي مبدول

٢٢٧١٠ - قندل * مفقأل
Machetas (S).
Combatant (F). Ruff (E).
مائل وحيد الجنس والنوع من عائلة الطولانيات. وفضيلة
دجاجيات الارض. طول نحو ٣٠ سم. بسطة من ٦٠
الى ٧٠ سم. قوية الى الصلبة القوية تطلو رقيقة حنطية
يعوقها اطار ابيض. الذكر قشري الرأس طروق السن،
طوقه مستطيل الريش يتصب عند القتال والبارزة.
مبارزة الاكود تدوم نحو ثمانية اسابيع تحتوي مع زين
الصفاد وتستمر حتى نهاية الحضانة || الاثني بيش نحو ٢٠
بيضات تحضنها من ١٧ الى ١٩ يوما. تمش مشا في
المنافع بين الاشجار || قوته الحشرات والديدان والرخويات.

٢٢٧١١ - قندل * مفقأل
Astragale (F). Astragalus (E).
في رصع القدم وطم الكعب.

٢٢٧١٢ - قندل * مفقأل
Algretha (F).
ريش قائم مجتمع على رأس بعض الطيور.

٢٢٧١٣ - قندل * مفقأل
Norme (F). Norm (E).
القنص ج قنوص. مبدأ يتخذ كقاعدة. او غطط قنص
يتخذ كقاعدة.

٢٢٧١٤ - قندل * مفقأل
Aunée (F).
جنس نباتات عشبية برية معمرة مشهورة باسم رائحة
الطليخ.

٢٢٧١٥ - قندل * مفقأل
Aesculus parviflora, Pavia alba (S). Pavier blanc (F).
شجرة زينة غضة من فصيلة القندليات تملو من متر
الى خمسة امتار. اوراقها خالصة التركيب. وريقاتها
تطوي نحو ١٩ سم. وتعرض ٧ سم. فصلها بجري اللون، وفي
الصفحة السفلى. ازهارها سنبلية تتجمع لنوا الى البياض
الاخضر. ثمارها كستنية الشكل ولقده مالة القشور.

٢٢٧١٦ - قندل * مفقأل
Aesculus pavia, Pavia rubra (S). Pavier rouge (F).
شجرة زينة سبروتية من فصيلة القندليات تملو من مترين
الى ستة امتار. اوراقها خالصة التركيب. وريقاتها
سنائية، مسنة الحافة. فصلها جامد الصفحة يطوي نحو
١٥ سم. ويمرض ٦ سم. ازهارها متفوية تتجمع، بتلاتها
حراء اللون، مهدبة الاطراف. ثمارها كستنية صلبة
مالة القشور.

٢٢٧١٧ - قندل * مفقأل
Aesculus octandra, Pavia lutea (S). Pavier jaune (F).
شجرة كبيرة دائمة من فصيلة القندليات تملو من ٢٠ الى ٢٥
م. اوراقها خالصة التركيب. وريقاتها سنائية دافئة
فصلها ازغب الصفحة السفلى، مسنة الحافة. ازهارها
متفوية تتجمع، بتلاتها مهدبة، صفراء اللون. ثمارها
كستنية الشكل كبيرة اللد مالة القشور.

٢٢٧١٨ - قندل * مفقأل
Ciste ladanifera (F).
هو اللادن الاسباني، العطية.

٢٢٧١٩ - قندل * مفقأل
Tragus (S).
Tragule (F). Tragus (E).
جنس حيوانات لبونة بجرة. انواعها خمسة جميعها صغيرة
القد، وشيقة القوام، فيها من الايل والمامز والارانب.
طولها من ٥٠ الى ٧٠ سم. علوها من ٢٥ الى ٣٢ سم.



قنديل

٢٢٧١٣ - قندلي هندي
Aesculus indica (S).
Marronnier de l'Indus (F). Indian horse-chestnut-tree (E).
شجرة هرمية الشكل مملها المكنوس تملو من ٢٠ الى ٢٥ م.
اوراقها لايقاسية التركيب منها الخالصة والسباعية
والسباعية. وريقاتها مستطيلة، فصلها جامد الصفحة،
مسنة الحافة. ازهارها كبيرة اللد. حنايتها هرمية الشكل،
تطوي نحو ٥ سم. بتلاتها لا متساوية اللد لنوا الى الابيض
المزرقش بالاصفر او الوردي. ثمارها رنية، قشورها
ثقلية حادة الشوك.

٢٢٧١٤ - قندل * مفقأل
Aesculaceae, Hippocastanaceae (S). Aesculaceae, Hippocastanaceae (F).
فصيلة نباتية وسيدة الجنس، عديدة الانواع. نباتاتها
اشجار وشجيرات ونباتات برية وزينة. اوراقها مركبة
متقابلة. ازهارها غشوية خالصة التركيب والاقسام. سباعية
الاسدية، متفوية تتجمع او حلقية او سنبلية.

٢٢٧١٥ - قندل * مفقأل
Cœdus (S).
Cœdous, Synèthère, Orico, Couly (F).
جنس حيوانات لبونة قاضية من فصيلة الشمميات. انواعها
١٣ موطنها امريكا الجنوبية || اجسامها غضة مستطيلة
براح طولها من ٥٠ الى ٧٠ سم. واذاها من ٢٥ الى ٥٠ سم.
رؤوسها خفيفة. مقاضها قصيرة مقلية.
حنانها عريضة. حورثا واذاها صغيرة. جرابها متدلة
القد. اظفارها قوية سادة. اذانها طويلة اعادة. شعرها
جليبي هندي نغاز يتخلل شوك قصير كاسلال تنفضه للذخاخ
عن النفس فيند ويطلب حيث يبرز || تألف الثنايات
والاحراج. تسرح في الليل. تتسلق الاشجار وتستن
باذاها للالتقال من ضمن الى ضمن || قوتها الثمار
والزيمات والاوراق والازهار والجذور ولحاء الاشجار.

٢٢٧١٦ - قندل * مفقأل
Spartium spinosum, Cytisus spinosus, Calycotome spinosa (S). Cytisus épineux, Genêt épineux, Calycotome épineux, Aspalot (F). Spiny broom, Spiny cytisus (E). Stacheliger Ginster (D). Ciste spinoso (I).
شجرة برية معمرة شالكة من فصيلة التريتيات. اوراقها
صغيرة مركبة. ازهارها صفراء اللون صطرة. يكثر ويوجد
في وحر الجبال البانانية السورية.

٢٢٧١٧ - قندل * مفقأل
Eau-de-vie (F).
Brandy (E).
سائل كحول يحصل من تقطير الثار بعد تقشيرها وهو
يعمر من الكحول ما يراوح حياره من ٤٥ الى ٨٥ درجة
متوية وهذا القادر الشائع بالنسبة يمد الى نوع المنسوب
وما يقتضيه من حيار خفيف او متوسط او ثقيل.

٢٢٧١٨ - قندل * مفقأل
Potologique (F).
Potological (E).
نعت تمريني يطلق على كل ما له صلة مباشرة بالقعدة.

٢٢٧١٩ - قندل * مفقأل
Crysoore (F).
Sea nettle (E).
نوع من المنوس، يكثر في البحر الاحمر وعلى جرف شواطئ
المتوسط. راجع مدوس.

٢٢٧٢٥ - قَنْصُور صَغير الورق

Colutea halepica, *C. istria* (S). *Bagueaudier microphylla* (F).
جنية برية سريرية مهددة الشرق الأوسط ويكثر وجودها من حلب إلى سيناء. تملو من ١٠٠ إلى ٢٠٠ سم. وريقاتها دقيقة تعد من ٩ إلى ١٣ نصلها يطول نحو ١٠ سم. وهو يجري اللون أبيض الصفحة السفلى. أزهارها برتقالية كبيرة القد. سنفاتها صغيرة جرابية مطبقة. أزهارها يستمر طوال شهر حزيران.

٢٢٧٢٦ - قَنْطَار
Quintal (F).
القنطار العربي العالمي وزن مئة رطل أي ألف وبنو أوقية أو ما يماثلها من الوزن المتري وقدره ٢٥٦ كيلو. أما القنطار المتري فوزنه ١٠٠ كيلوغرام.

٢٢٧٢٧ - قَنْطَر
Goura couronné (F).
هو الدبسي الملتفج، الحلبه.

٢٢٧٢٨ - قَنْطَرُون ، قَنْطَارُون
Centaurea (S). *Centauree* (F). *Centaury* (E).

جئس نباتات عشبية خشبية من فصيلة المركبات. أنواعه زهاء ٤٠٠ منها الحولية والأهولة والصمرة معظمها بري وبعضها تربي. أوراقها متعاقبة لا نظامية. قناباتها لا قياسية. أزهارها رؤسية. بزورها عادمة الاغرة مختلفة الاشكال والاحجام || أحرف أنواعه وأشهرها ما يلي :

٢٢٧٢٩ - قَنْطَرُونِ اسْمَر * ، رأس الدوزي
Centaurea jacea (S). *Centauree jacee*, *Jacée des prés*. *Chevalon*, *Malon*, *Tête de moineau* (F). *Black centaury*, *Brown rayed*, *Knapweed* (E). *Weissenfloekenblume* (D). *Giacea*, *G. dei prati*, *Erba della ferita* (I).

نوع من القنطريون البري المعمر. ساقه زهاب فروع تملو من ٣٠ إلى ٨٠ سم. رؤسياته الزهرية عديدة، صغيرة القد ليلكية اللون ، قناباتها الى السرة || يكثر في المراعي والزرود فيصبح من النباتات الضارة || جلوده غليظة غزيرة المادة اللبية التي تستعمل في علاجات امراض الفم والحلقوم .

٢٢٧٣٠ - قَنْطَرُونِ القفصاس

Centaurea depressa (S). *Bleuet du Caucase* (F).
عشبة سريرية حولية تربيية ساقها منه السنج تملو من ٤٠ إلى ٥٠ سم. أوراقها اللبليجية الشكل خلية البشرة. رؤسياتها الزهرية حادة العرف لونيا الى الزرق الزاهية تتوسطها الحمرة ؛ قناباتها مألصة الصفحة ، مهددة الحنار . اهدابها فضية || أزهارها يستمر من تموز الى آب .

٢٢٧٣١ - قَنْطَرُونِ امريكي

Centaurea americana (S). *Centauree americaine* (F).
عشبة تربيينة سريرية حولية. ساقها مزينة منتصبة قليلة الفروع تملو من ٦٠ إلى ١٨٠ سم. أوراقها سنانية النصل مسننة تملو من ١٣ إلى ١٥ سم. وتعرض من ١٠ الى ١٥ سم. رؤسياتها الزهرية فردية التجميع حادة العرف قطرها يراوح من ٥ الى ١٠ سم. لونيا الى الزرق الزاهي . قناباتها مهددة الحنار || أزهارها يستمر من ايار الى آب .

٢٢٧٣٢ - قَنْطَرُونِ بابل

Centaurea babylonica (S). *Centauree de Babylon* (F).
عشبة تربيينة سريرية حولية . ساقها مجنحة تملو من ٢٠٠

رؤوسها مستطيلة جهاد . اذنانها قصيرة عريضة منتصبة . قناباتها دقيقة . اغلافها اريسة . اذنانها مرفقة كاذناب . لئام . سطحها خلى ناعم للمس . اثنائها الى الصلبة المتخللة المشعة والمواج || مهددة فصح الاربعاء يمتد من سرتديب والهند الى الصين . تألف الثابتات الجبلية الرطبة . قوتها الاشباب . تيش جوامع قليلة العدد . إجلاها يتألف من ٤ او ٥ اناث يقودها ذكر واحد .

٢٢٧٣٠ - قَنْصُور * ، قَنْطَرُون

Colutea (S). *Bagueaudier*, *Colutea*, *Faux séné* (F). *Bladder-senna tree* (E). *Baumartiger blasenstrauch*, *Gewöhnlicher blasenstrauch* (D). *Colutea*, *Cantamaggio*, *Saluno*, *Sena falsa* (I).
جئس نباتات برية طيبة معدرة من فصيلة القنطريات الفراقية. أنواعه عديدة، بعضها جنات صغيرة أو متوسطة القد. أوراقها متعاقبة مركبة تشبه أوراق السناء. أزهارها عقدية التجميع ، محورية الايتكانز ، صفراء اللون . ثمارها سننات متضعة ثنائية الشكل || أحرف أنواعه وأشهرها ما يلي .

٢٢٧٣١ - قَنْصُور اسود الكيم

Colutea melanocalyx (S). *Bagueaudier à calice noir* (F).
جنية سريرية مبلولة تملو من ٢٠٠ الى ٤٠٠ سم. أوراقها مركبة كبيرة وثرية العدد مؤلفة من ٩ او ١١ وريقة بيضية الشكل، نصلها خلى الصفحة السفلى . أزهارها صفراء اللون صغيرة القد قطرها نحو ٢ سم. اكلمها زهاب البشرة زهاب اسود اللون. سنفاتها متوسطة القد تطول نحو ٦ سم. وتعرض نحو ٣ || أزهارها يستمر من ايار الى تموز .

٢٢٧٣٢ - قَنْصُور الشرقى

Colutea orientalis (S). *Bagueaudier d'Orient* (F).
جنية سريرية مبلولة تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. أوراقها سباعية أو تساعية الوريقات . نصلها بيض الشكل ، يجري اللون يطول من ١٠ الى ١٥ سم. ويعرض من ٧ الى ١١ . أزهارها الى الأهولة يطولها تمشيح اسفر . سنفاتها تطول نحو ٤ سم. لونيا الى الخضار المشوح بالبنيجي . أزهارها يستمر طوال شهر حزيران .

٢٢٧٣٣ - قَنْصُور الصم

Colutea persica (S). *Bagueaudier de Persie* (F).
جنية سريرية تملو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم. وريقاتها صغيرة القد ، حادة العروق ، خلية الصفحة السفلى . أزهارها الى الصفرة الزاهية يطولها تبيض اسمر . سنفاتها متوسطة القد مشوقة الطرف || أزهارها يستمر من حزيران الى تموز .

٢٢٧٣٤ - قَنْصُور شائع

Colutea arborescens (S). *Bagueaudier commun*, *Arbre à vessies*, *Balandier* (F).
جنية سريرية مبلولة تملو من ٢٠٠ الى ٤٠٠ سم. أوراقها وثرية الترتيب مركبة من ٧ الى ٩ وريقة اعليجية الشكل تطول من ٢٠ الى ٤٠ سم. وتعرض من ١٠ الى ١٥ . نصلها يجري الصفحة السفلى متلائق العروق . أزهارها الى الصفرة البرتقالية . سنفاتها متلية مطبقة تطول نحو ٨ سم. وتعرض نحو ٣ || أزهارها يستمر من ايار الى تموز .



قنصور



قنطريون اسمر

Blue-bottle, Corn-flower (E). Kornblume, Kornflockenblume (D). Ciano, Battesegola, Fioraliso, Fioralino (I).

حشبة سبروتية حولية بورية بلية وتربينية ، ساقها منتصبة فروعها زياة تملو من ٣٠ الى ٩٠ سم. أوراقها الجذعية خضيلة ، وريشاتها الزهرية زرقاء اللون حادة الطرف . قناياتها حناكية النصل سم الحنجر || كانوا يمتدونه فيها مضى من التغمط علاجات العين والبصر . انزهاره يستمر من ايار الى ايلول .



قنطريون صدير

٢٢٣٩ - قنطريون قنزل (S). *Centaurea fenzli* (S). *Centaurea de Fenzl* (F). حشبة تربينية سبروتية عمولة ، ساقها قليلة الفروع تملو من ٨٠ الى ١٢٠ سم. أوراقها بيضية الشكل ، قلبية القاعدة ، مجنعة المتى ، وريشاتها الزهرية فردية التجميع ، كبيرة اللثة ، صفراء اللون ، حادة الطرف . قناياتها الى الياض التاسع || انزهاره يستمر طوال الصيف .

٢٢٤٠ - قنطريون قيجيني الوركي

Centaurea rutaeifolia (S). *Centauree à feuilles de rue* (F). بحلة بورية وتربينية عمولة ، ساقها فروع منتصبة تملو نحو ٩٠ سم. أوراقها كبيرة اللثة فيجينة الشكل باللة التفريض ، وريشاتها الزهرية كثيرة العدد صغيرة اللثة وريدة اللون . قناياتها مهدبة الحنجر . اهدابها سود قاسية || انزهاره يستمر طوال فصل الصيف .



قنطريون عنبري

٢٢٤١ - قنطريون قصيرة الساق

Centaurea acutis (S). *Centauree acule* (F). *Centaury* (E). *Flockenblume* (D). *Centaurea* (I). نوع من القنطريون البري وهو نجمة جعنة الساق الفروع تملو من ١٠ الى ٢٠ سم. أوراقها قرصية طرحة الارنكاز ، صغيرة اللثة ، سنانية النصل الحنجر البشيرة . وريشاتها الزهرية فردية ، زرقاء اللون ، قناياتها حنطية || يكثر في المراعي والبور ويقال ان صصاره جلوره نائمة تغية الحنة ونشط الدم .

٢٢٤٢ - قنطريون كبير ، عرطب

Centaurea centaurium (S). *Centauree officinale*, *C. commune*, *Grande centauree* (F). *Great centaury* (E). *Grosse Flockenblume*, *Tausendgüldenraut* (D). *Centaurea maggiore*, *C. comune*, *Fiele di terra* (I). نوع من القنطريون الطبي البري المعمر. ساقه فروع تملو من ٨٠ الى ١٢٠ سم. اوراقه كبيرة سنانية سلتة . وريشاتها الزهرية عديدة خضطة اللثة زرقاء اللون || يكثر في الاراضي الجبلية الملحاة . جلوره عطرية ، حارة الطعم ، مرة للملحاق ، عديدة اللقوات الصسية المغوية للنبهة العادة الاثر الرجعي .



قنطريون كبير

٢٢٤٣ - قنطريون مسكي

Centaurea moschata (S). *Centauree ambrette*, *Ambrette*, *Barbesu musqué* (F). نبات تربيني سبروتي حولي . فروعها واصرامها عديدة . ساقه فروع تملو من ٦٠ الى ١٢٠ سم. اوراقه سنانية الشكل صغيرة اللثة . وريشاتها الزهرية ذكية الطرف الطري ، كبيرة اللثة ، عديدة اللقوات التي تختلف مع القروب والاصرام || انزهاره يستمر من حزيران الى تشرين الاول .

الى ٣٠٠ سم. أوراقها الجذعية حنطة رجمية . نصلها جامد الصلصة . أوراقها العليا رباعية صغيرة اللثة حناكية الصلصة السفل ، وريشاتها الزهرية كثيرة العدد ، كبريتية اللون ، حادة الطرف . قناياتها تحيلة مهدبة بالاسمر || انزهارها يستمر من تموز الى ايلول .

٢٢٣٣ - قنطريون بهمن ، بهمن ابيض

Centaurea behen (S). *Centauree blanche*, *Béhan blanc*, *Rhapontic blanc* (F). *White behen*, *White rhapontic* (E). *Weiss Behen* (D). *Behen bianco* (I). حشبة حولية بورية بلية تكثر في الحقول وفي الاراضي الملحاة . ساقها زياة منتصبة فروعها تملو نحو ٧٠ سم. أوراقها مزفرية البشرة على صفحتها ، زغبها لبد التجميع ابيض اللون . وريشاتها الزهرية قرصية اللون صفر الملاج . قناياتها بيضقة مستطيلة ، عديدة اللقوات || يقال ان فوائده الصعية جليلة اعصابها التنشيط لانه مقر ناض وقد يستعمل في التوابل .

٢٢٣٤ - قنطريون دلماسي

Centaurea ragusina (S). *Centauree de Dalmatie* (F). بحلة تربينية عمولة . ساقها منتصبة سرعة عادمة الفروع تملو من ٥٠ الى ٧٠ سم. أوراقها وريشة فضية اللون . وريشاتها الزهرية قليلة العدد ملحية اللون بمراء الملاج . قناياتها بيضقة الشكل مائلة الصلصة مهدبة الاطراف . انزهارها يستمر من حزيران الى تموز .

٢٢٣٥ - قنطريون ريشي

Centaurea phrygia (S). *Centauree plumose* (F). بحلة تربينية عمولة ساقها فروع تملو نحو ٧٥ سم. أوراقها اهلجية النصل ، حادة منشاري التسنين . وريشاتها الزهرية صغيرة اللثة ظفرا نحو ٣ سم. لونها الى الحمرة البنفسجية الملاج . قناياتها وريشة التفريض حنطية اللون ، سد الملاحق || انزهارها يستمر من تموز الى آب .

٢٢٣٦ - قنطريون شرقي

Centaurea cineraria (S). *Centauree cinéaire* (F). حشبة سبروتية تربينية عمولة فروعها واصرامها عديدة . ساقها فروع تملو من ٩٠ الى ١٢٠ سم. أوراقها كثيرة التفريض والتفريض ، خلية البشيرة ، فضية اللون . وريشاتها الزهرية حنطية اللثة والحنجر لونها الى الصفار الملح . قناياتها حنطية اللون والحنجر المهدب || انزهارها يستمر من تموز الى آب .

٢٢٣٧ - قنطريون صغير ، مرارة الحشش

Erythraea centaurium, *Chirona centaurium*, *Gentiana centaurium* (S). *Erythrae centaurée*, *Petite centauree*, *Herbe à la fièvre* (F). *Earth-gall*, *Feverwort* (E). *Echtes Tausendgüldenraut* (D). *Centaurea minor*, *Biondella*, *Caccia-febba* (I).

نبات عشبي طبي معمر من فصيلة الجلبانيات . يكثر في البور. ساقه قصيرة فروع تملو من ١٠ الى ٣٠ سم. اوراقه لاطئة متقاطعة رجمية النصل . انزهاره حنطية التجميع هامة الارنكاز وريدة اللون || يستعمل في الطب لملاج بعض الحشبات ولزود الديدان الحموية .

٢٢٣٨ - قنطريون عنبيري ، لرنشاه

Centaurea cyanus (S). *Bleuet*, *Bluet*, *Aubifoin*, *Barbeau bleu*, *Casse-lunettes* (F). *Bachelor button*,

٢٢٧٤٤ - قَنْطَرُونٌ مُعَمَّرٌ *

Pytho (S).

Pytho (F). Pytho (E).

جنس شجرات من فصيلة القنطريئات ورتبة عذبات الاجنحة. انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم مناطق الصنوبريات || اجسامها مستطيلة الشكل ، مبططة ، تطول من ٨ الى ١٠ سم. رؤوسها مستدلة الجرم. عينونها بارزة. تأثيرها وعلامتها ضلعية. قرونها الاستشعارية غوطية. كواسلها محصورة. اتحادها لاسفة. قوائمها نشيطة. الاطراف ملونة يكثر فيها البنفسجي الاسود المواج || يكثر وجودها تحت غطاء السرو والشرين حيث تخفي فصل الشتاء .

Centaurea montana (S). Centaurée vivace, Bleuet vivace, Barbeau vivace (F).

ليات ليني تربص حمر شكليل. ضروبها واصرامها عديدة ساقه فرعاء زياه تملو من ٣٠ الى ٥٠ سم. اوراقه سنانية، نصلها سرح الصلصة العليا عناكيبي السلسل. رؤوساته الزهرية كبيرة القند ، حايفة الزرقه. قناباتها سيد الاهداب || انزهاره يستمر من ايار الى آب .

٢٢٧٤٥ - قَنْطَرُونٌ تَجْمِي * و مَرَكَا

Centaurea calcitrapa, C. stellata (S). Centaurée étoilée, Chausse-trappe, Chardon étoilé (F). Caltrop, Mouse-thorn, Star thistle (E). Calciatrapa, Sternflockenblume (D). Calciatrupa, Calciatrupola, Cardo stellato (I).

حشبة برية محولة تكثر في البرور والمراعي وعلى حافة الطرقات ، جلوسها مأكولة نافعة طعمها كطعم الارضي شوكي .

٢٢٧٤٦ - قَنْطَرُونٌ وَحِيدُ الزَهْرَةِ

Centaurea uniflora (S). Centaurée uniflora (F). برية ورتبية معمرة . ساقها فردية زياه تملو من ٢٠ الى ٤٠ سم. اوراقها حاضنة ، سنانية الشكل ، مستديرة النافعة ، ثنائية الاذنيان . رؤوسها الزهرية وحيدة، قطرها نحو ٣ سم. لها الى الحرة التفرزية. قناباتها مفرقة سطعية اللون || انزهاره يستمر من جوز الى آب .

٢٢٧٤٧ - قَنْطَرُونِيَّة

Centaureide (F). جنس نباتات برية ورتبية من المركبات تسمى قنطورة ، اطلها .

٢٢٧٤٨ - قَنْطَوْرَة *

Cantua (S). Cantua, Bronnie (F). الاسم العلمي والعربي من البيروني . جنس شجيرات دغلة جبلية من فصيلة التنبسيات . انواعها المعروفة قليلة العدد مهدا بلاد البيرو من امريكا الجنوبية || سوقها متصببة فرعاء . اوراقها متباينة الاشكال ، منها الكاملة ومنها المسنة والمقرضة . انزهارها غليق التجميع . ازهارها انبوية التوزيع تطول من ٢ الى ٦ سم. الوانها تختلف مع الانواع || اعرف انواعها واشهرها الترنان التاليان .

٢٢٧٤٩ - قَنْطَوْرَة إِجْصَافِيَّةُ الْوَرَقِ *

Cantua pyrifolia (S). Cantua à feuilles de poirier (F). نوع من القنطورة تزود قنطين . ساقها كثيرة الفروع المتصببة ، تملو من ١٥٠ الى ٢٥٠ سم. اوراقها كاوراق الاجاص . نصلها جبلية اخضر الاسفر المواج . انزهارها غليق التجميع البلب . ازهارها معتقة ، يضاء اللون ، صفراء المواج ، محببة التوزيعات مستطيلة الالوان البالغة للثشوز || تنويرها يستمر من آذار الى حزيران .

٢٢٧٥٠ - قَنْطَوْرَة بَقْسِيَّةُ الْوَرَقِ *

Cantua buxifolia (S). Cantua à feuilles de buis (F). نوع من القنطورة ، تزود قنطين . ساقها فرعاء تملو من متر الى مترين . اوراقها كاوراق البقس . نصلها جبلية اخضر الاسفر . انزهارها غليق التجميع . ازهارها معتقة متهدلة حراء اللون ، صفراء التوزيع تطول نحو ٦ سم. || تنويرها يستمر طولا شهر نيسان .



قنطرون معمّر



قنطرون تجمي



قنطرون

٢٢٧٥١ - قَنْطَرُونٌ *

Pythidae (S).

Pythidae (F). Pythidae (E).

فصيلة شجرات من عذبات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض حراج البلاد الباردة والمتدلة الحرارة || اجسامها مستطيلة الشكل ، مبططة ، تطول من ٨ الى ١٠ سم. رؤوسها مستدلة الجرم. عينونها بارزة. تأثيرها وعلامتها ضلعية. قرونها الاستشعارية غوطية مركبة من ١١ فصلة. كواسلها محصورة . اتحادها لاسفة. قوائمها نشيطة. ارسافها خماسية المقل باستثناء الزوج الخلفي الرباعي المقل. الاطراف ملونة || تعيش تحت غطاء الصنوبريات اخصها السرو والشرين || اشهر اجناسها القنطريث .

٢٢٧٥٢ - قَنْطَرُونَة ، قَنْطَرُونِيَّة

Centaureidum (S). Centauride, Xanthisme (F). Centauridum (E).

الاسم العلمي من اليوناني بمعنى شبيهة بالقنطريون . جنس نباتات حولية ومحولة . برية وزراعية تزيينية من فصيلة المركبات الشاعية . منبتها بعض اصقاع امريكا الشمالية . ضروبها التزيينية شائعة الاستعمال الحدائقي || سوقها عقائقة . فرعاء . اوراقها متتابعة ، ضيقة النصال . انزهارها طرفي الارتفاع . ازهارها شعاعية ، فردية ، كبيرة القند ، بنفسجية اللون او سمجنونية . سطرية العرف المحمود .

٢٢٧٥٤ - قَنْطَرُورُس

le Centaure (F).

the Centaure (E).

كوكبة نجوم جنوبية الموضع مركزها تحت برج الدبران . وهي تمثل صورة حيوان خرافي مقدس مقدم انسان من رأسه الى آخر ظهره . اما مؤخره ، من منشأ الظهر الى الذنب ، ويده فمخسر فرس . وجهه الى المشرق وذنبه الى المغرب . ويده شراخان قد قبض بيده الاخرى على يد السبع || عدد نجومها ٣٧ بعضها من المرتبة الاولى والثانية والثالثة . والمرب تسمى النير الذي حل بطن قنطورس « بطن » . والنير الذي حل حافر يده اليمنى « حصار » . والنير الذي حل يده الاخرى « الون » . والحصار والون هما اللذان يسميان « الخلدن » .

٢٢٧٥٥ - قَنْطَرُوسِيَّات *

Xanthusidae (S).

Xanthusidés (F). Xanthusidae (E).

فصيلة حيوانات زحافة من رتبة البطانيات قابيات الانسان. اجناسها المعروفة ثلاثة وانواعها خمسة . تطول بعض مناطق امريكا الوسطى وكليفورنيا || اجسامها ملونة من ٨ الى ٢٥ سم. رؤوسها شبه حرمسة الشكل . اسنانها صغيرة كثيرة

البدن. أَسْبَتَا قصيرة ضِبا مُلَمَّسة وبِها الضِّلَّة. عِزْبَا صَفِيَّة، سَوَاجِبَا لَمُتَحَرَكَة. قُوَاطِبَا مِثْلَة الطُول. رُؤُسُهَا وَبَطْنُهَا حَرُشِيَّة الْفُشَار. ظُهُورُهَا مِثْلَة. الْوُثْبَا إِلَى الرِّمَكَة السَّوَاء.

٢٢٧٥٦ - قُتَيْشَاب العَظِيم مِنَ الْوُثْبِ.

٢٢٧٥٧ - قُتَيْشَابَة شُكْرَاءُ

Physcephala rufipes (S). *Physcephala rufes* (F). حشرة من فصيلة القنشيات. جسمها متوسط القد، يطوي من ٨ إلى ١٢ سم. رأسها مستطير، أصفر اللون. جبينها وعصرها مغطاة بالأسود. عظمها معتدل القد. عيناها كبيرتان، مرجانيتان. زباناها مستطيلان، أصفران. ريشتها مستطيلان، صفيان، تملؤها مشقة صناعية في الشطر الأمامي. صدرها قدسي الشكل، أصفر اللون، حطلي الموج. بطنها قعسي الشكل، أشعث اللون، مغطى بالأسود. قوائمها إلى الثلثة السراء. قوائمها المغمرة ترشفه من أجزائها فصيلة المركبات. تمتع الأني مكها حل بطون اللسان والقنشات ينقبض من يرقات تنقبض بطون الموائ وتدخلها وتميش فيها حتى الأكامل.

٢٢٧٥٨ - قُتَيْشَار

Tragelaphus gratus (S). *Tragelaphus des marais* (F). نوع من الجبل كير الجبل قنوة قدر القنص لكنه أصغر قرنا وأعين ثوباً وأصغر أخلاقاً. يتميز باستطالة واتساع انغلاقه إلى تحول دون غوصه في السيل ورمال المنابع. موطنه فسح الأرياء عند نهر الكامرون إلى النابون. يعيش قرب الماء يرتاد المنابع في الليل وأحياناً.

٢٢٧٥٩ - قُتَيْشَة

Regard (F). *Look* (E).

٢٢٧٦٠ - قُتَيْشَة مُدْهِيَّة

Conops flavipes (S). *Conops doré* (F).

حشرة من فصيلة القنشيات. جسمها متوسط القد، يطوي نحو ١٠ سم. رأسها كبير، شبه هرمي الشوون، ملهب اللون، يطوي في النافوخ والجبهة زركشة سوداء. عظمها معتدل الحجم، مرتقي الشكل. عيناها كبيرتان، مستديرتان. زباناها مستطيلان، أشعثان. ريشتها مستطيلان، صفيان، تملؤها مشقة صناعية في الشطر الأمامي. صدرها قدسي الشكل، تملؤها نقطتان حاديتان الأركان. ذنبها اللون مطوق ضيق ملهب. بطنها إلى الجفوة الرصاصية الموج تملؤها ثلاثة أطواق ذبذبة الخضاب. قوائمها إلى الثلثة. أخفاها سطوة الأطراف بالأسود. تمتع الأني مكها حل بطون اللسان والعنسا والزيور ينقبض المكان من يرقات تنقبض بطون الموائ وتدخلها وتميش فيها حتى الأكامل.

٢٢٧٦١ - قُتَيْشَة مُزْرَنْة

Conops quadrifasciatus (S). *Conops bandé* (F).

حشرة من فصيلة القنشيات. جسمها يطوي نحو ١٢ سم. رأسها كبير، شبه هرمي الشوون، أصفر اللون أسود الجبهة. أصفر النافوخ. عظمها مرتقي مستطيل. عيناها كبيرتان مستديرتان. زباناها مستطيلان أصفران. ريشتها صفيان. صدرها قدسي الشكل، حديدي اللون، يطوي زبجان من النقط الصفرة والبني. بطنها إلى الصفرة الصبابة الموج تملؤها أربعة أطواق سود. قوائمها إلى

السرة العاقبة. قوتها رقيق الأضار. الأني أكبر قدًا من الذكر. تمتع المكان حل بطون الزناير والجنادب.

٢٢٧٦٢ - قُتَيْشِيَّات

Conopidae (S). *Conopidae* (F). *Conopidae* (E).

فصيلة حشرات من ذوات أجناسها وأنواعها عديدة منتشرة في معظم أقطار العالم. جميعها مقترية. قوتها رقيق الأضار. أجناسها جبانة الجرم، تطوي من ٥ إلى ٣٠ سم. رؤوسها مسطحة، نافرة الأبريق. أعطانها مرتقية. عيونها كبيرة. قوتها إلى الاستعارة لاقائية الطول ويعد الفص. ورثاها مستطيلة، دقيقة. صفورها معتدلة. يطويها مستطيلة. أجناسها هريالة أو حلقة الفشار، خلفها شديد اللقعة والقصر. أنثاها أكبر قدًا من ذكورها. مكها شديد الصغر مستطيل الشكل، يمتد الإناث حل بطون الزناير والنسوح والجنادب ينقبض من يرقات دقيقة تنقبض قنار بلن المائل فتدخله وتميش كامل حياتها البرية إلى تنقضي مع حياة المائل. أشهر أنواعها القنشة المذهبة والمزمنة والقنارة.

٢٢٧٦٣ - قُتَيْشَر

القنشر: شجر مثل الكبر إلا أنها أغلظ شوكة ووداً وثمرتها كثرته ولا ينبت في الصخر. حكاها أبو حنيفة.

٢٢٧٦٤ - قُتَيْشَاكَة

Cryptops جنس دويبات من فصيلة القنشيات. أنواعها المرفقة ٦ أجناسها مركبة من ٢١ سلقة تحمل ٢١ ذوباً من الجرامز. ج قنشر.

٢٢٧٦٥ - قُتَيْشَايَّات

Scolopendridae (S). *Scolopendridae* (F). *Scolopendridae* (E).

فصيلة دويبات من البعثايات الشقويات الأربيل. أجناسها وأنواعها كثيرة البدن أشهرها القنشة وأما أربع وأربعين (الحريش).

٢٢٧٦٦ - قُتَيْش

Diots maritima, *D. candidissima* (S). *Diots argentea*, *Herbe blanche* (F). *Cotton weed*, *Sea cud-weed* (E). *Silberzwelohr* (D). *Santolina maritima* (I).

نبات عشبي بري معمر وسيد الجبس والذرع من فصيلة المركبات. منبت السواحل البحرية. ساقه رفيع زبده تلو من ١٠ إلى ٥٠ سم. زنبها مستطيل القد قطبي الشكل. أوراقه متعاقبة لاطفة، نعلها أهليجي الصفحة، مقطوع القامة، خلي البثرة. رويته الزهرية عديدة صفراء اللون، قنابا جريسي الشكل، تويجها اسفنجي النسيج. بزوبها مضلعة عادة الجناح والأغرة. أنثراها يستمر من حزيران إلى أيلول.

٢٢٧٦٧ - قُفْدَة، كُتَيْبَة الشُّرْكَة، أُنْشُد

حَسِيكَة، ذَلَج، ذَرَام، كُتَيْبَك،

كُتَيْبَك الشُّرْكَة، لُتَيْبَة، مِيلَج.

Erlinaceus (S). *Hérissou* (F). *Hedge hog*, *Urchin* (E). *Igel* (D).

كنيت أبو صفيان وأبو الشوك والأني لم دلال. ج قنافة ويقال لها الصامس. جنس حيوانات لبونة نافعة من آكلات الحشرات صغيرة القد طولها يراوح من ١٦ إلى ٣٠ سم. طولها من ٧ إلى ١٢ سم. أجناسها ملحوة بنطاه من الشوك يكتنفها بكاملها دون الرأس والمعن والمعن والجرامز. قوتها الحشرات والقنار والجرد والمظاء والحيات



قُتَاب



قُتَيْشَاكَة



قُفْدَة

٢٢٧٧٨ - **فُفْزْدَةُ الْبَحْرِ *** ، **شَيْتَه بَحْرِي**
 Diodon (S), Hérissou de mer (F), Sea-urchin (E).
 جنس اسماء بحرية شائكة من فصيلة الفهيات وربية
 لمحميات الفكوك. أنواعه نحو ٤٠ معظمها من اسماء بحار
 البلاد الحارة . مقدمها يشبه مقدم الفنفذ || قوتها
 الحشرات والمريجان . لحومها مؤذية وقد تكون سامة .

٢٢٧٧٩ - **فُفْزْدَات**
 Erinaceidae (S), Erinacidae (F), Erinacidae (E).
 فصيلة النافذ من الحيوانات الباردة وربية الحشرات اي
 آكلات الحشرات .

٢٢٧٨٠ - **فُفْزْدَة** هي الآفة ، اطباها ، ج قناش .
 ٢٢٧٨١ - **فُفْزْدَة ***
 Acornys جنس دويبات لبونة قاضية من فصيلة الفأريات. أنواعه
 ١٦ موطنها افريقية الشرقية وجزيرة العربية وفلسطين .
 اجسامها صغيرة القند مستطيلة تحمل في مؤخر ظهورها
 خيطوطا من الحلب اللؤلؤ الشائك . تألف الففز . قوتها
 الحشرات والوزغ والحرب والجلود || اعرف أنواعه
 واشهرها فنفقة القاهرة والفنفقة المصرية .

٢٢٧٨٢ - **فُفْزْدَةُ الْقَاهِرَةِ**
 Acornys cahirinus (S), Acornys du Caire (F).
 موطنها مصر السفلى . حجمها حجم الفأرة . ثوبها بلون
 الرمل . بطنها ابيض . ذنبها قصير . اذناها كيرتان .

٢٢٧٨٣ - **فُفْزْدَةُ مِصْرِيَّة**
 Acornys dimidiatus (S), Spiny mouse (F).
 موطنها مصر وفلسطين وجزيرة العربية . ثوبها بلون الرمل
 يصب عند الظهر ويبيض عند الصدر والبطن . طولها نحو ١٢
 سم . وذنبها ٨ سم . اذناها كيرتان || تألف القفار
 والقبلي .

٢٢٧٨٤ - **فُفْزْدَل**
 Chèvre (F), Goat (E).
 المعز السمين الفسخنة .

٢٢٧٨٥ - **فُفْزْدُوس ***
 Gomphosus (S), Gomphosus (F).
 جنس اسماء بحرية من شائكات الزعانف فصيلة الكيدميات.
 أنواعه المعروفة اربعة اصطلحها المحيط الهندي || اجسامها
 احليجية الشكل ، مستتلة التبطيط ، تحمل من ١٧ الى
 ٢٢ سم . انوثها تراوح بين السدرة والجودة الزينية الموج .
 بطونها ابيض كبر من ظهورها . زعانفها مبططة بالاصفر
 والاسود . رؤوسها صغيرة ، مخروطية الشكل ، مستطيلة
 الخاطر . حيوها مائعة . زعانفها الظهرية مستطيلة . زعانفها
 الذيلية مستعرضة ، محدودة الاطراف العليا والسفلى بتأخر
 خضروفية لينة || لحومها متوسطة الصنف ، مأكولة .

٢٢٧٨٦ - **فُفْزْدَل**
 Canavalia (S), Canavalia (F).
 جنس نباتات برية وزراعية ، حارشة اومدادة ، من فصيلة
 القرنيات . أنواعه المعروفة نحو ٢٠ جميعها من نباتات
 المناطق الحارة والاستوائية الاسيوية والافريقية . اوراقها
 مركبة ثلاثية تشبه اوراق الفاصوليا . ازهارها متعقوبة
 التجميع ، محورية الارتكاز . ثمارها قرين كبيرة القند ،
 حليقة الحب ، ثنائية الجناح البرزي || اشهر انواعه
 الزراعية ما يلي .

وهي مولة بالتمام الاقليمي لا تأثر بسما . ترح في
 الجبل وترقد في النهار وهي في وقادها تنقبض وتتكور فتبدو
 ككرة من الفلك . الاثى اكبر حجما من الذكر تنضج
 من ٢ الى ٨ جراه تبصر النور بعد وضعها باربعة اسابيع .

٢٢٧٨٨ - **فُفْزْدَ آذِن**
 Erinaceus auritus (S), Hérissou oreillard (F).
 موطنه العراق والاناضول وسورية ولبنان . جسمه يطول
 نحو ٢٦ سم . ويملو نحو ١٢ سم . اذناه كيرتان .
 خطمه وجراحوه مستطيلة . شوكة ابيض القاعدة اسم الجرم
 اصفر الطرف يطول نحو ٣ سم .

٢٢٧٨٩ - **فُفْزْدَ أُرُوبِي**
 Erinaceus europaeus (S), Hérissou d'Europe, Echinus (F).
 موطنه اوروبا ، جسمه يطول نحو ٣٠ سم . ويملو ١٠ سم .
 عظمه يشبه فنفقة الخنزير . عتقه قصير . اذناه صغيرتان .
 شوكة اسم الجرم ابيض الطرف يطول نحو ٣ سم .

٢٢٧٩٠ - **فُفْزْدَ الْمَغْرِب**
 Erinaceus algirus (S), Hérissou algérien (F).
 موطنه افريقية الشمالية من مراکش الى طرابلس الغرب .
 جسمه يطول نحو ٢٢ سم . بطنه حتملي اللون . شوكة فضي
 القاعدة ، احمل الجرم ، اسود الطرف ، يطول نحو ٢٥ سم .

٢٢٧٩١ - **فُفْزْدَ التَّمَل**
 Echidné (F).
 هو النضاض ، اطليه .

٢٢٧٩٢ - **فُفْزْدَ حَبَشِي**
 Erinaceus aethiopicus (S), Hérissou abyssin (F).
 موطنه الحبشة وجورجيا . جسمه يطول نحو ١٨ سم .
 بطنه اسم اللون . شوكة ابيض القاعدة مضلع الجرم
 الاسمر ، لغير الطرف ، يطول نحو ٢٥ سم .

٢٢٧٩٣ - **فُفْزْدَ سُكَّارِي**
 Erinaceus megalotis (S), Hérissou à longues oreilles (F).
 موطنه الانفان ، جسمه كبير القند يطول نحو ٣٠ سم .
 اذناه كيرتان وذنبه كذلك . شوكة اسم اللون يطول نحو
 ٣ سم .

٢٢٧٩٤ - **فُفْزْدَ طَوِيلُ الشَّوَلَةِ**
 Erinaceus macrocanthus (S), Hérissou à longs piquants (F).
 موطنه العرب والانفان والكرديستان . جسمه متوسط القند يطول
 نحو ٢٤ سم . اذناه كيرتان ذلقتان . شوكة اريد الجرم ،
 اصعب الطرف ، يطول نحو ٤ سم .

٢٢٧٩٥ - **فُفْزْدَ مِطْبَن**
 Erinaceus albiventris (S), Hérissou à ventre blanc (F).
 موطنه افريقية الشرقية والجنوبية من مصر والسودان وسائر
 ال الموزنيك . جسمه يطول نحو ٢٥ سم . بطنه ابيض
 اللون . شوكة الة الصهبة يطول نحو ٢٧ سم .

٢٢٧٩٦ - **فُفْزْدَ مَطْلُوق**
 Erinaceus collaris (S), Hérissou à collier (F).
 موطنه الهند والسند والبنجاب . يرغب في القيان والصحاري
 الرملية . جسمه اسم اللون يطول نحو ١٨ سم . عتقه مطروق
 بالابيض . شوكة اسم الجرم ، اغير الطرف ، يطول نحو
 ٢٨ سم .

٢٢٧٩٧ - **فُفْزْدَة**
 Hérissoune (F), She-hedgehog (E).
 انى الفنفذ .



فنفذ البحر



فنفذ



فنفوس

٢٢٧٨٧ - قُفُول هِنْدِي

* ٢٢٧٩٢ - قُنْفِيْنَة *

Trigona (S).

Trigone (F), Trigone (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات صفيحات الحياشيم
وفصيلة القنفذات. أنواعها الماعسة المرفوعة حبة أطرافها
تحت من البحر الأحمر إلى الهند وإستراليا || أصدانها
ثنائية المصابير المتساوية الأضلاع ، مخددة الطرح
الحرارية ، مائلة الداعلية الزلزلية التركيب الجميلة الألوان
القنفسانية .



قنفر

٢٢٧٨٨ - قُنْفُول سَبِي، قُل سَبِي

Trigonidae (S).

Trigonidae (F), Trigonidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرغويات صفيحات الحياشيم.
اجتماعها وأوضاعها المرفوعة عديدة منتشرة في معظم بحار
العالم || أصدانها ثنائية المصابير ، متباينة الأحجام ،
شبه مخروطية الشكل ، مخددة الصنعات المحززة || أشهر
اجتماعها القنفذة والجمبة .

Canavalia ensiformis (S). Canavalle ensiforme, Har-
ricot-sabre, Pois-sabre (F). Sword-bean, Jack-bean
(E). Kanavalbohne (D). Canavalia (I).

نوع من القنفلين وهو نبات زراعي مأكول البُار كاللوباء
والقول . ينبت البلاد الحارة . يعيش من ٣ إلى ٥ سنوات .
ساقه عارية ملتفة . أوراقه كبيرة . وريقاتها بيضيه ذلقة ،
لصلها جلدي الصلصة . الزمار جزئية اللون . عتقودية
التجميع . مستطيلة المالحق . ثمارها قرون متدلية ، مقوسة
كالبسب تصلح نحو ٣٠ سم . وقمرش ٣ سم . تغلف من ٨
إلى ١٢ حبة كبيرة القد مغلفة الشكل بياض اللون أو
وردية || قرونها الخضراء تستعمل استعمال القوياء وهي
للذئبة العلم جيدة الصنف . سحوية مأكولة ، غزرة المواد
الغذائية ، تحوي ما تعريه وقدره :

٢٥,٦٢ %

مواد ازرقية

٢,٣٢ %

مواد دهنية

٤٧,٩٤ %

مواد هيدروكربونية

Ranchement (F). Rancidity (E).

فساد اللحم أو الزيت رنحيت رنجما .

Thyras

٢٢٧٩٦ - قُنْوَ
شكل من أشكال الاضرار المتعدية تكون فيه الاجزاء
الوسطى أطول من السهل والعليا .



قنفر منسفن

٢٢٧٩٧ - قُنْوَ، قُنْوَ، قُنْوَ، قُنْوَ

Régime de ducs (F). Cluster (E).

هو الطبق الذي يحبل ثمار التمثل وهو كالتنقود من السنب
ج أقناء وقنجان وقنجان .

Bourgeons à fleurs (F).

Blossoms buds (E).

هي أين النباتات أو أكنة زهرة فلان بدت قول قد أقب .

٢٢٧٩٩ - قُنْوَ التَغْدِيَة

Normes d'alimentation (F). Feeding norms (E).

ما يجب اعتياده في تمييز مقادير العناصر الغذائية اللازمة
لكل حيوان أو فئة من الحيوانات بالنسبة إلى صه ووزنه
وجيرمه وعمله .

Chaox salmoné (F).

٢٢٨٠٠ - قُنْوَ

سمكة بحرية من الصابغيات تدعى شومص ، أطرافها .

Mormyrus (S). Mormyre (F).

٢٢٨٠١ - قُنْوَ
جنس اسماك نهري من فصيلة القنقرييات . أنواعه نحو ١٨
منظفها من اسماك المياه الإفريقية اصحابها النيل والنيجر .
اشهر انواعه القنقريه أطرافها وقنقريه النيل والقنقريه .



قنفة

Mormyrus caschive (S).

Mormyre ruma (F).

٢٢٨٠٢ - قُنْوَ التَبِيل
سمكة مستطيلة الجسم ، لينة الزعانف ، صغرة الفم ، مستطيلة
الخطم الطويل . يتكرر وجودها في النيل . كانت من الاسماك
المكرمة عند قدماء المصريين .



قنوم

Mormyrus oxyrhynchus (S). Mormyre à bec (F).

٢٢٨٠٣ - قُنْوَ خَطْمَاء ، أَمُورُ
نوع من القنوم وهي سمكة لينة الزعانف ، مودية العلم ،
تكثر في النيل والنيجر .

Kangourous (F).

Kangaroo (E).

فصيلة حيوانات لبونة عاشبة من الجرابيات طويزات
الأرجل . أنواعها المرفوعة نحو ٢٥ تنقسم إلى ثلاثة اجناس
التقفر والفرلاب والتلغاب || اجسامها متباينة الأحجام
التي تراوح من قد الأرنب إلى قد الصلابة . رؤوسها شبه
مخروطية الشكل . اذنانها كبيرة منتصبة . أعناقها واذنانها
مستطيلة . قوائمها الخلفية بالغة الطول . اناثها رباعية
الأضلاع || موطنها أستراليا وتسمانية ونيوفا الجديدة والجزر
الجارية .

٢٢٧٩٢ - قُنْفِين صدف بحري .

٢٢٨٢٠ - **قَتَوِيَّة** **Ductule**
قناة جهازية دقيقة تكون في الحشرات والحیوانات الدنيا .
٢٢٨٢١ - **قَتَبَلَة** كل حشرة تنتمي الى القهليليات .

٢٢٨٢٢ - **قَتَبَلَس** كل حشرة تنتمي الى فصيلة القهليليات .

٢٢٨٢٣ - **قَهْلَسِيَّات** **Psocidae (S), Psocidés (F), Psocidae (E).**
فصيلة حشرات من رتبة القهليليات اجناسها وانواعها عديدة
جميعها صغيرة اللد طويلا يراوح من ١ الى ٣ م . اثنائها
الى الرتبة السوداء يطولها موج اسفح || قوتها ما ينمو
على النبات من الفطور .

٢٢٨٢٤ - **قَهْلِيَّات** **Corrodentia, Psocoptera (S), Psocoptères (F), Psocoptera (E).**
رتبة حشرات من طبقة القمليات تشمل القهليليات
والنمسات .

٢٢٨٢٥ - **قَهْلِي** **Pardrix robuste (F).**
هو الحجل النباهي ، اطلبه .

٢٢٨٢٦ - **قَهْد** **Narcisse (F).**
هو الزرجس ، اطلبه .

٢٢٨٢٧ - **قَهْب** **Aubergine blanche (F).**
ضرب من الباذنجان ابيض الجار يستعمل كنبات تزيين .

٢٢٨٢٨ - **قَهْمَر** ، **قَهْمُور** **Fibres du dattier (F).**
قشرة حمراء مسطرة الالياف المبركة تكون على لب النخلة .

٢٢٨٢٩ - **قَهْمَعَة** صوت الدب .

٢٢٨٣٠ - **قَهْم** **Anorexie (F), Loss of appetite (E).**
قلة الشهوة للطعام عند الحيوان .

٢٢٨٣١ - **قَهْمَب** **Pardrix robuste (F).**
هو الحجل النباهي ، اطلبه .

٢٢٨٣٢ - **قَهْمَرَان** * **Amphisbenus (S), Amphisbène (F).**
جنس عظام من فصيلة القهقرانيات انواعه ثلاثة طويلا
من ٣٠ الى ٥٠ سم . اجسامها اسطوانية . اثنائها
الى السمرة السوداء يطولها تجذيع اخير . قوتها الحشرات .
تميش في التربة وتكثر قرب الماشات حيث تؤين الغذاء .

٢٢٨٣٣ - **قَهْمَرَانِيَّات** **Amphisbenidae (S), Amphisbénidés (F).**
فصيلة من البطانيات المديمات الارجل والروح الجنيهي .
اجناسها قليلة العدد . تميش تحت الارض . جميعها من
الزحافات الناعمة .

٢٢٨٣٤ - **قَرَادِم** **Rémiges primaires, Flèches (F), Wing primaries (E).**
ريش مقدم جناح الطائر وهي الاصغار والواشر .

٢٢٨٣٥ - **قَرَاوِم** **Rongeurs (F), Rodentia (E).**
رتبة حيوانات من البوانات تتميز باجسامها الصغيرة اللد
وبشائياها المستطيلة الحادة الاطراف التي تمكها من القضم .

٢٢٨٠٤ - **قَتَمِيَّات** **Mormyridae (S), Mormyridés (F), Mormyridae (E).**
فصيلة اسماك نهريه من مفتحات الماشة اشهر اجناسها
القنوم .

٢٢٨٠٥ - **قَتَوِي** ، **وُعَالِي** **Vasculaire (F), Vascular (E).**
نمت تعريني يطلق على النباتات القنوية اي الوائية النسيج .

٢٢٨٠٦ - **قَتَرِي** **Botryoïde (F), Botryoid (E).**
نمت ترمويي يطلق على ما كان شكله كالقنور .

٢٢٨٠٧ - **قَتَوِيَّات** هي المارزوانيات ، اطلها .

٢٢٨٠٨ - **قَتَوِيَة** ، **وُعَالِيَة** **Vascularisation (F), Vascularization (E).**

القنوية ، جسوريا ، تكونين اوعية جديدة في النسيج
المضوية . وهي ايضا النمط الذي تتخذه الاوعية في حالة
عضوية معينة .

٢٢٨٠٩ - **قِنِشَل** **Nuque de l'éléphant (F), Nape of the elephant (E).**
رتبة الفيل حيث يجلس الفيل .

٢٢٨١٠ - **قَتِيب** **Nuage épais (F), Thick cloud (E).**
سحاب متكاثف التجميع عابق اللون .

٢٢٨١١ - **قَتِيب** **Involuclle (F).**
قنابة صغيرة اللد تملق قاعدة الرؤية الزهرية .

٢٢٨١٢ - **قَتِيبَة** **Bractéole (F), Bracteole (E).**
قنابة صغيرة الجرم تملق قاعدة القتيب .

٢٢٨١٣ - **قَتِيبَرَة** **Feuilles mortes de pins (F).**
اوراق الصنوبر اليابسة تلتفد الارض .

٢٢٨١٤ - **قَتِيبَعَة** **Glumellule (F).**
حبة ثلثافة صغيرة اللد تحت العنيفة ملاصقة للزهره . وما
قنبتان لكل زهره من زهرات السنبله .

٢٢٨١٥ - **قَتِيس** **Phénotype (F), Phenotype (E).**
هو من النبات الذي يتصل بالصفات الشوزبية المنسوبة
الى محوره .

٢٢٨١٦ - **قَتِيشَعَة** راجع صيه .

٢٢٨١٧ - **قَتِيشَة** راجع أناسكلوس .

٢٢٨١٨ - **قَتِيشَة** **Verticilllopiets (S).**
جنس فطور مجهرية من الفتيخيات وفصيلة الوطحيات .

جره الكنديه منتصبة ، فرومه ريشية الشكل ، قاعدة
الارتكاز . كتالته شمعية التجميع ، يفضيه للشكل ثلثافة
انواعه قليلة العدد والاذا تهر في تكاثرها ككتل من العفن
الابيض تركيب المواد النباتية والمضوية المنطلة .

٢٢٨١٩ - **قَتِشَة** **Fiote (F), Phial (E).**
ققم زجاجي امادة صنبر اللد محكم الد .



قَهْمَرَان

Malandre (F).

Malander, Rotten Knot (E).

مرض جلدي يَمرِّي رِكبة القوس .

Dartrose de la vigne (F). قُوَيْمَةُ الْكَرْمِ

Dartros of the vine (E).

وصم نباتي مظهره الخارجي قروح وفلوج في اصول وسروع الكرمة . سببه حائل مختلفة اصحابها الفسجية .

Impétigo, Eczéma humide (F). Impetigo, Eczéma damp (E).

مرض جلدي يركب الحبوب .

Alouette cochevis (F).

قُوَيْمَةُ

في القبرة المنحنية ، اطليا .

Sternite (F).

قُوَيْمَةُ

في الاسرة مفصل من مفصل بين الحشرة . ج قوب .

Coque d'oeuf (F). Shell (E).

قُوَيْمَةُ

قشرة البيض بعد انفلاتها من القرح . ج قوب والوب .

Bergeronnette pristanière (F).

قُوَيْمَةُ

رابع ذرة الربيع .

قُوَيْمَةُ الارضي شوكي *

Depressaria subpropinquella (S). Teigne de l'artichaut (F).

حشرة من القديريات فراشتها صغيرة القدد ، حنطية اللون ، يسطها نحو ١٠ م . يرقها غبار اللون ثلاثية الخطوط القلابة . تركب الارضي شوكي .

Gracilaria azulella, G. azulella (S). Teigne de l'axella (F). Azalea leaf miner (E). Azalea-miner (D).

حشرة من القديريات يسطها نحو ١٠ م . وراشتها خفيفة حنطية اللون فضية اللون . يرقها دقيقة الجسم غبار التوب تلثم الارواك ولذاتها .

Teigne des arbres fruitiers (F).

في الشبكية الفسجية ، اطليا .

Teigne des bourgeons (F).

في الشبكية الفسجية ، اطليا .

Teigne des pommiers (F).

في عرطيط التفاح ، اطلبه .

Simsectis nemorana (S). Mineuse du rugier, Teigne du rugier (F). Fig moth (E). Felgenblatt-motte (D).

حشرة من القديريات فراشتها سمراء اللون تطول نحو ١٠ م . يسطها تراوح من ١٥ الى ١٨ م . وراشتها مستعرضة حنطية يعلاها بيج اسف الملوخ || لما جيلان في السنة . يرقها صغيرة دقيقة تركب في جيلها الاول السطح العلوي من الورقة وتركب في جيلها الثاني الورقة والورقة والورقة حماً .

فصائلها ١٤ تنتمي الى ٤ مراتب : السنجابيات الشوزب ، والقردييات الشوزب ، والشجيات الشوزب ، والبيكيات الشوزب || اما اجناسها ونوعاتها فكثيرة العدد .

Migrateurs (F). Migratory (E).

الطيور التي تذهب من بلاد الى بلاد وهي ضد الاوابد .

Lepus (S). Lièvre (F). Hare (E).

جلس حيوانات لبيقة تنافسة من فصيلة الارنيبات . انولاه ٦٩ موطنها العالم . اجسامها مستطيلة منسجمة . طولها الكامل ، من طرفها الى طرف ذنبها ، لا يقل من ٦٠ سم . ولا يفوق ٧٥ سم . اذنانها مستطيلة ضيقة متصبة .

حييا كبيرة . راسها مفلوكة . جرابها الامية قصيرة القدد خاسية الاصابع . اما الخلفية فمستطيلة وديابة الاصابع .

اظانها قوية حادة . اقلها سوية اللون منها الاكهب والاصفر والاصهب والابيض الخ ... || تألت اليهر والجهال والقائبات والاحراج والحضاب والسهول . ترحب في الليل . اصحرتا رداء مستطيلة الشكل تخلطها على اعماق

مخضلة تراوح من ٥ الى ٧٠ م . مدخلها وعرجها نطق واحد مستقيم || قوتها النبات والحيوي . اناثها ثنورة

تضع من ٣ الى ٥ مرات في السنة وكل مرة من العشرين الى الخمسة تخلف بامرة كاسية ترحب برفقة امهاتها بعد

وضعا بامبرع . واثي القواح تدعى درامة . وقواحة || احرف انولاه واشهرها :

Lepus timidus (S). قواح ابيض ، قواح جبول

Lièvre timide, L. blanc (F).

Lepus europaeus (S).

قواح اوروبي

Lièvre européen, L. commun (F).

Lepus tolai (S). Lièvre du Thibet (F).

قواح التبت

Lepus arcticus (S). Lièvre arctique (F).

قواح الشمال

Lepus capensis (S). Lièvre du Cap (F).

قواح القطب

Lepus mediterraneus (S).

قواح المتوسط

Lièvre méditerranéen (F).

Lepus campestris (S).

قواح المراعي

Lièvre des prairies (F).

Lepus americanus (S).

قواح امريكي

Lièvre américain (F).

Lepus aegyptius (S).

قواح مصري

Lièvre d'Egypte (F).

Lepus nigricollis (S).

قواح مقلد

Lièvre mosel, L. à cou noir (F).

Eudynamis orientalis (F).

٢٢٨٣٨ - قُوَال

القوال طائر معروف باسم عديس شرقي ، اطلبه .

٢٢٨٣٩ - قُوَاكَة

في الولاية ، اطلبها .

Membres (F). Limbe (E).

٢٢٨٤٠ - قُوَالِيم

اعضاء الحيوان كالذيمن والرجلين التي تزود انتقال الجسم .

Pousin (F).

٢٢٨٤١ - قُوْب

هو الصمور والكنكوت . ج اقواب .

Eczéma (F).

٢٢٨٤٢ - قُوَيْمَةُ

في الاكريميا ، اطلبها .



قواح



قويمة الارضي شوكي



قويمة الازالية



قويمة التين

٢٢٨٦٥ - قُوَيْعَةُ الشَّحْمِ

Aglossa pinguinalis (S). Teigne de la graisse (F).
حشرة من القويبيات. يرقاتها صغيرة دقيقة وريدية اللون تعيش
على اللحم الجاف.

٢٢٨٦٦ - قُوَيْعَةُ الشُّوَدَرِ ، لَيْعَةِ

Lica ocellatella (S). Teigne de la bettecarve (F).
حشرة من القويبيات. يسطها تراوح من ١٠ إلى ١٢ م.
نوبها إلى الحطلة المائلة. يرقاتها خضراء اللون حمراء الحواف
تلفم بطول الشندر وتضع بها أشد الأذى.

٢٢٨٦٧ - قُوَيْعَةُ الصَّكْبِيَّاتِ
Teigne du colza
هي القويعة المائية، أطلها.

٢٢٨٦٨ - قُوَيْعَةُ الصُّوفِ * ، سَيْعَةِ الصُّوفِ

Tineola bisellifella (S). Teigne de la laine. Mite
des vêtements (F). Webbing clothes moth (E).
Kleidermotte (D).

حشرة من القويبيات يرقاتها صغيرة دقيقة زبداء اللون تركب
جميع الانسجة الصوفية بما فيها السجاد.

٢٢٨٦٩ - قُوَيْعَةُ الْفِرَاكِ * ، سَيْعَةِ الْفِرَاكِ

Trichophaga tapetzelia, *Tinea tapetzelia* (S). Teigne
des fourrures, Mite des fourrures, Mite des
tapis (F). Carpet moth (E). Tapetanmotte (D).

حشرة من القويبيات يرقاتها صغيرة اللد سمراء اللون تركب
الفراء وتقرضها.

٢٢٨٧٠ - قُوَيْعَةُ الْفَلَيْنِ ، سَيْعَةِ الْفَلَيْنِ

Aenophila flavum (S). Teigne du liège (F).
حشرة من القويبيات يرقاتها صغيرة اللد دقيقة حمراء اللون
سنتية المروج تلفم الفلين المصنوع لتعطيه.

٢٢٨٧١ - قُوَيْعَةُ الْكُرَاتِ

Acrolepis assectella (S). Teigne du poireau (F).
Leek moth (E). Lauchmotte (D).

حشرة من القويبيات صغيرة اللد يسطها نحو ١٢ م.
نوبها إلى الحطلة السواء رواشها منشفة بالأسود. يرقاتها
دقيقة سنتية اللون تلفم الكرات بأوراقه وقص ساه.

٢٢٨٧٢ - قُوَيْعَةُ الْكَرَزِ *

Argyresthia aphipella (S). Teigne du cerisier (F).
Cherry fruit moth (E). Kirschblütenmotte (D).

حشرة من القويبيات. يسطها تراوح من ١٠ إلى ١٢ م.
رواشها الاخضر إلى الرمادي يطولها تمريج أسود.
رواشها الاخضر إلى السمرة الخطية السوية يحرقها أثمار
من الخمل الأصعب التام. يرقاتها تركب أثمار وثمار
الاجار المشرة اصعبها الكرز.

٢٢٨٧٣ - قُوَيْعَةُ الْكَيْشِيَش

Incurvaria capitella (S). Teigne du groseillier (F).
حشرة من القويبيات يسطها نحو ١٥ م. رواشها جوية
اللون يعلوها تبيج اصفر مثلث الزوايا. يرقاتها تبرد حمراء
اللون في أول عهدها ثم خضراء زاهية فقاومة وهي تقرض
براعم وثمار الكشمش.

٢٢٨٥٦ - قُوَيْعَةُ النَّيَّابِ * ، سَيْعَةِ النَّيَّابِ

Tinea pellionella (S). Teigne des vêtements (F).
Pelt moth (E). Palzmotte (D).

حشرة من القويبيات. يرقاتها صغيرة دقيقة تعيش على
النياب الصوفية. ابيالها الحولية من ٢ إلى ٥. فبالج
عادتها غدية الشكل متينة النواص.

٢٢٨٥٧ - قُوَيْعَةُ الْجَزْرِ

Depressaria nervosa (S). Teigne de la carotte (F).
Carrot moth (E). Kümmermotte, Möhrenschebe (D).

حشرة من القويبيات. يرقاتها صغيرة خضراء اللون تعيش على
أجزاء الجذر وفيه من لباتات الفصيلة الخيمية تنقص
على الأجزاء وقد لا تمت من البذور.

٢٢٨٥٨ - قُوَيْعَةُ الْخُبُّوبِ * ، حَنْطُوبِ الْخُبُّوبِ

Tinea granella (S). Teigne des grains (F).
European grain moth (E). Kornmotte, Weisser
kornwurm (D).

حشرة من القويبيات. يسطها تراوح من ١٠ إلى ١٤ م.
رواشها إلى البياض الاغبر يطولها تبيج حنطي ومجاة نصية.
يرقاتها وسيدة الجبل الحولي، صغيرة اللد، تركب. جميع أنواع
المواد الغذائية المخزونة ولا تمت من الحنطة والشعير.

٢٢٨٥٩ - قُوَيْعَةُ الْخُصْمِيَّاتِ *

Prays citri (S).
Teigne du citronnier (F).

حشرة من القويبيات. صغيرة اللد يسطها نحو ١٠ م.
نوبها إلى الحطلة. رواشها مرقشة. ثلاثية الاجيال الحولية.
يرقاتها صغيرة اللد، تركب أثمار وثمار الحنطيات.

٢٢٨٦٠ - قُوَيْعَةُ الْخُشْبِ

Teigne du bois mort (F).

هي المربية النيبكة، أطلها.

٢٢٨٦١ - قُوَيْعَةُ الدَّرَّاقِنِ ، سَرَسْتُومِ *

Cerostoma persicella (S). Cérostome du pêcher (F).
حشرة من القويبيات كبيرة اللد يسطها نحو ٢٥ م.
رواشها الامانيان إلى الصفار الكبريتي والخلقيان إلى
الطلعة. يرقاتها وسيدة الجبل الحولي تركب أوراق الدراق
والوز.

٢٢٨٦٢ - قُوَيْعَةُ الدَّرَّاقِنِ الصَّغِيرَةِ * ، أُنْرَسِيَا *

Anarsia lineatella (S). Petite mineuse du pêcher (F).
Peach twig borer (E). Pfirsichmotte (D).

حشرة من القويبيات. يسطها تراوح من ١٤ إلى ١٦ م.
رواشها شبيقة حطلاء اللون. لها حيلان في الحول. تركب
رقعة الجبل الاول الاثنان الثانية ضلعمها وتحول دون تمها.
اما يرقات الجيل الثاني فتتركب الثمار وتنقرها.

٢٢٨٦٣ - قُوَيْعَةُ الزُّعُرُورِ

Teigne de l'aubépine (F).

هي النيبكة الصغيرة، أطلها.

٢٢٨٦٤ - قُوَيْعَةُ الزَّيْتُونِ *

Prays oleella (S).
Teigne de l'olive (F). Olive moth (E). Oliven-
motte (D).

حشرة من القويبيات. صغيرة اللد يسطها نحو ١٠ م.
نوبها رمادي اللون نضي المروج. ابيالها الحولية ثلاثة.
يرقاتها صغيرة اللد سنتية اللون ثلاثية الحطوط السمرة القاطية
تركب الارواق ضلعمها والاوراق تقسب اخلصها والثمار
فتنقرها وتطليها.



قويعة النياب



قويعة الحبوب



قويعة الحنطيات



قويعة الدراق الصغيرة



قويعة الزيتون



قويعة الصوف



قويعة الفراء



قويعة الكرز

٢٢٨٩١ - **قُوَّةُ الإِنْتِاشِ** (F). Pouvoir germinatif (F).
Germinal power (E).
من المعلوم ان لكل نوع من النبات مدة فصيل من الزمن تستغلها البذور الى ان يتم انتاشها || قُوَّةُ الانتاش قياس نسبي لحي يقدر بواسطته نسبة البذور الجيدة والسريعة الانبات .

٢٢٨٩٢ - **قُوَّةُ جَذَابِيَّة** (F). Force centripète (F).
Centripetal force (E).
هي القوة التي تدفع الشيء نحو المركز .

٢٢٨٩٣ - **قُوَّةُ حَامِيَرِيَّة** ، **قُوَّةُ حَمِيَرِيَّة** (F). Force marémotrice (F). Tide-moving force (E).
هي القوة التي تكثرت موج البحر الطافية الغامرة في مدما وقد توسلوا في فرنسا الى استخدامها لتوليد الحركة الاندفاعية .

٢٢٨٩٤ - **قُوَّةُ نَائِيْدِيَّة** ، **قُوَّةُ طَائِرِيَّة** ، **قُوَّةُ مَبْعِدِيَّة** (F). Force centrifuge (F).
Centrifugal force (E).
هي القوة التي تدفع الشيء لابتعاد من المركز .

٢٢٨٩٥ - **قُوَّتَانِ** (F). Yaek (F).
هو القطار ، اطلبه .

٢٢٨٩٦ - **قُوِّيَّة** (F). Bromatologie (F).
Bromatology (E).
القيوة علم يبحث في الاعتناء مع وصف الاكلات وبراكيها ومعايرها العنصرية .

٢٢٨٩٧ - **قُوْرَج** (F). هو الظلم ذكر النعام .

٢٢٨٩٨ - **قُوْس** (F). Arc (F). Arch (E).

٢٢٨٩٩ - **قُوْس** (F). Cintre (F). Curve of an arch (E).
٢٢٩٠٠ - **قُوْس**

القوس مجموعة من ستة كواكب تدعى القلادة .

٢٢٩٠١ - **قُوْس قُوْرَج** (F). Arc-en-ciel (F).
هو القوس ، اطلبه .

٢٢٩٠٢ - **قُوْسِيَّات** (F). Arctotées, Arctotidées (F).
سبط من فصيلة المركبات الهيدريات .

٢٢٩٠٣ - **قُوْصَرَة** (F). Pot (F).
هي المكن زرع فيه الزهور ، ج قواصر .

٢٢٩٠٤ - **قُوْطِيَّة**
كلمة عامية تشمل دلالة على الثمر ويصل البانورة .

٢٢٩٠٥ - **قُوْطِي** ، **قُوْطِيَّة** (F). Nasua (S). Coati (F).
جنس حيوانات لبونة من فصيلة الرثويات . انواعها المعروفة خمسة ويهم من قال انها نوبان وثلاثة ضرب . جميعها امريكية الموطن ، صغيرة القد ، جميلة الشكل ، مستديرة الاذن ، كثيفة الصوف الناعم ، مستطيلة الذيل الجلل . اناتها تصع من ٣ الى ٥ جراء . تألف الغابات الكثيفة . قوتها الحار والموبيبات والحشرات .

٣٠ سم . حراشها صغيرة ، جامدة . ثوبها الى الربعة والبنرة الحمره يطولها في رأسها وظهرا ويطلها يتيج عابن الحمره كالمه . زعانفها الظهرية والصدية والذيلية مرفوعة بالاسر والاخر || رأسها كبير الجرم مستعرض الخطم والخطم . شدتها واسع الانفراج لكنها الاسفل يتقدم الاعل قليلا . اسنانها صغيرة ذرية ، ثنائية الهنث . عيناها كيرتان ، مستديرتان ، ناشرتان ، رفيتا الايتكار . زعنفتها الظهرية الاول مستطيلة المناخس . زعنفتها الذيلية مستديرة الطرف || الاثني تسرا في لفقة من الصدفة الكبير بد تنظيمها من الرمال والاتصال وتتقلب مع الذكر على حراسة السره حتى النفق || لها جيد الصف ، مرغوب فيه .

٢٢٨٨٧ - **قُوْبِيُونُ مَصْب** ، **كُرُوْج أَصْبَر**
Gobius nebulosus (S). Gobie nébuleux (F).
Gobius nebulosus (E).

سمكة بحرية بيوض من القويون . اصطناعا تمتد من الخليج الى البحر الاخر فالبحر الابيض المتوسط عبر قناة السويس || تعتبر من اسماك النفاق والمخادع . جسمها صغير الحجم ، مستطيل الشكل ، متدل التليط ، يطول من ١٢ الى ١٥ سم . حراشها معيئة جامدة . ثوبها ابيض اللون ويعلو من الخط الجانبي الى الظهر تمتد غير متفاوت الكثافة يبدو كالفصاي . اما القسم السفلي قفصي المراج . زعانفها الظهرية والرجية شفافة . الصدريه والحوضية الى الخصار البحر ويعلو الحوضية موج اسمر . الذيلية شفافة ملوكة يختار اسود || رأسها كبير الحجم ، غزواني الشكل ، قصير الخطم الذلق . اسنانها صغيرة ، متراسة . عيناها صيرتان ، مستديرتان ، ناشرتان ، رفيتا الايتكار || زعانفها الظهرية اثنتان تتميز باستطالة الشراع الثاني من الظهرية الاول الذي يبدو كسلك دقيق ، مستطيل اسود اللون . زعنفتها الحوضيتان متلاصقتان لها جيد الصف ، مرغوب فيه .

٢٢٨٨٨ - **قُوْبِيُونِيَّات** (S). Gobilidae (S).
Gobilidae (F). Gobilidae (E).

فصيلة اسماك بيوضة من شاكات الزعانف . اجناسها وانواعها كثيرة العدد ، معظمها بحري وبعضها نهري والبحري يكثر وجوده عند الاغوار . اصطناعا مياه البلاد المتعددة الحرارة || اجسامها متوسطة القد او صغيرة . رؤوسها كبيرة . شدتها معتدلة الانفراج . عيناها مستديرة ، ناشرة . زعانفها الظهرية الاول منخسية الاطراف || أشهر اجناسها القويون .

٢٢٨٨٩ - **قُوَّة** (F). Force (F).
هي صفة الالتزامية المفروضة وهي تشمل في الصيغ التالية:
قوة الاتبات Force probante (F).
قوة الالتزام الخاص Force d'obligation privée (F).
قوة القانون Force de loi (F).
قوة المحكوم به Force de chose jugée (F).
قوة تنفيذية Force exécutoire, Exécution parée (F).
قوة قاهرة Force majeure (F).

٢٢٨٩٠ - **قُوَّةُ الْاِتْمَاصِ** ، **قُوَّةُ الْمَصِّ**
Pouvoir absorbant (F). Absorptive power (E).
خاصة الترأب التي تمكنه من الاحتفاظ بين ذراته بعض العناصر الذائبة القابلة للربان .



قويون مصب

والبور. ساقه فراءه تملو من ٣٠ إلى ٧٠ سم. اوراقه صفوة
فضيلة زينة النصل. وروائته الزهرية فردية التجميع،
لقنوسية الشكل، صفراء اللون.

٢٢٩١٧ - قُوطِحَان المَرْجُج * ، كَرْوَتَم البَر * ، مَنَدِيلَه

Chrysanthemum coronarium (S). *Chrysanthème à carène*, C. des jardins, Marguerite des champs (F). *Crown daisy*, C. marigold, Garden chrysanthemum (E). *Kronenwucherblume* (D). *Crisantemo da mazzi*, *Bambagelle*, *Margherita gialla* (I).

عشبة سولية برية وريئية. ساقها فراءه مكشعة تملو من ٦٠ إلى ١٠٠ سم. اوراقها قدية التفريش. وروائتها الزهرية متوسطة القد قطرها نحو ٤ سم. طليها أصفر اللون أخضر الملاج. لبنتها الب الصغار الزايي || أزهاره يستمر من حزيران إلى ايلول.

٢٢٩١٨ - قُوطِحَان ذَهَبِي * ، قُودِيَا ، كَرْوَتَم مَحْصَل

Chrysanthemum segetum (S). *Chrysanthème des blés*, *Marguerite dorée*, M. jaune (F). *Corn chrysanthemum*, C. marigold, Yellow corn-flower (E). *Echte Wucherblume*, *Kornringelblume* (D). *Margherita dorata*, M. delle messi, *Crisantemo* (I).

عشبة سولية برية وريئية ساقها قليلة الفروع تملو من ٣٠ إلى ٦٠ سم. اوراقها قدية التفريش، بجمرة اللون، تحية النصل، متباعدة التنوين. وروائتها الزهرية ذهبية اللون، متوسطة القد، قطرها نحو ٤ سم. طليها متفخمة حية الشكل || أزهاره يستمر من حزيران إلى آب.

٢٢٩١٩ - قُوطِحَان كَبِير *

Chrysanthemum leucanthemum, *Leucanthemum vulgare* (S). *Chrysanthème grande marguerite*, *Cil de bœuf* (F). *Ox-eye daisy*, *White-weed*, *Dog daisy* (E). *Ginsawerblume*, *Riesenmarguerite*, *Goldsblume* (D). *Margherita grande*, M. dei prati, *Margaritone* (I).

عشبة برية مملوءة ساقها فراءه تملو من ٦٠ إلى ١٢٠ سم. اوراقها لاقياسية الشكل وإلته، وروائتها الزهرية كبيرة الحجم قطرها يراوح من ٦ إلى ٨ سم. لبنتها غنية مستطيلة. أزهارها يستمر من ايار إلى تشرين الثاني.

٢٢٩٢٠ - قُوطِحَان مَحْزُونِي * ، رُؤَيْدَة مَسْمُومِي

Calendula officinalis (S). *Souci officinal*, S. des jardins, S. à bouquet, S. double, *Mirliton* (F). *Hen and chickens*, *Poc marigold* (E). *Ringelblume*, *Garten-ringelblume* (D). *Calendola*, *Calta dei giardini* (I). نبات عشبي حولي ويحول من فصيلة المركبات. فروعها الزراعية عديدة ساقها تملو من ٤٠ إلى ٦٠ سم. اوراقها سنائية متعاقبة. وروائتها الزهرية كبيرة القد قطرها نحو ٥ سم. لونها إلى الصفرة اللحية المائلة.

٢٢٩٢١ - قُوطِحَان مَنِيَات * ، شَجَرَة مَرَمَم * ، كَرْكَاش

Chrysanthemum parthenium (S). *Chrysanthème-Matricaire*, *Grande camomille* (F). *Feverfew chrysanthemum* (E). *Goldfederwucherblume*, *Grosse Kamillen* (D). *Amarella*, *Matricale*, *Morella*, *Partenion* (I).

عشبة برية معمرة فواحة اللرب. ساقها حياءه فراءه تملو من ٢٠ إلى ٧٠ سم. اوراقها رطلة لاقياسية الكثريم تطويل



قُوطِي مَعْرُوف



قُوطَاغ



قُوطِحَان المَرْجُج

قُوطِحَان الحَقْل



قُوطِحَان كَبِير

قُوطِحَان ذَهَبِي



قُوطِحَان مَنِيَات

قُوطِحَان عَظْرَنِي

Nasua rufa (S).

Coati roux (F).

نوع من القوطي. جسمه يطول نحو ٤٨ سم. وذنبه ٤٢ أما ارتفاعه فنحو ١٩ سم. ثوبه إلى الجلوة الزاهية يمتد عند الظهر. رأسه ويصره إلى السمرة الرمضاء. ذنبه أصعب اللون مطرق بالأبيض || أعضائه شاسعة الحفيد تم جمع بلاد أمريكا الجنوبية.

٢٢٩٠٧ - قُوطِي مَعْرُوف * ، قُوطِي مَنَحْجَابِي * ، Nasua narica (S). Coati auricle (F).

نوع من القوطي. جسمه يطول نحو ٥٥ سم. وذنبه ٤٢ أما ارتفاعه فنحو ٢٥ سم. ثوبه إلى السمرة السوداء المراج. بطنه إلى الصفرة. خطمه أبيض الطرف. جوارحه قصيرة وقوية، غزاله حادة خاسية || أعضائه نحيفة الأرباء تشمل المكسيك وغواتيمالا وهندوراس وكوستاريكا.

٢٢٩٠٨ - قُوطِي ، مَحْكَارَة ، صِيَوَان Pavillon de l'oreille (F). Pavillon, Auricle (E).

قُوطِي الأذن عبارة الأذن وصيوان الأذن، ثلاثة أسماء لسمي واحد.

٢٢٩٠٩ - قُوطَا Silex meulier, Pierre meulière (F). Miltstone grit (E).

حجر أسود اسفنجي شديد الصلابة تعمل منه الرعى.

٢٢٩١٠ - قُوطِي هُو البَجِج ، اطْلِب.

٢٢٩١١ - قُوطَاغ Caquet (F). Cackle (E).

صوت للدجاجة على البيض وصوت الازرق.

٢٢٩١٢ - قُوطَاغ * Pyrola (S). Pyrola (F).

Wintergreen (E). *Wintergrün* (D). *Pirola* (I). جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة القُوطَاغيات أنواعها المعروفة نحو ١٢ أصلها بلاد الإقليم المعتدل. جلودها لينة. ساقها مشوكة. اوراقها متعاقبة متفخمة بيضية. شاربها الزهرية متبسة. أزهارها سلبية التجميع يضاء اللون.

٢٢٩١٣ - قُوطَاغِيَات Pyrolaceae (S). Pyrolacées (F). Pyrolacées (E).

فصيلة نباتية من ذوات السلقنتين متحدة القساعات. أصلها وأنواعها عديدة جميعها برية لا تنفع لها. أشهرها القُوطَاغ.

٢٢٩١٤ - قُوطَاغ طَائِر يَأْلَف الخُرْبة من الاماكن

٢٢٩١٥ - قُوطِحَان Chrysanthemum (S). Chrysanthème (F).

جنس نباتات عشبية سولية ويحول ومعمرة من فصيلة المركبات. الزواحة عديدة منها البرية والريئية والبطية. ساقها فراءه. اوراقها متعاقبة معرصة. أزهارها رؤسية صفراء اللون أو يضاء || أشهر أنواعها ما يتبع.

٢٢٩١٦ - قُوطِحَان الحَقْل * Calendula arvensis (S). Souci des champs, Fleur de tous les mois (F). Field marigold, Gools (E). Feld-ringelblume, Wilde Ringelblume (D). Calendula, Calta dei campi, Fiorancio (I).

نبات عشبي بري من فصيلة المركبات يتكرر في الحقول

٢٢٩٣٠ - قوتشيات *
 Delphinapteridae (S).
 Delphinapteridae (F).
 فصيلة حيوانات بحرية لينة من مرتبة مثالثات الانسان
 رتبة الحوتيات || انواعها المعروفة قليلة تتميز بضمير
 الحافظ وبانعدام الزعانف الظهرية || اشهر انواعها
 واهربها القوتى والبالوتة .

٢٢٩٣١ - قوتيس *
 Otocoris (S).
 Otocoris, Alouette de montagne (F).
 Otocoris (E).
 جنس طير من فصيلة القيريات انواعه قليلة جميعها قاطعة
 تجوب جبال الالاد الاسيوية والاروبية . تتميز بقوتها
 الراسية الفارقة التي تبلى كقرنين صغرين . انواعها متباينة
 الألوان و ظهورها الى الربة الحمراء المواج يطولها تيجين
 اسمر . بطونها الى الكهية البغراء . رؤوسها واعناقها موشحة
 بالاصفر || قوتها الحشرات والبرور البرية .

٢٢٩٣٢ - قولاان
 Koulan
 هو فراد الهند ، نوع من جنس الوش ، اطلبه .

٢٢٩٣٣ - قوتيد زعفراني *
 Colias croceus (S).
 Coliade safran, le Souci (F).
 Colias croceus (E).
 حشرة من فصيلة الكرنبيات حشرغيات الاجنحة . موطنها
 المناطق المعتدلة الحارة من العالم القديم . فراشها واثمة
 قوتها مشر الزهار . سرقها تعيش على اوراق فصيلة
 القرنيات القراشية || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٩ م .
 يسقطها نحو ٤٨ م . رأسها اسمر اللون . عيناها كبيرتان .
 زباناها صولجانان . جنيشها برتقالي الحلقة الصدرية
 الاولي ، اريد الثانية والثالثة . بطها احمر اللون ، اسمر
 المواج عند الذكر ، العسة عند الانثى || رؤشها الاماميان
 الى الصفار . الزعفراني تملوه نقطة سوداء وجدة كستنية عند
 الذكر ، سوداء اللون عند الانثى . رؤشها الخلفيان الى
 الصفار الزعفراني متوسطه بقية حراء يطولها اطراف اسمر
 عند الذكر ، اسمر عند الانثى || لها جيلان في الحول .
 تظهر فراشة الجبل الاول في نيسان وتظهر فراشة الجبل
 الثاني في آب . تسرح في النهار . تتألف اربعة ظهورها
 بستة اسابيع وتضع المكن مهادما على نصال الاوراق ||
 البرقة تطول نحو ٤٢ م . جسمها اسطواني الشكل . قوتها
 الى الخضار الاصفر يطولها خطان جانبيان اخيران قاطبان
 وعشرة اطواق كستنية وتغطي متباد اسود واصفر . رأسها
 اسود . مدنها ورواجها الى السمرة || طول الاكمال الذي
 يستمر في الجبل الاول نحو ثلاثة اسابيع ، يستمر في
 الجبل الثاني نحو ٢٢ اسبوعا .

٢٢٩٣٤ - قوتس العظم الثاني بين اذني الغرس .

٢٢٩٣٥ - قويسة ، قويسة ، قويسة *
 Salvia (S).
 Salvia (S).
 Salvia (S).
 جنس نباتات برية وريزية من فصيلة الشفويات . انواعه
 نحو ٥٠٠ منظمها بجلي وببعضها جنبي . منها الحولي
 والحول والمعمر . سوتها خشبية فحراء سريعة الانقاص
 اوراقها متقابلة معتقة . ازهارها متباينة الاشكال والاحجام
 والالوان . لانيامية التجميع والارتكاز || اشرف واشهر
 انواعها البرية والعلية والريزية ما يتبع .

نحو ٨ م . وتعرض نحو ٥ م . رؤسها الزهرية صغيرة
 اللد تقطرها نحو ٢ م . لسنتها متساوية الطول والرش .
 ضروره عديدة منها الاصفر والابيض . واللحي والبحري .

٢٢٩٣٦ - قوتش
 Milvgo (S).
 جنس طير من فصيلة الشيوريات رتبة الجوارح جسمه
 ربع اللد ، طوله نحو ٤٠ م . رأسه مستطيل الشكل .
 سقله ضيق مستطيل رقبته كذلك وهو سرورل الفرغ ،
 دقيق الخبط || موطنه البلاد الاسيوية والامريكية .
 اشهر انواعه قوتش شيشيا .

٢٢٩٣٧ - قوتش شيمشيم
 Milvgo chimachima (S).
 Chimachima (F).
 طائر من القوتش ، طوله نحو ٤٠ م . ثوبه الى الصمبة
 الداكنة . قوائم سقله موشحة بالابيض . مشره ازرق
 اللون . رجلاه الى الخضار البحري . غاليه دقيقة || موطنه
 امريكة الجنوبية يكثر في البرازيل والشيلى يعيش منفردا
 الا في زمن الترمع والحضانة || قوته الجيف والزحافات
 والانامي والحشرات على اختلاف اجناسها . اثناء تحضن
 من ٥ الى ٦ بيضات .

٢٢٩٣٨ - قوتع
 Helix (S).
 Escargot (F).
 هو الحلزون ، اطلبه .

٢٢٩٣٩ - قوتع
 Cantharellus (S).
 Chantarelle (F).
 جنس فطور من فصيلة الفاريقونيات . انواعه قليلة تتميز
 بطاريسها الخارجية الخامة المنتظمة التي تكثف كامل
 المسقلان || اشرف انواعه واشهرها الاصفر والبرتقالي .

٢٢٩٤٠ - قوتع اصفر *
 Cantharellus cibarius (S).
 Chantarelle comestible.
 Girolle, G. comestible (F).
 فطر مأكول كبير اللد ، يربي الشكل ، عني الصفار ،
 ثخين الصفحة . يتباد الاطراس .

٢٢٩٤١ - قوتع برتقالي *
 Cantharellus coronilla (S).
 Chantarelle orangée.
 Girolle orangée, Fausse girolle (F).
 فطر مأكول يكثر ساقا في بعض الاحيان . مسقلانه
 لتل تجويفا من مسقلان القيقع الاصفر ، لوله الى البرتقالي .
 اطراسه متقاربة الارتكاز حادة الاطراف .

٢٢٩٤٢ - قوتل
 Tetrsgallus (S).
 Tétragalle, T. du Caucase, T. Caspien (F).
 Tetrsgallus (E).
 طائر وحيد الجلس والترح من عارة الحجلليات وفصيلة
 البشيريات . كبير الجفة طوله نحو ٦٠ م . ثوبه الى
 الطحلة الزبداء المشوطة بالاسود والاصهب . متقار احدب
 اسين . عنقه مطوق الزور ، قوائمه ييش القواعد سود
 الاطراف ، اتيكه كتيث ابريش المستطيل اللبضع بالصمبة
 والسود . رصه وغاليه الى الربة || موطنه الجبال الربية
 المنقلية الاخبار . قوته الاحشاب والحروب والسائل والجفور .
 اثناء تبيض من ١٢ الى ١٦ بيضة تحضنها وحدها .

٢٢٩٤٣ - قوتبي
 Narval (F).
 هو حريش البسر ، اطلبه .



قوتع اصفر



قوتع برتقالي



قوتيس



قوتد زعفراني

وفروعها خالية زباد. اورثاقها بيضية الشكل، نصلها مذهب الطرف سنن الحافة. ازهارها كبيرة القند مستطيلة لونها الى الحمره المائقة. توضعها تربر حل اكمامها نحو ست مرات || ازهارها يستمر طوال الصيف .



قُوْسَةُ الْجَبَل

٢٢٩٤٣ - قُوْسَةُ سَمَاجُودِيَّة *
Salvia azurea (S).
Sauge azurée (F).
جنية تريينية سروتيّة معمرة تملو من ١٠٥ الى ٢٠٠ سم. ساقها فروع خالية القلم. اورثاقها سائبة مضطوية، نصلها سنن الحافة اخضر اللون يطول من ٦ الى ٨ سم. ازهارها سبيلية التجميع، كبيرة، القند سمنجونية اللون. اكمامها لا قياسه الشكل والقند لونها الى الخضار المشرب الزرقاء || ازهارها يستمر من تموز الى تشرين الاول.

٢٢٩٤٤ - قُوْسَةُ صِينِيَّة *
Salvia flava (S).
Sauge chinoise (F).
بجلة بريّة معمرة فروعها تملو من ٢٠ الى ٥٠ سم. اطرافها الصين. ازهارها خضفونية التجميع، متشعبة، كبيرة القند، تطول من ٦ الى ٧ سم. اكمامها الى الاصفر الكبريتي يطلو توضيح ابرجواني || ازهارها يستمر من ايار الى ايلول.



قُوْسَةُ الرّوج

٢٢٩٤٥ - قُوْسَةُ ضَمِيَّة *
Salvia verticillata (S).
Sauge verticillée (F). Whorled blue flowered sage (E).
Quiralsalvei (D). Salvia verticillata (I).
بجلة تريينية معمرة. ساقها فروع تملو من ٣٠ الى ٧٠ سم. اورثاقها قليلة الشكل نصلها جامد الصفحة الحشنة الزباد. ازهارها سبيلي التجميع. ازهارها سائبة متناقطة مستطيلة القند زرقاء اللون || ازهارها يستمر طوال الصيف .

٢٢٩٤٦ - قُوْسَةُ حَيْقَةِ الْوَرَق

Salvia angustifolia (S). Sauge à feuilles étroites (F).
جنية تريينية سروتيّة معمرة . ساقها فروع تملو من ٥٠ الى ١٠٠ سم. اورثاقها ضيقة النصل مدبة الاطراف تطول من ٤ الى ٨ سم. وتعرض من ٢ الى ٤ ازهارها سبيلية التجميع ، زرقاء اللون ، صغيرة القند || ازهارها يستمر من حزيران الى تشرين الاول .



قُوْسَةُ ضَمِيَّة

٢٢٩٤٧ - قُوْسَةُ فِصْبِيَّة *
Salvia argentea (S).
Sauge argentée (F).
جنية تريينية بجلة . ساقها فروع مزينة القلم تملو من ٦٠ الى ١٢٠ سم. اورثاقها كبيرة القند نصلها خالي البشرة على صفحيه يطلو كأنه مطلي بالفضة. ازهارها متوسطة الحجم تطول نحو ٤ سم. لونها الى البياض العاجي يطلو مزيج وردي . اكمامها غدية دقة || ازهارها يستمر من ايار الى تموز .

٢٢٩٤٨ - قُوْسَةُ قَاسِيَّة * وَ كَتَبُ الدَّب

Salvia sclarea (S). Sauge sclérée, Sclérée, Toute-bonne, Orvaie (F). Clary (E). Muskatalsalvei (D).
Salvia sclarea, Matrisalvia, Tuttasana (I).
جنية بريّة مبدولة معمرة مسكية العرف القفاح . ساقها فروع تملو من ٤٠ الى ١٢٠ سم. اورثاقها بسيطة بيضية الشكل، نصلها يطول من ٧ الى ١٨ سم. ويخرج البشرة على صفحيه. ازهارها وردية اللون، ليكية المويج . اكمامها سلتة شاذكة قليلة الخمل || ازهارها يستمر من ايار الى ايلول .



قُوْسَةُ قَاسِيَّة

٢٢٩٤٩ - قُوْسَةُ كَثِيرَةِ الزَّهَر *
Salvia patens (S). Sauge à grandes fleurs (F).
جنية تريينية معمرة . تملو من ٥٠ الى ٨٠ سم. ساقها

٢٢٩٣٦ - قُوْسَةُ الْجَبَل *
Salvia sylvestris (S).
Sauge de montagne (F). Wild sage, Wood sage (E).
Waldsalvei, Wilde Salvei (D). Salvia montana, S. salvatica (I).

بجلة بريّة طيبة مبدولة معمرة . ساقها زباد فروع تملو من ١٥ الى ٤٠ سم. اورثاقها اطيالية ضيقة ، نصلها جامد الصفحة السلتة الخملية البشرة . ازهارها خضفونية التجميع زرقاء اللون بتسفيج المويج || تكثر في الاراضي الجبلية المخضات منهاها الصيحة المعوية صديدة ويقال انها تستعمل في علاجات القالج .

٢٢٩٣٧ - قُوْسَةُ الْمَرْوَج *
Salvia pratensis (S).
Sauge des prés (F).

جنية بريّة مبدولة معمرة . ساقها فروع زباد دقة تملو من ٥٠ الى ٩٠ سم. اورثاقها بيضية الشكل، قليلة القفاحة. نصلها متسج الصفحة، سنن الحافة يطول من ١٢ الى ١٧ سم. ازهارها خضفونية التجميع ، زرقاء اللون ، بتسفيج المويج ، متوسطة القند || ازهارها يحصل على دفتين الاول من ايار الى حزيران والثانية طوال الحريف .

٢٢٩٣٨ - قُوْسَةُ بَهِيَّة *
Salvia splendens (S).
Sauge éclatante (F).

جنية تريينية معمرة ترعب في الموانع القليلة الرطبة . ساقها فروع تملو من ٥٠ الى ١٧٥ سم. اورثاقها بيضية مدبة نصلها رمل التسج القاتم ، سنن الحافة ، مائل البشرة على صفحيه. ازهارها سبيلية التجميع ، ياقوتية اللون تطول من ٧ الى ٧ سم. || ازهارها يحصل على دفتين الاول في الصيف والثانية في الشتاء .

٢٢٩٣٩ - قُوْسَةُ ثَنَائِيَّةِ الْوَرَق

Salvia bicolor (S). Sauge bicolorée (F).
جنية تريينية معمرة فروعها تملو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم. اورثاقها مفردة ، مزينة ، دقة . ازهارها ثنائية اللون . اقتسامها العليا الى الزرة البنفسجية المنسقة بالاصفر اللدخي، اقتسامها السفلى الى البياض السوي . اكمامها متوسطة القند ، غدية النصل . خضفودا الزهري يطول من ٥٠ الى ٦٠ سم. || ازهارها يستمر من ايار الى تموز .

٢٢٩٤٠ - قُوْسَةُ حَبِيصِيَّة وَ الْيُقُوس

Salvia aethiopis (S). Sauge d'Ethiopie, Ethiopienne. (F). Ethiopian sage (E). Ungarische Salvei (D).
Salvia di Candia, S. lanata (I).

جنية بريّة طيبة معمرة . ساقها فروع زباد تملو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. وهي كثيفة الخمل والزغب الصوفي الشكل . اورثاقها متوسطة الطول . نصلها خالي الصفحة . ازهارها صلبة القند بيضاء اللون . اكمامها مزينة عادمة التثنيق . توضعها يطول نحو ٢ سم. || ازهارها يستمر من حزيران الى تموز .

٢٢٩٤١ - قُوْسَةُ دَقِيْقِيَّة *
Salvia glutinosa (S).
Sauge glutineuse (F).

جنية مبدولة معمرة تكثر في الجبال . ساقها فروع تملو نحو ١٠٠ سم. اورثاقها السفلى كبيرة القند تطول من ١٨ الى ٢٠ سم. نصلها غدي الصفحة . ازهارها تطول نحو ٤ سم. لونها الى الصفرة الجملية . اكمامها انبوبية الشكل غدية البشرة || ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول .

٢٢٩٤٢ - قُوْسَةُ رُضِيْقِيَّة *
Salvia elegans (S).
Sauge élégante (F).

جنية تريينية معمرة تملو من ٦٠ الى ١٢٠ سم. ساقها

٢٢٩٥٧ - **قياس ، تقييس ، إلتفاح** Grasserie
مرض يصيب دودة القز في طورها النهائي أي قبل الصمود
على الشجر فينتفخ جسمها ويصفر لونها ويصبح جلدها
شفافاً يفرز مائلاً غروباً يلوث الورق فتضخم أجسامها
الداخلية وتموت . ويمكن لديد المصاب بهذا المرض أن
ينسج سلجته ويتحول فيها إلى خادرة ولكنه لا يلبث أن
يموت فيصبح مادة فاسدة مائلة تعطب الفيلجة .

٢٢٩٥٨ - **قياس** Jockey
هو الجوكي ، اطلبه .

٢٢٩٥٩ - **قياس** Mesure

٢٢٩٦٠ - **قياس الإرتفاع ، تقييد** Nivellement (F). Levelling (E).
تعيين الارتفاع النسبي لثلاث أجزاء الشيء .

٢٢٩٦١ - **قياس الأشعة** Actinométrie (F).
Actinometry (E). هو قياس قوة الاشعة .

٢٢٩٦٢ - **قياس التحليل** Acétmétrie (F).
Acetmetry (E). قياس درجة تحليل الخل أي حوضته .

٢٢٩٦٣ - **قياس الحموضة** Acidimétrie (F).
Acidimetry (E). قياس الحوامض مجردة عن مائها .

٢٢٩٦٤ - **قياس الرطوبة ، رزاحة** Hygrométrie (F).
Hygrometry (E). قياس كمية بخار الماء في الجو .

٢٢٩٦٥ - **قياس السكر** Saccharimétrie (F).
Saccharimetry (E). طريقة تعيين مقدار السكر في السوائل والمعادن السكرية

٢٢٩٦٦ - **قياس القلي** Alcalimétrie (F).
Alkalmetry (E). معرفة مقدار القلي الحقيقي في البوتاس وفيه .

٢٢٩٦٧ - **قياس الكحول** Alcoolométrie (F).
Alcoholometry (E). بحسوبة الاساليب أو الطرائق المتصلة لتحديد مقادير
الكحول الموجودة في السوائل أو المشروبات الروحية .

٢٢٩٦٨ - **قياس أملاح الماء** Hydrotimétrie (F).
Hydrotimetry (E). قياس مقدار الأملاح الجسية الموجودة في الماء .

٢٢٩٦٩ - **قياس** Mensuration (F).
Measurement (E). وسيلة استقصاء تستعمل في الطب وفي علم الطابع والجوهران
لتحديد بعض القياسات وتقدير مواقع وأحجام بعض
الأعضاء .

٢٢٩٧٠ - **قياسي ، تناسلي** Symétrique (F).
Symmetrical (E). نعت تعريفي يطلق على ما كان منقسم التركيب بنسبه .

٢٢٩٧١ - **قياسية الشكل** Actinomorphe (F).

فروع زياء . أوراقها ريمية الشكل ، نصلها خشن الملس
متنعج الحمار . أزهارها كبيرة القذ زرقاء اللون . أكامها
تطول نحو ٢ سم . وهي خلية البشرة || أزهارها يستمر
من آب الى تشرين .

٢٢٩٥٠ - **قُوْسَة كَرْدِيْنَالِيَّة**
Salvia cardinalis, S. fulgens (S). Sauge cardinale (F).
جنية ترينيتية معمرة . ساقها منتصبة فروعها تملو من ١٠٠
الى ١٢٠ سم . أوراقها بيضيه الشكل قلبية القاعدة تطول
نحو ١٢ سم . نصلها جامد الصفحة خلي البشرة الخسل
مدبب الطرف . أزهارها كبيرة القذ ارجوانية اللون سلبية
التجميع تتعاقب على ابعاد متساوية قدرها نحو ٣ سم .
أزهارها يستمر من ايار الى تشرين الاول .

٢٢٩٥١ - **قُوْسَة متقابلية الأزهار** Salvia oppositiflora (S). Sauge à fleurs opposées (F).
جنية برية وترينيتية معمرة تملو من ٣٠ الى ٨٠ سم .
أوراقها بيضيه مغنوية تطول من ٢٠ الى ٥٠ سم . وتعرض
من ١٥ الى ٤٠ سم . نصلها غند الصفحة ، يارز المروق .
أزهارها بتقابلية التجميع ، متقبالة ، بتقبالية اللون .
أزهارها يستمر طوال الخريف .

٢٢٩٥٢ - **قُوْسَة مغنرية ، مَرْمِيَّة ،**
أستاس Salvia officinalis (S).

Sauge officinale, Herbe sacrée, Thé de France, Thé
de Grèce (F). Common sage, Garden sage (E).
Echto Salbei, Garten Salbei, Salbey (D). Salvia offi-
cinalis, S. grande, S. cultivata (I).
جنية برية طيبة مفضولة معمرة . ساقها فروع زياء تملو من
٢٠ الى ٧٠ سم . أوراقها كاملة ، اعليجية ، اذنيقة للقاعدة .
نصلها خلي البشرة على صفحتيه . أزهارها بتضسية اللون
تطول نحو ٣ سم . أكامها ملونة خلية || أزهارها يستمر
من حزيران الى تموز . وهي تستعمل استهلاك الشاي . منافها
الصحية عديدة .

٢٢٩٥٣ - **قُوْسَة مشدودة** Salvia hians (S).
Sauge béante (F).

جنية برية جليلة معمرة . ساقها فروع غنية لزجة تملو
من ٦٠ الى ٩٠ سم . أوراقها لا قياسية الشكل منها البيضية
والقلبية والرمحية ، جميعها مستطيلة الاذنات المثلثية التي يبلغ
طولها نحو ٢٥ سم . نصلها تطول من ١٣ الى ١٥ سم .
وهي سبعة الحانة خلية البشرة . أزهارها الى الزرق الزاهية ،
توجهها بطول نحو ٤ سم . قسما العلوي منصف الى الخارج
يضم كانه مشقوق الشفة || أزهارها يستمر من تموز
الى آب .

٢٢٩٥٤ - **قُوْسَة مهيبة**
هي المردكوش الآخر ، اطلبه .

٢٢٩٥٥ - **قُوْسَة يابانية** Salvia nipponica (S).

Sauge japonaise (F).
بجلة بروقية فروعها تملو من ٢٠ الى ٣٠ سم . أظانها
اليابان . ساقها وفروصها زياء الفراء . أوراقها صغيرة القذ
خلية النصل . أزهارها اسمية الانكاز ، صفودية التجميع ،
مستطيلة الشكل ، صفراء اللون . أكامها رطلة نفضاعة
خلية البشرة || أزهارها يستمر من حزيران الى ايلول .

٢٢٩٥٦ - **قُوْسَة ، قُوْسَة** Sauge (F).
هي القوسية . راجعها .



قُوْسَة مغنرية

وترتفع قدر الذراع ونورها كنورة البنفسج يستوقد بعضها
وطية . الواحدة قيسة (السان) .

٢٢٩٨٤ - **قَيْسُون** * **قَيْصُومُ الْاَنْثَى** ، **عَيْبَة**
مُقَدَّسَة

Santolina Chamaecyparissus (S). *Santoline*, *Petit cyprès*, *Aurone femelle*, *Gardo-robe* (F). *Lavender cotton*, *Ground cypress* (E). *Zyprassenheiligenpflanze*, *Zyprassenkraut* (D). *Santolina*, *Abrotano femina*, *Crespolina* (I).

نبات جنوبي عطري بري معمّر من فصيلة المركبات *
ساقه فرها تملو من ٦٥ الى ١٢٠ سم . أوراقه صغيرة
القد ، ضيقة النصل للسّن المزنب البشرة . رؤسائه
الزهرية فردية التجميع صغيرة القد صفراء اللون || أزهاره
يتمسح من تموز الى ايلول .

٢٢٩٨٥ - **قَيْصَانَة**
Lampris
جنس اسماك بحرية من فصيلة الاسقمريات . لونها عذبة
جميعها كبيرة القد ، بيضية الشكل ، صغيرة القم والظم ،
عذبة الاسنان ، زرقاء القوب ، وردية المواج ، فصيحة التفتيح .
زماقتها الى الحمرة الفاتحة || اسماها بحار البلاد المحتلة
الحرارة . اشهرها قيصانة البدر .

٢٢٩٨٦ - **قَيْصَانَة الْبَدَر** *
Lampris luna (S). *Lampris lune*, *Poisson lune*, *Chrysotosse* (F). *Moon-fish*, *Opah* (E).

نوع من القيصانة وهي سمكة بحرية حرّرة الوجد
المتوسط طولها نحو ١٠٠ سم . ثوبا الى الزرقاء الوردية
المواج . جانيها مبيحان بالقصّة .

٢٢٩٨٧ - **قَيْصَل** *
Pinna (S). *Pinne* (F). *Pinna* (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم
وصفيلة الميديات . انواعه المبرقة متوسطة القد ، بعضها
من سمجرات الاراضي الجوفية والياشيرية والبعض الآخر
متشتر في مطر بحار البلاد الحارة والعلقة الحرارة ||
اصداها كبيرة تطول من ٥٥ الى ٧٠ سم . وهي غروبية
الشكل متساوية المصاريح البانقة التخديط العلوي تملوها
زركمة وزعارف وخطوط متفرقة متباينة الالوان . داخلها
لؤلؤي والمادة وكثيرا ما يوجد في جوفها لؤلؤ وردية
اللون فاعرة الصفّ ثميّة . ثلثها غزير المادة يستعمل
في صناعة التفازات والجوارب وغيرها ، لونه الى الغبار
المذهب ، تسجيح لأم الخط متينه || تعيش لاسعة
بالصفور على اعماق قراوح من ٤ الى ١٢ م . ملجئها
الحياثي جاهي . مجموعاتها كحد من ٥٥ زوجا الى اكثر
من مئتين .

٢٢٩٨٨ - **قَيْصُوم**
Verge du taureau (F). *Penis of a bull* (E).

قصب الثور .
٢٢٩٨٩ - **قَيْصُوم** * **أَبْرُوطُونُون** ، **زَيْحَان**
الْاَرْض ، **سَكَّ الْجَيْن**

Artemisia abrotanum, *Abrotanum* (S). *Aurone*, *Citronella* (F). *Abrotanum*, *Southern wood*, *Old man* (E). *Eberautra*, *Citronkraut* (D). *Abrotano*, *Citronella* (I).

جنيبة عطرية طيبة برية معمّرة من فصيلة المركبات الاثيوبية
الزهر . عرفها فواح مستحب . انماها ابطية الارتكار
عذوقية التجميع ذفينة اللون طرية العرف . انماها

٢٢٩٧٢ - **قَيْصَانَة** ، **قَيْصِي** ، **مَقْبَانَة**

Troc (F). *Truck* (E).
هي الاستماعة ، من الاعمال الاقتصادية التجارية . تركّز
حل مبادلة غني . بشي .

٢٢٩٧٣ - **قَيْطَا**
القيطان من الزرع ما زرع في الحريف قبل المطر .

٢٢٩٧٤ - **قَيْصَانَة** *
Bathymétrie (F). *Bathymetry* (E).

٢٢٩٧٥ - **قَيْصَانَة**
Morphologie (F). *Morphology* (E).

القائفة علم هيئة الاجسام الحية وتركيبها . وقد ترجموا
بكلمة مرفولوجية .

٢٢٩٧٦ - **قَيْصَانَة**
Despotisme (F). *Despotism* (E).

القائلة الحكم المطلق المستبد الناخذ الازادة .

٢٢٩٧٧ - **قَيْصَارَكَة** ، **سَيْطَانِي** ، **سَلْحَبَانَة**
Lyre, Tortue, Testudo (F). *Lyra, Testudo* (E).

التجارة والسلياق والسلفانة ثلاث اسماء لكوكبة نجوم
شالية المجر . مركزها بين الدجاجة والجالبي . وقد تسموا
بالسلفانة نظرا لشدّة بطله حركتها || عدد نجميها ٢١
منها « النسر الواقع » الذي يعتبر من الحرّية الاولى وقد
شبهته العرب بنسر ضم جناحيه الى نفسه كأنه واقع على
شبه . وقدام النسر الواقع نجم صغير تسميه العرب « الاطمار »
علم الفلك يقولون « ان النظام الشمسي يتجلب ببطء نحو
النسر الواقع » .

٢٢٩٧٨ - **قَيْصِد** ، **تَقْصِيد**
Inscription (F). *Inscription, Registry* (E).

٢٢٩٧٩ - **قَيْسِر**
Polx (F).
هو القطارن ، اطله .

٢٢٩٨٠ - **قَيْسِرَاط**
Carat
سمة توازي واحداً من اربعة وعشرين . وهو في بعض
الاعداد الثنية اصغرها الذهب يبر من مقدار الذهب
الصف . فالذهب ميار ٢٤ هو الذهب الخالص من كل
جرم غريب والذهب ميار ١٨ مثلاً هو ما شغل ١٨ جزءاً
من الذهب الخالص ويشت اجزاء من ثلث الذهب || والقيراط
يساري في وزن الحجارة الكريمة كاللؤلؤ ما قدره :

في فرنسة ٥,٢٠٥٩ غرام
في انكلترا والمانيا ٥,٢٠٥٥ غرام
في البرازيل ٥,١٩٢٢ غرام

٢٢٩٨١ - **قَيْسِرَاط**
Quint

هو نصف دانق . كان وزن حبة غروب . والقديم
الكتا حشرة حية . وهو في الحجاز ربع مسد دينار وفي
البراق نصف حشره || ومنه استعماله في المساحة هي عرض
الاصبع || وقد جعلوه دستوراً في الحساب فقسوا المتجزئات
الى اربعة وعشرين قيراطاً .

٢٢٩٨٢ - **قَيْصَانَة**
Muscul botryoides (F).

هي الخليل الجليل ، اطله .

٢٢٩٨٣ - **قَيْصَب**
نجر من الخمس . وهو شميرة تثبت خيطها من اصل واحد



قيسون



قيصانة البدر



قيسل



قيصوم

المائية . بلايصها عادة الحاطط القرنية والاسنان الشفوية .
لكنها مزودة بلواس مستطيلة تملو زوايا الانشقاق ||
سها انواع تميش وتتكاثر في الاكوايروم ، اعصها قيطم
لفيس (Xenopus laevis) .

٢٢٩٩٨ - قَيْصُوم هو السنور .

٢٢٩٩٩ - قَيْصُوم Cheilanthes (S). Chélanthe (F).
جنس سراسخ من البسباجيات . انواحه نحو ٣٠ اعطائها
مختلف مناطق العالم اعصها الاستوائية والحارة .

٢٣٠٠٠ - قَيْقَبُكَثُش Céphalantho (F).
هو الرأسية ، اطلبا .

٢٣٠٠١ - قَيْصُوسُ Cephé (F). Cephus (E).
كوكبة نجوم شمالية الموقع . مركزها بين الدجاجة والتنين
وذات الكرسى . عدد نجومها ٢١ || والعرب تسمي النجم
الذي على الصدر « النثرة » والذي على الكتف الايمن
« القردة » . ولذا تارة التي تحصل من نجوم ذراعها وما هو
خارج ضبا « القدر » . والذي على الرجل اليسرى يدعى
« الراعي » . والنجوم الصغار الموجودة بين الرجلين تدعى
« الاغنام » .

٢٣٠٠٢ - قَيْصُوم Physionomie (F).
Physiognomy (E).
هي مجموعة التعاطيف والملامح والسمات القارة التي تميز بين
شيء وبشيء .

٢٣٠٠٣ - قَيْصُوم نبتة ذات ثمرة في قرون وهي ذات ورق وغصنة تثبت بكل
مكان (السان) .

٢٣٠٠٤ - قَيْقَبُ * ، زُرَيْبَانُ Garrulus lanceolatus (S). Gari lanceolé (F). Jay (E).
طائر من الزربان وفصيلة الزربانيات . يألف القفص
فيقتبس الاصوات ويردها || وهو طائر مؤذ غار .
شكله كالبومة ، جسمه يطول نحو ٣٠ سم . اصدا الثوب .
اسود الرأس . ازرق الزنكي . مجزع الجناحين والذنب
بخطوط متراكبة السوداء والزرق والبياض || قوته الحبوب
والأثار اللبانة ويختلف انواع العصافير الصغيرة ويصها
وفراخها والمظا والحشرات الكبيرة والصغيرة || يدن في
الاشجار الحرجية اللظلية ، اثناء تسع من ٤ الى ٦ بيضات
تحضنها ١٦ يوما .

٢٣٠٠٥ - قَيْقَب هو القوقاك ، اطلبا .

٢٣٠٠٦ - قَيْقَبُ * ، اُسْتَنْدَانُ Acer (S).
Erable (F). Maple-tree (E).
جنس اشجار حرجية ورزينة من فصيلة القيقبيات . انواعه
نحو ١٨٠ منها الكبيرة القد والصغيرة . جميعها حسنة
المحيط والقالب . سكرية العصارة . اوراقها متعاقبة ||
لاقياسة الشكل ، مسطها حایل وبضها ابيد . ازوارها
مختلفة التجميع والالوان ، غزيرة الرقيق ، يحرمها النحل .
ثمراها جناسية مركبة من جناسيتين ملتصقتين || اعرف
انواعه اشد حادته

يدوم من تموز الى آب . ثمارها لينة صغيرة تشبه حب
الآس ، طعمها مر ، رائحتها ذكية . يقال انها مضادة
لحميات وثالثة تخفف اوجاع الصدر وضيق النفس
والمغاسل . ومن قال انها من القويبات وقد تستعمل
ايضا كطيارة للديدان || اما اسم مسك الجبن فينطلق
على عدة نباتات اعصها القيصوم والشفروور والزريرج والورام
وشيشة الريح .

٢٢٩٩٠ - قَيْصُوم اُنْقَى Santoline (F).
هو القيسون ، اطلبا .

٢٢٩٩١ - قَيْصُوم جَمْبَكِي Achillée suave (F).
هو الاخياليا المنشقة ، اطلبا .

٢٢٩٩٢ - قَيْصُوم طَبِي Armoise santonique (F).
هو الشيج التراساني ، اطلبا .

٢٢٩٩٣ - قَيْصُوم كَانُورِي * ، مُسِيكَة Artemisia camphorata (S). Armoise camphrée, A. dorée (F). Gold wormwood, Rock wormwood (E). Wermut (D). Assenzio salvatico (I).
نبات حشيش طهي بري من المركبات الانبوية الزهر .
ساقه فراء تملو من ٣٠ الى ٦٠ سم . اوراقه مضطعة صغيرة
القد ، غليظة النصل . رويساته الزهرية خلية القناب ،
ذخية اللون ، عشقودية التجميع ، كاقورية العرف المستحب .
ازهاره يستمر من تموز الى آب .

٢٢٩٩٤ - قَيْصُوم Coquille d'oeuf (F). Egg-shell (E).
القشرة العليا اي الخارجية البايمة على البيضة اما القشرة
الداعلية فتسمى الغرق .

٢٢٩٩٥ - قَيْطَلِيَا Noisetier de Turquie (F).
هي البندق التركي ، اطلبا .

٢٢٩٩٦ - قَيْطَسُ ، قَيْطُوسُ Baleine (F).
Cetus (E).

كوكبة نجوم جنوبية تشرق على خط الاستواء وتمتد
جنوبي برج الحمل وبرج الحوت . وهي على صورة حيوان
بحري مقدمه في ناحية المشرق ويؤخره في ناحية المغرب ||
عدد نجومها ١٠٢ || والعرب تسمي الكواكب التي في الرأس
« الكف والجذء » ونها تير يدعى « المنقب » . وتسمى
الحسة التي في اواسط البدن « الثمامات » . والتي على اصل
الذنب « النقام » . والتي على الشمة الجنوبية من الذنب
« القفص الثاني » . والتي على الشبة الشمالية « ذنب قيطس
الثاني » . وفي حق قيطس نجم يدعى « الصابرية » . او
« امجوبة قيطس » لان جسمه يتحول في اثناء مداره من
المرية الثانية الى الثامنة ولان لونه يتحول ايضا من الاحمر
الى الاصفر .

٢٢٩٩٧ - قَيْطَمُ * Xenopus (S).
Dactylète (F). Xenopus (E).

جنس شفادع من فصيلة اللياليات عاداته السان .
انواحه المعروفة قليلة العدد مهددا بعض المياه الافريقية
اعصها مياه المناطق الاستوائية || اجسامها صغيرة تطول
٧ الى ١٠ سم . رؤوسها مستطيلة . عيونها عادية
الاجفان . كوكبها العليا عادية الانسان . اصابع قوائمها
الامامية عادية الخطاب اما الخلفية فكاملة الخطاب والثلاث
الداعلية منها مفردة الاطراف باغداد قرنية المادة تهر
كأغالب || انشأه ٢٠٠٠ حصلة لتعلمنا المناشآت



قَيْصُوم كَانُورِي



قَيْطَم



قَيْقَب

صفحة ثلاثية العروق ، بحرية اللون ، زيتية الملمح .
أزهارها خضراء اللون . تنور في شهر شباط .

٢٣٠١٣ - قَيْبٌ تَرَيَّي - *Acer tataricum* (S). *Erable de Tartarie* (F).

شجرة حرجية سبروتية تملو نحو ٨ أمتار. مدها آسية الصغرى ، أوراقها عابلة منقطة . نصلها بيضي الشكل ، قلبى الناعمة ، مدب الطرف ، سنن الحافة ، ازغب الصفحة السفلى ، باهت الخضار . أزهارها علقية التجميع ، خاسية البتلات الأبيض جناسياتها متوازية المشافر . تنور في أيار .



قَيْبٌ حَبَرِي

٢٣٠١٤ - قَيْبٌ ثَلَاثِي الْأَجْزَاءِ - *Acer trifidum* (S). *Erable trifide* (F).

شجرة حرجية وريديية جادة تملو نحو ٨ أمتار. مدها اليابان . أوراقها عابلة منقطة ثلاثية التفتصيص . نصلها اسفيني الشكل لامع الصفحة الخضراء . أزهارها علقية التجميع ، فسفتية اللون ، جناسياتها متصالبة المشافر . تنور في أيار .

٢٣٠١٥ - قَيْبٌ جَمِيْزِي * - *Acer pseudoplatanus* (S). *Erable sycamore*, *Faux platane*, *Grand érable* (F). *Great maple*, *Sycamore maple*, *Mock-plane* (E). *Bergahorn*, *Falscher platane* (D). *Acer ilicic*, *A. sicomora*, *A. fico*, *Mollacaro* (I).

شجرة حرجية جبيلة مبدولة تملو من ١٥ إلى ٤٠ م. أوراقها عابلة منقطة، ثلاثية أو خاسية التفتصيص، تقوّل وتقرض من ١٠ م. نصلها مالم البشرة على صفحته وهو أخضر العليا بحري للسل يتشع ثم يحمر في الخريف أزهارها علقية التجميع متدلية. جناسياتها متبادعة المشافر، حادة الزوايا . تنور من نيسان إلى أيار .



قَيْبٌ مَقْلِي

٢٣٠١٦ - قَيْبٌ حَكَلِي * - *Acer campestre* (S). *Erable champêtre*, *Auzerole* (F). *Bird's tongue*, *Dog oak*, *Maple tree*, *Master tree* (E). *Angerbinbaum*, *Feldsborn*, *Maszholder* (D). *Acero campestre*, *Averliello*, *Cepollo* (I).

شجرة سبروتية مبدولة تملو من ١٥ إلى ٢٠ م. مالمها غلمة القحاء . أوراقها عابلة منقطة صغيرة اللد ، ثلاثية أو خاسية التفتصيص . نصلها جامد الصفحة ، مبسر الحمل ، أخضر اللون . أزهارها علقية التجميع خضراء اللون . جناسياتها افقية المشافر . تنور من نيسان إلى أيار .

٢٣٠١٧ - قَيْبٌ دَرْبِي * - *Acer platanoides* (S). *Erable plane*, *E. platane*, *Plana* (F). *Norway maple* (E). *Spitzahorn*, *Norwegischer ahorn* (D). *Acero platano*, *Amilacero*, *Acero riccio* (I).

شجرة حرجية مبدولة تملو من ١٥ إلى ٣٠ م. اصطالح البلاد الباردة . ساقها ملاء ، صماتر لبية . أوراقها ثلاثية التفتصيص تقوّل من ٨ إلى ١٨ م. وتقرض من ٩ إلى ٢٥ م. نصلها مالم البشرة مدب الطرف . أزهارها علقية التجميع صفراء اللون . جناسياتها افقية المشافر . تنور من نيسان إلى أيار .



قَيْبٌ دَلْبِي

٢٣٠١٨ - قَيْبٌ رَاحِي - *Acer palmatum*, *A. polymorphum* (S). *Erable palmé* (F).

شجرة حرجية وريديية تنفر من الازربة الكلسية . مدها الصين واليابان . تملو من ٥ إلى ١٥ م. أوراقها عابلة ،

٢٣٠٠٧ - قَيْبٌ أَيْضٌ - *Acer saccharinum*, *A. dasycarpum* (S). *Erable blanc*, *E. tendre* (F). *Silver leaved maple*, *White maple* (E). *Silber-ahorn*, *Weissahorn* (D). *Acero bianco* (I).

شجرة سبروتية حرجية وريديية تملو من ١٥ إلى ٣٠ م. أوراقها عابلة منقطة ثلاثية أو خاسية التفتصيص . نصلها يعطو من ٦ إلى ١٥ م. ويرض من ٥ إلى ١٢ صفحته العليا باهت الخضار ، صفحته السفلى خلية البشرة ، خضراء اللون ، بيضاء الملمح . أزهارها علقية التجميع ، صفراء اللون ، عادمة البتلات . جناسياتها كبيرة اللد متفاربة المشافر طولها بأربع م. إلى ٧ م. تنور من شباط إلى نيسان .

٢٣٠٠٨ - قَيْبٌ أَحْمَرُ - *Acer rubrum* (S). *Erable rouge*, *E. femelle* (F). *Red flowered maple*, *Swamp maple* (E). *Rocer ahorn*, *Virginischer ahorn* (D). *Acero rosso* (I).

شجرة سبروتية حرجية وريديية، مدها أمريكية الشالية . تملو من ١٠ إلى ٢٥ م. أوراقها عابلة منقطة ثلاثية أو خاسية التفتصيص . نصلها يطوّل ويرض من ٥ إلى ١٥ م. صفحته العليا مالم البشرة ، زاهية الخضار ، صفحته السفلى خلية البشرة ، أزهارها علقية التجميع حراء اللون . جناسياتها حر الأهن ، متبادعة المشافر . تنور من آذار إلى نيسان .

٢٣٠٠٩ - قَيْبٌ أُرِيدُ - *Acer griseum* (S). *Erable gris* (F).

شجرة حرجية وريديية مدها الصين . تملو من ١٠ إلى ١٢ م. أوراقها مركبة ثلاثية الوريقات . نصلها بيضي الشكل ، ذرب الطرف يعطو من ٥ إلى ٦ م. وهو مسن الحافة ، خلي الصفحة السفلى . أزهارها متدلية ثلاثية أو خاسية التجميع ، مهدبة التوجعات والبتلات . جناسياتها خلية البشرة متبادعة المشافر ، تنور في أيار .

٢٣٠١٠ - قَيْبٌ الْيَابَانِي - *Acer japonicum* (S). *Erable du Japon* (F).

شجرة وريديية سبروتية مدها اليابان. تملو نحو ٤ أمتار. ساقها ملاء القحاء ، فروصها مستطيلة، مستتقة ، جوية اللون . أوراقها عابلة منقطة خاسية أو سباعية أو تساعية التفتصيص . نصلها مسن الحافة ، مالم البشرة ، أخضر اللون ، مذهب الملمح ، يحمر في الخريف . أزهارها علقية التجميع حراء اللون . جناسياتها متوازية المشافر . تنور في أيار .

٢٣٠١١ - قَيْبٌ أَمْرَطُ - *Acer glabrum* (S). *Erable glabre* (F).

شجرة حرجية جادة تملو من ٧ إلى ١٢ م. أوراقها عابلة منقطة ثلاثية التفتصيص ، عنها جوي اللون ، نصلها يعطو ويرض نحو ٧ م. صفته العليا لامة البشرة شديدة الخضار ، صفته السفلى خلية خضراء . أزهارها علقية التجميع ، جناسياتها متبادعة المشافر . تنور في أيار .

٢٣٠١٢ - قَيْبٌ إِيْلِيْجِي الْوَرَقِ - *Acer oblongum* (S). *Erable à feuilles oblongues* (F).

شجرة حرجية سبروتية تملو نحو ١٨ م. مدها الصين . أوراقها عابلة منقطة . نصلها حاد التفتصيص ، إيليجي الشكل يعطو من ١٥ إلى ٢٥ م. ويرض من ٥ إلى ٦ م.

ويرض من ٩ إلى ١٢ سم. وهو مسن الحافة، خلى الصفحة السفلى، يصفر ويحمر في الخريف. جناحياتها مستطيلة الاذن متوازية المشافر. تنور في نيسان.

٢٣٠٢٥ - قَيْبُ كَبِيرِ الْوَرَق

Acer macrophyllum (S). Erable à grandes feuilles (F).
شجرة حرجية جاذحة تملو من ١٨ إلى ٢٥ م. أوراقها عابلة متفكة خاسية أو مسابية التفصيص تطول نحو ٣٥ سم. وتعرض نحو ٢٥ نصلاها لامع الصفحة العليا الخضراء اللون، أزغب السفلى. أزهارها عنقودية التجميع، متدلية، فصلها واسديتها خلية البشرة. جناحياتها متوازية المشافر الزباء. تنور من نيسان إلى أيار.

٢٣٠٢٦ - قَيْبُ مَرَايِي الْوَرَق

Acer negundo, *Negundo fraxinifolium* (S). Erable à feuilles de frêne (F).
شجرة حرجية وتزيينية مهدا امريكة الثالية تملو من ١٥ إلى ٢٥ م. أوراقها مركبة وتري التجميع. وريقاتها خمس أوسع، نصلاها لا قياسية الشكل تطول من ٥ إلى ١٣ سم. لونها إلى الخضار الجليل اللامع يملو توضيح اصفرار يبيض. أزهارها عنقودية مستطيلة متدلية. جناحياتها متوازية المشافر الدقيقة المستعرة. تنور في نيسان.

٢٣٠٢٧ - قَيْبُ مُسْتَدِيرِ الْوَرَق

Acer circinnatum (S). Erable à feuilles rondes (F).
شجرة حرجية وتزيينية تملو من ٨ إلى ١٢ م. فروصها وإفانها إلى الجؤرة. أوراقها عابلة، متفكة، ثلاثية التفصيص. نصلاها مستدير الشكل قطره نحو ١٠ سم. صفته خضراء اللون، خلية العروق، مسنة الحافة، نحر في الخريف. أزهارها عنقودية التجميع، متدلية. فصلها إلى الحمرة. بتلاتها إلى البياض. جناحياتها صغيرة اللد شبه مستديرة. تنور في أيار.

٢٣٠٢٨ - قَيْبُ مِلْثَان

Acer opalus (S). Erable opale, Duret, Ayalé (F).
شجرة سريرية مبلولة تملو من ٨ إلى ٢٥ م. أوراقها عابلة ثلاثية التفصيص. نصلاها يبيض الشكل، مستدير الطرف، مسن الحافة، بارز العروق المتتامة. أزهارها عنقودية التجميع. جناحياتها متبادلة المشافر. تنور من نيسان إلى أيار.

٢٣٠٢٩ - قَيْبُ مِيَايِي

Acer mlyabei (S). Erable de Miyabe (F).
شجرة حرجية تملو نحو ١٢ م. مهدا اليابان. ساقها مغلقة اللحاء. أوراقها عابلة ثلاثية التفصيص. نصلاها أخضر الصفحة العليا، خلى السفلى، باحث العروق. أزهارها عنقودية التجميع. جناحياتها خلية البشرة. تنور من أيار إلى حزيران.

٢٣٠٣٠ - قَيْبَات، أَسْدَتُ كَانِيَات

Aceraceae (S). *Acéracées*, *Acérinées* (F). *Aceraceae* (S).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين كثيرة التمثالات. اجناسها وأنواعها عديدة أشهرها القيقب || جميع نباتاتها شجرية. اغشائها مسابية مرققة يكثر فيها اللون الأحمر.

متفكة، خاسية أو مسابية التفصيص. نصلاها جامد الصفحة، راسي الشكل، أخضر اللون، ملج الملوغ. أزهارها عنقودية التجميع حراء اللون. تنور في أيار.

٢٣٠١٩ - قَيْبُ رُبَاهِي الْأَجْزَاء

Acer tetrarnerum (S). Erable tétrarner (F).
شجرة حرجية سريرية تملو من ٥ إلى ٨ أمتار. مهدا الصين. أوراقها عابلة متفكة بضيصة الشكل. نصلاها يطول من ٥ إلى ٨ سم. ويرض من ٣ إلى ٥ صفته السفلى خلية البشرة، خاسية العروق البارزة، حناره مزدوج التسنين. أزهارها عنقودية التجميع، رباعية الاجزاء والبتلات الأخضر. تنور في أيار.

٢٣٠٢٠ - قَيْبُ زُرْعُورِي الْوَرَق

Acer crataegifolium (S). Erable à feuilles d'aulépine (F).
شجرة حرجية تملو نحو ٨ أمتار. مهدا اليابان. أوراقها عابلة متفكة. نصلاها ثلاثي التفصيص مسن الحافة يطول من ٤ إلى ٨ سم. ويرض من ٣ إلى ٦ سم. وهو أخضر الصفحة العليا، بحري السفلى، يحمر في الخريف. أزهارها عنقودية التجميع لونها إلى الخضار القسني. جناحياتها مستقيمة الزوليا. تنور في أيار.

٢٣٠٢١ - قَيْبُ سَكْرِي

Acer saccharum, *A. barbatum* (S). Erable à sucre, E. dur (F). Hard-maple, Rock-maple, Sugar-maple (E). Zuckernahorn, Zucker massholder (D). *Acero zuchertino*, *A. del Canadie* (I).
شجرة سريرية داتحة تملو من ٣٠ إلى ٤٥ م. ساقها ملساء، صلابتها غزيرة للمادة السكرية. أوراقها عابلة، متفكة، ثلاثية التفصيص، تطول من ١٥ إلى ١٥ سم. وتعرض من ١١ إلى ١٦، نصلاها مائل البشرة، مدب الطرف، أخضر الصفحة العليا، بحري السفلى، يحمر في الخريف. أزهارها عنقودية التجميع، غبراء اللون. جناحياتها انقية المشافر. تنور من نيسان إلى أيار.

٢٣٠٢٢ - قَيْبُ سَكْمِي الْوَرَق

Acer clasifolium (S). Erable à feuilles de cissus (F).
شجرة سريرية تزيينية مهدا اليابان تملو من ١٥٥ إلى ٣٠٥ م. أوراقها مركبة، وتري التجميع، لا قياسية الحد. وريقاتها غريبة الشكل تطول نحو ٨ سم. نصلاها مائل البشرة على صفحته، مسن الحافة. أزهارها خلية، رباعية الفصل والبتلات. جناحياتها صغيرة اللد، متبادلة المشافر. تنور في أيار.

٢٣٠٢٣ - قَيْبُ شَرْمِي الْوَرَق

Acer caprinifolium (S). Erable à feuilles de charme (F).
شجرة حرجية سريرية تملو من ٥ إلى ٨ أمتار. مهدا اليابان. أوراقها عابلة متفكة. نصلاها لامع الصفحة المحبوة المسنة الحافة، بارز العروق التي يراوح حددها من ١٦ إلى ٢٥ زوجاً. أزهارها عنقودية التجميع متدلية، وبلغية البتلات الأخضر. جناحياتها مستقيمة المشافر. تنور في أيار.

٢٣٠٢٤ - قَيْبُ شَيْطَانِي

Acer diabolicum (S). Erable diabolique (F).
شجرة جاذحة مهدا اليابان تملو من ٦ إلى ١٥ أمتار. أوراقها عابلة، متفكة، ثلاثية التفصيص. نصلاها يطول

Hématocèle (F).

Haematocele (E).

٢٣٠٣٦ - ثِقَّة دَمَوِيَّة

ورم يسببه ارتشاح الدم في بعض أجزاء الجسم .

Despotique (F). Despotie (E).

٢٣٠٣٧ - ثِقَّةِيَّة

تمت تعريفها بطلق كل ما هو استبدادي أو تعسفي .
كذلك سلطة قليلة أو حاكم قليل .

Cureteur (F).

Guardian, Trustee (E).

٢٣٠٣٨ - ثِقْم

هو الذي يمين لإدارة ماله المجهور عليه أو لإدارة شؤون القاصر .

Valeur (F). Value (E).

٢٣٠٣٩ - ثِقْمَة

هي من الشيء أو قدره أي ما يقوم مقامه . ج ثِقْم . والثِقْمَة تستعمل في تمايز عديدة . أشهر حينها ما يلي :

Valeur locative (F).

ثِقْمَة إيجارية

Valeur déclarée (F).

ثِقْمَة مصرّحة ؛ ثِقْمَة مينة

Valeur vénale (F).

ثِقْمَة متعامل بها

Valeur agréée (F).

ثِقْمَة معتمدة

Valeur fournie (F).

ثِقْمَة مقدّمة

Valeur mobilière (F).

ثِقْمَة متحركة

Coquillière (F). Conchiferous (E). ثِقْلَة

قشرة البَيْضَة الرقيقة الداخلية تغلف البياض تحت القِشْر ج ثِقْل .

Tson des bœufs (F). Ox-fly (E). ثِقْلُوبَة

ذبابَة مؤذية من الثعريات . أناثها تلسع البقر ولا تصف من الخجل والحُمير ، راجع ثَعْرَة البقر .

Cuculidae (S).

Cuculidae, Cuculés (F). Cuculidae (E).

فصيلة طير من رتبة المُسلَّقات . اجناسها وأفرادها عديدة تجتمع إلى ثَمَان عائل ، أشهرها البُرَّاقيات . أصلها العالم . تألفت الأجناس الكثيفة . معظمها من القواطع التي تجوب البلاد في طلب الحصيد والمشي . قشرها الخشن واللبويات وهي لا تحسن بيضها ولا ترق فراغها .

Despote (F). Despot (E).

٢٣٠٣٤ - ثِقْل

الثقل الحاكم المطلق التصرف المستبد .

Hydrocèle (F).

٢٣٠٣٥ - ثِقْلَة

هي الأذرة ، الظها .

جدول ١

القيمة الغذائية في لتر واحد من الفخار المدرجة ادناه

ثِقْمَة غذائية

النوع	نخالة جافة	حماض ^(١)	سكر منحل	سكر كرز	زباد	بروتين	سرعة
	غ	غ	غ	غ	غ	٦,٢٥ × ١٠	(وحدة حرارية)
اجاص	١٧٢	٢,٧	٩٠	١٣	٣,٥	٣,٥	٥٦٧
انثاس	١٦٠	٦,٧	٣٥	٧٥	٥,٢	٤,٣	٥٩٥
برتقال	١٥٧	١٣,٥	٦٠	٢٥	٤,٨	٧,٠	٥٨٠
فخاخ	١٦١	٦,٥	٨٣	١٦	٤,١	٣,٧	٥٧٠
تين	٢١٥	٠	١٥٨	٠	٧,١	١١,٥	٧١٥
خوخ	١٩٦	٩,٥	٧٥	١٨	٥,١	٦,٩	٧١٨
خوخ زكلود	١٨١	١٢,٥	٦٥	٣٦	٦,٠	٦,٥	٧٠٤
فراخ	١٧٣	٨,١	٣٥	٤٢	٥,٨	٦,٦	٦٠٨
سفرجل	١٨١	٩,٣	٦٧	٦	٥,٨	٤,٨	٥٨٥
شمش ثوت	١٥٠	٨,٦	٥٥	٤,٧	٥,٠	٩,٦	٤١١
شيك (فراولة)	١٤٦	١٨,٤	٥١	٧	٧,٤	١٠,٦	٤٣٣
عنب	٢٠٩	٧,٧	١٥٠	٠	٤,٨	٥,٩	٥٥٧
فام احمر	١٦٣	١٩,٨	٨٢	٥,٣	٢,٦	٥,٩	٥٦٠
فام آسي	١٦٤	٨,٥	٥٤	٢,٢	٣,٧	٦,٨	٥٢٧
كرز	١٨٣	٦,٨	١٠١	٥,٧	٤,٩	٧,١	٦٨١
كشمش شالك	١٤٥	١٩,٠	٥٥	٤,٨	٤,٩	٧,٧	٤٤٥
كشمش هنودي	١٦٢	٢٣,٠	٥٠	٢,٤	٦,٦	١١,٢	٤٤٠
ليمون حامض	١٧٤	٥٤,٠	٣٠	٣٠,٠	٥,٦	٦,٣	٥٧٥
شمش	١٤٨	١٢,٧	٣١	٣٦,٠	٦,٧	٨,٠	٥١٦
موز	٢٦٢	٣,٨	١٠٨	٨٩,٠	٨,٩	١١,٣	٩٧٠

(١) الحماض التي تدخل في تركيب الفخار معدة . لا مجال للكروما الفرمية . لتبنيها لتفسي في القليل من الطرزي الموجود في العنب .

جدول ٢
القيمة الغذائية في أشهر البقول وفي بعض الخمار الجافة^(١)

النوع	ماء %	مواد معدنية %	بروتين %	مواد دسمة %	غلوسيد %	عدد السعرات في كيلوغرام واحد
بازيلا غصراء	٧٨	٠,٨٠	٤,٧٠	٠,٣٠	١٠,٤٠	٦٥٠
بصل	٨٨	٠,٦٠	٠,٦٠	٠,٠٧	٦,٢٠	٢٨٩
بطاطا	٧٥	١,٠٠	١,٥٢	٠,٠٧	٢٠,٧٠	٩١٨
بندورة	٩٣	٠,٥٠	٠,٧٠	٠	٢,٢٠	٢١١
ثوم	٦٤	١,٤٠	٣,٤٠	٠,١٣	١٧,٤٠	٨٥٤
جزر	٨٨	٠,٧٠	٠,٧٧	٠,١٣	٦,٩٠	٣٢٥
حمص (جافة)	١٤	٢,٨٠	١٦,٣٠	٠,٦٠	٤٤,٧٠	٢٥٦٠
خرشوف	٨٦	١,٣٠	١,٣٠	٠,٠٥	٥,٥٠	٢٨١
غنص	٩٢	١,٠٠	٠,٩٠	٠,٣٢	٣,٠٠	١٨٩
عيار	٩٥	٠,٤٥	٠,٤٥	٠,١٠	٠,٧٠	٥٩
دبج زراعي	٨٠	١,٠٠	٠,٥٠	٠,٢٠	٩,٨٠	٤٤٥
سيانغ	٩٣	١,٩٠	١,١٠	٠,١٠	١,١٠	١٠٧
سرفل لقي	٦٥	١,٧٠	١,٩٥	٠,١٦	١٨,٤٠	٨٣٨
سلق	٩٢	١,٦٠	١,٢٠	٠,٢٠	١,٩٠	١٤٧
شمام	٩١	٠,٥٠	٠,٦٠	٠,٠٨	٥,٣٠	٢٥٠
شمندر سكري	٨٠	١,٠٠	١,٠٠	٠,١٠	١٥,٤٠	٦٧٩
سوجا (جافة)	١٠,٢٠	٥,٢٠	٢٣,٦٠	١٧,٢٠	٢٣,٠٠	٣٥١٤
عفس (جافة)	١٢,١٠	٣,٠٠	١٨,١٠	٠,٦٠	٤٤,٦٠	٢١٣٠
فاصوليا (جافة)	١٤	٣,١٠	١٨,٠٠	٠,٥٠	٤٠,٢٠	٢٤٣٠
فجل	٩٣	٠,٧٠	٠,٩٠	٠,١٠	٣,٢٠	١٧٦
فستق صيد	٧,٥٠	٢,٤٠	١٩,٣٠	٤٠,٠٠	١٣,٢٠	٥٠٦٠
فول أخضر	٨٢	٠,٨٠	٤,٣٠	٠,٢٠	٧,٤٠	٥٠٢
قرع	٩٠	٠,٧٠	٠,٥٠	٠,٠٧	٤,٢٠	٢٠٢
قرنيط	٩٤	٠,٨٠	١,٢٠	٠,١٧	٣,٠٠	١٨٩
كرات أندلسي	٧٥	٠,٥٠	١,٣٠	٠,٠٥	١٧,٠٠	٧٥٥
كرات معروف	٨٨	١,٢٠	١,٤٠	٠,١٥	٤,٣٠	٢٤٩
كرلس	٩٠	١,٤٠	٠,٥٠	٠,١٧	٤,٣٠	٢١٠
كرب	٩٠	٠,٧٠	٠,٦٠	٠,١٠	٤,٠٠	٢٠٠
لفت	٨٩	٠,٧٠	٠,٧٠	٠,١٠	٤,٩٠	٢٣٦
لوبيا غصراء	٨٩	٠,٧٠	١,٣٠	٠,١٠	٤,٢٠	٢٣٤
ملفوف	٨٠	١,٥٠	٢,٤٠	٠,٤٥	٦,٨٠	٤٢٠
هليون	٩٤	٠,٦٠	١,٠٠	٠,٠٧	١,٦٠	١١٠
هندب (طرخشقون)	٨٥	٢,٠٠	٢,٠٠	٠,٢٠	٦,٣٠	٢٥٠
بندق	٧,١٠	٢,٥٠	١٢,٢٠	٥٦,٣٠	٦,١٠	٦٠٢٦
جوز	٧,٢٠	١,٦٠	١١,٧٠	٥٢,٦٠	١١,٠٠	٥٨٢٤
فستق	٧,٠٠	٢,٠٠	١٣,٥٠	٥٠,٢٠	١٠,٥٠	١٠٠٦٠
لوز	٦,٣٠	٢,٣٠	١٥,٠٠	٤٧,٨٠	١١,٢٠	٥٥٢٠
كستناء	٤٧,٥٠	٢,٠٠	٤,٣٠	٣,٧٠	٣٣,٥٠	١٩٠٠

(١) القيم الغذائية للمدرة في الجدولين ١ و ٢ هي قيم مريضة لا تعمل نيا هتشور ولاندور.

مستطيلة ذرية . أنوارها مَرَاكِبِيَّةُ الإلوان || تألف النابات ويجاري الماء . قوتها العطاء والحشرات أعصها الجراد . تنش في تجاويف الأشجار . أناثها تقسم من ٣ إلى ٤ بيضات مستديرة الشكل تحضنها بمناداة الذكور .

٢٣٠٤٦ - قِوَن الجَبَل (F). Caon de montagne
حيوان مقترس يدهى سهل الشمال ، أظله .

٢٣٠٤٧ - قِوَن الغَاب * ، قِوَن زَمِرَتِي

Halcyon smyrnensis (S). Halcyon de Smyrne (F).
Halcyon (E).

طائر من المازوريات . موطنه يمتد من الشرق الأوسط إلى الهند وسيام وجزر الزابيج . أعطاه البينانية تشدل بعض الرياض وصفات الأخر في فصل الخريف || جسمه متوسط القد ، منكش الشكل . طوله نحو ٢٢ سم . وبسطه نحو ٢٨ سم . ثوبه مَرَاكِبِيَّةُ الإلوان . رأسه ومنقه وخوشاء وبطنه إلى الكستاني الداكن . زوره وأحل صدره إلى البياض . رداؤه وظهره وصمغته إلى الزرقاء الخضراء . جناحه مَرَاكِبِيَّةُ الأزرق والخضفر والأزرق والكستاني والأبيض . قوادسه إلى الزرقاء الخضراء . كلاء إلى السمرة القاتمة . أباهره إلى السمرة المنطية . مناكبه مجذعة بالأبيض عيشه كيرتان . حلقة عينه صناعية . متقاده كبير الجرم . مستطيل الشكل ، محدوب الذك الأسفل ، أحر العين . ساقاه إلى الجلوة وصفه قصيرة سَرَدِيَّةُ القشار || تألف النابات والرياض ويجاري الماء . قوته العطاء والحشرات أعصها السحالي والجنادب والجراد || يدشن عشه في تجاويف الأشجار . الأنثى تقسم من ٣ إلى ٤ بيضات كروية الشكل ، عاجية اللون تحضنها بمناداة الذكر نحو ١٨ يوماً . يعتبر من الطيور الناعمة .



قِوَن الغَاب

٢٣٠٤٨ - قِيمَة غِذَائِيَّة (F). Valeur alimentaire
Alimentary value (E).

القيمة الغذائية هي ما يحويه الغذاء من عناصر تتحول في الجسم بعد الانقسام والتشكيل إلى طاقة ويؤاد استهلاكية لا حياة الجسم بدونها || وقد وضعنا في الجدول الأول ما تيسر لنا من القيم الغذائية العائدة لبعض الثمار المشهورة . أما الجدول الثاني فللقبول وبعض الثمار الجافة .

٢٣٠٤٩ - قِيمَة مَرْيُوتِيَّة (F). Valeur sifible
Nutritive value (E).

هي نسبة ما تحويه كل مادة من عناصر غذائية قابلة التشكيل والانبسام .

٢٣٠٥٢ - قِيس (F). Tragelaphus angus
Tragelaphe d'Angus (F).

نوع من الجبيل وهو أكبر جفة من اليرع وأصغر من الغلب . ثوبه أحمر اللون يملوه موج أصفر ويتجديع أبيض . موطنه جنوبي شرقي أفريقيا .

٢٣٠٥٣ - قِيشَل * ، قِيشَلَة * (F). Face
وجه الشيء كقرفك قبل البناء ...

٢٣٠٥٤ - قِيشَلِي * (F). Facial
نمت تعري يطلق كل ما له صلة بالتهيل .

٢٣٠٥٥ - قِيشُون * ، دِيَكُ البَحْرِ (F). Halcyon (F). Halcyon, Kingfisher (E).

جنس طير من المازوريات . أنواعه قليلة العدد أعطاه البلاد الإفريقية وأسترالية . أجسامها متوسطة القد . منافعها

Conidiophore

٢٣١٤١ - كاسيلينة

جهاز تكاثرى تتميز به بعض الفطور الكاذبة . قوامه سوط نواصى التركيب ، قاعدة ارتكازه المشيج ، طرفه صني الشكل ، ينتهي بشعيرة أو يشماغ من الشفاير يحمل الكناك المرفوعة المتناوبة كحبوب السحبة .

Décembre (F).

٢٣١٤٢ - كانون الأول

December (E).

يعرف أيضاً بـ ديسمبر . الشهر الثاني عشر من السنة الشمسية وهو من شهور الخريف والشتاء . مده واحد وثلاثون يوماً . في اليوم الرابع عشر منه تبدئ الأريبينيات . وفي الواحد والعشرين ينتهي فصل الخريف ويكون الانقلاب الشتوي وهو ما يمتد به مخرج النور من حد نقصان إلى حد الزيادة . وفي الثاني والعشرين تبدئ فصل الشتاء فتخرج الشمس من برج الرامي لتدخل في برج الدلو . تقويمه الزراعي - احص اعماله الزراعية ما يلي :

١ - في الزراعات العامة الموصية . متابعة واهاء بذر الفول والمندس والباقية وسائر النباتات العطيفة . متابعة توصيب وزرم اوراق التبغ الجافة . تحضير مشاتل التبغ وتوزيع الاسمدة العضوية حل الاكباد .

٢ - في الاشجار المثمرة ، متابعة اعمال المكافحة الشتوية والتسميد الكيماوي في المناطق الساحلية والوسطى . الابتداء بالتقليم مع الانتهاء الى ويوب جمع كل ما قطع من الاشجار وحرقه يوباً . المباشرة بفرس النصبوب في المناطق التي لا تحضى الثلج والاعتناء بالنقاية بعد الفرس تأتين البيتة الفضل الضرورية . اتخاذ الحيطه اللازمة لمنع ركود المياه في تربة البساتين . متابعة تشذيب وتقسيم وحرق الكروية والزيوتن . وتوزيع الاسمدة العضوية حل الموز . وتقليم كياشه اي طروحه لواقبتها من البرد والصقيع . انجاز تضييد البزور ثم تليطها في المشاتل الخاصة بها او في مستورها . اقتلاع النصبوب المدة قفرس قبل طفر البرام .

٣ - في الحفصيات : متابعة طفاط البرتقال وتوزيع الاسمدة الكاملة والخامسة وفرس نصبوب التارنج (ابو صفيح) في البساتين المستحدثة وتقليم نصبوب المشاتل .

٤ - في الاشجار المختلفة : فرس نصبوب الاشجار الحرجية والزيوتنية وتقليم وتشذيب معظم اشجار الحدائق والطرقات .

٥ - في البقول والزهور . متابعة العناية بالتربة والنبات و بمشاتل البنورة والخس والباذنجان وبا كواد الزبق والخرنس . والسون .

Janvier (F). January (E). ٢٣١٤٣ - كانون الثاني

يعرف أيضاً بـ يناير . الشهر الاول من السنة الشمسية وهو من شهور الشتاء القزيرة الاطمار . مده واحد وثلاثون يوماً . في اليوم الثاني والعشرين منه تنتهي الاربيبيات . تقويمه الزراعي - احص اعماله الزراعية ما يلي :

١ - في الزراعات العامة الموصية . لتفقد زروع المحطة واستلحاقها بالاسمدة الازوتية النتراتية اذا كانت متأخرة او سقيمة . حرق التربة المدة لزراعة التبغ اذا كان سرحا لم يتيسر في الشهر المنصرم . اعداد مشاتل التبغ وتحضير الاكباد والمباشرة بذر البزور .

٢ - في الاشجار المثمرة : متابعة فرس الاشجار المثمرة والمكافحة الشتوية والتسميد والتقليم . المباشرة بتعليق فساتل السفريل والربان والتفاح الجيت مولين والكروية والزيوتن . متابعة تليظ كبالش الموز .

التركيب ، مسنة الاطراف . ازهارها فردية او عقدية تصبح كبيرة القند يبيض اللون او حمره || أشهر اجناسها الشاي والكافيا .

Caméline (F).

٢٣١٣٣ - كاسيلينة

هي النصار ، اطلبه .

Camélinées (F).

٢٣١٣٤ - كاسيلينيات

هي النصاريات سبط من فصيلة الصليبيات .

Latent (F). Latent, Hidden (E). ٢٣١٣٥ - كامين

ما هو مقدر الوجود الخفي .

Chamidae (S).

٢٣١٣٦ - كاميات

Chamidae, Camacés, Chamacés (F). Chamidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرعويات صفيحيات الخياشم . اجناسها وزايعا المعروفة عديدة معظمها من متحركات الاراضي الجورية والطياشيرية . انواعها المعاصرة منتشرة في سبط عمار البلاد الاستوائية والحرارة || اصداقها متفاوتة الاشكال والجمهر . ثنائية المضارب الانظامية للاستوائية جميعها عادمة المناصب . مستغلطة الأربيل || اعرف اجناسها واشهرها الكامة والظفير .

Camellia (S).

٢٣١٣٧ - كاسيلينا *

Camellia, Camelia (F). Camellia (E).

جنس اشجار وشجيرات ونبات برية وزيوتية من فصيلة الكاسليات . انواعه نحو ١٤ سبطها متنتية قوام . اوراقها ابيدة ، متناقية ، مقنعة ، كاملة . فصالحا جامدة الصلصة حيلة الخضر الزاهي . ازهارها ابيطة او تاجية الارتكاز ، كبيرة القند ، خالصة او مسايحة الفصل وخاصة او مسايحة او تسمايحة البتلات المندجمة القواعد || اعرف انواعها واشهرها ما يلي .

٢٣١٣٨ - كاسيلينا سرديّة

Camellia reticulata (S). Camellia réticulé (F).

نوع من الكاسليات الفاخر الصف . جنسه جاذبة متوسطة القند قوام تملو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم . اوراقها سرديّة عابطة الخضر . ازهارها عادمة العرف ، كبيرة القند ، قفها براوح من ١٣ الى ١٥ سم . لونها الى الحمرة الكروية ازهارها يستمر من آذار الى نيسان .

٢٣١٣٩ - كاسيلينا مستنكا

Camellia sasanqua (S). Camellia sasanqua (F).

نوع من الكاسليات وهي جنبة سرديّة قوام تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . اوراقها مقنونة القامة مسنة الخالصة . ازهارها مكبة قفها براوح من ٦ الى ٨ سم . لونها الى البياض المالحى || ازهارها يستمر من شباط الى حزيران .

٢٣١٤٠ - كاسيلينا يابانية

Camellia japonica (S). Camellia du Japon, Rose du Japon (F). Camellia, Japan rose, Rose of the world (E). Japansche Kamellie, Japansche Rose (D). Camellia, Rosa del Giappone (I).

نوع من الكاسليات الشائع الزامة . ضرره او اصراعه نحو ١٥٠٠ جميعها هريبة الشكل تملو من ٤ الى ٦ امتار . اوراقها ماسلة ، لامة ، حيلة الخضر . ازهارها عادية او مكبة ، كبيرة القند ، عادمة العرف ، يبيض اللون او حمره .



كاسيلينا

Cédrat (F).

٢٣١٥٨ - كبداءة *

في الآرتج، ثمرة الآرتج، اطلبها .

Lasius (S).

Lasius (F). Lasius (E).

جنس بل من فصيلة المعرويات يتميز باستطالة القوائم وبضخامة البطن || أنواعه المعروفة عديدة اعطانها البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة من العالم القديم . بعضها حرجي بألف الغابات والبعض الآخر يعيش في الحدائق قرب المنازل المسكونة وفي الحرايات || معظم أنواعه يتغذى ثرية الإرق اما في زرائب غراه او على النباتات البطيئة والرائحة والاشجار المثمرة .

Cârier (F).

٢٣١٦٠ - كبدار *

هو الكبر ، اطلبه .

Capparidées (F).

٢٣١٦١ - كبداريات *

سبط من الكبريات أشهر اجناسه الكبر .

Epoque de fructification (F).

٢٣١٦٢ - كبداس *

Epoch of fructification (E).

الكبداس هو الزمن الذي يتسبق تفتح اكام الاشجار عن ازدهارها وقد يشمل ايضا زمن الاندثار والبقع .

Régime de dattes, R. de bananes (F).

Bunch, Cluster, Stem (E).

هي لقماء والقنر وهي من النخل كمثوق القلب من الكروية . وهي في الموز مجعدة امشاط الطرح الشمري . ج كبداس

Plantain triomphe (F).

٢٣١٦٤ - كبداش *

هو لقمة النجمة ، اطلبها .

٢٣١٦٥ - كبدان *

داه يصيب الايل ينقبض ثم تسكن كالي احياءه اكتب .

Balayures des étables et routes (F).

٢٣١٦٦ - كبدية *

كناسة المزارب والطرقات وهي من الاسمدة العضوية النابتة . ج كبدون .

Cirsium spectabile (S).

٢٣١٦٧ - كبدية *

Chardon spectaculaire (F).

نوع من القيصون الحقل، واوراقه خلية الفسل على سطحه وهو نبات من الخضص يصلح ورقه لاذباب الحقل يحسبها ويطلقها وله كمرب وشوك مثل السلق ينبت لها رقة من الارض وسهل . ج كبد .

Libérticide (F). Libérticide (E).

٢٣١٦٨ - كبدتيقية *

الكبدية تقويض الحورية .

Fois (F). Liver (E).

٢٣١٦٩ - كبد ، كبد ، كبد *

الكبد والكبد والكبد . ج اكباد وكبد هي احد اعضاء الجهاز الهضمي في الجسم . وهي فغة كبيرة اللد شبه هرمية الشكل تنقرز الصفراء . مركزها وراء الحجاب الحاجز ، في الكشح الامين من التجويف البطني . وهي تحضن حويصلة الصفراء المغروطة الشكل التي تمنحز للامدة المرارية . فضلا عن وظيفتها في اخزان الصفراء فالكبد تحول كل ما زاد من سحابة الجسم من السكر الى نشا سيريني . تدهرو للعالجة حيث تحولوه حته الانتضام الى سكر نافله مائل . ويعرف عن سحالة عجز الكبد عن القيام بهذه المهمة بمرض السكري .

٣ - في الحفصيات : متابة اعمال كائون الاول الخاصة بالقطاف وتوزيع الاسمدة وفرس التصويب وتقليم المراق...

٤ - في الانجار الثقيلة ، فرس لصوب الانجار اليبدة الارواك من حرجية وتريبية يضاف اليها الاروكاليتيس والصفصاف والميموزا والكزورينا والشكينس والورد ...

٥ - في البقول والزهور : متابة اعمال الشجر المنصرم والمتابة بالمخولق والتفتيط والنس والاسبانغ والشم والجل والجزر والكرفس والفت والبقدرس والشونس والهلين والاراضي شوكي والروبياء والبازيلا والشيلك ... تهدي زراعات ومثائل الزهور على اختلاف انواعها والمتابة مختلف اوضاعها الخاصة واستمرار مكافحة اوسامها ومشارتها .

Caniche (F). Poodle (E).

سلالة من الكلاب الصغيرة القد تتميز بصوفها الجملي وبفوط حرسها على اصحابها .

Cautique (F). Caustic (E).

٢٣١٤٥ - كاي *

Bourrache officinale (F).

٢٣١٤٦ - كايوزوان *

هو الحشم الخزي ، اطلبه .

٢٣١٤٧ - كايوشير ، كايوشير ، سيفسارون بوي

Opopanax (S). Opopanax, Panax sauvage (F). Opopanax, All heal (E). Gummi pastinsk, Pastinake (D). Opopanax, Panaces (I).

جنس نباتات برية طيبة معمرة من فصيلة الخبيات . انواعه ثلاثة جنودها جنسية غليظة . سوقها متصبية دقيقة صلبة . اوراقها مركبة ريشية . ازهارها خيمية التجميع ، صفراء اللون ، صغيرة القد . يستخرج منها صمغ رائحي يستعمل في الطارة والطب .

Caiman (F).

٢٣١٤٨ - كايتمان ، كيمان *

هو تمساح كيان ، اطلبه .

Fosse à fumier (F).

٢٣١٤٩ - كبا ، كبيسي *

Dunhill (E).

المزيلة . ج اكباد .

٢٣١٥٠ - كبادية *

هي فلفل كبادية ، اطلبه .

Hérissou (F).

٢٣١٥١ - كبادية الشوك *

هي القنفذ ، اطلبه .

Salvadore (fruit) (F).

٢٣١٥٢ - كبدات *

لصبيج ثمر الاراك واحده كبادية . والبرير ما لم ينضج من الكبادات .

Inhibition

٢٣١٥٣ - كبياس ، كبيسي ، منع *

٢٣١٥٤ - كبادية ، كبادية ، قمرمل *

Frein (F). Brake (E).

٢٣١٥٥ - كبادية *

Inhibiteur, inhibitif (F).

Inhibitory (E).

نعت تعريفي يوصف به كل عامل يحول دون سير الحركة الطبيعية فيعزلها او يوقتها كلياً .

Hépatite (F). Hepatitis (E).

٢٣١٥٦ - كبداد *

التهاب الكبد ، ويكون حاداً او مزمنياً .

Cédratier (F).

٢٣١٥٧ - كبداد *

هو الآرتج ، اطلبه .



كاشيش



كبادية



كباد



كبة

Câpre (F), Caper (E).

٢٣١٧٧ - كَبْرَة
ثمرة الكبر. ج. اكبار وكبار :

Coproah (F), Coco-nut (E).

٢٣١٧٨ - كَبْرَة

هي لب الناربيل ، اطلبه .

Soufrage (F), Sulphuring (E).

٢٣١٧٩ - كَبْرَة

هو التغير بالكبريت اي ذر مسحوق الكبريت على النباتات الملوها من بعض الاوصام الفطرية او لمكافحة تلك الاوصام .

Coléoptère mâle (F).

٢٣١٨٠ - كَبْرَتَل

He-coleoptere (E).

ذكر الخنفساء ، وهو ايضاً جسر الجمل المقدس .

Capromys (S).

٢٣١٨١ - كَبْرُوس ٥

Capromys, Houtia, Chemi (F), Capromys (E).

جنس حيوانات لبونة قاضية من فصيلة الداهيات . انواعه عديدة قريبة الشبه من الجرادات . اجسامها ريمية ضخمة تطول من ٤ الى ٥٥ سم. وذناها من ١٥ الى ٢٧ سم. ورونها مستطيلة . مقاسها مغلوقة . اذناها مستعرضة متحدة الحنج . عيونها كبيرة . رباطها العليا مغلوقة . اعناقها قصيرة غليظة . جريزها الامامية رباعية الاصابع اما الخلفية فثنائية . اطرافها طويلة مقوسة سادة . اذناها حشرية الجملد يكسوها حلب مستطيل دقيق . مؤلف مؤلفا فزوليا ومتنوراس وكرويا والجناح ... تألف الغابات والاحراج والادغال . تتسلق الاشجار بحفة وتسير على الارض ببطي . قوتها الاوراق والتأبر والحاء .

Capros (S).

٢٣١٨٢ - كَبْرُوس ٥

Capros (F), Capros (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الكبريات شاكات الزعانف . انواعه المعروفة عديدة . اعطائها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . سارحها حشاش المجاهد في الاعماق التي يراوح فيها من ١٠ الى ٣٠ م. || اجسامها صغيرة القدة ، مستعرضة الجسم ، مستطيلة الرأس والخطم ، كبيرة العين . زعانفها الظهرية الامامية تساعية المناسخ الحادة الأطراف || اعرف انواعه واشهرها الكبروس الخنزيري .

٢٣١٨٣ - كَبْرُوسُ خَنْزِيرِي ٥

Capros aper (S).

Capros sanglier, Sanglier (F), Boar-fish (E).

سمكة بحرية من الكبروس . اعطائها البحر الابيض المتوسط ، جسمها صغير القدة ، بيضي اللون ، مبطط الجسم ، يطول نحو ١٥ سم. رأسها متفطش الاركانز ، مخروطي الخطم المستدق الطرف كفتيشية الخنزير . عينها كبريات . زعنفتها الظهرية الامامية تساعية المناسخ الحادة . سفنها مهدب الصغرة الخشنة . قوتها الى الحلوة الفضية المراج || لحمها كاهن الصنف ، مستهجن الرائحة ، قل من يأكله .

Caproidae (S).

٢٣١٨٤ - كَبْرُوسِيَّات ٥

Caproidae (F), Caproidae (E).

فصيلة اسماك بحرية من شاكات الزعانف . اجسامها وانواعها عديدة . اعطائها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . اجسامها صغيرة مستعرضة . اعطائها ذلفة . عيونها كبيرة . زعانفها الظهرية كثيرة المناسخ الحادة حشاشها خشنة || اشهر اجناسها الكبروس .

Hépatiques (F), Liverwort (E).

٢٣١٧٠ - كَبْدِيَّة

صنف من قسم الطحليات .

Capparis (S).

٢٣١٧١ - كَبْر ، كَبْر

Câprior (F), Caper-tree (E).

جنس نباتات معمرة من فصيلة الكبريات . انواعه زهاء ١٢٥ منها من نباتات المناطق الحارة ، منها الاشجار والشجيرات والجنات ومنها الشائكة والرسعة . اوراقها متعقبة متناحية بيضيه النصل . ازهارها فردية التجميع ، ابطية الاركانز ، طويلة الزناد ، بحيلة الشكل ، كبيرة القدة ، مستطيلة الاسدية المدينة للتلوة || اعرف انواعه واشهرها الكبر الشائك .

٢٣١٧٢ - كَبْر شَائِك ٥ ، كَبْر شَائِك ، اصْف ،

صنف ، كَبْر

Capparis spinosa (S).

Câprior commun, C. épineux (F), Caper-tree, Common caper-bush (E), Kapparnastrauch, Echter Kapparnastrauch, Kapper (D), Cappero, C. spinosa (I).

نوع من الكبر وهو جنبة قراءه فناء شائكة تطول من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. منها اقل البحر المتوسط . فروعهها دقيقة متباعدة ، اشواكها محمجة . ازهارها وردية اللون كبيرة الحجم قطرها يراوح من ٤ الى ٦ سم. ثمارها كاتليار شكل وقالب لكن لا تطول اكثر من ٥ سم. || ازهارها وثمارها تستعمل في الخللات . جلجورها طيبة يقال انها نافعة وسطمة ومدرة البول .

Coccinia (S).

٢٣١٧٣ - كَبْر هِنْدِي

Coccinie, Céphalandre (F), Scarlet fruited gourd (E), Scharlachranke (D), Cefalandro (I).

جنس نباتات برية وزراعية معمرة من فصيلة القرعيات . انواعه المعروفة قليلة اعطائها البلاد الحارة . جلجورها صقولية . سيقانها مدادة او عارضة . اوراقها مقصصة او متلة الزوايا . ازهارها كبيرة القدة ، بيضاء اللون او صفراء . ثمارها ريفية الشكل ، صغيرة الحجم ، جامدة الياب . يزورها الى السواد المرط بالابيض || اعرف انواعه ما يلي .

٢٣١٧٤ - كَبْر هِنْدِي لَتِيَّي الورقي

Coccinia cordifolia (S), Coccinie à feuilles en coeur (F).

نوع من الكبر الهندي وهو نبات زواحي مداد يطول نحو ٢٠٠ سم. اوراقه صغيرة القدة ، خماسية التخصيص ، قليلة الشكل ، تطول نحو ١٠ سم. فصلها لامع البشرة على صفحتها . حواملها بسيطة . ازهارها الى الياض المائج ، قطرها يراوح من ٢ الى ٤ سم. ثمار ريفية تطول نحو ٥ سم. لونها الى الحمرة ، لهاها جامدة المادة ارجواني الخضاب . ثمار وصلقه مأكولة .

٢٣١٧٥ - كَبْر هِنْدِي كَفِّي الورقي

Coccinia palmata (S), Coccinie à feuilles palmées (F).

نوع من الكبر الهندي وهو نبات متسلق يطول من ٦ الى ٨ امتار . اوراقه كلية الشكل طويلا يراوح من ٨ الى ١٠ سم. حوائله فارقة . ازهارها الذكرية عتقوية التجميع صفراء اللون . ثماره بيضيه الشكل والحجم ، عتقية اللون ، لهاها جامدة المادة الصفراء || ثماره وصلقه مأكولة .

٢٣١٧٦ - كَبْرَت

Sulfurer (F), To sulphurate (E).

استعمل الكبريت .



كبر شائك



كبريس



كبروس خنزيري

٢٣١٩٢ - كبريتات البوتاسيوم
Sulfate de potasse (F).
رابع سلفات البوتاس .

٢٣١٩٣ - كبريتات الحديد
Couperose verte, Mélanterie (F). Green vitriol (F).
مركب معني طبيعي اخضر اللون يوجد في بعض الكنان .

٢٣١٩٤ - كبريتات الزنك
Couperose blanche, Gaiacite (F). White vitriol (F).
مركب معني طبيعي ابيض اللون ، سهل الكسر والذوبان ، طعم الحام ، قليل الذوبان .

٢٣١٩٥ - كبريتات الصوديوم
Sulfate de soude
رابع سلفات الصود يوم .

٢٣١٩٦ - كبريتات الكلس
Sulfate de calcium
رابع سلفات الكلسيوم .

٢٣١٩٧ - كبريتات النحاس
Couperose bleue, Cyanose, Chalcantithe (F). Blue vitriol (E).
مركب معني ازرق اللون ، زجاجي الحمر ، طعم الحام ، يذوب في الماء . يوجد في مناطق النحاس .

٢٣١٩٨ - كبريتات الأمونيوم
Sulfate d'ammoniaque (F).
رابع سلفات الأمونيوم .

٢٣١٩٩ - كبريتات الحديد
Pyrite (F).
هو البيريت ، مركب من كبريت وحديد . Pyrites (E).

٢٣٢٠٠ - كبريتات الكربون ، سلفور الكربون
Sulfure de carbone (F). Sulphide of carbon (E).
مائع ذو الرائحة شديدة الفاتحة لا يذوب في الماء ، يذوب في الزرارة ، لقصه حل الحشرات وتظهر التربة من بعض الاوصاف الفطرية المستعمية .

٢٣٢٠١ - كبريتات
Sulfureux (F). Sulphurous (E).

٢٣٢٠٢ - كبش ، لوزة الآلهة
Caboze (F).
قوة الكاكو ، رابع كاكو . Bump (E).

٢٣٢٠٣ - كبشود الزعفران
Caprodes flavomarginatus (S).
Caprode de l'aubépine (F).

حشرة غاصلة من فصيلة السمجيات . جسمها صغير يطول نحو ٨ سم . رأسها مجرم ، أصعب اللون . خطيها شديد السمرة . حينها بارزتان . زبانا مستطيلان ، امران . كوسلها أصعب يطول موج امر . حشيتها صفراء ، صناعية . ظهرها لاحف ، حشيتها الى الشوكة البيضاء المالح ، يطويها حار فوق اصفر ذهبي يتحول في الزم الاخضر الى صناعي . بطنها شديد السمرة ، امر الحمار . فومها مبلقة بالامر والاصفر ٦ ٦ تألف الحراج والمواقع التي يكثر فيها الزمور .

٢٣٢٠٤ - كبش
Bélir (F). Ram (E).
ذكر الفان يطبخ السواد . ج اكيش واكاش وكيش .

٢٣٢٠٥ - كبش
Fascine (F).
اغشاب واغصان واغشاب قوضع في سبيل الماء لتحويل قسم منه الى مجرى آخر .

٢٣١٨٥ - كبريتاتس مُحَرَّز
Coprphile strié (F).
هو الطروب الحز ، اطلبه .

٢٣١٨٦ - كبريتات
Coprillite (F). Coprolite (E).
معدن الغالب المتجر . وقد يتر من التفتات الطبيعية .

٢٣١٨٧ - كبريتات
Coprosm (S). Coprosm (F).
جس نباتات معمرة بقرة من فصيلة الفويات . انزاعها للمرة قليلة . مهدا بلاد زيلندا الجديدة . سقها تلو من ٢٠ الى ١٢٠ سم . اوراقها مستديرة الشكل ، مقنونة القاعده ، نعلها يطول ويمرض الى ٢ الى ٨ سم . صفحت جميلة الخمار الزاهي تملو ستارها رقيقة صفراء ، والكبريتة تستعمل في الحقائق استعمال المضاف الياباني .

٢٣١٨٨ - كبريتات
Capparidaceae (S).
Capparidaceae (F). Capparidaceae (E).

فصيلة نباتية معمرة بذوات الفلقين ، اجناسها وانواعها كثيرة المدد جميعها اربعة اسباط : البانيات والزيرويات والكباريات واليرويات . نباتاتها مختلفة الاشكال والاجسام منها الانجار والشجيرات والجنات ومنها الاعشاب الحولية والمعمرة . اوراقها متعاقبة ، معتقة ، اذنية . انزاعها حيلة القالب فردية او متعددية التجميع . ثمارها حبة ثنائية الفلق ٥ معظمها من نباتات المناطق الحارة وهي تحوي بعض الزيوت العطرية والبعض العناصر المختلفة انحصارها للصحة والشاقة والسامة .

٢٣١٨٩ - كبريت
Soufre (F).
Sulphur, Brimstone (E).

جسم صلب اصفر اللون قابل الكسر رمزه (ك - S) . وزنه الانمي ٢٢٠٠٦٦ يتصهر في ١١٢ ٦ . ويتنقذ في ٢٥٠ ٦ . حبة استراقه زرقاء اللون ساطعة خائفة . وهو رديء الاتصال الحرارة والكهرباء يلوي في الاثير والبنزين والزيوت ولا يذوب في الماء ٥ حراره الانسان واستخدمه منذ قدم الزمان وهو يوجد في الطبيعة اما نقيا واما مزوجا ينذر من العناصر كالحديد والنحاس والزرصاص . يستهلك منه العالم سنويا ملايين الاطنان في صناعة الاسمدة والاصباغ واللقاب والبارود والادوية الطبية الجلدية والادوية الزراعية ... من خواصه النقية التي تستعمل في الزراعة ضد الاوصاف الفطرية :

الكبريت الميكروني
Soufre micronisé (F).
الكبريت الزهر
Soufre sublimé, Fleur de soufre (F).
الكبريت المسحق
Soufre trituré (F).
الكبريت المبلور ، الكبريت العمود
Soufre cristallisé

٢٣١٩٠ - كبريت الرصاص
Galene (F). Galena (E).
مركب معني يسمي نحو ٨٦,٥٠ ٪ من الرصاص و ١٣,٥ ٪ من الكبريت وبعض الشوائب من الزر من الفضة او الحديد او الزنك او الامتد . وهو رصاصي اللون ، ازرق المالح ، اسفغ البريق ، سريع الكسر . ثقله النضي يراوح من ٧,٦ الى ٧,٦ وهو شائع الاستعمال الصناعي يستخدم خاصة في طلي الآلية الخزفية مناسا لاصصها الماء .

٢٣١٩١ - كبريتات
Sulfate (F).
رابع سلفات .

البياض الفضي. اعدادها صدها وصفائح حنكها الى السواد الباهت .

٢٣٢١٤ - كَبْجَة مَلَوَانَة

Megaptera verabilis (S). Mégaptère changeante (F).
موطنها شمالي المحيط الهادي طويلا يراوح من ١٨ الى ٢٥ م. رأسها وظهورها الى الزبداء السمره الزرقاء الملوحة . وبطنها الى البياض المالحى تعلوه مائة رديدة . اعدادها صدها وصفائح حنكها الى السمره القاتمة .

Hérissor (F). كَبْجَة كَاب الشوك
هو القنذ ، اطلبه .

Fourrure garnie (F). كَبْجَل
الكبيل : الكثير الصوف من الغنم .

Cabomba (S). كَبْجَة ٥
جنس نباتات مائية معمرة من فصيلة النيلوفرديات . انواعها المعروفة قليلة . سيقانها شجيرة . جلورها كالشمر تشعشعها مادة لزجة . اوراقها متناقصة صافية النصل تركّز على معاليق مستطيلة . ازهارها فردية التجميع ابضية الازتكاز سداسية الثلاث . بتلاتها صفراء الانتشاب بيض الاطراف . اوراقها وازهارها تنطق على سطح الماء . وهي تعيش في الاكواريوم وتتسمل كرمي لاسماك المياه العذبة ا عروف انواعها ما يلي .

٢٣٢١٨ - كَبْجَة كَرْوَلِيَّة ٥

Cabomba caroliniana (S). Cabomba de la Caroline (F).
نوع من الكبجبة المعمرة السبروتية الشائعة الاستعمال كرمي للاسماك . اوراقها صافية طافية . ازهارها بيض الاطراف ، صفر الانتشاب والاقراص ا تنويرها يستمر من ايار الى آب .

٢٣٢١٩ - كَبْجَة مَالِيَّة ٥

Cabomba aquatica (S). Cabomba aquatique (F).
نوع من الكبجبة المعمرة السبروتية الشائعة الاستعمال كرمي للاسماك . اوراقها طافية بيضبة النصل الاخضر الذي يطول من ١ الى ٣ سم . ازهارها صفراء اللون تشبه زهر الخيزران المائي ا تنويرها يستمر من نيسان الى تموز .

Capnodium (S). كَبْجُد ٥
هو التيج ، قطر مجهرى ، اطلبه .

Chabot, Chabotage (F). كَبْجُوت
مرض جرثومى يصيب الكرمة ينشطها على افراخ الجلودر الموحلة الشيتة .

Copris lunaris (S). كَبْجُول ٥
Copris (F).

شجرة من الجملليات يكثر وجودها في الربيع والصيف . طويلا يراوح من ١٥ الى ٢٢ م. ثوبها الى السواد اللامع . ذكرها مسلح بقرون مستطيل حاد . انتفاها سلسلة بشفرة ذرية عمودية الازتكاز . وهي من الحشرات العنصرية النائلة التي تعيش على مختلف انواع البراز . محبرها سرداب فردية نسبية تنبع فيها اكر الزبل التي تحفرها الانثى بالاشتراك مع الذكر ثم تمتع في كل اكرة بكثرة وتقوم على حراستها حتى اكتمال التفث الذي يستمر اكثر من اسبوعين .

Mouflon (F). كَبْشُ الْجَبَل
Mountain Sheep (E).
حيوان لبون يجتر يعرف بالاروية ، اطلبه .

٢٣٢٠٧ - كَبْشُ الصَّرْفُول
Girofle, Clou de girofler (F). Clove (E).
هو زهرة القرنفل المخلقة . طعمها حريف ، ورائحتها ذكية المرقة فواحة . يستخرج منها زيت شائع الاستعمال الطبي ويؤخذ قشره والتشجيج يغير الاعصاب ويمكن ا الانسان .

٢٣٢٠٨ - كَبْشِي الرّأس
Criocéphale (F). Criocephalous (E).
نمت ثمريني يطلق على كل فن كان رأسه كراس الكيش .

٢٣٢٠٩ - كَبْش ٥
Megaptera (S). Mégaptère (F). Humpback whale (E).
الواحدة كبة . جنس حيتان عظيمة القد مربية الشكل . ازماره المعروفة حدة ثنائى المحيطات . طويلا يراوح من ١٢ الى ٣٥ م. تتميز زعانفها الصدرية المستطيلة الضيقة الرابمية الاضامع . رؤوسها ضخمة ، صفائح احداها قصيرة مستعرضة مطاطة . صدها عديدة متوازية التخديج الطويل ا قريبا الاسماك الصغيرة . تجوب الاعماق والمياه السطحية والاقليمية في طلب الرزق . اناها تقسم من جرو الى جرون ترضعها بصفة شهود . سرعتها تفوق سرعة المراكب البخارية . صيدها غطر وشاق دهنها مغروب فيه وقد يراوح انتاج الكبة الواحدة من ٤ الى ٥ اطنان . اما انواعه الخمسة فهي ما يتبع .

٢٣٢١٠ - كَبْشَة الْجَنْب ، كَبْشَة لَانْتَد
Megaptera islandica (S). Mégaptère de Islande (F).
موطنها جنوب المحيط الاطلسي . طويلا يراوح من ٢٠ الى ٢٥ م. رأسها وظهورها الى السمره الزرقاء . بطنها الى البياض الاخضر . صفائح حنكها الى السمره القاتمة .

٢٣٢١١ - كَبْشَة الخَلِيج
Megaptera indica (S). Mégaptère indienne (F).
موطنها الاقيايس الهندي تكثر في الخليج الفارسي . طويلا يراوح من ١٢ الى ١٥ م. رأسها وظهورها الى الكبة السمره الصفراء الملوحة . بطنها الى البياض الاخضر الكدر . اعدادها صدها وصفائح حنكها الى السواد الباهت .

٢٣٢١٢ - كَبْشَة القُطْب ، جَبَلُ البَر
Megaptera Boops (S). Mégaptère Boops, M. longimane, Baleine à bosse, Jubarte, Gibbar, Poisson de Jupiter, Képorak (F).
اكبر انواع الكبج وارضها جنة واطولها هيكل واغربها شكلًا . طويلا يراوح من ٣٠ الى ٣٦ م. تتميز بسلام كسام الجبل بطول شبح الطير ورزعة ظهريّة منجلبة الشكل صغيرة القد . رأسها وظهورها الى السواد اللامع . بطنها الى البياض . اعدادها صدها الى السمره القاتمة . صفائح حنكها سود ا موطنها نسيج الاربياء يشمل بحار القطب الشمالي واقتسم الاصل من المحيط الاطلسي .

٢٣٢١٣ - كَبْشَة كُوْزِيْزَا
Megaptera Kuzira (S). Mégaptère Kuzira (F).
تكثر في مضيق بارين وبحار المجرية . طويلا نحو ٢٠ م. رأسها وظهورها الى السواد الأزرق الملوحة . بطنها الى



كَبْش



كَبْشَة كَرْوَلِيَّة



كَبْجُول (١)



كَبْجُول (٢) منظر جانبي

Swine-book - ٢٣٢٣٧ - **كِتَابُ أَنْسَابِ الْخَنَازِيرِ**
يحمل تدوين فيه أنساب سلالات الخنازير .

Stud-book - ٢٣٢٣٨ - **كِتَابُ أَنْسَابِ الْخَيْلِ**
يحمل تدوين فيه أنساب سلالات الخيل .

Flock-book - ٢٣٢٣٩ - **كِتَابُ أَنْسَابِ الْغَنَاءِ**
يحمل تدوين فيه أنساب سلالات الغناء .

Cants-book - ٢٣٢٤٠ - **كِتَابُ أَنْسَابِ الْكَلَابِ**
يحمل تدوين فيه أنساب سلالات الكلاب .

٢٣٢٤١ - **كِتَابُ** نبات كالجرير . (السان) .

Agglomérat, Conglomerat (F). - ٢٣٢٤٢ **كِتَابُ** *
Agglomérat, Conglomerat (E).
حالة تجميع طينية تكون عليها بعض المواد المختلفة . أحيانا طبقات الحصى والريال المتناسقة .

Imperméabilité (F). - ٢٣٢٤٣ **كِتَابُ** *
Impermeability (E).
خاصة مسك الماء في بعض أنواع القربة . وفي من حيرب القربة الزراعية لأنها تجعلها شديدة الصلابة والانتعاج .

Linum (S). Lin (F). Flax (E). - ٢٣٢٤٤ **كِتَابُ** *
جلس نباتات برية وزراعية من فصيلة الكتانيات . أنواعه المروقة زهاء ١٠٠ منظمها حولي وبهضها ممر . سوقها خشبية أو ليفية منتصبة غليظة . أوراقها لائقة متعاقبة سنانية التصلب أو خشيطة . أزهارها خالية التركيب عقدوية التجميع مختلفة الألوان منها الأبيض والأصفر والوردي والأزرق والأحمر . ثمارها حقية ، بزورها بيضية صغيرة ملساء تستعمل في الطب ويستخرج منها زيوت حارة تستعمل في النعناع والصلاد . كما وأنه يستخرج من غلاف سوقها اللبغية اللياف صناعة نسيجية تحتل المركز الثاني بعد القطن || أشهر أنواعه البرية والزراعية الصناعية والزراعية ما يتبع .

Linum suffruticosum (S). - ٢٣٢٤٥ **كِتَابُ أَبْيَضِ**
Lin blanc (F). White flax (E).
نوع من الكتان البردي الزرني . وهو عشية حولية تملو نحو ٣٠ سم . ساقها خشبية ، منتظمة ، معوية ، فراءه ، خلية اللحاء . أوراقها غززية الشكل ، جامدة التصلب . أزهارها إلى البيضاء الناصع . حنجر يتخللها إلى الحمرة البنفسجية الملوحة || أزهاره ينسمر من أيار إلى آب .

٢٣٢٤٦ - **كِتَابُ الزَّرِّي** * ، **كِتَابُ زَهْرِي** ، **كِتَابُ كَبِيرِ الزَّهْرِ**
Linum grandiflorum (S).
Lin à grandes fleurs (F). Flowering flax (E).
Leinblume (D). Lino d'Africa (I).
نوع من الكتان وهو عشية حولية زرينية تملو من ٢٠ إلى ٤٠ سم . ساقها فراءه ، فروصها منتصبة منتصبة . أوراقها سنانية ، فصلها بحري اللون . أزهارها كبيرة اللثة . حيلة الحمرة مهدبة التصلب || أزهاره ينسمر طوال شهر حزيران

٢٣٢٤٧ - **كِتَابُ الشَّرْقِ**
Linum orientale (S).
Lin d'Orient (F). Oriental flax (E).
نوع من الكتان الطبي البري البديل ، منته الشرق الأوسط . شتته معمرة تملو من ١٥ إلى ٢٠ سم . ساقها خشبية فراءه . أوراقها صغيرة اللثة ، فصلها وسيد العرق

Productif (F). Productive (E). - ٢٣٢٣٣ **كَبُوس**
كثير الحمل . يقال نقاعة كبوس ونقعة كبوس .

Capucine (F). - ٢٣٢٣٤ **كَبُوسِيْن**
هي السلية ، نبات عشبي زرعني مأكلي الأوراق والأزهار ، اطلبها .

Loche (F). - ٢٣٢٣٥ **كَبِيْت**
هو القمح من الإصمك النهرية ، اطلبه .

٢٣٢٣٦ - **كَبِيْت** * ، **كَبِيْت**
Copalera (S). Copaler, Copahler, Copayar (F). Copaliba-tras (E).
جنس أشجار حرجية من فصيلة القرنيات . أنواعه المروقة نحو ٢٠ . أطاها البلاد الحارة الأفريقية والأمريكية . ٢٥ م . أخصانها خشبية . أوراقها مركبة متعاقبة . أزهارها سلبية التجميع . ثمارها قرون صغيرة رقيقة وحيدة البزرة المستطيلة المبططة || اغشائها جوية اللون سلبية تستعمل في التجارة . يستخرج من سوقها طباب ورائحي المادة ، يلسي العرق يستعمل في الصيدلة .

Macrocarpe (F). - ٢٣٢٣٧ **كَبِيرُ الشَّعَرِ**
Macrocarpus (E).
نمت تعريفي يطلق على كل نبات ينتج ثماراً كبيرة .

Mégalocephale (F). - ٢٣٢٣٨ **كَبِيرُ الرَّأْسِ**
Mégalocephalous (E).
نمت تعريفي ووصني يطلق على الحيوانات الشاذة بفسخامة رؤوسها .

Renoncule des fleuristes - ٢٣٢٣٩ **كَبِيْتَج**
هو الخواند الأسبوي ، نبات قمبر الساق ، كويه الرائحة ، اطلبه .

Blométrie (F). - ٢٣٢٤٠ **كِتَابُ بِيَوْمَتِيَا**
Biometry (E).
بحث بيولوجي يطبق القواعد الاحصائية وسباب الاحتمالات على حياة الكائنات الحية .

٢٣٢٤١ - **كِتَابُ**
الواحدة كتاة . نبات كالجرير يطبخ فيوكل (السان) .

Book - ٢٣٢٤٢ **كِتَابُ**
يحمل الانساب في الحيوانات الداجنة .

Lettre de crédit (F). - ٢٣٢٤٣ **كِتَابُ الإِعْتِمَادِ**
Letter of credit (E).
رسالة يبعث بها صاحب المصرف إلى وكلائه لكي يحتفظوا مبلغاً من المال رهن تصرف شخص سمي .

Pedigree (F). - ٢٣٢٤٤ **كِتَابُ الْأَنْسَابِ**
Pedigree (E).
يحمل تدوين فيه انساب سلالات الحيوانات العرب وحياد الرعان وسائر الحيوانات الموصلة .

Lettre de garantie (F). - ٢٣٢٤٥ **كِتَابُ الضَّمَانِ**
Letter of guaranty (E).
كتاب يتعهد به شاحن البضائع وناقلها بإيصالها على الحالة المبينة في تذكرة الشحن .

Herd-book - ٢٣٢٤٦ **كِتَابُ أَنْسَابِ الْبَقَرِ**
يحمل تدوين فيه أنساب سلالات البقر .



كَبِيْت



كِتَابُ الزَّرِّي

Linum viscosum (S).
Lin visqueux (F).

نوع من الكُتَان الزَيَّيُّ وهو عشبة معمرة تملو من ٣٠ إلى ٦٠ سم. ساقها فراءة مزقية . أوراقها سنانية ثلاثية أو خاسية الفروق . نصلها مبهرم القد، خلي البشرة على صفحتيه . أزهارها وردية اللون موشة بالنحسي . أزهاره يستمر من أيار إلى تموز .

٢٣٢٥٣ - كُتَان مُسْهَل * ، قَرَقِي

Linum catharticum (S). Lin purgatif (F). Purgin flax, Fairy flax, Cathartic flax (E). Purgier-Lein, Purgier-Flachs (D). Lino a foglia purgative (I).
نوع من الكُتَان البري الطيبي الملبول وهو عشبة معمرة تملو من ١٠ إلى ٢٥ سم. ساقها غشوشية فراءة . أوراقها طيبة مسهلة ، السفل منها ضمية الجميع ، سنانية النصل ، الوسطى والعليا متناقبة غشوشة . أزهارها كبيرة القد لونها الياصفر التبي || أزهاره يستمر طوال شهر تموز .

Linaceae (S).
Linacées (F). Linacae (E).

نصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة القملات. أجناسها ١٤ تشمل ٢٣٠ نوعاً متبها جميع الاصناف المتعددة . معظمها عشبي حولي أو معمّر وبعضها شجري أو جنبي . أوراقها متناقبة أو متقابلة . أزهارها تاجية الارتكاز ، لاياسية الجميع منها الفردية والمتقودة والمشكولية . أشهر أجناسها الكُتَان والكوكوا والرديولا .

Démographie (F).
Demography (E).

٢٣٢٥٥ - كِتَابِيَة

الكتابية علم احصاء الجماعات البشرية .

٢٣٢٥٦ - كُتُبُ الْاِنْسَان

Livres généalogiques (F). Genealogical books (E).
مجلات تدون فيها الحيوانات بأسمائها وأشكالها مع أسماء وأشكال الآباء والامهات وصفاتها المميزة وما اشهرت به الخ .

٢٣٢٥٧ - كَعْد ، كَعْدَة ، كَعْدَة

الكعد والكعد هو اقل الكعف وقيل هو الكامل وقيل هو ما بين الكامل الى الظاهر . ج . اكعاد وكعد .

٢٣٢٥٨ - كَعْر ، كَعْر ، كَعْر ، كَعْرَة

Milieu d'une chose (F). Middle of one thing (E).
هو جوار كل شي، اي أوسطه .

٢٣٢٥٩ - كَيْتْرِش * ، جَمِيْمِلُ الشَّعْرِ

Callitriche (S). Callitriche, Callitriche (F). Wasserstärnwort (E). Wasserstern, Sternkraut (D). Callitriche (I).

جنس نباتات عشبية معمرة من نصيلة الكَثْرِيَشِيَات . انواعه قليلة العدد ، اصطناعها البلاد الحارة والمعتدلة تعيش في المياه العذبة || يستخرج منها عصارة لزجة ملينة تقيد الشعر وتحمده ملده وسسته .

Callitrichaceae (S).
Callitrichacées (F). Callitrichaceae (E).

نصيلة نباتية من ذوات الفلقتين أجناسها وانواعها قليلة العدد . جميعها مائية . أشهرها الكَثْرِيَش .

يطول نحو ٦ م. ويعمر نحو ٢ م . طعنته تنتهي بحلبة دقيقة خدية . أزهارها برتقالية اللون ، غدية النصل الشفافة . أزهاره يستمر من نيسان الى حزيران .

٢٣٢٤٨ - كُتَان بَرِّي * ، كُتَان هَبِّي الزَّرِّي ،

Linum angustifolium (S).
Lin sauvage (F). Pale flowered flax (E). Wilder Lein (D). Lino salvatico (I).
نوع من الكُتَان البري الملبول وهو عشبة معمرة تملو من ٢٠ الى ٣٥ سم. ساقها غشوشية قليلة الفروع المتصبة . أوراقها خفيفة ، نصلها غشوشة الصفحة ، وسيد الفروق . أزهارها قليلة العدد لونها الى الزرقة اليلكية المسلوخ . أزهاره يستمر من نيسان الى حزيران .

٢٣٢٤٩ - كُتَان ذَهَبِي

Linum flavum (S).
Lin jaune d'or (F).
نوع من الكُتَان البري الذي وهو عشبة معمرة تملو من ٢٠ الى ٥٠ سم. ساقها غشوشة فراءة . أوراقها ملوكة الشكل ، نصلها يطول من ٢ الى ٣ سم. ويعمر من ١٥ الى ١٠ م. وهو ثلاثي الفروع ، بحري اللون . أزهارها فرقة ، كثيرة العدد ، نحية اللون || أزهاره يستمر من حزيران الى تموز .

٢٣٢٥٠ - كُتَان زَيْلَنْدَة

Lin de la Nouvelle Zélande (F).
هو القريوم المتصلب ، أخليه .

٢٣٢٥١ - كُتَان شَاخ * ، مَلَسَج

Linum uscatissimum (S). Lin cutévé, Lin commun (F). Common flax (E). Echter Lein, Gemeiner Flachs (D). Lino usuale, Lino comune (I).
هو الكُتَان الزراعي الصناعي المشهور - شروبه عديدة . جلوده وثنية متوسطة الانشعاب . ساقه متصبة فراءة تملو من ٤٠ الى ١٢٠ سم. أوراقه سنانية النصل ، غشراء اللون . أزهاره الى البياض او الزرقة الباجوشية . ثمار جرداء كروية مقطوعة الرأس والمقعب ، عشارية المصاريم وفي كل مصراع بذرة . والبذرة مألقة ، لائقة ، حمراء اللون ، مغلطقة : تطوي من ٤ الى ٦ م. وتعرض من ٢ الى ٣ م. لياها زهبي اللادة يتبع من ٢٢ الى ٤٢ ٪ من الزيت . يقال انه من اقدم النباتات الصناعية لان زراعته وصناعتها اليافه في بلاد ما بين النهرين وفي مصر تمتد الى ابد من اربعة الاف سنة || زراعته الحالية فيسحة الاجزاء تشمل الولايات المتحدة والاربعين وروسيا وبوليفيا ولتوانية والمانيه وفرنسة وهولنده وبلجيكا وركيا || وهو موجود في الاقاليم المعتدلة ويفضل المناخات الرطبة حل الجافة والاعوام العذبة البشيرة اليوم على الصافية الادم || وهو رطب في الارية الخصبه اللدنية المنسوبة التركيب الحكسي ، المتوسطة الاندماج ، لانه من النباتات القشره التي تستدق كل ما وصل اليها من العناصر العضوية والمعدنية || يذو عادة في اوائل الربيع ويقتل حشاشا تصفر سوه وقد يكون ذلك في اوائل الصيف . فيترك في الحقل بلمة ايام الى ان تجف سوه ثم ينقل الى المصارب حيث تفصل البذور من السوق . اما الالياف الصناعية للتسيجة تفصل من السوق اما بواسطة الحرارة في مامل خاصة مجهزة هذه الناية واسا بواسطة الماء وهو ما يسمونه التطنين وقد يتم بنقع حزم سوق الكُتَان بالماء ارا مدة من الزمن تقروها حرارة المقيح لكنها صدياً تراوح من اسبوع الى اسبوعين .



كُتَان بَرِّي



كُتَان شَاخ



كُتَان سَهْل



كَثْرِيَش

٢٣٢٧٠ - كُتْلَبَةُ صِيْغِيَّةَ

Catalpa bungei (S).

Catalpa de Bunge, Arbra puant (F).

نوع من الكتلة بهذا الصن. تجربها صغرة اللقد تملو من ٧ الى ١٢ م. اوراتها رعية الشكل مقبولة القاعدة . نصلها بطول نحو ٢٠ سم. ويبرس ١٤ وهو ماس البشره على المروق حل الصفحة للشل . انزلها طول نحو ٤ سم. وقمرس ٥ سم. لوها الى اليهاش الشح بالاصفر والجلوي . ثمارها مخروطية طول من ٢٥ الى ٤٠ سم. ازهارها يستمر طوال شهر حزيران .

٢٣٢٧١ - كُتْلَبَةُ ظَرْفِيَّةَ

Catalpa speciosa (S).

Catalpa elegant (F).

نوع من الكتلة وهو شجرة سرية التمر تملو من ٢٠ الى ٣٠ م. مهذا أمريكية الشالية . ساقها مستقيمة فرصاه . اوراتها طول نحو ٣٠ سم. وقمرس ١٨ سم. نصلها ذوب المقصدة المستطيلة . ازهارها مقنودة التجميع . كبيرة اللقد طول نحو ٧ سم. وقمرس نحو ٨ سم. لوها الى البياض المرقط بالاصفر . ثمارها طول نحو ٥٠ سم. ازهارها يستمر طوال شهر حزيران .

٢٣٢٧٢ - كُتْلَبَةُ يَابَانِيَّةَ

Catalpa ovata (S).

Catalpa du Japon (F).

نوع من الكتلة السبرية مهذا اليابان . تجربها صغرة اللقد تملو من ٦ الى ١٠ امتار . اوراتها ثلاثية اوخاسية التفصيص البيضي الشكل . نصلها بطول نحو ٢٠ سم. ويبرس ١٥ سم. ازهارها صغرة اللقد ، صفراء اللون ، ملطخة بالبيضي . ثمارها مستطيلة دقيقة كالاصابع . ازهارها يستمر من حزيران الى تموز .

٢٣٢٧٣ - كُتْلَبَةُ صَفْرَاءَ

Immortelle des sables (F).

هي الخالية الطاقية ، الحلبا .

٢٣٢٧٤ - كُتْلَبَةُ هَوَاةَ

Masse d'air (F).

Mass of wind (E).

تعريف جيولي يدل على مجرى الهواء المتحرك في اتجاه معين .

٢٣٢٧٥ - كُتْمَ

• نبات جبلي ورقة كورق الآس يفض به مقفوا وله ثمر كمر القفلل ويسود اذا لضع وله يستمر منه دهن (١. م.) .

٢٣٢٧٦ - كُتْنُ

Tubercularia (S).

جنس فلور مجهرية من عارة الوطنيات وفصيلة الكنتيات . جرابها الكندي كثير الفروع البامدة الترتيب . كنفاده وسيدة الخلية ، كروية او اسطوانية الشكل . وسادته بجنية تيمو عند انفلاها خلية اللؤلؤ زاهرة اللون || انواعه قليلة . اعرفها الثلاثة التالية .

٢٣٢٧٧ - كُتْنُ الإِجَاصِ

Tubercularia pircicola (S).

نظر مجهري يركب البار المنقوشة . لفرونة اخصها الاجاص وانتفاخ || ينشط ويتكاثر في بيئة خاصة سرارها تفروق الاربع درجات ستيفارد وروطها من ٨٠ ٪ / وصاحه || مظهره الخارجي نندت خلي آخر اللون ، ابيض الملوخ ، يركب البشره فيطبلها ثم ينور في الب ينفعه ويبره .

٢٣٢٧١ - كُتُسُوسُ

Chatossus (S).

Chatossus (F). Chatossus (E).

جنس اسماك بحرية زهرية من ملتحات الائمة وفصيلة الصابوشيات . انواعه المعروفة عديدة معظمها بحري وبعضها بحري . والبحري منها يلزم البحر في زمن الاسراء || اجسامها اهليجية الشوزن ، طول من ٢٠ الى ٢٦ سم. وروصها صغرة ، مثثلة الاشداق . صيوتا ماصة . زانفها الظهري صغرة ، شبه مزوانية . الصدوية والخرسية صغرة . الشرجية مستطيلة . الليلية فارقة . انواعها متقاربة تسر في القسم الاحل وتندر في الاسفل || يكثر وجودها في الهند والصين واليابان || حوربها مأكولة وبعضها جيد الصنف .

٢٣٢٧٢ - كُتْسُيُولُ

Catéchol (F).

بلورات ابرية حامدة اللون براقه تستخلص من الكاشو والفيسر والطلان الخ ... تفل عت ١٧٧/١٧٥ سم.

٢٣٢٧٣ - كُتْهَادُ

Cernier (F).

سمكة بحرية تدعى قباب ، احلبا .

٢٣٢٧٤ - كُتْفَ ، عَاتِقُ ، مَنَكِبُ

Epaule (F). Shoulder (E).

الجزء العلوي من النصف .

٢٣٢٧٥ - كُتْشَانُ

الكثبان الجراد اول ما يطير . ويقال هو الجراد يمسد للدواء اوله السرد ثم اللب ثم اللقواء ثم الكثبان . الواحدة كفتانة .

٢٣٢٧٦ - كُتْكُوتُ

Poussin (F).

هو القروب والصومس .

٢٣٢٧٧ - كُتْكَلَزُ

Catalase

خيرة نباتية تيمس على انتاج واتزان هيدرات الاوكسجين في النبات .

٢٣٢٧٨ - كُتْلَبَةُ

Catalpa (S).

Catalpa (F). Catalpa (E). Trompetenbaum, Trompetenstrauch (D). Catalpa (I).

جنس نباتات برية ورتبية من فصيلة البننويات . انواعه المعروفة ا جميعها اشجار صغرة او متوسطة اللقد . سطها مستقيمة . اغصانها فارقة . اوراتها بسيطة ، حابلة ، متفائلة . نضفانها النصل . ازهارها جربية الشكل . ثمارها جرد مستطيلة كالحيار || اعرف انواعه واشهرها ما يتبع .

٢٣٢٧٩ - كُتْلَبَةُ شَالَمَةَ

Catalpa bignonioides (S). Catalpa commun, C. de la Caroline (F).

نوع من الكتلة الحرجية السبرية المبالولة مهذا أمريكية الشالية . ساقها تملو من ٥ الى ١٥ م. اوراتها كبيرة اللقد ، بيئة الفصوص ؛ نصلها بطول نحو ٢٥ سم. ويبرس نحو ٢٠ وهو ازغب المروق كربه الزائفة عند المس . ازهارها مقنودة التجميع طول نحو ٥ سم. وقمرس نحو ٦ . لوها الى البياض المرقط بالاصفر والاحمر . ثمارها طول من ٢٠ الى ٤٠ سم. وقمرس من ٦ الى ١٥ || ازهارها يستمر من حزيران الى آب .



كلته شالمة

تعيش على الصخور المشورة قرب الشواطئ || أصدافها داخلية رقيقة صفيحة . أجسامها لحمية ، بيضية الشكل أو اهليلجية تملأها الاديعة الغففاضة . غشايمها عينية الاوتكاظ نظامية الترتيب الثنائي الصف . افواها عظمية الشكل . لواسها ثنائية انبوية مفلوجة السطوح الخارجية .

٢٢٢٨٧ - كَتِيْمِيَّات (S). Pleurobranchidae (F). Pleurobranchidés (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرغويات مميزات الارجل خلفيات الغشايم . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع بحار العالم || دويباتها تتميز باصدافها الرقيقة الصغيرة التي تلمس الظاهر . غشايمها هدية يميلية الارتكاز . افواها عظمية الشكل و ثنائية القواسم الانبوية المفلوجة من الخارج || اعرف اجناسها واشهرها الكتيمة والغسوجة والندبة .

٢٢٢٨٨ - كَتِيْلَة

الكتيلة هي النخلة فالت اليه . ج كئائل .

٢٢٢٨٩ - كَتِيْن * ، كَتِيْنَة (F). Catène (F). Catena (E).

مجموعة تراكيب لاقامية التركيب الحكمي جمعها العوازل الطبيعية تميزت بوسطها للشكلية .

٢٢٢٩٠ - كَتِيْهَة Lotier corniculé (F).

هي القرص القرني ، اطليه .

٢٢٢٩١ - كَتَّاه Brachycome (F).

هي البراكيم ، اطليه .

٢٢٢٩٢ - كَتَّاب * ، زَقْرَاقُ النَحْص *

Sarciphorus (S). Sarciphore, Vanneau à caroncule (F).

جنس طير من طوائف الساق وفصيلة الزرقاقيات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطائها بعض الفلوات الافريقية القريبة من مجاري الماء . ملجئها الحيالي جماعي . قوتها الخشرات والذوايت الصغيرة والذباب . تتميز بسرعة عدوها على الزوال || اجسامها صغيرة القدة ، متراكبة الالوان الجميلة ، فيها الاخضر والاسود والجلوي والاشهب والابيض . رؤوسها صغيرة . مناقبها مبطلة الصفحات السفلى وتعلوها في قواعدها انمليا لخص صغيرة لحمية المادة . اجناسها لاشعة . افذاظها شديدة الصغر . سيقانها دقيقة حمراء اللون كالنمل .

نوعها المرفوان :

٢٢٢٩٣ - كَتَّابُ السَفَال * Sarciphorus cecus (S). Sarciphore du Sénégal (F).

٢٢٢٩٤ - كَتَّابُ الصِيَال * Sarciphorus latifrons (S). Sarciphore des Somalis (F).

٢٢٢٩٥ - كَتَّاه Crème (F).

هي القشدة ، المادة السنية في الحليب .

٢٢٢٩٦ - كَتَّاه Roquette (F).

هي الجرجير من احرار البقول ، اطليه .

٢٢٢٩٥ - كَتَّافَة Densité (F). Density (E).

هي مقدار الشيء في وحدة معينة . كترك ١٠ شول في المتر المربع .

٢٢٢٧٨ - كَتَّنُ البُحْس *

Tubercularia versicolor (S).

فطر مجهرى يعيش على اغصان البقس اليابسة وقد شوهد على لحاء المطاط في الاوشنا .

٢٢٢٧٩ - كَتَّنُ شَالَع *

Tubercularia vulgaris (S).

فطر مجهرى دني يكثر في الخريف والشتاء . يركب لحاء الاغصان اليابسة في غلاف الانجبار الحربية والمشرية .

٢٢٢٨٠ - كَتْنَة ، كَوْبَالِيَة

Hymenaea verrucosa (S). Copalier, Hyménée ver-rucuse (F). Gum copal tree (E). Henschrecken-baum (D). Imeneo (I).

شجرة حرجية من فصيلة القرنيات . مهدا افريقية الجنوبية وبمفسكر . ساقها كثيرة الثمول متوسطة الارتفاع تملو نحو ١٠ اثمار . غشها صلب المكسر احمر اللون مرفوف فيه . يستخرج من ساقها بالثقب عصارة صفية رائتجية صفراء اللون فواحة العرف المستحب تدعى كويال شائعة الاستعمال الصناعي .

٢٢٢٨١ - كَتْنِيَّات (S). Tuberculariaceae (E).

فصيلة فطور مجهرية من مرتبة الهيفانيات ورثة الزوييات . اجناسها وانواعها عديدة تجمعها حمارتان : الطحانيات والطحانيات .

٢٢٢٨٢ - كَتْنِيَّه Tuberculina (S).

جنس فطور مجهرية من عارة الطحانيات وفصيلة الكتيات . جراه الكتيدي بسيط التركيب قليل الفروع . كتائده وحيدة الخلية كروية او اسطوانية الشكل || انواعه قليلة العدد والاذى تركب اوراق بعض الصنوبريات والاجاص البري فتوشها بيض صغير للقد لونها الى الحمرة البنفسجية .

٢٢٢٨٣ - كَتُّوم Imperméabilité (F).

Impermeability (E).

الكثوم والكثام هي خاصة سلك الماء في بعض انواع التربة . وهي من هيوب القربة الزواحية لانها تجعلها شديدة الصلابة والاندماج .

٢٢٢٨٤ - كَتُّوم ، كَتِيم ، مَكْتَام

Imperméable (F). Impermeable (E).

نمت وصفة التربة التي تمسك الماء .

٢٢٢٨٥ - كَتْبِيْلَة Kitzibella (S). Kitzibelle (F).

جنية معمرة برية وتزبدت من فصيلة الهيازيات معروفة الترفيد على اسم اليوناني المتهاري بولس كيتيل (١٧٥٧-١٨١٧) ساقها فراء تملو من ١٥٠ الى ٢٥٠ سم . اوراقها متمالة خامية التفتيص . نصلها جيل الخصار . مسن الحافة . ازهارها ابطية الارتكاز ، كبيرة القدة ، خامية البتلات ، يضاء اللون .

٢٢٢٨٦ - كَتْبِيْهَة Pleurobranchus (S). Pleurobranche (F). Pleurobranchus (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات مميزات الارجل خلفيات الغشايم وفصيلة الكتييمات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة والمعتلة الحارة .



كتيلة



كتاب

Amphicoma (S).

Amphicome (F).

يحمل نباتات عشبية برية معمورة من فصيلة البينيفيات .
أنواعها للبرودة قليلة . سبواها تملو من ٢٠ إلى ١٠٠ سم .
أوراقها متناقصة . ريشية ورقية . أزهارها عتقودي التجميع ،
طرفي الأبتكار . أزهارها حرسية الشكل متدلية ، مستطيلة
الأنابيب ، خالية البشرة ، وردية أو برتقالية اللون . حب
ثمراها يشبه بين الجراد . جلودها لحمية غليظة مستطيلة
يقال أنها ناعمة .

Orcanette tinctoriale (F).

٢٣٣١٢ - كَحْلَاء

هي الشجيرة الصبغية ، الطليخ .

Sape marron, Rousseau (F).

٢٣٣١٣ - كَحْلَاء

هي الجريدية ، سمكة مشهورة ، الطليخ .

Alcool (F).

Alcohol (E).

كلمة عربية الأصل تطلق على طائفة من المركبات العضوية
المائلة للتطاير المتشابهة الخواص || حرف الإنسان
الكحول منذ زمن بعيد . وهي على أنواع عديدة أشهرها
الكحول الايثيلي أي كحول النعنب والبنار والمواد السكرية
والنشوية والكحول الميثيلية أي كحول الخشب || فالكحول
الايثيلي النقية سوائل عديمة اللون ، قليلة الرائحة التبريدية ،
لاذعة الطعم ، تحوي ٩٥ ٪ من الكحول و ٥ ٪ من الماء .
وهي تغلي في ٧٨ ٬س ٬ وتحتل بالماء بآية نسبة كانت
ومن خواصها أنها تذيب أكثر المركبات العضوية
وبعض الاملاح المعدنية وهي تشتت في الهواء . تستعمل
كسوريات روية وفي المركبات البنية وفي صناعات
كثيرة || أما الكحول الميثيلية فهي تستعمل من نشارة الخشب
بعد معالجتها بمحاض الكبريتيك المركز . وهي تستعمل
كوقود وفي مختلف الصناعات والعلاد والطب .

Alcool éthylique (F).

Ethylic alcohol, Ethyl alcohol (E).

يوجد بكميات قليلة في بعض ثمار نباتات الفصيلة
الصلبانية وهو يتكون خاصة في أثناء التخمير الكحولي
الذي يبين على المواد السكرية المختلفة .

Alcool amylique (F).

Amyl alcohol (E).

كحول يستخرج من البطاطا والشونيز والبنار والحبوب بعد
تخميرها .

Alcool méthylique (F).

Methyl alcohol (E).

ويسمى روح الخشب كحول يستخرج من الأخشاب الخشبية
واللبنية المختلفة .

Alcool absolu (F).

Absolute alcohol (E).

هو الكحول الصرف حيار ٩٧ ٬س ٬

Alcool dénaturé (F).

Denatured alcohol (E).

أنواع من الكحول يوجب القانون تسميتها بالظنون منأ
لاستهلاكها في المشروبات الروحية .

٢٣٣١١ - كَحْض

Pomme (F). Apple (E).

الكلمة : ثمرة التفاح . ج. كل .

Pommé (F).

Grown to a round head (E).

٢٣٣١٧ - كَحْضِي ، كَحْضِي

ما كان شكله شكل التفاح .

Corbeille de fleurs (F).

٢٣٣١٨ - كَحْشَة

Dune (F). Dune, Sand-hill (E).

٢٣٣١٩ - كَحْشِيْب
رياح تسفروا الأرياح لا تستقر على حالة . ج. أكبة
وكبيان .

Polyvalent (F).

٢٣٣٢٠ - كَحْشِيْر التَّعَادُلْ

Adragant (F).

٢٣٣٢١ - كَحْشِيْرَاه

راجع اسطرغالوس كثيره .

Astragale gommifère (F).

٢٣٣٢٢ - كَحْشِيْرَاه بِمِشْمَاه

راجع اسطرغالوس ديق .

Polychètes (F).

Polychaeta (E).

٢٣٣٢٣ - كَحْشِيْرَات الخُشْب
رقة من الحلقيات المفرديات . فصائلها وأجناسها وأنواعها
عديدة . جميعها بحرية . تتميز بفتوحها الكثيرة الخشب
وبرؤوسها الواضحة الملام وبوجود التخلخيل والأبريل
والأولاس . بعض أنواعها يفرز مواد قصفورية تنفخ في
الظلام . سلف أنواعها منفصل الشق وبضها عتودي ||
وهي تقسم إلى قسمين : كثيرات الخشب الجواله وكثيرات
الخشب الركينة . فالجواله تجوب الشواطئ وتعيش على
الزبل وبين الحصى والصخور والفوس والضرع ... أما
الركينة فتعيش ضمن أنابيب كلية المادة أو في أنفاق
تحتفرها في رمال القاع وتطبخها بمادة كلية أيضاً .

Mille-pattes (F).

٢٣٣٢٤ - كَحْشِيْرَة الأَرْجُلْ

صنف من الحيوانات المفصلي يعرف بالخداعيات . راجعها

Dense

٢٣٣٢٥ - كَحْشِيْن

صفة ما كان لبد الشيء .

Endophyte (F). Endophyte (E).

٢٣٣٢٦ - كَحْشِيْ ٥
لغت تعريفي يطلق على كل حي يعيش داخل حي آخر
أن من الحيوان أو النبات أو من الاثنين معاً كالحشرة
التي تعيش داخل الثمرة أو الشجرة .

Cajan (F).

٢٣٣٢٧ - كَحْشِيْوُسْ

هو الكنيس ، الطليخ .

Alcométrie (F).

٢٣٣٢٨ - كَحْشِيْة ٥

هي قياس الكحول .

Vipérine rouge (F).

٢٣٣٢٩ - كَحْشِيْة

هي الاخوين الخمرى ، الطليخ .

Raisin vert (F).

٢٣٣٣٠ - كَحْشِيْ

هو البروق أي المحصر من نهاية طور الحوصلة . يقال
كعب الكرم وأكعب اذا لوح منه . واحدته كمية .

٢ الى ٤ سم. رؤوسها صغيرة ، ملحقة . حيويا بارزة .
تأثيرها وولادتها نظامية . قرونها الاستثمارية دبوسية
الاطراف ، مركبة من ١١ فصلة . كوالها نصف دائرية
الشكل . انحدارها لاسقة . قوائمها نشيطة . ارساها خاسية
المقل . اثنائها ملونة || جميعها واشمة تعيش على الازهار
وتغني بيئاتها الشري تحت الحاء . يرقاتها مؤذية تقضم
تخوت الازهار والمبيض والجرح وتقتضي عليها || اشهر
اجناسها الكحيصة .

Eternuement des bêtes (F). كدأص
Sneezing of beast (E). هو عطاس البهائم .

Moyette, Dizeau (F). كدأصة
Hay cock, Shock, Stook (E). مجموعة حمامات من الحصيد تهرم وتكسح وتحط وريها
تُدْرَس .

٢٢٣٣١ - كدأل مُتَوَجَّه
Gubernatrix orietacella (S).
Commandeur huppé, Cardinal vert (F).

طائر من فصيلة التشرشوريات ورتبة الجواثم غروريات
الناحية . موطنه بعض مناطق امريكا الوسطى ومنها البرازيل.
يألف الغابات والاحراج القريبة من الماء . نظامه الحياتي
جماعي الا في زمن الترعيم || جسمه صغير اللد ، يطول
من ١٨ الى ٢٥ سم. ثوب الذكر متراكب الالوان الجميلة.
ظهره الى الشبهة انقراض اللوح . صدره ورطبه ولواصف
جناحيه وافيحه الى الصفار الزاهي . قبتيره ورأسه ورطبه
الى السود الاسفع . متفاده حطلي القرن . رسده الى
السرة السوداء . أما الانثى فصدرها الى الشبهة وظهرها الى
الغضار البامت . صدفاها وصبرها الى البياض العاجي ||
قوته الحشرات والبلود . يألف حياة الاسر ويعيش
ويتكاثر في القفص شرط ان يكون فسيحا || يذئن عشه
بين اثناد الاشجار القريبة من سطح الارض . الانثى
تحضن حل مرتين في الحول . حشنتها من يرضين حل ثلاث
بيضات تقوم برعيها دون الذكر الذي يولن لها الغذاء .

Mouvement (F). كدأمة
Movement (E). الكدامة هي الحركة ، اطلبها .

٢٢٣٣٢ - كدأمة
Leptodactylus (S).
Leptodactyle (F). Leptodactylus (E).

جنس ضفادع قاذبة من فصيلة الكدديات . انواعه المعروفة
ستة مهدا المناطق الاستوائية الامريكية || اجسامها
صغيرة اللد تطول من ٦ الى ٨ سم. عند الذكور من ٧
الى ١٠ سم. عند الاناث . رؤوسها معتدلة الطول والعرض
حيوتها مستديرة جاحطة . فكوكها السفلى عادمة الانسان .
اصابع قوائمها الخلفية نصفية الخطاب . جلودها مثاقلة
دقيقة الشعر || اثنائها الى السرة انقراض المابتة الازمة
تلعوا رقشة جزوية على الظهر ، صفراء على البطن ||
تعيش قرب الخنادق ويجاري الماء اكثر من عشرة احوام .
تسرح في الليل وتبيت في النهار بين اوراق النبات او في
الناقع . قوتها الحشرات والديدان || الانثى تقرأ نحو ٥٠٠
دعيلة في شلة تطرحها في مكان منتخب قليل العمق لا
تتجاوز مساحته المتر المربع الواحد تطوقه بالسبال واخر
والنباتات المائية المختلفة .

٢٢٣٣٠ - كحولاز ، زيمزاع

Alcoholase, Zymase (F). Alcoholase, Zymase (E).
خيرة كياوية تحول السكر على اختلاف اشكاله الى كحول
وطاز كربوني .

Spiritueux (F). كحولوي
Spirit, Spirituous (E).
نعت تعريبي يطلق على السوائل التي تحوي بعض الكحول .

٢٢٣٣١ - كحيتية
Seilbells (S).
جنس فلور مجهرية من عارة الخنثيات وفضيلة الكحيثيات .
يتميز بكريماته المستطيلة القصبان اللبوسية الرأس .
بورناته كروية الشكل ، صغيرة اللد || انواعه المؤذية
قليلة اهرها كحيبة الشاي .

٢٢٣٣٢ - كحيتية الشاي
Seilbella theae (S).
فطر مجري يتطفل على اثناد الشاي . مظهره الخارجي يقع
خلية زياء تشبه القنابر تركب لها الافناد . تيمو وردية
اللون ثم يبيض . مضجحه يسير في الارضية وقد يستقر في
قرب الانثان فيؤثف فيها ويسبب يباسها || يكافح
(١) باقطار الاغصاء الموصية وحرقتها . (٢) بتطهير
الجرح . (٣) بتضييق التربة لصرف المياه الزائدة التي
تسبب هذا الورم .

٢٢٣٣٣ - كحيتية
Seilbaceae (S).
Seilbaceae (F).
فصيلة فلور مجهرية من رتبة الميفانيات ورتبة الزوييات
تتميز بكتلتها المجرية الى كرميات . حينها لا نظامي
الارتكاز من المستتب الخوازي ومن المتشابك اللاتياحي
التربيع . شجيتها فرعي اللؤلؤ . يورثها قلادية التنجيح .
اجناسها عديدة تجمعها عمارتان الخنثيات والمفانيات .

٢٢٣٣٤ - كحيتية
Cryptae (F). Cryptae (E).
كحيبة ج كحيثات . الكحيثات ، جسورياً ، اسم
يطلق على هذبات صغيرة او الانبيس نحيلة ، غير نافذة ،
تلتصق في الفتاة الخسبية عند بعض الحشرات .

٢٢٣٣٥ - كحيتية
Fauvette orphée (F).
طائر من الدسلل ، اطلب دخلة غريبة .

٢٢٣٣٦ - كحيتية
Phalacrus (S).
Phalacre (F). Phalacrus (E).

جنس حشرات واشمة من فصيلة الكحيثيات ورتبة هذبات
الاجنسة . اثنائها المعروفة متوسطة اللد منتشرة في بعض
المناطق الجارية والمعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة ،
بيضية الشكل ، تطول نحو ٣ سم. رؤوسها غروروية ،
صغيرة . حيويا بارزة . تأثيرها وولادتها نظامية . قرونها
الاستثمارية دبوسية الاطراف . كوالها عمودية نصف
دائرية الشكل . انحدارها لاسقة يطولها تضديد نحيل
قاطب . قوائمها نشيطة . اثنائها ملونة || جميعها واشمة
تعيش على الازهار . يرقاتها تقضم تخوت الازهار ويبسهاها .

٢٢٣٣٧ - كحيتيات
Phalacridae (S).
Phalacridae (F). Phalacridae (E).

فصيلة حشرات واشمة من هذبات الاجنسة . اجناسها
وانوعها المعروفة متوسطة اللد منتشرة في معظم اقطار
العالم || اجسامها صغيرة ، بيضية اللون . تطول من



كحيبة الشاي



كحيمة



كُدُوَّة الارز

24347 - كُدُوَّة Lentour (F).
Slowness, Tardiness (E).
يقال كدت الارض اذا بطل نباتها . وربة كاداة اي بطيئة الانبات .

24348 - كُدُوَّة Leptosphaeria (S).
جنس فطور مجهرية من السخاميات وفصيلة المشويات . تتميز باصنافها القادرة في نسج النبات للنحار وحبوبها الوشي الشكل الملون والتبدد الزئالي المخرشة في انواعه عديدة اشهرها ما يتبع .

24349 - كُدُوَّة الارز

Leptosphaeria salvinii, Helminthosporium sigmaeum, Sclerotium oryzae (S).
فطر مجهرى يركب الارز في جميع اصفاء الحولية مودبة ويحيطها || مظهره الخارجي يقع صغيرة مستديرة مودبة ، لون غورها الى الخمر ثم يزداد اسمرارا مع اقترابه من الاطوار الاخضر || تركب المصغ والسوق والنبات || اغراضه تختلف باختلاف انتشاره واذا || يكافح بتطهير الشلب للمد الى البذر .

24350 - كُدُوَّة الحنطة

Leptosphaeria tritici (S).
فطر مجهرى يركب صنف ازروع وانصبا الحنطة ثم الشعير والشونان والشليم || مظهره الخارجي يقع صفر تنشر على المصغ والاعقاد تنسب جفافها الباكر . اغراضه تقوم على مدى نتائج انتشاره لانه يبق على نمو ويحد من نشاطه .

24351 - كُدُوَّة السقندر

Leptosphaeria rusci (S).
فطر مجهرى يصيب بعض انواع السقندر وانصبا السقندر الاربع || مظهره الخارجي نكت كثيفة لعلولية الشكل تكثف الانقاد تنسب ذبها ويغلفها || يكافح باستعمال سائل يورود وغيره من السوائل السلفوكسية .

24352 - كُدُوَّة السلمج

Leptosphaeria napi, Pleospora napi, Alternaria excruciosa, A. brassicae, A. herculea, Macrosporium brassicae, Sporodemiolum excruciosum, S. brassicae (S).
فطر مجهرى يصيب بعض النباتات الصليبية وانصبا السلمج والقت والمقوف والقيل ... || مظهره الخارجي يقع شخر تملو سطح اللادة الخضراء في السوق والاوراق وانفريبات تنسب يباس التسج ويغلف انفريبات وتحميدها وانفلاتها || وبهم من قال ان حفن جلمور الاقت يمد الى هذا الفطر الذي يتكاثر بسرعة مدهشة اذا لامته المومال الجدية وانصبا المولوية || يكافح بتطهير البذر .

24353 - كُدُوَّة الشونان

Leptosphaeria avenaria, Septoria avenae (S).
Malaria des taches sombres (F).
Oat leaf spot (E).
فطر مجهرى يركب صنف الشونان فيؤذي وبه الى نمو . مظهره الخارجي يقع صغيرة مبدرة على نصال الحنط ، تبدو اقل اخضراراً من النصل ثم تفسر بعد ان يملوها في وسطها نكتات خلية يضاء || اغراضه زهيدة لانه قليل الاذى والاسامة .

24354 - كُدُوَّة الصَّجَمَان

Leptosphaeria herpotrichoides, L. culmifraga, L. amphibola (S).
Pétiole-verse des céréales (F).
فطر مجهرى يركب سوق ازروع انصبا الشليم والحنطة

24344 - كَدَامِيَّات Leptodactylidae (S).
Leptodactylidae (F).
Leptodactylidae (E).

فصيلة حيوانات ديداء قازية من الطيات السويات ورتبة البتراوات اي ديداء الذب || اجناسها وانواعها عديدة . مدها امريكة البصل واسترالية . مظهر انواعها قازب وبها البري والمالي والشاجر والباس . جميعها سفة التكره العليا ، عادمة الانسان في السفل . وقرة صيرها شبه غالية من التثواء الضفية الجانية || اشهر اجناسها واعرها الكدامة والاوزيا والهيلود والسيراثيريس .

24345 - كَدَان Schiste (F).
Schist, Slaty rock (E).
اتربة صفيحية التركيب متراصة متوازية صلبة المكسر .

24346 - كَدَر Lie (F).
Loes, Dreg (E).
كل مادة ترسب في قعر الابوية التي تحفظ فيها المشروبات الكحولية ويورها كالمخمر والزيت .

24347 - كُدُوَّة Ganga cata
طائر من الطا يعرف بقطة كدرية وبهم من قل كدارية . الجلس كدرى وكدارى وكدر .

24348 - كَدَس ، كَدَس Botteage (F).
Tying up in bundles (E).
جعب الحشيش واملها الى اكادس .

24349 - كَدَس ، كَدَس Entasser (F).
To hoard up (E).
جمل الشيء كدسا بضمه على بعض .

24350 - كَدَم Tondre le gazon (F).
To mow a grass (E).
كم اخضر جزء بالكداة او المكمة .

24351 - كَدَم نوع من الجراد سود الاجسام خضر القرووس الواحدة كمة .


24352 - كَدَمَة Brebis grasse (F).
Fatted ewe (E).
نجة سمينة غليظة .

24353 - كَدَمَة Ecchymose (F).
Ecchymosis (E).
أثر نفسي او اجر اللون يظهر في الجلد عقب جرح او رضه سببه انكساب الدم تحت الجلد .

24354 - كَدَمِيَّات Cadmium
معدن ثنائي الذرة ابيض اللون ، ازرق الملوأ ، لدن المادة ، قابل التصفيح ، شديد المظولية ، اصلب من القصدير . ثقله النوعى براوح من ٨٦٠ الى ٨٦٩ ريزه (كـ-كـ) وزنه الانبى ١١٢,٤١ ينصهر تحت ٢٢٠ مس . ويبل في ٨٦٠ مس . يغاره ذائقي ، شديد الاذى ، يرتقالي اللون ، يتكثف بلورات ثمانية الارجح من المدن التي الحر . وهو يذوب في بعض الموماس منها الكبريتي والازوتي والكلوريدىكي .

24355 - كَدَن Frutescent (F).
Grazz (E).
نمت تمرين يدل على الاصول الصلبة في النباتات الجنية .

24356 - كَدَه Talure (F).
عارض فيزيولوجي يعترض حلاء الاجمار .



كُدُوَّة الحنطة



كُدُوَّة السلمج



كُدُوَّة الشونان

٢٣٣٦٣ - **كُرَاب ، كُرَاب** Scarflage (F).
هو السلف أي الخرت السطحي يبعثر ذرات التراب ويقتد المدر ولا يقلب التربة .

٢٣٣٦٤ - **كُرَات**
شجر كبير بجبال الطائف . الواحدة كرات (١ م.) .

٢٣٣٦٥ - **كُرَات البَرَّ ، طَيِّطَان**

Allium vineale (S). All des vignes, Porreau sauvege, Porrette (F). Crow garlic, Crow onion (E). Hundslauch, Feldlauch (D). Aglio cipolla (I).

نوع من الكرات البري ينمو في الكروم . ديوسته مستديرة مسطحة . أوراقه مستطيلة تعرض من ٨ إلى ١٥ سم . لونها إلى الأخضر البهري السابق . شراخه الزهري يعلو نحو ٦٠ سم . نورة صيوانية كروية الشكل ، أزهارها إلى الأبيض الوردى المواج .

٢٣٣٦٦ - **كُرَات الدُبَّ** Allium ursinum (S).

All des ours, Ail des bois (F). Bear's garlic, Ramsons, Wild-leek (E). Bärenlauch, Wilder Knoblauch (D). Aglio confoglio pedunculata (I).

نوع من الكرات البري الميزيل . أوراقه مستطيلة مستعرضة . شراخه يعلو من ٤٠ إلى ٨٠ سم . نورة صيوانية كروية ، أزهارها غبراء اللون ودية المواج .

٢٣٣٦٧ - **كُرَات الصَّخُور ، كُرَات إسبانيا**

Allium scorodoprasmum (S). Ail rouge, Rocambole, Ail d'Espagne (F). Rocambole, Sand leek, Spanish garlic (E). Graslach, Rocambole (D). Aglio di Spagna, Scalogno di Spagna (I).

نوع من الكرات للمسمر . شراخه الزهري ينتهي بنورة صيوانية كروية تكتنفها الأوراق الزهرية والفصوص الخلفية الشكل . أزهارها إلى الأبيض الأخضر يعلو مواج أحر . زراعته شائعة في أروبة وهو أقل مادة حريفة وفعالة من الثوم . يتكاثر بالفصوص لأنها أصغر وأسرع من البزور . يوجد في جميع الأتربة غير أنه يفضل الدبالية .

٢٣٣٦٨ - **كُرَات حَسَكُون ، كُرَات أُنْدَلُسِي**

كُرَات أَبْرُ شَوْشَة ، قَلَنْطُوط

Allium ascalonicum (S). Echalotte (F). Ascalonian garlic, Shallot (E). Eschlauch, Schalotte (D). Cipollina, Scalogno (I).

نوع من الكرات الزراعي الشائع الاستعمال . زراعته من البزرة إلى الدفوعة تستلزم ثلاث سنوات . يوجد أيتها زرع ولا يختار سوى الأتربة الكلسية . يقال أنه طيب ويستعمل كطارد للديدان المعوية .

٢٣٣٦٩ - **كُرَات مَعْرُوف ، كُرَات رُؤْمِي**

Allium porrum (S). Poireau, Porreau (F). Leek (E). Lauch, Porree, Porrei (D). Porro (I).

بقلة زراعية معولة شائعة الزراعة والاستعمال . يصلها اهليجية الشكل . أوراقها قرصية متتابعة حاشية ، نصلها مستطيل المسطحة عابق الخضار . شراخه الزهري يعلو نحو ٦٠ سم . ينتهي بنورة صيوانية كروية الشكل أزهارها إلى الحمرة . يرغب في الأتربة الدبالية لتنسجه الاندماج . يندر في أكواد خاصة وينقل إلى مستقره عندما يبلوغ ارتفاعه نحو ١٥ سم . تقطع أوراقه وتكدم جلوره ثم يصار إلى غرسه .

والشعير والدونان فيسبب قصفها في ايان تحبيب السنايل او قبل تمام الادراك || مظهره الخارجي بقعة حمراء مستطيلة تكتنف غدة الشراخ فالحالية الاول حيث تطبق جدار القصبة . ثم يعلو مع الزرع من غدة إلى غدة بعد ان يدخل في التربة حتى مستوى الجذور الاول فينتقلها بنشأة فسمية لبنة تتفرق التبادل السني ان لم تقف عليه .

٢٣٣٥٥ - **كُدوة الفَصَّة**

Leptosphaeria circinans (S).

نظر مجهرى يصيب الفصاة فيؤذيها ويشل نشاطها . مظهره الخارجي بقع خلية بنفسجية اللون لاقياسية الشكل والحجم تركب الجثث والجذور فتعطى وتشل نشاطها وقد تسبب ذبول النبات وموته || لم تنجح فيه مكافحة حتى الآن .

٢٣٣٥٦ - **كُدوة المُرَّ**

Leptosphaeria musarum (S).

نظر مجهرى يركب اوراق الفصاة فيؤذيها بعض الشيء . مظهره الخارجي لطح خطية لاقياسية الشكل والحجم تركب نصل الاوراق وتسبب جفاف النسيج للمحار || أضراره زهيدة لانه قلما يهزل ويؤخر تبادل النسيج || يكافح باستعمال الفطائير غير المركزة على النحاس .

٢٣٣٥٧ - **كُدوة الورْد**

Leptosphaeria coniothyrium, Coniothyrium Fuckelii, Septoria sarmentii (S).

نظر مجهرى واسع الانتشار يصيب الورْد والمليق والموجع والكشمش والخمضيات || مظهره الخارجي كلف باهت اللون لاقياسي الشكل والحجم يعلو الزواي فيسبب ذبولاً كما في الورْد والموجع ، ويعلو نصل الاوراق كما في الخمضيات فيؤذيها ويؤخر نشاطها || ومن الملاء من قال انه يصيب النبات الضعيف دين غيره || يكافح بتسميد النباتات الضعيفة وباستعمال احد الادوية الفطورية اعينها مثل بوردو وسائل سلفوكسليك .

٢٣٣٥٨ - **كُدِّي** Cystocarp (F).

Cystocarp (E).

اسم يطلق على كل مجموعة من البوغ او اكياس البوغ عند الخثيات الحمر .

٢٣٣٥٩ - **كُدِّي** كُدِّي

٢٣٣٦٠ - **كُدِّي** كُدِّي

٢٣٣٦١ - **كُدِّي** كُدِّي

٢٣٣٦٢ - **كُدِّي** كُدِّي

٢٣٣٦٣ - **كُدِّي** كُدِّي

٢٣٣٦٤ - **كُدِّي** كُدِّي

٢٣٣٦٥ - **كُدِّي** كُدِّي

٢٣٣٦٦ - **كُدِّي** كُدِّي

٢٣٣٦٧ - **كُدِّي** كُدِّي

٢٣٣٦٨ - **كُدِّي** كُدِّي

٢٣٣٦٩ - **كُدِّي** كُدِّي

٢٣٣٧٠ - **كُدِّي** كُدِّي

٢٣٣٧١ - **كُدِّي** كُدِّي

٢٣٣٧٢ - **كُدِّي** كُدِّي

٢٣٣٧٣ - **كُدِّي** كُدِّي

٢٣٣٧٤ - **كُدِّي** كُدِّي

٢٣٣٧٥ - **كُدِّي** كُدِّي

٢٣٣٧٦ - **كُدِّي** كُدِّي

٢٣٣٧٧ - **كُدِّي** كُدِّي



كُدوة المُرَّ



كُدوة الورْد



كُدِّي



كُرَات البر



كُرَات الدب



كُرَات الصخُور



كُرَات معروف



كُرَاتِ نَبْطِي



كُرَاتِ وَرْدِي



كُرَاتِ الْحَرَجِ



كُرَاتِ الْخَوْخِ



كُرَاتِ الْوَرْدِ



كُرَاتِ الشَّمْسِ

كُرَاتِ الْمَيْسِ
الصَّغِيرَةِ

كُرَاتِ خَشَنَةِ

٢٣٣٧٨ - كُرَاتِةَ الْجَيْسِ * ، سَكُولِيَتِ الْجَيْسِ
Scolytus scolytus (S). Grand scolyte de l'Orme (F).
Larger European elm bark beetle (E). Großer
Ulmenstinkkäfer (D).

حشرة من الكرشيات . جسمها مفلطح الشكل مقطوم
الطرف . طولها نحو ٦ سم . رأسها وصدرها وكولها الى
السود الازرق المالح . غمداء الى الجوزة المتأينة . تركيب
الميس وبضى الانجرار الزيتية فتخلج الشكير وتوقع به
اشد الاذى .

٢٣٣٧٩ - كُرَاتِةَ الْمَيْسِ الصَّغِيرَةِ *

Scolytus multistriatus (S). Petit scolyte de l'orme
(F). Lesser European elm bark beetle (E). Kleiner
Ulmenstinkkäfer (D).

حشرة من الكرشيات . جسمها مفلطح الشكل اسطوانى
الحية يطول نحو ٤ م . رأسها اسود اللون . جسمها كستى
الزوب . غمداءا سطحية للتخديد . تركيب الميس ولا تنف
من الانجرار المثمرة فتخلج شكير الاصصان والافئاد وتوقع
به اشد الاذى .

٢٣٣٨٠ - كُرَاتِةَ خَشَنَةِ * ، سَكُولِيَتِ خَشَنَةِ

Scolytus rugulosus (S). Scolyte rugueux, Petit scolyte
des arbres fruitiers (F). Fruit bark beetle, Shot-hole
borer (E). Ruzzelliger Obstbaumpinnkäfer (D).

حشرة من الكرشيات ، طولها نحو ٣ سم . كولها اسود اللون ،
غمداءا الى الجوزة البنية . تركيب جميع الانجرار المثمرة
اغصنها التفلح والكرز والخوخ فتخلج شكير الاصصان
وتوقع به اشد الاذى . لها جيلان في الحول . بيائها الشتوى
يحصل في الطور البيرى .

٢٣٣٨١ - كُرَاتِةَ لَامْتِجَالَسَةِ

Xylébore disparate (F).
غضفاء مؤذية تدعى كُرَاتِةَ الْحَرَجِ ، اطليها .

٢٣٣٨٢ - كُرَاتِشِيَّاتِ * ، سَكُولِيَتِيَّاتِ *

Scolytidae (S). Scolytidae (F). Scolytidae, Bark
beetles, Engraver beetles (E). Borkenkäfer (D).

فصيلة حشرات من غديات الاجنحة . اجناسها وانواعها
عديدة جميعها صغيرة القند . اجناسها اسطوانية : الزوايا
الى السواد ومشتقاتها والجوزى والبنى والحلجى . قرونها
الاستشارية صغيرة ، رفيقة او صرطانية . ابرافها ارباعية .
تميش باكثرها تحت لحاء الانجرار وفي الشكير فتخلجه
وتعطيه ثم تفتح مكها الذي يتقف من رقات دقيقة تميش
على المواد النشوية والسكرية التي يفرزها النبات .

٢٣٣٨٣ - كِرَافِي * ، Spermidae (F).

Sperm of the birds (E).
هو افراز الغدد التناسلية الالكيرية عند الطير .

٢٣٣٨٤ - كُرَاتِ

الكرع من اللحم واليقر بمنزلة الوليف من القرب وهو
مستق الساق . قيل هو ما دون الكعب من البهائم . ج
اكرع واكرع وكرومان .

٢٣٣٨٥ - كُرَاتِ

Vigneron, Viticulteur (F).
Vine-dresser, Viticulturist (E).
من تعاملى زراعة الكرمة لاستثمار العنب .

٢٣٣٧٠ - كُرَاتِ نَبْطِي * ، بَصَلِ الْعِصْرِيتِ ،
لُومِ الشَّرْقِ

Allium ampeloprasum (S). Ail d'Orient, A. à cheval,
Poireau sauvage, Pourrai, Pourriole (F). Blue-leek,
Vine-leek, Wild-leek (E). Perl Lauch, Wilder Lauch
(D). Porro salvatico, Porro bastardo (I).

نوع من الكرات البرى البجلول . اوراقه مستطيلة ،
نضرة ، شديدة الخضار . شمره يملو من ٣٠
الى ٦٠ سم . ينتهى بنورة صيونية قلنسوية الشكل ،
ازهارها الى البياض الاغبر .

٢٣٣٧١ - كُرَاتِ وَرْدِي * ، قُرْطِ

Allium roseum (S). Ail rose (F). Rosy-flowered garlic
(E). Rosen Lauch (D). Porro piccolo (I).

نوع من الكرات البرى والزراعى المأكول . دوفسته يضيبة
الشكل سمراء اللون تحرقها فصوص غليظة صغيرة القند .
اوراقه مستطيلة محددة تعرض من ٥ الى ١٢ سم . شمره
الزهرى يملو نحو ٧٠ سم . ينتهى بنورة صيونية كروية ،
ازهارها وردية اللون .

٢٣٣٧٢ - كُرَاتِ

Menon (F).
ئيس أو كيش يقدر التفلح .

٢٣٣٧٣ - كُرَاتِةَ الْوَرْدِ

Crasule (F).
هي الكركب ، اطليها .

٢٣٣٧٤ - كُرَاتِةَ الْحَرَجِ *

Xylébore dispar, Anisandrus dispar (S). Xylébore
disparate (F). Shot hole borer (E). Ungleich, Holzbohrer
(D).

حشرة من الكرشيات . ثوبها الى السمرة السوية . الذكر
اصفر قدماً من الانثى التي يراوح طولها من ٣ الى ٤ م .
تركب الانجرار الخرجية على اختلاف فصائلها واجناسها
ولا تنف من الدراق والمشمش والجوز . تتخلج للشكير
وتسرده على حدود الخشب حيث تمتع المكان .

٢٣٣٧٥ - كُرَاتِةَ الْخَوْخِ * ، سَكُولِيَتِ الْخَوْخِ

Scolytus pruni (S). Scolyte du prunier, Grand scolyte
des arbres fruitiers (F).

حشرة من الكرشيات طولها نحو ٥ م . رأسها وكولها
وصدرها الى السواد اللامع ، غمداءا ويطها الى البني
الزاهى . تركيب الخوخ وصائر الانجرار المثمرة فتخلج
الشكير في السوق والاصصان . لها جيلان في الحول .
بيائها يتم في الطور البيرى .

٢٣٣٧٦ - كُرَاتِةَ الْوَرْدِ * ، سَكُولِيَتِ الْوَرْدِ

Scolytus amygdali (S). Scolyte de l'amandier (F).

حشرة من الكرشيات طولها يراوح من ٢ الى ٣ سم . ثوبها
كستاني اللون سطلي المالح . تركيب معظم الانجرار
الورزية اغصنها الورز فتخلج الشكير وتعطيه .

٢٣٣٧٧ - كُرَاتِةَ الْمَشْمِشِ *

Xylébore saxeus, X. xylographus (S). Xylébore
de l'abricotier, X. xylographe (F). Flat-celled shot
borer (E). Borkenkäfer, Kleiner Holzbohrer (D).

حشرة من الكرشيات جسمها اسطوانى الشكل ، قصير القند ،
يطول نحو ٢ سم . ثوبها الى الحنطى المالح || تركيب
اغصان المشمش فتخلج الشكير وتعطيه .

٢٣٣٩٤ - كَرَبَس *
Porcello scaber (S).
Porcellion (F). Porcello (E).

دودية من القشريات مساويات الأرجل من فصيلة
الظفرليات مبلولة في معظم مناطق البلاد الحارة والمتعددة
الحارة || جسمها قليل الصلابة ، صغير اللدغ ، سمكي
التركيب ، يطول نحو ٨ سم. عند الذكر ونحو ١٤ سم.
عند الانثى. رأسها صغير الحجم ، متكئا قاصم قارض ،
قربها الاستشعارية أربعة ، جرابها صغيرة ، تخرجها
بفتحة ياربع زوايا لامتساوية اللدغ. ثوبا الى الطحلة
والقاصية والمساكن الازرقية حيث تعيش بمجمعة حمار قبان ،
وهي مثله بطيئة الحركة تسمى جهنم وتتكاثر عند الشعور
بالخطر || تسرح في الليل وتبيت في النهار . قوتها المواد
النضوية المنحلة وبعض اوراق البقول وسوقها وصالحها
ويطورها .

٢٣٣٩٥ - كَرَبُورُوت
Grape-fruit
هو ليون الجنة ، اطلبه .

٢٣٣٩٦ - كَرَبَل
هو الشش ، نوع من الاسماك ، اطلبه .

٢٣٣٩٧ - كَرَبَل *
Kalmia (S).
Kalmie (F). Calico-bush (E). Kalmie (D). Calmia (I).
جلس نباتات معمرة من فصيلة الخلنجيات ، انواعها عديدة
جميعها سامة الوراق والازهار. منها الاربية البرية. منها
الاجبار والشجيرات والجنات والاعشاب. معظمها بري
وبعضها زرعى . اوراقها كاملة ابيدة لا قياسية النظام
الدوري. ازهارها لا قياسية التجميع والارتكاز ، خاسية
البتلات الثنائية الفصن ، عشارية الاسدية ، جميلة الشكل ،
مختلطة الالوان || اشهر انواعها مايلي .

٢٣٣٩٨ - كَرَبَل بَحْرِي الْوَرَق
Kalmia polifolia, K. glauca (S). Kalmie glauque (F).
نوع من الكربل وهو بجملة سبروتية معمرة تملو من ٥٠ الى
٧٠ سم . ساقها فراء فرونها مضلمة ، اوراقها متقابلة
سنائية الشكل ، نصلها يطول نحو ٥ سم. ويعرض نحو ١ سم.
صفحة السفلى خالية البشرة بيضاء اللون ، صفحة العليا
الى الخضار البحري. ازهارها حلقية التجميع ، حشامية
الارتكاز ، وردية اللون ، ليلكية الحواج || ازهارها يستمر
من نيسان الى ايار .

٢٣٣٩٩ - كَرَبَل زَهْبِي الْوَرَق
Kalmia hirsuta (S). Kalmie velue (F).

نوع من الكربل وهو عشية سبروتية معمرة ، شكلها شكل
الصنوبر . ساقها ليفية فراء تملو نحو ٥٠ سم . اوراقها
متقابلة لاطئة صغيرة اللدغ . نصلها يطول نحو ١٠ سم .
ويعرض من ١ الى ٣ سم. وهو خالي البشرة على صفحته .
ازهارها ابيطة ، فردية ، حواء اللون || ازهارها يستمر
من ايار الى حزيران .

٢٣٤٠٠ - كَرَبَل صَفِيحَ الْوَرَق
Kalmia angustifolia (S). Kalmie à feuilles étroites (F).
نوع من الكربل وهو بجملة سبروتية معمرة تملو من ٦٠
الى ١٠٠ سم . ساقها خشوية فراء . اوراقها متقابلة
منقطة تملو نحو ٧ سم. وتعرض نحو ٢ سم . ازهارها حلقية
التجميع ، تاجية الارتفاع ، وردية اللون || ازهارها يستمر
طوال شهر حزيران .

٢٣٣٩٦ - كَرَابُيَا * ، كَرَابُيَا ، كَرَابُيَا
Carum carvi (S). Carvi, Cumini des prés, Kummel
(F). Common caraway (E). Echter Kümmel, Kümmel
(D). Carvi, Cumino tedesco, Kummel (I).
نبات من الاناث وهي عشية حولية من فصيلة الخيميات.
منها المروج والراعي الجبلية وزرع بكثرة . جميع اجزاء
النبات طرية من الجلود الى الازهار والبرور وهي
تستعمل استعمال الاثين وتدخل في تملير الاجبان وصار
المأكلا || بزورها حاشية تقطع الشهية وتلدو العلاب
وتنشط العصائر للمعدة وتفتح الشهية وحض الطعام
وتعمل التليق وتطرد الرياح وتلدو البول . غير ان الاكثر
من استعمالها ، يفسر بالكل || ويستخرج من بزورها
زيت طيار فاخر الصنف ذكي العرف .

٢٣٣٩٧ - كَرَب
اصول السنف تغلظ الفراش التي تقطع معها . الوحدة
كرية .

٢٣٣٩٨ - كَرَبِيَّة ، رَهْم
Emblaver (F).
سرح الارض ومعدا وبذرها .
To sow with wheat (E).

٢٣٣٩٩ - كَرَبَاج
Entelurus (S).
Entelure (F). Entelurus (E).

جلس إسماعل بحرية من عصيليات الخياشيم وفصيلة زمارات
البحر . انواعها الممرية قليلة العدد ، اعطائها بعض مناطق
البحر الابيض المتوسط . جميعها دقيقة الاجسام المستطيلة .
الحوالها تراوح من ٣٠ الى ٦٠ سم. وقوتها شقية الاعظام
الحافرية الأطراف .

٢٣٣٩٠ - كَرَبَاجِيَّات
Flagellariaceae (S).
Flagellariacées (F). Flagellariaceae (E).
فصيلة نباتية من سبديات الفلقة قريبة الشبه من الاسليات.
اشهر نباتاتها الكر بابية .

٢٣٣٩١ - كَرَبَاجِيَّة *
Flagellaria (S).
Flagellaire (F). Wild ratan (E). Wilder Ratang (D).
Flagellaria (I).
جلس نباتات سبوتية معمرة متسلقة من فصيلة
الكر بابيات . انواعها عديدة مهدا البلاد الحارة . تألف
النامق وصفات الأنهار . اوراقها حاشية ، صلبة الشكل ،
مستطيلة . نصلها سميك الصلابة ، بحري اللون ، يلتصق
بجوانق حلزونية مزدوية .

٢٣٣٩٢ - كَرَبِيَّة *
Carapa (S). Carapa.
Carapa, Bois de Crabe (F). Crab-wood tree, Carapa-
oil tree (E). Carapa-Baum, Crabbaum (D). Carapa (I).
جلس اشجار حرجية وصناعية من فصيلة الازدوتيات ،
مهدا البلاد الاستوائية . تثبت قرب الشواطئ . وهل صفات
الانهار . اشجارها كبيرة اللدغ دالعة يراوح ارتفاعها من
٢٠ الى ٣٠ م . ثمارها جراء ليفية التركيب تحضن بعض
البذور المختلفة الاشكال والاحجام ، يستخرج من لبها
مادة دهنية مرة الطعم صفراء اللون يستعملونها في افريقية
لقاية من الحشرات اذ يحضون بها اجسادهم واعشاب منازله .
قد يستعمل دمن الكربة في صناعة الصابون . اما لحاء
الاشجار طرية ويستخرج منها مادة مرة تستعمل استعمال
الكينا في مكافحة الحميات .

٢٣٣٩٣ - كَرَبَل
الكربز : الفتاه الكبار الطول .



كرابويا



كر بابية




كربة



كرس



كربل



رقم ٦

شبكة صفائح الكرة الأرضية وما يحفّ بها من أسرار عظيمة

الشبكة المثقبة بتدفق الصفائح الكوردية. أما مناجم النفط منذ التقاطع. والدليل على ذلك منجم «ديومن» الذي ينفق كل حد.

تركيب قشرة - الغلاف المنصري في تركيب القشرة بسبب بعض التدفد والغرابات في تطور النبات كما هي الحال في القرنين ٢ و ٤ إذ أن ٧٥٪ من الأنواع الجيولوجية والنباتية لا توجد إلا في هاتين المنطقتين. اختصها منطقة بحيرة بينكال.

توزيع الطير - أنواع الطيور القواطع التي تجوب البلاد عديدة أشهرها تلك التي رجاعها محصور بمناطق معينة لا تتخطاها وهي رقم ١٢ و ٢٠ و ٤١.

للصالح الجوفية والبحرية.

عولوس بطاكية - أعرها حتى الآن الصدح الوسط - الحسني الذي يمتد من رقم ١٠ إلى ٣٧.

الإشعاع الشمسي - المواقع المفضلة للشمس الناصي تقع في الأرقام ١ و ١٧ و ٤١.

الانفجار الانفجاري - يقارون، بعد الاتيات العلمي، أن انفجاراً نووياً وقع تلقائياً منذ ١٧٠٠ مليون سنة في حدود الرقم ٤٠. أما سبه فيعود إلى الأورانيوم ٢٣٥.

المعادن - مناجم المعادن تحتشد طوال الخطوط

الطوائف الرهية - عشر مناطق، توزيعها حول الكرة الأرضية متناسق الخطوط، تتميز بوابوها المدهشة. يدل في أطارها مثلك البرمود. المناطق المشر تحصل الأرقام ١٦، ١٨، ٢٠، ٢٢، ٢٤، ٢٦، ٢٨، ٤٩، ٤٧، ٤٥، ٤٣، ٤١.

البراكين - معظمها واشتد نشاطاً يقع على خطوط التصادم صفائح القلاف اليابس الذي يأتي مباشرة تحت القلاف الجوي.

جوكات - مراكز الحصف محصورة في بعض عقد الشبكة وقد ينجم عنها زلازل وأعاصير لا تقاسية البضط والسرعة تسير مع الخطوط كما هي الحال في

٢٣٤٠١ - كُرْبَل عَرِيضُ الْوَرَق ، غُكَا سَمَاء ،
لُورَة

Kalmia latifolia (S).
Kalmia à feuilles larges, *Laurier de montagne* (F).
Mountain laurel (E). *Breitblättrige Kalmia* (D).
Calmia a foglia larghe, *Lauro di montagna* (I).

نوع من الكربيل وهو شجرة جميلة الشكل تلو من ٧ إلى ١٢ م. أوراقها مقابلة أو خسية ثلاثية ، نصلها بطول نحو ١٣ سم. وعرص ٤ سم. أزهارها عذوقية للتجميع ثنائية الارتكاز عديدة الألوان التي تختلف مع الضروب || أنظرها يستمر من حزيران إلى تموز.

٢٣٤٠٢ - كُرْبِلَة
هي إنباء ، أطليه .٢٣٤٠٣ - كُرْبِلَة
المعالجة بالكربونيل وفي عملية تقوم على طلاء الأشياء الخشبية أو نغمها بالكربونيل لحفظها من التلف .٢٣٤٠٤ - كُرْبِير
نصم ثنائي أو هيدروجيني .٢٣٤٠٥ - كُرْبِيرُوس
Pelodytes (S).
Pelodytes (F). *Parsley-frog* (E).

جنس ضفادع من فصيلة الحكسريات. أنواعه المعروفة قليلة العدد مهدا بعض اصناف العالم القديم || اجسامها صغيرة فقد تطل من ٤ إلى ٦ سم. عيونها كبيرة ناشزة. حدقات عيونها عذوقية الارتكاز ، جلودها مبرمة التمدد والتغدد || اقوالها على الطحلة الخضراء تملؤها زراكن متباعدة الإشكال تختلف مع اختلاف النوع || من ميزات هذا الجنس رائحة الثوم الخامسة التي تفوح منه واستمراره على التفرقة نحو تسعة أشهر من كل عام || أشهر أنواعه الكربون المشط .

٢٣٤٠٦ - كُرْبِيرُوس مَشْطَط
Pelodytes punctatus (S). *Pelodytes punctuatus* (F).
Spotted Parsley-frog (E).

نوع من ضفادع الكربون وفصيلة الحكسريات . اصطناع تمتد من الشرق الاوسط الى اطراف البلاد الاسبانية دين ان تيمارز الاقاليم المتدلة || جسمه صغير القد . الذكر يعطون من ٤ إلى ٥ سم. والانثى تطلون من ٦ إلى ٧ سم. رأسه متوسط الحجم . خطمه مستدير الطرف . صياحه كبرتان ناشزان . حلقه صبيحة الارتكاز . اصابع قوائمه الخلفية قليلة الخطاطب الذي يكتنف قواعدها فقط . جلده مثالي البشرة . ظهره مجزج بعض التمدد ولقد المتدلة الشوز تنفخ الماددة اللبوية الرائحة التي يتميز بها || فوه الى الطحلة الخضراء تملؤها لكت خضر عابقة || يعيش في المنطق وجاري الماء . يجمع نحو حشر سنوات . مسرعه دجوي يستمر من الدروب الى الفجر . قوته الحشرات والديدان || الانثى تقرأ خلال موسمها السنوي الذي يستمر نحو تسعة أشهر من ١٢٠٠ إلى ١٦٠٠ دجيلة ضمن حبال مستطيلة لتلفها على بعض النباتات المائية . التف يثم بد التفرقة بنحو ثلاثة اسابيع والبلابيح عند اكتمال طورها البلوغ تطلون نحو ٦ سم.

٢٣٤٠٧ - كُرْبِيل حَنْطِي
هو الوضعة الخلفية ، أطليه .
Carpophila bruna (F).
٢٣٤٠٨ - كُرْبِيلِيل
نوع من الأزيم الكثير الانتشار في معظم اعضاء النبات . نشاطه ينحصر بتأثيره في الحوافض .

٢٣٤٠٩ - كُرْبِيلَة °

Corbula (S).
Corbula (F). *Corbula* (E).
جنس حيوانات بحرية من الرغويات صليحيات الخياشيم وفصيلة القفاليات . أنواعها المعروفة عديدة نحو ٧٠ ، قسم منها أي نحو ٢٥ من متحجرات الاراضي الثلاثية والثلاثية ، اما الباقى فتنتشر في جميع بحار العالم || اصداؤها صميكة الصفحة ، بيضية اللون ، لامتنارية المصارع الفصيلة الاطراف .

٢٣٤١٠ - كُرْبِيلِيلِيل
أزيم مثاقلة تربط في الخصلة وفي الصفاح وفي بعض اوراق النبات . جهدها يماكس حجمه في الترميز .

Carbone (F). *Carbon* (E).
جسم بسيط وزنه (ك-١٢) وزنه الاتومي ١٢.٠١ وهو من عناصر المركبات الصخرية الاسفمية ان نباتية او حيوانية . ونظراً لكثرة واهية هذه المركبات الكربونية فقد جعلوا الكيمياء الصخرية لدراستها || والكربون لا ينحصر وهو قابل للاحتراق وحمل ويبدد الاصلية الحرارية والكهرية || يوجد في الطبيعة على اشكال مختلفة اصعبها البلورة كالكلس والاسرب وغير البلورة كالكلس والساج .

٢٣٤١٢ - كُرْبُونَات
ملح الحامض الكربوني .

Carbonate
٢٣٤١٣ - كُرْبُونَات البُوتَاسِيُوم
Carbonate de potassium (F). *Potassium carbonate* (E).
ملح ابيض سريع الذوبان في الماء يحوي من ٥٢ الى ٦٢ ٪ من البوتاس || يستعمل ككيميا يوتاسي .

٢٣٤١٤ - كُرْبُونَات الكَلْسِيُوم ، كُرْبُونَات الكِلْس

Carbonate de calcium (F).
Calcium carbonate (E).
ملح الكلسيوم الطبيعي الذي يؤلف معظم الطبقة السطحية من الكرة الارضية .

٢٣٤١٥ - كُرْبُونِي
Carbonifère (F).
Carboniferous, *Coal-bearing* (E).

نمت تربوي يطلق على الصخور والاثارية التي تحوي بعض الكربون أو الفحم الحجري || ويطلق خاصة على الحقبة الرابعة من الياج القدم وفي الطبقة الارضية التي ترتكز على التيفونية . راجع مادة حياة .

٢٣٤١٦ - كُرْبِيلِيل
Carbonyla (F). *Carbonyls* (E).
مركب مضاد تنفخ يستعمل في صيانة الاخشاب .
٢٣٤١٧ - كُرْبِيلِيلِيلِيل
Carbohydraz
هو العسل الذي تقوم به الاربيات في مضافة الحلويد والمغروسيد .
٢٣٤١٨ - كُرْبِيلَة °
Couroupita (S).
Couroupita (F).

جنس اشجار برية وزراعية من فصيلة الآسيات . أنواعها المعروفة خمسة منها بعض اصناف امريكة الجنوبية اصعبها



كربوس مشط



كربلة



كريته



كريس

٢٢٤١٩ - كُرْدَانَة * Corbis (S).

Corbis (F). Corbis (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة القرينيات ، أنواعه المعروفة عديدة منها المعاصرة ومنها النافرة المنحجرة التي تعود الى الحقبة السيلورية || اصدها شبه بيضيه الشكل متساكنة ، مخددة ، عابقة الاوان ، يكثر فيها الجلوري القاتم || اجسامها متوسطة الحجم او صغيرة || ثنائية المشاب المستطيلة الطليقة || اعطائها معظم بحار العالم ، تعيش منفردة في الرمال المغورة بالماء المعتدل القور .

٢٢٤٢٠ - كُرْدَانَة Sphère, Globe (F).

Sphère, Globe (E).

جسم مستدير الشكل يتميز بشدري جميع خطوطه المستقيمة المنتهية من المركز الى السطح . تؤخذ مساحة الكرة بضرب مربع قطرها بعدد ١٢,٥٦٦٤ ويؤخذ حجمها بضرب مكعب قطرها بعدد ٤,١٨٨٨ .

٢٢٤٢١ - كُرْدَانَة لُزْبِيَّة * Globe terrestre (F).

Terrestrial globe (E).

الكرة الارضية كوكب سيار من النظام الشمسي . (راجع ارض) || كيف تكونت وتي ؟ بحث يقودنا الى عدة نظريات لا مجال لدرسا جميعها ، انما نذكر اشيعها واقربها لطقن || عند حصول الانفجار السديمي ، اي منذ نحو ٧ مليارات سنة ، تكوّن الفرج الرقيق المعروف بالنظام الشمسي ، لانه يتألف من الشمس وكواكبها ومنها الكرة الارضية التي بعد ان دارت حول الشمس مليارات السنين أصبحت ما نعرف عنها الآن : ارض متباينة التضاريس والقشامة تطلوها مياه البحر ، حركة مستمرة لا يمكن ان تتوقف لان وقوتها يعني الزواك . وحياة تنبت من كنه الخالق فتتجسد وتتنو ثم تلوي وتندثر . (راجع تاريخ الكرة الارضية) || اما الخواطع الاربع المذرية تبعاً فانها تبين مدى التطورات المنظمة الملهمة التي حصلت عبر الازمنة السميكة الثابتة ، وما سيحصل في المستقبل البعيد بعد مرور ٤ او ٥٠ مليون سنة .



كربوم أسود الرأس

٢٢٤٢٢ - كُرْدَانَة الثلج Boule de neige (F).

في الاطلس الثلجي ، اطلبه .

٢٢٤٢٣ - كُرْدَانَة هَوَلِيَّة Photosphère (F).

Photosphère (E).

سطح الشمس المضيء .

٢٢٤٢٤ - كُرْدَانَة أَسْوَدَ الرَّأْس * Cardium ebulinum (S).

Cardium ebulinum (F). Cardium ebulinum (E).

حشرة واشمة غاضلة من فصيلة القرينيات ورتبة صمغيات الانجسة . تألف البراري والجزائرين . غناقصها تعيش حل بتلات الازهار واغصنها اذهار الصرزيات . يرقاتها همة



كرد

تسردب لحاء وشكير جلوع النباتات البرية || جسمها صغير القند يطول من ٨ الى ١٢ سم . رأسها وكسليها وبطنها وجرانها الى السواد الاسفع . ظفراتها الى انفسار الازرق المواج . صيدها كيرتات جاحظتان ، زباناها دقيقان مستطيلان || ظفرها مقطوم الطرف الاسفع . غدها متباعدتان التخديد . ارسافها رباعية العقل الظاهرة || الاثن اثن قفأ من الذكر واغصم بطناً منه واغصم زبناً || لها جيل واحد في الجيل . تظهر الحشرة الجملانية في نيسان وتميش حتى اواخر حزيران . تسرح في النهار || البرقة عند ادراكها الكيال الجسوري تطول نحو ١٨ سم . جسمها مستطيل القدم والرأس ، مستدق المخبر ، قليل الملب الملبش . ثوبا الى الخلفي الاسمر . رأسها وشرجها الى السمرة السوداء .

٢٢٤٢٥ - كُرْدَانَة Karat

هي الطليقة الطليانية السطحية كُرْدَانَة فيها الإمات والكثل الاقنيسية الارتكاز والاجرام .

٢٢٤٢٦ - كُرْدَانَة Corrigiola (S).

Corrigiola (F). Corrigiola (E).

جنس نباتات عشبية برية حولية من فصيلة التوتانيات . انواعها المعروفة ستة منها الشرق الادنى واروية وبعض مناطق افريقية وامريكية الجنوبية || سوقها تحيلة . اوراقها لحمية مستطيلة . اذهارها حامي ضمي التجميع . اذهارها صغيرة لحامية البتلات والاسدية ، تبينة اللون . تنويرها رديمي . اعرف انواعها واشهرها كُرْدَانَة السواحل .

٢٢٤٢٧ - كُرْدَانَة السَّوَّاحِل * Corrigiola littoralis (S).

Corrigiola littoralis (F). نوع من الكُرْدَانَة . طوية في بعض مناطق الساحل اللياني ونها ضوحي يبروت || ساقها تحيلة مستطيلة . اوراقها ريمية الشكل ، مستطيلة التصلال . اذهارها حامي . اذهارها الى الصفار الباهت . تنويرها رديمي .

٢٢٤٢٨ - كُرْدَانَة Base du cou (F).

Base of the neck (E). هو اصل العنق ار قاعدة ارتكازه .

٢٢٤٢٩ - كُرْدَانَة Ferme, Métairie (F).

Farm, Lease, Land (E).

الحارة من المزارع . ج . كرف .

٢٢٤٣٠ - كُرْدَانَة * ، عَشْبَة السَّيْح ، دَلْسَة قَانِيَّة Daphne cartonraira, Thymelaea cartonraira (S).

Daphné cartonraire, Tartonraire, Herbe terrible (F). Silver leaved daphne (E). Tartonraire (D). Laureola bianca, Salamandra (I).

نوع من الدفنة البرية السامة منهاها المواقع الكنسية الرطبة . شكلها يشبه الخلع . ساقها فراء تمل نحو ١٢٠ سم . اوراقها متقابلة ضيقة ، نصلها جامد الصلابة ، باحت انفسار . اذهارها سبيلية التجميع ، هامة الارتكاز ، صغيرة القند ، يبيضاء اللون .

٢٢٤٣١ - كُرْدَانَة Cordana (S).

جنس فطور مجهرية من حمارة الزناخيات وفصيلة اللطحيات . جربه الكندية اسطوانية قصيرة تعلوها كنانة صرليانية ضمية التجميع قنالية الخلية || انواعه قليلة العدد والاذي ، اعرفها كُرْدَانَة الموز .



كردانة الموز



كردون



كردلس



كردلة



كردوم

٢٣٤٤٠ - كُرْدَهَان الْفَاق

Codonopsis silvestris (S). *Codonopsis* des bois (F).
نوع من الكردان. ساقه فرواه متسلقة متلغو نحو ١٥ سم. اوراقه متفلة قليلة الشكل، نصلها مبسر الزغب الجامد. ازهاره لا قياسية الايزكاز، كثيرة العدد، صفيرة اللد، فستقية اللون || ازهاره يستمر من تموز الى آب.

٢٣٤٤١ - كُرْدَهَان بَيْضِي الْوَرَق

Codonopsis ovata (S). *Codonopsis* à feuilles ovales (F).
نوع من الكردان. ساقه متسلقة متلغو نحو ٨٠ سم. فرواه متفلة قليلة الاستطالة. اوراقه بيضيه الشكل، خلية البشرة، طولها من ٢ الى ٣ سم. ازهاره طول نحو ٣ سم. لونها الى الزرقه الباهتة يملؤها توشيم عبق || ازهاره يستمر طوال الصيف.

٢٣٤٤٢ - كُرْدَهَان مَرَعَانِي

Codonopsis dematidea (S). *Codonopsis* -clématite (F).
نوع من الكردان. ساقه متسلقة متلغو نحو ١٢٠ سم. فرواه لا قياسية الايزكاز. اوراقه متفلة كاملة، السطح منها متفلة والبياض متفلة، نصلها خلية البشرة، بيضيه الصفحة اللينة عند زاهها الاخير. ازهاره طرفية الايزكاز، بيضاء اللون، مفصلة بالازرق || ازهاره يستمر من تموز الى آب.

٢٣٤٤٣ - كُرْدُونُس

Epiphyse (F). *Epiphys* (E).
٢٣٤٤٤ - كُرْدُونَلَه
Cordylura (S). *Cordylure* (F). *Cordylura* (E).
جنس حشرات قاتصة من فصيلة الطليحيات روية ذوات الجناحين. انواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم اقطار العالم || اجسامها هيفاء، طولها من ٨ الى ١٢ مم. رؤوسها كبيرة، مستعرضة. حيوها ناشزة، متبادعة عند الشقين. قرونها الاستشعارية شديدة القصير، تنتهي بنسيلة دقيقة. اعطالها ضليمة. ملاسها صغيرة. بطنها صقبة الشكل. كواسلها ويطونها ورؤوسها وقوائمها متكاثفة الحلب. رواسها ضيقة، ملونة. قوائمها نسيطة || الحشرة الجملة قاتصة، البرقة قلابة واجبة.

٢٣٤٤٥ - كُرْدُونُوم

Cardium (S). *Cardium*, *Bucarde* (F). *Cardium* (E).
جنس حيوانات نهريه وقماحية من الرخويات صفيحية اغنيائهم وفصيلة الكردونيات. انواعها المعروفة كثيرة العدد معظمها نهري وبضها قماحي يعيش في مياه الاغوار || اصداها شبه قليلة الشكل، متساوية المصارع. اصداها ماسية او مغلدة او مفصلة. جميعها محززة ملونة عادية الاغشية. مفصلاتها رباعية الاسنان. مطاها ثنائية طليقة || تعيش منتشرة في الاسماك والبرمال.

٢٣٤٤٦ - كُرْدُونِيَّات

Cardilidae (S). *Cardilidae* (E).
فصيلة حيوانات مائية من الرخويات صفيحية الاغنياء. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منها البرية التي تعيش في المياه العذبة ومنها البحرية ومنها القماحية التي تعيش عند مصبات الانهر || اصداها متباينة الاشكال والاحجام يكثر فيها الشكل القلبي. مصادرهم متساوية الغلق

٢٣٤٣٢ - كُرْدَانَةُ الموز *

Cordia musse (S).
فطر مجهري يركب اوراق الموز فيؤذيها بغض النمل. مظهره الخارجى زرقه عديمة الشكل تركب النمل حل صفحته العليا. يهد سره، اللون ثم تنسرف الى الخلفي يحيطها حصار اشهب قائم || اخرها زهيدة لا تنسفي الدنابة.

٢٣٤٣٣ - كُرْدَه

Kruberia (S). *Krubere* (F).
جنس نباتات شبيهة بيرة حولية من فصيلة انجسيات. انواعها المعروفة عديدة منها معظم مناطق حوض البحر الابيض المتوسط. سوقها مستقيمة، غلدة، لمساها الماء، فرواه، اوراقها محززة، متباينة التفصيل الريشي. ازهارها صيواني التجميع، طرفي الايزكاز، لاستساوي الاشمة عدد وطولها. ازهارها صفيرة، يضاء اللون او صفراء او ارجوانية || تنويرها ربيعي.

٢٣٤٣٤ - كُرْدُون *

Cordulia
جنس حشرات من فصيلة اليمسويات، انواعها المعروفة قليلة جميعها مفترسة تقضي على الحوام. طول اجسامها يراوح من ٤٨ الى ٥٠ سم. بسطة اجنتها يراوح من ٦٠ الى ٦٤ مم. ألونها الى الخضار الزرق. اناثها اصبق لوناً من ذكورها.

٢٣٤٣٥ - كُرْدَالِيَس *

Corydalis (S). *Corydalis* (F). *Corydalis* (E).
جنس حشرات من فصيلة الكردونيات روية سادات الاجنحة. انواعها المعروفة عديدة موطنها الاقطار الامريكية || اجسامها مستطيلة، شبه اسطوانية الشكل. رؤوسها غليظة، متسدلة التبطيط. حيوها صغيرة. قرونها الاستشعارية خيطية. تتميز بتأثيرها المستطيلة خاصة عند الذكور. اجنتها غشائية، شبه متساوية. ألونها تراوح من السمرة الى الكهبة || يرقاتها مفترسة تعيش كالحل طوها الريفي في الماء.

٢٣٤٣٦ - كُرْدَالِيَسِيَّات *

Corydalidae (S). *Corydalidae* (F). *Corydalidae* (E).
فصيلة حشرات من روية سادات الاجنحة. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة، منتشرة في معظم اقطار البلاد الامريكية || اجسامها مستطيلة، شبه اسطوانية الشكل. رؤوسها مستغلطة يكثر فيها التبطيط. قرونها الاستشعارية خيطية. حيوها صغيرة جانبسية. اجنتها غشائية || مسرهم دجوي. يرقاتها مائية مفترسة.

٢٣٤٣٧ - كُرْدُون

Cordylina (F).
هو القلب، جنس نباتات زنبقية، اطليه.

٢٣٤٣٨ - كُرْدَمَانَه

Garou (F).
نوع من الفئفة، اطلب مثان.

٢٣٤٣٩ - كُرْدَهَان

Codonopsis (S). *Codonopsis* (F).
الاسم العلمي من اليوناني بمعنى يشبه الجرس. جنس نباتات حشوية مدمرة من فصيلة الجريسيات. انواعها عديدة مسطحة بري وبضها تريبي. اعطالها بلاد الشرق. جنورها طية. سوقها متسلقة متلغو او ملقة. اوراقها لا قياسية الشكل والايزكاز يندب فيها التقابل. نصلها محززة اللون. ازهارها جريسية متدللة || اشهر انواعها ما يتبع.

Cerasus (S).

Cerisier (F). Cherry tree (E).

جلس اشجار برية وزراعية شجرة من فصيلة الوردية .
انواعه وفروبه كثيرة العدد تحفظ باحجامها ومياكلها
وارتكاز انصافها ونشر ثمارها واشكالها . ورق هذا النبات
في الاصم الجسورية فالصفات الشوزية الجنية
الرئيسية واسحة : جلور خمودية ثم حزية ، سوق مستقيمة ،
حاج ماسية ، غشب جلوري اللون ، اوراق متدة ، مسنة
الحافة ، ناصها بيضية الشكل او رمية . ازهار نوري
التجميع يضل من ٢ الى ١٢ زهرة . ازهار بيض ، خاصة
البتلات ، صديفة الاسدية ، ثمار لحيمة ، مستطيلة الاذن ،
كروية الشكل ، ماسية القشور اللامعة ، لذيذة للباب
النسم ، مستديرة البزور الصلبة || وهو من الاشجار
التي تألف المناطق الباردة في الاقاليم المعتدلة لكنه ينضج
المواقع الممرضة قريبا من الحوض لانها تسبب اغلاص الزهار .
يوجد في جميع الاثربة من القفيرة بالماء اللذائية الى الخمية
ومن الرولية الى الطينية غير انه لا يتصلب الاثربة الشديدة
الاندماج ، المستحكة الرطوبة . وهو يتكاثر بالبزور
والنقلات وبالترقيد والتغصم . منع واجود مطعاه المقلب
والبري والشرية وسناروشية .

Cerasus avium (S).

Cerisier des oiseaux, C. des bois, Mériel (F). Gean
cherry, Hedge-berry, Sour-cherry (E). Süskirsche
(D). Ciliegio visciolo, Cilegolo (I).

نوع من الكرز الزراعي المشر . اليه ينسب أكثر واشهر
الضروب الموصوفة المروفة ، اشجاره كبيرة اللد تملو من
١٥ الى ٢٠ م . سوقها وانصافها منقصة ، ثمارها مستديرة ،
كروية ، صغيرة ، سكرية الطعم ، مستحبة المذاق ،
لذيذة النكهة .

Cerise des Juifs (F).

هو الحبة الكاكنجية ، اطلها .

٢٣٤٥٥ - كَرَزْ غَادِي * كَرَزْ حَامَضُ

Cerasus vulgaris (S). Cerisier acide, Griotier, Bir-
garreautier (F). Cherry tree (E). Sauerkirsch, Sauer-
kirschen (D). Ciliegio agerotto, Cileglio (I).

نوع من الكرز الزراعي المشر المديد الضروب . ساقه
منقصة تملو من ٦ الى ١٢ م . انصافه منفرجة مسترلة .
ثمار كروية ، قليلة الحسة ، خيرة الماددة ، لذيذة الطعم ،
بينه الحوضة التي تفلوت نسبها مع الضروب وقد تكون
حامزة في الضروب المروفة بالوشة .

Cerasus padus (S).

Cerisier à grappes, Putier, Putlet (F). Bird-cherry,
Hach-berry, Hog-cherry (E). Gemeine Trauben-
kirsch (D). Pado, Ciliegio a grappoli (I).

نوع من الكرز البري المشر . ثماره صغيرة اللد ، عشقوبة
التجميع ، حامزة الطعم مأكولة ، منيته الحطاب والجبال
الصخرية . شجيرة تملو من ٢٠٠ الى ٤٠٠ م . انصافها
مسترلة متدلية ، اوراقها اعليجية ذبذبة مسنة الحافة .

٢٣٤٥٧ - كَرَزْ غَارِي * كَرَزْ الْغَارُ

Prunus lauro-cerasus (S). Laurier-cerise (F). Cherry
laural (E). Larbeerkirsche (D). Lauro ceraso, l.
mandorlo (I).

جلس نباتات برية ورزيتين من فصيلة الورديات . انواعه
قليلة العدد منها الاشجار والشجيرات والجنبات . سوقها

المفصلة والمنسنة الاطراف المنفرجة . جميعها ثنائية المذهب
الطليقة || احرف اجناسها واشهرها الكردوم .

Cardita (S).

Cardite (F). Cardica (E).

جلس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشم
وفصيلة الكرديتيات . انواعها المروفة كثيرة العدد منتشرة
في جميع بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحارة || اصداها
شبه قلبية الشكل ، مسنة التعقيد . مخابها ثنائية ،
طليقة || تمش لاسقة بالصخور المدورة القليلة اللور .
ليتها غزير المادة اللشيلة .

Carditidae (S).

Carditidae (F). Carditidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشم .
اجناسها وانواعها صديفة . الماصرة منها منتشرة في جميع
بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحارة . اما القارة فن
متحصرات الاثربة الديقوية || اصداها شبه قلبية الشكل ،
مدبة اللدن . خياشيمها لاسارية اللد ، حلقة الرباط .
وماصيها متساوية ، منفرجة الاطراف || احرف اجناسها
واشهرها الكرديت .

Cardinalis (S).

Cardinal (F). Cardinal (E).

جلس طير من فصيلة الشرشوريات . انواعه المروفة اربعة
موطنها بعض مناطق امريكا الشمالية والوسطى . يألف
الغابات . فوسه يراوح من ٢٠ الى ٧٠ زوجا || اجناسها
صغيرة اللد . رؤوسها منوعة بفتازع ثنائية الاحجام .
اثوابها حلوة يكثر فيها الاحمر والجلوري . تتميز بمناقيدها
الشبه غرولية الشكل القصيرة والفصلية . اذنانها مستطيلة ،
مقرة الاطراف او مستديرتها || طيراتها خفيفة الحركة ،
معتدلة الشوط ، كثير التصنيع والتبسط . تتنقل على الارض
بخطة وصل الاغصان برشاقة || فونها ثمار النينة والبنور
واغبارها لا تصف عن ثمار الفاكهة والحبوب واللدرة ||
اشهر انواعه كريدنال فيرجينية .

٢٣٤٥٠ - كَرَزْ بِنَالُ فيرجينية *

Cardinals virginianus (S). Cardinal de virginie (F).
Cardinal tanager (E).

طائر من الكريدنال . موطنه بعض مناطق امريكا الشمالية
اعصها فيرجينية . يألف الغابات ويحب البلاد باستمرار
الا في نين الترميم . فوسه يعد من ٢٠ الى ٤٠ زوجا ||
جسمه صغير اللد . ريع القامة ، يطول نحو ٢٢ سم . بما
فيه الذنب الذي يطول نحو ١١ سم . لونه الى الحمرة
القرمزية تبت في الظهر وتبين في الجناحين والذنب .
جبهة الى الجولة وكشته كلك . زوره اسود . حذقة عينه
باقوية اللون يطوقها حطار جلوري || طيرانه خفيف
الحركة ، سريعها ، معتدل الشوط || يطن عشه في
الادغال مري الاشجار القليلة الارتفاع الملتفة الانداد
والاننان . الاثني تقص من ٤ الى ٦ فضات تحضنها وسدعا
نحو ١٣ يوما بينا الذكر يوطن لها الغذاء .

Cône, Strobile (F).

Cone, Pine-cone, Strobile (E).

ثمرة اشجار الفصيلة السنورية وفيها من الثمار المخروطية
او المخروطية الشكل .



كرديت



كريدنال فيرجينية



كرز



كرز الطير



كرز حادي



كرز عشقودي

٢٣٤٦٣ - كَرْسُوفَة ذَرِّيَّة

Botryodiplodia tubercicola (S). Java black-rot (E).
فطر مجهرى يتطفل على دريات البطاطا الملثة فيطنها .
مظهره المخاريسي يحل محل الثياب والقشور قدسمر
وتسود وتسلخ ثم تتفتن ويملأ الففن || علاجه الوحيد
يقوم باجتناى الزرعة في المواقف الرطبة وفي الأثرية
المؤيدة مع تلكاكة بضرورة تطهير الباد قبل الزرع .

٢٣٤٦٤ - كَرْسُوف ، كَرْسُوف
Coton (F).
هو القطن ، اطبله .

٢٣٤٦٥ - كَرْسُوفِيَّة ، عَنَقَلَال
Gnaphale (F).
جنس لبائات برية طليحة من فصيلة المركبات . أنواعها
عديدة منها العشبية الحولية والخشبية المعمرة . سورها وأوراقها
زياه ، زغبها أبيض اللون . أوراقها متعاقبة لاطقة كاملة
صغيرة للقد ستانية التصل . أزهارها وريسات طرفية .
منظم أنواعها طبي يستعمل ضد السعال ويضع للصدر .
أعرف أنواعها وأشهرها ما يلي .

٢٣٤٦٦ - كَرْسُوفِيَّة جَبَلِيَّة * ، عَنَقَلَال جَبَلِي
Gnaphallium leontopodium (S). Gnaphale plad-de-
lton (F). Lion's paw cudweed, Everlasting (E). Ruhr-
kraut, Ruhrpflanze (D). Canapichia, immortali (I).
نوع من الكرسوفية البرية الطليحة منها الجبال العالية ،
زغبها ليد أغبر اللون . أزهارها ليلكية . تنيد السعال .

٢٣٤٦٧ - كَرْسُوفِيَّة حَمْرَاء * ، عَنَقَلَال أَحْمَر
Gnaphallium sanguineum (S). دم القَرَّال
Gnaphale rouge (F). Red cudweed (E). Roter
Ruhrkraut (D). Canapichia rosea (I).
نوع من الكرسوفية البرية الطليحة الحولية . تنيد في الأراضي
للحشاة من ارتفاع ٤٠٠ م إلى ١٢٠٠ م . سطح البحر .
زغبها أبيض اللون برآق . أزهارها ال حمراء الجملية . تغيد
السعال والصدر .

٢٣٤٦٨ - كَرْسُوفَة *

Ervum ervilia, *Vicia ervilia* (S). Ers, Ervillier, Lente-
tile ervillière, Vesca noire, Faux orobe (F). Ers, Ervil,
Bitter vetch (E). Stachelwicke (D). Ervo, Fragellini,
Girio, Lero, Moco, Veggolo (I).

نبات عشبي حولي علني من فصيلة البقوليات ، يزهر عليه
رؤته . وهو يعطي ملفاً ليهام أعصها البقر والقمم إلا أن
كثرت مستحقة لذلك يحسن الثروي في استعماله || جلونه
سطحية متعقبة الانشباب . ساقه عوززة قليلة الأعروق
تقلو من ٢٠ إلى ٤٠ سم . أوراقها متعاقبة ، مركبة ، شضية ،
مؤلفة من ١٠ أو ١٢ أو ١٤ زوجاً من الأوراق
الامتقابلة ، فصلها يميني الشكل ، أسن السطح .
أزهاره صغيرة اللد ، بنفسجية اللون سطحية الزناد . ثماره
سنت صفار وكل سفة تحسن من حبيتين إلى ثلاث حبات
صغيرة القدر لا قياسية الشكل لونها في الصرة البنية .
زراعتها بعلية وهو يجرى بعد الحطة أو الثمر . من جميع
الأثرية الخلفية والمتوسطة الانتاج ولا يخشى سوى المواقف
الرطبة || ينادر عاده في الكواكن لزوم الدثم رباح
من ١٠ إلى ١٢ كيلو .

٢٣٤٦٩ - كَرْسُوفِيَّات
هي البقوليات ، اطلبها .

٢٣٤٧٠ - كَرْسُوعِي
Gréaire (F).
Gregarious (E).

صفة النبات الذي يعيش ويكثر سباعياً متجانساً .

منصبة ، أوراقها أبيدة ، اطليحية ، ستانية ؛ فصلها
جامد الصلصة ، مشاربي الحافة . أزهارها عقودية التجميع
ثمارة صغيرة اللد زيتونية الشكل ذربة القلب ، لونها إلى
الحمرة أو السواد .

٢٣٤٥٨ - كَرْزَة
Cerise, Gulgne (F).
Cherry, Sweet cherry, Heart cherry (E).

هي ثمرة الكرز ، اشكالها وألوانها عديدة جميعها مستحبة
العلم المركب . لباب سوتها يحوي نحو :

من الماء	٨٠,١٠ ٪
من المواد السكرية	١١,٦٠ ٪
من المواد الاستخلاصية	٣,٨٥ ٪
من المواد الازوتية	٣,٢٥ ٪
من المواد الدعنية	٢,٢٥ ٪
من السليولر	٢,٥٢ ٪
من الرماد	٤,٤٣ ٪

وهو يحوي أيضاً بعض الحماض الضوية انحصا الحامض
التفاسي وما لا يستأن به من العناصر المعدنية كالبرناس
والفسفور والفلينزيوم والكريت والكلسيوم والصوديوم
والحديد والنحاس واليود ... انصف أن ذلك نحو ١٥ ٪
من الفيتامين د٥ وما لا يقل عن ٥٠٠ وحدة من الفيتامين
د٤ .

٢٣٤٥٩ - كَرْزِي
Bacciforme (F).
Bacciform, Berry-shaped (E).

ما كان شكله حبة العنب أو الكرز .

٢٣٤٦٠ - كَرْسُوس ، صَاهُوزَة ، مَرَاك
Chèrreria (F). Goat-pan (E).

ملأى المازز المني المسقوف . والكرس هو ما تنيد من
البر والابل . ج . اكراس ومرج ويوصي .

٢٣٤٦١ - كَرْسُوفَة
Botryodiplodia (S).

جنس فطور مجهرية من فصيلة الفصليات . يكتنذاته
ضمية كثيفة تجمعها ونسبة غليظة شارة . بويقاته خطية
اللون ثنائية الخلية || أنواعه المؤذية قليلة ، يكثر وجودها
في البلاد الحارة ، أعرفها ما يتبع .

٢٣٤٦٢ - كَرْسُوفَة الكَاكَاو
Botryodiplodia theobromae, Lasiodiplodia theobromae (S).

فطر مجهرى يصيب عدة نباتات مختلفة الفصائل اعصها
الككاو والفاي واين والمخاط والقطن والموز || هو حل
الككاو آكلة تنخر الجذور فتدبل الأوراق بعد أن تمتلئ
السنج يحمض من الففن الاسود وبد أن توشع للاء الساق
بعض أبقع المنخفضة السواء اللون || وهو حل الموز
من مركب قلب الارومة ليلونها ا يصيب الطرح فيوش
الأثر يقع قفطرها وحققها نحو ٨ م . لونها إلى الأخضر
الزيتوني || وهو حل المخاط ذبول على بقعة الشجرة يعقبه
اسمرار واسوداد في للاء الساق || ويصيب الشاي واين
فيلال اللتان والانداد ويلونها || وهو في القطن يوصي
مركب المغازة فيمنعها من النمو بعد أن يركم ثيلها ويتعصب
بشجيه الاسود || يكافح بالتصاق وسرق الاضفاء المؤيدة ،
بتطهير الجروح ، وباستعمال أحد الفوطير الفسالة أما
نفساً حل النبات أو تدفيراً على الأثرية والنباتات .



كرز غاري



كرسوفية جبلية



كرسوفية حراء



كرسوفية

قصيرة وغلظة ، جلورها عمودية . أوراقها لاطفة متناهية مركبة . السفل منها قرصية الانشعاب مسطيلة الاعناق الفصليّة ، اما العليا فتباعدة وكثيرة التفريش . ازهارها صيوانية التجميع ، لونها الياض الاصفر || وهي من النباتات الطبية تدر البول وتفتك الصدر وتحلل الورم وتفتح الحصى || تنكثر بالزهر وترغب في الازربة الدالية الحصى .

* كُرْسِي الجَبَل * ٢٣٤٨٢

Athamanta oreoselinum, Petroselinum oreoselinum (S). Ache de montagne (F). Moutain parsley (E). Augen Wurz (D). Appio di montana (I).

نبات عشبي بري طلي معمر من فصيلة الخيميات ، منبته الجبال الرقيّة . ساقه مخشوشة تعلو من ٢٠ الى ٤٠ سم . أوراقه مسطلة الاعناق كثيرة التفريش والتفرش . ازهاره صيوانية التجميع صلبة القذ وريدي اللون .

* كُرْسِي الماء * ٢٣٤٨٣

Ache latifolium (S). Ache aquatique, A. d'eau, Berle (F). Water parsnip, Water parsley (E). Breiter Merk, Wasser Peterlein (D). Erba crociana, Sedano d'acqua (I).

ومن اسمائه أَس النّس وبرجور الماء وهو نبات عشبي طلي معمر ، من فصيلة الخيميات ، يتكثر في المنابع والأراضي الرطبة . أوراقه جلورها مضادة الحفر ومردة البول . يزوره منطفة الكارول وهي مهيجة لقوة الجنسية وقد تكون شاذة نظراً لما تحواه من النّسور والكلسيوم . وإذا رعت الماشية من غم وباعز ويقر كرها ويباد صنفه .

* كُرْسِي بَرِّي * ٢٣٤٨٤

Smyrniolus olusatrum (S). Maceron, Mac. potager, Ache large, Gros persil (F). Alexander's, Horse parsley, Wild celery (E). Gespenstgelbode, Smyrnerkraut (D). Macerone, Olosatro, Smirno (I).

نبات عشبي بري يغلي من فصيلة الخيميات . ينبت في معظم الاسواق المعتدلة الحرارة . قريب الشبه من البقدونس والكرفس . أوراقه مأكولة مستحبة العرف والطعم .

* كُرْسِي رُؤْيِي * ٢٣٤٨٥

Persil (F). هو البقدونس ، اطليه .

* كُرْسِي لَفْيِي * ٢٣٤٨٦

Apium graveolens rapaceum (S). Céleri-rave, Céleri navet (F). Turnip rooted celery, Celeries (E). Kohl-rabistelleri, Selleriak, Knoll-Sellerie (D). Sedano rapa (I).

شرب من الكرفس يزرع جلورها وأوراقه المأكولة . وهو نبات محلي يندر في الأكلاد ثم ينتقل الى مستقره . يرغب في الازربة الطوارة الحصى .

* كُرْسِي * ٢٣٤٨٧

Auchenoglossis (S). قال الفريق أمين الملويف : « الكرفس أو شال كرفس ، ملك سلوري ذكر منه بولنجه نوعين في التيل » .

* كُرْفَكُول * ٢٣٤٨٨

Carvacrol سائل زيتي حاد اللون يتخلط من حطور الشفويات والسميويات ، انحصا حطور العصير والودنج والندج . ثقله النسبي عند ١٠°مغ = ٠.٩٨٥٦ . وهو يغلي عند ٢٢٦°مغ .

٢٣٤٧١ - كُرْسِي الجَزَاء

كربي الاجزاء مجسدة كواكب بالقرب من الجوزاء .

٢٣٤٧٢ - كُرْسِي

Souchet à nattes (F). هو سم الحصر ، اطليه .

٢٣٤٧٣ - كُرْسِي

Panse, Rumen (F). Bally, Paunch, Rumen (E). اكبر اقسام معدة الخيترات تتصل بالمرى وتشفل ثلاثة ارباع الجوف .

٢٣٤٧٤ - كُرْسَاب * ٢٣٤٧٥

Calyptra (F). Calyptra (E). هوقل الجراثيم الفطرية واشباهها .

٢٣٤٧٥ - كُرْسَب * ٢٣٤٧٦

Calyptra نميد غشائي مركزه عند الزاوية الخلفية من قاعدة ظهران الحشرة .

٢٣٤٧٦ - كُرْشُون * ، وأَس الحَفَش

Hertia cheirifolia, Othonna cheirifolia (S). Hertia, Othonne à feuilles de giroflée, Souci d'Afrique (F). Barbary ragwort (E). Schleierkraut (D). Fiorrancio d'Africa (I).

نبات عشبي سربوي معمر وحيد الجلس والنوع من فصيلة المركبات المشرقيات . شروبه التريينية عديدة . سوقها مخشوشة مسطحة ، فروصها متضيقة . أوراقها حرة وهي متناحية مشورة للشكل واللون نصلها سيك التنجع الشبه اللحسي . ازهارها وريسية كبيرة لثقة صفراء اللون . ازهاره يستمر من نيسان الى حزيران .

٢٣٤٧٧ - كُرْمان

Oursin melon هو التوتياء ويحلى الصفور نوع من الاخنيوس المأكول يتكثر على الشواطئ الصخرية اللبنانية .

٢٣٤٧٨ - كُرْمانِيَات * ٢٣٤٧٩

Echinides, Oursins (F). Echinides, Sea-urchins (E). رتبة حيوانات بحرية شاذة الاعداد . فصائلها واجناسها وانواعها الحاية والمتثرة عديدة ، معظمها شائع على الشواطئ البحرية في جميع اصقاع العالم .

٢٣٤٧٩ - كُرْصَانِيَة * ٢٣٤٨٠

Echinocystis (S). Echinocysta (F). Echinocystis (E).

عجلة معمرة عارضة من فصيلة القرصيات . مهدا بعض مناطق امريكا الشمالية . ساقها تطول نحو ستة امتار . حولقتها ثلاثية الشعب . أوراقها كفية ، خماسية الفصوص . ازهارها بيضاء اللون ، نجمية الشكل ، المتكبة منها صغودية التجميع ، الملقية فردية . ثمارها بيضية الشكل ، لونها الى الاصفر ، اطول نحو ٥ سم ، وتعرض نحو ٤ سم . طعمها تافه الحلاوة توكال مطبوخة .

٢٣٤٨٠ - كُرْف

كرف وكُرْف : تسم . يقال كرف الفحل او الحمار عندما يشم طريقه ثم يرغ رأسه ويقب جسطه .

٢٣٤٨١ - كُرْسِي تَبَطِي * ٢٣٤٨٢

Apium graveolens (S). Ache, A. des marais, A. douce, Céleri (F). Celery, Marsh parsley, Smalage (E). Sellerie, Echter Sellerie (D). Accio, Appio, Sedano, Seleno (I).

نبته بقلية عذوة من فصيلة الخيميات ، ساقها صلبة



كُرْسُون



كُرْسِي



كُرْسِي الجَبَل



كُرْسِي الماء



كُرْسِي بَرِّي



كُرْسِي لَفْيِي



كرنة جينفا



كرنة ذرية



كرك



كركب



كركند افريقي

صغيرة ، مخروطية الشكل ، ضيقة الاشداد . عينيا ماسحة . محاسرها متراكبة السيف . زانفانها الظهري عبيقة مستطيلة . الذيلية فاخرة || اثوابها فضية يعلوها تيلبع مترص اسمر ورفة ممرار تمتد من الرأس الى شبح الظهر والذنب || لحومها جيدة الصفت مرطوب فيها .

٢٣٤٩٧ - كركش (F). *Chrysanthème matricaire*
هو قوقان منيات ، اطليه .

٢٣٤٩٨ - كركب * كركسلا
Crassula (S). Crassula (F). Crassula, Thick-leaf (E). Dickblatt (D). Crassula (I).

جنس نباتات لحمية معمرة من فصيلة الخلدات . انواعه زهاء ١٠٠٠ ، منها افرقية الجنوبية . معظمها بري وينضج زريبي . اشهر انواعه الكركب القريري . ازهاره قرنية اللون ، لودية التجميع ، جميلة الشكل ، فواحة الكرف الياسميني .

٢٣٤٩٩ - كركة
Alambic (F).
هي الامبيق ، اطليه .

٢٣٥٠٠ - كركج
Sarcelle d'été (F).
هو الخلف الصيبي ، اطليه .

٢٣٥٠١ - كركندن * كركند ، هرئيس
Rhinoceros (S). Rhinocéros (F). Rhinoceros (E).
جنس حيوانات ليونة من الحافريات وفصيلة الكركنديات . انواعه خمسة ، موطنها البلاد الحارة ، منها ثلاثة اسوية واثنان افريقيان . جنبها ضخمة الاجرام . قوائمها قصيرة ثلاثية الاصلاب . رؤوسها غليظة وكبيرة ، اذنانها قصيرة مستقيمة ، عيونها صغيرة . منها اشحن بالغ السك . تحمل قرنا او قرنان فوق انفها || وهي حية الطبع لكنها شرسة اذا هوجمت . تقيم قرب الماء . قويا الجلود والاصبان والراسع والاعشاب اللينة . تعيش اوزاجا ذكر وانثى .

٢٣٥٠٢ - كركندن ابيض ، هرئيس
Rhinoceros sinus (S). Rhinocéros camus (F).
اكبر واضخم انواع الكركند وهو من ذوات القرنين . سفنه الى البياض الاخير . جسده طويل نحو ٢٧٠ سم . وتعلو ١٩٠ سم . ذليه نحو ٧٠ سم . قرنه الكبير يطول من ١٢٥ الى ١٦٠ سم . والصغير من ١٨ الى ٢٢ سم . موطنه يمتد من الحبشة الى اواسط افريقية وصفان بهر الأوراج .

٢٣٥٠٣ - كركندن افرقي * عوريت
Rhinoceros bicornis (S). Rhinocéros bicolore (F).
كبير الجثة البليغة الفسحة . طوله نحو ٣٥٠ سم . وطوله ١٧٠ سم . ذليه ٧٠ سم . سفنه الى البياض الخطية الداكنة . وهو من ذوات القرنين ، قرن كبير طوله زهاء ١٠٠ سم . وقرن صغير مستعرض للقاعدة طوله نحو ٢٠ سم . موطنه يمتد من الحبشة الى القطب . يرغب في اللعاق وضفان البحيرات .

٢٣٥٠٤ - كركندن البحر
Licorne de mer (F).
هو عرش البحر ، اطليه .

٢٣٥٠٥ - كركندن السنڊ ، كندة
Rhinoceros sondaicus (S). Rhinocéros de la Sonde, R. de Java (F).
كركند وحيد القرن كبير الجثة . جرمه يصغر جرم الهندي .

٢٣٤٩٩ - كركول ، كركون
Carvol, Carvone
سائل زيتي مادم اللون يتصلص من بطور الثيار والكرويا والكومن والبنج الجدي والصمغري . ثقله النسبي عند ١٧ سم^٣ = ٩٦٠ ، وهو يغلي عند ٢٢٥ سم^٣ .

٢٣٤٩٠ - كركفة
Coque d'œuf (F). Chell, Empty egg (E).
قشرة البيضة المليا اليابسة وتكسى القوة .

٢٣٤٩١ - كركفة
Corypha (S). Coryphe (F).
ج . كركف . جنس اشجار ريفية الجلع المنصب الجالس من فصيلة النخلات . منها المناطق الاستوائية الاسوية والافريقية . اوراقها هامة الارتفاع ليفة التركيب ، يشترج منها نسج الكرف الذي يستعمل في صناعة القمبات وبض اللزائم المنزلية || وهي من الاشجار الزينية التي تعيش في بعض الموانع الخاصة من شواطئ المتوسط || اشهر انواعها الزينية ما يلي .

٢٣٤٩٢ - كركفة جبنفا * كركفة مستديرة الورق
Corypha gebanga, Gebanga rotundifolia, Taliera gebanga (S). Coryphe à feuilles rondes, Taliera (F).

نوع من الكرف الزينية الشائع الاستعمال ، يوجد في جميع الاربة واقلا غصبا اما لا يتحمل الطلش الشديد والمعارض الباردة التي يخفص فيها لقر الى خمس درجات مع . فوق الصفر || تجتره تملو من ٤ الى ٦ امتار بمدة ٢٠ سنة . جلدها منتصب القوام ، مالى اللحاء ، ينهي بقصة من الاوراق المستديرة المروحية والمستطيلة الجريفة المشوكة .

٢٣٤٩٣ - كركفة ذرية * شكلج
Corypha umbraculifera (S). Coryphe parasol, Talipot de Ceylan (F). Great fan-palm, Talipot palm (E). Talipotbaum, Gross Schirmpalme (D). Palma corifia, Corifa del Malabar (I).

نوع من الكرف . جلدها اسطواني الشكل منتصب كالشمة يملو نحو ١٠ امتار . قشرته ماسلة . الياف الخشبية شديدة الصلابة . اوراقها هامة مروحية كبيرة القد مستطيلة السنف جميلة الخشار الاالص .

٢٣٤٩٤ - كركفيات
Coryphinées (F).
سبط اشجار برية وتزيينية من فصيلة النخلات . اجناسه وانواعه المعروفة لا تتجاوز العشرة . منها الاقاليم الاستوائية . يكثر وجودها في بعض مناطق الهند وجاوا وجزر الزابج وسولاو || سرفها منتصب ريفية . اغشائها حلبة تستعمل في البناء . اوراقها هامة الارتفاع صناعية الاستعمال || اشهر اجناسها الكركفة .

٢٣٤٩٥ - كركلة
وقف من اللي . يقال كركت اللدجاجة وهي كركة اذا ولقت من البيض .

٢٣٤٩٦ - كركلة *
Charax (S). Charax (F). Charax (E).

جنس اسماك بحرية من شائكات الزعانف وفصيلة الاسبوريات . انواعه المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار البلاد المعتدلة الحارة || اجسامها بسيطة ، شبه بيضية اللون ، تطول من ٢٥ الى ٣٥ سم . رؤوسها



كرَكَدَنْ الهَنْد

عيناه جؤونيا اللون . متفادح اسمر القاعدة والجسم ، اسود البهرة . سناقه الى السرة السوداء || قوته كل ما استطاع اقتراسه من اسماك . وحيوانات وطيور وحشرات . يطارد الزبيج ويفرغها من طير الماء فينزعها ما تصعد من سمك || يذبح عشه في اخمص يطنه بالخشيش والطحلب . الاثني قنص يصفان في اوائل شهر محوز . الحفن يستمر نحو اربعة اسابيع تقوم به الاثني بمنارة الذكر . الفرخ يستقل بطنه اثناء ابتداء من اوائل ايلول .

٢٣٥١٣ - كَرَكَرُو * Carcharodus (S).

جنس حشرات من فصيلة الحسريات . انواعه الفسارة قليلة تركب الخبازيات || فراشاته صغيرة القد طولها براوح من ٢٨ الى ٣٢ سم . اجسامها مخروطية الشكل ، كسكية اللون . رؤاشها بيضاء يعلوها تجلجج وتبين وزرا كش غثلفة الالوان || تظهر من حزيران الى ايلول . تمتع مكها حل الازرق ينفق من رقات صغيرة القد مستفدة الجسم . رؤوسها سود ، انوارها الى الزرقا يعلوها تحطيط وتجلجج اسمر .

٢٣٥١٤ - كَرَكْسَة مُدْبِيَّة * Charaxes jasius (S).

Charaxes jasius (S). Charaxes jasius, Pacha à deux queues (F). Charaxes jasius (E). حشرة من فصيلة البشوريات حرشفيات الاجنحة . موطنها معظم مناطق حوض البحر الابيض المتوسط . فراشها وأشعة قوتها مشر الاضمار . سرفتها تمش على اوراق الخنثنيات و اجسمها كبير القد يطول نحو ٢٢ سم . بسطها نحو ٧٥ سم . رأسها جؤوي اللون ، عيناه كبيرتان . زبابانها صولجياتان . مرفشها دقيق الجرم . جوشها يطنها الى المرة البراءه المولج || رؤشها الاناميان الى العصمة الحطية تملوها ببق وتزويق فيها الازرق والاسود والبرتقالي والاصفر الصنابي والاحمر . رؤشها الخلفيان الى السواد الازرق المولج تملو ببق وتزويق كما في الزوج الاسامي وثلاث جدات الاولى بيضاء ، الثانية متراكبة الالوان ، الثالثة صفراء || لها جيلان في الحول . تظهر فراشة الجبل الاولى في نيسان وتظهر فراشة الجبل الثاني في آب . تسرح في النهار . تماطل بعد ظهورها بسنة اسابيع وتمتد الممكن لطحا على نصال اوراق النبات العائل || السرة تطول نحو ٦٥ سم . اجسمها اسطواني الشكل ، مالمس القشار . ثوبها الى الخضار الاملح يعلو الى السكتين الخامسة والسابعة بعثان مستديرتان مركزهما اسود يحوقه الاصفر ويطوقه اطار اسفر . رأسها سداسي الزواك القرنية الجلوية اللون . سكتها الشرجية مغلفة الطرف الاخاذ || طور الاكمال الذي يستمر في الجبل الاولى نحو ثلاثة اسابيع يستمر في الجبل الثاني نحو ٢٢ اسبوعا .

٢٣٥١٥ - كَرَكُم * Curcuma

جنس نباتات جذمورية صفولية عشبية معمرة من فصيلة الزنجبيليات . مهدا المناطق الاسيوية الحارة . انواعها قليلة اعرفها الكركم الاسود والكركم الزعفران والكركم الصياحي || اوراقها منتصبة مستطيلة الزناد سنكية الشكل للشارف . ازهارها صفراء اللون ملبلة التجميع تتصلع شمرخ قصير || يستخرج من حساقلها مادة تشوية مأكولة تدهي اردوت الهند ويستخرج من ازهارها وبتاديرها مادة صبغية صفراء اللون ومادة طيبة تدهي كركمين (Curcumine) .

طوله نحو ٢٨٠ سم . وارتفاعه ١٧٠ سم . اثناء جء لا قرن لها . يكتم في الغابات الكثيفة قرب جداول الماء على ارتفاع ٢٠٠٠ م . من سطح البحر . موطنه الهند وبرمانيا وبنجاول .

٢٣٥١٦ - كَرَكَدَنْ سُونَمَرَا * Rhinoceros sumatrensis (S).

Rhinoceros sumatrensis (S). Rhinoceros de Sumatra (F). اصغر انواع الكركدن جرما واقلها غلاظة . جسته تطول نحو ٢٤٠ سم . وتصل ١٣٠ سم . ذنبه ٦٠ سم . اما وزنه فلا يقل من ١٠٠٠ كيلو . قرنه غليظ القناعة البطة . ذرب الطرف يطول نحو ٧٠ سم . || موطنه صومترا وسيام وملقة ...

٢٣٥١٧ - كَرَكَدَنْ هِنْدِي * Rhinoceros unicornis (S).

Rhinoceros unicornis, R. de l'Inde (F). احفظ انواع الكركدن الاسيوية وسيدة القرن . وهو كبير الجثة قليظة طوله نحو ٣٠٠ سم . وطوله ١٧٥ سم . اما ذنبه فنحو ٦٥ سم . وقرنه ٣٥ سم . وزنه براوح من ٢٠٠٠ الى ٣٠٠٠ كيلو || موطنه مستنقعات الهند وصفاف نهر الكنج .

٢٣٥١٨ - كَرَكَدَنْ كَسِي * Rhinoceros unicornis (S).

Rhinoceros unicornis (S). Rhinoceros de l'Inde (F). فصيلة حيوانات لبونة من الحافريات . اشهر اجناتها الكركدن .

٢٣٥١٩ - كَرَكَدِيَّات * Palinuridae (S).

Palinuridae (F). Palinuridae (E). فصيلة حيوانات بحرية من القشريات عشاريات الاربل ، طولها الاقل . اجناتها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار العالم || اعرف اجناتها واشهرها واشهرها المقيس والجراد البحري المعروف ايضا بالكركد او الكركند .

٢٣٥٢٠ - كَرَكَر * Fourreau (S).

Fourreau (S). Sheath (E). الكركر وهاء قصب الثور والئيس .

٢٣٥٢١ - كَرَكَر * Stercorarius (S).

Stercorarius (S). Stercoraire, Mouette pillarde (F). Jaeger, Skua (E). جنس طير بحرية من كليات القدم . انواعه ثلاثة تجوب البحار من النيك الى الجنوب . اجسامها هيفاء القد ، حيلة الشكل ، بلاء الثوب ، مستطيلة الاذنان . بسطة جوارحها براوح من ٨٠ الى ١٢٠ سم . مناقيرها طويلة منتفخة انشاذ || تطارد زبيج الماء والخرشة فتنازعه ما يصيدان من سمك وقد ترهبها حل لفظه نلتقه .

٢٣٥٢٢ - كَرَكَر شَايِب * Stercorarius catarractes (S).

Stercorarius catarractes (S). Stercoraire ravisseur, Labbe cataracte (F). Cataracta Skua (E). نوع من الكركر . طائر بحري من كليات القدم وفصيلة النورسيات . اصنامه الجوار القطعية . مليته الحياتي فرد . لا تقرب الذكر من الاناث الا في زين الكوم والحفن || جسمه ابيض الشكل ، مستطيل الذنب والجانح . طوله نحو ٥٧ سم . وبسطة نحو ١٠٠ سم . فروه الى السرة المابة المضملة بالشمعة السعفاء . بطه الى السرة الرمادية .



كرَكَر



كرَكَرود



كرَكَدَنْ



كرَكُم



كركي



كر كند الزيتون



كركي رمادي



كركي مشعوبة

Grus (S).

Grus (F). Crane (E).

جنس طيور كبار من فصيلة الكركيين ورثة طوال الساق. كتيه أبو حريان وأبو حن وأبو البزار وأبو نيم وأبو المصم. ج. كراكي. ١٢ أنواله ١٢. جميعها من القواطع. طويلة اللقن والساق. قوية المنقار الغريبي المسطح. أنوالها تختلف باختلاف أنوالها يكثر فيها الأبيض والرمادي. رؤوسها ملس أو ثنائية القنطرة || تألف المناقع وخطوط الأنهار. قوتها الأعشاب والحبوب والذرة والديدان والحشرات والصفاد والرجاجات من عتله وأنهي || تدفن في الفصوص رتيه في الإدخال السرحه أو بين الأعشاب الزرقية. الانثى تقص من ٢ إلى ٥ يبيضات تحضنها بتلوته الذكر || أحرف أنواله وأشهرها ما يلي.

Grus cinerea (S).

Grus cinerea (F). Common grey crane (E).

نوع من الكركي، كبير الجثة، طوله يراوح من ١٣٠ إلى ١٤٠ سم. ثوبه أبيض اللون. رأسه ويقدم من السواد الأزرق للمواج. حمراء وبجانبه منقار إلى الأبيض الناصع. أباهر وأنيكه وساقه إلى السرة القصية اللامعة. منقاره أسود اللون أخضر المواج. عيناها بيروية مستديرة. يآلف المناقع وأغوار الأهراب وجزيرا. يحبب العالم في طلب الرزق ويعود مع الأهراب إلى مشاته الذي يمتد من السودان إلى الهند.

٢٣٥٢٧ - كُرْكِي مَشْعُوبَة *

Grus viridirostris (S). Grue de Mandchourie (F). Demoiselle crane (E).

نوع من الكركي أكبرها جثة وإجلها ثوباً. طوله يراوح من ١٤٠ إلى ١٥٠ سم. ثوبه إلى الأبيض العاجي جبهته إلى الخضرة. عيناها كالأليوت. قاعدة منقاره ويقدم منقاره إلى السواد الأزرق للمواج. منقاره إلى الخضرة الزرقية. أباهر وأنيكه إلى السواد المايق يطوق مواج أخضر. ساقه إلى الأخضر الأصفر || مشاته بعض الأقاليم السميكة. يكثر في مشعوبة. يآلف للشواطئ النهرية والبحرية.

Gruidae (S).

Gruidae (F). Gruidae (E).

فصيلة طير من رتبة طوال الساق. اجناسها وأنوالها قليلة العدد أشهرها الكركي والفرزوق.

٢٣٥٢٩ - كُرْكِي ش

Camomille odorante (F).

هو ألبانيلج البطر، أطله.

Crocus (F).

هو الزفران، أطله.

٢٣٥٣١ - كُرْكُلُومَة

Stapelia (F).

هي النلف، نبات من السقليات، أطله.

٢٣٥٣٢ - كُرْكِين *

Carlina (S). Carlina (F).

جنس نباتات عشبية برية طيبة معمرة من الحشرات ونفصيلة المركبات. أنواله عديدة تكثر في الأربطة القاحلة وفي الأراضي المنحاة وبين الصنوبر. سيقانها قصيرة جفحة. لورائها كبيرة مسطحة، مفرقة، شاذكة. أزهارها روكسية ملونة، قفراها يراوح من ١٤ إلى ١٥ سم. أحرف أنواله وأشهرها ما يلي.

٢٣٥١٦ - كُرْكُم أسود، جَدْوَار أسود

Curcuma caesia (S). Curcuma vert, Zedoaire noir (F). Black zedoary (E). Schwarze Zedoarwurzel (D). Zedoaria nera (I).

نوع من الكركم وهو نبات طبي صقولي معمر تكثر زراعته في الهند وسائر بلاد الشرق الأقصى. مساقله تشبه غذائية مأكولة ويستخرج منها ومن الأجزاء بعض المواد الطبية والعصبية.

٢٣٥١٧ - كُرْكُم زَدَوَار، زَدَوَار، جَدْوَار

عقيد، سَطْوَال

Curcuma zedoaria (S). Curcuma zedoaria, Zedoaire (F). Zedoary, Setwall (E). Zedoarwurzel, Zittwerwurkum (D). Zedoaria (I).

نوع من الكركم تكثر زراعته في الشرق الأقصى ويستخرج من مساقله مادة تشبه غذائية تدعى أروث الهند. أزهاره صباغية نقيها منه ويقت.

٢٣٥١٨ - كُرْكُم صِبْغِي، هَرْد، عَقِيد

هندي، مَمِيرَان، أَصْبَغ صَفَر

Curcuma longa, C. tinctoria (S). Curcuma long, Safran des Indes (F). Long rooted curcuma, Turmeric (E). Gilber ingwer, Gilbwurzel (D). Curcuma longa, C. di Levante, Croco Indiano (I).

نوع من الكركم وهو نبات طبي صقولي معمر. يته المضم ويدار البويل ويكثر إفراز العايق ويفتح الشهية. يزرع ويحضر في الهند ويبيع تحت اسم «كاري».

٢٣٥١٩ - كُرْكَمَان

Mellilot-bleu (F).

هو الحنطوق الأزرق، أطله.

٢٣٥٢٠ - كُرْكَمِيَس *

جنس حشرات من فصيلة اليسويبات أنواله قليلة العدد جميعها مفترسة تقتضي على الحوام. ذكورها حرة، أنثاها إلى الضفائر الخطي. أجسامها تطول من ٣٥ إلى ٤٠ سم. وبسطة اجتناباً تراوح من ٥ إلى ٦٠ سم.

٢٣٥٢١ - كُرْكَنْد

هو الكركند وهو أيضاً الجراد البحري، أطله.

٢٣٥٢٢ - كُرْكَنْد الزَيْتُون *

Oryctes nasicornis (S). Rhinocéros de l'olivier (F). خنفساء كبيرة القدر من الجمليات. طولها نحو ٤٠ سم. ثوبها إلى الكستنائي يطوق مواج أحمر لامع. رأس الذكر مسلح بقرن منحنك إلى الوراء. الانثى جاء لاقن لها || يآلف الزيتون. يسرح من الغروب إلى الشروق ويبعث في النهار. يعيش على الأشجار اليابسة وبين نشارة الخشب. يرمته كبيرة القدر، غليظة الشكل، حلزونية الجسم مقوية، خبراء اللون، سمراء الرأس، تركيب جلوده أثريون فظفها.

٢٣٥٢٣ - كُرْكَهَان

Amethystea (S).

Amethystea (F). Amethyst (E). Amethystpflanze (D).

نبات عشبي حولي زراعي زيتوني من فصيلة الشفويات. يزرع لزهوه الأزرق الجليل المستحب العرف. نبتته صغيرة القدر، نحيلة الساق، قصيرة القروغ المستطلة || يتكاثر بالبذر. أزهاره صفراء.

٢٣٥٢٤ - كُرْكُلُومَة

طائر من الزواجر يبيض عيناها، أطله.

الاسروي يستمر نحو عشرة اشهر والسرقة عند بلوغها الادراك تظل نحو ١١ م. جسمها اسطواني الشكل، وأصبع التقسيم السكي، اربع اللون يملو تقطيط اخضر الس من الكويل الى الشرج. رأسها اسود. مديها ورواجها الى السرة || طور الاكمال الذي يستمر نحو اربعة اسابيع ينقضي ضمن صلجة تنسجها السرة في الجلالة او تحت قشور الاشجار الحرجية القريبة من المراحي.

٢٣٥٤٠ - كرمبوس النجيليات *

Crambus perillus (S). *Crambe perle*, *Taigne des graminées* (F). *Crambus perillus* (E).

حشرة من فصيلة التاربات حرشيات الاجنحة. موطنها منظر اقاليم المعتدلة الحارة من الشرق الاوسط واوربة. فراشها واسنة قوتها رقيق الاضرار وطلما. سرتها خاضلة تعيش على النجيليات البرية والزارعية || جسمها صغير يطول نحو ٩ م. بسطها تراوح من ٢٨ الى ٣٠ م. رأسها معتدل الجرم. جناها زهيتسان، بارزتان. زباناها عيطيان. ملاسها دقيقة. مرشها معتدل الطول. جوشها وبعثها الى الريدة القضيعة المواج || روتها الاسمان الى الريدة القضيعة يملوها تخضع خفيف متداخل الاخضر والازرق. روتها الخلفيان الى الريدة السمراء المواج. اهدابها عاجية || الانثى اميز قدام الذكر واغلظ بطناً منه واطول مرشاً || لها جيل واحد في الحول. تظهر الفراشة في مطلع حزيران وتبقى حتى اواخر تموز. تسرح في النهار. الانثى تلقي المكن مبيحاً تغلفه مادة غريبة تكتبه على صنف النجيليات || الطور الاسروي يستمر نحو عشرة اشهر. والسرقة عند بلوغها الكال الجسوري تظل نحو ١٢ م. جسمها شبه اسطوانة الشكل، وأصبع التقسيم السكي، اغير اللون يملو تقطيط جزوي يمتد من الكويل الى الشرج. رأسها اسود اللون. مديها ورواجها الى الطحلة || طور الاكمال الذي يستمر نحو اربعة اسابيع ينقضي ضمن صلجة تنسجها السرة بين فروع النجيليات او تحت اوراقها.

٢٣٥٤١ - كرمه * *Vitis* (S). *Vigne* (F). *Vine* (E).

جنس نباتات معمرة عايشة من فصيلة الكرديات. اقوامها عديدة، معظمها بري وتربي ويضعها زراعي || اشهر اقوامها واعها زرمة واكرها غروباً واجزلا نلماً الكرمه النعنية.

٢٣٥٤٢ - كرمه العنب * *Vitis vinifera* (S). *Vigne commune*, *Vigne noble* (F). *Cultivated vine*, *Grape vine* (E). *Weinrebe* (D). *Vite* (I).

لوح من الكرمه ضرورها المعروفة زهاء ٢٥٠٠ مجها زراعية مشرة. سوقها عايشة لينة مخشوشة. جلورها حزينية منبسطة لا تضرب القور العميق. مرقها سحوق عايلة تنمو على القند. نصلها كفي الشكل يكثر فيه التفصيص الخفسي وهو سنن الحافة، انزب البشرة على صفحته او على الصفحة السفلى. حوالها فائقة حلزونية تنمو قبالة الاوراق. ازهارها حنفي. متانها تكون على عقد سلايات الزجون الحولي ازاء الاوراق. ازهارها صغيرة القند خضراء اللون وهي مركبة من كاسي خاسي الفصل وتوج خاسي البيلات المندمجة التي تبدو كالمفرد فوق الاسدية والمقدة. والاسدية خش والمقدة ذات صلبة فروع يحسن كل منها يوفضتان تصبمان بعد التاير والاصخاب

٢٣٥٣٣ - كركين القشئ الورق *

Carlina scanthifolia (S). *Carline à feuilles d'acanthé*, *Chardouse* (F).

نوع من الكركين الملبول في الجبال. ساقه جعدة تملو من هـ الى ١٠ م. اوراقه كبيرة القند اقشئة الشكل. نصلها خيل البشرة على صفحته السفلى. وروسها قصيرة الزناد. قطرها يراوح من ١٢ الى ١٤ م. قناباتها صفراء اللون. ازهارها يستمر من تموز الى ايلول.

٢٣٥٣٤ - كركين شائع * *Carlina vulgaris* (S). *Carline vulgaire* (F). *Carline thistle* (E). *Kleine Eberwurz* (D). *Carline vulgare* (I).

نوع من الكركين الملبول يكثر في المراحي الجبلية وفي الاراضي المنبسطة. ساقه تملو من ٢٠ الى ٤٠ م. اوراقه كبيرة القند، شديدة التفريغ، خلية الصفحة السفلى رتعاها المائية قبل الادراك والهج. وروسها الزهرية ملونة، قطرها يراوح من ١٠ الى ١٢ م. قناباتها حنطية اللون || يقال انه من النباتات الطبية التي تقيد افادة الحرف والاراضي شوكي.

٢٣٥٣٥ - كركين عديم الساق * *Carlina acaulis* (S).

Carline scaule, *Baromètre*, *Loque* (F). *Carline* (E). *Eberwurz* (D). *Carline*, *Carlo pinto* (I).

نوع من الكركين الملبول. ساقه جعدة تملو من هـ الى ١٢ م. اوراقه كبيرة مستطيلة مفروعة، نصلها اخضر اللون، مائل البشرة على صفحته. وروسها كبيرة القند ملونة، قطرها يراوح من ١٠ الى ١٣ م. قناباتها قضيعة. ازهارها يستمر من تموز الى تشرين وهو ينكش عند وجود النيم ويبلغ مع اشعة الشمس.

٢٣٥٣٦ - كرم * *Vignoble* (F). *Vineyard* (E).

ومن اسمائه الفردوس. كل ارض مفروسة كرمه.

٢٣٥٣٧ - كرم * *Cépage* (F). *Vine-plant* (E).

الضرب المعروف الموسوف من الكرمه.

٢٣٥٣٨ - كرم زيتون، يستعان زيتون، واكلين *Olivale*, *Olivarale*, *Olivieraie* (F). *Oliva-plantation* (E).

كل ارض غرس فيها الزيتون.

٢٣٥٣٩ - كرمبوس القراحي *

Crambus pratensis (S). *Crambe des prairies*, *Taigne des prairies* (F). *Crambus pratensis* (E).

حشرة من فصيلة التاربات حرشيات الاجنحة. موطنها منظر اقاليم البلاد المعتدلة الحارة من الشرق الاوسط واوربة. فراشها واسنة قوتها رقيق الاضرار وطلما. سرتها خاضلة تعيش على اوراق النباتات الحرجية || جسمها صغير قضيبي يطول نحو ٨ م. بسطها نحو ٢٤ م. رأسها صغير الجرم. جناها زهيتسان صيرتان. زباناها عيطيان. ملاسها دقيقة. مرشها معتدل الطول. جوشها وبعثها الى الريدة || روتها الاسمان الى السرة الكنتية يملوها زركمة منمرقة صفراء وجة مستطيلة يضاه. روتها الخلفيان الى السرة الكنتية السوية. اهدابها الى التني || الانثى اميز قدام الذكر واغلظ بطناً منه واطول مرشاً || لها جيل واحد في الحول. تظهر الفراشة في ايار. تسرح في النهار وتبقى في الليل || الانثى تلقي المكن مبيحاً على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || الطور



كرين شائع



كرمبوس المراحي



كرمبوس النجيليات



كرمة العنب

٢٣٥٤٨ - كُرْمِيس الزَيْتُون (F). *Kermès de l'olivier*.
هي قزمية الزيتون المخططة ، أطلبا .

٢٣٥٤٩ - كُرْمِيس السَّنْدِيَّان (F). *Kermès du chêne*.
هي قزمية السنديان ، أطلبا .

٢٣٥٥٠ - كُرْمِيس الْوَرْد (F). *Kermès du rosier*.
هي قزمية الوردة ، أطلبا .

٢٣٥٥١ - كُرْمِيسِيَّات (F). *Coccidés*.
فصيلة حشرات مشهورة باسم مغفريات ، أطلبا .

٢٣٥٥٢ - كُرْمِيَّي (F). *Vinicole, Viticole*.
Wine-growing (E).
كل ما هو مختص بالكرونة من زراعة وصناعة .

٢٣٥٥٣ - كُرْمِيَّات (S). *Amplidacées*.
Amplidacées (E).
فصيلة نباتية من ذوات القفلقتين عديدة القممات سفلية الاسدية . اجناسها وانواعها عديدة اشهرها الكرونة .

٢٣٥٥٤ - كُرْمَات (F).
اصول الكرم التي تبقى في جذع اللخلة بعد قطع السعف .
الواحدة كرنافة . ج . كرايف .

٢٣٥٥٥ - كُرْمَب * (S). *Brassica caulorapa*.
Chou-rava, Colrave (F). Hungarian turnip, Kohl-rabi (E). Knollenkohl, Knollkohl (D). Cavolo rapa (I).
نوع من الملفوف الزراعي المأكول . ساقه غليظة مستديرة تنمو على سطح التربة || يجود في جميع الاربع الزراعية .
يلو في الاكواثم ثم ينقل الى مستقره حيث ينضج على ابداء تراوح من ٤٠ الى ٥٠ سم . بين السطر والسطر . وهو ينضج ويك .
قيته الغذائية لا بأس بها لذلك يكثر استعماله كمكاف البهايم اخصها البقر .

٢٣٥٥٦ - كُرْمَب الْجَمَل (F). *Morlandie*.
هو الخمر ، اطلبا .

٢٣٥٥٧ - كُرْمَب الْمَاء (F). *Nénuphar bleu*.
هو التيلوفر الأزرق ، اطلبا .

٢٣٥٥٨ - كُرْمَب بَحْرِي * (S). *Crambe maritima*.
Crambe maritime, Crambé, Chou marin (F). Sea cabbage, Sea kale (E). Echter Meerkohli, Seekohl (D). Crambe maritima, Cavolo marino (I).
بقلة معمرة من فصيلة الصليبيات تثبت برية على الشواطئ البحرية وتزرع في بعض البلاد اخصها اكثرها حيث يأكلونها بكثرة . طعمها كالقنبيط .

٢٣٥٥٩ - كُرْمَب عَنَكِي (F). *Rutabaga*.
Swedish turnip, Swede (E).
نبات علفي يدهى رباغة ، أطلبا .

٢٣٥٦٠ - كُرْمِيَّات (F). *Pieridae*.
Pieridae, White butterflies, Sulfur butterflies (E). Weisslinge (D).
فصيلة حشرات من سرشفيات الاجنحة . اجناسها وانواعها عديدة منظها متوسط الحجم وبعضها كبير وسريع . انواعها

زبور الثمرة . والثمرة عننية مختلفة الاشكال والاحجام والالوان مركبة من قشرة خارجية ولباب ويزور . لبابها يولفت من ٨٥ الى ٩٠ ٪ من الثمرة وما تبقى فيعود الى القشرة واليزور . وهو يكون عند الادراك قليل الحموضة . كثير المادة السكرية ، لللب الطعم ، مستحب النكهة والعرف ، متوسط تركيزه :

ماء ٧٥,٥٠ الى ٨٠,٥٠ ٪
سكر قابل الامتصاص ١٨,٥٠ الى ٢٥,٥٠ ٪
حوامض عضوية ٣,٣٠ الى ٥,٤٥ ٪
بوتر ترات البوتاس ٥,٥٠ الى ٧,٥٠ ٪
مواد ازوتية وعضوية عطرية ٥,٢ الى ٥,٣ ٪
والكرونة ترضب في الاقاليم المعتدلة التي تكون لها الحرارة الكافية لادراك الثمار . هذا لا يعني انها لا تنضج في الاقاليم الباردة فهي تنضج وتصلح القدر الشده شرط ان تكون لها حرارة الصيف ما هي حاجه اليه من السموات اللازمة لادراك الثمار . وهي تفضل السهول والمضارب والمناطق المنخفضة على البقاع المنبسطة او المنخفضة . وهي تجود في جميع الاربع يستثنى منها الربلة الصروف والكلسية البحت والطليعية المنسجة || اما تكاثرها فقد يتم على اربعة اشكال : باليزور والتعجيل والتزويد والتلصيص || فاليزور يستعمل حسادة للحصول على اسرام ارقاء جديدة . اما التعجيل فهو اثناع الطلوق واسهلها واسلمها ، قوامه اسطفاة المغلفة من زرعين بلغ الحبل شرط ان لا تقتل صغرها عن الاثننتين . اما التزويد فيرتكز على لي وطر بعض سرور الجفنة الى ان تشرش وتفصل . يبقى التلصيص وهو اشر من ان يعرف وقد كثر استعماله في الاجبان الأمريكية التي لا تحشى الفيلوكسره .

٢٣٥٤٣ - كُرْمَة بَيْضَاء (F). *Bryone blanche*.
هي الثاقرا البيضاء ، أطلبا .

٢٣٥٤٤ - كُرْمَدَكَن ، هَشَان (S). *Narthecium, Abama*.
نبات عشبي بري طلي معمر من فصيلة الزنبقيات . انواعه المعروفة اربعة . جذابها معادة . اوراقها صفية الشكل مستعرجة النصل الجانبد المتحد . شامخها الزهرية منتصبة مستطيلة تملوها اوراق صغيرة ذرية متعاقبة متباعدة . ازهارها عبقريه التجميع . انوعها صغيرة اللقد سداسية البتلات . يستخرج من جميع اعضائها مادة جعالية قفالة شديدة النشاط .

٢٣٥٤٥ - كُرْمَدَكَن مَتَغِيي ، عَشْنِي كَدَاب (S). *Narthecium ossifragum*.
Narthécia des marais, Anthracé des marais (F). Bastard asphodel, Bog asphodel (E). Echter Beinbrech, Beinbrechgras (D). Asphodelo bastardo (I).
نوع من الكبدان وهو نبات عشبي طلي معمر يزور للزهرين . يتكاثر بالقتل واليزور . اوراقه صفية مستطبة الاستطالة . نصلها جانب الصفصه غائر التثقيب . ازهاره صغيرة اللقد لونها الى الصفرة يملوها مزاج اخضر . يستخرج من جميع اعضائه مادة جعالية قفالة يقال انها مشطية ومعيقة .

٢٣٥٤٦ - كُرْمِيس (F). *Kermès*.
هي القزمية ، أطلبا .

٢٣٥٤٧ - كُرْمِيس التَفْحَاح (F). *Kermès virgule*.
هي قزمية التفاح ، أطلبا .



كرب



كرب بحري

Cranchidae (S). **كِرْنِيَّاتٌ** ٢٣٥٦٦ -
Cranchiidae (F). Cranchiidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات رأسيات الأرجل مزدوجات الخيشوم. اجناسها والنواصير الماصرة المرفوعة قليلة العدد اعطائها بحار البلاد الحارة || اجسامها صغيرة شبه اسطوانية الشكل. تتميز برابطها الفضل الذي يجمع بين الرأس والجسم. زعانفها شرجية الاركاناز، خاصة الاصلع. عيونها كبيرة جاحطة || اشهر اجناسها الكرنشة.

Carnallite (F). **كِرْنَلَيْتٌ** ٢٣٥٦٧ -
Carnallite (E).
ملح معاني يستخرج من الارض يستخلص منه البوتاس والمغنيزيوم .

Carnauba (F). **كِرْنُوبَةُ** ٢٣٥٦٨ -
Carnauba palm (E).

كرنوبه هو الاسم البرازيلي . شجرة من التعلجات تدهي البتقوس تكثر زراعتها الصناعية في البرازيل . راجع بقوس .

Calebasse (F). **كِرْنِبٌ** ٢٣٥٦٩ -
هو القرع الطويل ، اطليه .

Chernetidae (S). **كِرْنَيْسِيَّاتٌ** ٢٣٥٧٠ -
Chernetiidae (F). Chernetidae (E).

فصيلة دويبات من القمريات الكاذبة . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد ، معظمها من دويبات المنطق الباردة || تتميز بصغر الجسم المغطى بالمقنوط الطويل وشياعها المستطيلة المسلسلة بملاط طرفية قريبة الشبه بملاط المقارب || تعيش في الموائل المظلمة وتحت قشور الاشجار وفي الليوت القليلة اعصها الخشبية السفوف || جميعها من الدويبات النافعة تقضي على الحشرات الصغيرة المؤذية .

Numenius (S). **كِرْوَانٌ** ٢٣٥٧١ -
Courlis (F). Courlew (E).

جنس طير من الكروانيات القرواط . الاثنى كروانة والجمع كرواين وكروان . انواعه ١٠ تتميز باستطالة دفة مناقيرها وسيقانها . اجنحتها ذلقة . اذنانها مستديرة . ارساها تجعلها الجهة الامامية ، سرديفة الخلفية || تألف الماء وتعيش قرب الشاطئ والبيئات والانهار . قوتها الرخويات والديدان والحشرات والاسماك الصغيرة لتلتقط عنده جزر البحر || اناثها تلتن في افخيس تنشد قنومها بالحنين وهي تقص من ٣ الى ٤ بيضات تحضنها وسدما ٣ اسابيع . اعرف انواعها واشهرها ما يتبع .

Numenius tenuirostris (S). **كِرْوَانُ الرُّمْدُ** ٢٣٥٧٢ -
Numenius tenuirostris (S). Courlis à bec grêle (F).

نوع من الكروان، كبير الجثة طوله نحو ٦٥ سم. وبسطه ١٣٠ سم. لونه الى الوردية الرمادية المرفقة. بطه الى البياض. صياد صليطان، متقار اسمر. سقاء الى الوصاحي. يألف مختلف مناطق حوض البحر المتوسط يحبوها مرتان في السنة .

Numenius tenuirostris (S). **كِرْوَانُ إفريقيا** ٢٣٥٧٣ -
Numenius tenuirostris (S). Courlis à bec grêle (F).
نوع من الكروان، صغير الجثة طوله نحو ٤٠ سم. وبسطه

سوية الاولان بطولها تجذع رقيقج || ريقاتها شبه ملساء. رباط خادراتها يمزج اساطيلها ومعنها من التنبلي .

٢٣٥٦١ - **كِرْنِيَّةُ الزُّعْرُور * قِرَاشَةُ الزُّعْرُور**
Aporia crataegi (S). Aporie de l'aubépine, le Gazzé (F). Black-veined white (E). Baumweibling (D).
حشرة من الكرنليات وسيدة الجبل الحولي . بسطها تراوح من ٦٥ الى ٧٠ م. رواسها الى البياض العاجي، حرقها سود. ريقها سمراء اللون ، غيرا اللب، تعيش على اوراق الزهرود ورياس الاشجار المشرية . يهاها الشنوي تقضيه داخل الاوراق التي تفتلها ويجمعها الى بعضها بحيط من الحرير حنطية اللون .

٢٣٥٦٢ - **كِرْنِيَّةُ الكُرْب * قِرَاشَةُ الكُرْب**
Pteris rapae (S). Pléride de la rave (F). Small garden-white (E). Kleiner Kohlweibling (D).

حشرة من الكرنليات، بسطها تراوح من ٤٠ الى ٥٠ م. م. ذكرها يفس الراش ، سم الزوايا الامامية والبقع الثلاثية. اناثها عادمة الزوايا السمر، ثنائية البقع الصغيرة. لها في الحول من جبين الى ثلاثة . ريقها تعيش منفردة على مختلف اوراق الصليبيات البرية والزراعية اعصها الكرب .

٢٣٥٦٣ - **كِرْنِيَّةُ الفَت * قِرَاشَةُ الفَت**
Pteris napi (S). Pléride du navet (F). Green-veined white (E). Rapsweibling (D).

حشرة من الكرنليات، بسطها تراوح من ٣٥ الى ٤٠ م. م. رواسها الى البياض الاثير يملو موج اخضر . ذكرها سم الزوايا الامامية . اناثها وذكورها ثنائية البقع السود المستطيلة الاشكال || ريقها خضراء اللون تركب الفت ورياس الصليبيات . اذاها يستمر من سريان الى ايلول .

٢٣٥٦٤ - **كِرْنِيَّةُ المَلْفُوف * دُوْدَةُ الكُرْب، قِرَاشَةُ المَلْفُوف**

Pteris brassicae (S). Pléride du chou (F). Large garden-white (E). Grober Kohlweibling (D).

حشرة من الكرنليات بسطها، تراوح من ٦٥ الى ٧٠ م. م. رواسها الى البياض الاثير ، زواياها الامامية سودالاطراف. اناثها ثلاثية البقع السود || لها جعلان في الحول تمتص مكها على الصغمة السفل من لتصل . مكها غروية الشكل، اصفر اللون ، رني التجميع، رزته تده من ٣٠ الى ٥٠ مكنة || ريقها نمة مؤذية تلهم اوراق الملفوف ورياس الصليبيات البرية والزراعية ولا تترك منها سوى الصلوع والمروق . لوبها الى الخضار الاكعب يملو تعيش اسود وثلاثة خطوط مستطيلة قاطية غيرا اللون .

Cranchia (S). **كِرْنَشَةُ** ٢٣٥٦٥ -
Cranchie (F). Cranchie (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات رأسيات الأرجل وفصيلة الكرنشيات . انواعها الماصرة المرفوعة ثلاثة . اعطائها بحار البلاد الحارة . ملجئها الحياتي جماعي . اسراها وافة العدد . جميعها يمة لا تقرب الشطوط . سمرسها دبوي || اجسامها اسطوانية الشكل ، صغيرة القد . زعانفها صغيرة، خاصة الاصلع ، شرجية الاركاناز . ملاسها متنفعة معجمة الاطراف .



كرنية الزعور



كرنية الكرب



كرنية الفت



كرنية الملفوف



كروان ارد



كروان افريقي

٢٣٥٨٢ - **كروان مدسي** (F). *Goble sangans* (F). هو القويون المنسي ، سمكة بحرية ، اطبله .

٢٣٥٨٤ - **كروان أمونياك ، كروان الأمونياك ، حريف الشكار**

Crud ammoniac, Crude ammoniacque (F). سجاد كبري ازوتي يستعمل كعاشور وعاشور وهو من مواليد صناعة غاز الانارة بحوى من ٢ الى ١٠ ٪ من الازوت البطيء الانفعال والنتيجة الذي يستعمل لتحويله الى القوية من ٤ الى ٥ هـ شهور ٥ اما غواصة اللعانية ان على الحشرات والديدان او حل الاصاب فسريرة المفعول الجيد النتائج . وهو يستعمل في هذا السيلج بمعدل يراوح من ١٠٠ الى ٣٠٠ كيلو لدم الحليح .

٢٣٥٨٥ - **كروان البصل**

Liloceris mardigera, Liloceris brunnea (S). *Cricocrè de l'oignon* (F). Onion-beetle (E). حشرة غاصلة مؤذية من النضاريات وربة مقدسات الاجنحة . تألف البراري والمزارع وحطى البصل . غنفسها ويرقاتها تعيش على اوراق البصل والكراث والكرام البري وزنبق الوادي ٥ جسمها صغير القذ يطول من ٦ الى ٧ م . ثوبا الملوي الى الحشرة القرمزية الصنابية المروج . ثوبا السفلي الى السرة السوداء . رأسها مستعرض الجرم . عينها صغيرتان . زباناها غليظان . ظهرها مستدير الطرف اللاحق . غدها متباعدة التعزيز القاطب ٥ لها جيلان من الحول . تظهر الحشرة الجملة في اوائل نيسان . تسرح في النهار . تساهل بعد ظهورها باربعة اسابيع وتنتج المكن على نصال الارواق ٥ البرقة عند ادراكها الكال الجسوري تقايط نحو ٨ م . ثوبا الى الخلفي الاصفر المروج . رأسها ورواجها سيد .

٢٣٥٨٦ - **كروان الزرع** ، **أوليسا الزرع**

Ulama melanopus (S). *Cricocrè des céréales* (F). *Cereal leaf beetle* (E). *Rothstiges Getreidehnhchen* (D). غنفسه من فصيلة النضاريات طويلا يراوح من ٤ الى ٥ م . رأسها وغدها الى الزرقه اللامعة . كويلها الى الحرة . تركب مع برقاتها نصف التجليات فتؤذي وتسي الى اللينات .

٢٣٥٨٧ - **كروان الزنبق**

Crioceris lili, Liloceris lili (S). *Cricocrè du lis* (F). *Lily beetle* (E). *Lilienhnhchen* (D). غنفسه من النضاريات طويلا يراوح من ٧ الى ٨ م . رأسها وقواها سيد . كويلها وشمارها حر . مكها ناري اللون وشعي الشكل تمنحه الاثني على اوراق الزنبق فينتف عن برقات تقسط الارواق وتقرضها .

٢٣٥٨٨ - **كروان الهليون**

Crioceris asparagi (S). *Cricocrè de l'asperge* (F). *Asparagus beetle* (E). *Spargelhnhchen* (D). غنفسه من فصيلة النضاريات طويلا يراوح من ٦ الى ٧ م . رأسها اسيد اللون ، ازرق المروج . كويلها الى الحرة يطو توشيع اسف . غدها الى الزرقه اللامعة يحرقها اطار اصهب ويتنظها يتيج نمش مقابل ارنه الى الصغار الاخير الخلفي ٥ تركب الحليون ويؤذي .

١٠٠ م . منقاره دقيق نحيل . ثوبه الى الرتبة القنبره المرقطة . بطنه واثنين وشمار جناحه للدخل الى البياض . شتاء افرقية الاستوائية . مصيفه يجت من مراکش الى الصعيد وقد شوه مرارا في صقلية .

٢٣٥٧٤ - **كروان الجبيل**

Edicnème (F). *Stone curlew* (E). هو البرغينه ، طائر من دجاجيات الارض ، اطبله .

٢٣٥٧٥ - **كروان الهنسن**

Numenius hudsonicus (S). *Courlis du Hudson* (F). نوع من الكروان متوسط الجثة . طوله نحو ٥٥ سم . وبسطه ١١٠ م . ثوبه الى الرتبة المرقطة بالابيض والاسود . بطه ثبي اللون وصدره واثنين كذلك ٥ يحويب امريكية الشمالية لكنه يكثر الاقامة في مناطق الهندس انحصها الخليج .

٢٣٥٧٦ - **كروانيات**

Numenius (F). حارة من فصيلة دجاجيات الارض . اجناسها وانواعها عديدة تتميز بشكلها الرقيق الاهيف . مناقيرها مسطيلة ، حلالية التفويص ، مخددة الجرم . سيقانها دقيقة . ارسافها سرديّة ، اصحابها رباغية ٥ اشهر اجناسها الكروان .

٢٣٥٧٧ - **كروان**

Croton جنس نباتات حرجية وربة من فصيلة البترقيات . ارناعه كثيرة العدد منها الاشجار والشجيرات والجنبات والاصشاب . معظمها من نبات المناطق الاستوائية ٥ اورتها كلمة متعاقبة ، مسقة ، رجمية . ازهارها حقويدي تاجي . ازهارها وسيدة للسكن . ثمارها جراه كروية او بيضبة الشكل . يزورها نفعية منها هدنية طيبة وسها صنابية . قنور بعض انواعها طيبة ٥ اشهرها ما يتبع .

٢٣٥٧٨ - **كروان الزيت** ، **حب السلاطين** ، **خزوع صيني**

Croton tiglium (S). *Croton cathartique* (F). *Croton-oil plant, Purging croton, Tiglium* (E). *Purgierkroton, Tiglibaum* (D). *Croton, Tiglio drastico* (I). نوع من الكروان ، منه المناطق الاستوائية الاسيوية والافريقية . يستخرج من زروعه مادة زيتية غواصها خواص زيت الحروع وتستخدم استمدا .

٢٣٥٧٩ - **كروان عنبيري** ، **قشر عنبير**

Croton eluteria, Cascarilla eluta (S). *Cascarille, Croton eleutherie* (F). *Cascarilla-bark tree, Seaside balsam* (E). *Kaskarillenstrauch* (D). *Cascarilla, China aromatica* (I). نوع من الكروان ، منه البلاد الاسيكية ، يستخرج من لحائه مادة صناعية مرة زكية العرف العنبري المصطب ، تستعمل ضد الحيات .

٢٣٥٨٠ - **كروان**

Gobie (F). جنس اسمك بحرية مشهورة باسم قويون ، اطبله .

٢٣٥٨١ - **كروان اسود**

Gobie noir (F). هو القويون الاسود ، سمكة بحرية ، اطبله .

٢٣٥٨٢ - **كروان الغبر**

Gobie nébuleux (F). هو القويون المشب ، سمكة بحرية ، اطبله .



كروان الهيون



كروان البصل



كروان الزرع



كروان الزنبق



كروان الهيون

Sphérique (F). **كروية ، كروي** ٢٣٦٠١
Spherical (E).
ما كان شكله كالكرة أو ما كان له صفة بالكرة .

Carvi ٢٣٦٠٢ **كروية**
هي الكراويا ، اطلبها .

Micrococcae (S). **كرويات** ٢٣٦٠٣
Micrococccées (F). Micrococceae (E).
فصيلة من البكتريات ، أجناسها وانواعها التي هم لزراعة قليلة العدد تتميز بأحجامها الذرية الكروية وبانقسامها التكاثري الذي يحصل في اتجاهات مختلفة يمكن حصرها بالاتجاه الفردي والاتجاه الثنائي والاتجاه الثلاثي || أصف أنواعها المضرة ما يتبع .

Micrococcus tritici (S). **كروية التري** ٢٣٦٠٤
Microcoque du blé, Maladie du blé rose (F).
مرض بكتيري من الكرويات ، نغازه شديد اللون والأثر على بر الخنطة فينقبه ويغده ويصبه ويشبهه بالخصاب الوردي اللون .

٢٣٦٠٥ **كروية إمبراطورية**
Micrococcus imperatoris (S). Microcoque impérial (F).
مرض بكتيري من الكرويات ، نغازه شديد اللون على درنات البطاطا المحروسة والمحفوفة في أماكن رطبة عادمة البهوية لانه يهرجا ويصيب تلفها .

٢٣٦٠٦ **كروية بيضاء**
Micrococcus albidus (S). Microcoque blanc (F).
مرض بكتيري من الكرويات يترى البطاطا والقلناس والبيصل فيمنها ويهرجا .

٢٣٦٠٧ **كروية ذهبية**
Micrococcus flavidus (S). Microcoque doré (F).
مرض بكتيري من الكرويات ، نغازه يبيض على عذة الخنثوية المحفوفة فيفسدا ويجب تلفها .

٢٣٦٠٨ **كروية فخرية**
Micrococcus pelliculidus (S). Microcoque pellicule (F).
مرض بكتيري من الكرويات ، نغازه يبيض على عذة نباتات بصلية ودوفية وقد يركب البطاطا ويسبب لها الجرب الدري .

٢٣٦٠٩ **كروية ينكورية**
Micrococcus phytophthorus (S). Microcoque noir, Maladie de la jambe noire (F).
مرض بكتيري من الكرويات ، نغازه شديد اللون على سوق البطاطا حيث يسم بعض أقسامها فيسبب أسودادها وتلفها . وقد يصيب الدرن فينبو كيقع سود نحوها حالات يمر تجفف القشرة وتصلبها يتشققها ثم يهرى القلب .

٢٣٦١٠ **كروي**
Curage (F). Cleansing (E).
إخراج الومل والحسا والأعشاب من القنوات والحساسيات

٢٣٦١١ **كريات**
Corpuscules du sang, Globules (F). Blood corpuscles, Globules (E).
الوحدة كرية . والكريات محمصة من الأجسام الساعية في الدم منها الأحمر والبني ثم السلفية والمأيدة أو الحيدة .

Crossing-over ٢٣٥٨٩ **كرويتين أولفر**
هو الحاصل الناتج من تشابك وانتشاف النشب .

٢٣٥٩٠ **كرولا أرجواني الصدر**
Querula rubricollis (S). Plauhau de Cayenne (F).
طائر من الطيور منيات الخنازير وطيولة القطنجيات . أعطاه بعض مناطق أمريكا الاستوائية || جسمه متوسط القد ، يطول نحو ٢٥ سم ، قويه ال السوداء الاسفغ . ذره وصدره أرجوانيا اللون عند الذكر || ملجته الخياطي جماعي إلا في زين السافغ والحضانة . يالف التناجات والحراج . قويه البذور والثار البائدة وبعض الحشرات أخصها النمل .

٢٣٥٩١ **كروم**
Chrome (F). Chromium (E).
معدن اكهب اللون شديد الصلابة ثقله النسبي يراوح من ٦ الى ٨٠ ، ينصهر في ١٥٢٠ °سغ || دونه (كرو- Cr) وزنه الاتومي ٥٢.٠١ ، وهو لا يتأثر بالهواء الجوي ولا يتأكسد إلا في درجات الحرارة العالية ، يذوب في الحامض الكلوريدريكي والحامض الكبريتي || يوجد في الطبيعة مركبا مع بعض العناصر بلب مختلفة . تحريره أو استخلاصه من فقله يستوجب صفه في أفران خاصة تشتمل الحرارة العالية || أشهر مركباته الطبيعية كرويات الرصاص . أما أشهر مركباته الصناعية فهي كرويات البوتاسيوم وكرويات الصوديوم التي تستعمل في ديع الجليد وصباغها .

٢٣٥٩٢ **كرومايد**
Chromatide
هو من النشبة نصف طورها الطولي وذلك عندما تكون في طور الميوثة .

٢٣٥٩٣ **كروماتيكي ، صمغي**
Chromatique (F). Chromatic (E).
نمت تعريفي توصف به الاغضاء الصمغية في الاجسام الحيوانية والنباتية .

٢٣٥٩٤ **كروماتين ، كرويتين**
Chromatine (F). Chromatin (E).
مركب آسي - حامضي - سفوري تتكون منه مادة النشب وقسم من الجلبة الخلية .

٢٣٥٩٥ **كروموبلاست**
Chromoplaste (F). Chromoplastid (E).
مادة الألفة الملونة .

٢٣٥٩٦ **كروموزوم**
Chromosome
هو النشبة ، اطلبها .

٢٣٥٩٧ **كروموليست**
Chromoleucite
حبيبة المنصب في ذقة الخلايا النباتية .

٢٣٥٩٨ **كرومومتر**
Chromomètre (F).
أصفر جزئيات تشتمل بالشكل والمركز في شعاع البتتون الكروماتيكي .

٢٣٥٩٩ **كرونيلا**
Coronille (F).
هو الأمروس نبات من القرنيات ، اطلبه .

٢٣٦٠٠ **كرونومتر**
Chronomètre (F). Chronometer (E).
آلة تستعمل في قياس الوقت لا يفرقها عن الساعة العادية سوى دقة الاداء والضببط الفائق والتوقيف الجياري .



كرولا أرجواني الصدر



كروية البر



كروية ينكورية

٢٣٦١٢ - كُرْبَات يَفِي

Globules blancs, Leucocytes (F). Leucocytes (E).
 حبيرات حيوانية متحركة وظفيتها الرئيسية القضاء على
 الجيكروبات السابحة في الدم || الملبس المكعب من الدم
 يحوي نحو ٧٠٠٠ كرية .

٢٣٦١٣ - كُرْبَات حُمْر

Globules rouges, Hématies, Erythrocytes (F). Erythrocytes (E).
 حبيرات حيوانية من ذوات النواة . وظفيتها الرئيسية حل
 الأكسجين من الرئة الى جميع اجزاء الجسم وهي تعيش
 بضعة اسابيع ثم تنقسم وتفتت . نسبها الى الكريات
 البيضاء نسبة ٥٠٠ الى ١ || الملبس المكعب من الدم
 يحوي ما يراوح قدره من ٤ الى ٥ ملايين من الكريات
 الحمر . اما انما الاخر فيضئ الى المادة الملونة الحمراء
 المارقة باهولغوبلين (Hémoglobine) .

٢٣٦١٤ - كُرْب

Rhizome de roseau (F).
 Rhizome of reed (E).
 الكعب من القصب او القنا تعريفه العامي واصلطونه .

٢٣٦١٥ - كُرْبِيْسِيْسِيْسِيْس

Cryptosporium (S).
 جنس فطور مجهرية رية من فصيلة الزيفيات . انواعه
 قليلة الشكل ولاضرار . تركيب حلاء الاعصاب والافئاد اليايسة .
 وينتج عجمة او عسبة الشكل ، تنفذ عجمة ثم ترقى .
 بوفئاته شائعة ، بسيطة ، قوسية الشكل .

٢٣٦١٦ - كُرْبِيْتِرْك *٥

Cryptorrhynchus (S).
 جنس حشرات صغيرة القد من فصيلة السويات . انواعه
 المروفة سبعة . اطولها تراوح من ٦ الى ١٠ سم . اقربها
 حنطية او عمراء اللون تعلوها تراويق وزراكن سود . تعيش
 حل الحوز والصفصاف والبتولا . ريقاتها تسدب
 الاجزاء الفتية والجذوع المقطوعة اليابسة وقد تنفخها حتى
 اقتلاها .

٢٣٦١٧ - كُرْبِيْتِرْك الصَّفصاف *٥

Cryptorrhynchus lapathi (S). Cryptorrhynque
 des saules (F). Cryptorrhynchus lapathi (E).
 حشرة خافضة غاشية مؤذية من فصيلة السويات ورتبة
 مملدات الاجسمة . تألف المواق الربطة والمناقع . خنافسها
 تعيش حل اوراق البت والحمض . ريقاتها غاشية تركيب
 الحوز والصفصاف والحوز وتسدب الاجزاء الفتية والجذوع
 المقطوعة وقد تخلجها حتى اقتلاها || جسمها صغير القد ،
 يطول نحو ٨ سم . ثوبا احم اللون تملو فطوس متراكبة
 وتراويق وزراكن فيها الاسود والخطي والكسني والاصهب
 والاشقق الصنابي . رأسها صغير الحجم . عينها صغيرتان
 زباناها صرغانيان ، مرقطتان . ظهورها مذهب الخضر
 اللامع . غمداهها متشابكة التحزير الخلفي القاطب ||
 لها جيل واحد في الحول . تخرج الحشرة الجملانة من بيئاتها
 الشتوية في اوائل نيسان وتبقى حتى اوائل الحول . تسرح
 في النهار تزر المكان مباحدا في تقرب تخلجها بتكها في
 حلاء الجلود || البقعة عند بلوغها الادراك التام تطلئ نحو
 ١٢ سم . جسمها اعليجي الشكل ، مكور الرأس ، مذهب
 الطرف ، حنطلي اللون اسود الرأس والشرج .

٢٣٦١٨ - كُرْبِيْسِيْس

Cryptolite
 هو نشفات السيرير الطبيعي ، يكثر ويوجد في اليايسة
 الاخضر .

٢٣٦١٩ - كُرْبِيْتِرْيَا

Cryptomérite (F).
 شجرة من الطقوسيات تعرف بالسوي ، اطولها .

٢٣٦٢٠ - كُرْبِيْسِيْس

Coreopsis (S).
 Coreopsis (F). Calliopsis, Tickseed (E). Schöngesticht, Wauzenblums (D). Coreopsis (E). Calliopsis (F).
 جنس نباتات عشبية من فصيلة المركبات . انواعه عديدة ،
 منها البرية والزرينية . اوراقها لاقسية الشكل والاركانز .
 ازهارها زرقية ، ثمانية السينات الملونة . بزورها
 مستطيلة مبطلة متوجة بسنن او حكين او سرفشتين .
 اشهر انواعه الازرينية ما ينج .

٢٣٦٢١ - كُرْبِيْسِيْس اَيْشِي *

Coreopsis elegans, C. tinctoria (S). Coreopsis élégant (F).
 نوع من الكريسيوس ضرورية عديدة ، فوارها الوانها ، جميعها
 اصباب زرقية حيلة تملو من ٣٠ الى ١٢٠ سم . اوراقها
 متقابلة مفرفة . فروعها قدية الشكل ، لثاية او خاسية او
 سباحية المدد . فصلها مائل البشره عايق الخضار .
 وريساتها الزهرية ملونة الغلاب والبيضاء ، قطرها نحو ٤ سم .
 ازهارها يستمر طول فصل الصيف .

٢٣٦٢٢ - كُرْبِيْسِيْس بَحْرِي

Coreopsis maritima (S). Coreopsis côtière, C. maritime (F).
 نوع من الكريسيوس وهو بجلة زرقية مسرة تملو نحو
 ٣٠ سم . تألف الشطوط البحرية الدافئة . ساقها غليظة
 قصيرة متشعبة . اوراقها متقابلة قدية التفريش الضيق .
 وريساتها الزهرية صفراء اللون كبيرة القد سباحية الشكل ،
 قطرها يراوح من ٨ الى ١٠ سم . || ازهارها يستمر طول
 فصل الخريف .

٢٣٦٢٣ - كُرْبِيْسِيْس كَبِير الزَهَر *

Coreopsis grandiflora (S). Coreopsis à grandes fleurs (F).
 نوع من الكريسيوس وهو عشبة زرقية مسرة تملو من ٣٠
 الى ١٢٠ سم . اوراقها متقابلة مفرفة . فروعها قدية
 الشكل لثاية او خاسية المدد . فصلها مائل الصفحة العليا
 خلي السفلي . وريساتها الزهرية مكسبة قطرها نحو ٥ سم .
 طبها الى المسفرة ، لسيناتها رباعية التفصيص ذهبية اللون .
 ازهارها يستمر من ايار الى آب .

٢٣٦٢٤ - كُرْبِيْسِيْس مَحْرَج

Coreopsis coronata (S). Coreopsis couronné (F).
 نوع من الكريسيوس وهو عشبة زرقية حيلة تملو من ٣٠
 الى ٥٠ سم . ساقها نحيلة مستقيمة . اوراقها متقابلة كاملة
 فصلها اعليجي الشكل ، مقطوع القاعدة ، وحل الصفحة
 المائلة . وريساتها الزهرية مسر الغلاب . لسيناتها
 برتقالية اللون حنطية الخطار . قناباتها سنائية مهدبة .
 ازهارها يستمر من محزل الى تشرين .

٢٣٦٢٥ - كُرْبِيْسِيْس نَجْمِي

Coreopsis stellata, C. major (S). Coreopsis étoilée (F).
 نوع من الكريسيوس وهو بجلة زرقية مسرة تملو من ٦٠
 الى ٩٠ سم . ساقها وروعها مزينة الحلاء . اوراقها عشية
 الاركانز ، لثاية التفريش المعني . فصلها خلي البشره .
 وريساتها الزهرية صفراء اللون كبيرة القد نجمة الشكل
 مستطيلة السينات الناشرة || ازهارها يستمر من محزل
 الى آب .



كُرْبِيْتِرْك



كُرْبِيْتِرْك الصَّفصاف



كُرْبِيْسِيْس اَيْشِي



كُرْبِيْسِيْس كَبِير الزَهَر

المشوائية. ازهارها خالصة او سداسية التركيب. ثمارها غلظلة الاشكال تكثر فيها الاستدارة. سؤذها لباي المادة المأكولة || اشهر انواعه ما يتبع .

٢٣٦٣٥ - كرزويليم افرقي ٥

Chrysophyllum africanum (S). *Chrysophylla africana* (F).

نوع من الكرزويليم منته البلاد الافريقية الاستوائية. ثمرته تملو نحو ١٢ م. ثماره مأكولة يفضية الشكل مقبوة القاعدة تحوي من ٣ الى ٥ حبات .

٢٣٦٣٦ - كرزويليم كيمبو ٥ ، كيميت ٥

Chrysophyllum calmito (S). *Chrysophylla calmita*, *Calmitier* (F). *Common star apple* (E). *Echter Sumpfelbaum* (D). *Crisoillo calmito* (I).

اشهر انواع الكرزويليم واعمها زراعة . ضروريه الشائعة . خة . اشجارها تملو من ١٥ الى ١٥ م. سؤفها منتصبة ، مشقة البهلاء . اغصانها فارشة . قننها فرعاء قلنسوية الشكل . اوراقها متعاقبة اهليلجية . نصلها جامد النسيج ، اخضر الصغمة العليا ، خلى النفل ، مذهب الخمل . ازهارها صغيرة اللند ، يفضاء اللون ، خماسية التركيب ، مستطيلة الاذن . ثمارها كروية الشكل حبيها حجم التفاح . قشورها مالسة ملوقة ، لباها جامد المادة متوسط العسارة السكرية الزجة .

٢٣٦٣٧ - كرزويليم مكوكو ٥

Chrysophyllum macoucou, *Aubletia macoucou* (S). *Chrysophylla de Macoucou* (F).

نوع من الكرزويليم الزراعي . ثمرته تملو نحو ١٥ اثمار . ثماره مأكولة اجاصية الشكل واللند ، برتقالية اللون سداسية المبهات .

٢٣٦٣٨ - كرزويليم وحيد العجمه ٥

Chrysophyllum monopyranum, *C. oliviforme* (S). *Chrysophylla monosperma* (F).

نوع من الكرزويليم الزراعي . ثمرته تملو نحو ٨ اثمار . ثماره وحيدة المبهة يفضية الشكل والحجم . لوها الى التيفسي العابق . لباها لند الطم عند الادراك التام .

٢٣٦٤٠ - كرزوكوم ٥

Chrysocoma (F).

هو ذنب لقط ، اطليه .

٢٣٦٤١ - كرزويكسه ٥

Chrysomyxa (S).

جنس فطور مجهرية من فصيلة الزجايات يشين لبناجحه السوادية وبمسائله الشفافة الرقيقة . طوبه الايدي يتكون ويتفسي على اعداد الصنوبريات حيث يلو كالحوصلات المرصوة بمزارة الضلع على جانبها الى انواعه الاقتصادية المعروفة قليلة منها كرزويكسه الايصة وكرزويكسه المعسل .

٢٣٦٤٢ - كرزويكسه وردى ٥

Coreopsis rosea (S). *Coreopsis rosea* (F).

نوع من الكريسيس وهو عشبة زينة مسرة تملو من ١٥ الى ٦٠ سم . اوراقها متعاقبة لاطلة . نصلها مائل البشرة وسيد البرق يطول من ٣ الى ٧ سم . ويخرج من ١ الى ٣ م . وريصها الزهرية صفر الطيب ، يفض السينات قنطرها نحو ٢ سم . ازهارها يستمر من تجوز الى آب .

٢٣٦٤٧ - كرزيشه ٥

Butyrospermum parkii (S). *Karité*, *Si* (F).

شجرة مشرة من فصيلة الطلحيات . منبتها البلاد الافريقية الاستوائية ، تكثر في سبابس السودان وفضيا والشاطئ العاجي والدهسي والفرنسا والكسرون وتغاد والاريني || ساقها غلظلة منتصبة نخية البهلاء الرطبة . اوراقها خمسة طرفية . نصلها سناني الشكل ، مستطيل اللند ، يارز العروق المدينة . ازهارها خمسة التجميع ، طرفية الارتكاز ، عشوية . ثمارها برتقالية اللند مأكولة الخبض حبيتين لوزيتين لجا يحوي من ٤٠ الى ٥٠ ٪ من المواد اللينة الجامدة المعروفة باسم الكريشي وهي تستخرج من الورز بد تحميمه ونفشه .

٢٣٦٤٨ - كزيريه ٥

Carriéra (F).

هي النوار الصيني ، شجرة زينة ، اطليه .

٢٣٦٤٩ - كزيريه ٥

Conus (S).

Cône (F). *Conus* (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مبهيات الاصل وفضيلة الكزيريات . انواعه المعروفة نحو ٥٠٠ منتشرة في معظم بحار العالم || اصداها غروطية حلزونة قرنية الشبه باكرار الصنوبر . مرادها سنتة . اسنانها نبال صغرية ذرية لسها ذراي مؤذ .

٢٣٦٥٠ - كزيريم ٥

Chrysanthème (F).

هو القنقحان ، اطليه .

٢٣٦٥١ - كزيريم البر ٥

Chrysanthème à carène (F).

هو قنقحان البرج ، اطليه .

٢٣٦٥٢ - كزيريم مختصل ٥

Chrysanthème des bles

هو القنقحان اللحي ، اطليه .

٢٣٦٥٣ - كرزولريكس ٥ ، سيميريس ٥

Chrysorchix (S). *Salmiria* (F).

جنس قرد امريكية من فصيلة السوسيات . انواعه ٣ موطنها امريكة الوسطى اصحابها البرازيل والفرنسا وكولومبيا وبوليفيا والبيرو || اجسامها صغرة اللند . وشية القوام . قوامها دقيقة متوسطة الطول . اذنانها مستطيلة نخيلة . ازهارها متباعدة الالوان الزرافية . شمورها ناعمة ، لينة وثيرة . تألف الاجراج والنايات . مرقها الاشجار دون الحفص . قوتها البرام والاوراق والحشرات والمصابير .

٢٣٦٥٤ - كرزويليم ٥

Chrysophyllum (S). *Chrysophylla* (F). *Star apple* (E). *Sernapfelbaum* (D). *Crisoillo* (I).

جنس اشجار ومجهرات برية وزراعية مشرة من فصيلة الطلحيات . انواعه عديدة . اصلاها البلاد الاستوائية . سؤفها منتصبة . صانها حلابية المادة . اوراقها اهليلجية مستطيلة . نصلها جامد الصغمة ، كثير العروق النخيلة



كرينه (١)



كرينه (٢)

(الشرة والبررة والزهره)



كرز



كرزوريكس



كرزويليم كيمبو

٢٣٦٤٢ - كريزيوميكه الأيسية

Chrysomya abletia (S). Rouille des aiguilles de l'épicéa (F). Needle rust of the spruce (E). Fichtennadelrost (D).

فطر مجهرى يتطفل على اهداب الالبسة فيلبها ويسبب سقوطها || مظهره الخارجى يقع منخفضة متناحية متجانسة صفراء اللون تظهر في أواخر حزيران على ظهور سيارب الاهداب ثم تتطور وتزحف وتصيب كل بقعة من البقع قاعدة لحويصتين مستطيلتين لونها الى الصفرة الزاهية تقومان على جانبي نسيج الحبب || هو مركب الالبسة في جميع المواسم اما يفضل الاشجار الفتية التي تراوح اعمارها من ١٠ من ٢٠ سنة .

٢٣٦٤٣ - كريزيوميكه العنصل

Chrysomya rhododendri, *Uredo rhododendri*, *Acidium abletinum* (S). Rouille vésiculaire du rhododendron (F).

فطر مجهرى يتطفل على العنصل في المناطق الجبلية التي تملو سطح البحر من ١٠٠٠ م. وما فوق || مظهره الخارجى يتور مستديرة او بيضية الشكل تركب العنصل على صفحته السفلى يقابلها على البهفصة العليا يقع بنفس الحجم لونها الى الجفوة ثم تتحرف الى الحنفى وترفع بشرة النسيج وتغيرها وتسبب جفاف العنصل وسقوط الورقة .

٢٣٦٤٤ - كزونيئات

Conidæ (S). Conidées (F). Conidæ (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات مميزات الارجل اماميات الخياشيم وميزات الاجهزة . اجسامها وانواعها المعروفة عديدة بعضها من متحجرات الطبقة الطليانية والبعض الآخر معاصر || اصداها حلزونة اسطوانية الشكل او مخروطية . قرونها مستطيلة مفردة الحثار . اسنفلها قرنية المادة || احرف اجسامها واشهرها الكريز والزناطة .

٢٣٦٤٥ - كريزيلى

Cresyl (F). *Cresyl* (E). سائل مطهر غروئى اللون يستخرج من قطران الفحم الحبرى .

٢٣٦٤٦ - كزينة الحمايم

Astragalus peregrinus (S).

نبات يدهى اسطرغالوس رسال ، اطلبه .

٢٣٦٤٧ - كريفلون

Pomelo, Grape-fruit هو ليمون الجنة ، اطلبه .

٢٣٦٤٨ - كريكة

Carychium (S). *Carychium* (F). *Carychium* (E).

جنس حيوانات برية من الرخويات مميزات الارجل وفضيلة الحفشيات . انواعها المعروفة عديدة ، معظمها من متحجرات الاراضي الجوفية والطليانية . انواعها المعاصرة منتشرة في جميع اصقاع العالم . تعيش في المواقم الرطبة وقرب مجاري الماء || اصداها شبه مدونة الشكل ، حلزونة النصف الخلفي ، مستطيلة الانقباض .

٢٣٦٤٩ - كريكة

جنس نباتات بحرية مصرية من فصيلة البالياتيات . مهدا البلاد الحارة الاستراية . سوقها اسطوانية منتصبة حراطة تحمل في زائها الاخير ومنه قتها بعض الاوراق المزدنة الكبيرة العنصل وبعض الابر الكبيرة القند || ثمارها

ماكولة الباب نافسة تقيد اللمة وتتشط الحقم . لشور انزلها ما يتبع .

٢٣٦٥٠ - كريكة الاله

Carica candamarcensis (S). نوع من الكريكة ، مهدا جبال الاند الامريكية اغصها الوالطة قرب خط الاستواء . ثمرتها تملو من ٤ الى ٦ امتار . ساقها غليظة . اوراقها مستطيلة الزناد . نصلها ساهي التفصيص ، متناحية التفريض ، بحري اللون ، ازرق المواج ، خلى الصفحة السفلى || ثمارها اعطليجية الشكل ، خنسية الصلوع ، ناعمة الصرة الدبيسة . تقشرها عند نضجها يرتقالية اللون لا تقل سماكتها من ١٠ سم . لبها رغو مادة ، عادم اللون . بلورها بيضية الشكل ، سمراء اللون ، حريفة الطعم ، لاذعة . تقشرها ولهاها لؤلؤ طازية ومطبوخة . تتكاثر بالبلور ، ترب في الاربة الخلفية المتوسطة الاندماج . تعيش على الساحل اللباني .

٢٣٦٥١ - كريكة بيتا

هي البياض الزراعي ، اطلبه .

٢٣٦٥٢ - كريكة بنتاغون

Carica pentagona (S). التفصليع

نوع من الكريكة السبروتية الشائعة الزراطة . تجود وتثمر في معظم البلاد الحارة ، لكها تحفى الصبيغ ولا تتسبل درجة الصفر اكثر من بقعة ايام . ساقها متصبة نحلة حريضة تملو من ٣ الى ٤ امتار . اوراقها خنسية التفصيص ، نصلها مالى البشرة على صفحتي ، زانداها ثلاثي التفصليع . ثمارها مقطوعة القاعدة ، مدببة الطرف ، ظهرا نحو ١٢ سم . طولها يراوح الى ٣٥ من ٣٠ سم . لبها حادس اللذاق ، ابيض اللون ، مستحب العرف . ترب وتؤكل مطبوخة ومصروة .

٢٣٦٥٣ - كريكة صفراء الحلات

Carica chrysopetala (S).

نوع من الكريكة ، مهدا البلاد الامريكية الحارة . ساقها اسطوانية متصبة تملو من ٣ الى ٦ امتار . اوراقها مستطيلة الزناد الثلاثي الاصلع . نصلها خنسي التفصيص ، متقارب التفريض ، بحري اللون ، مالى البشرة . ثمارها اعطليجية الشكل ، مقطوعة القاعدة ، ناعمة التمل ، ساهية الصلوع طول نحو ١٥ سم . لونها عند نضجها يراوح من الفسنى الى الاصفر المايق . لبها تالط الطعم مستحب العرف يؤكل مطبوخا .

٢٣٦٥٤ - كريكة متناحية الزهرة ،

كريكة كزونييا

Carica castriflora, *Vasconcelia castriflora* (S).

نوع من الكريكة ، مهدا كزونييا وريانة الجديدة . ساقها تملو من ٣ الى ٥ امتار : اوراقها ساهية التفصيص خلية الصفحة السفلى ، غليظة الزناد . ثمارها حطرية العرف ، مستحبة اللذاق ، تؤكل مع السكر . لبها اصفر اللون ، بطيخي التركيب || تتكاثر بالبلور . ترب في الاربة الخلفية العميقة الغور . تعيش وتثمر على الساحل اللباني .

٢٣٦٥٥ - كزيم

Dicholopus (S). *Carlama* (F). جنس طير من طوال الساق . انواعه المعروفة قليلة المدم تجمع بين التلق والرو . اخلاقها اخلاق القنقع ومي قريبة الشبه منه . موطنها امريكة الجنوبية . اجسامها



كريكة

كريكة (١)
(الورقة والزهرة)

كريكة (٢) (الورقة)

سفه مركب الخوص المتقابلة . كافوره ابلي الارتكاز ، صغير القد ، ينشق من طلمة متدلية ، ثمان جوزية الشكل ولقد ، يستخرج من جارتها لباب كاساغو متوسط الصنف .

٢٣٦٦٣ - كُرْبَوْت
Créosote (F).
Creasote, Creasotum, Créosote (E).

سائل مطهر كازو حديد اللون فواح الرائحة يستخرج من قطران خشب الزان . يستعمل في علاج مرض السل ولتسكين ألم الإنسان .

٢٣٦٦٤ - كُرْبُوْلِيلِين
Caryophyllène (F).
Caryophyllin (E).
هيدركربور سائل يستخلص من عطر القرنفل والدارسيني والكينية . ثقله النسبي عند ١٥° سغ = ٠,٩٨٥ ، ويغل عند ٢٦٠/٢٥٨ سغ .

٢٣٦٦٥ - كُرْبُوْكَار
Caryocar
جنس اشجار برية وزراعية من فصيلة الكريوكاريات . انواعه المعروفة ثمانية منها البرية والزراعية والتربينية . سيقانها منتصب ، رفيعة ، فروعها ، اوراقها متقابلة ، ثمارها جوزية الشكل ، بعضها مأكل وبالحص الآخر دهن الالبوب يستخرج منه دهن نباتي يستعمل استهلاك السن او الزينة || اشهر انواعه الكريوكار السني والحسني .

٢٣٦٦٦ - كُرْبُوْكَار عَسْفِي
Caryocar nucifera (F).

نوع من الكريوكار ، شجرة زراعية وتربينية منها امريكية الجنوبية وتعيش في المناطق المعتدلة الحارة . ساقها فروعها ، اوراقها متقابلة . اثمارها ارجوانية سوداء اللوام يطبقها حنار احمر زاهي . اسديتها عديدة مستطيلة ذغمية اللون . ثمارها عسفية اي جوزية مأكلة الصلح .

٢٣٦٦٧ - كُرْبُوْكَار سَمْنِي
Caryocar butyracé (F).

نوع من الكريوكار ، شجرة زراعية يستخرج من البوب ثمارها الجوزية مادة دهنية دسمة شاملة الاستهلاك كسمن نباتي .

٢٣٦٦٨ - كُرْبُوْكَارِيَّات
Caryocaraceae (F). Caryocaraceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد . منها سطم اصفر احمر امريكية الحارة والاسيوية . نباتاتها اشجار وشجيرات مستنصبة القالب ، اوراقها متقابلة . ثمارها جوزية الشكل والقشور ، مأكلة الالبوب الوافر المادة الدهنية || اشهر اجناسها الكريوكار ،

٢٣٦٦٩ - كُرْبُوْلِيلِين
Caryolysé (F). Karyolys (E).
الكريوليز انحلال نواة الخبيزة او الخلية .

٢٣٦٧٠ - كُرْزَا ، كُرْزَا ، تَتَانُوس ، تَيْتَانُوس
شُوَهَار ، تَتَسَل
Tétanos (F). Tetanus (E).
مرض مخيف خطر تقتبض منه العضلات وتتشنج . مبيه تسم المراكز الدماغية بتأثير ميكروب خاص يدهي قصية نيكلولايت تدخل الجسم من طريق الجرح .

٢٣٦٧١ - كُرْب
Nothoscordón (S).
Nothoscorde (F).
جنس نباتات بصلية معمرة من فصيلة الزنبقيات . انواعه

واعثاتها مستطيلة ، وروسيها كثيرة متوجة الجيا بكثرة من الزنن المنتصب النقيق . متلحيها قوية مذهبة الملائح الهلدية الحادة . اجنتحها مزيلة . سيقانها واربعها رفيعة . غزالها غالب الجوارح || اعرف انواعها واشهرها الكرم المتوج .

٢٣٦٥٦ - كُرْبَم مُتَوَجَّ * ، تَلْتَلِقُ الْاَلْفَايِي
Dicholopus cristatus (S). Carliama huppé, Cigogne des serpents (F).

طائر من الكرم ، كبير القد ، طوله نحو ٨٥ سم . لونه الى الكهبة ، كل ريشة من جسمه تليها خطوط دقيقة متعرجة شبيهة اللون زاحية . ريش رأسه وصفه الى الربعة السوداء المزج . اقبينه ابيض الاطراف . حلقه عينه كبريتية الصفار . زقده ازرق . متقاده ورسده حر || موطنه امريكية الجنوبية . يألف الحفصاء النخلة والموثق الكثرة الحشب الرفيع . قوته الخمرات والنظار والافاعي ويخطف انواع الثمار والبرقان || يدين في الاشجار القليلة الارتفاع . عشه مزيج من القصبان والحشائش المنوعة بالطين . اثناء قصفه يصفان تحضبا نحو ثلاثة اسابيع || يألف حياة الاسر ويهين بسهولة مع سائر الطيور الدواجن .

٢٣٦٥٧ - كُرْبِمَة
Cordmia (F).

٢٣٦٥٨ - كُرْبِمْت ، كُرْبِمْتَس
Coryanthes (S).
Coryanthe (F). Helmet orchid (E). Holmbiluma (D). Coriantio (I).

جنس نباتات معمرة من فصيلة السطحيات . انواعه عديدة منها البرية والزراعية والتربينية . اصنافها المناطق الاستوائية اصعبها الامريكية . اوراقها لحمية . ازهارها جميلة الشكل كرمة الرائحة .

٢٣٦٥٩ - كُرْبُوَّة *
Oosphère (F). Oosphere (E).
البويضة النباتية الاقوية الى ان تمتد بالذكورية تصبح النواة . راجع خلية .

٢٣٦٦٠ - كُرْبُوَّة * ، تَحْلَلَةُ الْجَوَز
Caryota (S). Caryote (F).

جنس نخل منته يمتد من المند الى الكونشئين وجزر الزايج . انواعه المعروفة تسعة اشهرها الكريوت المتقوية وكريوت مسطير والشمشاع . جلعه منتصب لسوق المسترسمة الحيد . جريدها مستطيل القد ، غليظ الكرب . سفها ثنائي التركيب متقابل الخوص الالفاسي الشكل ، كافوره مستطيل النفق صغير القد . اثمارها وسيدة المسكن في طلمة واحدة .

٢٣٦٦١ - كُرْبُوَّة سَمَنْطَر
Caryota rumphiana, Saguaster major (S). Caryote des Célèbes (F).

نوع من نخل الكريوت مهده جزر الزايج . جلعه منتصب الساق يعلى من ١٢ الى ١٥ م . سفه مركب الخوص يطول من ٥ الى ٦ امتار . ثماره جوزية الشكل ، صغيرة القد ، حاضرة اللحم ، حريفة . يزود لاستخراج جازه ولاستعمال جلعه الصلب .

٢٣٦٦٢ - كُرْبُوَّة عَسْفُوْدِيَّة
Caryota sobollifera (S). Caryota sobollifera (F). Fish-tail palm, Sage palm (E). Nusspalme, Brennpalme (D). Palma carlota (I).

نوع من نخل الكريوت . مهده حصاب ويرتفعات ملقة وبليزيه . جلعه منتصب الساق يعلى من ٨ الى ١٢ م .



كرم متوج



كربو

٢٣٦٧٨ - كزبرة مزروعة * ، نقدك

Coriandrum maculatum (S), *Coriandre cultivée* (F), *Coriander* (E), *Echter Korlander* (D), *Coriandro*, *Erba cimicina* (I).



كزبرة البر

نوع من الكزبرة وهو نبات عشبي، يزرع لأتاره الطبية والمستملة كأفاديه . ساقه دقيقة رفاه . أوراقه متعاقبة مركبة ، وريقاته مفردة ، خضراء اللوز . أزهاره خضراء التجميع ، صغيرة القد ، ودية اللون ، حامية المراج . ثماره من كرية الشكل المستديرة ليل جلفها تصبغ بعد الجفاف ذكية الرائحة المستحبة المرق .

Fruits du tamaris (F).

٢٣٦٧٩ - كزبرة

Fruits de la tamarisk (E).

هو ثمر الطرفة . يقال انه طيب نقيه يلد الصدر والامعاء .

Cisticola (S).

٢٣٦٨٠ - كزوان ، فسيكة

Cisticole (F), *Fan-tailed-warbler* (E).

فسيكة هو الاسم المصري . جنس طير من فصيلة الحفليات انولاه المعروف ٢٠ اعلطها العالم القديم . جميعها صغيرة القد ، انولاه الى الطحلة السمراء ، ظهورها واجنحتها ملجمة بالاسود . قوامها يبيض الاطراف او رادية . نحوها يبيض . جوارحتها وعوضها الى الشفرة . مثاقيرها وسبقها الى السرة || تألف المنافع والمراعي والحقل المزودة . قتها الحوام والذباب والاساربع الصغيرة . تدن في الاذنان وفي الاضباب التي تملو سطح التربة او الماء من ١٠ الى ١٢ سم . عشها جراب يرمي الشكل . تحضن من مرتين الى ثلاث مرات في السنة . حضنتها تراوح من ٤ الى ٦ بيضات لونها الى الياض الاخير تملو ماجة ودية او زرقاء اللون .



كزبرة البر الجبلية

٢٣٦٨١ - كزوان مبدل ، فسيكة

Cisticola schachalia (S), *Cisticola ordinaria* (F).

فسيكة هو الاسم اللبناني . طائر من الكزوان ، صغير القد ، طوله يراوح من ١٠ الى ١١ سم . قويه يختلف عن ثوب جلته بالتشبه الاسود الذي يملو اواسط ريش الظهر فقط . اصطناعه حوض البحر المتوسط . يألف المنافع وضراف الاثمار والمراعي والحقل المزودة اغصها حقل القنب ولاده الصفراء || الانثى تحضن ثلاث مرات في العام الواحد . حضنتها اربع بيضات .



كزبرة مزروعة

Pupe (F), Pupa (E).

٢٣٦٨٢ - كزويد

علماء الحشرات من ذوات الجنانين وهي كالفسادة للحرشيات والحورية للصفديات .

Casuar (F).

٢٣٦٨٣ - كزور

هو الشيم * من الرواكس ، اطله .

٢٣٦٨٤ - كزورينة بهشية

Casuarina torulosa (S), *Casuarine torulosa*, *Filao toruleux* (F).

نوع من الكزورينة ساقها تملو من ٢٠ الى ٢٥ م . تقشرها فليظة صلبة كقشور البش . غراسها دقيقة . فستها تجمع من ٣ الى ٥ بانق اسطوانية الهرم . خلية البشرة . كراخها خلية الجراحات الناشئة || تربى كزفاها ، في الاربة الخفيفة الرطبة الساحلية وقد لا تتأذى من القتر العابر .



كزوان مبدل

قليلة ملبها شطوط وهضاب حوض البحر المتوسط . يصلها صخير القد مستطيل . اوراقها قرصية الانتساب ؛ تصلها مستطيل الصفة الفضية المستوية . ثمراتها الزهرية يملو من ٥٠ الى ١٠٠ سم . ينتهي بصيوان من الزهر الابيض الموشع بالوردي || انزهاره يستمر من نيسان الى حزيران .

٢٣٦٧٢ - كزبرة ، كزبرة ، كسبرة

Coriandrum (S), *Coriandre* (F), *Coriander* (E).

جنس نباتات عشبية حولية برية وزراعية من فصيلة الخيميات . انواعها ١٠ منها حوض البحر المتوسط . جميعها طبية تستعمل في عدة تركيب وعلاجات . وهي هاضمة ، مقوية ، مضادة للصداع والتشنج تنفع من ضغط الدم وتصلب الشرايين ، تمنع الملش والخفقان وتحبس البعابر من الرأس . ويقال ان قليها مع الساق يفيد الزطاري . صوفها دقيقة رفاه . اوراقها مركبة متعاقبة ، انزهارها صغيرة القد ، خضراء التجميع || اشهر انواعها الكزبرة للمروعة المزروعة .

٢٣٦٧٣ - كزبرة البير * ، شعر الحين ، شعر

الفول ، شعر الأرض ، وعصيف ، برشاوشان

Adiantum capillus veneris (S), *Adiante capillaire*, *Cheveux de Venus*, *Capillaire* (F), *Maidenhair*, *Venus's hair*, *Capillaire* (E), *Capillarkraut*, *Frauenhaar*, *Venushaar* (D), *Adianto*, *Capel-veneris*, *Capovenera* (I).

لبات عشبي بري جلدوري معمر من السراخس البسيبيات . يكثر في المواقع الرطبة الظليلة . يقال ان منافعها الطبية عديدة انما احقق منها هو انه مرقق وقايش . يماه يقوي الشعر ويطلو || اوراقه تملو من ٣٠ الى ٤٥ سم . زنادها اسود اللون ثنائي الانتساب وكل شبة منه تعمل اربعة فروع لاجسية الطول ، مروحية الترتيب ، كلبية الورقة المتشعبة الاطراف .

٢٣٦٧٤ - كزبرة البير الجبسية *

Polytrichum commune (S), *Polytrichum commune*, *Capillaire doré* (F), *Bear moss*, *Golden maiden hair* (E), *Echter Widerton* (D), *Politrico* (I).

نبات عشبي بري معمر من الطحالب يكثر في الاماكن الرطبة الظليلة . ساقه اسطوانية دقيقة مستقيمة . اوراقه هدية متراكبة جلدية الارتكاز . ثمرته جراب يوفي حالي يكمل الساق || وهو من النباتات الصعية يستعمل استعمال اقشاي لكنه بحث على النوم .

٢٣٦٧٥ - كزبرة البير المكسيكية

Adiantum tenerum (S), *Capillaire du Mexique* (F), *Brittle maiden hair* (E), *Capillir Kraut* (D), *Capel-venera de Mexico* (I).

نوع من كزبرة البير وهو نبات عشبي طيب بري معمر . ينبت في المواقع الرطبة في ظل الصخور والاشجار . يقال انه يمنع الامراض الصدرية ويضيق النفس . يستنصر منه شراب يستعمل ضد السعال .

٢٣٦٧٦ - كزبرة العسل

Pimpinella sanguisorba (F).

هي البلان الهجام ، اطله .

Pigamon jaune (F).

٢٣٦٧٧ - كزبرة الحيشة

هي الثليب الاصفر ، اطله .

* كزورينة كنيائية *

Casuarina equisetifolia (S). *Casuarina à feuilles de prêle*, *Filao à feuilles de prêle* (F), *Beef-wood tree*, *She-oak*, *Swamp-oak* (E), *Kasuarbaum* (D), *Casuarina* (I).

نوع من الكزورينة ساقها منتصبه تملو من ٣٠ إلى ٤٠ م. بانثاقها دقيقة مثدية رباعية التضلع. غلف مقدها ماله البشرة رباعية التنسج. منبها البلاد الحارة. تزرع لصد الرياح ولشج. ترطب في الأرض الساحلية الرطبة وتيجو قرب الشطوط البحرية.

* كزورينة منتصبه *

Casuarina stricta (S). *Casuarine dressée*, *Filao dressé* (F).

نوع من الكزورينة. ساقها وأغصانها منتصبه تملو من ٦ إلى ٩ أمتار. غراحيها غليظة، صمها تجم من ١٠ إلى ١٢ بقلية. بانثاقها منتصبه غنمة. غلف مقدها سداسية الثنتين والتخيد || تألف المناطق الساحلية الرطبة الدافئة.



كزورينة كنيائية

٢٣٦٨٧ - كزورينيئات
Casuarinaceae (S). *Casuarinacées* (F).

فصيلة نباتية وسيدة المجلس من ذوات الفلقتين. أنواعها نحو ٢٠ جميعها أشجار منتصبه سريعة النمو عادمة الاوراق. ترطب في المراتق الرطبة اغصانها الشطوط البحرية. غراحيها وبناتقها اسطوانية الشكل والترتيب والانتظام. ازهارها الذكري قدي التجميع، مستطيل الحجم، اسطواني الشكل، زهرته وسيدة السداة. ازهارها الانثوي قدي التجميع، قصير الحجم، كيف الازهار، زهرته وسيدة المبيض والقلم القصير. ثنائية السمة الخيطية المستطيلة. ثمارها اكواز صغيرة رنية الشكل.

* كزوريميس *

Xeromys (S), *Xéromys* (F).
جنس حيوانات لينة قاضية من فصيلة القاريات. أنواعها قليلة موطنها بعض جزر المحيط الهادي. اجسامها مستطيلة. طرفا الكايل براوح من ٣٠ إلى ٤٠ سم. رؤوسها ذلقة. اذنانها كبيرة. جرائرها قصيرة. اصابعها خاسية. اطرافها سادة || تألف الادخال والمخول. قوتها المواد النباتية حل اختلاف مصادرها والحشرات والديدان.

* كسائي *

Parosaurus (F).
هي الدنايات، اطليها.

٢٣٦٩٠ - كُسب
Tourteau (F), *Cake*, *Oilcake* (E).
ما يبقى من ثفل بعد عصر البزور البعينة كالقطن والسمن والاسنت السوداني ولكن الخ... منظم يستعمل كغلف البهاج. راجع جدول الغلف.

* كُسْبَرَة *

هي الكزيرة، اطليها.

* كستناء، كستناء، ابوقرورة، قسطلة *

Châtaigne (F), *Chestnut* (E).

ثمرة الكستنة أو القسطل أو الشاحيلوط وهي مأكولة ملدبة، لبها يحوي نحو ٣٠ ٪ من الفيتامين «ث» ونحو ٩٠ وحدة من الفيتامين «ب» ولعمرة عناصرها الغذائية راجع كستنة ملدولة.

* كستناء *

Castanea (S), *Châtaigner* (F), *Chesnut-tree* (E), *Kastanie* (D), *Castagno* (I).

جنس أشجار سرجية وزراعية من فصيلة السميليات.



كستنة مبدولة

أنواعه المعروفة ١٥ اقليمها البلاد المعتدلة الحارة. تنميز بفضاحتها سوقها واستطالة اغصانها التي تبلغ بصفة قرون. اغصانها دافحة. اوراقها عابلة، متعاقبة، معنقة، بسيطة. نصلها نافرة العروق المتوازية، ملشاري الحافة. ازهارها وحيدة المسكن. ازهارها قدي التجميع، شباره مستطيلة منتصبه، كثيرة الازهار الذكرية المتعاقبة، قليلة الانثوية السفلية الارتكاز، الفردية أو الثنائية أو الثلاثية التجميع التي تكثفها بعد التضلع والاصحاب قلافة كثيفة الشوك البدين تخشن الصرة أو الثآليل || ثمارها مأكولة البلب الشوي اللادة.

* كستنة أمريكية *

Castanea dentata (S), *Châtaigner d'Amérique* (F).

نوع من الكستنة الحرجية والزراعية البريوتية. مهدا امريكة الشمالية. تملو من ٢٠ إلى ٣٠ م. ساقها غليظة. اوراقها تطول من ١٢ إلى ١٤ سم. وتعرض من ٤ إلى ٦ سم. نصلها منشاري الحافة، امسط الصفحة العليا، ازغب الشغل على غملها ويحرقها || ثمارها صغيرة اللد مأكولة.

* كستنة حمرء *

Pavler (F).

هي القسطل الهندي، اطليها.

* كستنة صينية *

Castanea duclouxii (S), *Châtaigner de Ducloux*, *C. de Chine* (F).

نوع من الكستنة الحرجية والزراعية مهدا الصين. تملو من ١٥ إلى ٢٠ م. ساقها غليظة متوسطة الضخامة. اغصانها فاشرة، اوراقها متعاقبة الثنتين المنشاري المهدب؛ نصلها شمع الصفحة، قليل العروق الغائرة، امسط البشرة عل صفحتيها || ثمارها صغيرة بسيطة مأكولة.

* كستنة مبدولة *، قسطل،

قسطل، شاحيلوط، أبو قرورة

Castanea vulgaris, *C. sativa* (S), *Châtaigner commun*, *Marronnier* (F), *Echne*

Kastanie, *Kastanienbaum* (D), *Castagno domestico* (I).

نوع من الكستنة الحرجية والزراعية المبدولة. فروجها كثيرة البدد، منبها الشرق الاوسط واروبة الجنوبية والغربية. شجرتها تملو من ٢٠ إلى ٣٠ م. ساقها ضخمة عظيمة اغصانها غليظة قائمة. فروجها جاسلة، قنثيا قارضة. اوراقها اقليمية مسنة الحافة تطول من ١٥ إلى ٢٥ سم. وتعرض من ٧ إلى ٩ سم. نصلها قنثيا القاضة. ذرب الطرف. بارز العروق المتساوية الابعاد، لونه الالغصان الاصفر. اغصانها صناعية تفوق الستينان صفا وصلاية وغطانا. ثمارها مأكولة غذائية. قشورها كستنية اللون لامة الصفحة الخارجية خلية الداخلية لبها الى البياض النني. ثفلها الكياوي يلد ان ١٠٠٠ غرام من لباب الكستنة المحلولة بالماء يحوي ٢٧,٧٦ ٪ من الوحدات الغذائية المنهضة، تميزيها:

١,٥٦ ٪ مواد ازوتية

١,٧٢ ٪ مواد دهنية

٢,٤٨ ٪ مواد هيدروكربونية

وأن ١٠٠ غرام من لباب الكستنة المشوية يحوي ٥٦,٤٠ ٪

من الوحدات الغذائية، تميزيها:

٢,٤٩ ٪ مواد ازوتية

٢,٢٥ ٪ مواد دهنية

٤,٩٦ ٪ مواد هيدروكربونية

وان ١٠٠ غرام من دقيق لباب الكستنة الخفيف المسحوق يحوي ٨٨,٩٩٪ من الرسيدات الغذائية، تعريفها :

٧,٥١٪ مراد ازوية
٥,٦١٪ مراد دهنية
٧,٥٨٧٪ مراد هيدروكربونية

اقلها البلاد الجبلية المعتدلة الحرارة. وفي غرب في الارضية الخفيفة العميقة الغور المشبعة بالعصر الربلي. وقد تنمر وقصب في الاربة البليئة المتوسطة الانساج لكنها لا تنمر كثيراً فيها. وهي تخشى الاربة الكلسية لان الكلس لا يوافق مزاجها الجسموري || تنكأ بالبر وقد تزور البلور اما في مستقرها مباشرة او في الشغل الى ان يبلغ ارتفاع النصب نحو ٢٠٠ سم. وقد يكون ذلك بعد البذر بسنتين فتنتقل اذ ذلك الى مستقرها.

٢٣٦٩٨ - كَسْتَنَة هِنْدِيَّة

الكستنة الهندية واو قروء الحسان ويسقط الفرس ، ثلاثة اسماء لشجرة واحدة تعرف بالقندلي ، اطله .

٢٣٦٩٩ - كَسْتَنَة بِاتَالِيَّة Castanea crenata (S). Châtaignier du Japon (F).

نوع من الكستنة الحرجية والزراعية . مهدا اليابان . تملو من ١٠ الى ١٥ م. ساقها غليظة متوسطة الضخامة . اقصائها قائمة . اوراقها صغيرة القد ؛ نصلها مرتفع الجانب كبير العروق الناشئة الاطراف ، لونه الى الخضرة الصفراء تملوها لمة سفراء || ثمارها متوسطة القد مأكولة .

٢٣٧٠٠ - كَسْتُونِيَّة Xestobium (S).

Xestobie, Vrillette (F). جنس حشرات صغيرة من فصيلة الغفريات . انواده قليلة العدد . رقاتها مؤذية تنخر الخشب وتعلب . اغرها واعما كسترة الخشب .

٢٣٧٠١ - كَسْتُونِيَّة الْخَشَبِ * ، غِفْرِيَّة الْخَشَبِ

Xestobium rufovillosum, X. tesselatum (S). Xestobie brunâtre, Vrillette opiniâtre, Horloge de la mort, Vrillette damier (F). Death watch (E). Bunzwürflicher Nagekäfer (D).

نوع من الكسترون طويلاً براوح من ٦ الى ٩ م. ثوبها سطحي . نمشة كوسلها وظهورها صفراء اللون || رقاتها مؤذية تنخر معطر انواع الخشب اليابس والمتوسع ان في الطبيعة او ضمن المنازل والمخازن .

٢٣٧٠٢ - كَسْتُونُ hor الحارود ، اطله . Castor (F).

٢٣٧٠٣ - كَسْتُونُ hor أيل المسك ، اطله . Porte-musc (F).

٢٣٧٠٤ - كَسْنَج Ravalement (F). Trimming (E). قطع فروع الشجرة بنية تجديد شياها .

٢٣٧٠٥ - كَسْدُولَة Cassidula (S). Cassidule (F). Cassidula (E).

جنس حيوانات من الرخويات مهديات الارابل وقصيلة الخضفيات . انواعها المعاصرة المعروفة متوسطة البد اعطائها الهند ، بعضها قارب يعيش في المناطق التي تنكأ فيها احراج الشورى ، وبعضها بحري يعيش في رمال

٢٣٧٠٦ - كَسْمَر Fraction كسر اللدج . كسر كسور وكسورات .

٢٣٧٠٧ - كَسْمَة Pampille الريش الابيض المجمع تحت ذنب الطائر .

٢٣٧٠٨ - كَسْمَرَة الْحِمَاكو هي الشاترج ، اطله .

٢٣٧٠٩ - كَسِكَال * Quisqualls (S).

Quisque (F). Creeper (E). Sonderling (D). Quisque (S). جنس نباتات برية وتربينية من فصيلة الاطيلجيات .

انواده اربعة اصنافها بعض المناطق الحارة الاسوية والافريقية . جميعها شجيرات عارية طول من مترين الى عشرة امتار . اوراقها مثقبة متقابلة اطليجة . ازهارها متفردية التجميع طرفي الارتكاز . ازهارها جميلة الشكل مستطيلة الانابيب يحك في الابيض والاحمر والوردي . يزورها طليعة طاردة للود .

٢٣٧١٠ - كَسْكُوس Couscous (F). الكسكوس حيوان لين من الجرابيات الشاجرات يدعى كَسْتَنَجَر ، اطله .

٢٣٧١١ - كَسْكُول * ، كَسْكُول * Cassiculus (S). Cassicle (F). Cassiculus (E).

جنس طير من فصيلة الكاروبيات . انواعه المعروفة عشرة جميعها من طيور اريكة الوسطى والجنوبية . تألف الغابات ولا تقترب من الاماكن الاطلة . نظامها الحياتي جامي . فوجها يد من ٢٥ الى ٥٠ زويبا || اجسامها مغطاة طول من ٤٠ الى ٥٠ سم. متناحها غمرولية ذرية . رؤوسها متوسطة بقتانج كتشب في الجاه وليس في قم الكؤوس . اجنحتها معتدل الطول . اذناها مستطيلة ، مستديرة الاطراف . الواها تختلف مع الانواع إما يكثر فيها الاسود الخلف الاماجات || قوتها الحشرات على اختلاف فضائلها والثار والحبوب || اعرف انواده واشهرها كسكول المكسلي .

٢٣٧١٢ - كَسْكُولُ الْمَكْسِك * Cassiculus melanicturus (S).

Cassicle du Mexique (F). نوع من الكسكول . يكثر بجموده في المكسيك . يألّف الغابات . طليحه الحياتي جامي . فوجها يد من ٢٠ الى ٣٠ زويبا || جسمه ابيض الشكل يطول نحو ٤٥ سم. ثوبه الى السواد اللامع يملو مزاج اخضر . تقوده جزوية القرن . هاش جناحه الى السرة . متقاده الى السرة الزينية . قائمته وغاليه الى الليرة القامة || قوته الحشرات على اختلاف فضائلها وانواعها والثار والحبوب والبلور || يدن عشه في الاشجار الكبيرة الدالحة لان الفرج بكاهل يدن في ذات الشجرة . الاثن تحضن وسعها من يعضين الى ثلاث يعضات بينا الاكبر يئن الى القاء .

٢٣٧١٣ - كَسْكِر * Excaecaria (S).

Excécaire, Excécario (F). جنس اشجار وشجيرات برية وزراعية تربينية من فصيلة



كسوة الخشب



كسوة



كسكول



كسكول المكسك

الزيتية الطبية النافعة. وريقاتها حشوية الشكل والتركيب، متنامية الإزكاء، بتنية اللون. أزهارها هامة، سفلية التجميع، قصيرة السبلة، يبهض اللون أو وردية || جميع أنواعها طفيلية، وحواليها جلود الصنوبر والسرو والمائل والسنديان.

٢٣٧٢٢ - كَسِيدَات
Monotropaceae (S).
Monotropacées (F). **Monotropaceae (E).**
 فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين متحدة الفلقات. أجناسها ٤ وأنواعها ٢٠ منها البلاد المعتدلة المنشرة نحو الحارة. معظمها طفيلي يعيش على جلود الصنوبريات والسليويات. جميعها عشية. سوقها فردية الالتشاب عادمة الفروع. وريقاتها حشوية النصل. أزهارها سفلية هامة.

٢٣٧٢٣ - كَسُوف
Eclipse
 ظاهرة طبيعية تتميز باحتجاب ضوء الشمس عن الأرض وقد تحدث عندما يتوسط القمر بين الأرض وقمر الشمس. ولا يحدث الكسوف إلا إذا كان القمر في الحاقق وقد يكون كلياً أو جزئياً. فالكل يكمن عند احتجاب كامل قرص الشمس عن البصر والجزئي يكون عند احتجاب بعض قرص الشمس.

٢٣٧٢٤ - كَسِيكة ، كَسِيدَة ، كَسِيدَة
Polder (F)
Polder (E).
 اسم يطلق على الأراضي المنخفضة الممتدة من سواحل بلجيكية إلى هولندية وبولندية وقد صار استعمالها بعد تخصيصها بالمواجز وزعما من مساوي مياه البحر.

٢٣٧٢٥ - كَسِيدَة أَخْضَر * ، كَسِيدَة الْخَرْشُف *
Cassida deflorata, C. viridis (S). **Casside de l'artichaut, C. vortis (F).** **Tortoise beetle (E).** **Artischokenschildkäfer, Grüner schildkäfer (D).**
 حشرة صغيرة القند من فصيلة النشاريات، جسمها يغطي الشكل فطليح، طولها يراوح من ٧ إلى ٨ سم. لونها أخضر اللون أسفح المزاج، مدنها أسود. لها جيلان في الحول. ريقاتها مستقيمة السطيلة القرون الشرجية المنمكة على الظهر. تركيب هي وريقاتها أوراق الارضي شوكي وجميع أنواع الحرفش تلتصق بالبشرة وتمشي على خلايا النسيج.

٢٣٧٢٦ - كَسِيدَة الشُّوْكَارَة *
Cassida nebulosa (S). **Casside nébuleuse, C. de la betterave (F).** **Clouded tortoise beetle (E).** **Nebiliger schildkäfer (D).**
 حشرة صغيرة مبططة من فصيلة النشاريات طولها يراوح من ٥ إلى ٧ سم. لونها إلى الصفرة الخطية الباهتة. غمدتها منقطان بالأسمر والأبيض. لها جيلان في الحول وهي تركيب مع ريقاتها أوراق الشوادر فتتفرخها وتمشي عليها.

٢٣٧٢٧ - كَسِيدَة نَبِيل * ، كَسِيدَة السَّرْمَقِيَّات
Cassida nobilis (S). **Casside noble, C. des aisolacées (F).** **Casside nobilis (E).**

فروع من الكسيد، حشرة غاضلة مؤذية. موطنها يمتد من الشرق الأوسط إلى أوروبا وأفريقية الشمالية. تألف المزارع التي تكثر فيها السرمقيات. خنافسها وريقاتها تعيش على نصال الأوراق || جسمها صغير القند، يغطي اللون، غمدودب الصفحة العليا، يطول من ٦ إلى ٨ سم. لونها الملوي إلى الأخضر الأصفر يطوي في منطقة درز الظهران

الغريزياتيات. أنواعها المعروفة نحو ١٢٠ منها المناطق الاستوائية الآسيوية والأمريكية || سوقها مالة بحرية اللون. أوراقها متعاقبة ممتعة. نصلها يرمية الشوزن. أزهارها سنبل التجميع || يستخرج من لحائها بالحز عصارة لبنية يختلف تركيبها ويغوصها مع اختلاف الأنواع. منها تيج البشر وتؤذي البين إن أصابها ومنها طيبة تنقي الدم والإعلاط ومنها المشادة لداء السفلس ومنها الصناعية التي يستخرج من ثمارها مادة عذنية يبهض اللون شائعة الاستعمال المنزلي || أشهر أنواعها الخمسة التالية :

*** Ex. sebifera (S).** **كسيدر الدهن**
Ex. syriaca (S). **كسيدر حرجي**
Ex. spinosa (S). **كسيدر شائك**
Ex. hibernica (S). **كسيدر فتوي**
Ex. agallocha (S). **كسيدر يغشي البصر**

٢٣٧٢٨ - كَسَّان
Bradype, Al, Paresseux (F).
 هو الداب، اطلبه.

٢٣٧٢٩ - كَسَم
Habitus (F).
 هو الامدود والباللة، اطلبه.

٢٣٧٢٦ - كَسْمُورِيَّة
Cosmologie (F).
Cosmology (E).

الكسولوجية علم قواميس العالم عامة أي لفظة معقلات العالم المجردة.

٢٣٧٢٧ - كَسْمُورِيَّة * ، صَقْرَاءُ الْهَرَقِ

Xanthorrhiza (F).
 جنس جنبات برية وزييتية من فصيلة الشقيقيات. أنواعها قليلة. سوقها فرماة تطول من ٧٠ إلى ٢٥٠ سم. أوراقها زنادية، متعاقبة، مركبة، ثلاثية أو خمسية اللويقات المفردة الصفراء الدروق. أزهارها عقدوية التجميع، أبطية الإزكاء، صغيرة القند، بتنية اللون، خمسية البتلات الصغيرة السنائية الشكل || أزهارها يستمر طول فصل الصيف.

٢٣٧٢٨ - كَسْمُورِيَّة * ، صَقْرَاءُ الْقُرُون

Xanthocera (S). **Xanthocère (F).**
 جنس أشجار ونجيرات برية وزييتية من فصيلة السبنتيات. مهدها الصين، تتميز بالذرة قرنية الشكل مفردة الرحيق تتوسط بتلات الزهر. أنواعها المعروفة قليلة العدد. سوقها تطول من ٢ إلى ٨ أمتار. أوراقها عابلة متعاقبة وزية التركيب. أزهارها عقدوية التجميع. أزهارها متراكبة الألوان، كبيرة القند، نظامية، خمسية الفلص والبتلات، غمانية الاسدية. ثمارها تفاحية الشكل واللذ غير مأكولة.

٢٣٧٢٩ - كَسْمُج

جنس من الكماء ينبت في الوبال للذيد جداً (السان).

٢٣٧٢٠ - كَسُو هو الشار، اطلبه. **Couso**

٢٣٧٢١ - كَسُوب *
Monotropas (S). **Monotrope (F).** **Ice plant, Indian pipe (E).** **Fichtenspargel, Monotropa (D).** **Monotropas, Erba da cera (I).**

جنس نباتات عشبية برية طفيلية من فصيلة الكسوبيات. منها البلاد المعتدلة الحارة. أنواعها نحو ٨ سوقها فردية ليلية. لها دماغ، صارت عادمة اللون تجف بعض المواد



كسيدر



كسيدر



كسيدر الشوادر



كسيدر

أنواعه المعروفة سبعة موطنها بعض مناطق أستراليا . تألف الحراج والبراري . ملجئها الحياتي جماعي . فوجها بدء من ١٠ الى ٢٠ زوجاً ٢٠ اجسامها متوسطة الحجم ، قريبة الشبه بالصدرة وبالزجاج . مناقبها كبيرة ضلعية . اثنائها الى السمرة القاتمة يتخللها تبقيع ابيض ٥ قنبا الحشرات والزروع والنظام والفئران والتساقير الصغيرة . طياعها فرسة كالصدرة . تتميز بالجمارة والشرابة ومن عادتها انها تسفد قصصها في اشواك الاشجار لتصد لها حوتها يليب لها ٥ اعرف انواعه واشهرها الكسيكان الغرب .



كُفَت قنبراني

٥ كُسيكان صُغْرَب

٢٣٧٢٢ - كُسيكان صُغْرَب ٥

Cracticus torquatus (S). *Cassian destructor* (F).
نوع من الكسيكان . موطنه شمالي أستراليا . فوجيه بدء نحو حشرة ازواج . يألف الانفصال والحراج المبشرة الاشجار . يصير افرس انواع الكسيكان وانهمها ٥ جسمه معتدل الحجم يطول نحو ٢٧ سم . رأسه مستقيم الشكل . منقاده كبير وضلع . ذنبه متوسط الطول ، مقطوم الطرف ، مستدير الزوايا . ثوبه ابيض اللون ، رأسه وظهوره وجناياه وذنبه الى السواد اللحي . عنقه وصدره وانفيكه الى البياض الاشر . قوائمه الى السمرة القاتمة ٥ يقطن عنه في الاشجار الرقيقة . الاثنى تحضن من ٤ الى ٥ بيضات بيضا الذكر يقطن لها الغذاء .

٢٣٧٢٣ - كُسيكوز
Xylose (F).
هو الخشوز ، اطلبه .

٢٣٧٢٤ - كُسيكوية ٥

Cassiope (S). *Cassiopeta* (E).
نبات معقود التعريف على اسم الملكة لفرافية كسيوية . جنس نباتات نجمية معمرة من فصيلة الخلدنجات . انواعها المعروفة قليلة العدد جميعها من ثوبت البلاد الحارة ٥ سقفا قصيرة فراء تملو من ١٥ الى ٢٥ سم . اوراقها ابيدة ، صغيرة ، سنانية اتصال الجامدة الخلفية البشرة . ازهارها فردية ، متدلية ، جلبةجية الشكل ، يضاء اللون او وردي ٥ تنويرها يستمر من نيسان الى تموز .

٢٣٧٢٥ - كُسيكوة ٥

Vestiture (F).
الكسيكوة مجموعة الاعضاء الثانوية كازنبي والشوك والمناعس التي تلتصق بقشور النبات او جلود الحيوانات وذيها .

٢٣٧٢٦ - كُش ٥
Androcée (F).
هو جهاز التذكير في النبات ، راجع جش .

٢٣٧٢٧ - كُشاة ٥
Défect apparent (F).
هو العيب الظاهر .

٢٣٧٢٨ - كُشاح ٥
Empreintes du fer rouge (F).
سمة بالانار في موضع الكشك وقد تخلق في كل سمة بالانار في اي موضع كان من الجسم .

٢٣٧٢٩ - كُشت ٥

Pueraria (S). *Putaria* (F).
Pueraris (E). *Knollengrische* (D). *Pueraria* (I).
جنس نباتات ليلية عارشة معمرة من فصيلة القرنيات القرفاشية . انواعه ١٠ مهددا الشرق الاقصى من الهند الى اليابان . جلدها غليظة درنية . سقفا تملو من متر الى ١٠ أمتار . اوراقها عابطة ، مركبة ، ثلاثية الورقيات الكبيرة .

جدة قاطبة للؤلؤة اللون لشاهها ماجة ذهبية . ثوبها السفلي وبندبا الى السمرة ٥ لها جيل واحد في الحول . تنهر الحشرة الجبلانة في اواسط نيسان . تسرح في النهار . تناشر الاثنى مع الككن بعد ظهورها بأسرع . وينتفج الككن بعد متحه ينحدر حشرة ايام ٥ البرقة عند بلوغها الكال الجسودي تطيل نحو ١٠ سم . ثوبها الى الخضار الاصفر تملو بقبعة يضاء في مقدم الصدر . رأسها مكور الشكل ، اسود . سكبنا الشرجية تحمل ثلاث زوائد منها اثنتان حلوانتان متمكنتان على الظهر واحدة سفلية جاسية . سرهما علوي الفتحة يلقى للبراز على الزاقتين ٥ طور الاكمال يستمر من ١٢ الى ١٥ يوما وينتفضي لاصفاً ينصل النبات المائل بدء ان تملق فيه البرقة بزلاتها السفلية .

٢٣٧٢٨ - كُسيكوة ٥

Pelosa (F). *Pad* (E).
تضخم جلدي يحصل في اطراف بعض الحيوانات . وتضخم في الزوائد الخلفية عنه بعض الحشرات .

٢٣٧٢٩ - كُسيك ٥

Cassicus (S). *Cassique* (F). *Cassicus* (E).
جنس طير من فصيلة الكاربيجات . انواعه المعروفة ٢٣ جميعها من طيور امريكة الجنوبية والوسطى . تألف الغابات وبعضها يقترب من الحدائق . نظامها الحياتي جماعي . اسرارها متفاوتة العدد منها الانواع التي لا يتجاوز عددها ١٠٠ زوج ومنها الارباب الوفرة العدد ٥ اجسامها بين المتوسطة والكبيرة . اطرافها قراوح من ٢٦ الى ٤٠ سم . مناقبها مخروطية الشكل ، مستعرة القواعد ، حادة الاطراف . رؤوسها متوجة بقرنات مختلفة الاحجام . اجنتها معتدلة الطول . اذنانها مستطيلة ، مستديرة الاطراف . ارفياها مختلفة الالوان ، يكثر فيها الاسود . انانها اصفر قدأ من ذكورها ٥ قنبا الثأر والحبوب واللبور والخشرات المختلفة الانواع والاجناس ٥ اعرف انواعه واشهرها الكسيك القنبراني .

٢٣٧٣٠ - كُسيك قُنبراني ٥

Cassicus cristatus (S). *Cassique huppé* (F).
نوع من الكسيك يكثر وجوده في البرازيل والفريان حيث يدعى «يايو» . يألف الغابات ويقترب من الحدائق والجنان والحقول . سره يراوح بين ٣٠٠ و ٥٠٠ زوج ٥ جسمه كبير القد يطول نحو ٤٠ سم . قنزته كبيرة تمتد من المنطق الى القنن . ثوبه الى السواد الاسم الاسف . انفيكه وذنبه الى الخمر . وقال ذنبه اجانية صفراء اللون اما القزلاقان فالى السواد الاسم الاسف . منقاده اصفر اللون . حذقة عنه زرقاء . ساقه الى السواد الاسم الخواج ٥ من ميزاته ان يتقلد ويردد الاصوات التي يسعها فريد صياح الديك وثقاة الغم وصهيل الخيل ونبيق الحبر وصييح البقر ... ٥ قوته الثأر والحبوب واللبور والحشرات ٥ يدن عنه في الاشجار الرقيقة الكبيرة الاخصان القارشة الاقنية الانتاد . عنه جراب مستطيل يملق في التنفس ويحك بالالايات والقرش اخصها الياف الباهرة والبركا . وقد يربد على الشجرة الواحدة من ٢٠ الى ١٠٠ عش . مدخلها جانبية عليا . الاثنى تحضن من بيضتين الى ثلاث بيضات بيضا الذكر يقطن لها الغذاء .

٢٣٧٣١ - كُسيكان ٥

Cracticus (S). *Cassian* (F).
جنس طير . من الجوامث سنيات المناقير وفصيلة القرنيات .



كُسيكان عرب

Reaumuria (S). Réaumurie (F). كيفم ٢٢٧٥٢ -

جنس نباتات نجمية برية معمرة من فصيلة الالديات .
أنواعه المعروفة خمسة ، منها بلاد الحارة اخصها
الصحراوية || سوطها شديدة القصر ، كثيرة الفروع الجالسة
والمنفرجة . اوراقها متعاقبة ، متقاربة ، ضخائية النصال
او حليتها ازهارها لاقسيمة الانظام والارتكاز ، منها
المعقودية والمثلثي والاطفي والطرقي في السطيل الزناد القصيرة .
اشهر انواعه الثلاثة التالية :

R. mucronata (S).

كيفه حوية

R. palestina (S).

كيفه فلسطينية

R. hirtella (S).

كيفه مهدية

Ribes (S).

٢٢٧٥٣ - كيفيش

Grossellier (F). Currant-bush (E).

جنس نباتات جنسية معمرة من فصيلة الالديات . انواعه
نحو ٩٠ مظهرها بري وبعضها زراعي يزرع لثماره
المأكولة . اوراقه متعاقبة ، معتمة ، كفية ، لظنية ،
مسنة . ازهاره معقودية او فردية التجميع . ثماره عنبية
سكرية وحامضة او مرة . اشهر انواعه ما يلي .

٢٢٧٥٤ - كيفيش أحمر* ، كيفيش عبقودي

Ribes rubrum (S). Grossellier rouge, G. à grappes,
Castillier (F). Garnet-berry, Red-currant bush (E).
Johannisbeere, Rote Johannisbeere (D). Ribes, R.
vulgare, R. a grappoli (I).

نوع من الكشش، ضروبه الزراعية كثيرة العدد جميعها
جنبايات فروعها تملو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . اوراقه ثلاثية
او خماسية الفلق المسننة . متناخلة الزهرية تجمع نحو ٢٠
زهرة لونها الى الخضار المشع بالاحمر . ثماره متصلة اللد،
كروية الشكل ، حواء اللون ، للذلة العلم ، مستحبة
المعرف || يبيد في جميع الاربية لا يخفى سوى المندجة
الموطاب . يتكاثر بالتمليط وينشر على الافناد الحولة .

٢٢٧٥٥ - كيفيش أسود* ، هلمش

Ribes nigrum (S). Grossellier noir, Cassalier (F).
Black currant bush, Quinay-berry (E). Schwarze
Ribisel (D). Grossularia nera (I).

نوع من الكشش البري والزراعي . ضروبه قليلة العدد
تتميز ببندها الخنعية الطرية الصفراء اللون المبيضة على
الاوراق والافان والثمار . سوطه تملو من ٨٠ الى ١٢٠ سم .
اوراقه خماسية الخنعية التفتيص لاقسيمة التنتين المنشاري .
ازهاره معقودية . ازهاره حواء اللون خلية القنابات .
ثماره كروية عطرية سوداء اللون .

٢٢٧٥٦ - كيفيش شالك*

Ribes grossularia (S). Grossellier à maquereau, G.
épineux (F). Gooseberry bush, Cas berries (E). Sta-
chelbeere, Stachelbeere-Ribisel, Stachelburen (D).
Grossularia rossa, G. dei giardini (I).

نوع من الكشش البري والزراعي الشالك الملبول . تكثر
زراعيته في انكلترا . ازهاره فردي الانتساب غسي التجميع ،
ضسته تجمع من زهرتين الى خمسة ازهار . ثماره رفيعة الشكل
مقوية اللون مجرمة بالأخضر . وهي تتميز من المربطات
الصعية الشالعة في المانيا وانكلترا وهولندا وبلجيكا .

٢٢٧٥٧ - كيفيشة

Grosselle (F). Currant (E). ثمرة الكشش .

ازهارها معقودية التجميع ، حواء اللون او زرقاء . ثمارها
حنيلية . بزورها كالكوياب || اشهر انواعه ما يلي .

٢٢٧٥٨ - كيفت درقي

Pueraria tuberosa (S). Puérarie tubéreuse (F).

نوع من الكشث الزراعي ساقه متعصبة تملو نحو ١٠٠
سم . اوراقه منمصة . ازهاره زرقاء اللون ، حنابلة مستطيلة
عنقية الفواصل تخضن بعض البلور . بلوره درقية
لبها نشوي المادة . بلوره وبلوره مأكولة تطبخ
كالكسوليا والبطاطا .

٢٢٧٥٩ - كيفت ياباني

Pueraria hirsuta (S). Puérarie hirsute, Koudzou (F).

نوع من الكشث الزراعي البردي . ساقه تطلو نحو عشرة
امتر . فروعها خلية الماء ، وريقاتها مغلية الشكل
تطلو وتعرض من ١٠ الى ١٥ سم . ازهاره الى الزرقسة
البفسجية الموهجة بالابيض . معقوده الزهرية بطول نحو ٢٥
سم . حنابلة مستطيلة ، زباد الغلاف || بلوره درقية
مأكولة . سوطه صناعية نسجية . بزوره واوراقه طفيفة .
يخرج من النباتات التي تزرع في المواقع المعرصة لمت
لانها تتشبه بالترية وتسن انجرافها .

٢٢٧٦٢ - كفة

Huppe (F). Crest (E). شكل من اشكال القنعة .

٢٢٧٦٣ - كفة العجوز

Lichen (F). هي الخراز ، اطليه .

٢٢٧٦٤ - كفتح

Marquage au fer rouge (F). الكشش : لكي بالنار .

٢٢٧٦٥ - كشر*

Galtonogamy (F). Galtonogamy (E).

هو في الحيوانات الاليفة والداجنة التصاب بين اقارب
من اصل واحد .

٢٢٧٦٦ - كشرى

Haricot mungo (F). هو الماش ، اطليه .

٢٢٧٦٧ - كسط ، كفسير

Décorçage, Décorcation (F). Decortication,
Stripping off bark (E).

ازالة لحاء الاشجار او سقوطها طبعيا وانتزاع قشور بعض
الثمار والبيزور كالجزوز والوزر والاورز .

٢٢٧٦٨ - كسط الطحالب

Emoussage (F). Removal of moss from trees (E).

نزع الطحلب من لحاء الاشجار .

٢٢٧٦٩ - كشتف

Niquette (F). Nicking (E). الكشش في الخيل : اتواء في صيب الذنب .

٢٢٧٦٥ - كشتف ، معانة

Constat (F).

٢٢٧٦٩ - كشتف التخاريب

Désoperculation (F). Uncapping (E).

هو رفع الغطاء الشعي من عين الشاهد عند جني العمل .



كشش احمر



كشش اسود



كشش اسود



كشش شالك



كشيشة سوداء



كشيشة سوداء



كشيشة سوداء



كشيشة سوداء

- Or. luteus (S). Orbe jaune (F). **كشيشة صفراء**
Or. aureus (S). Orbe dorée (F). **كشيشة ذهبية**
Or. roseus (S). **كشيشة وردية** ، **بجيرة** ، **بجيرة**
Orbe rose (F).

٢٣٧٦٧ - كشيشة سوداء
Vicia fulgens (S).
Vesce brillante (F).
نوع من الباقليات وهو نبات عشبي حولي بري وريبي. ساقه
فرعاء عارية تملأ من ٦٠ إلى ٢٠٠ سم. ساقه مستقيمة
مستقيمة. أوراقه مركبة ، وريقاتها شفعية تعد ١٦
إلى ٢٤. أزهاره مغنولية التجميع. سداسية التصفيف ،
حراء اللون ، فضية اللون اللامع || أزهاره يستمر من
أيار إلى تموز .

- ٢٣٧٦٨ - كشيشة سوداء ، كشيشة سوداء ، كشيشة سوداء**
Cuscuta (S). Cuscuta (F). Dodder (E). Selda (D).
Cuscuta, Carpaterra (I).

جاء من الكشوش في لسان العرب :
« هو الكشوش فلا أصل ولا ورق
ولا نسج ولا ظل ولا ثمر »
جنس نباتات طفيلية من فصيلة المحموديات. أنواعه المعروفة
نحو ٨٠ معظمها أمريكية النبت. جميعها من النباتات
المؤذية الماعدة الورق. ساقها مستقيمة ، فرعاء ، كشيشة
التجميع ، غميطة الشكل ، صفراء اللون أو صفراء ، تلف
حل حاضيتها وتتشبب فيها مرافقها المماسية فتتربتها نسيها
وتحيها . أزهارها صغيرة الحجم بيضاء اللون أو وردية .
أصفر أنواره الشرقية والأوروبية ما يقع .

- كشوش السمر ، كشوش**
C. epithymum, C. minor (S). Cuscuta du thym,
Petite cuscuta, Epithym (F).
كشوش الكتان
C. epilinum (S). Cuscuta du lin (F).
كشوش التفل
C. trifolii (S). Cuscuta du trèfle (F).
كشوش زكي الرائحة
C. suaveolens (S).
Cuscuta à odeur suave (F).
كشوش عربي ، شريخ
C. arabica (S).
Cuscuta d'Arabie (F).
كشوش خيطي
C. racemosa (S). Cuscuta grosse (F).
كشوش فلسطيني
C. palaestina (S).
Cuscuta de Palestine (F).
كشوش كبير
C. major (S). Cuscuta grande (F).

٢٣٧٦٩ - كشيشة سوداء
شمة كلية القصب .
٢٣٧٧٠ - كشيشة سوداء
صوت الحية مجلجلا .

٢٣٧٧١ - كطري ، كطري
Dandrocicta (S). Dandrocicta, Pie vagabonde (F).
Dendrocicta (E).
كطري هو الاسم المحدث . جنس طير من الجوارث وفصيلة
الغرابيات . أنواعه المعروفة عشرة موطنها الهند . تألف
الحراج المبهمة الأشجار . ملجئها الحيالي حامي . جماعاتها
قليلة العدد . قوتها البلور والحبوب والتأثر والغشتر ||
اجسامها متوسطة القد تطول من ٣٨ إلى ٤٦ سم . بما فيه
الذنب الذي يطول من ٢٢ إلى ٢٧ سم . تتميز بأذنانها
المستطيلة الشبه سهمية الشكل وبألوانها الخسنة القاتمة
الميلقة بالاسود والاحمر والاشهب .

- Cassia (F). **كشيشة سوداء**
Black-currant (E). **ثمرة الكشيش الآسود**

٢٣٧٥٩ - كشيشيات
Ribésiées, Grossulacées, Grossulariées (F). Gros-
sulacées (E).
سبب من فصيلة الباقليات يشمل الكشيش والربياس
وبغيرهما . اجتماعه وأنواعه كثيرة العدد منتشرة في جميع
الاستقاع المعتدلة المنتشرة نحو الباردة من العالم القديم
والجديد .

- ٢٣٧٦٠ - كشيشة سوداء**
Androsaca (F).
هو الاندروسا ، أطليه .
٢٣٧٦١ - كشيشة سوداء
Guérine (F). Shelter (E).

- ٢٣٧٦٢ - كشيشة سوداء**
Truffe noire (F).
هو الكرم الأسود ، أطليه .

٢٣٧٦٣ - كشيشة سوداء
Kuehneola (S).
جنس ظهور مجهرية من فصيلة السحائيات ، يتميز بمشاكله
الزبدية التجميع التي تركب نصل الأوراق حل صفحاتها
المليا . فماتحه صفراء اللون قلادية التجميع والشكل . ذكاته
عديدة متراففة . مسامه الأساسية شفعية التركيب ، وباعية
البريدات || أنواعه المعروفة حتى الآن قليلة ، منها كشيشة
التيين وكشيشة القطن .

- ٢٣٧٦٤ - كشيشة السمين**
Kuehneola fici, Physopella fici, Uredo fici (S). Rouille
du figulier (F).

نظر مجهرية يتطفل على أوراق التيين فيؤذيها ويهيء إلى
نمو الإلحار ونفج النار || مظهره الخارجي بقع مبهمة
صفراء اللون تركب نصل الأوراق حل صفحاتها السفلى
تقتسب جفاف التجميع ذبوله ثم الإصايل الباكر الذي
يؤذي نمو الشجرة ويؤخر نفج النار || يكافح باستعمال
سائل بوريو ١٪ عند ظهور عوارض الوباء وبعد
ذلك بأسبوعين .

- ٢٣٧٦٥ - كشيشة القطن**
Kuehneola gossypii, Uredo gossypii (S). Rouille
du cotonnier (F).

نظر مجهرية يتطفل على أوراق القطن فيؤذيها ويهيء
مظهرها الباكر || مظهره الخارجي بقع صفراء اللون مبهمة
أو متلاصقة تركب نصل الأوراق حل صفحاتها العليا
تقابلها على الصفحات السفلى حالات بنية تمرقل سير التفسخ
تفذيال الأوراق بعد أن تقتفي على نسجها التي تلوي وتموت .
يكافح باستعمال أحد الفولانيات النحاسية الانتكاز الضعيفة
التركيز .

- ٢٣٧٦٦ - كشيشة سوداء**
Orobus (S).
Orobe (F). Orobe, Bitter vetch (E). Bergerbe (D).
Orobe (I).

جنس نباتات عشبية برية معمرة من فصيلة الباقليات
الفرشانية . أنواعها نحو ٤٠ ساقها فرعاء مستقيمة . أزهارها
معدنية يجرسها النحل . ثمارها سنية . بزودها مستدرة .
اشهر أنواعها :

- كشيشة ريمية**
Or. vernus (S). Orobe printanière (F).
كشيشة رطاه
Or. variegatus (S). Orobe panschée (F).
كشيشة سوداء
Or. niger (S). Orobe noire (F).

وصفته وأصل صدره وذنبه إلى السواد اللامع . قفنه قنبري
الريش الاسود الارزق المراج . ظهره متساك إلى الجؤوة .
قوامه وأباهره إلى السواد المطروق بالأحر . سائر ريش
جسمه إلى الحمرة النارية . اثناء أقل تلوناً ولُمة ۥ يألف
القفص ويضاهي الحسون في التفرية .

٢٣٧٨٥ - **كُفْرٌ مَبْدُولٌ** *

Chrysomitris spinus (S). *Tarin commun* (F). *Common siskin* (E).

نوع من الكُفْر ، موطنه يشمل الشرق وأروبة وبعض مناطق
أفريقية الشمالية . يألف الجبال والبلاد الباردة في الصيف
ويجوب غابات وحدائق المناطق المعتدلة في الشتاء . وهو
صغير اللد ، جميل القرب يطول من ١١ إلى ١٢ سم .
الذكر منه متوج الرأس بالاسود . ظهره إلى الخضار الاصفر
يطول تجنيم أسمر . جناحه إلى السواد يمتزجها غطان
اصفران . حصره وزوره وصدره إلى الصفار الاصفر .
عقه أسود . منقاره سنطلي الجسم أسود الملمط . حذقة عينه
كستنية اللون ، ساقه إلى الوردية . الانثى أكثر بياضاً
وأقل حمرة واسوداداً . أما رأسها فإلى الخضار الالكهف
بدلاً من الاسود . اثناء تبويض وتحقق مرة واحدة في العام
وقد يكون ذلك في الوتيرة الاولى من حزيران ۥ وهو يألف
القفص بسرعة ويدين بسهولة .

٢٣٧٨٦ - **كُفْرِيٌّ** *

تعت تعريفه يطلق على ما كان شكله كزهره القزديط
أو كالمعقود القصير المستدير .

٢٣٧٨٧ - **كُفْرِيَّة** *

هي الشج ، وأرجه .

٢٣٧٨٨ - **كُفْرِيَّة** *

جنس طيور مقعرة من الكنديات . أنواعه عديدة منها
واحد هم الاقتصاد الزراعي يدهى الكعكة الجرابية .

٢٣٧٨٩ - **كُفْرِيَّة جِرَافِيَّة** * ۥ **الْوَرِيَّة** *

Peziza vesiculosa, *Aleuria vesiculosa*, *Ectocephalum*
finetarium (S). *Pézize vésiculeuse* (F).

فطر يعيش على المواد العضوية النباتية والحيوانية ۥ عسلاته
كبير اللد مركب من سدائ غليظة قدسية الشكل ملموسة
الحافة . قطر براوح من ٣ إلى ٩ سم . مواجه الخارجى أخير
خلى . سطحه التنكي امس البشرة داكن اللون الخشن
اضرار قائمة على ما يتلف من شتول تخلفها من التربة عند
شق طريقه نحو النور .

٢٣٧٩٠ - **كُفْرِيَّات** *

Pezizaceae (S).

Pézizacées (F). *Pezizaceae* (E).

فصيلة طيور من رتبة الزقيات . اجناسها وألوانها عديدة
جميعها مقعرة ، بعضها عادم التفت . معظم اجناسها يعيش
على المواد النباتية والحيوانية المتحللة . منها الأنواع كبيرة اللد ،
لحية المسقودن ، ما كولة ۥ أشهر اجناسها الكعكة والاستيوله
والسركوسيتا والاوليتدا ، الخ .

٢٣٧٩١ - **كُفْر**

الكرم : « شوك ينسبط له ورق كبار امثال الذراع كثيرة
الشوك ثم تخرج له شمع وتظهر في رؤوس شعبة هنات
امثال الرايح يطيف بها شوك كثير طوال ، وفيها وردة
حراء مشرفة تجربها التنسل وفيها حب امثال الصفر الا
انه شديد السواد » (اللسان) .

٢٣٧٩٢ - **كَيْطَامَة**

Canal souterrain (F). *Underground duct* (E).

القناة غير الماء معلومة ومقنية تحت الارض .

٢٣٧٩٣ - **كُفْر**

كل اخمويه يارز يطول احد اعضاء الحشرة أو الزهرة .
ويهم من دهان قارب وزورق .

٢٣٧٩٤ - **كُفْرَان**

Capsules surrénales (F). *Suprarenal capsules*, *S. bodles* (E).

٢٣٧٩٥ - **كُفْب**

Noud (F). *Knot* (E).

المقعدة ما بين الانبوبين من القصب والقنا . ويقبل الكعب
هو طرف الانبوب الناشئ . ج كويوب وكعاب .

٢٣٧٩٦ - **كُفْب**

Malléole, Talon (F). *Malleolus, Heal* (E).

هو عتب الرجل .

٢٣٧٩٧ - **كُفْب الفَرْكَال**

راجع سكايبورزا حقلية .

٢٣٧٩٨ - **كُفْبِيَّة**

Noud (F). *Knot* (E).

الكبيرة : حفلة انبوب الزرع ونحوه . ج كمار .

٢٣٧٩٩ - **كُفْبِيٌّ ، كُفْبِيٌّ**

Radial

٢٣٨٠٠ - **كُفْبِيٌّ**

هو الجرو ، اطلية .

٢٣٨٠١ - **كُفْبِيٌّ**

Capsulaire (F). *Capsular* (E).

تعت تعريفه يوصف به ما كان شكله كالكبوري .

٢٣٨٠٢ - **كُفْتَة** *

Pirula (S).

Pirule (F). *Pirula* (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات سدنيات الاربع
وفصيلة الخنفيات . أنواعها المعاصرة المرفقة عديدة منتشرة
في المحيط الهندي والبحر الاحمر ۥ اصداها شبة اجاسية
الشكل ، رقيقة ، سريعة الطبع ، كبيرة القويوات المستطيلة
القابلة ، صغيرة الاعقاب المألوفة اللدية ، جملة الالوان
المنتشرة ۥ أشهر أنواعها الكعكة التينية (*Pirula ficus*)
التي يكثر وجودها في البحر الاحمر .

٢٣٨٠٣ - **كُفْر**

Chrysomitris (S).

Tarin (F). *Siskin* (E).

جنس عصافير صغيرة اللد نائمة من فصيلة الشرشوريات .
أنواعه المرفقة ٨ ألوانها متداخلة الالوان المركبة المتباينة . تألف
أذيالها مستعرضة ذلقة . مناليعها غروطية قصيرة . تألف
الانبات ويجاري الماء . تجوب البلاد في طلب الرزق والمضيف
والشج ، قوتها يزور النباتات البرية ونبوي الاوراق
والخضرات الصغيرة على اختلاف فصائلها وأنواعها .
تتمش في الاشجار الكثيفة اصحاب السرو والصنوبر . اناها
تقع من ٣ إلى ٥ يبيضات تحضنها وحدها ١٢ يوماً .
أشهر أنواعه المجهول والقنبري .

٢٣٨٠٤ - **كُفْرٌ قُفْبِيٌّ**

Chrysomitris cucullata (S). *Tarin rouge à tête*
noire (F).

نوع من الكُفْر ، موطنه امريكة الجنوبية يكثر في البرازيل
وفنزويلا . طوله براوح من ١٣ إلى ١٤ سم . رأسه وزوره



كفت



كُفْر مَبْدُول



كعكة جرابية

٢٣٧٩٢ - **كَفَرَة** هي المقدة القدية الشكل .

٢٣٧٩٣ - **كَفَس** Os des phalanges (F).

الكبس عظام السلاص في الاصابع . ج كفس .

٢٣٧٩٤ - **كَغَم** Ane sauvage (F).

هو الحمار البرني .

٢٣٧٩٥ - **كَغْسُوم** Ane domestique (F).

هو الحمار الاطلي .

٢٣٧٩٦ - **كَغْل** Métamorphose (F).

Metamorphosis (E).

الكمل هو الاكمال ، اطليه .

٢٣٧٩٧ - **كَغْتَد** Garmon (F).

هو الكند ، اطليه .

٢٣٧٩٨ - **كَغْيَب** ، **كَغْيَب** ، **كَغْيَب** ، **كَغْيَب** Carduus Marianus, Silybum Marianum (S). Chardon-Marie, C. argenté, Lait de N.D., Artichaut sauvage (F). Milk thistle, St. Mary's thistle (E). Echte Mariendistel (D). Cardo di Maria (I).

لثبات عشبي بري يحول من فصيلة المركبات . ساقه تملو من ٣٠ الى ١٥٠ سم . اوراقه كبيرة مفردة حاشية . نصلها لامع الصفحة المشجبة بالابيض . حناره شائك الاحداث . رؤوسها الزهرية تكبر من ٤ الى ٨ سم . ازهارها ارجوانية ، قناباتها مائنة متناهية تنتهي بشوكة مبطله الجرم مستطيلة الحمة .

٢٣٧٩٩ - **كَغْيَت** Pycnonota (F).

هو الببل ، اطليه . ج ، كغتن .

٢٣٨٠٠ - **كَغْيَتَات** ، **كَغْيَتَات**

Pycnonotidae (S). Pycnonotidés (F). Pycnonotidae (E).

فصيلة طير من الجوائم مشرومات المتناظر . اجناسها وانواعها عديدة . اعطائها معظم اقاليق البلاد الحارة والاستوائية || اجسامها صغيرة . منقارها خنزري الشكل ، مستعرضة للقاعدة ، منفضة الجوانب ، مدببة الاطراف . اجنتها مستعرضة ، معتدلة الطول . اذنانها متوصلة الحميم ، مستديرة الاطراف . ارباشها ناعمة وفزيرة . ارسافها قصيرة ، سرديه الفصالح الامامية ، اصابعها قصيرة وقوية . قوتها الحشرات والثمار المعنية والبلور البرية وبعض نواصي النبات || اشهر اجناسها الكميث اي الببل .

٢٣٨٠١ - **كَغْيَص** Cri de la souris (F).

صوت القارة او صراخها .

٢٣٨٠٢ - **كَغْيَط** Brachysien* (F).

نمت وصفي يطلق حل ما كان ظله شديد القصر . ويطلق جغرافيا حل الثموب التي تسكن المناطق الاستوائية لان ظل افرادها منه الظهيرة يكون شديد القصر .

٢٣٨٠٣ - **كَغْآم**

« نبت نحو ذراع مستدير الورق خشن بين سواد وسفرة داخله احمر له زهر كالفرم لكنه اذق وفيه مرارة . يسمونه »

يمنع الحلقان شربا بالبن ويحلل الرياح ويقوي الكبد . (القدرة) .

٢٣٨٠٤ - **كَغْآلْدُوب** Sauge sclairée (F).

راجع قويسة قاسية .

٢٣٨٠٥ - **كَغْآلْسَيْج** Renoncule asiatique (F).

راجع حوزان اسيري .

٢٣٨٠٦ - **كَغْآلْصِيَاغ** Iris d'Allemagne (F).

راجع سوين جرباني .

٢٣٨٠٧ - **كَغْآلْعَدْرَاك** ، **وَرْدَة أُرِيحَا**

Anastatica hierochuntica (S). Rose de Jéricho, Jérôme, Anastatic (F). Rose of Jericho, St. Mary's flower (E). Jerichorose, Marienrose (D). Anastatic, Rosa di Gerico (I).

لثبات عشبي حولي بري من فصيلة الصليبيات . منبسه الاصفاخ القاحلة انحصها البراري القلسية . ساقه قراء تملو من ١٠ الى ٢٠ سم . اوراقه اعليانية الشكل ، غليظة التسنين ، نصلها ازغب الصفحة زهية نجى التركيب . ازهاره اعليية الازتكاز ، فردية التجميع ، لاطفة الانتساب ، يشاهد اللون || وهو من النباتات التي تعيش من جديد بعد يباسها ، فلما لو وضعت في الماء .

٢٣٨٠٨ - **كَغْآلْشَمَر** ، **عُفْرَبَان** ، **حَشِيخَة دُورِيَّة** ، **فَلَس**

Scolopendre officinale, Herbe à la rate (F). Official hart's tongue (E).

هو السرخس الخزفي من النباتات الطبية المشكورة ، يستعمل في علاجات الطحال ويطرد الحصى ويدبر البول ويريل البرقان .

٢٣٨٠٩ - **كَغْآلْمَهْر** Renoncule des champs (F).

هو الحوزان الحقل ، اطليه .

٢٣٨١٠ - **كَغْآلْبَد** Dessaisissement (F).

Parting with, Abandonment (E). هو منع الشخص من ادارة ماله . وقد يكون الانتاع طوعا واختيارا .

٢٣٨١١ - **كَغْآلْجَدَمَاء**

الكف الجلهاء بضعة نجوم من كوكبة قيطس مركزها في الرأس .

٢٣٨١٢ - **كَغْآلْمُغْصِب**

الكف المغصب نجم ثير من كوكبة ذات الكرمي . ويدعى ايضا الكف المغصب .

٢٣٨١٣ - **كَغْآلْمَرْيَم**

هو الارائه ، جنبه طيبة ممررة . وهو كوكب البحر ، اطليه .

٢٣٨١٤ - **كَغْآلْمَاة** *

Sparassus (S). Sparassus (F). Sparassus (E).

دودية من التناكب الساعية القانصة ثنائية الروايا سداسية المشانق تنتمي الى فصيلة الاجيات || جسمها صغير القند بطول نحو ٧ سم . حته الذكر ونحو ١٢ سم . حته الانثى . سداسها ناق* المقدم ، حنلي اللون ، كغيب الحمل .



كيب



كف العلام



كغاس

الى الكسني الاحمر المواج . ملها ورواجها الى السرة الحالكة || طور الاكمال يستمر نحو ١٦ يوماً وينقضي في الجفلة او في التربة حيث تنفس السرة ملتصقة بجلباب من الطين .

Cautionnement (F).
Security (E).

٢٣٨١٧ - كفّالة

هو العقد الذي يلتزم به الكفيل نحو الدائن المكفول له . وهو أيضاً الدويمة المرتبة سواء كانت أوراقاً مالية أم عقوداً تستعيد تأميناً لدين احمالي .

Garantie (F).

٢٣٨١٨ - كفّالة ، ضمان

Guaranty, Warranty (E).

شهادة خطية من البائع يان ما يبيعه من بلدار وامددة وادوية وادوات وغيرها حائزة على التركيب المتفق عليه .

Ducreire

٢٣٨١٩ - كفّالة الشكري

هو ان يلتزم الوسيط دفع عن المشتري الى البائع اذا لم يفعل الشاري ذلك .

Caution juratoire (F).

٢٣٨٢٠ - كفّالة القسم

Juratory security (E). قسم قمتره الحكمة بمثابة كفالة .

Caution légaie (F).

٢٣٨٢١ - كفّالة قانونية

Common bail (E). هي الكفالة التي تقدم تنفيذاً لنص القانون .

Caution judiciaire (F).

٢٣٨٢٢ - كفّالة قضائية

Judicial security (E). هي الكفالة التي يجب تقديمها تنفيذاً لحكم المحكمة .

Limite du feuillage (F).

٢٣٨٢٣ - كفّة

Limit of the foliage (E). كفّة الشجرة : متبني حدود دوحها حيث تنقطع اوراقها .

٢٣٨٢٤ - كفّة جنوبيّة

الكفّة الجنوبية كوكب .

٢٣٨٢٥ - كفّة شمالية

الكفّة الشمالية كوكب .

Bitume

٢٣٨٢٦ - كفّر

هو الحمر الفروي ، راجع حر .

Keempferia (S).

٢٣٨٢٧ - كفّسريّة

Keempferia (F).

جنس نباتات جلمورية دقوسية معمرة من فصيلة الزنجبيليات . انواحه نحو ٢٠ منبها المناطق الحارة . اوراقها كبيرة القد ، قرصية الانتشاح يتوسطها شراخ تملو زهرة كبيرة ، جميلة الشكل ، متباينة الالوان || جذاميرها طيبة يستخرج منها مواد ناعوظية شديدة الفاعلية .

Selaginella (S).

٢٣٨٢٨ - كفّسان

Selaginella (F). Resurrection plant (E). Auferstehungs-pflanze (D). Selaginella (I).

جنس نباتات عشبية برية معمرة من فصيلة الخدرديات . انواحه المعروفة نحو ٢٠ جميعها من نباتات البلاد الحارة والمعتدلة . سوقها نخيلة مدادة فرما . فرصها منتسبة فناء تكسوها الاوراق الصغيرة المترتبة الحرشية الشكل ،

عينها زيمتان . شيفافها صغيران ذويان . فكاهها كبيران مجهزان بشفاف حادة . جرانها كبيرة مسطيلة . بطنها يضي الشكل ، سطلي اللون تملو نمشة سمراء واديع فقط سود || تألف البراري والمواقع النطلة . قوتها الحشرات والذباب . تسرح في الليل . ماراها سنة صغيرة قلنسوية الشكل تنسجها عند سوق النبات . يهاها الشفوي يستمر نحو خمسة اشهر تقصفيها في مكتبة صلمية تنسجها بين الحياجرة ونحها || تعتبر من الدويبات النافعة .

٢٣٨١٥ - كفّاشة ترّاويّة

Calymnia trapezina, Cosmia trapezina (S).

Calymnia trapézoidale, Cosmia trapézoidale (F).

Calymnia trapezina (E).

فراشة من فصيلة الضفليات حرشفات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اطراف اروبة . فراشتها جولة قوتها رحيق الازهار . سرفها خاضعة تركيب اوراق الازهار الوردية || جسمها يطول نحو ١٣ سم . بطنها تراوح من ٣٠ الى ٣٢ سم . رأسها مستد الجرم ، نفاق الجبهة . عينهاا كبيرتان نارفتان . زباناها غيطيان . ملاسها نخيلة . مرشفاها مستد الطول . جوشها وبطنها الى الخفي الامصر المواج || روشناها الامامية الى الخفي الاكلفت تملو مشعة عنابة ونفطان مفرضان اسمران . روشناها الخلفيان الى الخفي الامصر المواج يطوق حنار تني ينتهي بالامصر || لها جيل واحد في الجيل . تظهر الفراشة في ايار وتبقى حتى تموز . تسرح في الليل وتبيت في النهار || الاثني تلقى المكان لطفاً لانتراوية الشكل تنلفها مادة غريبة تنسجها على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرة عند بلوغها الادراك التام تطول نحو ٢٨ سم . جسمها ماس التشنج مستد القسم ، مستطيل المخفر الذي يبعد كسرب اللقطة . ثوبها الى البني الامصر تملو خطوط صفر مفرضة . رأسها كسني اللون . ملها ورواجها الى السرة القاتنة || طور الاكمال الذي يستمر من ١٥ الى ١٧ يوماً وينقضي في التربة حيث تنفس السرة على عمق ٣ او ٤ سم . ملتصقة بجلباب خفيف من الطين ينقل عند انطلاق الفراشة في ايار .

٢٣٨١٦ - كفّاشة مؤاطحة

Calymnia affinis, Cosmia affinis (S).

Calymnia complice, Cosmia complice (F).

Calymnia affinis, Cosmia affinis (E).

حشرة من النسيقات حرشفات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اروبة . فراشتها جارية قوتها رحيق الازهار . سرفها خاضعة تميش على اوراق السديان || جسمها صغير القد يطول نحو ١١ سم . بطنها نحو ٢٩ سم . رأسها الى الخفي . عينهاا كبيرتان . زباناها غيطيان . ملاسها دقيقة . مرشفاها مستد الجرم . جوشها وبطنها الى الخفي الامصر المواج || روشناها ، عند الشقين ، الى الخفي الاكلفت تملو في الزوج الامامي ماجة صنيابة وضطوط سمر مفرضة ويقطعان الى الطلعة || لها جيل واحد في الجيل . تظهر الفراشة في حزيران وتبقى حتى آب . تسرح في الليل . تماثل يمد ظهورها بنحو ٤٥ يوماً وتمتد المكان لطفاً مستطيلة الشكل على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرة عند بلوغها الكمال الجسوري تطول نحو ٣٤ سم . جسمها شبه اسطواني الشكل ، ماس التشا . ثوبها الى الطلعة يملو مواج اخضر وضطوط سود مفرضة يمتثلها من الجانبين نقط غبراء اللون . رأسها



كفّاشة تراويّة



كفّرية



كفّسان

٢٣٨٣٨ - كُكْلُوبْ * Cactus, Pylotophus (S). Cacatois, Cacatois (F). Cockatoo (E).

جنس طير من الببغاء. أنواعه قليلة العدد جميعها متسلسلة أصنافها فسيحة الإرتباب تمتد من الهند إلى جزر الزابنج وأستراليا. أجسامها كبيرة القدر. أوتياها إلى الأبيض الناصع. طوارها كبيرة فائقة لونها يختلف باختلاف النوع، يراوح من الأبيض إلى الوردي والأصفر. وهي هنية الخلق تعيش في القفص وتقتبس العلم والكلام.



كففة مدادة

٢٣٨٣٩ - كُكْلُوبْ الطَّيَّان * Leomophicus clemetidis (S).

حشرة من الككجيات طويلة يراوح من ٢ إلى ٣ سم. قوفاها إلى الخشنى تملو مابة جزوية. كوكها حاد التسنين. زيانها صولجانية مهدبة || تعيش على سوق الطيَّان بعد يابسها.



ككوة

٢٣٨٤٠ - كُكْلُوبْ المِخْزَن * ، كُكْلُوبْ سورينام * Oryzaephilus surinamensis (S). Silvain (F). Saw-toothed grain beetle (E). Getreideschmalkfer (D).

حشرة من الككجيات قوفا إلى الخشنى. جسمها مستط الشكل بطول نحو ٣ سم. كوكها مسن الحافة. زيانها صولجانية مهدبة || تركب مع رقاتها جميع الحبوب الخزونة والآبار الخفيفة والسكاكر والخبز. وقد تقوس وينيد رقات الككندرا (Calandra).

٢٣٨٤١ - كُكْلُوبْ مُنْقَطَعَة * Uleiota planata (S).

حشرة من الككجيات جسمها مستط مقطع. طولها يراوح من ٤ إلى ٥ سم. قوفا إلى الصلبة يملو مواج قائم. كوكها إلى السرة ثنائي التسنين الطرفي الامامي. زيانها خيطية، مستطيلة مهدبة. || تعيش تحت لحاء الاشجار الحرجية اخضتها للتدبير.



ككبة الطيَّان

٢٣٨٤٢ - كُكْلُوبْ * Cucujidae (S). Cucujidae (F). Cucujidae, Flat bark beetles (E). Rindenkäfer (D).

فصيلة حشرات من غديات الاجنسة. اجسامها وانواعها عديدة اصنافها العالم. جميعها من الخنافس الصغيرة المستطيلة الشكل. قوفا الاستشارية غشوية أو صولجانية مركبة من ١١ فاصلة. أرسافها خاشية المقل || تعيش بين الاخشاب ويقت القشور وفي مخازن الحبوب حيث تفترس ما تقوى عليه من المزارع والخزرات الصغيرة.

٢٣٨٤٣ - كُكْلُوبْ * هي الخنثرى. اطلبها.



ككبة الخازن

٢٣٨٤٤ - كُكْسِيلِيدُوزْ * Merus fatak يدهى غريرة الانب، اطلبها

٢٣٨٤٥ - كُكْلُوبْ * Cocoloba (S). Cocolobe (F).

جنس الجبار وهجيرات برية من فصيلة البيلجيات. انزاهه للمرققة نحو ١٦ منها المناطق الاستوائية الامريكية. تتميز بصلاية ومناعة اغشائها الصامدة || أشهر انزاهه ما يتبع.



ككبة مغلطة

٢٣٨٤٦ - كُكْلُوبْ أَزْهَبْ * Cocoloba pubescens (S). Cocolobe pubescent, Boit de fer (F).

شجرة عطية دائمة تسلو من ٢٠ إلى ٣٠ م. خشبها احمر

الزيتونية اللون || تزود لثريين يستعملها الزمارون في صناعة ارياش وبقاات الزهر.

Croupe (F).

٢٣٨٢٩ - كُكْلُ

هو الزود، اطلبه.

Glechoms (S).

Gléchome, Gléchome (F).

جنس نباتات عشبية برية معمرة من فصيلة الشفويات. انواعها قليلة بعضها طبي. سوقها لاقطية الشكل منها للمادة والمتنصبة. اورثها متقابلة معنفة، تسلفها مستدير الصفحة المشادية الحافة. انزاهها ابطية الارتكاز مختلفة الالوان منها الابيض والازرق والارجواني والبنفسجي. تعيش في المراتع الرطبة وفي الاقنية والسليجات.

٢٣٨٣١ - كُفْة مدادة * ، تلاب أزهي * Gléchoms hederacea (S). Gléchome hédéracé, Herbe de St. Jean, Rondelette, Terrestre, Lierre terrestre (F). Ground Ivy, Hedge maida (E). Echter Gundermann (D). Corona di terra, Erba di San Giovanni, Edera terrestre (I).

لوع من الكفة المبلولة وهو نبات عشبي طبي برى معمر. ساقه تسول نحو ٣٠ سم. اورثها بجيلة الخضار الموضح انزاهه ضمية التجميع، نحاسية، زرقاء اللون.

٢٣٨٣٢ - كُفْيات القندم * Palmipèdes (F). Palmipeds (E).

رتبة من الطير تنتمي إلى قسم الجائحات، فصالها واجنتها وانواعها كثيرة العدد تتجمع إلى أربع رتبيات : فاملات الكفوف منها البجع صفحيات المنابر منها الوز والبط طريقات الريش منها القفوس دمجات الريش منها البطريق.

Kéfir, Képhir (F).

Kefir, Kefyr (E).

٢٣٨٣٣ - كُفِير

مشروب كحولى حامز العلم يستحضر من مضارة اللبن بعد تخثيرها بمخار نظرية خاصة تمتد من نشاط الحامض اللبي.

Caution, Fidéjousseur (F).

Caution, Surety (E).

٢٣٨٣٤ - كُفِيل

هو الذي يلتزم للدائن مع المدين الاصلي بتنفيذ الالتزام اذا لم ينفذه المدين.

Garant (F).

Guarantor, Warrant (E).

٢٣٨٣٥ - كُفِيل، هامين

هو الملتزم بالكفالة أو الضامن.

٢٣٨٣٦ - كُفِيل التفتكات التفتائية * Caution judicatum solvi

هو الكفيل الذي يغضن دفع التفتكات التفتائية.

٢٣٨٣٧ - كُفِيل مُتَضَامِين * Caution solidaire (F).

Binding on several caution (E).

هو الكفيل الذي تتألف للدائن من سن المطالبة بتجريد المكفول فاصبح موقفه من الدائن موقف الشريك المتضامن في الدين.

طوله نحو ١٠ سم. وبسطه نحو ٣٠ سم. رأسه شبه مخروطي: عيناه صغيرتان، ماصتان. خنثاه، مقطوعتان، مقوستان. سباله متكاثل مستطيل. أذناه مستقيمتان، كبيرتان. جناحاه عريضان. ذيله مدرج في النشاء الجلدي || يألف البيوت والكهوف والمخار والقرية من الجاري المله. يعيش جماعات متوسطة العدد. الذكر لا يفرق إلا في زمن الكرم. مرة في الحول || مسرعه يستمر من النقص إلى الفجر. قوته الحشرات على اختلاف أجناسها وأنواعها.

٢٣٨٥٥ - **كلادة***
Chelodina (S).
Chelodina (F). Chelodina (E).

نوع من السلاحف القاذبة المقترنة تنتمي إلى فصيلة الحسبيات. تعيش في المياه العذبة وحمل صفات الأنهر. قوتها الأسماك والرخويات والصفادع والوزغ والسحالي والحيات || جسمها يطول نحو ١٠٠ سم. منها ٤٢ سم. الرأس والرقب وأنها مبطل الشكل، ذقن الخلع. صفها أسطواني مستطيل، ذنبها جذمة. ذيلها شبه يشي الشكل، مستدل الإحديدياب، ويتكبر من ٢٥ فترة لامتسارية الحجر، لونه إلى السمرة الصفراء الكدرية || موطنها بعض مناطق أمريكة الجنوبية || لها كامن الصفن، ما كمل من بعض قبائل تلك البلاد.

٢٣٨٥٦ - **كلاد يون***
Cladium (S).
Cladium (F). Marsh shear-grass (E). Schneidegras (D). Panicastrella di padule, Serrazo (I).

جنس نباتات برية عشبية معمرة من فصيلة السدييات. أنواعه المعروفة نحو ٢٠ أعطائها العالم. تألف المنافع والمواقع الرطبة. سوقها دقيقة قرصية التفرع، مستطيلة السليانيات، تملو من ٦٠ إلى ١٢٠ سم || تستعمل في تغليف الخيم لأنها آمن وأبقى من قش الزروع.

٢٣٨٥٧ - **كلاركيا، إكلركية**
Clarkia (S).
Clarkia (F). Clarkia (E). Clarkia (D). Clarkia (I).
جنس نباتات عشبية حولية من فصيلة الإخندريات مهدها البلاد الأمريكية. أنواعها قليلة جميعها صغيرة القد تزرع للزينة. أوراقها متعاقبة. أزهارها فردية التجميع، محورية الارتكاز، رباعية البتلات والسمات، ثمانية الإسدية. أحرف أنواعها وأشهرها ما يلي.

٢٣٨٥٨ - **كلاركيا رشيقة***
Clarkia elegans (S). Clarkia élégante (F).

عشبة تريبنتية سبروتية حولية تملو من ٨٠ إلى ٦٠ سم. أوراقها أحليجية ذائقة، نصلها مسنن الحافة، مجري اللون. أزهارها كبيرة القد عادية أو مكسية، بتلاتها مستديرة أو كلفة الشكل، مسنة الحار التجميع. ألوانها تختلف مع الفروغ منها الوردي والبفسجي والأبيض. أزهارها يستمر طوال الصيف.

٢٣٨٥٩ - **كلاركيا تحيفية**
Clarkia pulchella (S). Clarkia délicate (F).

عشبة تريبنتية سبروتية حولية تملو من ٣٠ إلى ٦٠ سم. ضرورها عديدة. أوراقها سنانية ذرية، نصلها خلو البشرة. أزهارها كبيرة القد، منها البادية والمكسية، بتلاتها لاقامية التخصيص، ألوانها تختلف باختلاف الفروغ منها الأحمر والأجواني والبفسجي والأبيض. أزهارها يستمر من موزران إلى أيلول.

اللون شديد الصلابة نام الرقة يقاوم النشع يدرج بنشب الحديد.

٢٣٨٤٧ - **ككلوب كينو***، **ودن الفيل، عشب الشقة**

Coccoloba uvifera (S). Coccolobe à baquette, Bois baquette, Raisinier des bords de la mer, R. à grappes (F). Sea-side grape, Kino tree (E). Gamela Scauruba (D). Coccoloba uvifera, Uva di mare (I).
نوع من الككلوب وهو شجرة برية تألف الشطوط البحرية. ساقها تملو من ٣ إلى ٥ أمتار. أوراقها متعاقبة، معتقة، كبيرة. نصلها مستدير الصفحة الجامدة اللامة. أزهارها سليل التجميع، ثنائي الارتكاز. إزهارها بلجولية الشكل، صغيرة القد، وردية اللون || يستخرج من ساقها باخر صاصرة لزنية، قابضة، مفراة اللون يطلق عليها اسم « كينو » (Kino).

٢٣٨٤٨ - **ككم***
Ierax (S).
Ierax, Faucon nain (F). Ierax (E).

جنس طير من عراة الصقور وفصيلة الصقريات. أنواعه جديدة جميعها صغيرة القد، ريمة القوام، طولها يراوح من ٢٠ إلى ٢٢ سم. لونها إلى الكسلة المرقطة يكثر فيها الأطول والأصغر والأزرق الباق، ويش صندورها أفر. رؤوسها مستديرة. حنيتها جليلة وكبيرة. مناسرها مسلة ومنمقة. غالبها حادة || موطنها البلاد الآسيوية من تركيا إلى اليابان. تألف الأجام ويهاجر المله. قوتها اللوديات والخشرات أعصها الجنادب والسرابع والفراشات الكبيرة.

٢٣٨٤٩ - **كك**
Fourrage (F).
Fodder, Provender (E).
كل ما ترعاه الماشية من احشاش خضر أو تتلفه من حشوش وصقال مخزونة كالطاطا والشولدر الخ.

٢٣٨٥٠ - **ككاييس**
Foin (F). Hay (E).
الككاييس والثن والشائرة والقييب هو العشب الحشوش الجفيف المحفوظ كلف للحيوان.

٢٣٨٥١ - **ككلاية**
Pâturin des prés (F).
هي تف المروج، أمليه.

٢٣٨٥٢ - **ككلاب**
Canidae
فصيلة حيوانية من الأواسم تعرف بالكليات.

٢٣٨٥٣ - **ككلاية***
Quillaja, Quilaya
جنس اشجار برية من فصيلة الورديات. أنواعها قليلة. أعطائها البلاد الأمريكية. سوقها وفروعها منتصب. أوراقها متعاقبة معتقة يشبه النسل. أزهارها نوري. إزهارها ثنائية المسكن، أبطية وتناحية الارتكاز || أشهر أنواعها الككلاية الصابونية التي تتميز بسبابة قشور سوقها وأغصانها الدنية بمادة الصابونين.

٢٣٨٥٤ - **ككوج، ككغاش أسبل**

Vespertilio mystacinus (S).
Vespertilion mystacin, V. à moustaches (F).
الككلاج والككلاية نوع من الخفاش، حيوان من فصيلة الخفاشيات. موطنه فصح الأرباء يمتد من الصين إلى أروبة مروراً بالشرق الأوسط والاند || ثوبه إلى الطحلة السمره تقب في الرأس والظهر، وتغير في البطن.



ككلوب كينو



ككم



كلادة



كلاركيا



ككلاديين



كلاركيا رشيقة

٢٣٨٦٨ - كَلْبُ الْجِبَار

كلب الجبار كوكب .

٢٣٨٦٩ - كَلْبُ الرَّاعِي

كلب الراعي نجم نير من كوكبة الجباري ، يسمى أيضاً رأس الجباري ، أطله .

٢٣٨٧٠ - كَلْبُ الصَّيْد

Chien de chasse, C. courant (F). Pointer, Beagle (E). صرغ من الكلاب النشيطة أحادقة الثم تستعمل في الصيد . هرفها عديدة تتميز باختصاصها واشكالها واثيرها .



(١) كلب

Ligne du dos (F). كَلْبُ الفَرَس
Line of a back (E). هو الخط الذي يوصل ظهر الفرس .

٢٣٨٧٢ - كَلْبُ الْمَاء

Lutra (S).
Loutre (F). Otter (E). هو القضاة والقتل والماء . جنس حيوانات لينة قلابة من فصيلة المرحويات . انواعها ثمانية اصنافها العالم . تألف الجيبرات والانه والاعوار . قيثا الاسماك والقرشيات والشفادع وبعض الباز والاشباب || اجسامها مستطيلة . وروسيها مستعرضة مفلطحة . اعطالها مقعولة . احتفها غليظة . قوائمها قصيرة ، اسابها خلسة ملتصقة . اذنانها مستطيلة . جلودها فروية فانعة الصنف || اجسامها دعائيز منحذرة الانفاق تبتئ تحت سطح الماء بمضيق او وتنتهي على بعد ٢٠٠ سم . رجعات مستدرة تملو مستوى الماء بحد ١٠ سم . وتتصل مع الخارج بمراديب تزين الهواء والمرب عند الحاجة || اذنانها اصغر قدماً من ذكورها وهي تضع من جروين الى اربعة جراء . رضها وريها نحو ٥ شهور .

(٢) كلب

Courtillière (F). كَلْبُ الْيَاقِ
هو الخالوش ، اطله .

٢٣٨٧٤ - كَلْبُ مُطَدِّم

الكلب المتقدم كوكب .

٢٣٨٧٥ - كَلْبَان

الكلبان « نيجان صفيان كاللترين بين الثريا والهدبان » .

Chienne (F). She dog (E). كَلْبَة
انثى الكلب .

(٣) كلب

Canidae (S). Canidés (F). كَلْبِيَّات
Canidae, Dogs (E). فصيلة الكلاب من القوارض تشمل الكلب والذئب والذئب وابن آوى .. قوائمها الاسامية خلسة البرائن اما الخلفية فرباعية ورائتها لا تتلفس كما في السانير وهي لا تتلفس الاضراس ولا تقبض على فريستها ببرائتها بل بانهاها .Cynocéphales (F). كَلْبِيَّاتِ الرُّؤُوس
Cynocephalus (E). هي القردايح جنس قرد من فصيلة المجرسيات . راجع قردوح .٢٣٨٧٩ - كَلْبُوم
هو الفيل والزلزليل ، اطله .

Collette (F).

٢٣٨٦٠ - كَلْبِيَّة

جنس نباتات برية معمرة من النقيات تدعى ميكة ، اطلها .

٢٣٨٦١ - كَلْب ، سَعَار ، سَعَر

Rage, Hydrophobia, Lyssa (F). Hydrophobia (E). مرض خبيث يصيب الكلاب والذئاب والثعالب والسانير ويسري الى سائر الحيوانات كالغلي والبقر والغنم والمنازل والارانب . عدواً يابجر من العاب .

Canis familiaris (S). كَلْب *
Chien (F). Canis, Dog (E). جنس حيوانات شاردة واعلية من فصيلة الكليليات . سلالات كثيرة البلد يجمع الى اربع فئات :Lupoides فئة الكلاب المبرورة
Braccoides فئة الكلاب الششية او البريجية
Molossoïdes فئة الكلاب الدوراسية
Gratoides فئة الكلاب السلطوية

انقله مشاركة الاطباء تحمل من ٦٣ الى ٦٥ يوماً وتضع من ٦ الى ١٠ جراء بجرز النور بعد وضعها بتمسة ايام . وتفتقد اسنان الخلب يسر ثلاثة اشهر ويكمل تسليها النهائي بمر ثمانية اشهر . والكلب خمسة اصابع في قوائمها الاسامية واربعة في الخلفية . اسابه مبطنة قوية البرائن || وهو حيوان مستأنس اليف وفي يستخذه الانسان في الحراسة والصيد والرماية والطرارة .

le Petit chien (F). كَلْبُ اصْغَر
Canis minor, the Lesser Dog (E).

الكلب الاصغر كوكبة نجوم جنوبية المقع مركزها بعد الكلب . الاكبر الى الشرق || نجومها قليلة العدد ، منها سبعة مزدوجة وكوكب انور من غيره تسميه العرب « الشعرى الشامية » لانه يغيب في شق الشام . وتسميه ايضاً « الفمضاء » . وتسمى الكوكبين القدين على الذراع « الذراع المقبوض » او « مزمذم الذراع » .

le Grand chien (F). كَلْبُ اكْبَر
Canis major, the greater Dog (E).

الكلب الاكبر كوكبة نجوم جنوبية المقع مركزها خلف كوكبة الجوزاء وذلك تدعى كلباً || عدد نجومها تسعة وعشرون . والعرب تسمي النير الاظهر الذي على موضع الفم « الشعرى المبرورة » . وكان قوم في الجالية يعبدهون لانه يقطع الباء هراً دون غيره من الكواكب . وهي هجوراً لان هبر الهجرة الى سهيل ، ويسمى ايضاً « الشعرى البانية » لان منبه في شق الين . اما الاريمة التي منها على كتفه وعلى ذيله وبا بينها وعلى فخذة فتدعى « المذارى » والاريمة المصطلة على الاستقامة تدعى « القرد » .

٢٣٨٦٥ - كَلْبُ الْأُرْكَار
Chien-terrier, Fox-terrier (F). Terrier (E).

سلالة من الكلاب النشيطة الرشقة تستعمل في صيد الجرذان والثعالب والاربابز وغيرها .

Requin (F). كَلْبُ الْبَحْرِ
هو القرش ، اطله .Emitsole (F). كَلْبُ الْبَحْرِ
سمكة بحرية ، كبيرة ، مفترسة تدعى سيجل ، اطلها .

٢٣٨٨٧ - كلزومة حرسة °

Calosoma rugosum (S). *Calosoma rugueusa* (F).
حشرة نافعة من فصيلة السلكوتيات طولها نحو ٢٥ سم.
لونها اسود اللون. غمداء غمدان يدلونها موانج اخضر.
اسفح || تكثر في الصيف على الانجار الحرجية وفي
الحاقل والجنان حيث تقترس يرقات غيرها من الحشرات
اخضها يرقات فصيلة السفيقات .

٢٣٨٨٨ - كلزومة مأكرة °

Calosoma sycophanta (S). *Calosoma sycophanta* (F).
European Calosoma beetle (E). *Puppenrüber* (D).
حشرة نافعة من فصيلة السلكوتيات طولها براوح من ٢٥
الى ٣٥ سم. رأسها وكسولها الى الزرقه ، غمداء مستعرضان
الشكل ، لونها الى اخضر المذهب الاسفح الموانج .
تألف الغابات والحاقل حيث تقترس على تيسر لها من
يرقات الحشرات اخضها اسارع القزيات .

٢٣٨٨٩ - كلس ، كجير
Chaux (F).
هو اكسيد الكلسيوم ، اطلبه .

٢٣٨٩٠ - كلسبورة °
Calospora (S).
جنس فطور مجهرية من الرفيات . تتميز ببوغها المستطيل
القد ، الأغشاف الجسم ، الشفهي الانقسام والوبري
المترس || له نوع واحد هم الاقتصاد الزراعي يدعى
كلسبورة الويلة .

٢٣٨٩١ - كلسبورة الويلة ° ، لصف الويلة °
شقران الويلة °

Calospora vanillae, *Gloeosporium vanillae* (S). *Anthracoze de la vanille* (F).
فطر مجهرى يركب اوراق وممار الويلة فيعطها ويذوبها .
مظهره الخارجى على الاوراق نقط سمر توشم صفحة النصل
علما قطب النسيج وتمرقل على الجسموري . وهو على
الجار قروح صغيرة مستديرة قمحية اللون تسبب القرن
في احد طرفيه او في وسطه فتسبب ذبوله وسقوطه || يكافح
فور ظهوره على الاوراق بمحلول بوردو المركز من ١
الى ١٥ ٪

٢٣٨٩٢ - كستوم °
Callistemon (S). *Callistème* (F). *Callistemon* (E).

جنس اشجار وجنيات ميمنة من فصيلة الاريات ، اوراقها
المروقة عديدة ، منها فسح الاجزاء ، يمتد من الشرق
الاسوط والاقصى الى امريكة واستراليا || سورها تملو من
مترين الى سبة اطار . اوراقها ايده ، متعاقبة ، متقاربة ،
مستقيمة . نصالها سناينة ، جامدة ، ازهارها سبلي التجميع .
ازهارها غنطة الخضاب والعرف || اعرف انواعها واشهرها ،
التالية :

٢٣٨٩٣ - كستوم أنيق °

Callistemon speciosus (S). *Callistème élégant* (F).
نوع من الكستوم . مجهرته تملو نحو سبة اطار .
اخصانها واغنداء واغناها جرهه اللون . اوراقها تملو نحو
١٠ سم . نصالها فواحة العرف العطرى ، خلية البشرة
في اول عهدها . سنايله الزهرية قرمزية اللون . مياس ازهاره
الى الصفار المايق الجميل || تنويره يستمر من آذار الى
حزيران

٢٣٨٨٠ - كلجم °
Géophyta (F). *Geophyta* (E).
كل نبات تكون اعضاءه تكاثره المائية مدفونة في التراب
كالباتيات السفولية والنوصية والصلية .

٢٣٨٨١ - لسان المزمار °

Salpiglossis (S). *Salpiglossa* (F). *Painted tongue*, *Valvet flower* (E). *Trompetenzunge* (D). *Salpiglossa* (I).
جنس نباتات عشبية حولية تربيتية من فصيلة الباذنجانيات.
انواعه المعروفة خمسة اما غربه فكلترة العدد جميعها زياه
الاعضاء لزجة . سورها فراءه منتصبه تملو من ٤٠ الى
١٢٠ سم . اوراقها معتقة لاجلجية ذرية . ازهارها قمية
الشكل ، كبيرة ، القد تطلو من ٤ الى ٦ سم . اقلام مدقاتها
مبطله . لوانها عديدة تختلف مع الضروب منها الاصفر
والاخر والازرق والبنفسجي والابيض والموشح والمنج
والمرط || ازهارها يستمر طوال فصل الصيف .

٢٣٨٨٢ - كلج
Férule commun (F).
هي القنة المبذولة ، اطلبها .

٢٣٨٨٣ - كلدة
Cumuler (F). *To accumulate* (E).
كلدة الشيء : جمعه ويحمل بعضه على بعض .

٢٣٨٨٤ - كلدة
Terrain dur et compact (F).
هي التربة الصلبة المتجمدة .

٢٣٨٨٥ - كلدودة مبدولة °

Eupithecia vulgata (S). *Eupithecia vulgaire* (F).
Eupithecia vulgata (E).
حشرة مبذولة من الريفات حشرقيات الاجتحة . مطبها
معظم الاصفاق المعتلة الحمرية من الشرق الاقصى الى
اروبه . فراشها جارية قوتيا رقيق الازهار . سورها
خاضعة قوتيا اوراق الصوانيات والشفويات والمركبات
جسمها صغير قصيف يطول نحو ٨ م . مطبها نحو ٢١ م.
رأسها حطلي اللون . صيها صنتريتان . زبانها مشطيان
عند الذكر ، عيطيان عند الانثى . حوشها وبطنها الى
الحطلي الاكلف الموانج || وراشها ، عند الشقين ، الى
الحطلي الاكلف تملو في الزوج الامامي بقنجان ونقطة
مستطيلة الى الي الامام الموانج وسبع نقط بنية في الحثار
الخارجي . تملو في الزوج الخلفي مشقة بنية وسبع نقط
صغيرة تتأخم الحثار || لها جيل واحد في الحول . تظهر
القراضة في نيسان وتبقى حتى اواخر حزيران . تخرج
من العصر الى لعمه الليل . تماطل يد ظهورها بنحو ستة
اسابيع وتفتح الملكن مبيدا على الصفحات السفلى من
نصال الاوراق || الفترة تملو نحو ١٩ م . جسمها شبه
وشمي الشكل . لونها الى اخضر الزيتي تملو بقشة غبراء
وسط بجي قالب اسمر وقشة خطوط جانبية وردية . رأسها
اسود . رواجها البطنية الوسطى ماسحة مما يحملها تنقوس
عند الانتقال || طول الاكامل الذي يستمر نحو ١٦٠
يوما ينقضي في الجلالة او بين فروع النبات التي تلاس
التربة فمن جراب غرويولي الشكل ينفلق عند انطلاق
الفراشة .



كلجم



كلدودة مبذولة



كلزومة مأكرة

٢٣٨٨٦ - كلزومة °
Calosoma (S). *Calosome* (F).
جنس غنفس نافعة من فصيلة السلكوتيات . انواعها
عديدة تقتلك يبيض الحشرات الفارة .

كَلْفَةُ الْاِكِيدِنَا

والاستوائية || معظم انواعها اشجار حولية او معمرة ، بعضها بري والبعض الآخر ثريفي . اكثر انواعها زبده السماء خلية الوراثة . ازهارها رقيقة ، عديدة الالوان . تنموها ربيعي وصيفي || اشهر اجناسها الكليسر والطاقة والقلاذ .

Calcium

٢٣٩٠٦ - كَلْسِيُوم

عنصر فلزي غير ألين ، لين الجسم ، ثنائي التكافؤ . رمزه (Ca) وزنه الذري ٤٠.٠٨ ينصهر في ٨١٠°مغ ويغلي في ١٤٨٧°مغ . وهو من الاجسام الشرة التي تمتص الماء والغازات || يوجد في الطبيعة مركباً من بعض العناصر اهمها اكسيد الكليسيوم او الكلس الحلي . ثم كبريتات الكليسيوم المرسدة الكليسيوم وهو ملح ابيض يوجد في الطبيعة حل هيئة رناعم او طباشير او جص . ثم كبريتات الكليسيوم المرسدة في الطبيعة حل هيئة حصى ويرس . ثم فسفات الكليسيوم الذي يعتبر المادة الرئيسية في تكوين العظام وفي تكوين الانسجة النباتية .

٢٣٩٠٣ - كَلْسِيْسِيْن ، كَلْسِيْسِيْن ، سُوْرْتَجِيْن
Colchicine (F). Colchictin (E).

مادة قلوية بلورية متياصرة تستخرج من سورتجان الخريف ثقل عند ١٤٥°مغ . تلوب في الماء البارد والكحول والكلوروفورم .

Crevasses (F). Chaps (E).

٢٣٩٠٤ - كَلْع

قشب صقن يحصل في جلد اسراع الدواب .

Macule du soleil (F).

٢٣٩٠٥ - كَلْك

Sun-spot, Macula (E).

Galvanomètre (F).

٢٣٩٠٦ - كَلْفَلْتُوْمِيْر

Galvanometer (E).

مقياس القوة الكهربائية أي شدة التيار .

Phyllosticta (S).

٢٣٩٠٧ - كَلْفَة

جنس فطور مجهرية من الفصليات . بكتيدات غسية التجميع تتلصق تحت ادمة التصل ثم ترق الى السطح . اشكالها متعددة ، الواحدة عابطة . مقه واضع الارتكاز ، شعيرات بسيطة ، قصيرة وشعافة || تركيب الأوراق فريزم لسيجها ويؤذيها || انواعه عديدة . اخرها ما يتبع .

٢٣٩٠٨ - كَلْفَةُ الْاِسْبَاحَةِ
Phyllosticta spinacia (S).

فطر مجهرية . تركيب اوراق الاسبانج فيلودريا . مظهره الخارجي يقع كبيرة مستطيلة تملو فصل الاوراق . تبو حنطية ألين ثم فبراه ، تسب ذبول التسج ويبله . يكلفه بالقطع الاوراق المصابة عند ظهور الوبس .

٢٣٩٠٩ - كَلْفَةُ الْاِكِيدِنَا *
Phyllosticta funiformis (S).

فطر مجهرية يصيب اوراق الاكيدنا . مظهره الخارجي يتور مستدرة قطرها نحو ٣ م . تركيب التصل حل صفحته العليا . تبو حمره ألين ثم سمراء || بكتيدات حكاكية ، قياسها نحو ٣٠٠ × ٨٠ ميكرون . شعيرات غليظة الجسم . يوردها مستطيلة قياسها نحو ٤×٩ ميكرون || يمتري الاشجار الضعيفة دون سولها ، لذلك يجر الاحتياط بالتسميد .

٢٣٨٩٤ - كَلْسْتُمُوم جَلِيدَ الْوَرَقِ

Callistemon rigida (S). Callistème rigide (F).

نوع من الكليستوم . جنيته تملو من مترين الى ثلاثة امتار . اوراقها غشبية ، جامدة ، ذرية ، تملو من ٥ الى ١٢ سم . وتعرض من ٣ الى ٤ م . || سنبالها الزهرية حمراء ألين ، قمرزية الموج || تنموها يستمر من ايار الى تموز

٢٣٨٩٥ - كَلْسْتُمُوم سِتَافِي الْوَرَقِ

Callistemon lanceolata (S).

Callistème à feuilles lancéolées (F).

نوع من الكليستوم . جنيته تملو من مترين الى ثلاثة امتار . اوراقه سنانية ، غشقة ، تملو نحو ٦ سم . وتعرض نحو ٨ م . نصلها جلدية ، حمراء ألين في اول عهدها ثم خضراء . سنبالها الزهرية الى الحمرة اللودية || تنموها يستمر من حزيران الى آب .

٢٣٨٩٦ - كَلْسْتُمُوم فَصْصَالِي الْوَرَقِ

Callistemon saligna (S).

Callistème à feuilles de saule (F).

نوع من الكليستوم . مجرته تملو نحو ستة امتار . اوراقها سنانية تملو نحو ٨ م . وتعرض نحو ٢ م . نصلها جامدة ، مبررة اللند الدهنية المطرة . سنبالها الزهرية صفراء ألين . ازهارها شديدة الصغر || تنموها يستمر من حزيران الى آب .

٢٣٨٩٧ - كَلْسْتُمُوم صَوْبَرِي الْوَرَقِ

Callistemon pinifolia (S).

Callistème à feuilles de pin (F).

نوع من الكليستوم . جنيته صغيرة اللد ، تملو نحو ٢٠٠ سم . اوراقها ابرية كأوراق الصنوبر . سنبالها الزهرية كثيفة للتجميع ، لونها الى الخضار الاصفر المالح || تنموها يستمر من حزيران الى آب .

٢٣٨٩٨ - كَلْسِيْ ، جِيْرِيْ ، جِيْصِيْ

Calcaire (F). Calcareous (E).

ما كان جصي التركيب او ما كانت تغطي على تركيبه مادة الجص .

٢٣٨٩٩ - كَلْسِيْت

Calcite (F).

Calcite, Calco-spar (E).

كربونات الكليسيوم الطبيعي للتبلور .

٢٣٩٠٠ - كَلْسِيْر

Calyca (S). Calycère (F).


جنس نباتات عشبية ، برية ، حولية او معمرة من فصيلة الكليسيديات . انواعه المعروفة قليلة البد ، منبها لطوي بعض اصقاع البلاد الحارة ، اغصانها الشبل والوبر || سوفها عفاية وبرية متكايفة الزغب . اوراقها صغيرة ، سنانية النصال الخشبية او المرطاب . ازهارها رويوية متراكبة التلات يكثر فيها الاحمر ثم الوردى فالازرق || تنموها ربيعي .

٢٣٩٠١ - كَلْسِيْرِيَات

Calyceaceae (S).

Calycéraées (F). Calycéracées (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلغلين متحدة القملات . تربتها بين المركبات والديسيديات . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة البد ، منبها بعض اصقاع البلاد الحارة



كَلْفَةُ الْاِكِيدِنَا

مدينة ، مبهمة ، قصيرة ، سوداء اللون . بويغاته بيضيه شفافة ، قياسها ٢×٥ ميكرون .

٢٣٩١٦ - كَلْفَةُ عَابِلَة ٥

Phyllosticta congesta (S). Bloch du prunier (F). Plum blotch (E).

وصم يصيب الخوخ سببه فطر مجهري يركب الاراق والابر . مظهره على الارواق بقع صغيرة تغطي النصل ، تبدو حطية ثم مبطاة واخيرا قصبية اللون || وهو على التبار بقع قروية مستديرة لونها الى السمره يكتنفها اطار مذهب || يكافح مكافحة كلفة التفاح . ومنه من فصل الفواطر غير المرتكزة على النحاس .

٢٣٩١٧ - كَلْفَن - *Galvaniser* (F). To galvanize (E).

٢٣٩١٨ - كَلْفَنَة ، كَلْفَن - *Galvanisme* (F). *Galvanism* (E).

٢٣٩١٩ - كَلْفَنِي - *Galvanique* (F). *Galvanic* (E).

٢٣٩٢٠ - كَلْكَسَة - *Putois* (F). هي ابن عرس ، اطلبه .

٢٣٩٢١ - كَلْكَمَار - *Calmar* (F). *Calamary* (E).

جنس حيوانات بحرية مقرنة من الرخويات رأسيات الارجل . انواعه المعروفة عديدة . اعطاهنا بعض مناطق البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي والهادي والهندي || اجسامها شبه اسطوانية الشكل متباينة الاحجام التي تطول من ٥٠ الى ٣٠٠ سم . ومنها نوع جبار يبلغ طوله نحو ٧٥٠ سم . جميعها عشاقية الجرامز المستطيلة ، العادمة للفواصل المنتجة بكل من الحاجز تمكثها من القش على صيدها || قوتها الاسماك والقشريات

٢٣٩٢٢ - كَلْكَمَبَلِيَّات ٥ - *Collemboles* (F). هي الكهليليات ، اطلها .

٢٣٩٢٣ - كَلْكَمَكَايَة ٥ - *Ubiquité* (F). *Ubiquity* (E).

الكلمكانية الوجود في كل مكان وفي آن واحد .

٢٣٩٢٤ - كَلْكَمِيدَة ٥ - *Chlamydospora* (F).

اسم يطلق على بورغ بعض الفطور التي تتميز بارتكازها الطولي . ولكنكيد يعتبر من البورغ المنتشر الذي لا ينتشر قبل انقضاء زمن بيانه .

٢٣٩٢٥ - كَلْكَمِيَّاس ٥ - *Callanthias* (S). *Callantias* (F).

جنس اسماك بحرية من شائكات الزعانف وفصيلة القرشيات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطاهنا بحار البلاد المعتدلة الحرارة اجسامها رشيقة تطول من ٢٢ الى ٢٨ سم . زعانفها الظهرية مستطيلة مقطوعة . زعانفها الذيلية فاقرة دقيقة الاطراف . اثوابها تزاول من الشقعة الصنانية الى الوردي . ظهورها ابيض لونا من بطونها || لحويها مأكولة جيدة الصنف .

٢٣٩٢٦ - كَلْكَمَرِين ٥ - *Calandrinia* (S).

Calandrine, *Calandrinie* (F). جنس نباتات عشبية حولية بعمره من فصيلة الربليات . انواعه قليلة جميعها تزيينية اعطاهنا البلاد الامريكية الشمالية

٢٣٩١٥ - كَلْفَةُ النِّعْج ٥ ، فِيلُوسْتِيكَ نِيكُولِيَّانَا ٥

Phyllosticta nicotianae (S).

فطر مجهري من الصنديات ، يكتنفاته غصية التجميع تنشأ تحت ادمة النصل ثم ترق الى السطح . مظهر واضح الارتكاز شفافية بصبغة التركيب ، قصيرة القد ، شفافة || يركب اوراق النعج ليوم من النصل يقع مستديرة لاقصية وراوح قطرها من ١ الى ١٠ م . تبدو صنانية اللون وتستقر على الحطلي الاسمر || اغمرار زهيدة لا تستوجب العناية .

٢٣٩١٦ - كَلْفَةُ النِّعْج ٥

Phyllosticta solitaria (S). Bloch du pommier (F). Apple blotch (E).

فطر مجهري يصيب التفاح في اوراقه وانفاده ونماره . مظهر الخارجي على الارواق بقع صغيرة عديدة مقرنة الزوايا ، غبراء او مراء اللون ، تركيب النصل فتقفي على نسجه الادمية || وهو على الانفاد قروح مستديرة او مستطيلة طولها نحو ٣ م . لونها الى الجلوة تركب البعد كالتسبب جفاته وانضداد بقرته || وهو على التبار بقع لاقصية الشكل والحجم ، لونها الى السمره يكتنفها اطار اخر ، تتسع مع حجم الشرة فيبلغ قطرها نحو ١٠ م . || يكافح باستعمال سائل يورده الهلول ١٠٠٪ حيث تنضغ الاشجار على ثلاث مرات ، الاول بعد سقوط التويجات الزهرية بامسويين ، والثانية بعد الاول بثلاثة اسابيع ، والثالثة بعد الثانية بثلاثة اسابيع || ومنهم من تستعمل سائل يورده الحامو ٤٠٪ من سلفات النحاس مع ٠.٨٪ من الكلس .

٢٣٩١٧ - كَلْفَةُ النِّعْج ٥

Phyllosticta prunicola (S).

وصم يصيب الخوخ والاياص سببه فطر مجهري يركب الارواق فيطبا ويقودها الى الاحمال الباكز || مظهره الخارجي يثور مستديرة او بيضيه الشكل تملو النصل على صفحة العليا . تبدو حطية اللون ، رمدا المحور ، بنفسية الاطار || يظهر في اوائل آب ويصل الارواق في اوائل تشرين .

٢٣٩١٣ - كَلْفَةُ الزَيْتُون ٥ - *Phyllosticta oleae* (S).

فطر مجهري يمتري الزيتون بارواقه الفتية فيؤذيها بعض الشيء || مظهره الخارجي يثور مستديرة قطرها نحو ١ م . تركب النصل على صفحة العليا . تبدو حطية اللون م غبراء يحيطها اطار اسمر || يكتنفاته حكايزة الشكل ، شفافة ، قياسها ٣×٣.٥ ميكرون || لا يستوجب المكافحة نظرا لقله اذاه .

٢٣٩١٤ - كَلْفَةُ السِّيَم ٥

Phyllosticta antirrhini (S).

فطر مجهري يصيب السيم في اوراقه وفروعه . مظهره الخارجي ، على الارواق ، يثور مستديرة قطرها من ١ الى ٢ م . لونها الى الصهية يكتنفها اطار اخر || وهو على الفروع يقع قروية لونها الى الجلوة السمره || يكتنفاته غليظة ، لاقصية التجميع ، قياسها نحو ١٠٠ ميكرون ، بويغاته مستطيلة قياسها ٢×٥ ميكرون .

٢٣٩١٥ - كَلْفَةُ الصَّكْبِيَّات ٥

Phyllosticta brassicae (S).

فطر مجهري يصيب نباتات الفصيلة الصليبية . مظهره الخارجي يقع مستديرة قطرها نحو ٨ م . تركب النصل الارواق ، تبدو فاقمة الخضار ثم غبراء اللون || يكتنفاته



كَلْفَةُ النِّعْج



كَلْفَةُ الخُوخ



كَلْفَةُ عَابِلَة



كَلْكَمِيَّاس



كلندرو

٢٠ مهدا المناطق الاستوائية . معظما يري وبعضها
تزييني . سقفا عشبية أو ليفية . اورانها متعاقبة ،
بيضية الشكل . نصلها جامد الصفحة المائلة البشرة .
انزهارها قلبي التجميع ، تاجي الارتكاز . انزهارها رباعية
التركيب بها البيض والصفير والحمر . ثمارها جرداء رباعية
الفلق || اورانها تنشق القروح وتندمل الجروح .

Calanus (S).

Calane (F). Calanus (E).

دوبية بحرية من القشريات مجذافيات الارجل وفضيلة
الكلنوسيات || جسمها صغير الحجم ، شبه مخروطي الشكل
مستعرض الضعراس ، وسيد العين ، عديم الحواف ||
تنشق حل الطوح . جماعها وافر البعد .

Calanidae (S).

Calanidés (F). Calanidae (E).

فضيلة دوبيات مائية من القشريات مجذافيات الارجل .
اجناسها قليلة العدد اما انواعها كثيرة ، معظما بحري
يمش في مختلف بحار العالم وبعضها بحري يعيش في
الانهر والبحيرات والمخلفات .

٢٣٩٣٦ - كلوة ، كلية ، حكر

Rein (F). Kidney (E).

عضو في الجسم كلوي الشكل يفرز البول . هما كلتان
أو سقوان مركزهما من جانبي السلسلة الفقرية .

٢٣٩٣٧ - كلوة الماء ، لاجم الضفدع

Hydrocharis morsus-ranae (S). Hydrocharis, Hydro-
charidae, Morrène, Mors de grenouille (F). Frog-bit,
Frogs-bit (E). Echter Froschbiss (D). Favagello di
chiana, Morsò di rana (I).

نبات عشبي يري مائي معمر وسيد الجنس والنوع من فصيلة
كلويات الماء . يعيش في المياه الرافدة وتزين به الاحراس .
سوقه سلبية متقاربة المقد . جلوهه ضمية التجميع تنشب
من العقد . اوراته مستطيلة الاعتاق كلوية الشكل تطول
وتعرض من ٤ الى ٥ سم . نصلها سميك الصفحة اغضر
اللون . انزهاره ثلاثية الفلعل والبتلات البيض || انزهاره
يستمر من حزيران الى آب .

Chlore (F). Chlorine (E).

غاز سام اقل من الهواء لونه ال احمار الزهني . رائحته
محرشة تثير السعال . وزنه الاتيني ٣٥,٤٦ رنزه (كل
جرامه || يوجد في الطبيعة مختلطا بغيره من العناصر
المتطرفة اخصها ملح الطعام (كلوريد الصوديوم) وهو
يتميز بجمه الشديد الى الاتحاد بالفلزات والالانزات
يحتوي من المظهورات المشهورة ويعتدل في ظهوره سياد
الشرب . كما انه يستخدم في اغراض في احمها تبيض
للمسويات القطنية والكتانية وصناعة قنابل الفلزات السامة .

Chlorops (S).

٢٣٩٣٩ - كلوروس

ذباب اصفر اللون يعرف بغيره العين ، راجع خرياه .

Chloroplasta

٢٣٩٤٠ - كلوروبلاست

جسيمات الخلايا النباتية الملونة بالغضيب والتي يرتكز عليها
التشغيل الخفوي .

Chloroforme (F).

Chloroform (E).

سائل عادم اللون اثره الرائحة ينتج عن الكلور مع الكحول
يعتدل في الطب كينج يندمل الاصباح .

والجنينية . اورانها متعاقبة . انزهارها جملة الشكل ،
زاهية الالوان ، لاثامية التجميع والارتكاز || اعرف
انواعه واشهرها ما يلي .

٢٣٩٣٧ - كلندين خيمية

Calandrinia umbellata (S). Calandrinia en ombella (F).

جملة تزيينية معمرة تملو نحو ٤٠ سم . ساقها فناء جبوية
اللون . فروعها فاشية . اورانها صنية شعبة تطول نحو
٢ سم . نصلها خلي البشرة حل صفحته . انزهارها خيمية
التجميع ، تاجية الارتكاز ، كبيرة المدد ، صغيرة
القد ، حراء اللون ، بنفسجية الموالج || انزهارها يستمر
من تموز الى ايلول .

٢٣٩٣٨ - كلندين زخيفية

Calandrinia discolor (S). Calandrinia discolor, C. elegante (F).

جملة تزيينية معمرة تملو نحو ٨٠ سم . ساقها متصبية قراء .
اورانها ملطية مقطعية . نصلها بحري الصفحة العليا ،
احمر السفلي . انزهارها عنقودية التجميع ، كبيرة القد ، قطرها
يرواح من ٤ الى ٦ سم . لونها ال البنفسجي الازرق الموالج .
انزهارها يستمر من حزيران الى ايلول .

٢٣٩٣٩ - كلندين قاحخرة

Calandrinia spectabilis (S). Calandrinia remarquable (F).

عشبة تزيينية حولية تملو نحو ٩٠ سم . ساقها متصبية
قراء . اورانها مينية الشكل تطول من ٣ الى ٤ سم .
نصلها ملطية مقطعية . انزهارها صفحية . انزهارها عنقودية
التجميع ، كبيرة القد ، قطرها يراوح من ٥ الى ٧ سم .
لونها ال الابيضوي الموشع والمضلع بالاسد || انزهارها
يستمر من تموز الى ايلول .

٢٣٩٤٠ - كلندين كبيرة الزهر

Calandrinia grandiflora (S). Calandrinia à grandes fleurs (F).

جملة تزيينية معمرة تملو نحو ١٠٠ سم . ساقها متصبية
قراء . اورانها بيضية ذرية تطول من ١٢ الى ٢٠ سم .
وتعريض نحو ٨ سم . نصلها اغضر اللون ، سميك الصفحة .
انزهارها كبيرة القد لورية التجميع ، محورية الارتكاز ،
قطرها يراوح من ٤ الى ٦ سم . لونها ال الوردي الموشع
بالاصفر والاسود || انزهارها يستمر من حزيران الى
تشرين الاول .

٢٣٩٤١ - كلندين مئزي

Calandrinia menziesii (S). Calandrinia de Menzies (F).

عشبة تزيينية حولية منبسطة . ساقها تطول من ٢٠ الى
٤٠ سم . اورانها الغل ملطية الشكل تطول نحو ٨ سم .
اورانها العليا سانية شعبة . جميعها مائلة النصل الاغضر .
انزهارها عنقودية التجميع ، محورية الارتكاز وتاجية ،
صغيرة القد ، ارجوانية اللون || انزهارها يستمر من
حزيران الى تموز .

٢٣٩٤٢ - كلندينليات

Calandriniales (F).

Calandrinia (E).

سبط من فصيلة الرحليات يشمل بعض الاجناس والانواع
نواياه عشبية أو مجالية ونباتية . معظما امريكي المنبت .
انزهارها خشوية . ثمارها جرداء ثلاثية الفلق .

٢٣٩٤٣ - كلنكزة *

Kalanchoe (F).

Kalanchoe (E).

جنس نباتات طيبة معمرة من فصيلة المخلدات . انواعه نحو



كلوة الماء

كيرثان. زباناها صولجانيان. جوشنبا الى الطحلة الرصاصية الزرقاء المواج. يطلها اصغر الثوب اسمر المواج || رواشتها، هته الشقين، الى الخشنى الاسمر الاسفع المواج يملو في الزوج الخلفى حثار صقيل اخبر وتنوعات حنطية تدير كزواك نديلية الشكل || لها جيلان في الجيل. تظهر فراشة الجبل الاول في مطلع ليسان وتظهر فراشة الجبل الثاني في تموز. تماثل بعد ظهورها باربعة اسابيع وتمتص المكن ميحاديا على الصفحات السفلى من لصل المائل || السفة تطول نحو ١٤ سم. جسمها مستطيل الرطب، مستدق القدم والمخبر، كسني اللون يملو خطان جانبيين اصفران وعشرة اطواق جزوية. اما الطوق الصدري الاول فأسود كالأرأس. ملها ورواجها الى السمة || طور الاكمال الذي يستمر في الجبل الاول نحو ١٥ يوما وينقضي مطلقا بانفان الثبات، يستمر في الجبل الثاني نحو ٣٠ اسبوعا.

Kaloula (S).

٢٣٩٥٠ - كلولة

Kaloula (F). Kaloula (E).

جنس صفاد قازية من فصيلة الرانيات. انواعها المعروفة خمسة. موطنها الهند والصين وبالايزية والفلبين || اجسادها مستدلة القد أو صغيرة. تتميز باصابعها الممددة المجهزة بمحابس طرفية. حطابها قليل الانبساط عند حسي اولائل الزم الثاني من الاصابع. انواعها السائدة الى السمة الزيتية يملوها تبغيع اشهب اسمر ورقشة حنطية تمتد من مؤخر الرؤوس الى اطراف القوائم.

Collomia (S).

٢٣٩٥١ - كلومية

Collomia (F). Collomia, Queen Ann's tumbler (E).

Blumenschleimame (D). Collomia (I).

جنس نباتات عشبية حولية من فصيلة القبيبات. انواعها قليلة، سيقانها وارلقها زباب لينة. ازهارها رويسية كثيفة التجميع. يستخرج من زورها غراء نباتي يدخل في عدة تركيب || احرف انواعها واخبرها ما يلي.

٢٣٩٥٢ - كلومية أزجوانية

Collomia coccinea (S). Collomia écarlate (F).

عشبة زينة سبروتية تملو نحو ٥٠ سم. ساقها قليلة الفروع، زباب اللحاء. اوراقها بيضبة مستطيلة، نصلها ثلاثي او رباعي التفرع القدي. رويستها الزهرية مستدلة القد. ازهارها حر الابواق صفر الانابيب || ازهارها يستمر من حزيران الى آب.

٢٣٩٥٣ - كلومية كبيرة الزهر

Collomia grandiflora (S). Collomia à grandes fleurs (F).

عشبة زينة سبروتية تملو من ٢٠ الى ٧٠ سم. ساقها فراء. اوراقها سنانة ضيقة تطول من ٤ الى ٥ سم. وتعرض من ٥ الى ١٠ م. نصلها غلي البشرة. رويستها الزهرية كبيرة القد. ازهارها مستطيلة، كوروسها مسنة الحافة، توتيجاتها تظهر صفراء اللون ثم تنصرف مع الادراك، الى الحمرة || ازهارها يستمر من حزيران الى تشرين.

Hydrocharidae (S). ٢٣٩٥٤ - كلوريات الماء

Hydrocharidae (F). Hydrocharidae (E).

فصيلة نباتات مائية من صيديات الفلقة. اجسادها وانواعها عديدة. احرف اجنسها الاقطنان والطقون وكلورة الماء ووش الماء.

٢٣٩٤٧ - كلوريدات، هيدروكلورات

Chlorhydrate (F). Hydrochlorate (E).

هو ملح الخافض الكلوريدينيكي.

Chlorides (S).

٢٣٩٤٣ - كلوريد

Chloride (F).

جنس شحات شارة من فصيلة الزمفقيات. انواعها ١٠ جميعها متوسطة القد خضبا الجسم. مستطيلة القرن الاستشارية الشارية الفواصل. اوانها زاجية. احمادها عتقدة يمتزجها تجليج وتليج. ريقاتها خاضلة أو نائمة تركب بعض النباتات من مختلف الفصائل.

٢٣٩٤٤ - كلوريد البوتاسيوم، كلوريد البوتاس

Chlorure de potassium (F). Chloride of potassium (E).

سماد بوتاسي يحوي من ٤٦ الى ٥٠ ٪ من البوتاس الصريف وهو ملح ابيض اللون يتميز بسرعة ذوبانه في الماء ويهبط انفماله وتركيبه في التربة.

٢٣٩٤٥ - كلوريد الصوديوم، كلوريد الصوديوم

Chlorure de sodium (F). Chloride of sodium (E).

هو ملح الطعام المعروف.

Chlorelle (F).

٢٣٩٤٦ - كلوريل

جنس نباتات مائية من الخفيات الخضر وصيدات الخليات المهيبرات. ميكالها كروي الشكل، قلعها نحو ٨ ميكرون. تمش في المياه العذبة جماعات واقر المبد على المدارات والجذريات وغيرها || وهي وافرة المواد الغذائية اغصها البروتينات والفولويد والدمم والفيتامينات والكثير من طفيف العناصر || تكاثرها الجنسي في المحيط الملائم يعطي اجدد النتائج. نتاجها الجاف واقر المواد الغذائية القيمة.

Clusiaceae (S).

٢٣٩٤٧ - كلوزيات

Clusiaceae, Guttifères (F). Clusiaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة الثمالات سفلية الاسمية. اجسادها وانواعها عديدة جميعا اشجار وشجيرات سوقها منصبة أو عارشة. اوراقها ابيدة جامدة النصل. ازهارها عتقودية التجميع، محورية الارتكاز أو تاجية. ثمارها نورية، قشرها جلدية، لبها زفر المصارة الراتنجية الصفراء اللون التي تصعب بلية بعد جفافها.

٢٣٩٤٨ - كلوزية

Clusia (S). Clusia, Clusier (F). Clusiaceae (E).

جنس نباتات عارشة مستقلة من فصيلة الكلوزيات. انواعها قليلة، سيقانها تطول نحو ١٠ امتار تركب الاشجار الحرجية تنفضي عليها || يستخرج من سوقها حليب اصفر اللون، دبق للمادة الراتنجية، يستعمل في تطبيق جروح الحيوانات اغصها الخليل والبقر.

٢٣٩٤٩ - كلوفريس الموشج

Calliphrys rubi (S). Calliphrys des ronces (F).

Calliphrys rubi (E).

حشرة من فصيلة القنليات وربة حوشليات الاجنحة. موطنها بعض اصقاع البلاد المعتدلة الحرارة من العالم القديم. فراشتها جارية قوتها رقيق الازهار. سرقها تمش على الموج والوزاك والزان || جسمها صغير القد يطول نحو ١٠ م. يسطحها نحو ٢٨ م. راسها معتدل الحجم. عينها



كلوريد



كلوفريس الموشج

التجميع ، محورية الارتكاز أو تاجية . ثمارها عنبية لا مأكولة لأنها إلى الحمرة البنفسجية || أشهر أنواعها ما يلي .

٢٣٩٦٥ - كَلِكْرِبَه أَرْجَوَانِيَه

Callicarpa purpurea (S). *Callicarpa pourpre* (F).
جنية تزيينية زهرة مهدبا اليابان . تملو نحو ١٠٠ سم .
أوراقها بيضيه الشكل طول نحو ٧ سم . نصلها انخسر
الصفحة العليا ، انزب السفلى . عناقيدها الزهرية رطلة ،
انزهارها أرجوانية اللون زاحية || انزهارها يستمر طوال
شهر تموز .

٢٣٩٦٦ - كَلِكْرِبَه أَمْرِيكِيَه

Callicarpa americana (S). *Callicarpa d'Amérique* (F).
جنية تزيينية زهرة مهدبا أمريكية الشمالية . تملو من ١٠٠
إلى ٢٠٠ سم . ساقها فراء . أوراقها مستطيلة الاضلاع ،
نصلها خلى البشرة على صفحتيه . انزهارها تاجية . بنفسجية
اللون رطلة المتنايد || انزهارها يستمر من حزيران إلى
تموز .

٢٣٩٦٧ - كَلِكْرِبَه صِينِيَه

Callicarpa giraldiana (S). *Callicarpa de Chine, C. de Girald* (F).
جنية تزيينية جادة مهدبا الصين . تملو من ١٠٠ إلى
٢٠٠ سم . ساقها فراء ناه . أوراقها طول من ٥ إلى
١٠ سم . نصلها انزب الصفحة السفلى زغبه نجسي التركيب .
انزهارها تاجية كثيفة التجميع ودية اللون || انزهارها
يستمر طوال شهر تموز .

٢٣٩٦٨ - كَلِكْرِبَه يَابَانِيَه

Callicarpa japonica (S). *Callicarpa du Japon* (F).
جنية تزيينية سبروتيه مهدبا اليابان . تملو نحو ١٠٠ سم .
أوراقها منقطة طول من ١٠ إلى ١٥ سم . وتعرض من
٥ إلى ٦ سم . نصلها لاص الصفحة العليا ، انزب السفلى ،
متباعد التستين المشاري . عناقيدها الزهرية صغيرة القد .
انزهارها ودية اللون || انزهارها يستمر من حزيران إلى
تموز .

٢٣٩٦٩ - كَلِكَنْتُس

Calycanthus (S).
Calycanthe (F). *Alapica* (E). *Kelchblume* (D).
Calicanto (I).
جنس جنات تزيينية عطرية من فصيلة الكليكانتوسيات .
أنواعه ستة . سطوها منتصبه تملو من ١٥٠ إلى ٢٥٠ سم .
أوراقها كاملة متعابلة . انزهارها فردية أو محورية أو هامة
الارتكاز ، جميلة الشكل ، جودية اللون ، فليحة العرف
الطرقي الشبيه باتفاح والشام .

٢٣٩٧٠ - كَلِكَنْتُوسِيَات

Calycanthaceae (S). *Calycanthaceae* (F). *Calycanthaceae* (E).
فصيلة نباتية من ذوات المفلتين ، اجناسها وأزهارها عديدة .
نباتاتها اشجار ونباتات . سطوها يفردها سطحة . أوراقها
متعابلة . انزهارها جميلة الشكل ، عطرية العرف .

٢٣٩٧١ - كَلِيمِنِيَه ، كَلِيمِنِت

Clymenia (S). *Clymenie* (F). *Clymenia* (E).
جنس حيوانات من الرضويات أرشبات الاثيل رباعيات
الحياض وفصيلة الثنائياتيات . أنواعها المروفة نحو ٤٠
جميعها من متحشرات الخفية اللبيفية || اصدها قرصية
الشكل ، محتلة القد . اخدها القوي يستمر من القرفة
إلى العقب .

٢٣٩٥٥ - كَلْتِي . Cosses, Grandes tectrices (F).

من ريش جناح الطائر ما يكو قوائد الاطيار . والكل
قسان صغيرة وكبيرة . الصغيرة تلتف الكبيرة والكبيرة
يكنو الاطيار .

٢٣٩٥٦ - كَلْتِيَه

Reln (F).
هي الكوة ، اطلبا .

٢٣٩٥٧ - كَلْتِيرِيَش *

Callichrix (S).
Calitriche (F).
جلس قروء امريكية من فصيلة البسويات . انواعه ١٠
موطبا حوض الامازون . اجسامها رشيقة . رورها
مستديرة . قوائمها متصلة الطول . اذناها كاسية مملقة لا
اخافة . اثنائها قصيرة الشعر المتباين الالوان || تألف
الاسراج والذبابات . مرتها الاشجار تنقل بينها نخفة الطير .
قوتها التار والخشرات والمصابير .

٢٣٩٥٨ - كَلِيْسْ أَرْخَب

Clytus poilu (F).
هو الصملول الانزب ، اطلبه .

٢٣٩٥٩ - كَلِيْسْ أَمِيْف

Clytus étroit (F).
هو الصملول الاخيف ، اطلبه .

٢٣٩٦٠ - كَلِيْمُوسِيَب

Clitocybe
جنس فلور مؤدية من الفاريفوريات مركب بمشبه القدي
الشكل اربوات واساخ وجلور بعض النباتات الزهرية
منها الموز وقائعه والكريمة والكنيا والكرورينه وقت مركب
ايضا ، في ظروف خاصة ، التفاع والمشش والتشش
والجهميرة والياسمين || مشبه غزر المادة وافر القند
المتشبه . يتركز بين الماء والشكر او بين الجردة
والخشب فينبط الارضية والتسج على اختلافات ثم يقضي على
النباتات السني || يكالنج بقتلح الاشجار الموصولة ويظهر
التربة بالكلس الحارن .

٢٣٩٦١ - كَلِيَجَه *

Caliga (S).
Calige (F). *Calige* (E).
جنس دوبيات بحرية من القشريات الدنيا وفصيلة
الكليجات . انواعها المروفة قليلة العدد . اجسامها
صغيرة ، وحيدة العين ، عادمة الحاف . تستقل على
الاملاك .

٢٣٩٦٢ - كَلِيَجِيَات *

Caligidae (S).
Caligides (F). *Caligidae* (E).
فصيلة دوبيات بحرية من القشريات الدنيا مجذباتات
الارجل . اجسامها وأزهارها عديدة . جميعها طفيلية تعيش
على مختلف انواع الاملاك اغصها القادسيات .

٢٣٩٦٣ - كَلِيَش

Callche (F).
هو ملح الشيل كما يستخرج من المناجم وهو يفسد بعد
استصلاحه ويكثر به نترات الشيل او نترات الصودا الطبيعي

٢٣٩٦٤ - كَلِكْرِبَه *

Calliropa (S).
Calliropa (F). *Besuty-berry*, *Mulberry* (E).
Schöenfruchte (D). *Calliropa* (I).
جنس نباتات جنية معمرة من فصيلة الساجيات . انواعها
قلية معظمها تزييني . أوراقها متعابلة احليجية ، مستطيلة ،
ممتدة الحافة ، غدية الصفحة السفلى . انزهارها عتقودية



كَلِكْرِبَه



كَلِكِبَه



كَلِكْرِبَه



كَلِكَنْتُس



كَلِيَبَه

٢٣٩٨١ - كَمْءُ اسْوَد * ، كُشْنُج

Tuber melanosporum (S). Truffe noire, T. de Périgord (F). Black truffle, French truffle (E). Echte Trüffel, Schwarze Trüffel (D). Tartufo nero (I).
نوع من الكمء المأكول الجيد الصنف . ذرته كبيرة
القد حجمها قدر البياض الصغيرة . ثوبها بارزة لونها الى
الصعبة . لباها اسود اللون اسفل المواج عند الادراك .
تدرك في الخريف .

٢٣٩٨٢ - كَمْء شَتَوِي * ، بَسَات الزَعْد

Tuber brumale, T. hiemale (S). Truffe d'hiver, T. hiemale (F). Winter truffle (E). Französische Trüffel (D). Tartufo brumale (I).
نوع من الكمء المأكول المتوسط الصنف . ذرته مستديرة
حجمها حجم الجوزة . ثوبها الى السرة السوداء . لباها
احمر اللون يضل بتهكة خاصة . تدرك في الشتاء .

٢٣٩٨٣ - كَمَاء * Rabastier (F).

جاسع الكمء .

٢٣٩٨٤ - كَمَاء * Truffe (F). Truffle (E).

واحدة الكمء .

٢٣٩٨٥ - كَمَاء المَاء * Macre (F).

في المكر ، نبات من الاندريات ، اطليه .

٢٣٩٨٦ - كَمُح * Préfloraison (F).

نشور أجزاء وأعضاء الزهرة داخل الزهرة اي البرعمة الزهرية .

٢٣٩٨٧ - كَمُحَاء * Frein (F).

في الكباشه ، راجها .

٢٣٩٨٨ - كَمُحَاخ * Pampination (F).

الكح نخوة برام الكرمه وانتشارها .

٢٣٩٨٩ - كَمُحَاك * Protérante (F).

كلخ م كاخة . نمت تعريفي يطلق على كل نبات يزهر
قبل ان يورق .

٢٣٩٩٠ - كَمُحَاد زَيْوُس * Germandrée officinale (F).

هو الطوقرين الحزني ويدي أيضاً غامادريوس .

٢٣٩٩١ - كِمَاس * Kemas (S).

Céma (F). Kemas (E).

جنس حيوانات لبونة عاشية بحيرة من فصيلة الابلات .
انواعه المعروفة اربعة موطنها يمتد من الهند الى الصين
ونشورية . تألف الحصاب والجبال من ارتفاع ١٠٠٠ م .
حتى ٢٧٠٠ م . من سطح البحر . ملجئها احيائي جماعي .
إيجالها قليلة العدد الذي يراوح من ٥ الى ٩ انفار ||
اجسامها قريبة الشبه باجسام الظفائر كما وانها تشبه الحزري .
قرونها صغيرة متناوبة الحيد ، مستقلة الاطراف المنحرفة
الى الوراء . رؤوسها صغيرة ذلقة الاعظام . اعناقها
مستطيلة . قوائمها شديدة النشط . اثارها تختلف مع الانواع
تكثر فيها السرة المتناوبة للماجات . هجوع انثاها ثنائية
الاعلاف . يحبل الاثنى يوم نحو ستة اشهر تصعب في
تامه يهفورا واحداً || اعرف انواعه واشهرها كاس فورال .

٢٣٩٩٢ - كَلْبُوب * Calliopes (S).

Calliopo (F). Calliopo (E).

طائر من الجاليم وفصيلة الشروريات . موطنه بعض
المناطق الشرقية من القارة الاسيوية . ملجئه احيائي زبتي
بامتياز ابن الطعاق حيث يتجمع الى اسراب وافرة العدد .
يألف البراري والخراج . قوته الحشرات الصغيرة والبلور
البرية || جسمه صغير القد ، قريب الشبه بالبع ،
طوله نحو ١٦ سم . ثوبه الى السرة الزرقية المتفاوتة
الماجات . رأسه وجناحه اعلى من رذاه . زور اخر .
منقاده غروطي الشكل . ذنبه مستدل الجرم ، مقطوم
الطرف || يلدن عشه على ارتفاع ٢٥٠ او ٣٠٠ سم .
من سطح الارض . الاثنى تحضن بمناوبة الذكر من ٤
الى ٥ بيضات .

٢٣٩٩٣ - كَلْبُوبَة * Cléome (F).

في النفرة ، اطليا .

٢٣٩٩٤ - كَلْبُوبِيم * Cléome (F).

في السبكة الصياد ، اطليا .

٢٣٩٩٥ - كَم * Buttage (F). Raising, Mounding (E).

الكم ويدي لتخفيف هو جمع التراب عند سوق النبات .
الغاية منه دم الساق وسحبها لانتفاخ الجذيرات وإيماد المَاء
فيها وزيادة تعريض التربة الى اشعة الشمس ، الخ .

٢٣٩٩٦ - كَم * ، كَم * Périanthe (F). Perianth (E).

هو غلاف الزهرة اي جاع الكأس والتويج . وقد سمي كما
لانه يستر ما ينشق عنه . ج اكمام وكلم واكة .

٢٣٩٩٧ - كَم * Tuber (S). Truffe (F). Truffle (E).

الواحدة كَأَة والمثنى كَأَاتان ولجمع كَم وأكوه وكأت .
جنس طور ذرية من الزقيات وفصيلة الكمثيات . تنبت
وتتكاثر تحت الارض فتتغصن . غلافها جلدي التسج
قوولي التركيب يحضن العدة انتاسلية البوية . لباها
سودي التركيب جامد المادة || انواعه عديدة مختلفة
الاشكال والاحجام والالوان اشهرها ما يتبع .

٢٣٩٩٨ - كَم * أَيْسِي * Tuber hiemale, T. album (S). Truffe blanche (F).

White truffle, False truffle (E). Weiss Trüffel (D).
Tartufo bianco, T. del Piemonte (I).
نوع من الكمء المأكول المادي الصنف . ذرته متوسطة
القد منخفضة الشكل . لباها ابيض اللون مسكي العرف .
تدرك في الخريف .

٢٣٩٩٩ - كَم * أَحْمَر * Tuber rufum (S). Truffe rouge (F). Red truffle (E).

Rote Trüffel (D). Tartufo rosso (I).
نوع من الكمء المأكول الفاخر الصنف . ذرته مستديرة
مغطوية القامة . ثوبها ناشرة لونها الى الجوزي الاسمر .
لباها اخر اللون مستحب الطعم ، تدرك في اواخر الخريف .

٢٣٩٨٠ - كَم * أَرْمَك * Tuber magnatum (S). Truffe magnate, T. grise (F).

Gray truffle (E). Lauch Trüffel (D). Tartufo bigio (I).
نوع من الكمء المأكول المادي الصنف . ذرته بيضية
الشكل مفلحمة . ثوبها مستديرة مبطلة رمادية اللون .
لباها اغبر . تدرك في الخريف .



كَلْبُوب



كَمْء اخر



كَمْء ارده



كَمْء اسود



كَمْء شَتَوِي



كاشير



كالا



كالية البر



كالية فعبية

كالية المروج



كيدود

٢٣٩٩٩ - كَمَالِيَّةُ الْبَرِّ *

Alchemilla arvensis (S). *Alchemille des champs*, *Perce-pierre des champs* (F). *Break-stone*, *Colic-wort*, *Persley plant* (E). *Feldsinn*, *Steinbrech* (D). *Spacca pidra*, *Petricolo* (I).

نوع من الكمالية تكثر في المراعي الجبلية .

٢٤٠٠٠ - كَمَالِيَّةُ الْمُرُوجِ * ، كَمَالِيَّةُ مُتَبَدِّلَةٌ ، رَجُلُ الْبَقْوَةِ

Alchemilla vulgaris (S). *Alchemilla commune*, *Mantelet de dame*, *Pied de lion*, *Porte rosée* (F). *Great sanicle*, *Lady's mantle*, *Lion's foot* (E). *Löwenfuß*, *Mantelsinn*, *Sinn* (D). *Alchemilla comuna*, *Ventagina* (I).

نوع من الكمالية تكثر في المروج . اورثاقها طيبة شائعة موزرة .

٢٤٠٠١ - كَمَالِيَّةُ فَبِيَّةِ *

Alchemilla argentea (S). *Alchemilla argentea*, *Saëne* (F). *Alpine lady's mantle* (E). *Alpensinn*, *Alpenfrauenmantel* (D). *Alchemilla alpina* (I).

نوع من الكمالية المصرة تكثر في أسراج الجبال العالية ، اورثاقها خلية البشرة فضية اللون .

٢٤٠٠٢ - كَمَامُ (F). HEADSTALL, CURS (E). كَمَامُ

ما يكس به قم الحيون .

٢٤٠٠٣ - كِمَامَكَة ، مِفْطَمِيَّةٌ

Mullière, *Muselière* (F). *Muzzle* (E).

أداة تلتف في الحيوان تحته من الرضاعة والأكل والعض .

٢٤٠٠٤ - كَمْبَرِي (F). CAMBRIAN (E). كَمْبَرِي

اسم يطلق على الحفوة الأولى من الأياح القديمة . يقال الصر الكمبري والحفوة الكمبرية ، وهي تتميز باحترابها على أقدم صخر الكرة الأرضية .

٢٤٠٠٥ - كَمْبُودُ * (S). CAMPODEA (F). CAMPODEA (E).

جنس حشرات دامت من فصيلة الكمبوديات ورتبة لآخيات الحثك . أنواعها المعروفة نحو ٣٠ منتشرة في معظم مناطق البلاد الحارة || أجسامها صغيرة القد ، مستطيلة الشكل ، معتدلة التبييط ، مبررة الحذب الثقيل الناعم ، تطول من ٦ إلى ١٠ سم . ألوانها أبيض البياض القبيبي . رؤوسها شبه مكورة . شاكها لاحتة . قربها الاستثنائية شديدة . عيونها شديدة الصغر . صدورها ثلاثية الحلقات . بطونها عشارية الشكل ، قصبة ، أي سرعة السحب . قوائمها نحلة . أرساغها ثنائية العقل . أسراكها دقيقة مستطيلة || يكثر وجودها تحت الحجارة وفي المواقع الرطبة . قوتها المواد النباتية المنحلة .

٢٤٠٠٦ - كَمْبُودِيَّات (S). CAMPODEIDAE (F). CAMPODEIDAE (E).

فصيلة حشرات من رتبة لآخيات الحثك . أجناسها وأنواعها المعروفة متوسطة العدد ، منتشرة في معظم مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || أجسامها صغيرة ، قصبة ، يضاء اللون . عيونها شديدة الصغر . حلقاها الصدرية الأولى أصغر من الثانية والثالثة . بطونها عشارية الشكل . قوائمها الأولى مجهزة بزرزك حوصلية تنفسي . سكبها الثانية والسابعة مجهزة بمزبد صغيرة . ألوانها الترسية ثنائية الأسلاك || أمرف أجناسها الكمبود .

٢٣٩٩٢ - كِمَاسُ غُرُوكَل * (S). KEMAS GORAL (F).

نوع من الكباس . موطنه يمتد من كمشير إلى برمانية وأسام . يأنف الوصر للمواقع الكثيرة الضخور . يسرح من الحجر إلى نحو الساعة الثامنة ومن العصر إلى فحة الليل || جسمه ربعة بطول نحو ١٣٥ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ١٠ سم . ارتفاعه نحو ٨٠ سم . وزنه نحو ٧٥ كيلو . قوته بطول نحو ١٨ سم . عند الذكر وهو ١٤ سم . عند الأنثى . رأسه صغير الحجم ، ذلق الحظ . عيناه كيرتان مكشطان ومطقتان بخار أصفر . أذناه صغيرتان مستطيلتان الشكل . قوائمها شديدة النطف . ثوبه إلى الصرة الحمراء المزاج يمتد في الرأس والظهر ويصل إلى تدريجياً إلى الفخمة في الصدر والبطن || أجهل بعد تمة الفغار ، ذكر مالح وأربع اثاث وأربعة شواهد .

٢٣٩٩٣ - كَمَاسِيَا (F). CAMASSIA (F).

هي الكش من الزنايق ، اطبل .

٢٣٩٩٤ - كَمَاسُ * (S). POLYCARPaea (S). POLYCARPÉE (F).

جنس نباتات عشبية حولية وبسرة من فصيلة النيبانيات . أنواعها المعروفة عديدة منها معظم الأصناف الحارة من العالم القديم || سطها مستطيلة متعابدة القنوع . اورثاقها متعابدة رحيمة النصال . أزهارها خماسية البتلات واللبال الضيقة الحادة الأطراف . لونها إلى البياض الأخضر المزاج .

٢٣٩٩٥ - كَمَاسُشِير * (S). ATHAMANTS MACEDONICA (S). ATHAMANTE, Ache des rochers, Persil de Macédoine (F). MACEDONIAN PARSLEY (E). MACEDONIC PETERSILL (D). PREZEMOLO DI MACEDONIA (I).

نبات عشبي بري معمر مبلول من فصيلة الحميات . اورثاقه مفرصة وبسرة نصلها على البشرة على صفحتها . أزهارها صيدانية وردية اللون . يقال أنه طيب يستعمل في معالجة العوارض المعوية .

٢٣٩٩٦ - كَمَافِيْطُوس * (S). KAMAFITUS (F).

قال الانطاكي « هو الحامياطس يعني صنوبر الارض لبنت كمي » العالم الصغير في تقتيل اورثاقه وانتلاشها بالوطوية وزيارها له زهر أصفر يختلف حياً أصفر من بذر الكركس الأبيض الأصغر من الطم يفتح السد ويدور ويؤكل الرياح ويواجه الظفر والمفاصل . »

٢٣٩٩٧ - كَمَالَةٌ * (S). ECHINUS PHILLIPENSIS (S). KAMALA (F).

جنية زراعية معمرة من فصيلة البتوسيات . مهدها الحث . ساقها فراه . اورثاقها منقطة ، متعابدة ، يفضية النصل المذهب الطرف . أزهارها عقودية التجميع تاجي الأركان . ثمارها بلوطية الشكل تنلفها ثمل دقيقة تتحول إلى غبار يرتقي اللون حطلي المزاج يستعمل في سباج الألفه الخيرية ويستعمل أيضاً لطرد البتود البوسية . النشعة منه أروع من قرامين إلى ١٢ غراماً وذلك بالنسبة إلى عمر المرو .

٢٣٩٩٨ - كَمَالِيَّةٌ (S). ALCHAMILLA (S). ALCHAMILLA (F).

جنس نباتات عشبية برية من فصيلة الورديات . أنواعها قليلة منها الحولية والمصرة تكثر في المراعي والأحراج الجبلية . يحزن لها بفس الخواص الطبية ويقولون أنها شائعة وتؤثر أغشية البكرة تنفسي الرائي ففقد كمين .

بعض الإصقاغ الأمريكية أعصابها كليفورني والمكسيك ||
جسمه كبير القد. طوله نحو ٧٠ سم. وبسطه نحو
١٠٠ سم. ثوبه إلى السواد اللامع. جناحاه مبلقان
بالأبيض. حذقة عينه إلى الصفار الذهبي. متقاده وساقاه
وأصابعه إلى الزرقه الطحلاء || أخلاقه رضية لكنه يتجنب
الإنسان ويتخذ من الصبرك. يتسلق جلود الأشجار
قفزاً. طيرانه طويل الشوط كثير التجمعات والسيف ||
قوته الحشرات على اختلاف فصائلها وأجناسها ثم الأثمار
البرية والبلوط || يعيش ذكراً واثني لا يفرقها سوى الموت.
يذئن عنه في تجاويف الأشجار الرقيقة. الاثنى تبغض
من ٣ إلى ٥ يعضات تحضنها وسدحا دون الذكر الذي
يؤئن لها الغذاء.

٢٤٠١٩ - كمكامل أميرى *

Campophilus principalis (S).
Campéophile princier (F).

نوع من الكمكامل موطنه بعض مناطق أمريكا الشمالية من
فلوريدا إلى كاليفورنيا والتكساس || جسمه كبير القد
طوله نحو ٥٨ سم. وبسطه نحو ٨٢ سم. ثوبه إلى السواد
اللامع. جناحاه ومطاطا منه مبلقة بالأبيض. حذقة
عينه إلى الصفار الذهبي. متقاده عاجي اللون. ساقاه
وأصابعه إلى الزرقه || أخلاقه رضية لكنه كثير الرجل.
قوته الحشرات والأساريج والنمل والثمار البرية والبلوط
والبلوط || يتسلق الأشجار قفزاً. طيرانه معتدل الشوط
كثير التجمعات || يعيش ذكراً واثني لا يفرقها سوى
الموت. يذئن عنه في تجاويف الأشجار على ارتفاع بعض
الامتار. الاثنى تبغض من ٣ إلى ٥ يعضات تحضنها
وسدحا دون الذكر الذي يؤئن لها الغذاء.

٢٤٠٢٠ - كمككات *

Kumquat

هي ليمون ككات. شجرة رضية مشرة من الحمضيات.
لها خربان مشهوران هما :

٢٤٠٢١ - كمككات مُستديرة *

Citrus japonica madurensis, *Limonellus madurensis*
(S). *Kumquat à fruits ronds*, «Marum» (F).

فرب من الكمككات. اسمه الياباني «مارومي» فبرته
سرسة متوسطة القد تملو نحو ٤ أمتار. أوراقها معتقة
متعاقبة سنائية. نصلها جامد الصفحة الخضراء اللامعة.
ثمأوها كروية صفراء اللون مأللة البشرة. قطرها يراوح
من ٢٠ إلى ٣٠ سم.

٢٤٠٢٢ - كمككات مُستطيلة *

Citrus japonica margarita, *C. margarita* (S). *Kum-*
quat à fruits oblongs, «Nagami» (F).

فرب من الكمككات اسمه الياباني «نagamى» فبرته سرسة
متوسطة القد تملو نحو خمسة أمتار. أوراقها متعاقبة،
معتقة، سنائية؛ نصلها جامد الصفحة المأللة، شديد
الخضار اللامع. ثمأوها مستطيلة اجسامية الشكل صفراء
اللون طويلا نحو ٤٠ سم. ورضها ٢٥ سم.

٢٤٠٢٣ - كمككام

Essence de la marjolaine (F).

Oil of the sweet marjoram (E).

هو دهن الرو يستعمل في الطآارة. يستخرج بتقطير
الازهار والأوراق بعد تقمها بالماء. وهو أصفر اللون
يخضر ويصق مع مرور الزمن. عرقه ذكي الرائحة، حامز
الطعم، يغلى عند ١٦٣° مسخ. ويذوب بالكافور في
الكحول حيار ٨٥°.

Cambium

٢٤٠٠٧ - كمكسيوم

هو القُلب الطبقة المولدة في النبات.

٢٤٠٠٨ - كمك * هي الاروسة، اطلجا.

Poire (F).

٢٤٠٠٩ - كمكشاة

هي الاجامسة، ثمرة الاجامس.

Poirier (F).

٢٤٠١٠ - كمكشوى

هي ثمرة الاجامس.

٢٤٠١١ - كمكج

Bourgeonner (F). *To bud* (E).
كع الكرم اذا تحرك للبراق. واكمت الزمة اذا ما
ابيضت وظهر عليها ثمل كالقطن.

٢٤٠١٢ - كمكز

٢٤٠١٣ - كمكر

الكمر من البسر : ما لم يربط على نخله ولكنه سقط فارطب
في الارض. اما النخلة لكمار.

٢٤٠١٤ - كمكش *، كمكسيما

Camassia (S). *Camassie*, *Camash*, *Cyanotride* (F).
Camass, *Quamash* (E). *Quamassie* (D). *Camassia* (I).
من الاسم المحدث «كش» . جنس نباتات بصلية من
فصيلة الزنبقيات. انمواعه المعروفة نحو ٨ منها البرية
والزراعية. اوراقها قرصية الانتشاب شقيقة مستطيلة.
شامخها اسطوانية جوياء. ازهارها حنقوية التجميع
يكلل الشاربخ. ازهارها نجسة الشكل فارشة || اعرف
انواعها وانمواعها ما يلي.

٢٤٠١٥ - كمكش جملتي *

Camassia hyacinthina, *C. fraseri* (S). *Camassie-*
jacinthe, *Camash-jacinthe* (F).

نوع من الكمكش البسروي الزنبقي. شامخه يملو نحو ١٠
سم. بلمات ازهاره لالاية العروق تملو من ٦ إلى ١٢ م.
لونها إلى الوردي يملو موانج ليكي || ازهاره يستمر
من نيسان إلى أيار.

٢٤٠١٦ - كمكش ليشطين *

Camassia leichdlini (S). *Camassie de Leichdlin*,
Camash de Leichdlin (F).

نوع من الكمكش البسروي الزنبقي. شامخه يملو نحو
٩٠ سم. بلمات ازهاره خاسية أو سباعية العروق
تملو من ١٥ إلى ٢٥ م. فروبه المشهورة أربعة تختلف
بالوانها منها الأبيض والأصفر والأزرق والبنفسجي.
ازهاره يستمر من نيسان إلى أيار.

٢٤٠١٧ - كمكش مأكول *

Camassie esculenta (S). *Camassie comestible*,
Camash comestible (F).

نوع من الكمكش البسروي الزراعي لماكول البصل. شامخه
يملو من ٤٠ إلى ٨٠ سم. ازهاره إلى الزرقه اللبراء الموانج،
تلاتها خاسية أو سباعية أو قساعية العروق تملو من ٢٠
إلى ٣٠ م. مما يجعل قطر الزهرة يراوح من ٥ إلى ٧ م.
ازهاره يستمر من أيار إلى سزيان.

٢٤٠١٨ - كمكامل امبراطوري *

Campophilus imperialis (S).

Campéophile imperial (F).

طائر من فصيلة الفقايرات وربية المتسلقات. موطنه



كش



كمكامل امبراطوري



كمكامل اميرى



مستديرة مستطيلة ككات



كليل



كهة مبدلة



كوكليت اربوئي



كون



كون حيشي



كيشي

٢٤٠٣٣ - كَمِين * ، سَنَوَات

Cumina cynimum (S). Cumina (F). Cumin (E). Echter Römerkümmel (D). Cumino, C. domestico, Cimino dolce (I).

نبات عشبي حولي زراعي من فصيلة الحشيشيات . يزود من الاناربية وقد تستعمل في تطهير الحيز والجبن . ويستخرج منها مشروبات صحية نافعة || ولكن من منه للحمدة ، يجعل الرياح والارام ويخفف سوء الحمض ويحسن النفس والمغص . كان يستعمل في الطب القديم عقويا جليا بمزجه مع السمل والفلفل .

٢٤٠٣٤ - كَمِين اُرَمْسِي * Cumin des prés (F).

هو الكراويا ، اطبا .

٢٤٠٣٥ - كَمِين حَيْشِي * ، يَالِسُون بَرِّي

Carum (S). Ammi, Sison (F). Ammi, Bishop's weed (E). Herrenkümmel (D). Ammi, Sison (I).

جنس نباتات عشبية رية طيبة حولية من فصيلة الحشيشيات . انواعه المرفوعة حصة اطباها حشيش ويزود اليهم المتوسط وينها نوع حشيش المنبت . اوراقتها تشبه اوراق الجوز . منافعها الطيبة كنافع الكون .

٢٤٠٣٦ - كَمِين حُلُو Anis (F).

هو الانيسون ، اطبا .

٢٤٠٣٧ - كَمِينِيَات Tuberaceae (S).

Tubéracées (F). Tuberaceae (E).

فصيلة الار . من الفطور الزقية اجناسها وانواعها عديدة اكثرها مستحب العلم مأكول . فوراقتها الشكل والحجم والون والرائحة .

٢٤٠٣٨ - كَمِينَت Bai (F). Bay (E).

من الزوان اثواب الخيل للذكر والاثنى . ج . ك . والفرس الكويت اشد حرة من الاشقر ويكون عرفه وذنبه اسودين وقوائمه كذلك . والكميت قد يكون :

٢٤٠٣٩ - كَمِينَت Bais (F). Chestnut (E).

وهو الذي يعلو حوته سواد

٢٤٠٣٩ - كَمِينَت Bais (F). Dapple-bay (E).

وهو الذي تشبه حوته

٢٤٠٣٩ - كَمِينَت Bais (F). Light-bay (E).

وهو الذي تملوه صفرة

٢٤٠٣٩ - كَمِينَت Bais (F). Light-bay (E).

وهو الذي تملوه صفرة

٢٤٠٣٩ - كَمِينَت Bais (F). Light-bay (E).

وهو الذي تملوه صفرة

٢٤٠٣٩ - كَمِينَت Bais (F). Light-bay (E).

وهو الذي تملوه صفرة

٢٤٠٣٩ - كَمِينَت Bais (F). Light-bay (E).

وهو الذي تملوه صفرة

٢٤٠٣٩ - كَمِينَت Bais (F). Light-bay (E).

وهو الذي تملوه صفرة

٢٤٠٣٩ - كَمِينَت Bais (F). Light-bay (E).

وهو الذي تملوه صفرة

٢٤٠٣٤ - كَمِينَت Bais (F). Light-bay (E).

جنس نباتات سرخسية من فصيلة الكلويات . انواعه عديدة جميعها كثيرة القد تملو نحو ١٠ اثمار . جالوبها زباد اللحاء . اوراقتها متصبية ، مركبة ، ثنائية او ثلاثية الانقسام تطول من ٣ الى ٦ اثمار . فصوصها اهليلجية الشكل ، مغشاة بالنسج ، نصلها جامد النسج ، اعرض الاخرى المغشاة العليا ، فصي السفل || وهو يربط في الاثر الصمغية العور المتوسطة الاندماج الكائنة في المفاصل الجنبية الدافئة .

٢٤٠٣٥ - كَمِينَت Bais (F). Light-bay (E).

فصيلة من البرانس الصمغية المستورات الزهر . انواعها نحو ٩٠ جميعها خشب اجناس . اطباها البلاد الحارة . تصلح للزيتين انما ترطب في المواضع الرطبة .

٢٤٠٣٦ - كَمِينَت Bais (F). Light-bay (E).

هو ذو الكه اي المسمى يولاه بالانسان او الخيول .

٢٤٠٣٧ - كَمِينَت Bais (F). Light-bay (E).

الواحدة كاه . ولكنه جنس اسماك نهريه من فصيلة الشبوطيات مفتوحات الفم . انواعه قليلة تتميز باجسامها الاهليلجية الشكل ويبدئها الفكيتين البتيتين . اعرف انواعه واشهرها الكهية المبلولة .

٢٤٠٣٨ - كَمِينَت Bais (F). Light-bay (E).

Tinca vulgaris (S). Tanché commune (F). Common tanch (F). نوع من الكه وهي سمكة نهريه ترطب في المياه الراكدة انحصا مياه القنارات حيث تعيش في اسماها . طولها عند ادراكها التام يراوح من ٢٤ الى ٣٧ سم . وزنها من ٥ الى ٦ كيلو . فلوها صغيرة القد كاه . زعانفها الظهرية والصدريه والبطنية والشرجية مسطيلة ومستديرة الاطراف . ذنبها مستعرض مقطوم . فوها الى المنشار الاسف المواجه .

٢٤٠٣٩ - كَمِينَت Bais (F). Light-bay (E).

جنس نباتات عشبية حولية عارشة من فصيلة اليليات . انواعه قليلة جميعها زينة . سقها صفرة . اوراقتها متعاقبة . اعزها لاقامية التجميع والارتكاز || تتكاثر بالبرز وتجدد في جميع الارربة الزراعية || اشهر انواعه التريينية ما يلي .

٢٤٠٣٩ - كَمِينَت Bais (F). Light-bay (E).

وهو الذي تملوه صفرة

٢٤٠٣٩ - كَمِينَت Bais (F). Light-bay (E).

وهو الذي تملوه صفرة

٢٤٠٣٩ - كَمِينَت Bais (F). Light-bay (E).

وهو الذي تملوه صفرة

٢٤٠٣٩ - كَمِينَت Bais (F). Light-bay (E).

وهو الذي تملوه صفرة

٢٤٠٣٩ - كَمِينَت Bais (F). Light-bay (E).

وهو الذي تملوه صفرة

٢٤٠٣٩ - كَمِينَت Bais (F). Light-bay (E).

وهو الذي تملوه صفرة

٢٤٠٣٩ - كَمِينَت Bais (F). Light-bay (E).

وهو الذي تملوه صفرة

٢٤٠٣٩ - كَمِينَت Bais (F). Light-bay (E).

وهو الذي تملوه صفرة

٢٤٠٣٩ - كَمِينَت Bais (F). Light-bay (E).

وهو الذي تملوه صفرة

٢٤٠٣٩ - كَمِينَت Bais (F). Light-bay (E).

وهو الذي تملوه صفرة

Canarium (S). * **كتاروم** ٢٤٠٤٨
Canarion, Canari, Canarium (F). Almond, Elemi tree (E). Kanarienbaum (D). Canario (I).
جنس شجيرات برية من سبط البفوريات وفصيلة البطيانيات.
أنواعه المعروفة نحو ٦٠ جميعها من نباتات المناطق الاستوائية،
تفرز حصاراً وراتنجية يبيض اللون ببطء الاشتعال قوية
الهب فواحة العرف المستحب. اغشائها صلبة يبيض اللون
لكنها لا تصلح للاستعمال الصناعي.

Gîte (F). Lair (E). * **كناس** ٢٤٠٤٩
مأوى الطير في الغاب بين الشجر يستتر فيه. ج. كنوس
واكناس.

Lignée (F). * **كنشاة** ٢٤٠٥٠
Issue, Progeny (E).
ج. كنشأت وكناس. هي الاصل الموصلة المشتبة
كأماها لسلالات نباتية معينة.

Tectonique (F). Tectonic (E). * **كنشاهة** ٢٤٠٥١
علم يبحث في تكوين الأرض وتوغلها.

Cal (F). Callus (E). * **كتب** ٢٤٠٥٢
نسيج دامل يغطي الفراغ الذي احده الجرح في الشجرة.

Callose, Callosus * **كتب** ٢٤٠٥٣
اندمال في الجلد مظهر نقط رافعة متصلة او نتوءات
جامدة.

Equisette (F). * **كتبات الحقل** ٢٤٠٥٤
هو الأسوخ، اطلبه.

Prêle d'hiver (F). * **كتبات الشتاء** ٢٤٠٥٥
هو الأسوخ الشتوي، اطلبه.

Equisetaceae (S). * **كتباتيات** ٢٤٠٥٦
Equisétacées (F). Equisetaceae (E).
هي الأسخيات، فصيلة نباتية من مستورات الزهر
الوصالية.

Chamaedorea (S). * **كتبار** ٢٤٠٥٧
Chamaedorée (F).
جنس اشجار ليفية من فصيلة النخلات. أنواعه المعروفة
١٠ اصطناعها الاقاليم الحارة معظمها امريكى المنبت وبعضها
افريقي. تزهر القزوين، جلوهها تملو من متر الى تسعة
امتار، صفها يطول من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. كواثيرها
عديدة، قنولتها لينة، ثمارها كرزوية الشكل رائحة
ناخفة المادة للاستعملة || اشهر انواعه التريينية :
كتبار البق *

Ch. elegans (S).
Chamaedorea élégante (F).
Ch. elator (S). كتبار شامع
Chamaedorea élevée (F).
Ch. gracilis (S). كتبار ظريف
Chamaedorea gracileuse (F).

Chenopus (S). * **كتنبث** ٢٤٠٥٨
Chénopée (F). Chenopus (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات مديات الاربل
وفصيلة الكتنبثيات. أنواعه المعروفة كثيرة العدد، المعاصر

Caecum (S). * **كيمية** ٢٤٠٤٢
Caecum (F). Caecum (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات مديات الاربل
وفصيلة الكتنبثيات || انواعها المعاصرة المعروفة نحو ١٠٠
منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة والاستوائية || اصطناعها
صغيرة، انبوية الشكل، حلزونة القنة المقوسة. افواها
دائرية. اسقاطها مدلتكة، قرنية الغشاء. لولاسها عادية
اليزين.

Caeidae (S). * **كيمييات** ٢٤٠٤٣
Caeidae (F). Caeidae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات مديات الاربل
اميات الخياشيم ومديات الاجهزة || اجناسها وانواعها
المعروفة عديدة، معظمها من متحجرات الاياج الثالث
اما الانواع المعاصرة فنحو ١٠٠ تنتمي الى جنس واحد
يدعى كيه.

Lepadogaster gouvaili (S). * **كيبه** ٢٤٠٤٤
Barbier, Porte-écuelle (F). Sucker (E).
سمكة من فصيلة الرخويات يكثر وجودها في المتوسط. تتميز
بكبكر وأنها وامتناعه زمانها الصدرية والظهرية. جسمها
متوسط اللد، ثوبها جميل الالوان الزاهية يغلب فيها الوردي
للحلب المواجه. بطنها فضي اللون. حصرها ويخرج ظهرها
معرضة للتجلبع الاسمر. لحها متوسط الصفب.

Callosté (F). * **كتاب** ٢٤٠٤٥
هو الجبسة، اطلها.

٢٤٠٤٦ - كتار * * **كتاري** ، **حزكر**
Serinus canaria (S). Serin des Canaries, Canari (F).
Canary (E).
نوع من النمر وهو صفور غريد اصفر اللون، اخضر
المواج يرق في الانقاص. ضره وسلاطه الحالية عديدة
تختلف باختلاف القرب والحجم || موطنه الاصل جزر
كتاريه وهو يألف الأماكن القريبة من الماء لانه يقتل
كل يوم. قوته البزور البرية الصغيرة ولوامي النبات وبعض
الانعام السكرية انحصا اثنين الناصب السامع. وهو في
القفص يعيش نحو ٢٠ سنة هل يزركلكنس والبسبيبية
والقزير والشلم المنقوع وانس والبار السكرية والخز
المنقوع بالخليب اللذي وصفار البيض || الانثى تحضن
ثلاث مرات في الحول. حاضتها تراوح من ٣ الى ٥
بيضات صغيرة الحجم فبراء القشور المرقوشة بالجلوي
رخيما يستقيم ١٣ يوما || وهي تساند النمر والحسن
والكشر والخفيري والتضبيعي والقشور والوردي ...
تاجها لعل قوي الشكبة مراكب الالوان للتداعلة
المرتكرة على الاصفر.

٢٤٠٤٧ - كتارين * * **كتارين**
Canarina (S). Canarine (F).
جنس نباتات جنبية معمرة من فصيلة الجريسيات. انواعها
قليلة اصطناعها جزر كتارية. جلودها غليظة وشية. سيقانها
تملو من ١٠٠ الى ٢٥٠ سم. حصارها حلابية دقة.
اوراقها متقابلة، معنقة، رخية. نصلها مالمش البشرة،
سمن الحافة، بحري اللون. انماها قمية الشكل، كبيرة
القد، مستطيلة المنالين متدلية. لونها الى الصفرة النديعة
وروقها الى الحمر. ثمارها جنبية مأكولة.



كيه



كتار



كتاروم



كتبار انيق

يفار الى ذلك باضافة ١٥ فيصح التعريف ان ذلك كذا او كذا او كذا الخ.

٢٤٠٦٦ - كُنْتَبُوس ، كُنْتَبُوس (S). Cajanus

Cajen (F).

جنس نباتات ليفية خشبية معمرة من فصيلة القرنيات القرشاية . اوراقها عديدة مطبها بري وبضها زراعي . اصلها البلاد الحارة والامراتية . سيقانها متضبة . اوراقها متضبة ، مركبة ، ثلاثية . ازهارها نورية التجميع . ثمارها قرون مطبلة مخضرة القواصل الحبية || اعرف انواعه واشهرها الكنجوس الهندي .



كنيت

٢٤٠٦٧ - كُنْتَبُوس هندي * ، كُنْتَبُوس هندي * و كُنْتَبُوس هندي *

هندي * ، كُنْتَبُوس هندي *

Cajanus indicus (S). Ambrevede, Pois d'Angola, Pois d'Angola (F). Doli, Pigeon-pea, Cajan-pea, Congop (E). Catjan, Angolische Erbsen (D). Cajano dell Indie, Cicio dell indie, Pisello d'Angola (I).

نوع من الكنجوس القرشي ، فروهه عديدة شائعة استعمال . ساقه ليفية ، خشبية ، فراءه ، زياه ، تعلو من ١٥٠ الى ٣٠٠ سم . اوراقها مركبة ثلاثية ، وريقاتها اهلجية التصل ، خلية البشرة حل فسحتها . ازهارها نورية التجميع ، صفراء اللون ، موزعة بالاخر . ثماره قرون مطبلة تقوئل من ٤ الى ٧ سم . تقطف من ٣ الى ٥ حبات مستديرة مغلفة قفرا قشر الحصى ، لونها يتخلف مع القصر منها الابيض والحلي والاسمر والاخر والمقرش || قرونه القصر تطيح كالقوياء . حبه التامنج الجاف صلب اللادة يستعمل بعد سحقه وهو غزير العناصر الغذائية يحوي ما قدس :



ككور الشوك

من ١٩ الى ٢٠ % من المواد الازوتية
من ٦٢ الى ٦٤ % من المواد الهيدروكربونية
من ١٠ الى ١٢ % من المواد للحمية

٢٤٠٦٨ - كَنْتَب Anaphalis (S).

Anaphale, Anaphalide (F). Pearly everlasting (E). Weisses Perikörbchen (D). Sempreviva blanca (I).

جنس نباتات شبية معمرة من فصيلة المركبات . انواعه الممروقة قليلة . اوراقها متضبة مخضرة قطنية . رؤيساتها الزهرية ملقية التجميع . ازهارها حافية الزائفة . ثنائياتها فيقة . يزورها مستقلة || اعرف انواعه واشهرها ما يلي .



كنجوس هندي

٢٤٠٦٩ - كَنْتَب الثَبَّت Anaphalis (S).

Anaphallis nubiaga (S). Anaphalide du Tibet (F).

نوع من الكنجب الزائفة يطو من ١٠ الى ٢٠ سم . ساقه واوراقه مخضرة قطنية . اوراقه سنانية التصل وسيدة العرق . رؤيسات الزهرية وسيدة ، ازهارها صغيرة مبكرة حافية اللون . ازهارها يستمر طوال شهر تموز .



كنجب ثممي

٢٤٠٧٠ - كَنْتَب ثَمَمِي * Anaphalis (S).

Anaphallis margaritacea, Antennaria margaritacea (S). Anaphalide nacrda, Immortelle blanche (F).

نوع من الكنجب الزائفة يطو من ٣٠ الى ٦٠ سم . اوراقه شيفة تقوئل من ١٢ الى ١٤ سم . وتعرض نحو ٥ م . فصلها اخضر الصفحة البلبا زهرها زعفران اللون . رؤيسات الزهرية كبيرة القدة ثمانية اللون واللمعة || ازهارها يستمر طوال الصيف .

منها وقد يتجاوز ٤٥ يمشي في بحار شمال المحيط الاطلسي || اصداها صغيرة القدة وشبية عازنة مثلمة الاولية . فوهاها مستقلة الانفراج ، رباعية الفلق للامتساوية التي تبدو كاربيل التم شكلا وحطبا .

٢٤٠٥٩ - كَنْتَبَات * Chenopodiaceae (S).

Chenopodiaceae (F). Chenopodiaceae (E).

لفصيلة حيوانات بحرية من الرضويات معديات الاريل . اجناسها وانواعها الممروقة عديدة بعضها من متحيرات الاحتجاب الجبرية والبيشورية وبضها معاصر منتثر في معظم بحار البلاد المعتدلة الحرارة || اعرف اجناسها واشهرها الكنجب والدرتية والمربود والفصيمة .

٢٤٠٦٠ - كَنْتَب Aurent (F).

Pent-roof, Porch roof (E).

سقية مسطحة لاقياس العلل والعرض والاعتدال ترتكز على حائط او بناء .

٢٤٠٦١ - كَنْتَب Enveloppe, Revêtement (F).

Covering, Facing, Revêtement (E).

كل مادة حاجزة توضع لوقاء الشيء وتستره .

٢٤٠٦٢ - كَنْتَب Bibelot (F). Curio (E).

ج . كتاب . هي الاشياء الصغيرة الفاعرة الصنع من تماثيل وغيرها توضع لزين .

٢٤٠٦٣ - كَنْتَبريد Cantharide (F).

هو الزناح ، اطلبه .

٢٤٠٦٤ - كَنْتَبُور الشوك * Agapanthia (S).

Agapanthia cardui (E).

حشرة وائمة خاضعة من فصيلة القرنيات ورتبة مفدمات الاجمنة . موطنها يشغل معظم اقالم حوض البحر الابيض المتوسط . تألف جميع انواع الشوك والقيهاء . خنافسها تموش على الازهار . يرقاتها تسردب اربوات النباتات المائلة ولا تقف من سقوها || جسمها صغير القدة ، اهيف الشكل ، يطوئل من ٧ الى ١٢ سم . ثوبا الى الزرقعة العابقة يملوها مواج سبروي وثلاثة خطوط عابية تقطب الكحول ، وضطان اصفران يكتنف الدرز الغدي . رأسها مشتمل الجرم بقور مغطاه تحت الكحول . عينها صغيرتان . زبادانها خيطيان ، مهبان . ازهارها مهدب الحمار . ثمدانها معدلتا الصلابة ، متباينتا التحزير القاطب . ارسافها خماسية العقل || الاثن امير قدا من الذكر واجبت ثوبا منه والسر زائنا || لما جيل واحد في الحق . تظهر الحشرة الجمدنة في اوائل ايار وتبقى حتى اواخر آب . تسرح في النهار وتثبت في الليل || البرقة منه ادراكها الكمال الجسوري الذي يحصل بعد التقف بنحو ٣٨ اسبوعا ، تقوئل من ١٨ الى ٢٢ سم . جسمها دقيق الجرم ، مستطيل الصدر ، مستدق السكة الشرسية ، سداسي الروابج . ثوبا الى السمرة الخفيفة البهراء المواج يكتنفها تقطيط اسود يطوه بفسر الهلب .

٢٤٠٦٥ - كَنْتَب Exotype

هو حاصل التجميع انبل كان ام الشيب . يعرف عنه عدادة بحرف «ك» اما السلالة الاولى فتعرفها كز والسلالة الثانية كز والثالثة كز . واذا هجن الكنجب من جديد مع احد طرفيه ، وهو ما يدعى التاثير او الدجلة ،

Gypsophila elegans (S). كُنْدُسْ أُنِيق
Gypsophile élégante (F).
 عشبة حولية تملو من ٣٠ إلى ٥٠ سم. جلورها دقيقة ساقها قوية متضبة. أوراقها سنانية ذلقة، نصلها وسيد الوراق. أزهارها مستطيلة المالحق، بيضاء اللون أو وردية. أزهارها يستمر من تموز إلى ايلول.

٢٤٠٨١ - كُنْدُسْ دَبْحِي الرَوِي
Gypsophila scorzonifolia (S). Gypsophile à feuilles de scorzonère (F).
 عشبة سبروتية معمرة تملو من ٦٠ إلى ١٠٠ سم. ساقها كثيرة الفروع المستطلة. أوراقها سنانية، نصلها قلبي القاعدة خماسي الوراق. أزهارها إلى الحمرة الجليمة، كلها أخضر اللون صغير القند يطول نحو ٢ سم. || أزهارها يستمر من تموز إلى ايلول.

٢٤٠٨٢ - كُنْدُسْ دَرَب
Gypsophila scutifolia (S). Gypsophile à feuilles algues (F).
 عشبة معمرة زباء تملو من ٣٠ إلى ١٠٠ سم. ساقها فروع. أوراقها بحرية اللون خلية البشرة حل صفحتها. أزهارها وردية، كروصا إلى البياض الاخير تملو خمسة خطوط حر || أزهارها يستمر من تموز إلى ايلول.

٢٤٠٨٣ - كُنْدُسْ كَبِير الزَهَر
Gypsophila floribunda (S). Gypsophile multiflore (F).
 عشبة حولية سبروتية تملو من ١٥ إلى ٢٠ سم. ساقها دقيقة الفروع. أوراقها صغيرة ذرية. أزهارها كثيرة العدد، صغيرة القند، وردية اللون، كلها خماسي التفلق للسنة المتعصولة بخطين ابيضين يتوصلها خط أخضر. أزهارها يستمر من تموز إلى تشرين.

٢٤٠٨٤ - كُنْدُسْ لَوَاح
Gypsophila viscosa (S). Gypsophile visqueuse (F).
 عشبة حولية لزجة تملو من ٢٠ إلى ٤٠ سم. ساقها فروع. أوراقها سنانية؛ نصلها خلي البشرة الزيتية، ثلاثي أو خماسي الوراق. أزهارها وردية اللون قصيرة المالحق || أزهارها يستمر من تموز إلى ايلول.

٢٤٠٨٥ - كُنْدُسْ مَدَاد
Gypsophila repens (S). Chalk plant, Cloud plant (E). Kriechendes Gipskraut (D). Gesso filo (I).
 عشبة سبروتية ميلولة معمرة تملو من ٢٠ إلى ٤٠ سم. ساقها ليفية مدادة. أوراقها سنانية مستطيلة، نصلها بحري اللون وسيد الوراق. أزهارها كثيرة العدد، صغيرة القند، وردية اللون أو بيضاء || أزهارها يستمر من حزيران إلى ايلول.

٢٤٠٨٦ - كُنْدُسْ مَصْرِي
Gypsophila struthium (S). Gypsophile frutescente, Saponaire d'Egypte (F). Egyptian soap root, Struthium gypsophila (E). Spanisches Gypskraut (D). Saponaria vera, Struzio (I).
 عشبة برية ميلولة معمرة تكثر في البلاد المصرية حيث تستعمل في التبييض. ساقها مدادة. جلورها متوسطة النضال. أوراقها شقيقة؛ نصلها خلي البشرة، بحري اللون. أزهارها صغيرة القند وردية اللون أو بيضاء.

٢٤٠٨٧ - كُنْدُسْ
Pie (F).
 هو المقتق، اطليه.

٢٤٠٧١ - كُنْدُسْ
Pterygode (F).
 الكندسية جناح زائد صغير القند، قلبي الشكل، يلحف الررش عند قاعدته في رتبة حشفيات الاجنحة. وهما كندسيان، يعني ويسرى، تستعملها الفراشة لكسج ريشها الاماميين.

٢٤٠٧٢ - كُنْدُسْ كَارَة
Cantharus (S). Canthère (F). Bream (E).
 جنس اسماء بحرية من الاسبروديات الشالكانات الزعانف الكيثانية القلوس. انواعها ثلاثة. اجسامها بيضيه الشكل، طولها يراوح من ٤٠ إلى ٥٠ سم. زعانفها الظهريه قشبه السنام. تألف الغور الهيد ولا تقرب من الشاطئ الا في بعض الاثمة.

٢٤٠٧٣ - كُنْدُسْ كَارَة مَبْدُولَة
Cantharus cantharus (S). Canthère commun, Griset (F). Common sea-bream (E).
 نوع من الكندارية. سمكة بحرية يبيض من فصيلة الاسبروديات ورتبة شالكانات الزعانف. مسرعها المالحق، تألف الشطوط والاعوار وتدخل المواني. اعطائها البحر الابيض المتوسط || جسمها اعليجلي الشكل، معتدل التبييط، يطول من ٤٠ إلى ٥٠ سم. ثوبا إلى الشبهة الغضبية المالحق تشبه سمرا. في الظهر. جانبها مشيزان بخطوط قاطبة صفراء اللون. رأسها كبير الحجم، قصير أنف. فكها متعادلان. شفتها معتدل الانفرج. اسنابها رباعية الصفوف في الفكين. ميناها صغيرتان، تاذرتان. زعنفتها الظهريه واسعة سنانية الشكل. زعنفتها الليلية نازقة || لحمها متوسط الصنف، مأكول.

٢٤٠٧٤ - كُنْدُسْ هو كركك السد، اطليه.
٢٤٠٧٥ - كُنْدُسْ هو الهان الذكر، اطليه.

٢٤٠٧٦ - كُنْدُسْ يَرْزُوم، مِيْشُوكُنْدُري
Chondriosomes, Mitochondries (F). Chondriosomes, Mitochondria (E).
 هي مجموعة الكناسج التي تتألف منها الخبيرة الحيوانية أو الخلية النباتية.

٢٤٠٧٧ - كُنْدُسْ يَرْزُوم
Chondriome (F).
 هي الهية، اطليه.

٢٤٠٧٨ - كُنْدُسْ
Gypsophila (S). Gypsophile (F).
 جنس نباتات عشبية من فصيلة القرنفليات. انواعها زهاء ٤٠ منها الحولية والمعمرة والبرية والزارية. ساقها فروع. أوراقها صغيرة القند متطابقة. أزهارها خمسة التجميع، قاجية الاوتكاز، صغيرة الحجم. جلور بعضها سنانية يستخرج منها مادة الصابونين وتستعمل في خيل الانسية الصوفية والكاتانية والقلبية تنظفها من الاقذار وتكسبها بعض الزهراء والرياق || أدب انواعها واشهرها ما يلي.

٢٤٠٧٩ - كُنْدُسْ الصُّخُور
Gypsophila petraea (S). Gypsophile des rochers (F).
 عشبة سبروتية معمرة برية تعيش في الارتفاع والصخور الكلسية. تملو من ١٥ إلى ٢٠ سم. جلورها غليظة. ساقها ليفية مدادة. أوراقها صغيرة القند، بحرية اللون، بنفسجية القاعدة والمتن. أزهارها متقاربة لونها إلى البياض المالحق. قناباتها بيضيه الشكل ثنائية التركيب || أزهارها يستمر من حزيران إلى آب.



كندارة



كندارة ميلولة



كندس الصخور



كندس مداد



كندس مصري



كندور

٢٤٠٩٥ - كُنْدَ Asterôide (F), Asterôide (E).
نمت تعريفياً يطلق على جميع السيارات الصغرى الدائرة حول الشمس بين المشتري والمريخ. ج. كُنْدُش ويُسمى أيضاً الجوارى الكُنْدُش.

٢٤٠٩٦ - كُنْج Organite
كل عنصر من العناصر التي تتألف منها الخلية كاجلية والسنزوروم ... ج. كُنْج.

٢٤٠٩٧ - كُنْج Lignéa (F).
هو الكتانة، الخشب.

٢٤٠٩٨ - كُنْجَ Consoude (F).
هي السوفولان، جلس اشباب برية طيبة.

٢٤٠٩٩ - كَنْكَلِيَّات Tringians (F).
عارة من فصيلة دجاجيات الارض. اجناسها قليلة. اعرفها الجبليل. جميعها من القواطع الصغريات اللند. متاخرها دقيقة خالية من التشنيد. ارساغها نجيل. الزواجا مرطلة وهي صيفية وشتوية تختلف عن بعضها برونق الالوان واقترب الرقعة او تباعدها.

٢٤١٠٠ - كَنْكَلِيَّات Conchite (F).
مادة متجمدة في داخل صفة.

٢٤١٠١ - كَنْكَلِيَّات Germon (F).
هو كنجون الابيض اي الجرجون، سمكة بحرية من فصيلة الاسقمريات. قال جرير:

« قوم اذا جلول في صبرهم بصل
ثم اشتروا كنداً من مالح جلولاً »

٢٤١٠٢ - كَنْف Holacanthus (F).
هو الطبق من الاسماك البحرية، اطله.

٢٤١٠٣ - كَنْف Blotope
هو المكان الموصوف المتحدود بطبيعتها ويناعه.

٢٤١٠٤ - كَنْفك
هو البان الذكر، اطله.

٢٤١٠٥ - كَنْكَلِيَّ Terricola (F), Terricolous (E).
نمت تعريفياً يطلق على الديدان والحلوانات الدنيا التي تعيش داخل التربة.

٢٤١٠٦ - كَنْكُر Topinambour (F).
هو عباد الشمس السقولي، اطله.

٢٤١٠٧ - كَنْكَلِيَّة، قَمْز رَلي Combratum altum, C. micranthum (S).

Combrat élevé, Kinkeliba, Chigomier altier (F).
Vegetable-glue plant (E). Langfaden (D).

لوع من الاسم وكَنْكَلِيَّة هو الاسم الافريقي. نبات حرجي طبي معمر من فصيلة الالهليجيات. منته يمد من جمهورية مالي الى سيراليون وشاطئ الكنج || وهي شجرة فراء تعلق نحو اربعة امتار. ساقها شديدة الصلابة. فروعها متراكبة، مستطيلة، جلدية اللون ثم ملحد. اورقانها متعاقبة، متفتحة، اهليلية، تطلق من ٥ الى ٩ سم. وتقرض من ٢ الى ٥ سم. نصلها مائة البشرة، حاكمة الخصار الجوزي المالح. ازهارها سنبل التمديع،

٢٤٠٨٨ - كُنْدُش جَوَال Plor vagabonde (F).
طائر من الجوارى يدعى كطري، اطله.

٢٤٠٨٩ - كَنْدَلاء، كَنْدَلِي كَنْدَلِي
نبت ينبت بماء البحر ويؤتى بالشوة. قشره يسي الأيدع يدبغ به (اللسان).

٢٤٠٩٠ - كَنْدَم، جَوَر كَنْدَم Mangouste (F), Mangosteen (E).
ويدعى الجندم، هو ثمرة جلد مستفان.

٢٤٠٩١ - كَنْدُورُج Silo
شبه مخزن يشاد في الارض يفره الثراب مخزن فيه الحبوب.

٢٤٠٩٢ - كَنْدُورُ، كَنْدُورُج، كَنْدُورُج
فصاح

Sarcorampus condor, S. gryphus (S). Condor des Andes (F). Condor (E).
طائر من النسور ينتمي الى فصيلة النسوريات. جلته كبيرة. لبقه طويل نحو ١٦٠ سم. اما بسطة سقله فنحو ٣٥٠ سم. رأسه مستطيل الشكل يحمل على جبهته حرف اخر. منقرو كبير اللند، مريض الانتشاب، احسن البيرة الحادة. صقعه اغفر الريش كالرأس، مطوق بالابيض الاسفر المالح. ريشه اسط، غاليه كبيرة. ثوبه الى الطلبة المرح، بالاسود. قوامه يبيض || اطانه جبال الاند في امريكا الجنوبية. يألف المناطق العالية من ارتفاع ٣٠٠٠ الى ٥٠٠٠ م. من سطح البحر. نظامه الحياتي خاص. سره يد من ١٠ الى ٢٠ ذبياً. يلتصق قوته في رامة النبار، ورغب في الجنب وان تضر عليه ويوجد اسطاد الايايل والاماز وكل ما استطاع اليه سبيلاً. يمشي وكنه على الحضيض في اوقات المسحور للزفنة او لتو الجبال الرقعة. اثناء تضع رقتين كثيرين تحضنها وسدحها نحو ٤٠ يوماً.

٢٤٠٩٣ - كَنْدِيَّة، زَهْرَةُ المَرْجَان Kennedy (S), Kennédie, Kennédye (F). Coral creeper (E). Kennedie (D). Kennedia (I).

جنس نباتات ليفية عارضة برية وتربينية من فصيلة القرنيات القرشانية. انواعها ١٢ معظمها ترابي، سورها زياء طويل من متر الى عشرة امتار. اورقانها متعاقبة منعقة ثلاثية الفصوص. ازهارها كبيرة القد فريدة او متعددة التجميع، عوروية الاكثار او طرية لونها الى الاحمر ومنها الوردي والاربعوني والقرنبي والياقوتي ... || اشهر انواعها التربينية:

كندية هبية K. splendens (S).
Kennédie splendide (F).
كندية هراء، كندية بالقوية K. rubicunda (S).
Kennédie rouge, K. à grandes fleurs (F).
كندية سوداء K. nigricans (S). Kennédie noire (F).
كندية شقراية K. coccinea (S). Kennédie écarlate (F).
كندية مرءاء K. glabra (S). Kennédie glabre (F).
كندية مستلقية K. prostrata (S).
Kennédie couchée (F).

٢٤٠٩٤ - كَنْس
هو الشنقب، اطله.



كندية

٢٤١١٦ - كُنيَاك، كُونِيَاك Cognac (F).
Cognac brandy (E).
مشروب قنديدي شائع الاستهلاك يصنع من كميال العنب .
وقد اشتهرت بصناعته بلاد الكونيكاف في فرنسا .

٢٤١١٧ - كُنيَب Arbres desséchés (F).
Dried trees (E).
الكنب: ليس من الشجر .

٢٤١١٨ - كُنْدِيدَا، كُونْدِيدَا Conidia (F).
Conidium (E).
كل بويضة فطرية نشأت حل كاتب لا في زق تدعى كندية.

٢٤١١٩ - كُنْدِيَة Locule (F). Loculus (E).
الكنديّة، في علم التاريخ الطبيعي، هي الحدر الشديد
الصر .

٢٤١٢٠ - كُنْثُورِيسِيوم Coniothecium (S).
جنس تطور مجهرية من حمارة الزمانيات فصيلة الطحنيات.
يتميز بظلمة من الجرب الكنديّة . كئالده مركبة مستطيلة .
بويضاته كروية جبرية التجميع || أوزامه عديدة جميعها
دمية تركب لحاء بعض الاشجار دون ان تؤذيها، منها البندق
والحور والوخ والصمغ .

٢٤١٢١ - كُنْثُورَاف، كُونُورَاف Gognographe (F).
ويسمى مرمة الزوايا . آلة المسح تقاس بها زوايا الارض
فترسم مستلها على القور .

٢٤١٢٢ - كُهَب Buffle âgé (F). Aged buffalo (E).
هو الجاموس للمسن لا يزال كاذر الحسم .

٢٤١٢٣ - كُهَبَل Detarium (S).
Détar, Détare, Détarium, Ditah (F). Tallow-tree (E).
Detaripbaum (D). Detaria, Meli (I).
جنس اشجار افريقية المنبت من فصيلة القرنيات . له
نوعان نوع ثماره مرة الطعم ، سحالية المادة ، مؤذية .
ونوع ثماره مأكولة مستحبة الطعم يعرف بكهبل السنغال .

٢٤١٢٤ - كُهَبَل السنغال Detarium senegalense (S). Détare du Sénégal (F).
Senegal tallow tree (E).

نوع من الكهبل شجرته تملو نحو ١٢ م. ساقها مستقيمة
اوراقها متعاقبة مركبة، وريقاتها شفافة الانتظام .
الشكل ، نصلها جامد الصفعة . عايق الخضر .
عقودية التجميع ، محوري الاذنكاز ، ثمارها مشعشة
الشكل والقه ، ليلب سؤذها ناشف المادة ، سكري الطعم ،
اغضر الون .

٢٤١٢٥ - كُهَدَب الإِجَاص، * أَكَارُوس Eriophyes pyri (S).
Phytopste du poirier, Eriophyes des poiriers (F). Pear
leaf blister mite (E). Birnblatt-Pockenmilbe (D).

حشرة من الكهديات المجهرية تركب برام الاجاص
تقتبب الاوراق الباكرك ثم تغطي على الاوراق فتضم النصال
بالبحور السمر او الحطية بعد ان تقضي على خلايا النسج
الذي يصيح كالاسفنج بين بشرته العليا والسفلى .
يكلف مكافحة التناكب باستعمال الحواشير والمواكيب .

محوري الاذنكاز . ازهارها صغيرة ، ودية الون ،
تملوا رشفة نحاسية . ثمارها يزور بحرمة جمجمة صغيرة
تبدو في اول صيدها غضراء الون ثم يتحرف الون ، عند
النضج ، الى الوردية القلبية الواجبة .

٢٤١٠٨ - كُنْثِيلُوجِيَة Conchytiologie (F).
Conchology (E).
في علم الاصداف .

٢٤١٠٩ - كُنْثِيَا، كُنْثِيَا سينكونة Cinchona (S). Quinquina (F). Cinchona, Quinin bark (E).
Chinabum, Fiebarindenbaum (D). China (I).
جنس اشجار ونجيرات برية وزراعية صناعية من فصيلة
الفويات . انواعه المخرقة ٢٠ اصلها المناطق الحارة
الرطبة . معظمها بري وبعضها زراعي صناعي طبي .
سوقها منتصب تملو من ٤ الى ٣٠ م. اوراقها متعاقبة
معتقة ، نصالها بيضيه او ابيضجية الشكل . ازهارها
عقودية او عشوكية التجميع . ازهارها عشوية زبده
البشرة . ثمارها جبراه مخروطية الشكل تحضن البذير من
البزور الصغيرة النشائية المنح || يستخرج من قشورها
مادة قلوية يفسد الون شديدة المارة تعتبر من أهم القلويات
المستخلصة من لحاء النبات وتعرف بالكينا .

٢٤١١٠ - كُنْثِيَا Cinchonées (F).
سبط من الفويات يشمل نحو ٩٥٠ نوعاً من النبات
تنتهي الى ١٠٠ جنس لشهورا الكنكيتا .

٢٤١١١ - كُنْثِيَان، كُنْثِيَان Alkana orientalis (S). Alkana, Alcanne, Alkan, Grémil à fleurs jaunes (F). Yellow bogloss, Yellow gromwell (E). Orientalische Perithrize (D). Alkana (I).
جنس نبات عشبي بري من فصيلة الحمصيات . اوراقه
ضيفة مستطيلة ، نصلها خال البشرة . ازهارها صغيرة القذ
يضاد الون . يزوده مستديرة ، حطية ، قاسية كالجر
لدر البرول وتفيد الحسم وتنشط الايلاج وتذيب البلم .
انواعه عديدة اصلها الجرد والبقاع الداخلية .

٢٤١١٢ - كُنْثِيَان صِبَاغِي، * شَنْجَار الجَرّ، عَسَّ الحَمَام، عَسَّ الحَمَام Alkana tinctoria (S). Alkana tinctoriale (F). Alkanet (E). Alkanne (D). Alkana spuria (I).
نبات عشبي بري من فصيلة الحمصيات يشتجر منه
صباغ احمر الون شائع الاستعمال .

٢٤١١٣ - كُنْثِيَل الكُنْثِيَلُ غير طام . قال امرؤ القيس :
فاضى بسح الماء . من كل نيفة
يكب على الاذنكاز دوح الكُنْثِيَل .

٢٤١١٤ - كُنْثُور Fractocumulus (S).
ضرب من البوم اللزيرة المطر ويدي الجلب ، اطلبه .

٢٤١١٥ - كُنْثُ Terre improductive (F).
Unproductive soil (E).
ارض لا تثبت شيئاً . يقال هذه ارض كنثو .



كنكينا



كهان صباغي



كهبل السنغال



كهذب الاجاص

٢٤١٣٤ - كُهْدَبُ المَنْجَا ، أكَارُوسُ المَنْجَا
Eriophyes mangiferae(S). Eriophye du mangarier(F).
حشرة من الكهديات المجهريات تركب برام المنجا فتؤذيها
وقد تقضي عليها .



كهذب البندوة

٢٤١٣٥ - كُهْدَبُ يَسَاتِ ، Eriophyidae(S).
Eriophyidae(S). Eriophyidae, Blister mites, Gall
mites (E). Gallmilben, Gallenmilben (D).
فصيلة حشرات صغيرة القد من رتبة الغزديات . اجناسها
وانواعها عديدة جميعها مجهزة . اجسامها اسطوانية .
تطوي من خيلن الى اربعة خطوط من للميتير . جرابها
رباعية طرفية تحيط باجزاء الفك || جميع حشراتنا ضارة
تركب برام واوراق النبات فتؤذيها اشد الاذى وقد تسبب
تلها .



كهذب الزيتون

٢٤١٣٦ - كُهْدَبُ القطن ، قارضة القطن
Lepidocyrtinus incertus (S).
حشرة صغيرة من الكهديات . ذباب الجسم ، سرها اللون ،
مستطيلة الذنب ، تعيش على نباتات الاراضي الرطبة
انصها القطن والبرسيم والفاصة .

٢٤١٣٧ - كُهْدَبُ الموز ، قارضة الموز
Drapanura muscica, Entomobrya muscica (S).
Drépanure du bananier (F).
حشرة صغيرة من الكهديات فوجيا الى الصفرة ، تركب
الموز وقصب السكر . انمرارها ضخمة لا تستعيب
المكانة .



كهذب الكرمة

٢٤١٣٨ - كُهْدَبُ لِيَاتِ ، كَلْبَنِيْلِيَاتِ
Collembola (F). Collembola (E).
وسم من دعما و قافزت الذب . رتبة حشرات علدية
الاجنة ناقصة التطور الاصلها البرني . حشرات
قارضة قاذرة مستطيلة الاذنان تحمل في حلقها البيئة
الاول جراب صغير القد يفرز مادة لزجة تاصمدا على
تسلق السطح الناعمة المائلة .

٢٤١٣٩ - كُهْرْمَانِي ، Electrogène (F).
Electrogon (E).
نمت تعريي يطلق على كل جهاز يولد الكهربية .



كهذب القطن

٢٤١٤٠ - كُهْرْمَانِي ، Electricité (F). Electricity (E).
الكهربية طاقة موكمة ، داسها تتبع على الطبيعية .
هي تقسم الى فرعين الكهربية الاحتكاكية والكهربية
الديناميكية فالاحتكاكية هي التي تستعمل في توليد
الكهربية . اما الديناميكية فهي لفظة بالتيار الكهربي
والاجهزة التابعة له .

٢٤١٤١ - كُهْرْمَانِي ، كهربة ، Electrification (F).
Electrification (E).
٢٤١٤٢ - كُهْرْمَانِي ، كهربة ، Electric (F).
Electric (E).



كهذب الموز

٢٤١٤٣ - كُهْرْمَانِي ، كهربة ، Electrolgalvanisme (F).
Electro-galvanisme (E).
درس القوى الصادرة عن الصفائح الكهربية .

٢٤١٤٤ - كُهْرْمَانِ أَصْفَرُ ، Sucrin
هو المنبر الاصفر مادة راتينية عمرة ، صلبة ، شبه
شفاطة . لونها يراوح من الاصفر الى الاحمر . لا تنوب
في الماء وتقصهر في ٢٨٧ °م . اشتمالها يوك الحامض
النبري و زيت طيار مستحب الرائحة العطرية .

٢٤١٣٦ - كُهْدَبُ البُنْدُقِ ، أكَارُوسُ
Eriophyes avellanae (S).
Phytopte du noisetier, Eriophye du noisetier (F).
Hazelnut gall mite (E). Haselnussgallmilbe (D).

حشرة من الكهديات المجهريات تركب حراف برام
البندق تسبب سقوطها واعلاص الازهار .

٢٤١٣٧ - كُهْدَبُ البندورة ، أكَارُوسُ
Eriophyes cladophthirus (S).
Eriophyes des tomates (F).

حشرة من الكهديات المجهريات تركب سوق واوراق
البندورة فتقتلها ويجهتها وتعتمد على الاثمار .

٢٤١٣٨ - كُهْدَبُ التين ، أكَارُوسُ التين
Eriophyes ficus (S). Eriophye du figulier (F).

حشرة من الكهديات المجهريات تركب اوراق التين الطرفية
النامية فتؤذيها بغض الشيء .

٢٤١٣٩ - كُهْدَبُ الرمان ، أكَارُوسُ الرمان
Eriophyes granat (S). Eriophye du grenadier (F).
حشرة من الكهديات المجهريات تركب اوراق الرمان
تقتبب اصفرارها وحلها الباكر .

٢٤١٣٠ - كُهْدَبُ الزيتون ، أكَارُوسُ
الزيتون ، فيلركوبت
Phyllocoptes (S). Phyllocopte (F). Rust mite (E).
Kräuselmilbe (D).

حشرة من الكهديات تركب اوراق الزيتون اصعبها
وريفات الانان الثانية فتقتنها من القاذ حبيها الغليبي
وترقصها ببطور صفر تتسع تدريجيا الى ان تم الفصل
تقتفي عليه .

٢٤١٣١ - كُهْدَبُ الزيتون ، أكَارُوسُ
الزيتون
Eriophyes tiliae (S).
Eriophye du tilleul, Phyllopte du tilleul (F).

حشرة من الكهديات المجهريات تركب اوراق الزيتون
قتشوها بالانابيب البشروية التي تقيمها على صفحات
التصل العليا .

٢٤١٣٢ - كُهْدَبُ الكرمة ، أكَارُوسُ
الكرمة
Eriophyes vitis, Phylloptes vitis (S). Eriophye de la
vigne, Erinoze de la vigne, Phyllopte de la vigne (F).
Grape bud mite, Grape erineum mite (E). Raben-
blattgallmilbe, Rebenpockenmilbe (D).

حشرة من الكهديات المجهريات تركب اوراق الكرمة
فترقصها بالبربر بمد القضاء على خلايا النسيج فيصح
النسيج بين البشرين كانه محروق لا ريباه منه .

٢٤١٣٣ - كُهْدَبُ الكشمش ، أكَارُوسُ
الكشمش
Eriophyes ribis (S).
Eriophyes du groseillier, Phyllopte du groseillier (F).
Black-currant gall mite (E). Knospengallmilbe (D).

حشرة من الكهديات المجهريات تركب برام واوراق
الكشمش فتؤذيها وقد تسبب اعلاص البرام والازهار .

الزئافن . انواعه المعروفة اريمة تتميز برؤوسها المستضخمة وباشداقها الكبيرة الفاغرة وباسنانها الحادة المنطقفة كانهباب الاثافي || اجسامها عريضة ، عادمة السهف ، مبدرة المناسخ . عيونها حلوية الاركانز تحتل قلة الرأس حيث يوجد ثلاثة اسلاك او ملاس غضروفية تسمى كنيوط مستطيلة تنتهي ببعض الاسمال المختلفة الاشكال يستعملها الكراخ لاجتذاب الاسمال الصغيرة ، ذلك لانه كسول قليل الحركة يقضي معظم اوقاته مستلقيا على بطنه فائحا شقة بانتظار الفريسة || اشهر انواعه كواكة المحيط وكواكة المتوسط .

٢٤١٥٤ - كَوَاكِبْ المحيط الأطلسي °

Lophius budgassa (S).
Baudroie de l'Atlantique (F).
سمكة من الكواخ . اعطانها جناح واغواط وشطوط المحيط الاطلسي . يكثر وجودها في خليجان المراكشية والاسبانية والبرتغالية والفرنسية || جسمها شبه غرورفي الشكل طويل من ٧٠ الى ٩٠ سم . ثوبا يماثل الموقع الذي تعيش فيه لانها قليلة الحركة || لحمها جيد الصنف ابيض اللون مرغوب فيه .

٢٤١٥٥ - كَوَاكِبْ مَبْدُولَة ° ، كَوَاكِبْ

المَتَوَسِّط ° ، لُطْ بَحْرِي مَبْدُول °
Lophius piscatorius (S). *Lophie baudroie*, *Baudroie commune*, *Diable de mer*, *Crapaud pêcheur*, *C. de mer* (F). *Toad-fish*, *Sea-devil*, *Fishing-frog* (E).
نوع من الكواخ . سمكة بحرية بيوض . اعطانها البحر الابيض المتوسط وبعض اقالم المحيط الاطلسي . مسرحها اضواء الهامح والشطوط . تألف المواقع المأدلة التي يراوح عنها من ١٠ الى ٢٠ مترًا || جسمها صفي الشكل ، يطول من ١٦٠ الى ٢٠٠ سم . سمكها عادم السهف . ثوبا الى الخنطي الاسمر يبق في الصفحة العليا ويغير ويبيض في السفلى . رأسها ضخم غليظ . شفها رجب الانفراج . عيناها كبيرتان سطحيات . ويلعوا في قلة الرأس ثلاثة اسلاك غضروفية دقيقة مستطيلة ، الاول منها ينتهي بمزق صغيرة كالاسمال || زعنفتها الظهيرة الامامية مستطيلة المناسخ الشائكة || تتميز باستاطلة قواعده الزعانف الصدرية الرفيعة الاركانز . وتتميز ايضا بالشذولة اي انها تمانق البيئة التي تعيش فيها || لحمها ابيض اللون ، متوسط الصنف ، مأكول .

٢٤١٥٦ - كَوَاكِبْيات °

Lophilids (F).
Lophiidae (E).
فصيلة اسماك بحرية من رتبة شالكات الزعانف . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد . اعطانها المحيط والبحر الابيض المتوسط . تألف الهامح والشطوط . مسرحها الاغواط التي يراوح عنها من ١٠ الى ٢٠ مترًا . تتميز بالكسل والشذولة اي انها تمانق المواقع التي تعيش فيها || اجسامها صغية الشكل كالشرغ ، ضخمة الرؤوس ، مأللة القشار الزج ، مبدرة المناسخ الحادة . اعطانها فطس . اشداقها كبيرة وعريضة . اسنانها حادة متعققة || عيونها رقيقة الاركانز تشرف عليها بعض الاسلاك الغضروفية المتوسخة بالاسمال || اشهر اجناسها الكواخ .

٢٤١٥٧ - كَوَاكِبْ °

Bulla (S).
Bulle (F). *Bulla* (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الاربيل

Hydro-électrique (F).
ما يختص بانتاج الطاقة الكهربائية المولدة من دفع الماء .

٢٤١٤٦ - كَهْرَتَانِي °

Spéléologue, *Spéléologiste* (F). *Speleologist* (E).
من كان اختصاصه الكهفنة .

٢٤١٤٧ - كَهْفَنَة °

Spéléologie (F).
Speleazology (E).
علم يبحث في تشيب الكهوف وفي سبر الاغوار ومجاري المياه الجوفية .

Aubergine (F).
هو الباذنجان ، اطبله .

٢٤١٤٩ - كَهْفَنَة °

Chicoca angulifuga, *C. brachista* (S).
Cahinga, *Cainga* (F). *Chicoce tree* (E). *Trauben-förnige*, *Kainzawurzel* (D).
شجرة حربية طيبة مسمرة من فصيلة الفويات . مهدا بعض مناطق امريكا الاستوائية || ساقها عارضة متسلقة فروع . اوراقها معتقة ، متفالة ، اعليجية الشكل . نصلها جامد الصلصة ، جميل الخضار العاين للاعم . ازهارها متعدي التجميع . ازهارها صغيرة وردية اللون ، عادمة اللزف . ثمارها حلوية ، مبططة ، عاصفة المذاق ، لا تؤكل || عصارة الاوراق ولزير مقوية وقايسة .

Liobunum rotundum (S).
Phalangide, *Faucheur* (F). *Harvester*, *Harvest-spider* (E).
حشرة عظيمة دابة من فصيلة الككويبات ورتبة المردبات . مسرحها معظم المناطق المعتدلة الحرارة من الشرق الاوسط واروپة || جسمه صغير اللد ، اعليجي الشكل ، ملحوم الصدر والبطن ، عادم المشن ، خيشومي التنفس . ثماناي البرامز المستطيلة الثقيلة . ثوبه اصهب اللون عند الانثى ويصتوف الى السرة الخنطية يعلوها تقبيج اسود عند الذكر . الذكر اصفر قدًا من الانثى التي يبلغ طولها نحو ٤ سم . || يألف جميع المواقع والمساكن الآهلة . يصرح في الليل . قوته اخشرات الصغيرة واساريعها ويرقاتها والذباب والحمام || يجتر من الدويبات النافعة لانه يقضي على المؤذية .

٢٤١٥٠ - كَهْل °

Phalangidae, *Faucheur* (F). *Harvester*, *Harvest-spider* (E).
حشرة عظيمة دابة من فصيلة الككويبات ورتبة المردبات . مسرحها معظم المناطق المعتدلة الحرارة من الشرق الاوسط واروپة || جسمه صغير اللد ، اعليجي الشكل ، ملحوم الصدر والبطن ، عادم المشن ، خيشومي التنفس . ثماناي البرامز المستطيلة الثقيلة . ثوبه اصهب اللون عند الانثى ويصتوف الى السرة الخنطية يعلوها تقبيج اسود عند الذكر . الذكر اصفر قدًا من الانثى التي يبلغ طولها نحو ٤ سم . || يألف جميع المواقع والمساكن الآهلة . يصرح في الليل . قوته اخشرات الصغيرة واساريعها ويرقاتها والذباب والحمام || يجتر من الدويبات النافعة لانه يقضي على المؤذية .

٢٤١٥١ - كَهْلِيَّات °

Phalangidae (S).
Phalangides (F). *Phalangidae* (E).
فصيلة حشرات دابة من رتبة المردبات وصف التناكب . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم اصقاع البلاد المعتدلة الحرارة || اعرف انواعها واشهرها الككويبات .

Electron
جزي . عادم الجرم اللؤلؤس يشمن الكهراة السلبية .

٢٤١٥٢ - كَوَاكِبْ ° ، عُنُجُوم البحر ، لُطْ

Lophius (S).
Baudroie, *Lotte de mer* (F). *Anglar-fish*, *Frog-fish* (E).
جنس اسماك بحرية من فصيلة الككواحيات ورتبة شالكات



كهول



كواكة مبلدة

الجنوبية . تسرح في الصباح الباكر ويقرّب الغروب . قوتها
الأعشاب والحبوب والحبوب . اجبرتها اتفاق مستطيلة
حديقة التماريح والهايزز المتفرقة اشهر انواعه
مايلي .

٢٤١٦٩ - كُوَيَاي البركازيل *Cavia porcellus* (S).

موطنه البرازيل والفرنان وويليغيا والأوروغواي . طوله
نحو ٣٠ سم . ثوبه الى الصبغة الصائبة . بطنه ابيض اللون .
يمش بجاذات عند الافراد نحو ١٥ . يألف الاماكن
الرطبة ويجاري الماء والطواف الاذغال والذبابات || اثناء
تضع من الدرسين الى الثلاثة مرة واحدة في العام .

٢٤١٧٠ - كُوَيَاي الجَنُوب *Cavia australis* (S).

موطنه امريكا الجنوبية حتى مضيق مجلان . طوله نحو
٢٨ سم . ثوبه سوي اللون احمر الطهر اثير البطن . وبره
عش مستطيل || يألف الحشبات والاذغال . اثناء تضع
مئتين في العام .

٢٤١٧١ - كُوَيَاي الهِنْد ، مختبر الهِنْد

Cavia cobaya (S), *Cobaya*, *Cochon d'Inde*, *Lapin*
d'Amérique, *Rat d'Amérique* (F).

هو الكويباي الداجن . مهده امريكا الوسطى . سلالاته
الرئيسية خمس تختلف من بعضها باختلاف وبرها بين
الطول والقصر واخشونة والنعومة والقلّة والجنابة || طوله
يراوح من ٣٠ الى ٣٥ سم . ثوبه حديد اللون التراكمة
للتباينة || طبعه طباح الارنب ويرى مثله . اثناء تلد
عدة مرات في العام الواحد .

٢٤١٧٢ - كُوَيَا *Cobra* (F).

Cobra, *Hooded-snake* (E).
الكوبرا وانجا والصل اسماء مختلفة لافى من الحيات الحبيطة
الاسمايت الاضاديد . اطلب نجا .

٢٤١٧٣ - كُوَيْك *Cobalt*

معدن ابيض اللون شديد الصلابة صعب الانصهار ثنائي
التكافؤ يريزه (كو-Co) وزنه الذري ٥٨.٩٤ ثقله
النقي ٨٩.٦ يذوب في الحامض النتريكي || لا يربط في
الطبيعة حرّاً بل مركب مع بعض العناصر . اوبس استعماله
حديثة اعصها تلون القزاز والخرف .

٢٤١٧٤ - كُوَيْن * *Galeopithecus* (S).

Galeopithecus (F), *Galeopithecus* (E).

كوين هو الاسم المائليزي . اما الاسم العلمي فيني (فر-
قرد) . جنس حيوان لبني حاشر رابل متسلق من فصيلة
الكوينيات . له ثوبان كوين مائزه وكرين القليلين .
الفارق بين الاثنين حجم ثوب . المائليزي يطول نحو ٦٥ سم .
بما فيه الذنب الذي يبلغ ٢٢ سم . بسطته نحو ٦٧ سم .
ثوبه العلوي الى الطحلة السوداء لاشيابة الماجات . ثوبه
السفلي الى الصبغة السوداء . اطراف قوائم الى السوداء
التمش بالايض . القليلين يطول نحو ٥٥ سم . وبسطته
نحو ٥٧ سم . ثوبه العلوي الى السوداء السوداء تملوها
بقشة ييضاء لامتساوية التوزيع ثوب السفلي اطراف
قوائم الى الطحلة التبراد يملوها موج اسم || سلجته الحياتي
جاهي . يسرح في الليل ويبيت في النهار متعلقاً بقائمتيه
الخلفيتين كالرولوط . قوته اغشرات والثار ولوراق النبات ||

وفصيلة الطاييات . انواعها الماصرة المعروفة عديدة منتشرة
في معظم بحار البلاد المعتدلة الحرارة || اصداها اهليلجية
الشكل ، راحة الفلج المصراعي القاطب رقيقة الصفحة
الملوثة ، عادمة الخلزنة والاريفة . اجسامها اهليلجية
مقطعية الرأس والعقب . رؤوسها قليلة الوضوح عادة
الواس .

٢٤١٥٨ - كُوَاة ، كُوَاة ، كُوَاة *Rucha* (F).

Hive (E).
هي مأوى النحل اى غليته حيث شباكها بالقصب او
بالقش .

٢٤١٥٩ - كُوَاَصِي *Rapaces* (F), *Rapacious* (E).

نعت تعريفي توصف به جوارح الطير .

٢٤١٦٠ - كُوَاَصِر *Oiseaux de proie*, *Rapaces* (F).

Birds of prey (E).
رتبة من الطير تعرف بالجارح . فصائلها واجنسها عديدة
تقسم الى فئتين كواس النهار وكواس الليل .

٢٤١٦١ - كُوَاَصِر القَيْل *Rapaces nocturnes* (F).

Nocturnal birds of prey (E).
هي جوارح الليل تشمل اليوم وصائر اجناس الطير الكواس
التي تسرح في الليل .

٢٤١٦٢ - كُوَاَصِر النَّهَار *Rapaces diurnes* (F).

Diurnal birds of prey (E).
هي جوارح النهار وتنبس صباح الطير تشمل العقاب
والصقور والسنور الع ...

٢٤١٦٣ - كُوَاَكِبِ الْبَحْر *Asteriadae* (S).

Asteriadae (F), *Asteriadae* (E).
فصيلة من شوكيات البحر . اجناسها وانواعها عديدة
منتشرة في جميع بحار العالم .

٢٤١٦٤ - كُوَيْكَل *Copal* (F), *Copal-rasin* (E).

صمغ راتنجي يستخرج من شجرة الكنتة يستعمل في صناعة
الطلاء .

٢٤١٦٥ - كُوَيْكَلِيَّة *Copala* (F).

Copala (F), *Copala* (E).

سرة فضفاضة توضع على ظهور الخيل لوقايتها .

٢٤١٦٧ - كُوَيْكَلِيَّة * *Cupania* (S), *Cupania* (F).

جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة السابديات انواعها
المعروفة نحو ٤٠ منتشرة في جميع المناطق الاستوائية ||
جميعها اشجار وشجيرات قزواء . اوراقها متعاقبة مركبة ،
شعيرة التجميع ، سنائسة النصال . ازهارها محوري
الارتكاز ، عشقوي التجميع . ازهارها ضرية متباينة
الالوان ، يكثر فيها الالبيص ثم الوردى . يزورها مأكلة
طعمها شبيه بطعم الكستناء .

٢٤١٦٨ - كُوَيْكَاي * *Cavia* (S).

Cobaya (F), *Guinea-pig* (E).
جنس حيوانات لبنة قاضية من فصيلة الشردنيات . انواعه
ثمانية . جميعها ربة الوجة ، صغيرة القد متناثلة الشكل .
رؤوسها غليظة . راسها لا مفلوكة . اذنانها قصيرة قارئة .
قوائمها متساوية الطول . اذنانها جذاع || موطنها امريكا



كُوَاة



كُوَيْك



كُوَيْك



كُوَيْن

٢٤١٨٢ - **كوتنل** ، **أطماط** (S).
 Area (F). Area (E).
 جنس أشجار مشرة من النخلات . أنواعه عديدة منها البلاد الحارة . جلدها رقيقة مستقيمة . جريدها ريشي الصف. ثمارها بيضية صناعية، لبها شائع الاستعمال الطبي لا سيما القلب البيطري || أشهر أنواعه كوتنل الكاشو .

٢٤١٨٣ - **كوتنل الكاشو** ، **أطماط الكاشو** (S).
 Area catechu (S). Area catechu, Ardequier, Noisette d'Inde (F). Area-palm, Betel-nut palm (E). Pinangpalm, Arekapalm (D). Area, Palma arec (F).
 نوع من الكوتنل جلده مستقيم ريف . ثمار بيضية الشكل والحليم ، يستخرج من لبها مادة الكاشو .

٢٤١٨٤ - **كوتنل الحبشة** ، **كوتنل إفريقي** (S).
 Brucea antidysenterica, B. salutaris, B. ferruginea (S). Brucea d'Ethiopie, Ko-sam d'Afrique (F).
 نوع من الكوتنل . شجيرة برية من فصيلة السموريات . مهدا الحبيطة وبعض مناطق إفريقية الوسطى والشمالية || ساقها تحلة فراء تملو من ١٥٠ إلى ٢٢٠ سم . أوراقها معتقة متعاقبة ، سنائية ، أبيض || تنبت من التباتات الطبية . لحاء ساقها وجنورها تحوي بعض المواد الدعنية والحواض الضوية ومادة الكوتنين || تستعمل في معالجة الزحار ودود الأمعاء .

٢٤١٨٥ - **كوتنل نحيل** (S).
 Brucea amarissima, B. gracilis, B. sumatrana (S). Brucea grêle, Ko-sam (F). Ko-sam seeds (E).
 نوع من الكوتنل . شجيرة برية من فصيلة السموريات . منها الطوي يمتد من جنوب الصين إلى ماليزيا والفلبين وإستراي || ساقها تحلة فراء تملو من مترين إلى ثلاثة أمتار . أوراقها معتقة متعاقبة أهليلجية ، أبيض || تنبت من التباتات الطبية . لحاء الساق والجذور مرة الحماق تحوي بعض المواد الدعنية والحواض الضوية ومادة غلوكوزية تدعى كوتنين . ثمارها لوزية سوداء تفلد صجبات لوزية الشكل دعنية المادة خواصها خواص الخواص || تستعمل كمشادة للميكروبات وفي معالجة الصفراء والزحار ودود الأمعاء .

٢٤١٨٦ - **كوتنل** (S).
 Psathyrella (F).
 جنس فطور كاملة التركيب من فصيلة الفاريتريات . أنواعه المعروفة قليلة المدد أعطائها بعض المناطق الجبلية المعتدة من الشرق الأدنى إلى أروبة . يعيش على اللب والفاط والفلل . ساقه دقيقة مملوءة اللون . نكهته مقلية وعلى أرويات الأشجار الحرة أغصانها السنديان ومنه اللك والفلل والمدر والدرايم . يتميز بقوة التثنية الجامدة ومجودة لحية الأنواع المأكولة || أعرف أنواعه وأشهرها الثلاثة التالية .

٢٤١٨٧ - **كوتنل أمغر** (S).
 Psathyrella spadicea (S). Psathyrella bai brun (F).
 نوع من الكوتنل . يعيش مجموعات وأزرة العدد على أرويات اللك والفلل . ساقه دقيقة مملوءة اللون . نكهته مقلية الشكل ، قطرها نحو ٧ سم . لونها إلى لفرة القائمة أو الكمية الاسمر . أطرافها إلى الكسفي الآخر الحواج || لحية كاعنة الصف ، غير مرغوب فيها .

يصلق الأشجار جفة وينقل بين أغصانها برشاقة ويقتر من جفرة إلى جفرة حلقاً في الفضاء كالملل ، من أعلى إلى أسفل ، مسافة ٦٠ أو ٧٠ متراً .

٢٤١٧٥ - **كوتنيات** (S).
 Galeocephalicidae (F). Galeocephalicidae (E).
 فصيلة حيوانات لبونة ، حشرة ، رابطة ، مفصلة ، مركزها في هرم البونات بين السيوريات والبولوطيات || أجسامها مكشوفة بنفشة أشمر ، يمتد من قاعدة البطن إلى الأطراف والقوائم والذليل ، يقوم مقام المظلة فيكسبها الانتقال جواً بين الأشجار على مسافات تراوح من ٦٠ إلى ٧٠ متراً || أصابع قوائمها مشطية الزنكاز ، لا متعاقبة . أظفارها حادة بحجة الأطراف || أنثا ثنائية الإخصاف الصدرية ، تضع جرواً واحداً يتعلق بصورها حتى النضام || لها جنس واحد يدعى كوتنن وله نوعان .

٢٤١٧٦ - **كوتنية** هي الإيدارجية ، راجعها .
 ٢٤١٧٧ - **كوة** ، **مقل** (F).
 نافذة في جدار البناء لدخول الهواء والنور . فهو قانوني إذا كان يشرق من على الطريق العام ما دام مطابقاً للأنظمة الإدارية ولكنه معطور إذا كان يشرق من على ملك الغير ولم ترع المسافة القانونية في بدهه مع أنه ان يكون مرفقاً أو مقلأ مباحاً .

٢٤١٧٨ - **كوتنل منقطة البطن** ، **كوتنل** (S).
 Cleonus punctiventris, Temnorhinus punctiventris (S). Cleonus piquet (F).
 حشرة مؤذية من فصيلة السويات . موطنها بعض أقاليم حوض البحر الأبيض المتوسط ومعظم أقاليم حوض البحر الأسود . تألف الملقح التي توجد فيها السميتيات . غنائها تقضم الأوراق . يرقاتها تركب الجلود فتتجها وتضوها || جسمها معتدل الحجم ، أهليلجي اللون ، بطول من ١٦ إلى ١٨ م . ثوربا العلوي إلى الكهبة يملو موج اشجع . ثوربا السفلي إلى الكهبة السمراء يملو تنقيط أفر . رأسها يرمي الشكل ينقيط ينظم غروطي ناشز الكظر . زباناها مرفقيان ، وشيا الأطراف . الأنيق أبيض قدام من الذكر وأطول خلفه منه || لها جيل واحد في الجيل . تخرج الحشرة الجملة من استكانتها الشتوي في أواخر نيسان . تسرح في النهار . تباهر متع اللكن بمد ظهورها بنحو عشرة أيام . قترزة في التربة قرب استاخ التباتات المعلقة || البرقة مرفقة ، بطيئة النمو ، تبلغ الكوال الجسودي بعد الثنت بنحو حشرة أسابيع . جسمها بطول نحو ٢٠ م . وهو أسطواني الجسم ، مقوس الشكل ، أبيض اللون ، تنبت الحواج . وأنها مستطلة ، مكدور ، اسمر || طور الأكامل يستمر نحو عشرة أيام وينقضي في التربة .

٢٤١٧٩ - **كوتنل** (F).
 Caoutchouc (F).
 هو المطاط ، أظله .
 ٢٤١٨٠ - **كوتنين** هي البشريين ، أظله .
 ٢٤١٨١ - **كوتن**
 كوتن الزرع وكل نبات حولي : فاق الأدياس وصار على أربع ورفات أو خفا .



كوتن منقطة البطن



كوتنل الكاشو



كوتن أمغر

کوئن کندول - کوڈاین



کوئٹہ کنسل



کوثر غمل



کوچہ



كودانة جاوا



کمدانہ رولفی



کودانه سولانی

متفككة تلوح بالحاء لفتحت ويسقط ۥ وهو حل
نصفيات بقع حطوية لا كاسية مستطيلة تركب الحاء
تقتب جفاتها وتصلها وتتصاها بالحرف . وبعد ذلك
خمسة أو ثمانية اسابيع تنفلق الحاء باسفلاتها وتظهر حل
الشقوق الشايل فطرية رمية قطرها نحو المليمتر لونها براوح
من الابيض الى الوردى . ۥ كالتفكك والاستئصال وبطلان
الجروح بعد تطهرها .

٢٤١٩٥ - كُودَاكَة رُولِيْم، ٥٠*

[illegible]

٢٤١٩٦ - كُودَانَك سُولَايِي * ، رِيْزُوْكَتُون
اَسُوْدَه

Corticium solani, C. vagum, Hypochynus solani, Rhizoctonia solani, R. rapae, R. betae, R. napi (S). Rhizoctone noir, Maladie des collerettes, M. des manchettes, Varlole des tubercules, Chancres du pied (F). Black speck, Collar rot (E). Wurzelst ber-Krankheit (D).

نظر جمهوري يتطلّح على البطالة وصل أكثر من ٢٠٠ نوح
في المحافظات، لتتصّل إلى ٦٦ فصيلة. يكثر في المناطق
المختلطة العربيات، يسبب البطالة في الإكثار فيليبيا وبركها
في الحقول فيعمل أصحاب القطن والبندورة والبطانيات.
يعتبرون في البطالة المزروعة وشاح متكبتيه اغبر الذين
يعتبرون الذين والجارو والسوق في سطح الزرية فيعملها
فيبقى في صلابتها مرتقي وتعود وتبلى اوتريها.
هو على درن البطالة المقلقة وشاح مبيحي ايفس الذين
متكبتيه التراس تتصله فروح الإهمية أنشكك والهم
في السمره طفت النسيج الإهمية في كل مكان
لشمال، مديكات طفت النسيج او املح الزيق.

Corticisone (S). كورتيزون - ٢٤١٩٧ °

Corticaceae (F), Corticaceae (E).
 صليبة تطور مجهرية من رتبة النماميات تتميز بتحتها
 الفانار. نكتتها لمساح السطح او زباد، دقيقة الحلب .
 غشيتها فوفية التركيب او شمعية . بويقاتها ثنائية
 جنسا وانواعها قليلة المدد اعرفها الكودانة .

Codéline (F). كوداين، كودين ٢٤١٩٨

مادة قلوية بلورية متباعدة عديمة اللون تستخرج من
اللافيين. تغلي عند 100°م. وهي قليلة اللزوجة في
الماء. تلوّب في الكحول والكلوروفورم والهزين وسلفور
الكربون.

۲۴۱۸۸ - کَمَلَتِ کُنْدُوبُلُ*

Psathyrella candolleianum (S).
Psathyrella of Candolle (F).
 نوع من الكوثر. يتكاثر وجوده في بعض غابات أروية
 تركية. يعيش على التبال في الأراضي الجبلية. ساقه
 دقيقة، رفيعة، غبراء اللون، تكتمت مظلية الشكل،
 غبراء اللون يعلوها موانج اسفراء تشبه صفرتة وتسمى عند
 التمرس، قطرها نحو ٧ سم. أطرافها وريدية اللون ||
 لطيفته من الصنف مأكولة.

٧٤١٨٩ - كَوْنِ مُغْمَلِي ٥٠*

Psathyrella velutina (S). *Psathyrella veloutée* (F).
 ينمو من الكؤوس. يعيش على الدبال في المراعي الظليلة.
 ساقه دليقة ، سمراء اللون ، خلية الزغب حتى
 واسط الزام الرابع . لكتة مظلية الشكل ، لامتساوية
 السطح الخمل الزغب ، فطره نحو 5 سم . لونها ال الكسني
 لاصفر المواي الخميته جيدة الصنف ، مأكولة .

۷۴۱۹۰ - کَوَاجِر * ، بُؤْمَاء ، اُسْدُ اُمْرِیْ .

فيلس concolor (S). Puma, Puma concolor, Cougar, Leopardus concolor, Lion argenté, Lion d'Amérique (F). Puma, Cougar, American Lion (E).

حيوان مفترس ويسمى أيضا البشمير والزعرم من فصيلة السنوريات. موطنه البلاد الأمريكية. شكله يشبه الفيلب. طوله المأخوذ من الجبهة إلى الذنب ٢٠٠ سم، جسمه ١٤٥ وذيته ٦٥ أما ارتفاع كتفه ٦٥ سم. ثمرة إلى العسلبة السوية المتأخرة يقيم مع اقترابه من الظلم ويهرب عند البطلن. زوره أبيض اللون وشفته العليا كذلك ٥ يألف الإسراج الكثيفة المائية. يسكن الأشجار غنقة غنقة ويقتفي وقت استراسته عليها ٥ قوته ما استطاع اقترابه من الحيوان والطيور. يسرح عند الغدوب في الزمان الخيل وعند الفجر ٥ انه تقصم من جبرود واحد إلى آخر لآفة شمير النور ٥ بعد وضعها بقسمة أيام يتراقصها بها عبر لآفة شمير النور ٥

Planche à semis (F). ٢٤١٩١ - كَوْد ، كَوْدَة

هي الشربة أو المسكبة سطح ترابها ورفعت حروفها
وحضرت لاقتبال الزور. ج اكواد.

Entasser (F). To hoard up (E). كَوَّد - ٢٤١٩٢

كوْد التراب . جمعه وجعله كثبة مسطحة .

Corticulum ۶۵۱۹۳ - کُودانہ ۵

جنس فطور مجهرية من فصيلة الكوديات . انواعه عديدة تتطفل على مختلف اعضاء النبات وعلى الاغصان الجافة المصنوعة || مظهره الخارجي لباد مشجي كيف للتجميع يلحف الاغصان الموصومة ثم يوشها بقروصه الخفيفة اللون الغليظة النشاء || اشهر انواعه ما يتم .

٢٤١٩٤ - كُمُودَالِه جَاوَا * ٥

Corticium salmonicolor, C. javanicum, Nectora
decreta (S).
تظهر مجهرى يعيش في المناطق الحارة. يتطفل على عدة
نباتات أعصها الهيبة والبن والكاكاو والخمضيات والسط
والكينا والمنفا... || يركب الافناد عند انتشابه على
الاصغان والافصان عند انتشابه على الجلعون على الجهة
الاسفل المغرشة لاشعة الشمس || مظهره الحاربي بنور
مستدرة كيفية التجميع تتحول الى قروم جافة صلبة

٢٤١٩٩ - كودو *، كوسان *

Pachyrhizus (S). *Pachyrhiza*, *Pachyrhiza* (F).
كودو هو الاسم الهندي وكوسان الاسم الشائع في ملقة .
جس نباتات جنينة عارضة ومعمرة من فصيلة القرنيات
الغريانية . أنواعها المعروفة قليلة المبد منها الحد الصينية
وملقة . تزرع نباتات حولي لجلاء جلودها || سوفها
عارضة كالديباء . أوراقها معتقة مركبة من ثلاث وريقات
قلبية الشكل . أزهارها عتقوية التجميع ، أبطي الارتكاز .
أزهارها صيرة بنفسجية اللون ، مستقيمة الأبر . سفاتها
مستطيلة ، محدلة التبطيط || حبوبها تتركز خضراء ومطبوخة .
جلودها شبيهة بالكربن وتوكل طازية ومطبوخة .



كودو

٢٤٢٠٠ - كودس
بجودة المقاتل الرسمية وهي تحوي وصف الأدوية وتركيبها .

٢٤٢٠١ - كودن
هو البهل المشترك من الحسان والآلات ومنهم من سماه النخل .

٢٤٢٠٢ - كودن *
Croiser (F). To cross

٢٤٢٠٣ - كودكة *
Croisement (F).
Cross-breeding (E).

٢٤٢٠٤ - كودو *
Strepsiceros (S).
Strepsicère, *Coudou* (F). *Kudu* (E).

جس حيوانات لينة عارية عترة من فصيلة الابلات .
له نوعان موطنها يتعد من الصومال الى الحبشة والزيبيز .
بعض اصناف اترقية الجنوبية || ملجنيا الحياتي .
اجسامها كبيرة اللد تنبذ . بقروها القلبية المستطيلة .
اناثها جاء . ضرورها ثنائية الاختلاف . عيها يستمر
نحو ستة اشهر تقص في تمامه مفعورا واحدا .

٢٤٢٠٥ - كودو الحبشة *

Strepsiceros imberbis (S).
Strepsicère imberbe, *Coudou de l'Abysinie* (F).
نوع من الكودو . موطنه الحبشة والصومال . يألف الاثام
والغابات التي يجتازها مجاري الماء . يسرح في النهار ويبيت
في الليل في مواقع معينة قلما يغيرها || جسمه كبير اللد
يطول نحو ٢٦٠ سم . بما فيه اللد الذي يبلغ نحو ٤٠ سم .
ارتفاعه نحو ١٢٠ سم . قرنه لويبي الشكل يرتفع نحو
٦٥ سم . ثوبه الى الشقعة السراء المتفاوتة الموج بين الرأس
والظهر والصدر والبطن . وهو عادم المبرة والحلال الابيض
في الجبة انما يملو من الحاروك الى الكفل خطوط متعرجة
بيضاء مدها ١٥ سنته الذكر ١١٠ سنته الانثى . قوته
شديدة النشط وسرعة عتو تفوق سرعة كودو الرأس ||
اجله يتألف من اربعة ذكور مائة وثمان اناث وثمانية
شودان .



كودو الحبشة

٢٤٢٠٦ - كودو الرأس *

Strepsiceros capensis (S).
Strepsicère du Cap, *Coudou du Cap* (F).
نوع من الكودو . موطنه يمتد من رأس الرجاء الصالح الى
الحبشة والصومال . يألف الغابات والاحراج . يسرح في
النهار ويبيت في الليل || جسمه كبير اللد يطول نحو
٣٣٠ سم . بما فيه اللد الذي يبلغ نحو ٥٠ سم . ارتفاعه
نحو ١٣٥ سم . قرنه لويبي الشكل . ارتفاعه السنوي
نحو ١١٥ سم . والمسافة بين طرفي القرنين نحو ١١٠ سم .
ثوبه الى الشقعة السراء . عتو شديدة السمرة تمتد من قة

الرأس الى قاعدة اللدب . ويملو من الحاروك الى الكفل
تسمة خطوط متعرجة ، بيضاء اللون ، لامشوية الطول .
عيها لوزيتان ، بارتان . اذناه كبيرتان . ويحصل في
اجل قصبة الالف حلال ابيض ينتهي عند المائي . قوائمه
صلبة . شديدة النشط || اجله يتألف من ذكربين مائين
واربع اناث واربعة شودان .

٢٤٢٠٧ - كودو العبيد
هو الشيط الحيفي ، اطلبه .

٢٤٢٠٨ - كودب
Uranoscopus (S).
Uranoscopus (E).

جس اسماك بحرية يرضة من فصيلة الترغونيات وربة
شائكات الزعانف || انواعها المعروفة قليلة الممد اعطائها
بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة اللد
او متوسطة . تتميز بروسها المنصبه الاشداد || عيونها
الحامية الارتكاز الاقني وبزمانها الشائكة المناس
الحادة || تعيش مدفورة في الرمال والاسمال لا يظهر منها
سوى طرف الزعنفة الظهرية الاول وهي شائكة المناس
المسة || اعرف انواعها واشهرها الكورب الاخش .

٢٤٢٠٩ - كودب الحفش ، اشتراب ابيض ،

Uranoscopus scaber (S).
Uranoscope raboteux, *Rascasse blanche*, *Rat* (F).
Uranoscopus scaber (E).

نوع من الكورب . سمكة بحرية بيوض من فصيلة
الترغونيات . اعطائها البحر الابيض المتوسط || جسمها
اعليجي الشكل بطول نحو ٣٠ سم . رأسها غليظ ، كبير ،
مضغ ، منتصب الفك ، مستعرض الشق ، مراكب
الزوايق الطمية . عيناها اقنيتا الارتكاز تحتلان قنة
الرأس . زعانفها كبيرة شائكة . زعنفتها الظهرية الاول
ناشرة المناس الصلبة اللرية المسمة . مناس اسفله
مسمة ايضا || ثوبا اللوي الى الريدة السراء تملوها
رقشة حنطية زاهرة . جانباها الى الريدة الفضية الموج .
بطنها الى البياض الاغبر || لها كامن الصنف ، قل
من يرب فيه .

٢٤٢١٠ - كودريل
هو الكنو ، اطلبه .

٢٤٢١١ - كودرة
Crò, *Cru* (F).
Growth, *Country* (E).

منطقة معينة تميزت بجودة بعض صفات محاصيلها الزراعية .
ج . كور .

٢٤٢١٢ - كودريل
جس نباتات عشبية من فصيلة الناريديات انواعها المعروفة
١٢ منها البري والزيبي والحولي والمسر . سوفها فراج
تعلو من ٣٠ الى ١٨٠ سم . أوراقها مركبة متعاقبة .
أزهارها نفاطية عتقوية متجميع . ثمارها يرضية
الشكل ، مستديرة الثنايات . اشهر انواعها .

كودريل الصفوف .
P. rupestris (S). *P. des rocaillies* (F).
كودريل سيرة
P. siberica (S). *P. de Sibirie* (F).
كودريل كعب للفرال
P. scabiosaefolia (S).
P. à feuilles de scabieuse (F).

٢٤٢١٣ - كودوس زودو *
Coreus scapha (S).
Coreus esquif (F).
حشرة خاضعة من فصيلة الكورسيات . جسمها مترسط

Coryza (F).

٢٤٢٢١ - كُورِيَّاتَا

هي التهاب غشاء الانف .

Chortzema (S).

٢٤٢٢٢ - كُورِيَّاتَا

Chortzema (F). Tango plant (E). Kōrisemapfanzee (D). Chortzema (I).

جنس نباتات عشبية وبشبية من البذرليات وفصيلة القرنبيات . أنواعه قليلة منتبهاً أستراليا ، بعضها زراعي تزييني اشتهر :

Ch. dicksonii (S).

كُورِيَّاتَا ديكسونيه

Ch. de Dickson (F).

كُورِيَّاتَا ليلية

Ch. cordatum (S).

Ch. en cœur (F).

كُورِيَّاتَا موشحة

Chorisia (S). Chorisia (F). ٢٤٢٢٣ - كُورِيَّاتَا

جنس اشجار حرجية من فصيلة الزيفيات . أنواعها المعروفة قليلة العدد ، منها بعض المناطق الاستوائية اخصها امريكا الوسطى والجنوبية || اشجارها كبيرة ، دائمة ، تنمو من ٢٠ الى ٣٠ م . أوراقها ناعمة ، مركبة ، خاسية الورديقات البيضاء الشكل ، الجالدة النصال . ازهارها خشنة ، خاسية البتلات ، عديدة الاندية . ثمارها خضراء ، مستطيلة ، تحوى حبة بيض زرقاء زغب نام ، قصير الثبلة ، قلاً يصلح للقول . يزورها مأكولة بعد التخميس .

٢٤٢٢٤ - كُورِيَّاتَا هِي الصليب ، اظليه .

Courisque (F).

٢٤٢٢٥ - كُورِيَّاتَا

جنس طير من الببغاوات مشهور باسم امزونة ، اظليه .

٢٤٢٢٦ - كُورِيلُوس ، جِلُوزِيَّاتَا

Corylopsis (S). Corylopsis (F).

جنس جنبايات معمرة من فصيلة المشركات . أنواعه عديدة . اصطلحها الصين واليابان . دعوا جيلوزية لانها قريبة الشبه من الجلولوز . سيقانها فراء . أوراقها حلابة . ازهارها سنبل التجميع يستبق الاوراق . ازهارها صفراء ملونة عريضة الرائحة . اشتهر أنواعه ما يلي .

٢٤٢٢٧ - كُورِيلُوس سَبِيلِي

Corylopsis spicata (S). Corylopsis en épis (F).

جنية سبروية تزيينية منتبهاً اليابان تنمو نحو ١٢٠ سم . ساقها وفروعها زياد اللحاء . أوراقها بيضيه النصل ، خالية الصفحة السبل تنطوي من ٥ الى ٨ سم . ساقها سباحية او تساعية الازهار تنطوي نحو ٥ سم . || ازهارها يستمر طول شهر اذار .

٢٤٢٢٨ - كُورِيلُوس سِينِي

Corylopsis sinensis (S). Corylopsis de Chine (F).

شجيرة سبروية تزيينية منها الصين تنمو من ٣ الى ٦ متر . ساقها فراء . أوراقها أحليجية الشكل ، نصلها ينطوي من ٨ الى ١٠ سم . ساقها سباحية او تساعية الازهار تنطوي نحو ٨ سم . || ازهارها يستمر طول الربيع .

٢٤٢٢٩ - كُورِيلُوس قَلِيل الزهر

Corylopsis pauciflora (S). Corylopsis pauciflora (F).

جنية سبروية تزيينية منتبهاً اليابان تنمو نحو ١٠٠ سم . ساقها فراء . أوراقها تنطوي من ٣ الى ٦ سم . وتعرض من

القد والتبليط ، شبه مربع البطن ، مزاني الكوس ، ينطوي نحو ١٣ م . رأسها محرم . غطها مستدل الطول . ازهارها نازلة . منها سبروتان ، بارزتان . زباناها مستطيلتان . كوسها مزاني الجانبين || ثمرها الى الخنطى الاسمر الجلودى المزاج . ثمرها ملوح بالاسفر . الصفحة السبل من صدرها وثمرها الى الخنطى الثبري المزاج || مسرحها الجباري حيث تكثر الاشباب والازهار .

٢٤٢٢٤ - كُورِيلُوسَاتَا

Coraidés (F). Coraidés (E).

فصيلة حشرات من رتبة مختلفات الاجنحة وطبقة نصفايات الجناح . اجناسها والوانها عديدة منتشرة في جميع اصقاع العالم باستثناء المناطق القطبية || اجسامها متباينة الحجم والاشكال . رؤوسها محرمة أو مربعة . قرونها الاستشعارية رباعية الفصل . صفحات صدرها السلسل لاقبسية التغدية الممد لاستيعاب الاخطام || جميعها من الحشرات الخاضعة القليلة الاذى .

٢٤٢٢٥ - كُورِيلُوس

Eurypyga (S). Caurale (F). جنس طير من فصيلة الكورليات . أنواعه المعروفة قليلة العدد . ساقها ينطوي كامل امريكا الجنوبية . اجسامها رفيعة . مناقبها جالسة مستقيمة الاطراف . اجنحتها مستعرضة ذرية . اذنانها مستطيلة القد عريضة الراف . ارساغها رفيعة وديقة . ارياشها رطلة . ثمرها سراكبة الالوان الزاهية || اشتهر أنواعه واشهرها كُورِيلُوس الشمس .

٢٤٢٢٦ - كُورِيلُوس الشمس ، بَلَشَرِيَّاتَا الشمس

Eurypyga helias (S). Caurale soleil, Héron soleil (F).

طائر من الكورليات طوله نحو ٤٤ سم . قويه مؤرثش الالوان يجمع بين الالوان الاصفر والاحمر والاسود والابيض والاسمر والخنطى . زوره ويحصره مع غطها الى البياض الناصبي . عنقه مؤذن بالاسمر والاسود . ظهره وسفاهه مجملية بالالوان والاسفر . اذنيكه وذنبه وقواديه واباهره وسناكه مغطاة بالابيض والاسود . صدره وبطنه الى البياض الخنطى . صدقة عينه حراء اللون . منقاده وسفاده صفر || موطنه امريكا الجنوبية ، يائث الاضوار ويجاري المياه . قوته الحشرات حل اختلاف أنواعها || يدرن في الاشجار المشدنة الفتاه . يحملك منه بالخشيش ويطنه بالسمل والطين . اثناء تخضن من يهضمين الى ثلاث يهضات نحو ٣ ايام .

٢٤٢٢٧ - كُورِيلُوسَاتَا

Eurypygidae

فصيلة طير تجمع بين الخنطى وطول الساق . رؤوسها واصنافها واجنحتها بلشورية الشكل ، مناقبها وسفاتها نفقية . موطنها امريكا الجنوبية . تأث الاضوار ويجاري الماء . قوتها الحشرات حل اختلاف أنواعها .

٢٤٢٢٨ - كُورِيلُوس

Tige souterraine bulbeuse (F). Corm (E).

نعت تعريفي توصف به الساق النوصية الديماسية .

٢٤٢٢٩ - كُورِيلُوسَاتَا

Corydale (F).

هي الثبرية ، نبات من الخشخاشيات ، اظليه .

٢٤٢٣٠ - كُورِيلُوسَاتَا

مادة قلووية عادمة اللون مرشورية البلورات تستخرج من جذور الكوريدال اتراروند . تنطوي عنه ١٣٤ سم . وهي قليلة اللوان في اللد . تلوب في الكحول الساخنة وفي الكلوروفورم والايتر .



كُورِيلُوس



كُورِيلُوس



كُورِيلُوس سَبِيلِي

٢٤٢٣٨ - **كُوشَج** هو القرش ، اطليه .

٢٤٢٣٩ - **كُوشَجِيَّات** Scyllorhinidae (S).

الكوشيات فصيلة أسماك بحرية تدمي أيضاً غراليات ، اطليها .

٢٤٢٤٠ - **كُوشَل** Corselet, Pronotum
هو في الحشرات الحلقة العليا من مقدم الجوشن .

٢٤٢٤١ - **كُوشِي** Cucurbita pepo ovesera (S).
Courgette (F). Vegetable marrow (E). Elerkürbis, Kürbis (D). Zucca, Z. da mangiana (I).
نبات زراعي من فصيلة القرعيات ، فروبه وأصمراء عديدة ، زراعتها مروية . ثمارها مستطيلة تركل مطبوعة . وثمار الكوشى تحوي نحو :

٩٥,٠٠ ٪ من الماء
٨,٠ ٪ من المواد البروتينية
٣,٠ ٪ من المواد الدهنية
١,٤ ٪ من المواد السكرية
٢,٧ ٪ من المواد التشوية
٥,٠ ٪ من الألياف

وي تحوي أيضاً بعض الألاح المعدنية اعصها الكليسيوم والجليد مع القليل من الفيتامين ١٥ والقليل القليل من الفيتامين ٥ .

٢٤٢٤٢ - **كُوشِي الفرتنجي** Chayote (F).
هو الكيوسم ، نبات زراعي من القرعيات ، اطليه .

٢٤٢٤٣ - **كُوش** Appariar (F). To couple (E).
كوش الطائر أثناء سفدها والكرش سداد الطائر .

٢٤٢٤٤ - **كُوش** Conyza dioscoroides (S).
Conyza, Conisa, Conisa (F). Ploughman's spike-nard (E). Dörrkraut (D). Coniza (I).
نبات حشوي بري طبي معمر من فصيلة المركبات . يملكه تملون من ٤٠ الى ٨٠ سم . ساقها خشوية فراج . اوراقها منقطة احليجية ، نصلها أزغب البشرة على سطحه . ازهارها الى البياض الأخير || يستخرج منه بعض المواد الطبية الصحية وهو يحوي بعض العناصر الجسالية الغلابة التي تملكه بالخرات اعصها البرايت .

٢٤٢٤٥ - **كُوشَاد ، جَنْشِيَّات ، جَنْشِيَّاتَا** Gentiana (S). Gentiane (F). Gentian (E).
جنس نباتات جنينية وعشبية من فصيلة الكوشاديات . انواعه نحو ١٢٤ معلها بري وبعضها زراعي وزئفي وبعضها طبي . يستخرج من جلور أكثر الانواع مر الكوشاد ويحاصل الكوشاد وصباغ الكوشاد . يجلور بعضها تحوي نحو ١٥ ٪ من السكر الذي يستخرج منه بمد التصهير نوع من القنديل الجيد الصنف || اعرف انواعه واشهرها ما يبيع .

٢٤٢٤٦ - **كُوشَاد أُرْجُومَالِي** Gentiana purpurea (S). Gentiane pourpre (F).

نوع من الكوشاد وهو بجلة جبلية مدولة تملن من ٢٠ الى ٦٠ سم . اوراقها لاطئة متعاقبة سنائية ، نصلها بطول نحو ٢٠ سم . ويرض نحو ٥ . ازهارها طريقة الارتكاز ، قصيرة الممايق ، أرجوانية اللون ، سفاه الملاج . توجيها جري الشكل سداسي التخصيص المستعرض || ازهاره يستمر من تموز الى ايلول .

٢ الى ٤ . سنايها ثنائية او ثلاثية الازهار || ازهارها يستمر طوال شهر آذار .

٢٤٢٣٠ - **كُورِيلُوس مُسْتَعْرِض البِتَلَات**

Corytopsis platypetala (S). Corytopse à pétales élargis (F).

جنينة زينة مهدا الصين تملن من ١٠٥ الى ٢٥٠ سم . سنايها ميمرة القروع ، خلية الجعد . اوراقها يمسبة الشكل ، لصاها خلية المسحة السفلى بطول نحو ١٠ سم . سنايها خسية او سبانية الازهار بطول من ٣ الى ٥ سم . بتلات ازهارها نأسية الشكل مستعرضة || ازهاره يستمر طول فصل الربيع .

٢٤٢٣١ - **كُورِيلُوس** Loriculus (S). Coryllis (F).

جنس طير من التسلقات وفصيلة البهارات . انواعه المعروفة قليلة البعد موطنها ماليزية وجزر الزايج . ملجنها الحياتي جامعي الا في زمن التساقط واخضاعة . تألف الغابات . قوتها الثار حل اختلاف اجناسها وانواعها || اجسامها صغيرة القد ، اثوابها جميلة الالوان الزاهرة . تتميز بقصر اذناها المستديرة الاطراف . ومن ميزاتها ايضا انها تتعدل كالغافيش عند النوم .

٢٤٢٣٢ - **كُوز** Strobila (F).

Scrobile, Pine-cone (E).
نمت تعريفي يطلق على الثآير الكروزية الغرومية الشكل ، الورقية او اللبنة القشور .

٢٤٢٣٣ - **كُوز كَنْدَم** Mangoustaniar (F).

هو جزر جندم ، اطليه .

٢٤٢٣٤ - **كُوزَن** Daine (F). Don (E).

في اثني الايل الاسمر او الاريل .

٢٤٢٣٥ - **كُوزُو** Trichosurus (S).

Trichosure, Kousou (F). Kousu (E).
جنس حيوانات لبونة من الجرابيات الفشارجات وفصيلة الفلتجريات . موطنه استراليا . تألف الاجراج اعصها اجراج الاراكاليديوس . قوته الوراق والازهار وبيض الصافير والمصافير والخرات . يصرح في الليل ويرقد النهار || جسسه صميم جسم السور البري . رأسه غروفي الشكل . اذناه فاشرتان . غروته خسية الاصابع متحدة الارتقاء || اثناء رباعية الاختلاف . له نوعان التعلبي والتكليبي .

٢٤٢٣٦ - **كُوزُو تَعْلِي** Trichosurus vulpecula (S).

Trichosure renard, Kousou renard (F).
نوع من الكوزور شكله شكل التعلب ، حركاته السنجاب . اذناه كيرتان فاشمتان . ذنبه جل الصوف المستطيل . ثوبه الى الصبهة الشهاب يطوها مواج صناعي يميل في الظهر ويغير في الاطمين والبلن .

٢٤٢٣٧ - **كُوزُو كَنْبِي** Trichosurus caninus (S).

Trichosure canin, Kousou canin (F).
نوع من الكوزور لا يختلف من التعلبي الا باذنيه المدونين ويشكل الرأس الذي يشبه رأس الكلب وبذنيه القصير الصوف . ثوبه خال من المواج الصناعي تملن مشعة سمراء .



كوشى



كوش



كوشاد أرجواني

٢٤٢٧ - كُوشَاد أَصْفَر * ، جَنْتِيَانَا صَفْرَاءُ

جَنْتِيَانَا صَفْرَاءُ ، دَوَاءُ الْحَمِيَّةِ

Gentiana lutea (S). *Gentiane jaune*, *Grande gentiane* (F). *Yellow flowered gentian* (E). *Gelber Enzian* (D). *Gentiana glabra*, *G. maggiore* (I).

نوع من الكوشاد وهو جنة ممررة جسامدة طيبة وصناعية تملو من ٥٠ إلى ٢٠٠ سم. أوراقها لاطفة متقابلة تطول نحو ٢٠ سم. ويعرض ١٥، نصلها طسي الصفحة جبل الخضار. أزهارها غسمية التجميع، أبوية وتاجية الارتكاز، مستطيلة المالمين، خمسية أبتلات التجميع الشكل والتأشباح، لونها إلى الصفرة || جلودها وافرة المواد الطيبة والعصاوية والسكرية. أزهارها يستمر من حزيران إلى آب.

٢٤٢٨ - كُوشَاد رَيْسَمِي *
Gentiana printanière (F).

نوع من الكوشاد وهو عشية برية مبلولة تملو نحو ١٥ سم. أوراقها صغيرة اللقد تطول نحو ٣ سم. ويعرض نحو ١ سم. أزهارها طرفية فردية مستحوية اللون، توتيجها خامي التخصيص يطول نحو ٣ سم. || أزهارها يستمر من آذار إلى تموز.

٢٤٢٩ - كُوشَاد صَلْبِيَّي الْوَرْدِ

Gentiana cruciata (S). *Gentiane croisetia* (F).

نوع من الكوشاد وهو عشية مبلولة ممررة تملو من ٢٠ إلى ٥٠ سم. أوراقها غسمية رباعية متقابلة تبغو كالصلب. نصلها يطول نحو ١٠ سم. ويعرض نحو ٢ سم. أزهارها أبوية الارتكاز غسمية التجميع كثيرة المدد زرقاء اللون. توتيجها رباعي التخصيص || أزهارها يستمر من حزيران إلى أيلول.

٢٤٣٠ - كُوشَاد لَبْنِيَّي * ، جَنْتِيَانَا لَبْنِيَّةِ

جَنْتِيَانَا لَبْنِيَّةِ

Gentiana asclepiadea (S). *Gentiane-asclepiade* (F). *Milkweed gentian*, *Willow gentian* (E). *Würger-enzian* (D). *Gentiana asclepiade* (I).

نوع من الكوشاد وهو جلة ممررة طيبة وصناعية تملو من ٣٠ إلى ٧٠ سم. أوراقها لاطفة متقابلة سنانية الشكل؛ نصلها يطول من ٥ إلى ٨ سم. ويعرض من ٢ إلى ٥ سم. عروقه بارزة ثلاثية أو خمسية المدد. أزهارها مستحوية اللون مرتقلة بالنفسي. جلودها وصفها غزيرة العصاراة القلبية السمانية || أزهارها يستمر من آب إلى أيلول.

٢٤٣١ - كُوشَاد مَكْرِي

Gentiana acaulis (S). *Gentiane acaule* (F).

نوع من الكوشاد وهو نجمة زرقانية مقررة، فروجها تملو نحو ١٠ سم. أوراقها لاطفة متقابلة تطول من ١٠ إلى ١٢ سم. أزهارها كبيرة اللقد، فردية التجميع، تملو من ٦ إلى ٨ سم. لونها إلى الزرقة المستحوية || أزهارها يستمر من تموز إلى آب.

٢٤٣٢ - كُوشَاد مَهْدَب *
Gentiana ciliata (S).

Gentiane cilide (F).

نوع من الكوشاد وهو عشية سبروتية تملو من ٢٠ إلى ٣٠ سم. ساقها فراء رباعية التصلع. أوراقها لاطفة متقابلة، نصلها شيق الصفحة وحيد الفرق. أزهارها زرقاء اللون، طرفية الارتكاز، فردية التجميع، تطول من ٤ إلى ٥ سم. توتيجها رباعي التخصيص، مهدب الخمار والحلقة. أزهارها يستمر من آب إلى تشرين.

٢٤٣٣ - كُوشَاد بَات ، جَنْتِيَانَا بَات

Gentianaceae (S).

Gentianaceae (F). *Gentianaceae* (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين وسيدات القمالة. أنوارها نحو ٥٠٠ تلتقي إلى ٦٠٠ حباً. جميعها أشباه وسينات صغيرة اللقد. أوراقها لاقامية الشكل والانتظام. أزهارها عشوية لاقامية التجميع يكثر في ألوانها الأزرق والأرجواني.

٢٤٣٤ - كُوشَر *
Pluchea (S). *Pluchée* (F).

Ovre-bla (E). *Ovralakorn* (D). *Pluchea* (I).

جنس نباتات برية ممررة من فصيلة المركبات. ألوانها نحو ٢٠ أصنافها المناطق الحارة في جميع أمصاق العالم. نباتات عشية أو مجلية. أوراقها متعاقبة. أزهارها طفقة التجميع.

٢٤٣٥ - كُوشَتَمَة *
Dendrométrie (F).

Forest mensuration (E).

تقدر أشجار الحرج مع أبعادها وأشكالها وأعمارها وسالتها الحاضرة والمستقبل.

٢٤٣٦ - كُوشِيل
Cochenille (F).

هي القرمزية، أظلمها.

٢٤٣٧ - كُوشِيل أَسْتَرَالِيَّةِ

Cochenille australienne (F).

هي القرمزية الأسترالية، أظلمها.

٢٤٣٨ - كُوشِيل الْبُرْتَقَالِ الْبَيْضَاءِ

Cochenille blanche des orangers (F).

هي قرمزية البرتقال البيضاء، أظلمها.

٢٤٣٩ - كُوشِيل الْبُرْتَقَالِ الْسَوْدَاءِ

Cochenille noire de l'oranger (F).

هي قرمزية البرتقال السوداء، أظلمها.

٢٤٤٠ - كُوشِيل الْفُخَّاح

Cochenille du pommier (F).

هي قرمزية الفخاخ، أظلمها.

٢٤٤١ - كُوشِيل الْتِينِ

Cochenille du figuier (F).

هي قمية التين، أظلمها.

٢٤٤٢ - كُوشِيل الصَّبَارِ

Cochenille du nopal (F).

هي قرمزية الصبار، أظلمها.

٢٤٤٣ - كُوشِيل الْكَلِّ

Cochenille de la laque (F).

هي قرمزية الك، أظلمها.

٢٤٤٤ - كُوشِيل الْكُورِ

Cochenille de l'amandier (F).

هي قرمزية الكور، أظلمها.

٢٤٤٥ - كُوشِيل النَحِيلِ

Cochenille du dattier (F).

هي قرمزية النخيل، أظلمها.

٢٤٤٦ - كُوشِيل الْوَرْدِ

Cochenille du rosier (F).

هي قرمزية الورد، أظلمها.



كوشاد اصفر



كوشاد ريسمي



كوشاد لبني



كوشاد مهدب



كوش

٢٤٢٧٧ - كوشنيل سان جوزيه

Sabulicole (F).
نمت ترمي في طلق كل دوية او حشرة او نبات يعيش في كوشنيل الرمل وكتبانه .

٢٤٢٧٨ - كوشنيل طوطية

Cuphaea (S).
Cuphée, Cuphée (F). Cigar flower (E). Hückerkelch (D). Cufée (I).
جنس نباتات عشبية خشبية من فصيلة الخناثيات . انزاعه نحو ٨٠ اصنافها البلاد الحارة الاسيوية . اوراقها صغيرة متقابلة . انزاعها محورية الارزكان ملونة تتميز باحديداب كوشنيل وبكبر بتلاتها العليا || اعرف انزاعها واشهرها ما يلي .

٢٤٢٧٩ - كوشنيل بنفسجية

Cuphaea cyanea (S). Cuphée violes (F).
نوع من الكوشة الازرقية المعمرة تملو نحو ٢٠٠ سم . ساقها زاه . اوراقها متقابلة بيضية ، نصلها ذات الزام الاخير . كوشنيل انزاعها خلية البشرة . ارجوانية الانتشاب صفر الجسم . بتلاتها ثنائية ، كبيرة القند بنفسجية اللون . انزاعها يستمر من تموز الى ايلول .

٢٤٢٨٠ - كوشنيل سلقونية

Cuphaea miniata (S). Cuphée à pétales vermillon (F).
نوع من الكوشة الازرقية المعمرة تملو من ٢٠ الى ٦٠ سم . نصلها زاه فراء . اوراقها متقابلة قصيرة الاضلاع . نصلها ضيق الصفحة ، خلي البشرة . كوشنيل الزهرية عشارية التستين طول نحو ٣ م . بتلاتها سلقونية اللون || انزاعها يستمر طول الصيف والخريف .

٢٤٢٨١ - كوشنيل مستانية

Cuphaea lanceolata (S). Cuphée à feuilles lancéolées (F).
نوع من الكوشة الازرقية المحلية تملو من ٥٠ الى ١٠٠ سم . ساقها وفروعها منتصب . اوراقها سنانية ، متقابلة تطول نحو ٥ سم . وتعرض نحو ٢ سم . نصلها خلي البشرة ناشز المروق . كوشنيل الزهرية كثيرة الاحديداب ، بتلاتها مستديرة متحمية ودية او ارجوانية اللون || انزاعها يستمر طول الصيف .

٢٤٢٨٢ - كوشنيل ناروية

Cuphaea ignea (S). Cuphée rouge-feu (F).
نوع من الكوشة الازرقية المعمرة تملو نحو ٣ م . ساقها وفروعها مضطمة الزوايا . اوراقها متقابلة ، اعليجية ، مديبة . كوشنيل انزاعها ناروية اللون ، سداسية التستين ، مستطيلة الماعين || انزاعها يستمر طول الصيف .

٢٤٢٨٣ - كوشنيل * كوشنيل

Erythroxylon coca (S). Cocaier, Coca (F). Coca, Spadic busch (E). Cocastrauch (D). Coes (I).
نبات بري وزراعي من الكوشيات . مهد البلاد الحارة الاسيوية وقد حدت زراعتها بعض الاصقاع الحارة الاسيوية اعصها الهند وبرنديب . فربو عديلة ، جميعها جنباية معمرة تعيش من ٤٠ الى ٦٠ سنة وتملو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم . ساقها يهاد الحاد . اوراقها متقابلة متقبة اعليجية مديبة . نصلها بارز الضلع والمروق واضع الشرايين ، اخضر الصفحة العليا ، زيتي السفلي . انزاعها محورية الارزكان ، صغيرة القند صفراء اللون . ثمارها ناروية مستطيلة الشكل حاوية الاحرار || يستخرج من اوراقها بعد قلعها ويحفظها مادة قلوية غندرة طيبة كدسي « كوكاين » .

٢٤٢٧٧ - كوشنيل سان جوزيه

Cochenille de San José (F).
هي القرمزية للتاكة ، اطلبها .

٢٤٢٧٨ - كوشنيل طوطية

Cochenille floconneuse de la vigne (F).
هي قرمزية للكرم الحمار ، اطلبها .

٢٤٢٧٩ - كوشنيل هبراه

Cochenille farineuse de la vigne (F).
هي القرمزية للدواء ، اطلبها .

٢٤٢٧٠ - كوشنيل * هينم

Kochia (S). Kochia, Beivédère (F).
جنس نباتات عشبية حولية من فصيلة السرمقيات . انزاعه نحو ٣٠ مظهره بري وبشها زيتي هري الشكل . سوقها فراء فناء متحمية تملو من ٤٠ الى ٢٠٠ سم . اوراقها متعاقبة مشتركة غطية يكثر فيها الهبيب ، تلو غضراء اللون صفراء اللولج ثم تحمر مع الخريف . انزاعها محورية الارزكان ، صغيرة القند ، قليلة القند || وهي تستعمل في صناعة الكائنات ولعود القز كالشع .

٢٤٢٧١ - كوشنيل هريية

Kochia-cyprès (F).
هي الجشم الحري ، اطلبها .

٢٤٢٧٢ - كوشنيل

Cochylis (F).
هو اللقو ، اطلبها .

٢٤٢٧٣ - كوشنيل الكروية

Cochylis de la vigne (F).
هو فائلة النيب ، اطلبها .

٢٤٢٧٤ - كوشنيل

Radius
هو السطح الاسفر من الزند الاصل .

٢٤٢٧٥ - كوشنيل

Colon (S). Colon (F). Colon (E).
جنس حشرات من فصيلة الكوشيات ودية عذبات الاجنحة . انزاعه المعروفة نحو ٣٠ منتشرة في معظم اقطار البلاد المعتدلة الحارة من العالم القديم || اجسامها صغيرة تقطو من ٣ الى ٤ م . رؤوسها مستديرة . عيونها صغيرة بارزة . تأثيرها ويكوكها ويلاصها نظامية . قرونها الاستعمارية صغيرة ، ديبوية الشكل . كولاسها عريضة . اجماعها لاسعة . كولاسها واحداها كثيفة الحمل الثام . قوائمها صغيرة . اثوابها انزاعه من القسرة الى السواد القاتم || تآنت الحقل والفايات . تسرح في الليل . طيراتها غثيف الحركة . تعيش تحت الحجارة والجافة . بعضها قانص والبعض الآخر دامن .

٢٤٢٧٦ - كوشنيل * كوشنيل

Colonidae (S). Colonidae (F). Colonidae (E).
فصيلة حشرات من عذبات الاجنحة . اجناسها وانزاعها المعروفة قليلة القند ، نحو ٥٠ منتشرة في معظم مناطق البلاد المعتدلة الحارة || اجسامها صغيرة ، اعليجية الشكل ، تقطو من ٣ الى ٤ م . رؤوسها مستديرة . عيونها بارزة . تأثيرها نظامية . قرونها الاستعمارية صغيرة ، ديبوية الشكل . كولاسها عريضة . اجماعها لاسعة . خلية انتشار || جميعها مفترسة ودامة . تعيش تحت الحجارة والجافة . تسرح في الليل . طيراتها غثيف الحركة || اشهر اجناسها الكوش .





كوكال السباحات



كوكاليس



كوكال البحر



كوكلة كبيرة



كوكلة



كوكلة الشبحان

صغيرة. عرقها كثيرة القروع. عراجيدها متشعبة. اورقها غليظة شبه متصالية يملؤها عجيب متتابع مستغلل الوسط الاجوف، مستغرق الاطراف، يبدو كجمجمة من الكوكاب.

٢٤٢٩٢ - كوكلة *Astrantia (S).*

Astrantia (F). *Astrantia (E).* جنس نباتات برية وزراعية معمرة من السنكليات ونسيلة الخبيثات. انواعه قليلة جميعها بجيلة وجنبية. اورقها مفصصة. ازهارها صوبانية التنصيص، تبدو كالسجوم يبيضا. اللون او وردية. جلورها طيبة مسهلة. احرف انواعها وازهارها ما يلي.

٢٤٢٩٣ - كوكلة عورليكية الورق *Astrantia helleborifolia, A. heterophylla, A. pontica, A. trifida (S).*

Astrantia à feuilles d'Elleboré (F). نوع من الكوكبية وهي بجيلة برية وريضية معمرة تملو من ٣٠ الى ٦٠ سم. اروتها مدادة. ساقها متصبية. اورقها ثلاثية الفصوص السنانية المسنة المهذبة. قذاة صوبيا الزهري مؤلفة من ١٢ الى ١٣ قذاة مهدبة الاطراف. ازهارها وردية اللون. ازهارها يستمر من حزيران الى تموز.

٢٤٢٩٤ - كوكلة صغيرة *Astrantia minor (S).*

Pedice astrantia (F). نوع من الكوكبية البرية البلولة وهي بجيلة صغيرة اللذ تملو من ٢٠ الى ٤٠ سم. اروتها مدادة. ساقها مستقيمة. اورقها خاسية او سباعية او تساعية الفصوص الضيقة التي تطلو من ٢ الى ٤ سم. وقترض من ٨ الى ١٣ قذاة مهدبة الزهرية صغيرة اللذ تقطرها نحو ١ سم. ازهارها الى الياض الاخير. ازهارها يستمر من تموز الى آب.

٢٤٢٩٥ - كوكلة كبيرة *Astrantia major (S).*

Astrantia majura, Grande astrantia, Sanché de montagne, S. femelle (F). *Larger astrantia, Master wort (E).* *Grosse Sternoldole, Meisterwurz (D).* *Astrantia maggiore, Sanicola femina (I).* نوع من الكوكبية الطيبة والريضية وهي جنبة صغيرة اللذ تملو من ٧٠ الى ١٥٠ سم. جلورها طيبة مسهلة. ساقها قوية متصبية. اورقها كثيرة مستعرضة خاسية او سباعية او تساعية الفصوص الاطليجية الشكل المسنة الخار. اصوبها الزهرية كبيرة اللذ، ازهارها يبيضا اللون، قذاتها وردية. ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول.

٢٤٢٩٦ - كوكلة *Silquaria (S).*

Silquaria, Ténagode (F). *Silquaria (E).* جنس حيوانات بحرية من الرعويات مغنيات الاربل ونسيلة الحنوبريات. انواعها المعروفة مهدبة منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة الاصلها انبوية مستطيلة ملوكة. قطر الانبوب ودوره القولية واسطاه تختلف مع الانواع.

٢٤٢٩٧ - كوكلة الشبحان *Cuculla (S).*

Cuculla absinthii (E). *Cuculla des armoies (F).* *Cuculla absinthii (E).* حشرة من المستقيمت ورثة حشرقيات الاجنحة. موطنها يتعد من الشرق الاوسط الى اطراف اوروبية. قراستها جارية قوتها رقيق الانظار. سرتها غامضة واشعة تموش على

٢٤٢٩٨ - كوكال *Centropus (S).* *Coucal (F).*

جنس طير من فصيلة التفرقيات. انواعه المعروفة نحو ٣٠ اصطنها البلاد الحارة الاسيوية والافريقية والاسرائية الى اجسامها متوسطة القدة او كبيرة. اطوالها تراوح من ٤٠ الى ١٠٠ سم. جميعها من الطيور المتسلقة القليلة الطيران. تتميز باصطناع اذانها وبالمزاج السفاه المزعج. اجنتها قصيرة. منقادها قوية، عذبة الاثالة العليا. قوتها يشمل كل ما دب على الارض من احبث الاناعي الى النفاذ والمناكب والمقارب والديدان. ذكرها واناثها تتناوب على سحن البيض الذي يستمر نحو ١٥ يوما. اظهر انواعه كوكال السفال وكوكال السباحات.

٢٤٢٩٩ - كوكال السنغال *Centropus senegalensis (S).* *Coucal du Sénégal (F).*

نوع من الكوكال. اصطنه تمتد من السنغال الى السودان. يأنث الاذلال والاجام والقباض. ينساب بين الاحشاب ويتسلق الاشجار بشفة. جسمه يطلو من ٤٠ الى ٥٠ سم. رأسه وعنه والقسم الانامي من ظهره الى السواد الداس يملو مزاج ازرق اسفع. جناحاها والقسم الخلفي من ظهره الى القصرة القفراء المزاج. انفيكه وذنبه الى السواد المنسج بالاصهب. يسله الى الياض الاخير. قوته اعشرات والجنادب والمقارب والافاعي الصغيرة.

٢٤٢٩٦ - كوكال السباحات *Centropus rufipennis (S).* *Coucal des haies (F).*

نوع من الكوكال. اصطنه تمتد من شط العرب الى الهند والهند الصينية. يأنث المناطق الرطبة والاجام والقابات. يقترب من المزارع ويحتم على السباحات. يملو بسرعة ويتسلق شفة ويغير يسله. جسمه يطلو من ٥٠ الى ٦٠ سم. ثوبه الى السواد الازرق المزاج. يسله الى الصعبة الخلفية. انفيكه احر. ذنبه الى الجورة. قوته الافاعي والسفاه والورق والمقارب والجراد. يذئن عشه بالخشيش الاخضر في الانجاز القليلة الارتفاع.

٢٤٢٩٧ - كوكاليس *Cuculla (S).*

Cuculla, Caucalier, Caucalia (F). *Cuculla, Beer parsley, Hedge parsley (E).* *Hufdold (D).* *Cuculla, Lappolina, Sacca (I).* جنس نباتات عشبية برية من نصيلة الحميات. انواعه المعروفة ١٨ منها البراري والاحراج.

٢٤٢٩٨ - كوكالين *Cocaine (F).* *Cocaine (E).*

شبه قلوي نباتي يستخرج من اوراق الكوكا يستعمل في الطب لتشدير اللومسي.

٢٤٢٩٩ - كوكب افريقية *Aster d'Afrique (F).*

هو الشبية، نبات زينة، عاظمه.

٢٤٢٩٠ - كوكب البحر *Asterias (S).*

Asterias (S). *Antérie, Etoile de mer (F).* *Asterias, Starfish (E).* جنس حيوانات بائية من فصيلة كوكاب البحر. انواعه كثيرة العدد منتشرة في جميع بحار العالم.

٢٤٢٩١ - كوكلة *Lomentaria (S).* *Lomentaria (F).*

جنس نباتات بحرية من الخبيثات احر. انواعها المعروفة ١٢ اصطنها بحار البلاد المعتدلة الحارة الى كلالها

يتميز بقصر منقاره الاعطف الثلاثي التفرّض . اجنحته متوسطة القد منفرجة . ذيله مستدير قصير || انواعه عديدة نحو ٢٠ موطنها البلاد الامريكية . تألف البطائح والسهول . قوتها الحبوب والفاول والخضراوات || انثاه تبويض من ١٤ الى ٢٠ بيضة تحضنها وحدها في افصوص تدثله بالخشيش بين الادغال والاشجاف || اشهر انواعه ما يلي .

٢٤٣٠٤ - كُولَاة حَمِيل

Colin de Gambel, Caille à casque (F).

طائر من الكولان يتميز ببقعته المثلثة من ٦ ارباش . ثوبه متراكب الالوان فيه الابيض والاصفر والاحمر والاحمر والازرق والاسود || يأنف المناطق الويرة قرب مجاري الماء .

٢٤٣٠٥ - كُولَاة فيرجينية

Colin de Virginia (F).

طائر من الكولان . ثوبه متراكب الالوان . ظهره الى الجوزة المظفرة بالاسود والاصفر . رأسه عادم القترزة . يأنف المراعي والحقول المزروعة وجوانب الرياف .

٢٤٣٠٦ - كُولَاة كليفورنية

Colin de California (F).

طائر من الكولان . ثوبه متراكب الالوان . رأسه مرنج بقرزة مستطيلة الريش الاحمر اللعة || يأنف الحشاب والادغال والحقول المزروعة .

٢٤٣٠٧ - كُولَاة مَسِينَا

Colin Masséna (F).

طائر من الكولان . ثوبه اسود اقون يملوه قويم ابيض . يأنف الرياف ومجاري الماء .

٢٤٣٠٨ - كَوَلَب

Cholæpus (S).

Cholæpe, Nan (F).

جنس حيوان من فصيلة الدبابات المتسلقة البطيئة الحركة . طوله يراوح من ٤٠ الى ٥٠ سم . قوامه ثنائي الاظافر المتسلقة المنسقة . ثوبه كثيف اللور لونه الى الصبابة الماعقة . يعيش على الانجار . قوته البرام والنزاري والتهار . انثاه تضع جروا واحدا ترشعه وتحمله حتى الفطام || له نوعان كولب الامازون وكولب كولوبيو .

٢٤٣٠٩ - كَوَلَبَة

Calappa (S).

Calappe (F), Calappa (E).

جنس حيوانات بحرية من القشريات عشاريات الارجل قصيرات الذليل وفصيلة الكوليبيات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطانها مجار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها صلبة قلنسوية الشوزن محبة التدور حمرسة الالفوا . ارجلها دقيقة . ملاقطها كبيرة مسطحة متائلة || لموها كاعنة الصنف لا تؤكل || اشهر انواعها الكولبية المحبسة .

٢٤٣١٠ - كَوَلَبَة مُحَبَسَة

Calappa granulata (S), Calappa granulé (F).

يكثر وجودها في البحر الابيض المتوسط . تعيش على رمال الشواطئ المدورة بالماء .

٢٤٣١١ - كَوَلَبِيَّات

Calappidae (S), Calappidae (F), Calappidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من القشريات عشاريات الارجل قصيرات الذليل الحمرسات . اجناتها وانواعها المعروفة

اوراق المركبات وازهارها واعصها الشجبان || جسمها متوسط القد يميل نحو ١٦ م . بسطها نحو ٤٢ م . رأسها حشلي الثوب . عينها كيرتان . زباناها خيطيان . جوشها حشلي الابن اصغر المراج . بطنها الى الحشلي الاشجع المراج يملوه خط شجي اسود يقطب كامل البطن عند الذكر ويغطب نحو ثلثه عند الانثى || وراثتها عند الشقين الى الحشلي الاصغر تملوه في الزوج الانامي زركفة وشفرة وتزاويان تراوح من الصباب الى الاسود || لها جبل واحد في الحول . تظهر القترزة في ايار وتبقى حتى تموز . تسرح في الليل . تقابل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتضع المكن لمطاول على الفصحات السفلى من نصال الاوراق || تسرع تطول نحو ٢٢ م . جسمها اسطواني الشكل . ثوبا الى الخلسار الباحت يملوه شمع اربد ويحلبه منفرض اسود يجتد من السكة الثالثة الى التاسعة . رأسها اسود . منها الى اربعة الخفسار . وارجاها الى السيرة || طور الاكامل الذي يستمر نحو ١٥ يوما ينقضي في التربة حيث تنطفن السيرة ملتصقة بجلباب من الطين .

٢٤٦٩٨ - كَوَكُو مُذْهَب

Coccolus doré (F).

طائر مشهور باسم هوو ، الطلب .

٢٤٦٩٩ - كَوَكُوْس

Coccolus, Cebatha (S).

Coquecul, Cebathe (F).

جنس نباتات عارشة برية معمرة من فصيلة القريرات . انواعه نحو ٢٠ . جميعها طيبة مهذبة المناطق الاستوائية . سوقها متسلقة . اوراقها متعاقبة لاقامية الشكل . ازهارها معتوية التجميع ثنائية المسكن . ثمارها نوية لا قيمة لها .

٢٤٦٠٠ - كَوَكَبِيَّات

Erythroxylaceae (S), Erythroxylacées (F), Erythroxylaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة القعالات . اجناتها وانواعها قليلة العدد اشهرها الكوكا .

٢٤٦٠١ - كُولَا ، كَوَلَبَة

Stearculia acuminata (S), Colatier, Kolatier (F), Colanut, Kola-nut tree (E), Kolabaum, Stinkbaum (D), Cola, Noci del Sudan (I).

جنس اشجار برية وزراعية من فصيلة البرازيات . انواعه قليلة اصلاها المناطق الاستوائية الافريقية . اشجارها تملو من ١٠ الى ٢٠ م . سوقها خراء اللون مشقة القشور . اجناتها متسقة المستوية . اوراقها مسقة متعاقبة اهليلجية ؛ نصلها جامه الصلبة . باز البروق ، مسحلي المتى ، مدب الطرف . ازهارها ذكورية او شترية ، الحفرية معتوية التجميع ، محورية الارتكاز ، تتكون على الانثاء التي بلغ عمرها ثلاث سنوات او اكثر . ثمارها قرن نولية مبسطة تنلف من لورئين الى عشر نوزات كلوية الشكل جامدة المادة القابية التي يراوح لونها من الاحمر الى الابيض الاصفر ، وهي مأكولة مغذية تنشط القلب رتبه الاصاب وتغف التعب والهر .

٢٤٦٠٢ - كُولَان

Kaolin, Argile blanche (F).

Kaolin, Porcelain clay (E).

هو الاسم الصيني والسلي للصلصال الحر الاقير اللون الذي يستعمل في صناعة الخزف وفيرها .

٢٤٦٠٣ - كُولَان

Collins (F).

American partridges (E).

جنس طير من عمارة الحجلبات وفصيلة الطيوريات .





كوكب أرنك

الطول : ١٥ سم الخطم الاخر ، اصفر الاسفل . ماله مستدلة الطول سواد اللون . حلقه صه الى الحرة القويضة || يأت الإخراج الكثيفة ويقرب من الاماكن الأكلة لكنه كثير الرجل والرجل || قوته الحشرات واساربعها والجراد والبراغ والنمل والثار والارباعية ومنها الكرز والين || الاثى تلتد عشها في الاشجار الرقيقة الارتفاع القل وتبين من ٢ الى ٥ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو ٤٠ يوما .

Salila, Colt, Monta (F).

كوكب

زو ذكر الحيوان حل انشاء وقد شاع استعمالها في الحيوان والديويات .

٢٤٣١٩ - كوكب أرنك * ، صرأبيية

Coumarouna odorata, Diptyryx odorata (S). Fève Tonka, Sarrapia (F). Tonka-bean tree (E).

شجرة برية وزراعية من فصيلة الفريزيات . مهدا البلاد الامريكية الحارة تكثر في نرويا واليونان . يستخلص من زورها الجافة ، بعد تقمها بالورم ، مادة الكوبرين الشائعة الاستعمال الطري والتيني || وهي كبيرة اللقذ فارشة الاضغان اولوقها متعاقبة مركبة . وورقها برية التجميع اذنيها ؛ نصلها جامد الصفعة يضي الشكل . ازهارها عورية الانكاز . ثمارها شامية الشكل لينة السوذك تحوي عصية مطقة طول من ٣ الى ٤ سم . وتعرض نحو ١ سم . ثمرتها قليلة الشائعة ، سريمة الصبيحة ، لونها الى السمرة البنية الالامة ؛ لباها جامد المكسر ، اصفر اللون .

Coumarine (F).

Coumarin (E).

هي لكتون الحامض الكوبريكي ؛ مادة متبلورة يضاء اللون مستحبة العرف الطري تلعب في الماء والكحول . تستخرج من الكوبرون والحشوق ... وهي شائعة الاستعمال الطري تدخل في صناعة تطهير وتصيل التبوغ الامريكية .

٢٤٣٢١ - كوكب * ، كوكب Cumul, Pluralism

الكوكبة هي الجمع من كوكب جمع وكلك كلك .

Cumlingia (S).

Cumlingie (F). Cumlingie (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياطين فضيلة المتغيرات . انواعها المعاصرة المعروفة قليلة المدد اصطلحها بحار امريكية الجنوبية اعصها الشيل والبيرد || اصدافها شبه يريمة الشوزن ، متشابهة المصارع لاشعاريه الاصطلح ، ماسة الطروح البيضاء اللون الموضحة بالجلاوي .

Coumia guianensis (S).

Couma, Coumier (F).

شجرة برية راتنجية دماعة من فصيلة الغليلات . منبها حراج الفويان || ساقها مستدلة الارتفاع فراء . فرومها متصبية عجمية اوراقها متعاقبة ، طلة ، جامدة النصال المراط . ازهارها عورية الانكاز طرفية || يستخرج من ساقها بالخر عصارة راتنجية لها استعمالها الصناعي .

٢٤٣٢٤ - كوكب * ، كوكب Cometes (S). Cométes (F).

جنس نباتات عشبية حولية برية من فصيلة التينانيات . انواعها المعروفة قليلة المدد جميعها من نبوت غياي الشرق الاوسط واقرينية الشرقية || سيقانها فراء ، شكلها منقودي

متوسطة المدد . اعطائها بحار البلاد الحارة || اجسامها صغيرة القد ، لانياسية الشكل تتميز بافراها المعروفة وبدرومها المحببة السطوح العلوية ، وبملقطها الضليلة || اشهر اجناسها الكوكبة والذباباة والمشتوة .

٢٤٣١٢ - كوكب أرنك *

Phascalarctus cinereus (S). Phascalarctus cendré, Koala cendré (F). Native bear (E).

حيوان لبون وحيد الجنس والنوع من الجرابيات الشاجرات وفصيلة الفلججرات . موطنه بعض مناطق استرالية اعصها الشرقية . يأتف الغابات . يسرح في الليل ويبست في النهار . قوته اوراق الاشجار ونعماها وازعارها ونعماها || جسمه يطول نحو ٥٠ سم . ويرتفع نحو ٣٣ سم . رأسه اطلس المقدم قريب الشبه من رأس الذب . قوائمه قصيرة ، لحاسية الاصابع ، كبيرة الاظفار المحببة الحادة الاطراف || ثوبه الى الرنكة ، يمتد في الظهر ويغير في البطن . الاثى رباعية الاضغان || لحمه مأكول وفروته مرغوب فيها .

Coulomb

كوكب

هو ما يصرفه بالتالية المجرى الكهربائي التي تبلغ قدرته ١ أمبير .

Collybia (S).

جنس فلور من الفاريتويات . انولاه عديدة تركب حرضا جلور بعض النباتات الحرجية دون ان تكفيها .

٢٤٣١٥ - كوكب الدجاج ، كوكب الطير ، هيفة الطير

Pasteurellosis avium (S). Choléra des poules (F).

مرض وبائي يصيب الدجاج فيفضي عليه اذا لم يكلف وقاها بالتلفيح بالاشعاريه .

Colisa (S).

Colisa (F). Colisa (E).

كوكب هو الاسم المحدثي البنغالي . جنس امحاك نهرية من شاكات الزعانف وفصيلة الطيوريات . انواعها المعروفة عشرة اصطلحها انهر الهند وميجراته ومناتمه || اجسامها شبه اهليلجية ، صفيحة ، لا تتجاوز ٢٠ سم . رؤوسها مستدلة الاعظام الصغيرة الاشداد . زعانفها الظهرية والبطنية مستطيلة ، متائلة . زعانفها الخوضية شبه غشبية . للذيلية كبيرة مقطوعة . اوتوا الى الحصار الباهت يملو تجلج مغرض اريد اللون ، نحاسي الموج . مطربها الى البياض الاشر || ذكورها تحضن السرة في عشاش شبه جرابية الشكل تحبها بين النباتات المائية || غروبها مأكولة متوسطة الصنف .

٢٤٣١٦ - كوكب * ، كوكب

كوكب هو الاسم المحدثي البنغالي . جنس امحاك نهرية من شاكات الزعانف وفصيلة الطيوريات . انواعها المعروفة عشرة اصطلحها انهر الهند وميجراته ومناتمه || اجسامها شبه اهليلجية ، صفيحة ، لا تتجاوز ٢٠ سم . رؤوسها مستدلة الاعظام الصغيرة الاشداد . زعانفها الظهرية والبطنية مستطيلة ، متائلة . زعانفها الخوضية شبه غشبية . للذيلية كبيرة مقطوعة . اوتوا الى الحصار الباهت يملو تجلج مغرض اريد اللون ، نحاسي الموج . مطربها الى البياض الاشر || ذكورها تحضن السرة في عشاش شبه جرابية الشكل تحبها بين النباتات المائية || غروبها مأكولة متوسطة الصنف .

٢٤٣١٧ - كوكب امريكي *

Coccyz americanus (S). Coulicou américain, Coucou à bec jaune (F). Yellow-billed cuckoo (E).

طائر من القواطع من فصيلة التيقوييات . موطنه امريكية الشمالية وكندا . يرسل في اواسط الخريف الى جزر الانتيل ويضع في اوائل الربيع || جسمه متوسط القد يطول نحو ٢٠ سم . بسطة نحو ١٤ سم . ثوبه العلوي الى الكهية الزءاء تعلوها حاجيات تراوح من الشبهة الى الخضرة والزرق . صدره وبعك الى البياض الاشر . لوانف الاجنحة الى الشبهة . نيكاء بلون الرد اما ظاهرا انفيك مع الزلايل فال السواد التام باستثناء الاطراف البياض . قدنه زناجي التركيب مستطيل وعريض . متفاده معتدل



كوكب



كوكب امريكي



كوكب (حبة)



كوكب

العقريات. موطنه يمتد من افريقية الشرقية الى الشرق الاوسط. ظهره واحالي الى الشبهة السوداء. بطنه وخوافيه الى البياض الاخير. حنثه كاليافوت. منقاره اسود، ساقه الى الصفرة الخضراء. قوته القواض والحشرات يصيدها عند الشروق ويقرق القروب || يثن في الاشجار الرقيقة. انتاء تقصع من اثنين الى اربع تحضنها اربعة اسابيع.

Cauterisation (F).

٢٤٣٣٤ - كتي

Cauterization (E). هو احراق الجلد بمجديده ونحوها.

Pâllan (F).

٢٤٣٣٥ - كتي

هو الجيع، اطلبه.

Accommodat

٢٤٣٣٦ - كيتالة ٥

حالة حيوان أو نبات كيتأها عوامل البيئة المفروضة دون ان تجعلها وراثية.

Myopotamus ٢٤٣٣٧ - كيتو * حارود المتافع
coypus (S). Myopotame coypou, Coypou, Castor des marais (F). Myopotamus, Coypu (E).

حيوان لبين قاضم وحيد الجنس والنوع من فصيلة الدانيات. موطنه بعض اصقاع امريكا الجنوبية اخصها الاناثام المعتدلة الحرارة. يألف المتافع وضفاف البحيرات ويجاري الماء. ملجته الحياتي زوجي || جسمه يطول نحو ١٠٠ سم. يما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ٤٥ سم. رأسه شبه مكور الشكل، مقطوع الطم. عيشاء واذنان صغيرتان، ستديرتان. سباله معتدل الكثافة مستطيل. قوامه قصيرة خالصة الاصابع. ذنبه مردي الشكل غليظ القاعدة، مستدق الطرف، طليبي الوبر في الزايم الاول والثاني، حشيشي الخلفات في الزايم الاخيرين. وبره لبد، قصير، ناعم. ثوبه في الرأس والظهر الى السرة الكستنية. وفي البطن الى السرة الخضيلة. خاصرته الى الشقعة || قوته المواد النباتية والاسماك والرخويات || حبره وجار يتحفر بالتربة. الاثني تقصع من ٨ الى ٩ ادراس كاسية باصرة تسرح وتقص في الماء بعد اسبوع || فروته جيدة الصنف مرغوب فيها ولحمه كذلك.

Chitonellus (S).

٢٤٣٣٨ - كيتون ٥

Chitonelle (F). Chitonellus (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الاربل امانيات الخياشيم مصصحات القشار وفصيلة الكيتونيات. انواحه المعاصرة المروفة قليلة العدد منتشرة في بعض مناطق المحيط الهادي، من ماليزيا الى الاكيتل واستراليا || اصداها مستطيلة ثمانية الصفيحات التراكية. اجسامها قريبة الشبه باجسام البازق. اطولها تراوح من ٣ الى ١٢ سم. رؤوسها وعيونها صغيرة. لولاسها رباعية، زوج مستطيل وزوج قصير. اوبنها قليلة الانفراج. تتكود عند الخوف فتبدو كالاكرة الصغيرة.

Chitonidae (S).

٢٤٣٣٩ - كيتونيات ٥

Chitonides (F). Chitonidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات مطيات الاربل، امانيات الخياشيم مصصحات القشار. اجسامها وانواها المعاصرة قليلة العدد منتشرة في معظم بحار البلاد الخمار والمعتدلة الحرارة || اصداها مؤلفة من ثمان صفيحات كلسية المادة، متراكمة، مفصلية، تغلف الطاهر ويمكن اللوبية من التكوير كالمدرع، عند الحاجة || اشهر اجناسها الكيتون والحيدية.

الشوزن. اوراقها متعاقبة، وريجة اتصال الفصيلة المستعفة الاطراف || انهارها خالصة البتلات والاسدية، وودية اللون دقيقة الزناد المستطيل. تنويرها ديمي.

Hobereau, Falquet (F).

٢٤٣٣٥ - كوتنج *

Hobby (E).

جنس طير من عمارة الصقور وفصيلة العقريات. انتواه اربعة جميعها خفيفة الجناح ديمة الجسم طولها يراوح من ٣٥ الى ٤٥ سم. انوارها نعمة ظهورها وسراقتها الى السرة. بطنها الى الذنب || اما انواعه فهي الكوتنج النبوي والكوتنج الشائع والزمدم واليوليد.

٢٤٣٣٦ - كوتنج الدبسي

Falco columbarius, Hypotriorchis columbarius (S). Faucon-pigeon (F).

طائر من الكوتنج صغير القد طوله نحو ٣٢ سم. خفيف الجناح، شرس الخلق، حاد المزاج، شديد البطش يصيد الياض والصائير والقواض الصغيرة والجرذان والحشرات. وهو من القتراط التي تجوب البلاد في طلب المصيف والمشي. سره في رحله يمد بضم ثبات. يثن في الاشجار المالية وفي ارباب المسعود. انتاء تقصع من ٣ الى ٤ رفقات تحضنها وسحا اربعة اسابيع

٢٤٣٣٧ - كوتنج شائع

Falco subbuteo, Hypotriorchis subbuteo (S). Hobereau commun (F). Common hobby (E).

طائر من الكوتنج حاد المزاج، خفيف الجناح، صغير القد، طوله نحو ٣٥ سم. الاثني اكبر حجماً من الذكر. وهو من القتراط يجوب البلاد الاسيوية والافريقية والاربية. يألف الثنايات والاحراج الميمنة الاشجار. قوته الصائير والحشرات. يثن في الاشجار الرقيقة انتاء تقصع من ٣ الى ٤ رفقات تحضنها وسحا نحو اربعة اسابيع

Cosmique (F). Cosmic (E).

٢٤٣٣٨ - كوتني

نمت تعريفه يطلق على بعض الاشياء المختصة بالكوتن كالاشعة الكونية.

Cognac (F).

٢٤٣٣٩ - كونيالك

هو الكنيالك، اطلبه.

Cosmogonie (F).

٢٤٣٤٠ - كونيية ٥

Cosmogony (E).

الكونية نظرية في تكوين العالم، والنظريات في التكون أو التكوين عديدة ومنها المفردة الهابة واللامفردة.

Conidia (F).

٢٤٣٤١ - كونيديا

هي الكونيد، اطلبها.

Cunila (S). Cunila (F).

٢٤٣٤٢ - كونييلة *

Dittang, Stone-mint (E). Kunel (O). Cunilis (I).

جنس نباتات برية نجبية مسرة من فصيلة الشفويات. انوارها نحو ٢٠ اصنافها البلاد الامريكية. مظهرها طلي. اوراقها معققة متعاقبة اعليجية الشكل. نصلها صغير القد غلي البثرة سطري اللوف يشبه النبت. انفرارها حلقى التجميع طرفي الاركانار. لقيح اوراقها وانوارها يفيد الاساء ويقوي المعدة.

Elanus coroleus (S).

٢٤٣٤٣ - كونيي *

Elanion blanc (F). Black-winged kite (E).

طائر من الزراويق ينتمي الى عمارة الهاء وفصيلة



كوتنج



كونيلة



كومي



كوي



كيتون

بين الصنوبر. لحما مسحب العلم فاخر الصنف.
اشهر انولمه الثلاثة التالية :

٢٤٣٦ - كَيْبَلَة الْأَطْلَس

Labrus bergytta (S). *Labre neustrien, Crahotte, Vras* (F). *Cockwing wrasse* (E).

نوع من الكيبل. تكثر في المحيط الأطلسي من شواطئ بلجيكا الى جبل طارق. طولها نحو ٥٠ سم. ثوبها مذاكب الألوان الزاهية المتباينة.



كيبلية

٢٤٣٧ - كَيْبَلَة عَصْفَرَاء
Labrus viridis (S). *Labre vert* (F). *Cuckoo wrasse* (E).

نوع من الكيبل. تكثر في المتوسط. طولها نحو ٣٥ سم. لونها الى الخضار. ظهرها اسفع المراح. بطنها وردي اللون مسطح الماحة. الاثنى ثلاثية البقع السود الجانبية وهي اكبر بقعة من الذكر.

٢٤٣٨ - كَيْبَلَة زُرْقَاء
Labrus merula (S). *Labre marie, Merla* (F). *Labrus merula* (E).

سمكة بحرية بيوض من فصيلة الكيبلديات ورية شالكت الزعانف. اصلها من مغارة البحر الابيض المتوسط. تعتبر من اسماك المهادس والحلاف. ملجأ للحياض الرشي || جسمها اهليجي الشكل، معتدل التبييط، بطول من ١٥ الى ٢٥ سم. ثوبها متباين الخصب بين القطين. اللون السائد هو الازرق يطوق في القسم الاعل من الجانبين والظهر موطج مجزوي واسود عند الذكر وموطج وردي عند الاثنى. ويطوق في القسم الاسفل من الجانبين وفي البطن موطج بنفسجي عند الذكر ويلبكي عند الاثنى. رأسها غروفي الشكل، مشعر الشفاء. فكاه متادلان. شفتها متوسط الانفرج. اسنانها كبيرة، متعقبة. عيناها مستديرتان، جاسطتان. زعنفتها الظهرية واحدة، مسطيلة. زعنفتها الذيلية مقنطرة الطرف || لحما جيد الصنف، مغروب فيه.



كيدل ثنائي الشفط



كيبل

٢٤٣٩ - كَيْبَلَة مَقُونَة
Labrus mixtus (S). *Labre varié, Coquette, Connet, Tenca* (F). *Sea-partridge* (E).

نوع من الكيبل. تكثر في شمال المتوسط طولها نحو ٤٥ سم. ثوبها متباين الألوان الزاهية فيها الوردي والحلي والبي والاحمر والاصفر والاسمر الداكن.



كيدلة زرقاء

٢٤٣٥ - كَيْبَلِيَّات
Labridae (S). *Labridae* (F). *Labridae* (E).

فصيلة اسماك بحرية من شالكت الزعانف تشمل زهاء ١٠٠ نوع منتشرة في جميع بحار العالم.

٢٤٣٥١ - كَيْبَلَج
Terre de bruyère (F). *Heath-soil* (E).

هو التراب الحرجي الخشن، تركيبة الحكي يختلف باختلاف مناصره الاسيانية او دالية او طينية او جصية لكنه يتميز بوفرة المادة الدبالية المنحلة التي تبعله من الجرد الاثرية الساحلة للزراعات التريينية والبيئية.

٢٤٣٥٢ - كِيرَش
Kirsch (F). *Kirschwasser* (E).

هو خمر الكرز، شراب مسكر يصنع من قنديل الكرز.

٢٤٣٥٣ - كَيْبُوب
Choropus (S). *Chéropé* (F). *Choropus* (E).

حيوان جاس لاعم ورعي الجنس والنوع من فصيلة



كيبوب

٢٤٣٤٠ - كَيْبَلِيَّة * مَشْطُورَة

Kigelia (S). *Kigélie, Arbre à concombre* (F). *Cucumber tree, Sacred tree of Nubia* (E). *Kigeliobaum* (D). *Kigelia, Albero di castrolo* (I).

جلس اشجار برية وزينية من فصيلة البغنيات. مهدا البلاد الحارة. انولها اربعة. اولاتها متعاقبة مركبة. ازهارها صفوي التجميع. انزاعها كبيرة القذ. جولة الشكل، مقنطرة، ثمارها تشبه الخيار لكنها حاضرة العلم لا تؤكل.

٢٤٣٤١ - كَيْبَحَاء
Rhynchonella (S). *Rhynchonella* (F).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفديات الارجل وفصيلة الكياليات. انولها المعروفة عديدة، معظمها من متحجرات العصر السيلوري المائل الى الاياج الاول، اما المعاصرة منها فتنتشرة في بحار الشمال والجنوب || اصداها مصراية، متساوية، مروية الشكل، غندة الصفحات الخاربية، للؤلؤة الداخلية. تعيش شبه لاصقة بالصخور رابطها سلك ليفي المادة طولها من ١٥ الى ٣٥ سم.

٢٤٣٤٢ - كَيْبَحَالِيَّات
Rhynchonellidae (S). *Rhynchonellidae* (F).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفديات الارجل. اجناسها وانولها المعروفة عديدة معظمها من متحجرات الاياج الاول || اشهر اجناسها الكيحاء.

٢٤٣٤٣ - كَيْبَحَن
Pipit roussetine (F). *Tawny Pipit* (E).

طائر من فصيلة الذعريات يدعى جشة الحقل وطرسوم، اطلب جشة الحقل.

٢٤٣٤٤ - كَيْبَل كَثَافِي التَّسْطِيط *

Adalia bipunctata (S). *Adalie à 2 points, Coccinella à 2 points* (F). *Adalia bipunctata* (E).

حشرة خاتلة نافعة من فصيلة الدعسقيات ورية مفدات الاجنحة. موطنها بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة من الشرق الاقصى وروية. تألف البراري والحداق والجنائن والسيائن والزراعات الصيفية. غناؤها ويزقاتها تعيش على الارق والقرين والقرن والوبف ... || جسمها صغير القذ، يبيي الشكل، بطولها من ٥ الى ٦ سم. ثوبها الذي يتميز بدمم الاستقرار يكون غالباً الى السود تملو في كل هذه من غدية نقطة حمراء. رأسها صغير الحجم، ماصتان، زباناها صقيان. فكاه ذريان. تأشيرها وملاسها صغيرة || الاثنى اميز قدماً من الذكر واكد ثوباً به واقتصر زبانا || ايجهاا الحولية ثلاثة. تسرح في النهار وتبيت في الليل. يختصا الجيل الثالث تحمي فصل الشتاء غنيقة تحت الحجارة الى ان تدب الحرارة فتخرج من مكبتها في اوائل فصل الربيع.

٢٤٣٤٥ - كَيْبَدَم *
Labrus (S). *Labre* (F). *Wrasse* (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الكيبلديات انولها المعروفة ١٠ تتميز بالزوايا التراكبية الألوان الزاهية وباستطالة زعانفها الظهرية والشرية. رؤوسها صغيرة. اعطائها غروبية الشكل مشقوفة القفك || مرتها قرب الشواطئ

على القلب. ورفائله عديدة اخصها تأمين جريان الماء وادخار المواد الغذائية والمقاومة الميكانيكية.

٢٤٣٦١ - كَيْش * ، أَبُو مَالِك

Spatula clypeata (S). Canard souchet, Souchet commun, Rouget de rivière (F). Shoveller duck (E).
نوع من البط الرشي. طائر من التقاطع مشتهر البلاد الأفريقية الحارة وبمصر البلاد الباردة الأوروبية والاسيوية || جسمه كبير القد يطول نحو ٥٠ سم. رأسه وفتحة الى انخضار الالاسع. صدره الى البياض الناصع. بطنه واطفله الى الشفحة الصنابية المواج. ظهره اسود اللون تملوه رقشة حنطية. جناحاه مزرقان بالابيض والازرق والاخضر والكسني. عينه صغرتان صليتان. منقاده صفيحي الشكل، ملحفي الطرف، اسمر اللون، اخضر المواج. جناحاه مستطيلان، لاسفان، ذنبه غمروقي الشكل، صغير القد، ابيض اللون، يتوسطه الاسود. ساقاه قصيرتان لونهما الى الصفرة البرتقالية || قوته الحشرات اخصها المائية ودعبل الضفادع وبعض النباتات المائية || يدفن اضمحله بين الاسل على ضفاف البحيرات والمناقع والاهوار في المواق الصلبة الخال. الاثني تحضن من ١٦ الى ٢٠ بيضة. الترخيم يستمر نحو اربعة اسابيع تقوم به الاثني دون الذكر الذي يؤمن لها الحماية واغذاءه || تجتر من الطرائد المزينة. لحمها فاخر الصنف.

Mouche de l'olive (F).

٢٤٣٥٤ - كَبْرُون

هو خروقة الزيتون، اطباها.

Calina moschata (S).

Calina, Canard de duck (F). Barbary duck (E).
طائر داجن من كليات القدم صفيحيات المنانير ينتمي الى فصيلة البطيات. موطنه امريكا الجنوبية || جسمها كبير القد. عنقها اطول من عنق البط الاعلى جناحها كبير الحجم، ذلق الطرف، يكاد يلمس الذنب. ذنبها صغير اجرم، مقطوع الطرف. ثوبها الى انخضار الالاسع الاصفر يطوق تيجاج ابيض || اغلافها شرسة تلتصق على غيرها من الطير الداجنة. لحمها متوسط الصنف لا يخلو من رائحة المسك.

٢٤٣٥٦ - كَيْش البَرْخ ، كَيْش العَبْرَات

Sporange (F). *Sporangium* (E).

هو الكيس الشري الذي يحضن بؤغ مستورات الزهر.

٢٤٣٥٧ - كَيْش الراعي * ، قَرْمَلَة

Capsella Bursa-pastoris (S). Capselle, Bource à pasteur, B. de Capucin, Boursette (F). Moher's heart, Shepherd's burse (E). Hirtentäschel (D). Bors di pastore (I).

نبات عشبي بري حولي مبدول من فصيلة الصليبيات.

Embryon d'animal (F).

٢٤٣٦٢ - كَيْشَة

Embryo of animal (E).

هي النمرة، ملقحة الحياة التناسلية الكاشية في الحيوان.

Calophora (S).

٢٤٣٦٣ - كَيْفُور

Calophore (F). *Calophora* (E).

جنس نباتات عنبية برية وتزيينية من فصيلة اللوزيات. منها بعض مناطق امريكا الجنوبية. هليها حارق كالقراس سقها مدادة، عارضة. اوراقها لاقبسية الشكل. انهارها كبيرة القد، حراء اللون || انواعها المعروفة قليلة العدد، اشهرها التالية.

٢٤٣٦٤ - كَيْفُور اعْوَج الحَقِي

Calophora contorta (S).

Calophore à capsule cordue (F).

نوع من الكيفور. عشبة حولية تزيينية. ساقها عارضة تطول نحو ثلاثة امتار. اوراقها بيضبة مستطيلة الزام الاخضر. نصلها منشارية الحمار، باهتة انخضار يملؤها بعض الزغب والمحب. انهارها حراء اللون يملؤها بعض مواج يرتقالي || تنويرها يستمر طوال فصلي الصيف والخريف.

٢٤٣٦٥ - كَيْفُور فَرْمِيْزِي

Calophora coccinea (S). *Calophore écarlate* (F).

نوع من الكيفور. عشبة تزيينية ممرمة. ساقها عارضة تطول نحو اربعة امتار. اوراقها معتقة، السفلى ناعمة ورشمة خمرية اما العليا فاحليبية. طولها يراوح من ١٥ الى ٢٥ سم. انهارها قرمزية اللون. غلة الرجيق فيها مستطيلة الخواطوط المحيطة الاطراف || تنويرها يستمر من حزيران الى تشرين الاول.

Kysta (F). *Cyst* (E).

٢٤٣٥٨ - كَيْسَة

دملة لاقبسية الشكل والحجم تتكون تحت الجلد او في بعض النجج.

Quiscalus major (S).

Quiscale majeur (F).

طائر من فصيلة الكاروجيات. موطنه بعض مقاطعات جنوب امريكا الشمالية. يآلف المناطق الجبلية وصفاف الاجار. سره وافر العدد || جسمه كبير القد يطول نحو ٤٠ سم. منقاده اطول من رأسه وهو محدد الخيط الملوي بين التقويس. جناحه معتدل اللول. ذنبه صغير الطرف. حدة عينه جزوية اللون. ثوب الاكر اسود اسم يملو مواج جزوي في الرأس والذال ومواج اخضر في الذنب. ثوب الاثني الى الكهية السمر المابقة في الرأس والرداء والجناسين والذنب والى الكسلة الحمراء المواج في الصدر والبطن || اغلافه ريشة آسة. قوته الحشرات من الجراد الى القراش والاسادع والضفادع والرخويات ولا يفت عن الحبوب والثار النباتية || يدفن عشه في الاجار الرائجة اخصها الصنوبر. الاثني تضع من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها متناوبة الذكر نحو ١٥ يوما || عشه جرابي الشكل، بالغ الطول، ليد الحيك يملقه بفند الشجرة. طولها يراوح من ٨٠ الى ١٠٠ سم. قطر قمره من ٢٥ الى ٣٠ سم.

٢٤٣٦٠ - كَيْسَم

هو في النباتات الخشبية نسيج الساق والجذور الذي يرتكز



كَبْرُونَة



كيس الراعي



كيسكال



كَيْش

صغيرة. اضمحلتها قليلة الانقراض. زمانها الظهيرة مستطيلة، الجزء الأول منها شفاف شالك، الجزء الثاني مغشى سرح. الذيلية منفرجة، شبه فاقلة. اثنائها الى البرودة القليلة تلوحها زخارف وتجاويف متباينة الزخابة سمراء اللون غضراء الخراج || غوبها مأكولة متوسطة الصنف .



كبكه

٢٤٣٧٣ - كيلوغرام Kilogramme (F).
هو ألف غرام يعرف منه عادة بكتلة كيلو. وهو من المقاييس المترية الفرنسية التي شاع استعمالها، نظراً لسهولة كسورها، في معظم بلدان العالم.

٢٤٣٧٤ - كيلومتر Kilomètre (F). Kilometer (E).
من المقاييس السطحية قدره ألف متر.

٢٤٣٧٥ - كيلوات Kilowatt
من المقاييس الكهربائية قدره ألف واط. وهو يمثل وحدة كهربائية طاقاتها ألف جول بآتانية.

٢٤٣٧٦ - كَيْفَالِيل Chimaphila (S). Chimaphile (F). Chimaphila (E).
الاسم العلمي من اليوناني يعنى «حبيب الشفاء». جنس جنات سميرة مدادة من فصيلة الاغروسيات. منبتها يعض اوراقها حشوش البحر الابيض المتوسط || سوقها مستطيلة مدادة قليلة القروع. اوروقها متعاقبة، سنانة اتصال، صغيرة الحجم. ازهارها بيضاء اللون أو وردية || انواعها المروقة قليلة العدد، اشهرها التالية.



كبلع امس

٢٤٣٧٧ - كَيْفَالِيل صِيَوَاتِي Chimaphila umbellata (S). Chimaphila en ombelle (F).
نوع من الكيفاليل. ساقه تطول من ١٥ إلى ٣٠ سم. اوراقه جليلة اغضار تطول نحو ٨ سم. وتعرض نحو ٢ سم. ازهاره صيوانية التجميع، صغيرة القدة، وردية اللون || تنويره يستمر من حزيران الى تموز.

٢٤٣٧٨ - كَيْفَالِيل مَلَطُوع Chimaphila maculata (S). Chimaphile maculé (F).
نوع من الكيفاليل. ساقه تطول من ٢٠ إلى ٤٠ سم. اوراقه تطول نحو ١٠ سم. وتعرض نحو ٣ سم. نصلها اخضر الصفحة العليا الملطخة بالابيض، احر الصفحة السفلى. ازهاره كبيرة القدة بيضاء اللون، فواحة العرف العطري || تنويره يستمر طوال شهر حزيران.



كليس

٢٤٣٧٩ - كَيْمِيَاكِي Chimique (F). Chemical (E).

٢٤٣٨٠ - كَيْمِيَايِي Chimista (F). Chemist (E).

٢٤٣٨١ - كَيْمُوع Terra arable (F). Arable soil (E).
هو التراب الزراعي. ويصير آخر هو طبقة التراب السطحية التي يتمكن منها المزارع أو التي تسير غروبها جلور النباتات الزراعية.



كيلودكيل

٢٤٣٨٢ - كَيْمُوس Chyma
مجسمو المواد اللدائية الماتمة في اللمة بعد اعدادها الارلي.

٢٤٣٨٣ - كَيْمُوع Géophage (F).
هو التراب، اسطلي.

Empirique (F). كَيْمِيِي ٢٤٣٦٦

Empirie, Empirical (E).
هو ما اتركز على المادة أو التجربة الشخصية وليس على القواعد العلمية الململة.

٢٤٣٦٧ - كَيْكِيه Calca (S).

Calca (F). Calca (E).
جنس طير من المتطفلات وفصيلة الببغاوات. انوارها المعروفة ستة تنتمي الى حارة الدّر. موطنها معظم مناطق امريكا الجنوبية. ملينها الخالي جماعي باستثناء زين التلساف والحفن || اجسامها ريمية تطول من ٣٠ الى ٣٦ سم. اثنائها تختلف مع الانواع. الوانها الملونة الى اغضار المتفاوتات الامجات. الوانها السفلية تراوح من الزيمية الى الصفنتية والسمراء، اجنحتها ذلقة الاطراف، شبه رتاجية التركيب. لا تلحف كامل الذنب. اذانها مقطوعة الاطراف. ارساغها قصيرة، اصابعها كبيرة، شديدة السمرة || تألف القنابات القرية من الممران. قوتها التار البرية والزراعية والحجوب.

٢٤٣٦٨ - كَيْتِل مَعَايِرَة Jaugage (F).

Gauging (E).
طريقة الوصول الى تحديد المقدار او الحجم بها اشي. كقياس المياه الجارية ورسم الدّر وقطر الشجرة الخ.

٢٤٣٦٩ - كَيْل المِسَاحَة Levé superficiaire (F).

٢٤٣٧٠ - كَيْل المَسْ كَيْل Obisium lubricum (S). Obisie lise (F). Obisium lubricum (E).

دوية نافعة من فصيلة الكرنيسيات ودية المقرليات الكاذبة. جسمها صغير القد بطول نحو ٣ سم. صدرها جويوي اللون، مغطى الصفقة الماتمة. مقنباها كيران يتنباها بملغطين كلالط المتقارب يملوها حلب دقيق اطحل. بطنها مغطى عادم الذنب اكهب اللون اسمر الخراج. عنانها مركبات، صغيرة، جرابها معتدلة الطول، متخلفة اللون || تألف الاجراج وتعيش تحت الجحالة والحجارة الصغيرة. مسرحها دجوي. قوتها الحشرات الصغيرة ويكناها ويزان التمثل ودياه والديدان ... || تتمر نحو جنس سنوات بيائها الشتوي يستمر نحو اربعة اشهر. تبيض الاثني من ١٠ الى ١٢ مكنة تطفلها كالثوية يصلحها حرارية النور سمراء اللون. يتم التفت وتفتل الصلجة في اوائل تموز وتسمى الصغار طلباً للرزق بعد التفت بنحو ٤٨ ساعة.

٢٤٣٧١ - كَيْلَسْ Chellinus (S). Chéline (F).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الكيسديات الشائكات الزعانف. انواعها المعروفة نحو ٢٥ اصنافها المحيط الهندي وجواره. تتميز باستقالة زعانفها الظهيرة والشرجية ويتسدى لونها المتباينة واغضارها ميكها البطني || جميع انواعها مأكولة اشهرها كليس يشيل وهي سمكة كبيرة القدة تطول نحو ٦٠ سم. نوها الى السمرة يملوها موج اخضر.

٢٤٣٧٢ - كَيْلُود كَيْتِل Chelodactylus (S).

Chelodactyle (F).
جنس اسماك بحرية من شائكات الزعانف وفصيلة البهاريات. انواعها المعروفة عديدة. اصنافها بحار الجنوب || اجسامها شبه ابطلية التوزن تطول من ٢٥ الى ٣١ سم. وروها

التجميع . ثمارها حبوب صغيرة مستطيلة مأكولة || زراعتها رابحة وجسريه شائعة الاستعمال الغذائي .

٢٤٣٩٥ - **كَيْنُولَة** °
Phylogénèse (F).
Phylogeny (E). تاريخ تكوين ونشوء وتطور الانسال .

٢٤٣٩٦ - **كَيْنَيْت**
Kainite ملح بوتاسي طبيعي الحامضية تركيبة مزيج من كلوريد البوتاسيوم مع سلفات المغنيزيوم وبعض التي من كلوريد الصوديوم والمغنيزيوم . وهو من الاسمدة البوتاسية الحامضية الاستعمال بحوي من ١٤ الى ١٥ ٪ من البوتاس لكنه يمتص ذرات التربة السطحية ويلتصق انكاشها لذلك يحسن استعماله في الآتربة الرملية الخفيفة دون سواها .

٢٤٣٩٧ - **كَيْشِين**
Quinine الكينين اصل فاك يستخرج من لحاء شجر الكينينا ويستعمل في معالجة معظم الحيات .

٢٤٣٩٨ - **كَيْسَب** °
Prioscals (S). Prioscèle (F). جنس حشرات من غديات الاجنحة تختلف الاجزاء وفضيلة النشبات . انواعه المعروفة عديدة جميعها من علم افريقية الاستوائية والاتقال المهاردة || اجسامها كبيرة ، مستطيلة ، متتلة التبطط . رؤوسها متتلة الجرم . قرونها الاستعمارية صولجانية . تأثيرها عجيبة . كراتلها بحية الشكل . اغامها لاحقة بحزة . جراثيمها قصيرة ، مقوسة ، نشطة . انوبها لامة قليلة الالوان يكثر فيها الاسود والبني الاسمر .

٢٤٣٩٩ - **كَيْسَلْتِ الثِين** °
Hypoborus fusc (S). Hypobore du figuier, Scolyte du figuier (F). Hypoborus fusc (E). Feigenborkenkäfer (D). حشرة غاصلة غشائية مؤذية من فصيلة الكراشيات ورتبة نمذات الاجنحة . اعطائها اللبانية تمتد امتداد اقلم الثين ، من السواحل الى ارتفاع الف متر من سطح البحر . تركيب الانداد المستضفة ولا تقرب من الريانة او البايبة || جسمها صغير القف يطول نحو ٢ سم . لونها الى السمرة الكستنية يملوها في ظهرها موج اريد . رأسها معتدل الجرم . عينها صغيرتان . زباناها صولجانيات . فكهاا حليمان ذريان . ظهرهاا ذاق المؤخر اللاصت . غدهاها متانتهاا التميزيز القاطب || اجسامها الحولية تراوح من ٢ الى ٤ . اربعة اجيال في المناطق الساحلية وجيلاان في اعالي الوبوط || ويوجد الحشرة الجملدة والبرقة لا ينقطع في مناطق الساحل والوسط ، طوال مذار السنة || والحشرة من اي شق كانت تعمل في سبيل التكاثر وتاغذ حل عاتقهاا عالج السرداب الرئيسي وحجرة التصاطل ثم الانفاق الثانوية من البين واليسار . وقد يراوح عدد الانفاق الثانوية من ٣٠ الى ٤٠ .

٢٤٣٩٠ - **كَيْسِت** راجع كروزفيلم كينتر .

٢٤٣٩١ - **كِينا** هي الكينينا ، اطلها .

٢٤٣٩٢ - **كِلتورتس**
Ciltoirts هي مقر الاساس المرفج من الفرج وهي جلام مثلث الزردان او حجابها ، مركزهاا تحت الزرنية من داخلها .

٢٤٣٩٣ - **كِينكاجُو** °
Cercopithecus (S). Kinkajou (F). حيوان من الراترنيات وسيد المجلس والنوع . موطنه امريكا الوسطى يعيش في غابات مناطقهاا الاستوائية . جسته تطول نحو ٤٠ سم . بذيله ٥٠ اما ارتفاعه من ١٦ الى ١٨ سم . وهو يستعمل ذنبه كالقردة للانفعال من ضمن الى حصن ومن هجرة الى اخرى . قوته الثار واللويبات الصغيرة والمصاير والبشيش والحشرات والصل الذي يفتش عنه ويلتهم بشراسة .

٢٤٤٠٠ - **كِيوِي** °
Apteryx (S). Apteryx, Kiwi (F). Apteryx, Kiwi (E). طائر راس عدهاا وسيد المجلس والنوع من فصيلة الكيوريات . موطنه نيوزيلندا . جسمه متوسط القف ، جسمه حجم النجاسة . قويه الى السمرة السعفاء المراج . وهو اجدع الجناح ، حاد الذنب . خيطي الريش اللينق النام الذي يشبه الشعر . متقار مستطيل عذب . يصرح في الليل . قوته

٢٤٣٩٤ - **كَيْمُونُو نَنْتَس** ° ، **زَهْرَة الشِيَاء**
Chimonanthus (S). Chimonanthe, Calycat du Japon (F). Winter flower, Japan allspice (E). Japonische Keichblume (D). Chimonanto (I). جنس شجيرات برية ورتنية من فصيلة الكليكتسيات . انواعه قليلة البند . سواهاا تملو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم . اوراقهاا حابلة ، متعاقبة ، بسيطة ، نصلهاا سناني الشكل ، مالم البشرة ، زاهي الخضار || ازهارهاا متتلة انبوبية جرثوية المرف . الوانهاا تختلف مع اولوهاا منها الابيض والاحمر والاصفر والموش || ازهارهاا يستمر من كانون الاول الى اذار .

٢٤٣٩٥ - **كَيْمِيَاء** ، **كَيْمِيَاء**
Chimie (F). Chemistry (E). علم يبحث في تكوين المادة والتغيرات التي تلحق بها من جراء عوامل مختلفة تفقد الجسم مظهره الخاص وصفاته التي يتميز بها .

٢٤٣٩٦ - **كَيْمِيَاء حَيَوَانِيَّة**
Zoochimie (F). Zoochemistry (E). قسم من علم الكيمياء يبحث في تفاعلات الانسجة الحيوانية .

٢٤٣٩٧ - **كَيْمِيَاء كَهْرَبَالِيَّة**
Electro-chimie (F). Electro-chemistry (E). قسم من علم الكيمياء يبحث في المناشع الكيائية التي تنيرهاا الكهروا .

٢٤٣٩٨ - **كَيْمِيَاءِيَّة**
Biochimie (F). Biochemistry (E). قسم من علم الكيمياء يبحث في تفاعلات المادة الحية .

٢٤٣٩٩ - **كِيمِيَا تَبَايِيَّة**
Phytochimie (F). Phytochemistry (E). قسم من علم الكيمياء خاص بالنبات .

٢٤٣٩٠ - **كَيْسِت** راجع كروزفيلم كينتر .

٢٤٣٩١ - **كِينا** هي الكينينا ، اطلها .

٢٤٣٩٢ - **كِلتورتس**
Ciltoirts هي مقر الاساس المرفج من الفرج وهي جلام مثلث الزردان او حجابها ، مركزهاا تحت الزرنية من داخلها .

٢٤٣٩٣ - **كِينكاجُو** °
Cercopithecus (S). Kinkajou (F). حيوان من الراترنيات وسيد المجلس والنوع . موطنه امريكا الوسطى يعيش في غابات مناطقهاا الاستوائية . جسته تطول نحو ٤٠ سم . بذيله ٥٠ اما ارتفاعه من ١٦ الى ١٨ سم . وهو يستعمل ذنبه كالقردة للانفعال من ضمن الى حصن ومن هجرة الى اخرى . قوته الثار واللويبات الصغيرة والمصاير والبشيش والحشرات والصل الذي يفتش عنه ويلتهم بشراسة .

٢٤٣٩٤ - **كِينُوَا** ° ، **أَلِيْنَة كَيْنُوَا**
Chenopodium quinoa (S). Quinoa, Petit riz (F). نوع من الاينة وهو نبات عشبي يجلى حولي زراعي مهدد ببلاد الشيلي والبيرو . ساقه متصببة قليلة الفروع . اوراقه معتقة متعاقبة سنانية التصل المرفرس . ازهارهاا سنيلي ليد



كيمونتس



كينكاجو



كينوا



كيب



كين ثين



كِيوي

Œuf très petit (F).

Little egg (E).

هي البيضة اي البيضة الشديدة الصغر .

٢٤٤٠٢ - كِيِيَكَة

الحشرات والديدان والحبوب . يعيش ذكراً واثقاً . انثاه
تحضن في الحول من مرتين الى ثلاث مرات . حفتها بيضة
واحدة ترخها نحو ٢٤ يوماً .

Micro-organisme.

Microorganisme (F). Micro-organism (E).

تعريف يطلق عل كل كائن حي شديد الصغر لا يشاهد
بالعين المجردة بل تحت المجهر كالميكروبات والبكتيريات
والفائز والاصفان والاولاي .



٢٤٤٠٣ - كِيِيِيْن

Apterygidae (S).

Aptérygides (F). Apterygidae (E).

نصيعة طير من الموردي تشتمل حالياً بنوع واحد ينحى
كيري موطنه نيوزيلندا .

٢٤٤٠١ - كِيِيَوَات



Electrode

٢٤٤١٢ - لاجب

هو القطب الكهربائي أو المنفذ الكهربائي .

Lepismidae

٢٤٤١٣ - لاجسات

فصيلة حشرات تعرف بالشحبيات ، اطباها .

Lepisma (S).

٢٤٤١٤ - لاجسة

Lépisma (F). Lepisma (E).

جنس حشرات من فصيلة اللاحسات . انواعها عديدة تعيش على المواد العضوية والتشوية . راجع شحبية .

٢٤٤١٥ - لاجسة السكر *

Lepisma saccharina (S). Lépisma du sucre. Petit poisson d'argent (F). Silberfischchen (D).

حشرة صغيرة القند اطيحية الشكل فضية اللون من فصيلة اللاحسات مبدولة في البيوت تلتصق السكر وتقرض القرمزية والكتب .

Cœlentérés (F).

٢٤٤١٦ - لاجسات

Cœlentérata (E).

هي الحيوانات ويدعونها في مصر « جوفويات » . شعبة من الحيوانات الدنيا تتميز بجلوها من الاحشاء والامتعاضة عنها أو الاكتفاء بتجوييف وحيد الفتحة يقوم مقام الدم والانس .

Zoophage (F).

٢٤٤١٧ - لاجيم ، واكيج

Zoophagous (E).

ما كان قوته اللحم حيواناً كان ام دودية ام حشرة .

Carnassiers

٢٤٤١٨ - لاجيمات

هي آكلات اللحوم ، اطباها .

Apétale (F). Apetalous (E).

٢٤٤١٩ - لايتكي

هو النبات الذي لا قسالة في زهرته . وهي الزهرة العالمة البتلات .

Lactifère (F). Lactiferous (E).

٢٤٤٢٠ - لاين

نمت تمريني يطلق على الاوعية العضوية التي تنقل اللبن او المصارات اللبنية في الحيوان والنبات .

٢٤٤٢١ - لاكتافيمي بالوكالة

Nul ne plaide par procureur (F).

مبدأ قانوني فرنسي سري مسرى الاثقال لعملاء انه اذا وكل عمرو زيدا مقاضاة بكر يجب ان يذكر في صحيفة الدعوى وفي الحكم اسم الوكيل والاصليل .

Grémillet (F).

٢٤٤٢٢ - لاكتستبي

نبات تريني يدعى آذان الفأر المنقي ، اطليه .

Lathyrine (F).

٢٤٤٢٣ - لاثيرين

هي الجلبانين ، راجعها .

Calcifuge (F).

٢٤٤٢٤ - لاجقي

نمت تمريني يطلق على النباتات التي لا تنمو في الارربة الكلسية او انها تنحاشها .

Frémteur (F). Brakesman (E).

٢٤٤٢٥ - لاجيم

نمت تمريني يطلق على الاصحاب والمضلات التي تستطيع قمع حركات بعض الاعضاء او اعمالها .

٢٤٤٢٦ - لاجيم الفيفدع

نبات يدعى كلوة الماء ، اطباها .

لاحة السكر

٢٤٤١٩ - لا حيوي

Abiotique (F), Abiotic (E)

نقيض الحيوي .

٢٤٤٢٠ - لاصيب

Intensif (F), Intensive (E)

نمت تعريفي يطلق على كل ما يتميز بطابع الانتاج الوافر .

٢٤٤٢١ - لاعتشوبي

Abranche (F)

Abbranchiate (E)

نمت تعريفي يطلق على الحليقات المادامات اغلياشيم .

٢٤٤٢٢ - لادن ، لادن

Ladanum

مادة صمغية رائحتها طيبة تقزمها سوق واوراق بعض النباتات اخصها نبات الالادن . لوئها يراوح من الاشهب الصناعي الى الجوزي الاسمر المالح ، وهي ذكية العرف طيبة الرائحة || كان لا يزال يستعمل في الطب وبهم من استعمله للنجح وهو شائع الاستعمال المعطري .

٢٤٤٢٣ - لادن ، قستوس ، قستوس ، قستوس

Cistus (S), Ciste (F), Cistus (E)

جنس نباتات طيبة بروية وتربيتية من فصيلة الالادنيات . انواعه المروفة ٢٠ منها الاجنات والجيلات والاعشاب . اصلها حوض البحر المتوسط . سيقانها قصيرة متضبة فرعاء . اوراقها ابيدة كاملة متقابلة صغيرة النصل . ازهارها لاقياسية التجميع ، جيلة الشكل ، خلمية الزينات . ثمارها حقية خامية او عشارية الاخية || اشهر انواعها ما يتبع .

٢٤٤٢٤ - لادن اجعد

Cistus crispus (S)

Ciste crépu (F)

نوع من الالادن الممر وهو بجلة سبروتية تملو نحو ٥٠ سم . اوراقها لاطئة سنائية الشكل . نصلها اجعد الصفعة الخشنة الزيادة القواسمة العرف المعطري . ازهارها ارجوانية اللون صغيرة الحجم قطرها نحو ٣ سم . || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

٢٤٤٢٥ - لادن اُرْهَب *

Cistus hirsutus (S)

Ciste hérissé (F)

نوع من الالادن الممر وهو جنبة سبروتية تملو من ٥٠ الى ٨٠ سم . ساقها وفروعها كثيفة الزغب . اوراقها رهلة . نصلها ليد الخمل على مسطحه . ازهارها متكونية التجميع ، متوسطة القند ، لوئها الى الابيض المبيح بالأصفر || ازهارها يستمر من حزيران الى تموز .

٢٤٤٢٦ - لادن إسباني ، قستوس لاذني

شقرامس ، قستوس

Cistus ladaniferus (S), Ciste ladanifère, C. lédon, C. d'Espagne, Ladanum d'Espagne (F), Gum-cistus, Lircharbaum (D), Larice, Abeto larice (I), Ladanum-resin tree (E), Spanische Cistrose (D), Ciste ladanifère, C. di Spagna (I).

نوع من الالادن الممر ، يكثر في حصاب اسبانيه وبيجاها وهو جنبة بلولة تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . ساقها فرعاء . اوراقها لاطئة ثلاثية العروق . نصلها اخضر الصفعة العليا الخمر السفلى الكثيفة الخمل والزغب . ازهارها كبيرة القند قطرها يراوح من ١٠ الى ١٠ سم . لوئها الى الابيض يعلوه ترشيح وتبييض احر || اوراقها وفروعها لزجة يستغلط منها الالادن المشهور . ازهارها يستمر من نيسان الى حزيران .

٢٤٤٢٧ - لادن كرتيني ، قستوس الكرتيني ، عيتد

Cistus creticus (S), Ciste de Crète (F), Cretan rockrose (E), Kretische Cistrose (D), Cisto di Creta (I).

نوع من الالادن الممر الجليل . جنبتة تملو نحو ١٠٠ سم . ساقها فرعاء . اوراقها قصيرة الاصل ، صغيرة القند ذرية . نصلها يتقاطع العروق والاعصاب ، غشن الخمل ، ازغب البشرة على مسطحه . ازهارها قمرية اللون ، كبيرة القند ، قطرها يراوح من ٨ الى ٨ سم . || اوراقها وفروعها وساقها لزجة يستغلط منها اجود اصناف الالادن || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

٢٤٤٢٨ - لادن طوطي ، برعين

Cistus villosus (S), Ciste cotonneux (F)

نوع من الالادن الممر . جنبتة تملو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . ساقها وفروعها مزينة . اوراقها معتقة ييشية . نصلها اغشن الصفعة المتضمة الزباء . زغبها ليد مستطيل يعلو كتيل القطن . ازهارها فردية فرعاء اللون ، قطرها نحو ٥ سم . || ساقها وفروعها واوراقها لزجة يستغلط منها الالادن || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

٢٤٤٢٩ - لادن عاري الورق

Cistus laurifolius (S), Ciste à feuilles de laurier (F)

نوع من الالادن الممر وهو جنبة سبروتية تملو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . ساقها فرعاء . اوراقها معتقة غارية الشكل . نصلها ثلاثي العروق ، ماس الصفعة العليا ازغب السفلى . ازهارها بيضاء اللون ، كبيرة القند ، قطرها يراوح من ٥ الى ١٠ سم . || ازهارها يستمر طوال شهر حزيران .

٢٤٤٣٠ - لادن قروسي الورق

Cistus salvicifolius (S), Ciste à feuilles de sauge (F)

نوع من الالادن الممر وهو جنبة بلولة ترغب في الازربة الربلية ، تملو من ٦٠ الى ٢٠ سم . اوراقها معتقة قوسية الشكل عادمة العروق . نصلها ازغب البشرة على مسطحه ، ابيض الصفعة السفلى المشبهة الخمل والزغب . ازهارها الى البياض الاصفر . قطرها نحو ٥ سم . || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

٢٤٤٣١ - لادنيات

Cistaceae (S)

Cistacées (F), Cistaceae (E)

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة القلمات ، اجناسها اربعة ، أما انواعها فكبيرة العدد . اشهر اجناسها الالادن والملايين .

٢٤٤٣٢ - لار

Lar

هو جبون لار ، اطبه .

٢٤٤٣٣ - لارس ، مَلَر

Larix (S)

Larix (S), Larix, Mélèze (F), Common larch (E), Lirchar, Lircharbaum (D), Larice, Abeto larice (I).

جنس اشجار سرجية من التنزيات وفضيلة الصنوبريات . انواعه المعروفة نحو ١٢ اجمارها كبيرة الحجم ، هريفة الشكل ، اقية الاغصان والفروع . غراخها مبررة ، بناتها جانبية الاغصان ، قصيرة القند . اوراقها خطية ، غنية التجميع ، عابلة . ازهارها وسيدة المسكن ، الاثنية قدية الشكل . ثمارها اكواز صيرة . اغصانها جزوية اللون صلبة ، قشورها تستعمل في الدفاعة ويستخرج من سيقانها بالخر مادة رائتجبة شائعة الاستعمال الصناعي || امرف انواعها واشهرها ما على .



لاذن ازغب



لاذن اسباني



لاذن كرتيني

صفحة العليا خضراء اللون غنّدة، صفحته السفلى خفيفة البنية، خضراء اللون. وأوراقها حده تشقّر عند اقترابها من الخريف فتبدو بلون الذهب. أكوازها مخروطية الشكل تطول من ٦ إلى ٧ سم. وتعرض من ٤ إلى ٥. جرتها باجوية اللون، هريّة الشكل، ناشرة.

٢٤٤٤٠ - لارورد ، لارورد

Lapis, Lapis-lazuli, Lazulita

حجر كريم مشهور، أجوده الصافي الشفاف الأزرق الشارب إلى حمرة وخضرة.

٢٤٤٤١ - لاروردية

Cynanthus (S).

Cynanthus (F). Cynanthus (E).

عشبة معمرة، برية وتربوية من فصيلة الجريسيات. منبتها الهند وقد انتشرت زراعتها الحدائقية والمركبة في أكثر من قطر. ساقها قصيرة تملو نحو ٢٠ سم. جلويها درياء مستطيلة. أوراقها متعاقبة، بيضيّة النصال، صغيرة الحجم. أزهارها فردية، محورية الأركان، لأزوردية اللون. قطرها نحو ٣ سم. انتويرها يستمر من أواسط آب إلى أواسط أيلول.

Agame, Asexuel (F).

Agamous, Asexual (E).

كل ما هو عادم الشق أي عادم الأعضاء التناسلية في الحيوان وفي النبات.

Lachenalia (F).

٢٤٤٤٢ - لاشيتال

هي زينة البير، اطلبه.

Dessev (F).

٢٤٤٤٤ - لاصع

نمت تمرطي يطلق على التسع النباتية الحالية من المواد الصائفة.

Plantain (F).

٢٤٤٤٥ - لاصب

جنس نباتات عشبية كثيرة الأنواع اشتهرت باسم لسان الحمل، اطلبه.

Lates (S).

٢٤٤٤٦ - لا طيس ، ليشر

Lates (F). Lates (E).

جنس اسماء نهرية من شالكات الزخائف وفصيلة الفرغيات. انواعه قليلة العدد اصطلحوا نهر البلاد الاسيوية والافريقية الحارة كالنيل والنيجر والكنج والفرات ... جميعها كبيرة القد مستطيلة الجسم محدودة الطول. انواها الى السمرة القصية يملوها موج مختلف باختلاف النوع. طولها مأكولة لكنها دون الوسط. اشهر انواعه ما يلي.

٢٤٤٤٧ - لا طيس النيل * ، حيمار البحر، فرخ

Lates nilotica (S).

Lates du Nil (F). Great Nile perch (E).

نوع من الاطس وهي سمكة كبيرة القد، طولها نحو ١٠٠ سم. تكثر في مياه النيل من منبه الى مصبه. وهي من الاسماك المأكولة المنتشرة الصنف. وكان المصريون من عهد الفرعنة الى عهد الرومان يقدسونها وبها سميت مدينة لا طوبوس اي اسنا في الصعيد.

Lates maxima (S).

٢٤٤٤٨ - لا طيس الهند

Lates des Indes, L. du Gange (F). Great Ganges perch (E).

نوع من الاطس وهي سمكة كبيرة القد خضنة، طولها نحو

٢٤٤٤٩ - لاريس أروبة * ، مكر أروبة

Larix europaea, L. decidua (S). Larix d'Europe, Mélèze d'Europe (F).

نوع من اللاريس منته جبال أروبة. شجرته تملو من ٣٠ إلى ٤٥ م. غراحيها صفراء اللون. أوراقها تطول من ١٥ إلى ٣٥ م. وتعرض نحو ٥. وهي رطلة، كثرة في الشكل، ثلاثية الصفحات، حيلة الخضار الزاهي. أكوازها الانثوية ارجوانية اللون. أكوازها تملو من ٣ إلى ٤ م. وتعرض نحو ٢. جرتها سكية الشكل كثيرة العدد.

٢٤٤٥٠ - لاريس الصين ، مكر الصين

Larix chinensis (S). Larix de Chine, Mélèze de Chine (F).

نوع من اللاريس منته جبال الصين. شجرته سرية، تملو من ١٥ إلى ٢٥ م. غراحيها زياء سطحية اللون. بناتها خلية. أوراقها ثلاثية الصفحات تطول من ٢ إلى ٣ م. لوها الى الخضار المائل يملو موج أزرق. أكوازها مخروطية تطول من ٣ إلى ٥ سم. جرتها بارزة مشننة الاصغر.

٢٤٤٥١ - لاريس اليابان * ، مكر اليابان

Larix leptolepis (S). Larix du Japon, Mélèze du Japon (F).

نوع من اللاريس منته جبال اليابان. شجرته سرية سريعة النمو تملو من ٢٥ إلى ٣٠ م. غراحيها جوية اللون لامة. بناتها خلية لبشرة، بحرية اللون. أوراقها ثلاثية الصفحات تطول من ١٥ إلى ٣٠ م. لوها الى الخضار الصافي الموج، أكوازها مخروطية صفراء اللون تطول نحو ٤ سم. جرتها لتسوية الشكل غائرة الخار.

٢٤٤٥٢ - لاريس أمريكة ، مكر أمريكة

Larix americana, L. pendula (S). Larix d'Amérique, Mélèze d'Amérique (F).

نوع من اللاريس منته أمريكة الشمالية. شجرته سرية بطيئة النمو تملو من ٢٥ إلى ٣٠ م. غراحيها الى الحمرة البنفسجية. بناتها بحرية اللون، ودية الطيل. أوراقها ثلاثية الصفحات، حيلة الخضار الزاهي تطول من ١٥ إلى ٣٠ م. أكوازها جوية اللون تطول نحو ٣ سم. وتعرض نحو ٢.

٢٤٤٥٣ - لاريس سيبيرية ، مكر سيبيرية

Larix sibirica (S). Larix de Sibérie, Mélèze de Sibérie (F).

نوع من اللاريس منته سيبيريا. شجرته سرية تملو من ٢٥ إلى ٤٠ م. غراحيها سود الخار. أوراقها ثلاثية الصفحات تطول من ٤ إلى ٥ سم. وتعرض نحو ١ م. انواها الانثوية الى الخضار الباهت. أكوازها مخروطية تطول من ٤ إلى ٥ سم. جرتها بارزة مشننة الزوايا، قليلة العدد.

٢٤٤٥٤ - لا ريس كاذب ، مكر كاذب

Pseudolarix (S). Faux-larix, Faux-mélèze, Sapin doré, Arbre d'or (F). Golden larch, G. pine (E). Echte Goldlärche (D). Abeto d'oro (I).

شجرة حرجية سرية، سريعة النمو، هريّة الشكل، وسيدة الجنس والنوع من التنزيات. مهدا جبال الصين الشمالية. تملو من ٣٠ إلى ٤٠ م. اغصانها انقية الانتشاب فارشة. أوراقها عابطة، ضمة التجصيح. نصلها خطي الشكل يملو من ٥ إلى ٨ سم. ويعرض من ٣ إلى ٣ م.



لاريس أروبة



لاريس اليابان



لا طس النيل

تطول من ٨ إلى ١٠ م. تحله نسل أوراق التبغ الاخضر وتسرده بين بشرتيه فينبو شفاثا خاليا من المواد البتية الحمية. راجع جنس الباطا .



لاية

٢٤٤٥٨ - **لايحة التين** ° *Mineuse du figuier (F).*
هي قربة تين ، اطليا .

٢٤٤٥٩ - **لايحة الزرع** ° ، *Agromyza ambigua (S).* *Mineuse des céréales (F).*
حشرة صغيرة من اللايحات . طولها يراوح من ٣ إلى ٤ م. رأسها ويطنها الى الجوزة البنفسجية . كسلها الى السواد الأزرق الملوخ . تكثر في اراثل نيسان . تمتع مكها حل حلف الزرع فينتف عن رقات تلم النسيج وتسبب ذبوله .



لاية الارضي شوكي

٢٤٤٦٠ - **لايحة الكرنتيم** ° ، *Phytomyza atricornis (S).* *Mouche des chrysanthèmes (F).*
حشرة صغيرة من اللايحات ، طولها يراوح من ٢ إلى ٣ م. لونها الى الزبداء السراء تملوها بقع صفر . رقاتها تركيب اوراق الكرنتيم فتلفها وتؤذيها أشد الأذى .



لاية التبغ

٢٤٤٦١ - **لايحة اللوبيا** ° ، *Agromyza phaeoli (S).* *الفاصوليا °*
حشرة صغيرة من اللايحات ، طولها نحو ٣ م. فوجها اسود لاح . تمتع مكها في اوراق اللوبيا قرب الفلفل فينتف عن رقات تعيش بين بشرتي الورقة ثم تنجس بحر الفلفل ويها الى الملقاق فالساق فالمرقة حيث تبقى الى ان يتم انسلخها وتتحول الى كزود .



لاية الزرع

٢٤٤٦٢ - **لايحة اوراق الأشجار المثمرة**
Mineuse des feuilles des arbres fruitiers (F).
حشرة مؤذية من حشرات الاجتحة تدعى رقاعة ملوطة ، اطليا .

٢٤٤٦٣ - **لايحة**
Euphorbia officinale (F).
هي القريقين الخروني ، اطليا .

٢٤٤٦٤ - **لايحاتي**
Invertébrés (F). *Invertebrata (E).*
الانقاريات قسم من الحيوانات لا فغار لها . فالاريا والاسفنجيات والمحيطيات والشوكيات والدوديات والرخويات جميعها من الحيوانات الانقارية .



لاية الكرنتيم

٢٤٤٦٥ - **لايحاتي**
Acotylédone (F). *Acotyledon (E).*
نمت تمرني يطلق على النبات الدقيق الثقلة .

٢٤٤٦٦ - **لايحة بوهية**
Zygospore

٢٤٤٦٧ - **لايحاتي**
Atracheates (F). *Atracheates (E).*

فئة من الحلييات تشمل الانواع الباعثة الرطام ، الجلدية التنفس . جميعها من الحيوانات الدنيا تتغفل على الحيوان او تعيش على المواد العضوية السائلة نحو الانحلال .



لاية الربابة

٢٤٤٦٨ - **لايحات النمل**
Ant-thrush. *Ant-catcher (E).*

مرتبة من الطير تنسب الى رتبة الجرام . فصائلها واجناسها

١٣٠ م. تكثر في مياه الكنج من منبه الى مصبه . فوجها الى السرة الفحمية يعلوها موج جزوي يميل حته الطهر ويضف وزعو حته البطن .

٢٤٤٦٩ - **لايحات العيون**
Edriophthalmes
شعبة من الحيوانات الثريات اللينات الصف .

٢٤٤٧٠ - **لايحات المتك**
Diplours. *Eutotrophes*
رتبة حشرات مدنية من هليات الانذاب . اجناسها وانواعها نحو ١٥٠ اطليها جميع المناطق الحارة والمعتدلة . تتميز بصغر مكها واحتجابها ، باستطالة قرونها الاستشعارية البديدة الفواصل وباراسها الوحيدة المغاسل .

٢٤٤٧١ - **لايحات**
Sesilio (F).
نمت تمرني يطلق على الاعضاء النباتية التي لا تقدم حل دعائم بل تركز مباشرة على الهود كقوك ورقه لاطنة .

٢٤٤٧٢ - **لايحاتي**
Inorganique (F). *Inorganic (E).*

٢٤٤٧٣ - **لايحة**
Lophospermum (S). *Lophosperme (F).*
جنس نباتات عارضة خلية لزجة من فصيلة الخنازريات . انواعها قليلة ، سيقانها فراء تطول من ٢٠٠ الى ٤٠٠ م. اوراقها متفكة قليلة خاسية التغميس . نصلها خلية البثرة مسنن الحافة . اثمارها فردية ، محورية الارتكاز ، كبيرة القد ، طويلة الزناد ، وريدة اللون موحية بالابيض والاصفر وهي مثوية التريج يحرسها النمل .

٢٤٤٧٤ - **لايحات**
Agromyzidae (S). *Agromyzidae.* *Leaf miners (E).* *Minterfliegen (D).*

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها المعروفة نحو ٥٠٠ . جميعها صغيرة القد ، رمادية اللون او بنية ، ملوثة الجناح . تطفر في الربيع . تمتع مكها على اوراق النبات وصاليجه فتنتف عن رقات دقيقة خيطية تدخل النصل فتلفه وتفسد حلاياه ، بين البشريات ، ثم تتحول بعد انسلخها الاخير الى كزود تحكث في مكها او تقيم في التربة كامل فترة بيائها الملوي .

٢٤٤٧٥ - **لايحة الارضي شوكي**
Agromyza andaluslaca (S). *Mineuse de l'artichaut (F).*

حشرة صغيرة من اللايحات . طولها يراوح من ٣ الى ٤ م. جسمها ازغب الكساء . فوجها الى السرة العابقة . اجناسها الحولية ثلاثة ، رقاتها تلمن هروق اوراق الارضي شوكي فتلفها .

٢٤٤٧٦ - **لايحة البهنية**
Phytomyza liliis (S). *Mouche du houx (F).*

حشرة صغيرة من اللايحات . طولها يراوح من ٣ الى ٤ م. فوجها اسود اللون . رأسها وجرانها جملدة بالاصفر . رقاتها تركيب اوراق البهنيات فتلفها وتؤذيها .

٢٤٤٧٧ - **لايحة التبغ**
Phthorimaea operculella (S). *Mineuse des feuilles de tabac (F).*
فراشة من فصيلة المنجوليات تدعى جنسها الباطا . حورياتها تحيلة فراء اللون محتلة الرأس هلية النقط الترجية الجانية .

٢٤٤٧٨ - لَامَة * ، جَسَلْ أَمْرِيكَة

Auchenla, Lama (S). Lama

جنس حيوانات لبونة عاشية من فصيلة الجمليات . أنواعها أربعة ، موطنها هضاب وجبال أمريكا الجنوبية . أجسامها رفيقة القوام ، طولها يراوح من ٢٠٠ إلى ٢٥٠ سم . وارتفاعها من ٨٠ إلى ١٢٥ سم . أذناتها مسطيلة ، أوبارها صناعية جيدة الصنف تحميه القدر . قوتها الأعشاب . بعض أنواعها داجن يستعمل لدر الحليب ونقل الأقال .

٢٤٤٧٩ - لَامَسَاوِي الأوراق

راجع غير متساوي الأوراق .

٢٤٤٨٠ - لَامَسَاوِي البتلات

راجع غير متساوي البتلات .

٢٤٤٨١ - لَامَسَاوِيه الأجزاء

راجع غير متشابه الأجزاء .

٢٤٤٨٢ - لَامِيكِي

Atypique (F). Atypic (E).

Lamarkia (S). لا مَرَكِيَة ، قَد يُون .

Lamarkia, Codion (F). Lamarkia (E).

جنس نباتات عشبية معقودة التعريف على اسم العلامة « لامارك » . وهي برية ، معروية ، حولية أو ممرمة من فصيلة النجيليات . أنواعها المعروفة قليلة العدد ، منها جوش البحر الأبيض المتوسط || سوقها شطئية فراء تملو من ٢٠ إلى ٥٥ سم . صفها متدل الطول ، قليل التعرض . ازهارها سبلي التجميع ، شبه غروطي الشكل ، سبيلاتها متدلية .

٢٤٤٨٤ - لَامِسَة

Tentacle (F). Tentacle, Feeler (E).

ج . لولس . زوائه لا مفصليّة قابلة الانعطاف والانكماش . توجد عند بعض الحيوانات تمكّنها من القبض على فريستها أو التماس طريقها ...

٢٤٤٨٥ - لَامَسِيَمِيَات

Aplacentales (F). Aplacentalia (E).

شعبة من صف الفصريات . فصائلها وأجناسها عديدة تجتمع إلى رقبين : الجرابيات ووحيديات المسالك .

٢٤٤٨٦ - لَامِعَات

Ganoides (F). Ganoids (E).

رتبة أسماك غضروفية تشمل بعض الفصائل أخصها الحفشيات .

٢٤٤٨٧ - لَامِعَة

هي القوتية ، نبات من الورديات ، أطبا .

٢٤٤٨٨ - لَامَقْصِي

Inarticulé (F). Inarticulate (E).

نمت وصني يطلق على الاعضاء العادة المفصائل .

٢٤٤٨٩ - لَامِي

هو الأمريد ، أطبا .

٢٤٤٩٠ - لَامِي البَكْسَم

هو الأمريد البلسي ، أطبا .

٢٤٤٩١ - لَامِي المَكْسِيَة

هو أمريد المكسيك ، أطبا .

وأنواعها كثيرة العدد معظمها من طيور افريقية وأمريكية . تأثت المناطق الحارة والامتوائية || أما فصائلها فهي الجليديات وإقناجيات والقرناريات والمأنوريات والمختبرات والوصيات .

٢٤٤٩٦ - لَأَثُون مُنْقَط

Lacon punctué (F).

هو السائل المنقط ، أطبا .

٢٤٤٩٧ - لَأَيَسِي ، لَأَنَسَاكِي

Asymétrique (F). Asymmetrical (E).

نمت تعريفي توصف به الأشياء الشاذة من نظم القياسات المألوفة .

٢٤٤٩٨ - لَأَلَا

Renoncule d'Orient (F).

هي الحوذان الآسيوي ، أطبا .

٢٤٤٩٩ - لَأَلَة

Trillium (S). Trillie (F). جنس نباتات عشبية سريرية من فصيلة الزنبقيات . أنواعها المعروفة عديدة . أنصاتها العالم معظمها أمريكي المهد . ترطب في المناطق الظليلة . أروبتها منادة ، سوقها قصيرة تنتمي بقسمه للأقية الأوراق تملوها زهرة ملونة ثلاثية البتلات . أعرف أنواعها وأشهرها ما يلي .

٢٤٤٩٩ - لَأَلَة الثلج

Trillium nivale (S).

Trillie des neiges (F).

نوع من الالة . ساقها تملو من ٦٠ إلى ٩٠ سم . أوراقها مستطقة ، بيضيه ، صغيرة اللد . نصلها ثلاث المروق يطول نحو ٥ سم . أزهارها بيض ، قطرها نحو ٤ سم . أزهارها يستمر من آذار إلى نيسان .

٢٤٤٧٤ - لَأَلَة حَافِيَة

Trillium semile (S).

Trillie sessile (F).

نوع من الالة . ساقها تملو من ١٥ إلى ٣٠ سم . أوراقها حاشية ، نصلها ثلاث المروق اعليجي الشكل مذهب الزام الأخير يطول من ٧ إلى ١٥ سم . أزهارها قوزية اللون ، قطرها يراوح من ٥ إلى ٦ سم . أزهارها يستمر من نيسان إلى أيار .

٢٤٤٧٥ - لَأَلَة كَبِيرَة الزَهَر *

Trillium grandiflorum (S). Trillie à grande fleur (F).

نوع من الالة . ساقها تملو من ٢٠ إلى ٥٠ سم . أوراقها حاشية . نصلها خماسي المروق اعليجي الشكل ذلق الزام الأخير يطول من ١٠ إلى ١٤ سم . أزهارها عمادة العرف ، كبيرة اللد ، قطرها نحو ١٢ سم . لونها إلى الأبيض أو الوردي . أزهارها يستمر من أيار إلى حزيران .

٢٤٤٧٦ - لَأَلَة مُنْتَصِيَة

Trillium erectum (S).

Trillie dressée (F).

نوع من الالة . ساقها تملو من ٢٠ إلى ٤٠ سم . أوراقها حاشية . نصلها خماسي المروق ، سناني الشكل ، مستطق الزام الأخير يطول نحو ١٢ سم . أزهارها جفر ، كبيرة اللد ، منتصبة الانكناز . بتلاتها إلى الخضار الأصفر يطولها حنار اخر وتغطي ثلاثة خطوط جزوية . أزهارها يستمر من نيسان إلى أيار .

٢٤٤٧٧ - لَامَاكِي ، هَيْبِلَر

Anhydre (F).

Anhydrous (E).

نمت تعريفي توصف به الأجسام الحالية من الماء أو العادة الماء .



لَاَة كَبِيرَة الزَهَر



لَاَة

٢٤٥٠٠ - لَاهَوَاتِيَّة ، أَتِيرَابِيَّة (F).

Anseroble (F).

Anserobe (E).

صفة الكائنات الحية المجهرية التي تستطيع العيش منقطعة عن الهواء .

٢٤٥٠١ - لَائِدَّة

في الخواص ، اطليا ، ومنها الاصلية والذكر والحرسمة والحسنة .

٢٤٥٠٢ - لَائِتَحَلَّ ، لَائِدَوْب (F).

Indissoluble (F).

Undissolved (E).

هو ما في جوف الحبة واللوزة وغيرها من مادة جامدة مأكولة أو غير مأكولة .

٢٤٥٠٣ - لَبْ

Pulpe (F). Pulp (E).

هو ما في جوف الحبة واللوزة وغيرها من مادة جامدة مأكولة أو غير مأكولة .

٢٤٥٠٤ - لَبْا التَصَرَّة ، هِيْزُوْكَرْب

Mésocarpe (F). Mesocarp (E).

هو البندق ، الجزء المتوسط من الثمرة ، وهو الجزء اللحمي في الثمار المأكولة .

٢٤٥٠٥ - لَبْ التَارْبِيل ، كُبْرَة

Coprak, Copra (F). Coco-nut (E).

لب ثمر التاربييل الذي يستخرج منه بالصر دهن نباتي يدعى « سمن نباتي » .

٢٤٥٠٦ - لَبْ يَتِي

Brunissement Interne (F).

Internal browning (E).

عارض يصيب ثمار التفاح الخزونة في البراد ، قوله عروق مستطيلة مستقيمة ومتعرجة تشعب من وسط الثمرة الى سطحها فتقطع الخلايا التي تغطيها وتسبب اختار عصيرها .

يقال ان اسبابه تعود الى انخفاض درجة الحرارة قرب زرع ادراك الثمار والى بطولها في البراد حتى درجة الصفر واستمرارها على هذه الدرجة بعض الوقت .

٢٤٥٠٧ - لَبَا

Arroser (F).

To water, To sprinkle (E).

لِبَا التَصَرَّة : سقاها عند فرسها ، اذا فرست ليفة يجب ان تلبها .

٢٤٥٠٨ - لَبَا

Amouilla, Colostrum (F).

Beestings, Colostrum (E).

اول حليب عقب الوضع تدره البقرة والنعاء والاعرة . وهو غني بالمواد الاحية فقير بالزبد والسكر والماء .

٢٤٥٠٩ - لَبَاب

Pulpe (F). Pulp (E).

هو بويضة عام جاع المادة الدرقية النباتية الطبيعية . وهو بويضة غامض ما تبقى من الثريد بعد استخراج السكر ومن البطاطا بعد استخراج النشا .

٢٤٥١٠ - لَبَابِي ، لَبْرَبِي ، أَتِيرَابِي ، لَحِيم

Pulpeux (F). Pulpous, Pulpy (E).

٢٤٥١١ - لَبَادِي ، لَبَادِي قال الجاحظ : « طائر على شكل البنان اذا اسفحل الارض لبه فلم يكد يطير حتى يطار » .

٢٤٥١٢ - لَبَان ، بَسْتَج

Boswellia (S).

Boswellie (F).

جنس اشجار حرجية من سبط البخوريات وفصيلة البطليات انواعه الممرودة قليلة اصنافها جبال المناطق الاستوائية الحسنة

٢٤٤٩٢ - لَاهِيَّة الصَّفَصَاف (F).

Lamie des saules (F).

في ثريبي الصفصاف ، اطليا .

٢٤٤٩٣ - لَامِيُون

Lamium (S).

Lamier (F). Dead-nettle (E).

جنس نباتات برية معمرة من فصيلة الشفويات ، انواعه نحو ٤٠ جميعها احشاب تعملون من ٣٠ الى ١٢٠ سم . اوراقها متعاقبة ، مستطقة ، مخززة . ازهارها خضراء النجم ، ابطية الاينكار . تكثر في الاماكن الظليلة وفي السياجات وبجاري الماء . وفي من النباتات الممرودة التي تشبهها الماشية . احرف ازهاره واشهرها ما يلي .

٢٤٤٩٤ - لَامِيُون أَبْيَض * ، قُرْبَس كَذِاب

Lamium album (S). Lamier blanc, Ortie blanche, O. morte, Fausse ortie (F). White dead-nettle (E).

نوع من اللاميون الطبي . عشبته تعملون من ٤٠ الى ٨٠ سم . اوراقه الى الحضار الاصفر المالح ، يطولها زغب مبهر

يحل . ازهاره كبيرة اللد بيضاء اللون || ازهاره ربيعي يستمر من نيسان الى حزيران .

٢٤٤٩٥ - لَامِيُون اَرْجَوَانِي * ، قُرْبَس اَحْمَر

Lamium purpureum (S). Lamier pourpre, Ortie rouge, O. féide (F). Red dead-nettle (E). Rote Taubnessel (D). Lamio purpureo, Ortica fétida (I).

نوع من اللاميون الطبي . عشبته كرجة الرائحة تعملون من ٥٠ الى ١٠٠ سم . اوراقه خلية الصفحة السفلى .

ازهاره ارجوانية اللون ، كبيرة اللد ، تطول نحو ٤ سم . ازهاره ربيعي .

٢٤٤٩٦ - لَامِيُون اَرْقَط * ، ثُقَاس ، حَرْف

Lamium maculatum (S).

Lamier maculé, L. tacheté (F). Spotted dead-nettle (E). Gefeckta Taubnessel (D). Lamio scitro, Dolcimele, Milzadella (I).

نوع من اللاميون الطبي . عشبته تعملون من ٤٠ الى ٨٠ سم . اوراقه خلية الصفحة السفلى . ازهاره كبيرة اللد تطول نحو ٥ سم . لونها الى البياض المرقط بالاحمر || ازهاره ربيعي .

٢٤٤٩٧ - لَامِيُون اَصْفَر *

Lamium luteum, L. galieobdolon (S). Lamier galieobdolon, Ortie jaune (F). Yellow archangel, Yellow dead-nettle (E). Gelbe Goldnessel, Goldtaubnessel (D). Lamio giallo, Ortica gialla (I).

نوع من اللاميون ، عشبته تعملون من ٦٠ الى ١٢٠ سم . اوراقه مائلة البنية على صفحاتها ، ازهاره متوطة اللد تطول نحو ٣ سم . لونها الى الصفرة الكبيرة . ازهاره ربيعي .

٢٤٤٩٨ - لَاهِيَّة ، مَلْهَاب

Lance-flammes (F). Flame thrower (E).

جهاز آلي يرسل اللهب ويسده . يستعمل في القضاء على بعض الحشرات وفي تطهير التربة من بعض الاوسام والجراثيم

٢٤٤٩٩ - لَاهَوَاتِي ، أَتِيرَابِي

Anasérobique (F). Anserobic (E).

نعت تعريفي يطلق على جميع الاحياء المجهرية التي تستطيع الحياة بهذا عن الهواء .



لاميون ابيض



لاميون ارجواني



لاميون ارقط



لاميون اصفر

سوقها صارة صمغية رائحة تستعمل استعمال
البخور ، عرفها ليموني الزانحة مستحب .

٢٤٥٢٢ - لبَّاب

لب الحب : جرى فيه اللقيح وصار له لب يؤكل .

٢٤٥٢٣ - لبَّاب

Tilapia (S).

Tilapia (F). Tilapia (E).

جنس اسماك نهريه من فصيلة المشقيات . انواعه المعروفة قليلة العدد . اصلها من بعض انهر الشرق الادنى وافريقية الشرقية || اجسامها صغيرة ، قصيرة الاعظام ، صغيرة الاسنان كبيرة العين . زعانفها الظهرية كبيرة ، قليلة المرض . الصدرية والخصوية والشرعية متصلة الجرم . الذيلية كبيرة ، مقطوعة الطرف . اوثابا تراوح من الزبدية السوداء الى الزبدية الفضية يطولها ستة او ثمانية او عشرة اطواق متفرعة شديدة السرة || من ميزات هذا الجنس ان الانثى ان الاكور تحسن سره الاناث في تجاويف اعظامها حتى التقف اي نحو سبعة ايام || اعرف انواعه :

Tilapia orontes (S).

٢٤٥٢٤ - لبَّاب العاصي

Tilapia de l'Oronte (F).

يكثر وجوده في نهري العاصي والاردن .

Tilapia nilotica (S).

٢٤٥٢٥ - لبَّاب النيل

Tilapia du Nil (F).

يكثر وجوده في النيل حيث يسمنه غرضي وشط في حين ان المشط اي الخرشقي ينتمي الى غير هذا الجنس .

٢٤٥٢٦ - لبَّاب

Trombidium holosericeum (S). Lepse automnal, Aoutat, Mite rouge, Vendangeur (F).

حشرة من الغاشيات ، طولها نحو ٣ م . ثوبها الى الحرة تكثر في المراعي والحقول المزروعة وعلى اللوزيات . ريقها نحيلة دقيقة طولها يراوح من ١ الى ٢ م . تركب الانثى اذا جلس فوق الثوب وتدخل تحت بشرة الجلد فتحدث حكاكا مؤلما . يمينها البزنجي .

٢٤٥٢٧ - ليتوثريوم

Leptothyrium جنس فطور مجهرية من فصيلة الهاديكات . انواعه قليلة ، تتميز بكتيكباتها المجعنية الشكل ، السطحية الارتكاز ، السوداء اللون . بويضاته اهلجية او رشيعة || اعرف انواعه ما يلي .

٢٤٥٢٨ - ليتوثريوم التفاح

Leptothyrium pomi (S). Maladie en crotte de mouche (F). Sooty blotch (E).

فطر مجهرى يمتري ثمار عدة نباتات برية وزراعية اعصاب التفاح في بعض انواعه المتشابة || مظهره الخارجى رقيق رشيعة تشبه ونم الذباب يبلغ متوسط عددها نحو ٤٠ ونم . تركب بشرة الثمرة قرب ادراكها . تبدر حنطية اللون ثم تنحرف الى السرة الفحمة || يعيش البآر فينبس قبيها التجارية دون ان يملها || يكاثرباستمال سائل يورده الخلف قبل ادراك البآر باسبويه .

٢٤٥٢٩ - ليتوثريوم كاروفيلوم

Leptothyrium carpophilum (S). Fly speck (E). فطر مجهرى يمتري بعض انواع الاجاص المتشابة . مظهره

والاريفية . يستخرج من سوقها بالخز صارة رائحة سريفة الجفان فاعرة المصنف تدعى بخور اللبان || اشهر انواعه ما يتبع .

٢٤٥١٣ - لبان حبشي * ، بسنج حبشي ، طونس
Boswellia papyrifera (S).

Boswellia d'Abyssinie, Arbre à l'encens (F). Incense tree (E). Weihrauchbaum (D). Albero Incenso (I).

نوع من اللبان ، شجرته صغيرة القد ، موطنها بلاد الحبشة . يستخرج منها بالخز اخضر يتغير واخضر .

٢٤٥١٤ - لبان شامي ، صمغ البطم
Polx-résine (F). Shoemakers' wax (E).

مادة راتنجية صمغية تستخرج من سوق البطم .

٢٤٥١٥ - لبان هندي ، لبان ذكر ، بسنج هندي ، كندور

Boswellia serrata (S). Boswellia des Indes, Oliban (F). Frankincense, Olibanum tree (E). Echter Weihrauchbaum (D). Olibano incenso (I).

نوع من اللبان ، شجرته متوسطة القد ، موطنها بعض مناطق الهند . يستخرج منها بالخز بخور اللبان المشهور .

٢٤٥١٦ - لبان
Laitier (F). Milkwoman (E).

من تاطى بيع الحليب واللبان .

٢٤٥١٧ - لبانكة
Andrachnes (S). Andrachné (F). False orpine (E). Echter Burgel (D). Porcellana (I). جنس نباتات برية من فصيلة اليتوبيات ، انواعه عديدة منها الاشباب والجنات والشجيرات . جميعها معمرة ، اصلها من المناطق الحارة والمتدلة في سائر اقطار العالم . سوقها متصصة او معرجة ، فروصها دقيقة ملتوية . اوراقها صغيرة القد معتقة متعقبة متقاربة . ازهارها ابطية فردية . ثمارها جراء تغلف نحو ٦ بزور آسية المادة || اشهر انواعها الطيبة ما يلي .

٢٤٥١٨ - لبانكة المتوسطة

Andrachnes telephoides (S). Andrachné téléphoïde (F).

نوع من اللبانة الطيبة ، مهدا تمام شرقي المتوسط من فلسطين الى اذير . ساقها نحيلة ، فروصها دقيقة وملتوية . اوراقها صغيرة ، بيضبة النصل ، تقريبا ينقي الدم ويدبر البول .

٢٤٥١٩ - لبانكة الهند
Andrachnes cadishawii (S). Andrachné cadishaw (F).

نوع من اللبانة الطيبة ، مهدا الهند . اوراقها سطوة ناجبة قعدل الجروح وتشفى القروح الخفيفة .

٢٤٥٢٠ - لبانكة مغربية
Euphorbe résinifère هي المتجدد ، اطية .

٢٤٥٢١ - لبانكة * ، امني

Icica icariba, Protium icariba (S). Iciquier (F). Elemi gum tree (E). Elemibaum (D). Elemi (I).

جنس اشجار حرجية من فصيلة البخوريات . انواعها عديدة ، اصلها من المناطق الاستوائية والحارة بعضها ينقى في رمال الشواطئ البحرية والبرية . اوراقها مركبة متعاقبة . ازهارها صغيرة القد يضاء اللون . ازهارها خشكوكة او عنقودي التجميع ، محوري الارتكاز || يستخرج من



لبان حبشي



لبانة المتوسطة



لبان



كيت



ليتوثريوم



ليتوثريوم التفاح

الخارجي رقيقة حنطية تركب البار فتصلب البشرة المنحارة وتثبت البار دون أن تنطبعها || يكالغ باستعمال سائل بوردو الخفيف أو السائل السلفوكسليسي.

٢٤٥٣٦ - ليثورة مُنَطَّحة *

Leptura maculata (S).

نوع من الليثورة ، طولها يراوح من ١٥ إلى ١٧ م . جسمها شبيه أسطواني الشكل اسمر اللون أطول المراج ، اسود الرأس ، ميمر الحلب الناعم الأبر الون .



ليثورة ذهبية
التجديع



ليثورة سدائية
ليثورة فضيتة

٢٤٥٣٧ - ليثورة مُنَطَّحة *

Leptura cerambyciformis (S).

نوع من الليثورة ، طولها يراوح من ٧ إلى ١١ م . رأسها وكسلها الى السواد اللامع . تمشي على ارجلها الى الصفرة المذرة تعلوها نقط سود طرية || تعيش في الاغلاوالخلائق الجبلية ، يكثر ويوجد من حزيران الى آب .

٢٤٥٣٨ - ليثورة مُؤَلَّدة *

Leptura aurulenta (S).

نوع من الليثورة ، طولها يراوح من ١٤ إلى ١٨ م . رأسها وكسلها الى السواد العايق . تمداها الى الصفية المتناية تترسها ثلاثة خطوط سمر يملوا حل مذهب اللون . تعيش على مختلف الاشجار الحرجية اغصانها السنتيان ، يكثر ويوجد من حزيران الى آب . رقاتها مؤفة تسردب الشكير .



ليثورة مضبة

٢٤٥٣٩ - ليثوسيريات *

Leptoceridae (S). *Leptoceridae* (E).

فصيلة حشرات من رتبة جملويات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة البدن منتشرة في بعض اصقاع البلاد المعتدلة الحرارة والمتفرقة نحو الياردة || اجسامها متوسطة القد ، فراء ، اجنتها خيزاء اللون مهدبة الاطراف الخلفية ، تملوا بعض الزخارف . ترتزها واضح القريب ، قليل الاعصاب المتفرقة || ملجأ الحياتي جامي . اقواسها كثيرة العدد . تعلق فوق مجاري الماء خاصة بعد الظهور || اساريمها تعيش في المياه الجارية ملصقة بجلايب مخروطية منخقة كمنه الحسام || أشهر اجناسها :



ليثورة ملطحة



ليثورة منطحة
ليثورة مؤدة

Leptocerus (S).

البوسيس

Trisnoides (S).

الترينيد

Mystacides (S).

المستسيد

٢٤٥٤٠ - ليثون *

Lepton (F). *Lepton* (E).

البات نطشة تحلة تظهر في الجبلية حسنا تكين في اول طور المبرزة .

٢٤٥٤١ - ليثونة *

Lepton (F). *Lepton* (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات سفيمية الحاشيم وفضيلة اليرسويات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار العالم || جميعها صغير القد طول من ١ الى ٢ م . اصداؤها شبه بيضية الشوزن ، وريقة الصفة ، قليلة الاحديداب . يملوا ريس في الشكل || تعيش لاصقة بالصخور . ليفها غزير المادة .



ليثونة

٢٤٥٣٠ - ليثورة *

Lapeura (S). *Lapeura* (F).

جنس حشرات من فصيلة القرنييات . انواعها عديدة ، جميعها صغيرة القد ، مسطيلة الجراميز والزابان ، زاجية الاالوان السوية او المزركشة . تركب ازهارها مختلف النباتات اغصانها المشبية || رقاتها نمة تعيش تحت لحاء الخلود والاغصان الصلغة وقد تسردب الشكير || أشهر انواعها ما يتبع .

٢٤٥٣١ - ليثورة ذهيتة *

Lapeura fulva (S).

نوع من الليثورة ، طولها يراوح من ١٠ إلى ١٤ م . رأسها ويوشها وجفتها سود . تمداها الى الصفرة للذهية . تعيش على ازهار المركبات والغيصيات . تكثر في المروج المرابي من حزيران الى ايلول .

٢٤٥٣٢ - ليثورة سدائية التجديع *

Lapeura sexguttata (S).

نوع من الليثورة ، طولها يراوح من ٩ إلى ١٠ م . ثوبها اسود اللون . تمداها سدائية التجديع الاصفر . تعيش على ازهار الخبيات . يكثر ويوجد من حزيران .

٢٤٥٣٣ - ليثورة سيدائنة *

Lapeura cordigera (S).

نوع من الليثورة ، طولها يراوح من ١٤ إلى ١٦ م . رأسها ويردم جوشها وجفتها سود . تمداها الى الحرة الكرزية يملوا حنة ملتقاعا بمسد الزام الاول من القاعدة بقعة سوداء مسطيلة سدائية الشكل تمتد حتى طرف الفمدين || تعيش على ازهار الشوك والاراضي شوكي . يكثر ويوجد من حزيران الى ايلول .

٢٤٥٣٤ - ليثورة فسقية *

Lapeura virens (S).

نوع من الليثورة ، طولها يراوح من ١٥ إلى ٢٠ م . ثوبها الى السرة يملوا حل دقيق كثيف اصفر اللون اخضر المراج . تكثر في اسراج الصنوبر . رقاتها نمة تسردب قشور وشكير الاشخاب اليابسة والمقطوعة .

٢٤٥٣٥ - ليثورة مضبة *

Lapeura bifasciata (S). *Lapeura bifasciata* (F).

Lapeura bifasciata (E).

حشرة واحة خاضلة من فصيلة القرنييات ورتبة سمعات الاجنحة . تألف الحشايا والبراري . غناضها تعيش على بتلات الازهار . رقاتها خاضلة ناعمة تركب لحاء الاشجار الفتية وسوق النباتات الحرجية خلفها وتسردبها وتعلها || جسمها صغير القد يعل من ٧ إلى ١٠ م . ثوبها ثنائي اللون ، رأسها وكسلها وزبانها وبرامضا الى السواد العايق اللامع ، يطنها وظهورها الى البني الاسمر المراج يملو في الفمدين تمصيب اسود . رأسها صغير الجرم عينها كيرتان ناشرتان . زباناها دقيقان ، مسطيلان . ظهورها فارغ المشر لا يلحف السكة الشريية . تمداها متتابع الصنوبر القاطب . اسرارها رباعية النقل الظاهرة || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملولة في اوائل حزيران وتعيش حتى اواخر ايلول . تسرح في التبار . تسافد بعد ظهورها باربعة اسابيع . تترز المكان في لحاء



لبنيد



لبن



لبن الجبل



لبرة الحمص



لبرة الزيتون



لبرة الكرز

٢٤٥٤٢ - لبنيد * *Leptides brevipennis* (S).

Leptide (F).

حشرة نصفية الغمد من فصيلة القرنيات. اصطناعها البلاد المحتلة الحارة من العالم القديم || طولها يراوح من ٤ الى ٦ سم. ثوبها الى السرة الحطية الشبهاء. زباني ذكورها مستطيلة تلحف كامل الجسم. زباني انثاهما قصيرة تبلغ طرف الاقدام || قوتها جميع المواد الصلبة واعصها الاغشاب الينة التي تنخرها وتسددها وتقضي عليها.

٢٤٥٤٣ - لبنين * *Leptinus* (S).

Leptine (F). *Leptinus* (E).

جنس حشرات من فصيلة البتينيات وربة عديدات الاجنحة انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض مناطق البلاد الباردة والمعتدلة الحارة || اجسامها صلبة ، بيضبة الشوزن ، تطول من ٢ الى ٣ سم. رؤوسها قصيرة ، مستعرضة. عيونها طامسة. تأثيرها ولكونها وملاصها صغرة. قرونها الاستشعارية غطيلة ، مستطيلة. كواسلها مستعرضة ، خلية التشار. احماها لاحقة يملوها خل قصير. قرونها نشطة. اولها الى السرة المختلفة المناجات، يكثر فيها الاصفر || تنطفل على مختلف انواع القوام. تعيش على الصفات التي يفرزها الجله.

٢٤٥٤٤ - لبنغيفيات * *Leptinidae* (S).

Leptinidae (F). *Leptinidae* (E).

فصيلة حشرات جلدية من غديات الاجنحة. اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم اقطار العالم || اجسامها صغرة ، مبطلة ، شبه بيضبة الشوزن ، تطول من ٢ الى ٤ سم. رؤوسها قصيرة ، مستعرضة. عيونها طامسة. تأثيرها ولكونها قياسية. قرونها الاستشعارية صولطانية. كواسلها واحماها خلية التشار. احماها متباينة الشكل ، بعضها يملف كامل البطن والقيص. الاخر نصفه. اراسها وراعية العقل. اولها عادمة الشقاق || تعيش على فراء القوام الحية. قوتها الصفات التي يفرزها الجله || اشهر اجناسها البنين.

٢٤٥٤٥ - لبنث * *Lapachum aquaticum* (S).

Pettencia aquaticae (F). *Water dock*, *Water sorrel* (E). *Wasserampfer* (D).

Romice aquatico (I).

نبات عشبي يري معم من فصيلة البطاطيات. يكثر في النائق وصل بجاري الماء. جذوره درزية ، ساقه فراءه تملن من ٤٠ الى ١٠٠ سم. اوراته منقطة اعليانية مستطيلة؛ نصلها ياهت الحفار البحري، متمتع الصفة.

٢٤٥٤٦ - لبنج * *Lebbek* (F).

جاء وصفه في البزيدي اللينج ، واجمعها.

٢٤٥٤٧ - لبنج الجبل * *Cocculus lebeba* (S).

Coqueculae glabra (F).

نوع من الكوكوس من فصيلة القرنيات. وهو نبات عشبي طلي يري مصر. ساقه فراءه. فروعه ردة متدلية. اوراته منقطة متعاقبة بيضبة صغرة القد. نصلها مالمس البشرة على صفحتين || وهو يستعمل في عدة مستحضرات طبية منها علاجات الحميات والبرقان والزنقة والكدب ...

٢٤٥٤٨ - لبنقة ، لبقة * *Cataplasme*, *Charge* (F). *Cataplasme*, *Poultice* (E).

مستحضر قانع يوضع على مكان الألم من الجسم.

٢٤٥٤٩ - لبنيد * *Aborigène* (F). *Aboriginal* (E).

هو الاصلي من ثوبت البلاد او عظمها اي حيواناتها.

٢٤٥٥١ - لبنيدان * *Aborigène* (F). *Aboriginal* (E).

هو السلق المضلع ، اطلبه.

٢٤٥٥٢ - لبنيدور * *Lepidurus* (S).

Lépidure (F). *Lepidurus* (E).

دوبية من القشريات عيشويات الاطراف تعيش في المياه قليلةية انما تكاثرت الاغشاب || جسمها صغير القد ، مبطط الشكل ، يملو حواف مجني يلفظ الظهر. زباناها شديدة القصير. قرونها الصدرية كثيرة العدد.

٢٤٥٥٣ - لبنيدي ، وبيري * *Tomenteux* (F).

Tomentous, *Downy* (E).

نمت تمرني يوصف به كل عضو نباتي خلطه مستطيل وكثيف كالوبر.

٢٤٥٥٤ - لبنيرة * *Cylindrosporium* (S).

جنس فطور مجهرية من فصيلة الفريجات. انواعها قليلة العدد والذى || كئناذه غروطية الشكل تشقا منفردة ثم تتجمع. بويداته مستطيلة وقد تكون غطيلة منقطة ، مؤثرة الاطراف || اشهر انواعها ما يتبع.

٢٤٥٥٥ - لبنيرة الخيص * *Cylindrosporium plasi* (S).

فطر مجهرى يصيب الخيص وسوقه وارائه رستايه. مظهره الخارجي بقع صفر او رمادية اللون، مرقنة الزوايا، تركيب السوق ثم الارواق والحنايل قسب الجفاف واليباس.

٢٤٥٥٦ - لبنيرة الدلب * *Cylindrosporium platanoideis* (S).

فطر مجهرى يركب اوراق الدلب والقيص. مظهره الخارجي بنور صغرة كثيفة شقراء اللون ، تركيب النصل بكامله قسب الذبول والاحبال.

٢٤٥٥٧ - لبنيرة الزيتون * *Cylindrosporium olivae* (S).

Cylindrosporiose des olives, *Lebbra des olives* (F).

فطر مجهرى يصيب الثمار يقيضي عليها بعد ان يجمعها ويحفظها. مظهره الخارجي بقع فسيحة مستديرة او بيضبة الشكل ، تلبو في تشرين ، تركيب الاذن ثم تمتد الى الثمار ، تظهر بنفسية اللون ثم تتصرف الى السرة الباهتة قسب يباس اللب بعد تمجيحه وتشقيقه || تقلبات الحرارة الجرية وارتفاعها بعض الايام يبلط هذا الوسم. يكافح باستعمال الاملاح النحاسية الخفيفة.

٢٤٥٥٨ - لبنيرة الكرز * *Cylindrosporium padi* (S).

فطر مجهرى يصيب ويبطط اوراق الكرز || مظهره الخارجي بقع صغرة مستديرة او مرقنة الزوايا ، قطرها من ٢ الى ٣ سم. لونها الى الصبغة الزاوية ، توسطها نقطة بيضاء ، تركيب النصل قسب يباس وانحنات النسيج المتحارة || يكافح باستعمال السوائل السلفوكسية بعد تخفيفها نحو ٥٠٪ وعملها ٠,٦٪ من سلفات الحديد.

٢٤٥٩ - كَبَرَةُ الميوزويس

Cylindrosporium myosotidis (S).
فطر مجهرى يركب نصل اوراق الميوزويس || مظهره الخارجى يقع نسيجة مستطيلة ، طولها نحو ١٠ سم. لونها الى السمر ، اطرافها اصفر الخشب ، اشقر الملوغ . تسبب اللبؤل والاصباح .

٢٤٦٠ - كَبَرَتُونِيَّة

Lapeyrousia (S).
Lapeyrousie (F).
جنس نباتات دوفسية من فصيلة السوسنيات . انزاعها كثيرة العدد معظمها بري وبعضها ترابي . منها البلاد الافريقية . جميعها صلبة القد وحبدة الساق الشراعية . اوراقها مردوبة التصنيف . ازهارها سبيلية التجميع . احرف انواعها واشهرها ما يتبع .

٢٤٦١ - كَبَرَتُونِيَّة اَسَلِيَّة الورك

Lapeyrousia juncea (S). *Lapeyrousie à feuilles jonciformes* (F).

نوع من البروزيه . اوراقها اسلية الشكل ، مستطيلة النصل المهدب الخشار . شراعيها الزهري يملو من ٤٠ الى ٦٠ سم. ازهارها سبيلي التجميع . ازهارها متوسطة القد ، كثيرة العدد ، وردية اللون || تنورها يستمر طوال شهر ايار .

٢٤٦٢ - كَبَرَتُونِيَّة عَذِيَّة

Lapeyrousia corymbosa (S). *Lapeyrousie en corymbe* (F).

نوع من البروزيه ، شراعيها يملو من ١٥ الى ٣٠ سم. ازهارها مغلي الشكل وهو بذلك يشد عن سائر انواع الجنس . ازهارها الى الزرقة الزاهية تنصطبها نجمة يبيضه اللون بنفسجية الخشار . تنورها يستمر نحو ٣ اشهر ابتداء من شهر ايار .

٢٤٦٣ - كَبَرَتُونِيَّة كَبِيرَةُ الزهر

Lapeyrousia grandiflora (S). *Lapeyrousie à grandes fleurs* (F).

نوع من البروزيه ، اوراقها غنية الازتكاز . شراعيها يملو نحو ٣٠ سم. ازهارها سبيلي التجميع . ازهارها ارجوانية ، زاهية ، كبيرة القد ، قطرها نحو ٥ سم . تنورها يستمر طوال شهر تشرين الاول .

٢٤٦٤ - كَبَرَتُونِيَّة مَبْطَّطَةُ الساق

Lapeyrousia anceps (S). *Lapeyrousie à tiges aplatis* (F).

نوع من البروزيه ، شراعيها مسطط الجسم ، ثنائي الزوايا ، يملو من ١٥ الى ٣٠ سم. ازهارها سبيلي التجميع . ازهارها بنفسجية اللون . تنورها يستمر طوال شهر ايلول .

٢٤٦٥ - كَبَرَتُونِيَّة الورك

Lupinus circumfusus (S). *Lupère des genêts* (F).
Luperus circumfusus (E).

حشرة ضاحلة من فصيلة التصاريات وردية مغمدة الاجنحة . تألف البير والبراري والاحراج . غناصها ويرقاتها تموت على نباتات القرنيات الفرافشة واعضاها الزوال || جسمها صغير القد يطول من ٣ الى ٤ م. ثوبها الى الصفرة الصفاه الملوغ يطوقها في الكليل والفسدين حمار اسود . رأسها مستد الجرم . عينها صغيرتان . زباناها خيطيان . غطها مخروطي . فكاها ذريان .

ظهورها مستدير المؤخر القارص اللامع . عمداها متناظرا التقيط الخفيف . اوسافها رباعية المقل الظاهرة || لها جبل واحد في الخيل . تظهر الحشرة الجبلانة في اواخر نيسان وتموت حتى اواخر حزيران . تشرح في الليل وتسايف بعد ظهورها بنحو ثلاثة اشهر . تجمع المكن رزقا تلتفها مادة خروية على نصال الاوراق ولبه السيق والتضيق || البرقة عند بلوغها الادراك تطول نحو ٧ م. جسمها شبه اسطواني الشكل ، قليل التقوس ، سداسي الرواجب ، سحلي اللون ، اسمر الملوغ ، اسود الرأس . ويملو الجسم ثلاثة خطوط قاطية حاجية وعلب دقيق اشهب اللون || طود الاكمال الذي يستمر نحو اربعة اشهر يتقضي في البرقة تحت الجلالة والليل .

٢٤٦٦ - كَبَرَتُونِيَّة

Labeobarbus (S).
Labeobarbe (F).

جنس اسماك نهريه من مفتوحات الماء وفصيلة البليطيات . انواعها المروقة ثلاثة ، اثنان يعيشان في اتر الهند واثنان وواحد يعيش في النيل || اجسامها شبه اسطيلية ، قليلة التقيط ، تطول من ١٠ الى ٧٥ سم. رؤوسها معتدلة الجرم . ميتها جاحظة . اشدها كبيرة ، خماسية الملبات الصغيرة . زعانفها الظهرية فردية ، شراعية الشكل . زعانفها الذيلية قاذقة . اوقاها الى الخضار البحري . زعانفها الى الخضار الاصفر || لحوها متوسطة الصفه ، مأكولة || اما انواعها الثلاثة فهي :

Labeobarbus nagdia (S). ليريس النيل *
Labeobarbus jungha (S). ليريس اصنام
Labeobarbus macrolepis (S). ليريس كشمير

٢٤٦٧ - كَبَرَتُونِيَّة

Labrella (S).
جنس نباتات مجهرية من فصيلة الهذكيات ، انزاهه قليلة لا مؤدية . بكتباته مستفزة ، سواد اللون ، فرجية الانفلاق . يوفاته مستطيلة او وشية او كروية الشكل ، شفافة .

٢٤٦٨ - كَبَرَتُونِيَّة

Sanve (F).
هو الخردل البري او خردل الحقل وينمو الحشاء . وقد يتبر من الاحشاب القصارة نيا لو كثر في الزرع . ابادته ثم باستعمال احد المولايين القمالة الكثيرة الوجود في هذا البحر .

٢٤٦٩ - كَبَرَتُونِيَّة

Lampene commune (F).
هي الخلفج ، اسطيل .

٢٤٧٠ - كَبَرَتُونِيَّة

Pralnaga (F).
عملية زراعية تتقدم غرس النصب . قوامها تقطيس جلور الاغراس بروبة مألومة من الماء والليل ونحو القبر وذلك لتغطية الجذور وبروسها بشاه ناعم واق لا يتخلل من التناء يساعد على مقاومة مواريل البيت الجديدة ويحضرها ويحيا على اثنائ الجلبارات الخيطية وما يتبعها من عدة اصنام اللناء ، ايد الحياة والنشوء .

٢٤٧١ - كَبَرَتُونِيَّة

Labostemon (S).
Labostémone (F). *Labostemon* (E).

جنس جنات برية وتربينية معمرة من فصيلة الحمسيات . سيقها منتصبه فراء تطو من ٧٠ الى ١٥٠ سم. اوراقها



ليروس الزلال



ليروس النيل

٢٤٥٧٩ - بُبْسُ حَنْطِي* (S). Elops congicus**Elops brun (F).**

نوع من الببس. أصله تحت من مصب النيل إلى الجزائر والمغرب. جسمه متوسط القد النسبي، ويطول نحو ٧٠ سم. قويه إلى الرعدة الخطية المواج يمين في الظهر ويبيض في البطن || لحمه متوسط الصنف، مأكول.

٢٤٥٨٠ - بُبْسِيَات (S). Elopides**Elopides (F). Elopidae (E).**

فصيلة اسماك بحرية من العظميات مفتوحات الفمائن. أجناسها وأنواعها المعروفة قليلة العدد. أعطائها بحار البلاد الحارة. مسرحها الاغواط والتفاف والمحاذ وبعض أنواعها تدخل الاعوار والانهار || أجسامها أهليجية الشكل تطول، بالنسبة إلى الانواع من ٣٠ إلى ٢٠٠ سم. رؤوسها مخروطية كبيرة الاشدق تتميز بسنود نصل علمي المادة يتوسط الفك السفلي ويرتكز على جانبيه. ظهورها شبه مسطحة. بطونها محدبة. زعانفها الظهرية مقترنة. زعانفها الذيلية غائقة || أشهر أجناسها وأعزها الببس والسجاس.

٢٤٥٨١ - بُبْتُوس* (S). Leptosomus**Courol, C. bicolor (F).**

طائر وسيد الجنس والنوع من فصيلة القيقويات. أعطائه قسيمة تحت من تمام البحر الاحمر إلى الحيشة ويدعكر يصطط مناطق افريقية الجنوبية || الذكر اصفر قدماً من الانثى، وطوله نحو ٥٠ سم. ثوبه متباين الألوان. ظهره مع جناحيه وذنبه إلى الخضر النعاسي المواج. يمشي إلى الصعبة النبراء. رأسه إلى الصعبة الخطية تحملوا قنفوسة سمراء. زنده كمرف الديك ثنائي الاكتساب || الانثى تطول نحو ٥٥ سم. ثوبها إلى الرعدة الخطية تحملوا ثمة صناعية القتم سمراء الختار. وثوبها هذا يمين في الرأس والظهر والذنب ويغير في المق والصدر والبطن والافتيك || يألف الغابات والادغال. قويه الثأر والحشرات احصها الجراد والجنادب والزيزان || يذئن عشه في الاجمار المترامية الافصان والاقتان. الانثى تضع من ٤ إلى ٥ بيضات تحضنها بجناوبة الذكر نحو ٢٤ يوماً.

٢٤٥٨٢ - كِلَاب (S). Convolvulus**Lisaron (F). Convolvulus (E).**

جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة البلبليات. انواعها ١٥٠ أعطائها المناطق الحارة والمتعددة معتدلة بري وبمضا طيب وزييني || احرف انواعها واشهرها ما يلي.

٢٤٥٨٣ - كِلَابِ ارُضِي هو الكفة المادة، اطلبها.**٢٤٥٨٤ - كِلَابِ الحُقُول* ، كِلَابِ صَغِير ، طُرَيْشُ الغُرَاب****Convolvulus arvensis (S). Lisaron des champs, Petit Lisaron, Liset, Vrillet (F). Corn bind, Corn lily, Lesser bindweed, Bearbine (E). Ackerwinde, Winde (D).****Convolvulus arvensis, Erba leprina, Vitechio (I).**

نوع من الكلاب المبلول، يكثر في الحقول وبين الزروع فيصبح من النباتات الصارة. ساقه مفصلة مزرقية تطول من ٢٠ إلى ١٠٠ سم. اوراقه رقيقة مجتمعة. أزهاره وردية اللون أو بيضاء، قطرها يراوح من ٢ إلى ٣ سم. || أزهاره يستمر من ايار إلى تشرين.

لاطئة، متعاقبة، كاملة. أزهارها مختلفة الألوان منها الازرق والوردي والبنفسجي والاحمر || انواعها المعروفة قليلة العدد، أشهرها التالية.

٢٤٥٧٢ - كَيْسَمُونْ أُنَيْق ***Lobostemon formosus (S).****Lobostémone élégant (F).**

نوع من الببستين. ساقها تملو من ١٠٠ إلى ١٥٠ سم. افتادها مزقية الصماء. اوراقها سنائية الشكل. نصلها خلية الصفحات العليا، مسنة الختار. أزهارها وردية اللون متدلية. قطرها نحو ٣ سم. || تنويرها يستمر من حزيران إلى تموز.

٢٤٥٧٣ - كَيْسَمُونْ بِمَحْرِي الورقي ***Lobostemon glaucophyllum (S).****Lobostémone à feuilles glauques (F).**

نوع من الببستين. ساقها فرياه تملو نحو ٧٠ سم. اوراقها بحرية الخصار، خشنة الختار. أزهارها معتدلة الحجم، بنفسجية اللون، فاشرة الاسدية || تنويرها يستمر من ايار إلى تموز.

٢٤٥٧٤ - كَيْسَمُونْ فِيْ ***Lobostemon argenteus (S).****Lobostémone argenté (F).**

نوع من الببستين. ساقها تملو نحو ١٠٠ سم. افتادها زباد الصماء. اوراقها كاملة سنائية الشكل، نصلها مزقية على الصبطين، زفيا فني اللون. أزهارها معتدلة القد، قطرها نحو ٣ سم. لونها إلى الزرق الجميلة || تنويرها يستمر من حزيران إلى تموز.

Radier en béton (F).**Concrete bed (E).**

تسميم لاسف، شائع الاستعمال في البناء الباطوني.

Elops (S).**Elops (F). Elops (E).**

جنس اسماك بحرية من فصيلة الببسيات. انواعها المعروفة خمسة. أعطائها مطر بحار البلاد الحارة والمتعددة الحرارة || جميعها اعليجية الشكل، شفاء الحلق، مسطحة الظهر، محدبة البطن. جالدة الحراشفت المتباينة الاحجام. أثوابها متباكية الألوان تكثر فيها الرعدة الرصاصية التي تدبق في الظهر وتبر أو تبيض في البطن || احرف انواعها واشهرها، الثلاثة التالية :

٢٤٥٧٧ - بُبْسُ اصَحَم**Elops saurus (S).****Elops saurian (F).**

نوع من الببس. أصله البحر الاحمر والخليج العربي. جسمه كبير القد يطلو نحو ١٢٠ سم. ثوبه إلى الصمعة || لحمه متوسط الصنف، مأكول.

Elops lacerata (S).**Elops lézard (F).**

نوع من الببس. أصله الشواطئ الافريقية المعتدلة من المغرب إلى انكولا. جسمه كبير القد يطلو نحو ١٥٠ سم. ثوبه إلى الرعدة الرصاصية || لحمه متوسط الصنف، مأكول.



ببس حنط



لببوس



كِلَابِ الحُقُول

ردلة خلية البشرة القضيبة المواج. أزهاره ثلاثية التجميع، زرق اخضر، حر القاطعة، سفر الاسدية || أزهاره يستمر من تموز الى تشرين.

٢٤٥٩٣ - تِلْبَاب يَابَانِي، تِلْبَاب أَزْهَب

Convolvulus japonicus, Calystegia pubescens (S). *Liseron pubescent* (F).

نوع من التلابل الممر. ساقه: باز عارضة تطول من مترين الى أربعة أمتار. أوراقه خلية النصل، صغيرة القد، قصيرة الاعتناق. أزهاره كبيرة الحجم، مستطيلة المالحق، بيضيه التناهات، حراء اللون || أزهاره يستمر من أيار الى أيلول.



تلابل السجالات

٢٤٥٩٤ - تِلْبَابِي

Hédéracé (F). *Hederaceae* (E). نمت تفرعي، وصي يطلق على السوك المنطلة التي تشبه التلابل.

٢٤٥٩٥ - تِلْبَابِيَّات، حُمُودِيَّات، سَكَمُولِيَّات

Convolvulaceae (S). *Convolvulaceae* (F). *Convolvulaceae* (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين وسيدات القناعة. أجناسها وأزهارها عديدة. جميع نباتاتها مفادة أو مستطيلة. سيقانها غزيرة العصارة اللينة. أوراقها متناحية مغرسة. أزهارها كبيرة القد لا قياسية التجميع والازدناز. ثمارها حقية تنفلق عن مصرايين أو أربعة مصاريج. مصاريها لا قياسية الاخضبة التي يراوح صدها من ١ الى ٤ وكل غياه يحسن حية أو حيتان قشارها جلد الماد || أشهر نباتاتها السقمونيا والبطاطا الحلوة والجلب والتريد.

٢٤٥٩٦ - تِلْبَابِيَّة

Cissolde (F). اسم يطلق على منمن خاص من المعادلة الثلاثية.

٢٤٥٩٧ - لَبْن، لَبْن، لَبْن

Torchis (F). *Cob, Loam* (E). المضروب من اللبن لبناء مرمباً كان أو مستطيل. واحدته لبن أو لبنة.

٢٤٥٩٨ - لَبْن

Lait (F). هو الحليب، اطلبه. واللبن بالعرف اللبناني هو الحليب الرائب.

٢٤٥٩٩ - لَبْن زَائِب، لَبْن مَرُوب

Lait caillé, Yoghour, Yahourt (F). *Curdled milk, Yaourt* (E).

هو الحليب غثر بالروبة فراب واستبانة سوامفه.

٢٤٦٠٠ - لَبْنَات، لَبْنَات

Lactate هي ملح الحامض اللبن.

٢٤٦٠١ - لَبْنَتَا، لَبْنَتَا

Lactane خيرة قحول اللبنوز الى غلوكون وفلكونوز.

٢٤٦٠٢ - لَبْنَة

هي اللبن الرائب المقطوع الذي نضج مصله.

٢٤٦٠٣ - لَبْنَوَز، لَبْنَوَز

Lactose هو سكر اللبن. يشبه السكر البادي لكنه اقل حلولة، يذوب في اللبن والماء ولا يذوب في الكحول.

٢٤٦٠٤ - لَبْنَتِي

هي الاصطرك، اطلبه.



لبلاب نفسي

٢٤٥٨٥ - تِلْبَاب السِجَات *

Convolvulus sepium, Calystegia sepium (S). *Liseron des haies, Grand liseron* (F). *Hooded bindweed* (E).

نوع من التلابل الممر الساقه تطول نحو ٥ أمتار. أوراقه كبيرة القد مثلثة الزوايا مستطيلة الاعتناق. أزهاره كبيرة الحجم، بيضاء اللون، وردية المواج || أزهاره يستمر من سبتمبر الى تشرين.

٢٤٥٨٦ - تِلْبَاب المَجْرُس

هو الفيرونيكا الخريفية، اطلبها.

٢٤٥٨٧ - تِلْبَاب زَيْتُونِي، لَوْرَق

Convolvulus oleosifolius (S). *Liseron à feuilles d'olivier* (F).

نوع من التلابل الممر. ساقه غشوشة منتصبه تملو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. أوراقه زيتونية الشكل، أزهاره نورية التجميع، صغيرة الحجم، وردية اللون || أزهاره يستمر طوال الصيف.

٢٤٥٨٨ - تِلْبَاب فُصِي، تِلْبَاب حَبِيْبِي، لَوْرَق، حَبَشِيَّة مَهْبِيلَة

Convolvulus althaeoides (S). *Liseron à feuilles de guimauve, Volubilis* (F). *Mallow bindweed* (E). *Kleine Kornwinde* (D). *Convolvolo argentino* (I).

نوع من التلابل البري الابلول. ساقه فراء زياء تطول نحو ١٠٠ سم. أوراقه خيزرية الشكل مفصصة، نصلها خلي البشرة على صفحتيه. أزهاره كبيرة القد، ليلكية اللون، بيضيه الفص. جفوره دودية طيبة عديدة المنافع || أزهاره يستمر من نيسان الى حزيران.

٢٤٥٨٩ - تِلْبَاب مُتَلَتِّ الأَثْوَان

هو شب النهار، اطلبه.

٢٤٥٩٠ - تِلْبَاب مِصْرِي، لُوْبِيَاء تِلْبَابِيَّة

Dolichos lablab, Lablab vulgaris (S). *Dolique d'Egypte, Dolique lablab* (F). *Egyptian kidney bean, Hyacinth bean, Lablab* (E). *Agyptische Fasel, Gernale Lablab* (D). *Dolico Egiziano, Fagiolo d'Egitto* (I).

نبات زراعي حولي من فصيلة القرنيات. ساقه صفرة عارضة. أوراقه مركبة ثلاثية الوريقات البيضية القرية. أزهاره عطرية الرائحة، عشودية التجميع، بتفسجية اللون ومنها الابجوبالية واللوحجة بالابيض. ثماره قرن مفلغلة، سيفية، مقومة. بزورها بيضية مبطة بتفسجية اللون أو جلوبية نأ أزهاره يستمر من حزيران الى آب.

٢٤٥٩١ - تِلْبَاب مُقَطَّص

Convolvulus cneorum (S). *Liseron-camélée, Liseron argencé* (F). *Silvered bindweed* (E).

نوع من التلابل الممر. ساقه غشوشة منتصبه تملو من ٧٠ الى ١٢٠ سم. أوراقه ابيدة نصلها سناني الشكل، ملحق الطرف، خلي البشرة على صفحتيه، بحري اللون، فضي المواج. أزهاره متشكلة التجميع، صغيرة القد، بيضاء اللون، وردية التوشيح || أزهاره يستمر طوال فصل الصيف.

٢٤٥٩٢ - تِلْبَاب مُورِيَّانِيَّة

Convolvulus mauritanicus (S). *Liseron de Mauritanie* (F).

نوع من التلابل الممر وهو جنية ليفية غشوشة. ساقها قصيرة، فروصها دقيقة مفادة، تطول من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. أوراقها بيضية الشكل قصيرة الاعتناق. نصلها

بمد صمغ بهشمة اباهم من برقات ذرية تنسجه فوراً نحو الصفحات العليا من الاوراق وتقيم في اغاديده العروق حيث يتطور لها امتصاص الغذاء . ثم تتحول تدريجياً الى لبيدة تسرح على النصال والافانان والافصان والسوق .

٢٤٦١٤ - لَبُودَةُ فَلُورِيدَةِ

Ceroplastes floridensis (S). *Céroplaste de Floride* (F). حشرة صغيرة من القرمزيات ، موطنها الاصل فلوريدة . وقد انتشرت في جميع الاصقاع الحارة . موطنها عديدة اعصاب الفار والكافاي . طولها يراوح من ٣ الى ٤ م . وعرضها من ٢ الى ٣ . ظهرها مخدوب الشكل مقعر النتوء . ثوبها ابيض اللباض الاخير ، جيلها الحولي واحد . نقت مكنها فيم في اواخر حزيران . تركيب الاوراق على صفحتها العليا وقد تركيب الافصان والسوق . تكاليف الزيت الشفوي .

٢٤٦١٥ - لَبُودَةُ لَيْبَتِيكِ *Laitière* (F). *Milch* (E). صفة الاثني الحلوب .

٢٤٦١٦ - لَبُودَات *Mammifères* (F). *Mammiferous, Mammalia* (E). هي الحيوانات الليفة المعروفة بالثدييات . واسمها لبون .

٢٤٦١٧ - لَبُودَةُ لَيْبَاز *Lapaz* هو الريبي ديار طبيعي لا يقياس العمق والاتساع بخندق سطح التندوز الجصي .

٢٤٦١٨ - لَبِيكِه *Lebia* (S). *Lébie* (F). *Lebia* (E). جنس حشرات قانصة من فصيلة الليبيات ورتبة عمديات الاجتمعة . انواعها المعروفة كثيرة البعد منتشرة في معظم اقطار واقالم العالم . اجسامها صغيرة ، مبطلة ، تقوّل من ٥ الى ٨ م . رؤوسها صغيرة . عيونها بارزة . قرونها الاستشعارية خيطية . تأشيرها وتذكورها وملابسها نظافية . كاسلها صغيرة ، منحصرة . بطونها مفلطحة ، مستعرة . اعماؤها تساعية الاغاديده النحيلة القاطبة . قوائمها نحيلة . ألوانها متباينة الالوان الزاهرة ، تكثر فيها الزفرقة . الحشرة الجلجلة قانصة واليرقة ايضاً .

٢٤٦١٩ - لَبِيكِه *Lippia* (F). هي اللوزة ، نبات من فصيلة وهي الخمام ، اطبخا .

٢٤٦٢٠ - لَبِيكِتَةُ الْحَمْسِ *Libythen celcis* (S). *Libythée du micocoutier* (F). *Libythen celcis* (E). حشرة من فصيلة الدشانيات ورتبة حرشيات الاجتمعة . موطنها معظم الاقاليم الحارة المنخفضة نحو المعتدلة . فرائسها جارية قوتها رقيق الاثمار . سرقتها تعيش على اوراق الانجيرييات ونبتا اللوس . جسمها مدوني الشكل يطول نحو ١٧ م . بسطتها نحو ٤٦ م . رأسها صغير الجرم . عيناها كيرتان . زبابانا صولجانيان . جونها وبطنها الى الجوزي الاشقم المواجه . في دراستها عند الشقين اوراق الجوزي الخنطي المواجه يطوي في الزوج الاسامي تجذيع الكلف وبقتعنا عابتيان وخس نقط بيض وسط حشاري اغير . ويعطو في الزوج الخلفي جده قاطبة عاجية ونشط حشطي بين الجدة والطرف . لها جيلان في الحيل . تظهر قراصة الجيل الاول في نيسان وتظهر قراصة الجيل الثاني في اواخر تموز . تسرح في النهار . تعاطل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع ويضع المكن ميسارياً على الصفحات

٢٤٦٢٠ - لَبِيكِتَةُ *Lactée* (F). *Lacteous* (E). ما كان يشبه الحليب او كان تركيبه كالحليب .

٢٤٦٢١ - لَبِيكِتَةُ *Libitina* (S). *Libitina* (F). *Libitina* (E). اطبل لكاريوس .

٢٤٦٢٢ - لَبِيكِتُ *Fécule* (F). *Faecula* (E). هو نشا البطاطا خاصة والنشا المستخرج من سائر المسائل النشوية المادة .

٢٤٦٢٣ - لَبِيكِتُ *Libitina* (S). *Libitina* (F). *Libitina* (E).

جنس حيوانات بحرية من فصيلة الطيريات ورتبة الرغويات صفحيات الخياشيم والاريل . انواعها المعروفة عديدة اصطناعها بحار البلاد الحارة من العالم القديم . يكثر وجودها في البحر الاحمر والمحيط الهندي . اصنافها شبه كلوية الشكل ، معتدلة الجسم ، متساوية الصاعير . مشابها صغيرة ، طليقة ، ثنائية في تعيش لاصقة بالصخور المشورة القليلة السم . لحومها مأكولة متوسطة الصنف .

٢٤٦٢٤ - لَبِيكِتُ ، لَبُودَةُ ، لَبَان *Lionne* (F). *She lion* (E). ويقال لها العرس ايضاً .

٢٤٦٢٥ - لَبُودَةُ الْبَيْنِ * ، شَمْعِيَةُ الْبَيْنِ *Ceroplastes rusci, C. nerii* (S). *Céroplaste du figier* (F). حشرة من القرمزيات ، موطنها حوض البحر المتوسط . تركيب الثين والاس . جسمها كروي الشكل ، اسير اللون ، قطرها يراوح من ٤ الى ٤ م . قرنها الشمسي جامد التند التماسي الشكل ، ثنائي الصعائف الطويلة . شحمها اريد اللون يتسهي المراج . ذكورها بمنجحة تقوّل نحو ٢ م . ثوبها الى الجوزة . رؤسها عاجية اللون مهدية الخمار .

٢٤٦٢٦ - لَبُودَةُ الْحُمْصِيَّاتِ * *Coccus hesperidum, Lecanium hesperidum, Lecanium tessellatum* (S). *Pou des hespérides, Cochenille paze de l'orange* (F). حشرة صغيرة من القرمزيات ، موطنها جميع مناطق الحمصيات . طولها يراوح من ٤ الى ٤ م . وعرضها من ٢ الى ٣ . وهي يبيضة الشكل مفلطحة . طليها الخماري عادم الصلابة . قرونها الاستشعارية ثمانية القواصل . ثوبها يختلف باختلاف عمرها يظلم في البني والاسمر . تركيب جميع الحمصيات وقد تنفصل الاوراق بين الاوراق الاخاديده العروق لا فارق بين الصفحة العليا والسفل . تكاليف يستمال الزيت البياض او الزيت النباتية المركزة من ١ الى ٢ ٪ .

٢٤٦٢٧ - لَبُودَةُ الزَيْتُونِ *Lippia* (F). هي قرمزية الزيتون المخططة ، اطبخا .

٢٤٦٢٨ - لَبُودَةُ صَيْبِيَّةٍ * ، شَمْعِيَّةُ الْحُمْصِيَّاتِ *Ceroplastes sinensis* (S). *Céroplaste ciroux* (F).

حشرة من القرمزيات تركيب الحمصيات على اختلافها . مهدا الصين وقد انتشرت مع اللبون في جميع مناطق زراعتها . وهي صغيرة الهند مذكورة الجسم طولها يراوح من ٤ الى ٦ م . وعرضها من ٣ الى ٥ . لبنتها تعلق نحو ٤ م . وهي مبيضة التاكيل الشائكة . قرنها الشمسي جامد التند ، اثير اللون ، يلكي المواجه . جيلها الحولي واحد . الاثني تقص من ٢٠٠٠ الى ٣٠٠٠ مكنة اطيالية الشكل حقيقية اللون وذلك من الموالل تموز الى اواخر آب . يتغذ المكن



لبودة الثين



لبودة الحمصيات



لبودة صينية



لية



لبس النيل

الميل من نصال النبات المائل || السرة طول نحو ٢٥ سم. جسمها شبه اسطواني الشكل، خفي القشعر، كسني الرب، مشاري الاطراف الحمر. رأسها الى الجفوة. رواجيها الى السرة السوداء || طول الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اشابيع ينقضي في التربة.

٢٤٦٢١ - **لَبْسِيَّة** هو الكنهان، اطبله.

٢٤٦٢٢ - **لَبْسِيَّة** Clerge de Notre-Dame (F). نبات يندي بصير لبد، اطبله.

٢٤٦٢٣ - **لَبْسِيَّة** متوفاة Molène noire (F). هي البوصير الاسود، اطبله.

٢٤٦٢٤ - **لَبْسِيَّة** Labeo (S), Labéon (F), Labeo (E). جلس اسماك نهريه من فصيلة الشبليات. انواعه نحو ٢٠ اعطانها انهر وبجيرات البلاد الحارة من السام القديم. اجسامها طولها ٢٠ الى ٦٠ سم. اثنواها سوية الألوان يكثر فيها الاسمر والجفوي البني. جسمها كبيرة الزعانف. انهرها ليس النيل.

٢٤٦٢٥ - **لَبْسِيَّة** النيل Labeo niloticus (S), Labéon du Nil (F).

نوع من اللبس وهو سمكة نهريه تكثر في النيل. جسمها كبير القدر بطول نحو ٦٠ سم. ثوبا الى الخضار الاسمر. زعانفها كبيرة حراء اللون. لحمها مأكول متوسط الصنف.

٢٤٦٢٦ - **لَبْسِيَّة** Anagallis (S), Mouron (F). ويدي واناخالس. جنس نباتات برية وتربسية، من فصيلة الربيات. انواعها قليلة منها المشية واخشوية واخولية ولعمرة. اوراقها متعاقبة او ضمية. ازهارها جويسية الشكل || اعرف انواعها ما يتبع.

٢٤٦٢٧ - **لَبْسِيَّة** الماء Samola (F). هو السوسل، اطبله.

٢٤٦٢٨ - **لَبْسِيَّة** المروج *، زهليكة، حشيشة الخملكة *، عشبة العلق

Anagallis arvensis (S), Mouron des champs, M. rouge, Morgeline (F), Red pimpernel, Poorman's weather-glass (E), Roter Gauchkal, Rote Müse-darm (D), Anagallide, Anagalli (I).

نوع من اللبين الحروي البري المائل. ساقه جالسة مضمة طول نحو ١٥ سم. اوراقه لائنة متعاقبة، نصلها يفي الشكل صغير القد. ازهاره حراء اللون زرقاء المواج. وهو يتجن من الاصاب الضارة للواجب تلفها ان في الزروع ام في الحقائق والمائل || ازهاره يستمر من ايار الى تشرين.

٢٤٦٢٩ - **لَبْسِيَّة** الهضاب * Anagallis collina (S), Mouron des collines (F).

نوع من اللبين التربي المنصر. ساقه خشبية متضبة طول من ٢٠ الى ٣٠ سم. اوراقه السفلى متعاقبة، اعليجية اتصل. اوراقه العليا ضبة ثلثية التجميع، سنانية النصل السيق. ازهاره كبيرة القد ارجوانية اللون || ازهاره يستمر من ايار الى ايلول.

٢٤٦٣٠ - **لَبْسِيَّة** ضمي الورق * Anagallis verticillata (S), Mouron verticillé (F). نوع من اللبين التربي المنصر. ساقه خشبية متضبة

٢٤٦٣١ - **لَبْسِيَّة** حريف Anagallis tenella (S), Mouron mignon (F).

نوع من اللبين البري المنصر، يكثر في المناطق ساقه متضبة طول نحو ١٥ سم. اوراقه متعاقبة متعاقبة، نصلها مستدير الشكل صغير القد. ازهاره ودية اللون، مستطيلة المالحق النسيلة || ازهاره يستمر من ايار الى ايلول.

٢٤٦٣٢ - **لَبْسِيَّة** مستعرض الورق * Anagallis latifolia (S), Mouron à larges feuilles (F).

نوع من اللبين المنصر زرع كحولي. ساقه متضبة طول نحو ٣٠ سم. اوراقه متعاقبة متعاقبة يضي. نصلها بطول نحو ١٥ سم. ازهاره الى الزرقاء الازوردية || ازهاره يستمر من جوز الى آب.

٢٤٦٣٣ - **لَبْسِيَّة** هي القريغ، اطبله.

٢٤٦٣٤ - **لَبْسِيَّة** Lepiota (S), Lépiote (F), Lepiota (E).

جنس فطور كاملة التركيب من فصيلة الفاريقيات. انواعه المعروفة نحو ١٢. اعطانها بعض اقالم مناطق البلاد المعتدلة الحرارة. تعيش على المواد النباتية المتحللة في الغابات وفي المواق الرطبة. تتميز ببزورها الابيض اللون وبطارسها الحادة الاطراف الطليقة، ويطوق يكتنف اعالي الساق، تحت الاسرة. يكثر ريوها في فصل الحريف || بعض انواعها لتزيد الطعم مأكول وبقسم الآخر كامن الصنف غير مريض فيه وسها نوع جمالي المادة يذوي وقد يحيت.

٢٤٦٣٥ - **لَبْسِيَّة** ركيث * Lepiota rhacodes (S), Lepiota déguenillée (F).

نوع من البسوت المأكول. يكثر وجوده في حراج الصنوبريات. ساقه متدلة الارتفاع، مستقلة القاعدة. اوسه مظلة الشكل، قطرها نحو ١٠ سم. لونها الى البني الاحمر يملوه مواج اصفر عند النضج.

٢٤٦٣٦ - **لَبْسِيَّة** رفيع * Lepiota procera (S), Lépiote élevée (F).

نوع من البسوت المأكول. يكثر وجوده في حراج الصنوبريات. ساقه رفيعة، مستقيمة القاعدة، اوسه مظلة الشكل، كبيرة القد، قطرها يراوح من ١٠ الى ٢٠ سم. لونها الى البني الباهت المدم الاحمر.

٢٤٦٣٧ - **لَبْسِيَّة** زلي البرق * Lepiota metulaespora (S).

لَبْسِيَّة الى spore en outre (F). نوع من البسوت الكامن الصنف. يوجد في المواق الرطبة. ساقه رفيعة، متدلة الضخلة، حطلة اللون. اوسه مظلة الشكل، قطرها نحو ٦ سم. لونها الى الغرة، وشامها اصفر البانج. يوهها ذي الشكل.

٢٤٦٣٨ - **لَبْسِيَّة** عادم النع * Lepiota naucina (S), Lépiote sans valeur (F).

نوع من البسوت الكامن الصنف. يكثر وجوده في المراعي.



لبس الهضاب

لبس المروج



لبس مستعرض الورق



لبس رفيع

لبس ديث



لبس زلي لموج

Latania (S). لَتَانِيَا * ٢٤٦٤٥
Latania (F). Fan-palm (E). Latanie, Fächer
palm (D). Latania (J).

جنس اشجار زراعية من الثعلبات الناليات. أنواعه ٦
 منها المأكولة البآر والصناعية والزيبية. جلوسها منتصبه
 سلبية. أوراقها حالية مروحية. أزهارها ثنائي الجنس.
 طلعها مهبل الشكل. جنباها متبصرة. أزهارها الذكورية
 منفردة. كرووس وتوجيات أزهارها الانثوية ثلاثية الفصل،
 متناكها مهيبة، استنباطها خطية تمتد من ١٥ الى ٣٢.
 جميعها من نباتات المناطق الحارة ترطب في الأتربة الخفيفة
 المسقية النور التي لا تتنفسها الرطوبة || احرف اولهاها
 ما يلي.

٢٤٦٤٦ - لَتَانِيَا أَهْرِيكِيَّة
Latania americana (S). Latanier d'Amérique (F).
 نوع من اللتانية، منبتها افريقية الوسطى. زرع لاترين
 ويستخرج من أوراقها الياف لسيجية صناعية لا بأس بها
 شائعة الاستعمال المحلي.

٢٤٦٤٧ - لَتَانِيَا بَوربونِيَّة
Latania borbonica (S). Latanier de Bourbon (F).
 نوع من اللتانية الزيبية. زرع في المراكن والحدائق
 التي لا تخشى البرد. أوراقها مروحية جميلة انفسار الزاهي،
 تطويل وتعرض من ١٠٠ الى ١٥٠ سم. جريدتها متباعدة
 الحسف الاخضر اللون || ترطب في الأتربة اللدالية
 الحوارة الممكن دجا.

٢٤٦٤٨ - لَتَانِيَا حَمْرَاء
Latania rubra (S). Latanier rouge (F).
 نوع من اللتانية الزراعية الصناعية، منبتها البلاد الاستوائية.
 أوراقها كبيرة اللق تطويل وتعرض نحو ٢٠٠ سم. جريدتها
 حطلي اللون بجوي الموج. غوصها احمر الضلع، اغضر
 الصلصة || يستخرج من أوراقها الياف صناعية شائعة
 الاستعمال.

٢٤٦٤٩ - لَتَانِيَا صِينِيَّة
Latania sinensis (S). Latanier de Chine (F).
 نوع من اللتانية الزراعية، منبتها الصين تتميز بكثر
 كباشتها وكثرة حصدها الذي يراوح من ٦ الى ١٠، أما
 متوسط وزن الكيلة فنحو ٥٥ كيلو. ثمارها مأكولة يحي
 يضيء الفلح صفراء اللون طقدراها قدر اليسر الصيني.
 أوراقها متوسطة اللق تستعمل في صناعة الحبال وفي بعض
 الانسجة الوطنية.

٢٤٦٥٠ - لَيْثْرُوس *
Lethrus (S). Létrus (F). Lethrus (E).
 جنس حشرات من همديات الانجحة صليحيات القرون
 ونصيلة الجمليات. انواعها المرفوعة نحو ٢٠ اعطائها تمتد
 من الشرق الاوسط الى اربوة الشرقية والجنوبية. جميعها
 خاضعة راسمة تسرح في الليل || اجسامها شبه يضيئة
 اللون، تطويل من ١٨ الى ٢٢ سم. أثوابها الى السواد
 الاصفر او الحوارة السمر. رؤوسها كبيرة. تكثرها
 ضليحة. عيونها صغيرة بارزة. قرونها الاستعمارية
 صليحيات الاطراف. كاسلها عريضة مقعرة الحاس
 الراسي جالسة الحاس الفضلي، اعماها مستديرة الاطراف
 اللافحة. قوائمها شديدة النشط، متكافئة الهلب.

ساقه معتدلة الارتفاع لونها الى الحلطة. اروسه قلسوية
 الشكل، قطرها نحو ١٠ سم. لونها الى الحلطة السمر.

٢٤٦٣٩ - لَيْبِيُوتُ مُجْعَد *
Lepiota cristata (S). Lépiote crêpe (F).
 نوع من الليبوت الجمالي المؤذي. يوجد في انباتات كربة
 الرابطة عند السس. ساقه معتدلة الارتفاع، سمر اللون،
 طوقها ابيض اللون، اسمر الحافة. اروسه مجعدة الصلصة،
 مقعرة الوسط، قطرها نحو ٣ سم. لونها الى السمر يطوها
 تنعيم اسفر.

٢٤٦٤٠ - لَيْبِيُوتُ هُورِيَّو * ٢٤٦٤١
Lepiota hystrix (S). Lépiote hérissée (F).
 نوع من الليبوت المأكول. يكثر في المواقع الظليلة. ساقه
 مستقيمة، قصيرة، عادية الطول. اروسه شبه
 غروبية الشكل، مشطلة الصلصة، صغيرة الحجم،
 قطرها نحو ٤ سم. لونها الى الصفرة الكستنية الموج.

٢٤٦٤٢ - لَيْبِيُوتُ مُسَج *
Lepiota excorista (S). Lépiote excoriée (F).
 نوع من الليبوت المأكول. يوجد في بعض المواقع الرطبة.
 ساقه مستقيمة القاعدة، مشطلة المتق، غبراء اللون.
 اروسه شبه مظلية الشكل، قطرها نحو ٥ سم. لونها الى
 البيرة يطوها تسنيج اسمر.

٢٤٦٤٣ - لَيْبِيُوتَات *
Lebidiidae (S). Lebidiidae (F). Lebidiidae (E).
 فصيلة حشرات من رتبة همديات الانجحة. اجناسها
 وانواعها المرفوعة كثيرة العدد منتشرة في معظم اقطار العالم
 اجسامها صغيرة، مبطلة تطويل من ٤ الى ١٢ سم. رؤوسها
 صغيرة. عيونها بارزة. تكثرها ونكوتها قياسية، عادية
 الهلب. قرونها الاستعمارية خطية، مركبة من ١١
 فصلة، مهدبة ابتداء من الفصلة الرابعة. كاسلها صغيرة،
 خضرة، يكثر فيها الشكل الخلفوني. اعماها تساجية
 الاغاديدي، جميلة الالوان الزاهرة، اراسع القوائم
 الاسانية، عند الذكور، مجهزة بصلين من الهامج ||
 جميعها مقعرة، تطير بصفة وتتقلل حل الارض برشاقة.
 تألف المواقع التي يكثر فيها الارق لاته من فراشها المفصلة ||
 اشهر اجناسها اللبببة والسيسنديس.

٢٤٦٤٣ - لَتَات * ٢٤٦٤٤
 ما فت من قشور الشجر.

٢٤٦٤٤ - لَتَاسَة *
Latasta (S). Latastia (F). Latastia (E).
 جنس حيوانات زساعة ييبوتية من المظائيات وفصيلة
 الضبابيات. انواعها المرفوعة اربعة موطنها الجزيرة العربية
 وبعض المناطق الافريقية. تألف القسائي والباري
 والواحات. قوتها الحشرات والدوبيات والديدان ... ||
 اجسامها مستطيلة. اطوالها تراوح من ٢٧ الى ٣٢ سم.
 رؤوسها مستطيلة الشكل. قوائمها خاسية الاصابع. .
 اذنانها اغشية، دقيقة الاطراف. أثوابها الى السواد
 الخليلية او الصهبة الصفراء || ذكورها اصفر قدا من
 اناثها ولم ثوبا منها. الاناث تومن شلقها في الرمل حل
 عتق ٤ الى ٥ سم. يفتقد يمد خسة اصابع عن دوبيات
 نخلة دقيقة تسمى الى القوت يمد التفق يربون.



ليبوت حاد الفع



ليبوت مجعد



ليبوت مزبل



ليبوت مسج



لثاسة



لتانية



تيس



تين مداد



لثة

٢٤٦٦٠ - **لثة مقلبة الورق** (F). *Clethra alnifolia* (S).
Clêthre à feuilles d'aune (F).

نوع من اللثة وهي جنية سرطانية تملو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم. اوراقها مقلبة الشكل طولها من ٨ الى ١٢ سم. وتعرض من ٤ الى ٦ سم. نصلها بمجرى الزغب كثير المروق للنتابة المتوازية. ازهارها وردية اللون طرية المرف حنقودية التجميع || ازهارها يستمر من تموز الى آب.

٢٤٦٦١ - **لثة مقلبة**

Clethra canescens, *C. barbinervis* (S). Clêthre barbu (F).

نوع من اللثة وهي شجيرة سرطانية تملو من مترين الى ٦ امتار. اوراقها بيضبة مدببة ملتحية كثيرة المروق للنتابة الشارقة و نصلها خلي الصلصة السفلى، مجرى اللون. عتاقده ازهارها ملشبية وطة، ازهارها كبيرة اللثة يشاء اللون || ازهارها يستمر من آب الى ايلول.

٢٤٦٦٢ - **لثاتيات** (F).
Clêthraceae (F). *Clêthraceae* (F).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين، كانوا يعتبرونها في التصنيف السابق جنساً من فصيلة الخنثيات || انواعها كثيرة العدد، معظمها بري وبعضها ترشني. جميعها شجيرات ونباتات. اوراقها متعاقبة، بسيطة، مسنة الحافة. ازهارها عتقودية التجميع او سنبل، طرفي الارزكاز. ازهارها خماسية الفصل والبلات، عشارية الاسدية، مقلوبة المآبر، خلقة السبات || اشهر انواعها اللثة الزباء والندبة والشجرة والفضية واللثة.

٢٤٦٦٣ - **لثة** (F).
Macroglossus (S).

Macroglosse, *Roussette klodote* (F).
جنس حيوان من فصيلة اللواطيات. ازواجه المرفقة خسة جميعها يترآه صغيرة القد، طولها من ٦ الى ٧ سم. بسطها من ٢٠ الى ٢٢ سم. اثلواها الى الربعة السوداء. فراطيسها ضيقة، ذلقة، مدببة. السنتها قابلة الانعطاف عارقة الطول || موطنها البلاد الحارة الاسيوية والافريقية. تعيش بجاعات قليلة العدد. تألف مجاري الماء والادوية والكهوف والبيوت الخربة. قوتها الثمار حل اختلاف انواعها.

٢٤٦٦٤ - **لثة زغباء** (F).
Macroglosse minime, *Roussette klodote minime* (F).
Small Reed-bunting (E).

نوع من اللثات. حيوان ليون ثامر من فصيلة اللواطيات || جسمها صغير القد، عادم الذنب، يطول نحو ٦ سم. وتبلغ بسطه نحو ٢٠ سم. قوتها الى الربعة السوداء السوداء الخراج. رأسها مستعرض الثقف، غروطي الشكل. فوطيسها ضيقة، ذلقة، اذناها صغيرتان، متصبتان، مدببتا الطرف. عتاقدها مستديرتان كيرتان. قمها كبير اللثقف يحوي ٣٤ سنًا. لسنتها عارقة الطول يعمل في طرفه بعض الحاجاج الماصة || تألف جلود الاثجار والكهوف والمغاور والبيوت المهجورة. تعيش بجاعات قليلة العدد الى الذكور والاناث || مسرهما دجوي يستمر من الدفوش الى النجر. نباتات الشتوي يستمر نحو ١٢ اسبوعاً. يحبل الاثنى بدم نحو ٣٨ يومًا تقف في تمامه جرراً واحداً يكثي ويسع ويهر بعد الوضع باسبوع ويتعلق بصدر امه حتى التئام، اي نحو سبعة اسابيع || قوتها الثمار الينة واعصها السكرية. تعتبر من اللواطيد المؤذية الفارسة.

٢٤٦٥١ - **لثيس** (F).
سكة من السحليات مشهورة باسم قرلاص، اطلبها.

٢٤٦٥٢ - **لثيس** (F). *Ononis*, *Bugrane* (F).
Ononis (S). *Ononis*, *Bugrane* (F).
جنس نباتات عشبية حولية وبعمرة من فصيلة القرنيات. ازواجه عديدة معظمها بري وبعضها طبي وزراعي || اشهر انواعها ما يلي.

٢٤٦٥٣ - **لثيس القدماة** (F).
Ononis antique (F).
هو الشبارق، اطلبه.

٢٤٦٥٤ - **لثيس مداد** (F).
Ononis repens (S).
Ononis des champs, *Bugrane rampante*, *Arrebauf* (F). *Rest-harrow* (E). *Kriechende Hauhechel* (D). *Bulimacola del campi*, *Serppegliante* (I).
نوع من اللثتين البرية الممر الحليل. سكة منسطة مدادة مستطيلة السلاحيات، كثيرة المروق المندبة المشرقة التي تحمل النبات كاشبكة المطروحة الناحية في التربة || يعتبر من النباتات الفارسة التي تؤذي انبات وتميق الاعمال الزراعية.

٢٤٦٥٥ - **لثة** (F).
Suc végétal (F).
Vegetable juice (E).
ما يسيل من الشجر من عصارة مما كان نوحها.

٢٤٦٥٦ - **لثة** (F). *Clethra* (F).
Clethra (S). *Clêthre* (F).
جنس نباتات برية وربيانية من فصيلة الخنثيات. انواعها عديدة جميعها شجيرات ونباتات. اوراقها متعاقبة، بسيطة، مسنة الحافة. ازهارها عتقودية او سنبل التجميع طرفي الارزكاز. ازهارها خماسية الفصل والبلات، عشارية الاسدية، مقلوبة المآبر، ثلثة السبات || اشهر انواعها وانهرها ما يلي.

٢٤٦٥٧ - **لثة زباء** (F).
Clethra tomentosa (S).
Clêthre tomentoux (F).

نوع من اللثة وهي جنية سرطانية تملو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم. قروصها زباء اللحاء. اوراقها احليجية ضيقة طولها نحو ١٠ سم. وتعرض ٤، نصلها خلي الصلصة السفلى الطحلل. اللون. ازهارها طرية كبيرة اللثة سنبلية التجميع || ازهارها يستمر من تموز الى آب.

٢٤٦٥٨ - **لثة مدببة** (F).
Clethra acuminata (S).
Clêthre acuminé (F).

نوع من اللثة وهي شجيرة سرطانية تملو من مترين الى ٦ امتار. اوراقها احليجية مدببة تطل نحو ٢٠ سم. وتعرض نحو ٩، نصلها مدببة الحافة، اخضر الصلصة العليا، مجرى السفلى الحلية البشرة. ازهارها كبيرة القد، سنبلية التجميع، يضاء اللون || ازهارها يستمر من تموز الى تشرين.

٢٤٦٥٩ - **لثة مشجيرة** (F).
Clethra arborea (S).
Clêthre arboreuscent (F).

نوع من اللثة وهي شجيرة تملو من ٤ الى ٦ امتار. اوراقها ابدة تطل نحو ١٦ سم. وتعرض نحو ٦ سم. نصلها جامد الصفحة، خلي البشرة السفلى الصفراء اللون. ازهارها عاجية، عتاقدها صغيرة القد لثة || ازهارها يستمر من آب الى تشرين.

٢٤٦٧٢ - لآءة
Chelonia (S).
Chelone (F). Chelone, Sea-tortoise (E).
جنس سلاسل بحرية من فصيلة اللجنيات . انواعها عديدة ، جميعها كبيرة القد تقبل نحو ٢٠٠ سم . وزن نحو ٥٠٠ كيلو . ذيلها قليل الاحدياب ، قعرها قرني المادة قياسي الترتيب . قوائمها زيتنية الشكل ثنائية المقاب . قوائمها الاحشاش البرية . تبيض على الشواطئ الرملية ، لحماها ماكول ويبيها ايضاً .

٢٤٦٧٣ - لآءة خضراء *
Chelonia viridis, C. midas (S). Chelone franche, Tortue verte (F). Green tortoise (E).
نوع من اللآءة المأكولة للحوم . تكثر في المحيط الهندي وفي بحر العرب ، طويلاً نحو المترين ، ذيلها الى الخصر الزيتوني .

٢٤٦٧٤ - لآءة سهفية *
Chelonia imbricata (S).
Chelone imbricque, Caret (F).
نوع من اللآءة المأكولة للحوم المنتشرة في جميع البحار . ذيلها اسمر اللون ، قعرها سهي التركيب لؤلؤي الماجة .

٢٤٦٧٥ - لآءة
النسبة التي قل لها وقد يكون ذلك بعد تاجها باربعة اشهر . ج . لآءة .

٢٤٦٧٦ - لآءة
Abyss (F). Abyss (E).
المنقح البعيد الفور في البحر ، ينتدح من حدود المنطقة الجبية اي على عمق ٥٠٠ م . من سطح الماء وما دون ذلك حتى القعر .

٢٤٦٧٧ - لآءة ملقوسة *
Ligdia adustata (S). Ligdie adusta (F).
Ligdia adustata (E).

حشرة من الافريات حشرغيات الاجسنة . موطنها يعد من الشرق الاوسط الى اوروبا المعتدلة الحارة . فراشها جارية قوتها رقيق الازهار . سرقها تعيش على اوراق الخصاص ولقات ... || جسمها صغير قصيف يطول نحو ٩ سم . بسطها نحو ٢٨ سم . رأسها الى الكسني . عينها ناضجة زباناها مشطيان عند الذكر ، عيطيان عند الانثى . جوشها الى الكسني الاسود المواج . بطنها الى الطحلة السمر المواج || وراشها عند الشقين الى الشبهة الروردة المواج تملوها في الزرع الاسامي بقية قاعدية بلون الجوشن ، ويقتة بنية ورقشة الى الطحلة . وتملوها في الزوج الخلفي رشة تراوح من الخطني الى الاسمر . اعدائها تبنية اللون || لها جيلان في الجيل . تظهر فراشة الجيل الاول في نيسان وتظهر فراشة الجيل الثاني في تموز . ترحم من الصمر الى فسة الليل . تماثل بعد ظهورها بنحو ثلاثة اسابيع وتفتح المكن مهادياً على الصفحات السفلى من نصال النبات المائل || السرفة تطول نحو ٢٠ سم . جسمها اسطواني الشكل ، مالمس القشار . ثوبها الى الطحلة الكدرا تملوها رشة زرقاء قائمة . رأسها الى الزرقعة السوداء . مدها الى الخطني الاخير . رواجها البطنية الوسطى ماصحة ما يحملها تنقص عن الانتقال || طول الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقضي ضمن صلبة تحبكهما السرفة في كل مكان .

٢٤٦٦٥ - لآءة
Synanthérie, Syngénésie (F).
Syngenesia, Syngenesia (E).
الثآءة حالة الاسدية الملقوسة اي الملتصقة المآبر .

٢٤٦٦٦ - لآءة الاقائي *
Astica cracca, Toxocampa cracca (S).
Toxocampe de la vesce craque (F).
Astica cracca (E).

حشرة من النملقيات حشرغيات الاجسنة . موطنها بعض مناطق الشرق الادنى واروبة الجنوبية والفرية . فراشها جارية قوتها رقيق الازهار . سرقها تعيش على اوراق الفريزات القرائية واعصها الاقائي والقصداد || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٥ سم . بسطها نحو ٣٨ سم . رأسها كسني اللون جوي المواج . عينها كبيرتان . زباناها عيطيان . جوشها وبطنها الى الخطني الاكلس المواج || وراشها الاماميان الى الخطني الاكلس تملو جدة كسنية وبشفة حلالية سوداء ثم جدة اخرى خضراء . وراشها الخلفيان الى الخطني الاكلس في الزوايين الاول والثاني والى الكسني الاسمر في الزوايين الثالث والرابع || لها جيل واحد في الجيل . تظهر الفراشة في تموز ويثقي حتى ايلول . ترحم في الليل . تماثل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتفتح المكن مهادياً على نصال اوراق النبات المائل || السرفة تطول نحو ٢٣ سم . جسمها شبه اسطواني الشكل ، مالمس القشار ، اخضر اللون ، اطول المواج تملوه خمسة خطوط نارية قاطبة منها خط ثبجي ينتهي عند السكة التاسعة . رأسها الى المرفة القائمة . مدها ورواجها الى السمر || طول الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقضي ضمن صلبة تحبكهما السرفة على مالمق الاوراق الذاللة القريبة من التربة .

٢٤٦٦٧ - لآءة
Rosée du matin (S).
Morning dew (E).
هو الندى وبهم من يقول ما سقط آخر الليل ، وأما الذي يسقط اوله فهو الندى . ويقال يوم لآءة اذا كان ساكن الريح كثير الندى .

٢٤٦٦٨ - لآءة
Recueillir un suc (F).
To gather a juice (E).
لآءة والى واتش : استقطر حصاره الاشجار من حلاب وصنع وما اشبه .

٢٤٦٦٩ - لآءة ، صامع
Gommeux (F).
Gummeux (E).
ما كان صمغى المادة او كانت تملوه مادة صمغية .

٢٤٦٧٠ - لآءة ، مكنود
Synanthérique (F).
Synagetic (E).
اللقيد من النبات ما كانت مآبر اذهاره ملتصقة . ومن الاذهار ما كانت مآبرها ملتصقة .

٢٤٦٧١ - لآءة يآءة
Synanthérose (S).
Synanthérose (F). Synanthérose (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين وسيدة القائمة سفلية الاسدية الملتصقة المآبر . كائناً ، فيما مضى ، يعتبرونها صارة من فصيلة المركبات .



لآءة الاقائي



لآءة خضراء



لآءة سهفية



لآءة ملقوسة



لَجَفَةُ الحور



لَجَفَةُ السديان



لَجَفَةُ السط



لَجَفَةُ الصنوبر



لَجَفَةُ العليق



لَجَفَةُ اللؤلؤ



لَجَفَةُ النجيل



لَجَفَةُ خضلة

« Feuille morte du chêne » (F). Common lappet moth (E). Kupferglucke (D).

حشرة من اللبغيات متوسطة القد، ثوبها إلى البني المائل، وراشها منشارية الحافة ثلاثية الخطوط السود. يرقاها تركب المائل والزعرور والنوخ.

٢٤٦٨٧ - لَجَفَةُ النجيل * و« كشفة الندي » Cosmoriche potatoria (S). Cosmoriche, Buveuse (F).

حشرة من اللبغيات متوسطة القد صفراء اللون، يرقاها تركب مختلف البنايات النجيلية. من خصائصها أنها ترشف نقط الندى المتجمعة على زغب الأوراق قبل أن تقرض النصل.

٢٤٦٨٨ - لَجَفَةُ مُخَطَّطَةٌ * Malcosoma neustria (S). Bombyx à livrée, B. à bagues, B. neustrian (F). Common lackey moth (E). Ringelspinner (D).

حشرة من اللبغيات صغيرة القد حشوية اللون حرراء المخرج تمتع مكها بالتتابع على الإخصان فيظهر كالطوق أو كالحزام. يرقاها تركب أوراق الأشجار الخضراء وأرجحية من إيار إلى حزيران.

٢٤٦٨٩ - لَجَفَتِيَّاتٌ * Laslocampidae (S). Laslocampidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة حشرقيات الأجنبية. أجناسها وأولعها زهاء ١٢٠٠ جميعها متوسطة القد، كثيفة الحراشف، ضعيفة الرواشن، عادمة الطعم، شطية الزباني، أناثها أكبر حجماً وإفتح لوناً من ذكورها. يرقاها تحصل على جانبها خصل من الهلب الكتيق. غادراتها لتتحف بشرائق حريرية الخيط مثقوبة النسيج.

٢٤٦٩٠ - لَجَمٌ

و« الجَم دويبة اصفر من اللطاية. وقيل أكبر من شمة الأرض ودون الحرياء ».

٢٤٦٩١ - لَجَنٌ، لَجِينٌ Mash كل خليط من دقيق أو نخالة أو قث أو غيرها مع الورق أو اللبن مرق بالماء لتتلفه الماشية.

٢٤٦٩٢ - لَجَنِيَّاتٌ، لَجَنِيَّاتٌ Cheloniidae (S). Cheloniidae (F). Cheloniidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية بيوضة من رتبة السلاسل، أجناسها وأولعها عديدة معظمها كبير الجف. ذبلها عني التركيب قليل الإحدياد. زلفها صفروني للامدة، فأولعها مبطلة زعتقية الشكل || أشهر أجناسها اللبأة والحفأة والقبض.

٢٤٦٩٣ - لَجِيٌّ Abyssal, Abyssique (F). Abyssal (E).

نمت تعريفي يطلق على الكائنات البحرية المزودة في العجة أي في المنطقة البحرية التي يراوح عمقها من ٥٠٠ م. تحت سطح الماء حتى القعر.

٢٤٦٩٤ - لَجِيدِيَّومٌ * Lagidium, Lagotis (S). Lagidium (F).

جنس حيوانات لينة قاضية من فصيلة الشفليات. موطنها بوليفيغية والبيرو والبيلي. أجسامها متوسطة القد، قدرها قدر الارانب. سبالها كثيفة الهلب الاسود العليل. أذاها كبيرة متعسبة. أذاها مستطيلة جثة طولا يبادل طول

٢٤٦٩٥ - لَجَفَةُ الرَّبْسِم * Laslocampa trifolia (S). Bombyx du trèfle, Laslocampe du trèfle (F).

حشرة من اللبغيات متوسطة القد ثوبها إلى الجوزة الوردية المراج. يرقاها تركب الربسم وجميع أنواع النفل وبعض القلغيات.

٢٤٦٩٦ - لَجَفَةُ الحور * Gastropacha populifolia (S). Gastropacha du peuplier (F).

حشرة من اللبغيات، متوسطة القد. يسطها نحو ٩٠ م. ثوبها إلى البني الزاهي. وراشها منشارية الحافة، خلسية الخطوط السود. يرقاها تركب الحور وتعيش على أوراتها.

٢٤٦٩٧ - لَجَفَةُ السند يان * Laslocampa quercus (S). Bombyx des chênes, Laslocampe des chênes (F). Oak moth (E). Eichen-spinner (D).

حشرة من اللبغيات متوسطة القد كبيرة الرواشن المتناخة الألوان. ثوبها إلى البني الاصفر المراج. يرقاها نمة تركب جميع أنواع السديان.

٢٤٦٩٨ - لَجَفَةُ السط * Nadia obsoleta (S). Bombyx du gommier (F).

حشرة من اللبغيات، متوسطة القد، يسطها نحو ٥٠ م. يرقاها تحصل في بعض طبقات حلقها البنية جيوا مشبة بالهلب اللطيق الناعم اللزب تغلفه عند الحاجة دفاعاً عن الحياة. يهي تركب السط تعمره من الورق.

٢٤٦٩٩ - لَجَفَةُ السط المُرَّ كَشَفَةٌ * Taragama acaciae (S).

الميموزا Bombyx du mimosa (F). حشرة من اللبغيات تتحلل بذات خصائص يرقاها السابقة إلا أنها أكبر قدًا وأغلظ جثة وأقوى ثوبًا. وراشها مزركشة بالاسود والأعطل. يرقها تركب السط دون سواء.

٢٤٦٩٣ - لَجَفَةُ الصنوبر * Dendrolimus pini (S). Dendrolime du pin, Bombyx du pin (F). Pine lappet, Pine moth (E). Kiefernspinner (D).

حشرة من اللبغيات متوسطة القد يسطها نحو ٥٠ م. ثوبها إلى اللون الغبر المراج. وراشها مزركشة ومغطاة. تسرح من عزم إلى آب. تمتع مكها على جلود وأغصان وأهداب الصنوبر فينفت من يرقات دقيقة تباين بالهلب الإهداب منه أنسلخها الأول. ومن قائل أن البرقة تآكل في أثناء دورتها الحياتية زهاء ١٠٠٠ هدية. وأنها تلهم الهدية بظرف خلس دقات.

٢٤٦٩٤ - لَجَفَةُ العرعر * Pachyopa lineaire (F).

فراشة مشهورة باسم بكلمة العرعر، أظلم.

٢٤٦٩٥ - لَجَفَةُ العليق * Macrothylaca rubi (S). Bombyx de la ronce (F).

حشرة من اللبغيات متوسطة القد بنية الثوب يسطها نحو ٥٠ م. تسرح من إيار إلى حزيران. يرقاها نمة تركب العليق وبعض النباتات البرية والزراعية أخصها الوردية.

٢٤٦٩٦ - لَجَفَةُ اللؤلؤ * Gastropacha quercifolia (S). Gastropacha

٢٤٧٠١ - **تحلاح** * ، **فُصُون الجِمال**

Cnicus acarna, *Picnomon scarua* (S). *Chardon acanthin* (F). *Cnicus*, *Thistle*, *Welded thistle* (E). *Schöne Distel*, *Sperdistel*, *Stacheldistel* (D). *Cardo acantino*, *Scardaceione* (I).

نبات عشبي يري حولي شالك من فصيلة المركبات يكثر في الاراضي البر واصل جوانب الطرقات ويصعب من النباتات الضارة اذا كثر في الزروع .

Apogon (S).

٢٤٧٠٢ - **تحلح**

Apogon (F). **Apogon** (E).

جنس سمك بحرية من فصيلة الفرغيات شالكانت الزعانف . انواعه المعروفة ثلاثة اعطائها بحار البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها اميلجية الشكل تطلو من ١٥ الى ٢٥ سم . اذواها مختلفة الالوان . رؤوسها معتدلة الحجم ، قصيرة الخلف . اشدالها واسعة منفرجة . عيونها معتدلة القد ، مستطيرة ، ماصحة . زعانفها الظهرية الثتان . زعانفها الذيلية فارقة || اشهر انواعه الصالح الاخر .

٢٤٧٠٣ - **تحلح آخِر** * ، **تحلح مبدل** ، **يُوزباشي**

Apogon ruber,

Ap. imbarbis (S). **Apogon rouge**, **Ap. commun**, **Roi des rougets** (F). **Apogon ruber** (E).

نوع من الصلح - سمكة بحرية بيوض من فصيلة الفرغيات . اعطائها معظم اقالم البحر الابيض المتوسط . مسرحها الكثاف الصخرية والاشفاف || جسمها اميلجي الشكل يطول نحو ١٥ سم . حراشفها كبيرة . ثوبها الى الحمرة يطولها تنقيط اسود . زعانفها حراء الكون . رأسها معتدل الحجم ، رفيع المقدم ، قصير الخلف . شفتها واسع الانفراج اسناتها صغيرة ، مترامة ، ذرية . زعانفها الظهرية الثتان . زعنفتها الذيلية فارقة || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

٢٤٧٠٤ - **لحم** ، **لحم** ، **لحم**

Vlande (F). **Meat** (E). هو التسج المنسل في الحيوان والطيور وهو من الاطعمة الهامة المفيدة لاستهلاكه حل نسبة كبيرة من المواد الغذائية تلخص متوصلها في الجدول التالي :

نوع اللحم	ماء	مواد	مواد	مواد
	ازوتية	دهنية	معدنية	
ايقار عادية	٧٦,٣٧	٢٠,٧١	١,٧٤	١,١٨
ايقار مسمة	٥٣,٠٥	١٦,٧٥	٢٨,٢٨	٠,٩٢
حبول عادية	٧٨,٨٤	١٩,٨٦	٠,٨٢	٠,٥٠
حبول مسمة	٧٢,٣١	١٨,٨٨	٧,٤١	١,٣٣
قم حادي	٧٥,٦٨	٢٠,٨٢	٢,٣٥	١,١٥
قم مسن	٥٣,٣١	١٦,٦٢	٢٨,٦١	٠,٩٢
خنزير مسمة	٤٧,٤١	١٤,٥٤	٣٧,٣٧	٠,٧٢

أما بيان المواد المعدنية المذكورة في الخانة الأخيرة من هذا الجدول فهو التالي :

حامض فسفوري	٠,٥٥ %
كلور	٠,١٠ %
بوتاس	٠,٥٥ %
صودا	٠,١٠ %

الجسم . جوامها الامامية قصيرة والخلفية طويلة جيمها رباعية الاصابع . وبر فراها كيف التسجيم نام المنسل ابني القاعدة اسهب الجسم صتاني الطرف || قوتها الاخشاب والجلود والقشالط . اناتها تقص من ٤ الى ٦ ادراس حل ثلاث مرات في السنة || انزلها الثنان :

Ligidium pallipes (S).

Ligidium à pieds pâles (F).

Ligidium persuanum (S).

Ligidium du Pérou (F).

لجديدوم البر و

Ecorce (F). **Bark**, **Strip** (E).

اللحاء برجه عام هو قشر البرد والقصن والساق . واللحاء من البرجة الثانية هو احد التسج الثلاثة التي تتكون منها الخزم الصالطة . وهو يتكون من انسجة غروالية تمر بها المواد الغذائية ومن جيوب خلوية تخزن بعض المواد . واللحاء جسموريا يأتي بين القشرة والشكير وهو يلفف التسج القلبية التي تلتف الشكير .

٢٤٦٩٦ - **لحانة دجونة** *

Nomophila noctuella (S). **Nomophila nocturna**,

Teigne nocturne (F). **Nomophila noctuella** (E).

حشرة من فصيلة الثاريات حرشيات الاجنحة . موطنها المناطق المعتدلة الحرارة في جميع اقطار العالم . قراشتها رحالة قوتها رقيق الازهار . سرقتها خاضلة تعيش ضمن غمد حريري التسج على الازواك التي تلتاس التربة من التيجليات والمركبات والقنريات || جسمها يطول من ١١ الى ١٢ سم . يسطها قزواح من ٣٧ الى ٣٤ سم . رأسها شبه مكور الشكل . صنتها صغيرتان ، ناضرتان . زيانها خيطيان . ملاسها صغيرة . برشفتها معتدل الطول . جوشنها ويطنها الى الكسني || رواشتها الى الصناني تملوها ، في الزوج الامامي ، رفقة زربا كس كسنية تمتد من القاعدة الى الختار الحاربي || لها جيل واحد في الحول . تظهر القراشة في نيسان ويقي حتى تشرين الاول . تسرح وتضجل في الليل || طويها القراشي يستمر نحو سبعة اشهر تماثل في غلولة نحو ست مرات . والاقي تلقى المكمن بعد كل طرة زربا شعية الممد تغلفها مادة غروية تثبتها حل الصفحات السفلى من تصال الازواك التي تلتاس التربة || الطور الاسروي يستمر من ثمانية اسابيع الى عشرين اسبوعا لانه معوط بموئل البيت والحرارة والاختفاء . السرعة عند الادراك اتام تطلو نحو ١٤ سم . جسمها اسطواني الشكل ، حطلي الكون ، اسمر المراج . رأسها كسني الكون . مدنها ورواجها الى الخنط || طور الاكمال الذي يستمر من اسبوعين الى ثلاثة اسابيع يتقضي ضمن حلجة تسمجها السرعة تحت الاجنالة او بين اربويات الثنيات .

Pointe (F). **Tip** (E).

لحاط الرقبة : اسفلها الابيض .

Protogénie (F). **Protogyny** (E). **٥** - **لحَب**

الحلب هو ادراكه اعضاء التاملل الانثوية في الزمرة قبل ادراكه الاعضاء الذكرية .

Ecorcer (F).

To strip, **To bark** (E).

Chalcide (F).

هي الحلكة ، دوية تنوص في الليل ، اطلها .



لجديدوم



لحانة دجونة



لحاح



لحاح أحمر

اسمر ، يطفئ الى الصفار الاخير . طبقاته صغيرة دقيقة
اربع منها تحللي الفك الاعلى ولثنتان في الفك الاسفل .
لحمه لذيذ الطعم مرغوب فيه .

كلس ٠٠٠١ %
مغنيزيا ٠٠٠٤ %
اكسيد الحديد ٠٠٠٥ %



لُحْ الفُردان

٢٤٧١٩ - نُحْم شَالِكَة
Cobitis taenia (S).
Loche épineuse, L. de rivière (F). Groundling (E).
نوع من اللُحْ ، يعيش في المياه النهرية الراكدة . جسمه
يطول من ١٠ الى ١٢ سم . وهو مبسط الشكل متراكب
الارزان اللامعة والمائلة . طبقاته ست تحللي الفك الاعلى
دون سواه . لحمه متوسط الصنف مأكول .

٢٤٧٢٠ - نُحْمُوم (F). Omophage (F). Omophagous (E).
أكل اللحم النيء .

٢٤٧٢١ - نُحْمِي
Ganache (F). Lower jaw (E).
رما حيوان أي شيئاً فك القفوس والبلغم والحمار ...

٢٤٧٢٢ - نُحْمِيَّة التَّيْس (F).
هو سلسيل المَرَج ، اطلية . قال الانطاكي : « هو
الموسطيداس نبت كوروك الكركرات لكن لا يرتفع حفص
حاد الرامحة يقطع الاسهال والنزف وقروح الرثة والصدرة .

٢٤٧٢٣ - نُحْمِيَّة الحِمَار هي كزيرة الير ، اطلية .

٢٤٧٢٤ - نُحْمِيَّة اَحْمِيَّة هي ذقن احية ، اطلية .

٢٤٧٢٥ - نُحْمِيَّة العُتْر هي الشناب البحري ، اطلية .

٢٤٧٢٦ - نُحْمِيَّة المَهْل هي اللوتيا ، اطلية .

٢٤٧٢٧ - نُحْمِيَّة (F). Volva, Volve (F). Skin (E).
هي غشاء الفطر ، شفاء شفاف ناعم لا تقياسي قوئل .

٢٤٧٢٨ - نُحْمِيَّةَات الأَلْسَنَة (F). Crassilingues (F).
زينة من المظائبات تشمل بعض الفصائل . تتميز بألسنها
الحمية السميكة القصيرة وغير الاعذلة .

٢٤٧٢٩ - نُحْمِيَّة (F). Loch (F). Log (E).
مقياس سرعة السفن .

٢٤٧٣٠ - نُحْمِيَّة (F). Cobitis (S).
جنس اسماك نهرية من الشبوطيات اللبانات الزواحف . اناؤه
المعروفة قليلة . اصطلحاً مياه البلاد الممتدة . اجسامها
ضخمة مستطيلة . تتميز بكثرة طبقاتها واسنانها البلعومية ،
بصفير فلوسها وسيق غشائيتها ما يجعلها تتراد طلع الماء
كثيراً || احرف اناؤه واشهرها ما يلي .

٢٤٧٣١ - نُحْمِيَّة (F). Cobitis fossilis, Misgurnus fossilis (S).
نوع من اللُحْ ، يعيش في سهل البحيرات والفردان . جسمه
يطول من ٢٠ الى ٣٠ سم . ثوبه الى الكهبة للبراء يعمل
حل جانبيه خطان اسودان قاطبان . طبقاته ١٠ ، ست
منها في الفك الاعلى واربعة في الفك الاسفل ، لحمه متوسط
الصنف مأكول .

٢٤٧٣٢ - نُحْمِيَّة (F). Cobitis barbatus (S).
نوع من اللُحْ ، يعيش في الانهر والبسيورات والفردان . جسمه
يطول من ١٠ الى ١٥ سم . ثوبه الى الكهبة بملوفا توضح

٢٤٧٢٣ - نُحْمِيَّة (F). Livistona (S).
Livistona, Rondier (F). Fan-palm (E). *Echete Schirm-*
palm (D). *Palma di cappelli* (I).
جنس اشجار ليفية صناعية وزيتونية من فصيلة النخلات .
مهددا المناطق الحارة والاستوائية . انواعها عديدة جميعها
رفيمة الجذع الجالس في اقاليمها الطبيعية ، قصيرته في
الاقلام المعتدلة ، اوراقها تستعمل في عدة صناعات احصاها
صناعة التبنات والسنائر . الواحدة نلبة || اشهر انواعها
الزيتونية ما يلي .

٢٤٧٢٤ - نُحْمِيَّة (F). Intensifier (F).
To intensify (E).
استعمل اسمن الطرق لاكثر الانتاج .

٢٤٧٢٥ - نُحْمِيَّة أندوليزية *
Livistona hoogendorpii (S). *Livistona de Hoogen-*
dorp (F).
نوع من اللُحْ الزيتوني يزرع في المراكم والحدايق . اوراقه
مستديرة ، جرائدها شائكة تطول من ٨٠ الى ١٢٠ سم .
غوصها مخروطي الشكل ، خاسي او سبامي الانحناء وهو
جابد الصفحة اخضر اللون اصفر اللولج .

٢٤٧٢٦ - نُحْمِيَّة زَيْتُونِيَّة التَّسَر *
Livistona olivaeformis (S). *Livistona à fruits en*
olive (F).
نوع من اللُحْ الزيتوني يزرع في المراكم والحدايق .
اوراقه كلوية الشكل تطول من ٦٠ الى ١٠٠ سم . جرائدها
شائكة جسمها احر اللون ، متباد الاذنكاز . غوصها حاقن
الانضغاط يحسن الاطرائ . ثمارها زيتونية الشكل ولقده .

٢٤٧٢٧ - نُحْمِيَّة مُخْمَشَتِيَّة
Livistona humilis (S). *Livistona bas* (F).
نوع من اللُحْ الزيتوني يزرع في المراكم والحدايق .
اوراقه قليلة الشكل تطول نحو ٩٠ سم . جرائدها سرسة .
غوصها ضيق الصفحة جميل الحصار الزاهي وهو ذرب الزام
الاخير ، حاد الحمة .

٢٤٧٢٨ - نُحْمِيَّة مُسْتَدِيرَة اللَوْرِي *
Livistona rotundifolia (S). *Livistona Birco* (F).
نوع من اللُحْ الزيتوني والصناعي . اوراقه كبيرة القد
مستديرة الشكل قطرها يراوح من ١٠٠ الى ١٥٠ سم .
جرائدها سرسة تطول نحو ٢٠٠ سم . غوصها شديد الحصار
المابن يطول من ٥٠ الى ٧٥ سم .

٢٤٧٢٩ - نُحْمِيَّة ، نُحْمِيَّة (F). Requin (E). Shark (E).
هو القروش ، حيوان بحري جصور ، اطلية .



نُحْمِيَّة أندوليزية



نُحْمِيَّة زَيْتُونِيَّة التَّسَر



نُحْمِيَّة مستديرة اللورق

٢٤٧٢٧ - لحم أنيس

Caracharodon carcharias (S). Requin blanc (F).
White shark (E).

سمكة بحرية ولبد مفترسة من فصيلة الشحيات. أصلها من معظم بحار المناطق المعتدلة الحارة أحصها المحيط الأطلسي. مسرحها المعادي يمي لا يتجاوز الأعواط وتمتد سطح الماء وتواكب السفن || جسمها كبير القد، وشبي الشكل، بطول نحو ١٢ متراً. ثوبها الازرق البهيرة البيضاء الموج. بطنها أبيض من ظهرها. رأسها غروطي الشكل. عظمها شارب. لها لاطم مستعرض الشدك الكبير. أسنانها مثلثة الرؤوس الحادة. زعنفتها الظهرية الامامية كبيرة الحجم مقعرة الشكل. زعنفتها الذيلية حلالية الشكل مستطيلة || تتميز بالثمن وبشدة البطش. قريباً كل ما استطاعت من الأسماك والحيوان || أناثها معدلة التناثر. تضع في كل مرة ١٠ بين أوائل حزيران وأواخر تموز نحو ٤٠ مجراً.



لحن الاعشار المشوة

٢٤٧٢٨ - لحم لعتي

Alopias vulpis (S).
Requin renard, Renard (F). Fox shark, Thresher (E).

سمكة بحرية ولبد مفترسة من فصيلة الشحيات. أصلها من معظم بحار العالم أحصها المحيط الأطلسي || مسرحها يمي ولا تخفى عبور المياه الاقليمية والاقتراب من الجاهل عند ملازمتها اسراب الرنكة والسريدن والاسفري || جسمها وشبي الشكل، كبير القد بطول من ٤ الى ٦ أمتار. ثوبها الازرق الزرقاء الموج يمتد في الظهر وينتهي في البطن. رأسها غروطي. عظمها شارب. لها لاطم مستعرض الشدك. أسنانها مثلثة الرؤوس الحادة. تتميز بزعنفتها الذيلية الكبيرة التضخضاة التي يبلغ طولا طول الجسم والرأس معاً || أناثها معدلة التناثر تضع في كل مرة ١٠ بين أوائل ايار وأواخر حزيران نحو ٣٠ مجراً.

٢٤٧٢٩ - لحميات

Lamnidae (S).
Lamnidae (F). *Lamnidae* (E).

فصيلة أسماك بحرية ولبد مفترسة من السنفقيات ورتبة الاثلاخ. اجناسها وانواعها المعروفة نحو عشرة. أصلها من بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحارة || مسرحها يمي غروطي وسطى || جميعها كبيرة الاجسام الوشيمة الشكل. تتميز بشدة بطشها ونهمها وبأسنانها المثلثة الرؤوس الحادة وبالفتحات الجسدي الكبير بين زعنفتها الظهرية || أشهر انواعها اللحم الأبيض والقمح الصليبي والحداد والياهي.

٢٤٧٣٠ - لحم

Sclerotinia (S).
جس فلور مجهرية من الزمفيات وفصيلة المشاريات. يتميز بدلائه اللطيفة الكبيرة القمية الشكل. تكاته غروطية مشتمية متشابهة القد، بوضف ثنائي او شمائي التركيب. يركب غطفل الاجناس النباتية || أشهر انواعها واصرفها الثمانية عشر التالية.



لحن الاكيدنيا

٢٤٧٣١ - لحم الأشجار المثمرة * ، لحم

لحم * مؤلفيوز * سلبويينا لحم

Sclerotinia laxa, *S. cinerea*, *S. oregonensis*, *Monilia laxa*, *M. cinerea* (S). Rot-brun des arbres fruitiers, Moniliasis (F). Blossom blight (E). Monilia-spitzendürre (D).

فطر مجهرى يركب التفاح والاجاص والسفرجل والكرز والخوخ والدراق واللوز وللمشمش فيسبب انحلاس الازهار

وذبول النولي وانتشار لحاء الافئاد والافئاد وعفن الثمار وتحتيطها || مظهره الخارجي: ينمو على التفاح والاجاص والسفرجل وذبول طارئ يصيب النوية او بعض اثمارها فيصلبها ثم يركب الازراق اللقرية منها وينتقل الى الفين والفند فينوي الاول بعد ان يوشم الثاني ببقع عفنية تقضي على النسج العصاية وتسبب انتشار لحائها || ويكون على الفوخ والدراق واللوز وللمشمش وذبول ففالي يعل بأوراق النولي فيذبلها ويصيب اقرب الازراق من الثمار فيقضي عليها ثم ينتقل الى الافئاد فيفقرها ويصيب انتشار لحائها. أما الثمار فانه فيقتضيها على دمعين الارل عند الانمقاد، على اثر سقوط البتلات، فيلونها. والثانية قرب الادراك فيوشها بمرصاته الحطبية الحطبية التي تعطب القشرة وتحميها بعد ان تسبب عفنا وعفن لها || وهو على الكرز وشم يصيب النور قبل انبلاج الزهر فيقضي على البتلات والحيجان والامن والاوراق والافئاد، والنسج تلو الآخر. كما وانه يصيب الثمار عند ادراكها فيعطيها ويصلب فيها قلمه بثر الخوخ وللمشمش والدراق || يكافح اربا في فصل الشتاء، من كانون الى شباط، بقطع جميع الاعضاء الموصوبة وسرقها وينسخ الاجبار بلوب ملح الصودا المحلول ١ ٪ وللمصا ١ ٪ الى ١ ٪ من الصابون الخالي من البوتاس. ثم تضغ الاجبار مرة ثانية خلال شهر اذار اي قبل الاكاخ يسائل بورودو المحلول من ٠.٨ الى ٢ ٪. بالنسبة الى نوع الاجبار والى ظروفها الخاصة، ومن الواجب ايضاً قنضتها مرة ثالثة توما بعد القعد.

٢٤٧٣٢ - لحم الأكيدنيا *

Sclerotinia mespili (S). Maladie du dessèchement des pousses de néflier (F).

فطر مجهرى يصيب الاكيدنيا في ثولها واثمارها واراقها وثمارها الفتية || مظهره الخارجي عفن اصهب اللون كثيف المرصات يركب النولي فيذبلها ويؤخر نموها ويتركب الازهار فيسبب سقوطها ويصيب الازراق تنحيف وتسرر ابتداء من صفتها بعد ان تكتسب راحة عطرية شمعية. واذا سطا على الثمار يقودها الى اليباس بعد جفاف قشورها || يكافح باستعمال سائل بورودو المحلول ١ ٪ بعد قطع الاعضاء الموبدة وسرقها.

٢٤٧٣٣ - لحم البرقوق *

Sclerotinia pruni-spinosa (S). Rot-brun des prunelles (F).

فطر مجهرى يصيب الثمار والافئاد فيسقطها بطفه التني اللون الذي يسبب اثمارها بكاملها او بجزء منها. وهو حل الافئاد عفن اخضر ثم اصفر يطب اللحاء ويسبب اليباس || يكافح كثيره من اللخن.

٢٤٧٣٤ - لحم البقول *

Sclerotinia minor (S).
فطر مجهرى يفسط ويتكاثر في البيئة الرطبة الباردة التي تراوح حرارتها من ٢ الى ١٠ درجات. يصيب حدة بقول اعصها الحليين والجزر والكرنس واللوياب والحمس والبندورة والطرطوف ... || مظهره الخارجي ببقع عفنية ليدة صغيرة مستديرة تركب مختلف اعضاء النبات فتتلفها ببثور سود بعد ان تفل فيها الحركة التنفسي التي تسبب الذبول الذي يقضي اليباس || لم يكافح حتى الآن. ننصح باحتجاب زراعة البقول المعرصة لهذا الفطر في المواقع الرطبة الباردة.

عفن الحبل خلي يعلو الثَّارَ عند ابتداء الإزراق فينبثقها برصاتها ثم يركب التلوي والارواق الغنية والانتان فيؤذيها بعد ان يحول دون نموها || يكافح مكافئة لحن الثَّارِ .

٢٤٧٤٢ - لَحْنُ السُّوسَنِ

Sclerotinia convulsa, *Botrytis convulsa* (S).
فطر مجهري يفتك مجلدات السوسن . مظهره الخارجي يقع غنية حنطية اللون زغبية ، تركب الجلدات المحفوظة وفي الثَّارَ فتنطعها وتلفها || يكافح بتطهير الجلدات المحفوظة بالفريول وباملاح الزئبق .

٢٤٧٤٣ - لَحْنُ السَّيْتَمِ

Sclerotinia tamulenta, *S. ascalincola*, *Sclerotinia tamulenta*, *Phiala tamulenta*, *Endoconidium tamulenta* (F). *Maladie du seigle enlirant* (F).

فطر مجهري يصيب حب السيل وحب بعض الحنطيات العلفية والثَّارَ || مظهره الخارجي اسطعالة في الحب وتخلطد يبقها انحلال وتآكل المادة النشوية || اكل الحب المويود وبقية حبب في الانسان والحيوان مسا يسببه الزوران من عوارض اسرعهاد ويسكر || يكافح بانتقاء البذار السليم او بغير الحب مدة ٣٠ دقيقة بلأما الساخن البالغة حرارته ٥٠ درجة ستفتراد .

٢٤٧٤٤ - لَحْنُ العَقْرِ * ، عَقْنُ أَشْهَبَ ، عَقْنُ عَتِكَبَرِي

Sclerotinia fuckeliana, *Botrytis cinerea*, *B. vera*, *Polycystis cinerea*, *P. vera*, *Sclerotium durum*, *S. echinatum* (S). *Pourriture grise*, *Pourriture noble*, *Maladie de la tige* (F). *Grey mould* (E). *Botrytis-fuile*, *Graufuile* (D).

فطر مجهري يركب جميع الاعضاء الهوائية النباتية من الساق ال الثَّارَ كما وانه يركب المواد الصغوية على سطح الثَّارَ فينشها برصاتها واصلها التي تشبه نواس المتكبروت . مظهره الخارجي يختلف مع النبات المصاب . يبدو غالباً بشكل ونية حامدة طلاء اللون او حنطية تكتنف النبات . هو في الكثرة يقع غنية زغبية طلاء اللون تركب السروع القريبة من الثَّارَ و تركب حب التلقية فضله وتذله . وهو في الاجاص يقع غنية متبابة قبية للشكل تركب الافناد فتؤذيها وتنبها || ويركب التين في اغصانه فيسبب يباسها وذبول الثَّارَ وجفافها || ويصيب النبات في الماشات فيفشي على الشنول الغنية من اي نوع كانت || يكافح بتطهير الثَّارَ وباستعمال اسعد العلاجات الاقتصادية للزينة الشن .

٢٤٧٤٥ - لَحْنُ القَرَبَلِيَّاتِ

Sclerotinia elborioides, *S. trifoliorum* (S). *Maladie à sclérotis des légumineuses* (F). *Stem rot*, *Wilt of clover and alfalfa* (E). *Kleekrebs* (D).

فطر مجهري يركب بعض النباتات القزنية الحولية اغصنها القبول والبالقة والبرسيم || مظهره الخارجي يقع حنطية مبترنة تركب نصل الارواق ثم تنتشر تصطب كالحبل النصل والمخلط وتندل السوق فتذبلها وتلويها بعد ان تمطعها ويؤشع من العفن الابيض الذي يفسد النبات والثَّارَ || يحسن تخفيض الثَّارَ الكثوم لصرفت الماء القصار واجتناب الزراعة في الارربة الرطبة القوية الانسجام .

٢٤٧٤٦ - لَحْنُ الكَسْتَنَةِ * ، قَرُوم

Sclerotinia pseudo-tuberosa, *Rhacodielia castaneae*, *Marziella castaneae* (S). *Pourriture noire des châtagnes* (F).

فطر مجهري يصيب ثمار الكستنة فنجها ويقضي عليها . مظهره الخارجي لونه طلاء او سرام اللون تملو القشرة

٢٤٧٤٥ - لَحْنُ الثَّيْبِ *

Sclerotinia nicotianae (S). *Maladie à sclérotis du tabac* (F).

فطر مجهري يصيب الثَّيْبِ في سوقه واوراته . يبدو على السوق لطم سمر طويلا نحو ١٠ سم . يمرضها ٦ . وهو على الارواق يقع صغيرة لا قياسية للشكل والحجم تبدو كالشوبر الحنطية اللون الى ان تركبها عرصات العفن الحبل الاثر || اصرار زغبية لا تستريب النابتة لان انتشاره منوط بكثرة الرطوبة الحقيقية وبشدة البرد .

٢٤٧٤٦ - لَحْنُ التَّامَارِ * ، مُوَلِيَّيَّة *

Sclerotinia fructigena, *S. coryli*, *Monilia fructigena*, *Monilia fructigena* (S). *Rot-brun des arbres fruitiers à pépins* (F). *Brown rot* (E). *Monilia-fruchtfäule*, *Polsterschimmel* (D).

فطر مجهري يصيب اشجار ومزارع التفاح والاجاص والسفرجل والا كيديا وقد شوهد في ظروف خاصة على ثمار الكرز والقوق والمشمش والدراق || يصيب في بادئ امره بتلات الازهار ونباتاتها وانها ثم يند الى الانتان فيعطب الحباء والاصية ويصل الحركة النسية بعد ان يمتلئ الاعضاء المصابة ويؤشع من عوصات العفن الحبل الاصل || وقد يصيب الثَّارَ في مختلف ادوارها الحياتية فيعطبها بعد ان يكتنف كامل برشها || يكافح اولاً بقطع وحرق الاعضاء الملوثة والثَّارَ الجافة المختلة . ثم باستعمال سائل بودير الحلول ١٪ الى اثر سقوط بتلات الزهر . وتنفخ الاشجار مرة ثانية بذات السائل وذات اللمدل عندما تصحج الثَّارَ في تصف حببها او في ثلثيه .

٢٤٧٤٧ - لَحْنُ الثُّومِ *

Sclerotinia porri (S).
فطر مجهري يركب اوراق الثوم فيؤذيها ويؤخر نموها . مظهره الخارجي يقع بين ثم سمر صغار مستديرة تركب النصل تنقل نشاطه وتؤخر نموه .

٢٤٧٤٨ - لَحْنُ الجَنُوتَيْنِ * ، عُرُوطُ الجَنُوتَيْنِ *

Sclerotinia bulborum (S). *Morve de la jacinthe* (F).
فطر مجهري يركب بصل الجون والاشقيل والزعفران . مظهره الخارجي اسفرد وذبول يملأ بالادراق فور سطوع الشمراخ الزهري . ثم يبور لبدة لا قياسية الحجم والشكل سمر الغلاف يفس الداخل تركب اسفاد البصل فتضنها وتبرها || يكافح بانتعاج البصل المويود منه ظهور الورسم بتطهير الثَّارَ بالفريول .

٢٤٧٤٩ - لَحْنُ الدُّبُوسِ *

Sclerotinia draytoni (S).

فطر مجهري يصيب البصل المحفوظ وينتقل معه الى الثَّارَ . مظهره الخارجي يقع غنية حنطية زغبية صرامة تركب اسفاد البصل والقرامه فتعطبها وتبرها || يكافح بتطهير البصل عند حطه وقيل زهره بالفريول وباملاح الزئبق .

٢٤٧٤٠ - لَحْنُ الزُّهْرُورِ *

Sclerotinia crataegi, *Monilia crataegi* (S).

فطر مجهري يركب الارواق فيؤذيها ويصيب الثَّارَ فيلويها او يحول دون نموها || يكافح كغيره من اللحن .

٢٤٧٤١ - لَحْنُ السَّكْرَجَلِ *

Sclerotinia linhartiana, *S. cydoniae*, *Monilia linhartiana*, *Monilia necans* (S). *Maladie du dessèchement des jeunes coings* (F).

فطر مجهري يركب الثَّارَ في ابل جهدا فيسبب اتلاها ويركب الارواق والانتان فيؤذيها || مظهره الخارجي



لحن الثَّارِ



لحن العفن

لحمه يحوي بعض المواد السامة المؤذية . وقد يكون السبب مرضي المرجان .

Lychnis (S).

Lychnis, Lychnide (F). Campion, Lampflower, Maltese cross (E). Lichtnelke, Marienröslein, Pechnelke (D). Licnide, Croce di Malta (I).

جلس نباتات عشبية من فصيلة القرنفليات . أنواعه نحو ٣٠ ، منها الحولية والمعمرة . أوراقها متعاقبة بيضية أو سنانية النصل . أزهارها كبيرة القد جميلة الشكل لا قياسية التجميع والارتكاز يكثر لها الاحمر والابيض والوروش . اعرف انواعه واشهرها ما يلي .

٢٤٧٥٣ - لُغْنِسُ أَرْجَوَانِي ، لُغْنِسُ سَاطِع

Lychnis fulgens (S). Lychnide éclatante (F).

نوع من اللغْنِس وهو عشبة معمرة وريضة الساق تملو من ٢٠ الى ٤٠ سم . أوراقها لاطفة سنانية ، نصلها مسن الحافة اذنب البشمة . أزهارها عتكرولية التجميع ، هامة الارتكاز ، بتلاتها أرجوانية اللون ، رباعية التجميع . أزهاره يستمر من حزيران الى آب .

٢٤٧٥٤ - لُغْنِسُ الْحَدَلِق ، لُغْنِسُ مَشْهُورِي

Lychnis coronaria (S). Lychnide coronaire, Agrostemma coronaire, Coquelourde des jardins, Ceillet de Dieu, Passe-Flur (F).

نوع من اللغْنِس الزبني . وهو عشبة معمرة زباه تملو من ٤٠ الى ٩٠ سم . أوراقها بيضية لسنة . نصلها خلي البشمة حل صفحية . أزهارها مستطيلة الاذن كثيرة العدد . بتلاتها قليلة التشرح عديدة الالوان التي تختلف باختلاف القصر || أزهاره يستمر من ايار الى تموز .

٢٤٧٥٥ - لُغْنِسُ الشَّرْقِ الْأَدْنِي ، لُغْنِسُ

Lychnis chalcadonica (S). عتكرولية

Lychnide de Chalcadonia, Croix de Jérusalem, Croix de Malte (F).

نوع من اللغْنِس وهو عشبة معمرة تملو من ٣٠ الى ١٠٠ سم . شروبه الزراعية عديدة . سوقها وأوراقها مزيجية . أوراقها لاطفة بيضية ، نصلها مسن الحافة اصفر الخضار . أزهارها مختلفة الالوان ، ضمية التجميع ، هامة الارتكاز ، منها المكبنة والمعادية ؛ بتلاتها مقعرة تبدو كالصليب مما جعلهم يسمونها صليب القدس أو صليب مالهه || أزهاره يستمر من حزيران الى تموز .

٢٤٧٥٦ - لُغْنِسُ الشَّخَرِي * لُغْنِسُ

Lychnis flos-jovis (S). Lychnide fleur de jupiter, Coquelourde fleur de Jupiter, Cail de Dieu, Fleur de jupiter (F).

نوع من اللغْنِس الزبني وهو عشبة زباه معمرة وريضة الساق تملو من ٣٠ الى ٤٠ سم . أوراقها لسنة ، نصلها خلي البشمة . أزهارها كبيرة القد ، بتلاتها ثنائية التجميع قرصية اللون || أزهاره يستمر من حزيران الى تموز .

٢٤٧٥٧ - لُغْنِسُ بَرِّي لُغْنِسُ

Lychnide sylvestre, Compagnon rouge (F).

نوع من اللغْنِس وهو عشبة برية معمرة تكثر في المراعي والمروج زرعها الماشية بشية .

٢٤٧٥٨ - لُغْنِسُ كَبِيرُ الزَّهْرِ

Lychnis grandiflora, L. coronata (S). Lychnide à grande fleur (F).

نوع من اللغْنِس وهو عشبة معمرة تملو من ٢٠ الى

الخارجية نصلها . ثم يمتد الى لباب الثمرة فيسبب انحلاله وتحويله الى بؤرة من اللغْن الناشئ الاسود تنصله عروق صفري يسلط منها عند انفلاقها شبار كالمهاب || تفرز الثمار المطوية من السليبة بعد نحرها بالماء لان المطوية تنفطر والسليبة تفرز .

٢٤٧٥٩ - لَعْنُ النَّجَسِ ٥

Sclerotinia narcissicola, Botrytis narcissicola (S).

نظر مجهرى يركب الارواق عند ظهورها فؤجيا ويصير الى نموها وأزهارها || مظهرها الخارجي حركات مجعرة طلاء اللون تركب نصل الارواق منذ ظهورها ثم تتحول الى وثاق سود تشبه الوراق وتبقى نموها ونمو أزهارها وأزهارها .

٢٤٧٥٨ - لَعْنُ تَامِي ٥

Sclerotinia sclerotium, S. libertiana, Sclerotium compactum, S. varium, S. brassicae (S). Pourriture des racines (F). Collar rot (E). Rapkrabe (D).

نظر مجهرى يركب معظم الانواع النباتية في غثلت اصفائها التربة والحواليات || مظهره حركات كالشجر صغيرة لينة تبدو بيشاء اللون ثم تتحول الى الزرقعة وتستقر على السمرة توشع سطح الاضواء المويضة أو تصيب السوق في مناطقها المكثية كما يحل في البطاطا والبنورة والتبغ . وهو حل كل حال لا يقرب الاضواء السليبة بل يركب القشور الخشونة ويصيب النبات في الخلل ولا يمتد في الجار والدرنات الخزونة || يكالغ بتطهير التربة بواسطة الفرمول أو الحامض الخلي أو الاملاح الزئبقية .

٢٤٧٤٩ - لَعْنَةُ

Chou (F).

هي الملفوف ، اغلب .

٢٤٧٥٠ - لَعْنَةُ ٥

Lachnea (S).

Lachnée (F). Lachnea (E).

جنس ظهور من فصيلة الخشاريات ودية الزيات . انواعه المعروفة قليلة العدد . تعيش مجموعات في الموائل الظليلة على المواد النباتية المنحلة . مجموعتها تمد من زوج الى ثلاثة أزواج . سوقها مجعرة . تكاعها قصية الشكل أو ترسية ، قطرها من ١ الى ٣ سم . قوتلها الخارجية مهدية الكشار لونها الى الصفار الاسمر الباهت أو الى الحمرة البرتقالية . صفتها الداخلية بيشاء اللون . وأغتها كرجية مستجيبة || اعرف انواعها واشهرها :

لَعْنَةُ ترسية ٥

Lachnea scutellata (S).

Lachnée en écusson (F).

لَعْنَةُ نصف دائرية ٥

Lachnea hemisphaerica (S).

Lachnée hémisphérique (F).

٢٤٧٥١ - لَعْنُوم * لَعْنُومِي

Lachnolaimus (S). Lachnolème (F).

جنس اسماك بحرية من شائكات الزعانف وفصيلة الكنيدات . انواعه المعروفة خمسة جميعها من اسماك حمار جزر الانتيل || اجسامها شبه احليلية الشكل ، كبيرة القد ، تطويز من ٧٠ الى ١١٠ سم . رؤوسها مخروطية . اشداقها متدلة الرحابة . زانفتها الظهرية والشرجية واللبيبية مجعرة بمناعس غسرية مستطيلة . افراسها ثنائية الالوان منها الاحمر والجلوي والاعضر والاسمر والاعضر البحري . ظهورها اعين لونا من بطونها || لحمها متوسطة الصنف مأكولة (Lachnolaimus) مستشاه نوع واحد يدعى لحوم كليي (Lachnolaimus) ثوبه الى الخضار الزبني . طوله نحو ١٠٠ سم .



لغْن نام



لَعْنَة ترسية



لَعْنَة نصف دائرية



لَعْنَم



لغْنِس الشَّرْقِ الادْنِ



لغْنِس الشَّخَرِي

صغيرة ، محرمة . ظواهرها كامل الحنجية ، شارب ، كسني الشباك . ووشاها غشائيات . بطنها صغير الحجم . قوائمها نشطة || مسرعا حراج السديان . قوتها نضع الازراق .



لُحْنِسُ نَرَج

٢٤٧٦٧ - لَدَائِيَات ٥ Lédridae, Scaridae (S).

Lédridae, Scaridae (F). Lédridae, Scaridae (E).

فصيلة حشرات من رتبة متجانسات الاجنحة وطبقة نصفيات الجناح . اجناسها وانواعها متوسطة العدد منتشرة في معظم اقطار البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها متوسطة القد أو صغيرة . رؤوسها ضخمة . اعطالها صغيرة . حيزها جانبية صغيرة . قرونها الاستعارية صغيرة ، ثلاثية الفصل الانشائية . كوسلها عريضة ، مزودة باطناف غشائية ، شفاة . بطنها صغيرة مبطنة . قوائمها نشطة ، والخلفية منها مستعرضة الاقطار المستندة كالشمار .

٢٤٧٦٨ - لَدَهَكَة ، لَسَمَكَة . Piqore (F). Prick (E).

هي المرة من اللدغ بالنم ومن اللس بالحقنة .

٢٤٧٦٩ - لَدِيد Côté (F). Side (E).

جانب المتق وجانب الوادي . اللديان : جانب الوادي وصفحا المتق دون الذاذين . ولدينا الشيء : ناحيته ج الله .

٢٤٧٧٠ - لَدَابَة سَوْدَاة ٥ Empis nigricans (S).

Empis noirâtre (F).

حشرة قانصة من فصيلة اللدائيات . جسمها خلي القشار ، كثيف الملب ، متوسط القد ، يطول من ٩ الى ١٢ م . ثوبها الى السرة السوداء يطولها في صدرها خسة خطوط سود . يطها شبه مخروطي الشكل ، خاسي الجهد . رأسها شبه مكور . خطها مستدل الطول . عيناها كيرتان ، متلاحتان عند الذكر ، مفترقتان عند الانثى . زباناها صغيران ، اسودان . قوائمها الى السرة السوداء || تسرح حيث تكثر الاعشاب . قصها اللهاب والحوام .

٢٤٧٧١ - لَدَابَة هِدَ بَابِيَة ٥

Empis muscaris (S). Empis gobe-mouches (F).

حشرة قانصة من فصيلة اللدائيات . جسمها خلي القشار ، وشي الشكل ، صغير القد ، يطول من ٤ الى ٩ م . ثوبها الى السرة الخفيفة . رأسها كبير الحجم ، شبه مكور الشكل . عيناها كيرتان ، متلاحتان عند الذكر ، فارتقتان عند الانثى ، لونها الى الحرة المرجانية . خطها مستدل الطول ، شديد التثبط . زباناها مربعان ، اشقران . صدرها اسطواني الشكل ، كثيف الجلد . بطنها خاسي السمك ، مردي الشكل . قوائمها حطية || قوتها اللهاب والحوام تقتنصها طائفة .

٢٤٧٧٢ - لَدَائِيَات ٥ Empididae (S).

Empididae, Empididae (F). Empididae (E).

فصيلة حشرات خائفة من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها كثيرة العدد ، منتشرة في جميع اصقاع العالم || اجسامها صغيرة ، مستطيلة الشكل ، خلية القشار أو محرقة ، مبرعة الملب . رؤوسها شبه مكورة . حيزها كبيرة . فائقة عند الاناث ، متلاحة عند الذكر . اعطالها دقيقة متباينة الاحجام والصلابة . المخادها

٥٠ سم . اوراقها لامعة يضيء الشكل . فصلها متبادح للتئين جميل الخضار . ازهارها ضمية التجميع محورية وعاية الانكازان كبيرة القدر قطرها يراوح من ٤ الى ٧ سم . لونها الى الحفرة القرميدية ونسها عاجية || ازهارها يستمر من حزيران الى آب .

٢٤٧٥٩ - لُحْنِسُ نَرَج * Lychnis viscaria (S).

Lychnide visqueuse, Trape-mouches (F).

نوع من اللحنيس البري وهو عشبة معمرة تكثر في المراعي . اوراقها لينة . ازهارها ابيضانية اللون .

٢٤٧٦٠ - لُحْنِسُ وَرْدِ السَاء Lychnis corollata (S).

Lychnide rose du ciel, L. facinosa, Coquelourde rose du ciel, Rose du ciel, Lamprette (F).

لوع من اللحنيس البري وهو عشبة حولية تملو من ٤٠ الى ٥٠ سم . ساقها وفروعها عادمة الزغب . اوراقها ضيقة جامدة النصل . ازهارها امحورية اللون مهدبة البتلات الكاملة . ازهارها يستمر من حزيران الى آب .

٢٤٧٦١ - لُحْنِسُ وَرْدِي * Lychnis flos-cuculi (S).

Lychnide fleur de coucou, Fleur de coucou, Ceillet des prés, Véronique des jardins (F).

نوع من اللحنيس وهو عشبة معمرة تملو من ٣٠ الى ٩٠ سم . اوراقها لامعة ، سنائية النصل ، بحرية اللون . ازهارها مكسية عديدة البتلات الراحية التشرع للوردية اللون || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

٢٤٧٦٢ - لُحْنِسِيَّات Lychnidae (F).

سبط من القرنفلينات ، اشهر اجناسه اللحنيس .

٢٤٧٦٣ - لُحْنِيَّات Cobitidae (S).

Cobitidae (F). Cobitidae (E).

فصيلة اسماك بحرية من رتبة مفتوسات المثانة لينات الزعانف . اجناسها وانواعها قليلة العدد ، كانت تتبع في التصنيف الماضي ، فصيلة الشبوطيات . اعطالها معظم انحر وحميرات البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها ضيقة ، مستطيلة ، متباينة الالوان . فلوها صغيرة ونحيلة . زعانفها الظهرية وحيدة تتوسط الظهر تقابلها الزعانف الخرسية من الجهة السفلى . وتتميز بكثرة عذباتها التي يراوح عددها من ١٠ الى ١٥ ورأسها البومية وبضيق خياشيمها ما يجعلها تزاود سطح الماء بكثرة لاستنشاق الهواء الطلق || اشهر اجناسها الخب .

٢٤٧٦٤ - لَدَاكَة Rhodopaxilla (F).

هو البلك ، فطر من فصيلة الفاريقريات ، اطلبه .

٢٤٧٦٥ - لَدَاكَة Malleabilité, Pliability (F).

Malleability, Pliability (E).

القابلية الى الانواء . وهي ايضا القابلية الى التصفيح في بعض المادان .

٢٤٧٦٦ - لَدَاكَة يَلْفَلْفَة Leda aurita (S).

Léda attentive (F).

حشرة من فصيلة الدريات . جسمها يطول من ١٤ الى ١٨ م . ثوبها الى الخفي المنمش بالكسني والاسمر . رأسها مستعرض ضخم . عيناها صغيرتان . زباناها قصيران ، ثلاثيا الفصل . كوسلها مزود باطناف شاربة . حجبها



لُحْنِسُ وَرْدِي

من ٢٠ الى ٢٥ م. يستخرج من جذعها بالخز عصاره صمغية ولاتنجية تعرف بالبخور المادي. اوراقها حادة الحرف المسنن. لونها الى اخضر الازرق المائل. ثمارها كروية الشكل جلوية اللون، طريفا يروح من ١٢ الى ١٥ سم. وعرضها من ٨ الى ١٠، احشائها صناعية جيدة الصنف.

٢٤٧٧٩ - لَزَان ، لَزَان * سِيْسُوس

Cytisus (S), Cytisus (F), Broom (E), Kleastrauch (D), Citiso, Avornello (I).

جنس جنبات برية وتربيتية من فصيلة الفريثيات الفرشية. انواعه نحو ٣٠ معظمها من نباتات حوض البحر المتوسط. اوراقها مركبة ثلاثية الوريقات. ازهارها عقدية جالسة او متدلية يعلب فيها اللون الاصفر. ثمارها سنطية. يزورها عسدية الشكل تحوي بعض المواد المتصهرة الجعالية، ذيلها شديد الغمالية. احرف انواعه واشهرها ما يتبع.

٢٤٧٨٠ - لَزَان اَبْيَس

Cytisus albidus (S).

Cytisus blancheâtre (F).

نوع من اللزان البري والتربيتي. مجلته فراءه ثناء متدنة تملو نحو ٥٠ سم. فروصها واغنائها شاككة الاطراف. اوراقها مركبة صغيرة الوريقات المنقطة. ازهارها بيضاء اللون. ازهاره يستمر من حزيران الى تموز.

٢٤٧٨١ - لَزَان اَرْجَوَانِي *

Cytisus purpureus (S).

Cytisus à fleurs pourpres (F).

نوع من اللزان البري والتربيتي. جنينه تملو نحو ١٠٠ سم. اوراقها منقطة. وريقاتها اعليجية النصل مائلة البشرة. ازهارها ارجوانية اللون فردية التجميع المحوري والطرفي. ازهاره يستمر من ايار الى كيب.

٢٤٧٨٢ - لَزَان عَطِيطِي الرَّزِي

Cytisus linifolius (S), Cytisus à feuilles linéaires (F).

نوع من اللزان البري المجلول. مجلته تملو من ٣٠ الى ٥٠ سم. وريقاتها لاطنة غشبية خالية البشرة تطول نحو ٣ سم. وتعرض من ٢ الى ٣ سم. ازهارها كثيفة التجميع طرفية الزنكاز صغيرة القند صفراء اللون. ازهاره يستمر من آذار الى ايار.

٢٤٧٨٣ - لَزَان سَبِيلِي *

Cytisus nigricans (S).

Cytisus en épis (F).

نوع من اللزان البري والتربيتي. جنينه تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. ساقها فراءه زبا، زغبها اصفر اللون. اوراقها منقطة. وريقاتها سنائية النصل تطول نحو ٢٠ سم. وتعرض نحو ٨. ازهارها سنطية متدلية تملو من ١٥ الى ٢٠ سم. لونها الى الصفرة الزاهية. ازهاره يستمر طوال شهر حزيران.

٢٤٧٨٤ - لَزَان كَنْتَارِيَّة

Cytisus canariensis (S).

Cytisus des Canaries (F).

نوع من اللزان البري والتربيتي. مجلته صغيرة القند متدنة. ساقها فراءه ثناء. وريقاتها بيضبة النصل تطول نحو ٧ سم. ازهارها طرفية صفراء اللون مستحبة الحرف. ازهاره يستمر من حزيران الى آب.

٢٤٧٨٥ - لَزَان مَدِينِي *

Cytisus maderensis (S).

Cytisus de Madère (F).

نوع من اللزان البري والتربيتي. جنينه تملو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم. اوراقها منقطة. وريقاتها اعليجية النصل تطول من ٢ الى ٣٥ سم. وتعرض من ١٠ الى ١٥.

وظايبها منخسبة حادة بمجزة الخلف. الجهاز التناسلي عنه الاكوار خارجي الزنكاز. اناثها اكبر قدماً من ذكورها. تجمع مكثا في التربة وفي جنوح الاشجار النخرة. يرقاها دودية، شبه اسطوانية، خامية السم، شاككة الحيد. رؤوسها صغيرة قاسحة. تكثيرها ذرية. جميعها دامت او وانجة تعيش في التربة او في جنوح الاشجار النخرة، وبعضها قازب يسرح في ابحال واولال المناقع ويحاري الماء.

٢٤٧٧٣ - لَدَاج *

Hémaphysage (F).

Hematophagous (E).

نمت تعريفي يطلق على كل حيوان يقتل الدم او قوته الدم.

٢٤٧٧٤ - لَزْدِيَزَال

جنس نباتات زراعية ليفة عارشة مسرة من فصيلة اللوزيات. مهمها امريكة الجنوبية. لها ثومان لوزيزال الشلي ولوزيزال البري. اوراقها متعاقبة. ازهارها بتفسجية مابقة. ثمارها لحمية غشوية تستحق اللون مأكولة يصورها في بلاد الفيل (كوفيل).

٢٤٧٧٥ - لَزْدِيَزَالِيَّات *

Lardizabalea (S).

Lardizabaleae (E).

فصيلة نباتات ثنائية الفلقة مستقلة القمالة مرتفعة المبيض، قريبة الشبه من البربريسيات والقمريرات. تتميز بنباتها الوسيد المسكن والبوروشة. اجتمها وانواعها عديدة معظمها من نباتات البلاد الامريكية. اشهرها اللوزيزال والابيض.

٢٤٧٧٦ - لَرْمُوس * ، لَرْمُوس *

Larimus (S).

Larime (F).

جنس اسماك بحرية من شاككات الزمانف وفصيلة البهاريات. انواعه المعروفة ثلاثة اصطناعها بحار البلاد الحارة. اجسامها اعليجية الشكل معتدلة التيطيط تطول من ٢٥ الى ٣٥ سم. رؤوسها كبيرة، قصيرة الاعظام، رسية الاشداق. عيونها كبيرة جاسحة. زعانفها الظهرية مستطيلة، ثنائية التركيب. زعانفها الذيلية مزوانية. اثوابها الى الرتبة القفصية تقيم في الظهور ويملوها تسليج اسيد يمتد الى ما يقارب ثلثي الاطاول. يطونها الى الشبهة القفصية الشديدة القمان. اجسامها جيدة الصنف، مرقوب بها.

٢٤٧٧٧ - لَرْمُوس *

Larimus (S).

Larin (F).

جنس شحرات خاضعة من مخدات الاجنحة وفصيلة السويات. انواعه المعروفة عديدة اصطناعها المناطق الحارة والمعتدلة الحارة من العالم القديم. تألف البراري التي تكثر فيها المهرشات احصها الاقنوس. اجسامها شبه بيضبة الشكل، صغيرة القند، مستقلة المقدم والمؤخر. قرونها الاستعمارية مرفقة، دويبة الاطراف. كولسها واغدادها ملحقة بقشاه من الطيلس الاصعب الين. ازوارها متباينة الالوان والاشكال الهندسية تكثر فيها السرة والطلحة.

٢٤٧٧٨ - لَزَاب * ، عَوْقَر زَبِيع

Juniperus excelsa (S).

Génévrier de Tauride, G. en arbre (F).

Greek juniper (E).

Moher Wacholder (D).

Ginepro di Crimea (I).

نوع من المرمر اصطناعه تمتد من البلقان الى حلايا. يكثر وجوده في بعض جرد لبنان. ثمرته كبيرة القند تملو



لرموس



لزاب



لزان ارجواني



لزان سنيلي

Neritidae (S).

٢٤٧٩٦ - لَزَنِيَّات

Nérítidae (F). Neritidae (E).

فضيلة حلازين من الرخويات المذليات . اجناسها وانواعها عديدة معظمها بحري وبعضها بحري ونهرى .

Homophylle (F).

٢٤٧٩٧ - لَزِيم

Homophylous (E).

نمت ترميتي يطلق كل كل نبات سائل الأوراق المتشابهة.

Lasioderme (F).

٢٤٧٩٨ - لَزِيدِرْمَة

هي الثفيرة ، اطليا .

Lasiostroma (S).

٢٤٧٩٩ - لَزِيُوسْتْرُومَة

جنس فطور مجهرية من فصيلة الصنفيات . ونبته نصف كروية تنشأ ضمن النسيج المشام ثم تنبثق الى سطحها . بكتينها كروية الشكل ، نخلة اللق . يوفاته يضيئة او مرقية || له نوع واحد يعي لزيوسترية الاجاص (Lasiostroma pisorum) يركب ثمار الاجاص المحفوظة ، عند ارتفاع الحرارة ، فيقرصها ويطنها .

Déprimage (F).

٢٤٨٠٠ - لَسْ

رعي المثالية اول نبات المرج .

٢٤٨٠١ - لَسَّاس

المشب ما دام صغيراً لا تستمكن منه الرماية .

٢٤٨٠٢ - لَسَّاس

الساس شبة عشة كلان الثور وليست به ، (المهيل) .

Lange (F). Tongue (E).

٢٤٨٠٣ - لِسَان

عضو فصيل متحرك الجسم ، ثابت القاعدة ، مركزه الفم . وظيفته المصغ والمص والبلع وتكييف الصوت .

٢٤٨٠٤ - لِسَان

سمكة تسمى اللسان ، اطليا .

٢٤٨٠٥ - لِسَان

« شبة من الجنية لها ورق متفرش اعشن كانه المساحي يسو من وسطها قضيب كالفرع طولاً في رأسه ثورة كعلاء » (اللسان) .

Potamot (F).

٢٤٨٠٦ - لِسَانُ الْبَحْرِ

نبات يعي جدار النهر ، اطليا .

٢٤٨٠٧ - لِسَانُ الْفَحْل

« نبات كثير الفروع مربع طويل الاوراق فيه عشوة » (ابو حنيفة) .

٢٤٨٠٨ - لِسَانُ الثَّوْرِ الْحَمَلِيِّ

Buglossae officinale (F).

هو الانشودة الحزنية ، اطليا .

٢٤٨٠٩ - لِسَانُ الْحَمَلِ (S). Plantain (F).

جنس نباتات عشية برية من فصيلة الحلييات . انواعها نحو ٥٠ منها الحولية والمعمرة جميعها مقرة . اوراقها قرصية الانتشاب متعقة او لاطة . انجازها سلبية التجميع يحملها غمراخ مصمت دقيق || اكثر انواعه من الاغشاب الطبية تنفع من السعال والربو وتقتل الهم وقروح الفم واللثة

انجازها طرية التجميع صفراء اللون || انجازها يستمر طوال فصل الشتاء .

Cyclus purgans (S).

٢٤٧٩٦ - لَزَن مُسْهِل

Cyclis purgatif (F).

نوع من الزان الطلي البري المينول . يملك ثلث ٣٠ الى ٦٠ سم . اوراقها لاطة بسيطة ، نصلها لسن الصفحة البحرية اللون . انجازها الى الصفرة . يزورها وجوزها مسلة || انجازها يستمر من ايار الى تموز .

٢٤٧٩٧ - لَزِيْمَة

هي الذبابة القانصة ، اطليا .

Visqueux (F). Viscous (E).

٢٤٧٩٨ - لَزِيْم

ما به لزوج اي تخط وتعد ويدك يعلق باليد ونحوها .

Viscosité (F).

٢٤٧٩٩ - لَزُوْمَة ، لَصْرُق

Viscosity (E).

Emplâtre (F). Plaster (E).

٢٤٧٩٠ - لَزُوْمَة

دواء يلزم الجرح او الصدغ حتى يبرأ .

Luzula (S).

٢٤٧٩١ - لَزُوْمَة *

Luzule (F). Wood-rush, Cuckoo grass (E). Hasenbrotmarbel, Marbel (D). Luzula, Luziola, Glunco peloso, G. secco (I).

جنس نباتات عشية برية مرعوية علفية معمرة من فصيلة الاسمايات . انواعها المعروفة ٣٥ ، اصطناعها البلاد الممتدة الحرارة من المابين القديم والجديد . جذورها مدادة . سوقها فردية متشعبة . اوراقها متعاقبة عصفية ، نصلها خلى البثرة . مهدب الحافة ، غير المواج . انجازها حثولية التجميع ، طرية الانتكاز . ثمارها حبة . تستعمل لتثبيت الأراضي الجبلية المنحدرة التي يخشى عليها من انجراف التربة .

٢٤٧٩٢ - لَزِيْن *

Falco erythropus (S).

Kobez (F). Red-legged falcon (E).

جنس طير من عمارة الصقور وفصيلة الصقريات . انواعه قليلة جميعها من القواطع التي تجوب البلاد في طلب الفصيف والشي . عدد افراد سربها يراوح من ٥٠ الى ١٠٠ وهي صغيرة القدر ريمه القامة طولاً يراوح من ٣٠ الى ٣٢ سم . انواها نمر . مناسرها وجفون حبيبا وسيفاتها الى الحمرة . ذكورها سمر الرووس والاحتاق والصدور . اناتها حمر الرووس والصدور || قوتها الحشرات حل اختلاف انواعها واشكالها . تدفن في الانجار العالمية . اناتها تضع من ٤ الى ٩ فنان تحضنها اربعة اسابيع || احرف انواعها ما يلي .

٢٤٧٩٣ - لَزِيْنُ الْشَرْق

Falco erythropus amurantis (S). Kobez vaspéral (F).

نوع من اللززين يحوم الشرق حتى روسيا ويمتدح خة شهور في الحظيرة او مصر والسودان حيث يدفن ولكنه ويبعض .

٢٤٧٩٤ - لَزِيْنُ الْهَرَب

Falco erythropus vaspertinus (S). Kobez vaspéral (F).

نوع من اللززين يحوم آسيه الصغرى واروبه ويمتدح نحو خمسة شهور بين جبال الاطلس والسنتال حيث يدفن ولكنه ويبعض .

Nerita (S).

٢٤٧٩٥ - لَزِيْمَة *

Nérític (F). Nerita (E).

جنس حلازين بحرية من اللزبيات . انواعها المعروفة نحو ٢٠٠ جميعها قبيية الشكل مطنها بحار وشواطئ البلاد الحارة .



لزنة



لزنيق



لزيفة

٢٤٨١٧ - **لسان العصفور الحبلي**
Cérinthe retournée (F). هو السرتة المغلوقة ، اطبله .

٢٤٨١٨ - **لسان العصفور الصغير**
Cérinthe petica (F). هو السرتة الصغيرة ، اطبله .

٢٤٨١٩ - **لسان العصفور المُرّ**

يمرّ باسم حلق ، اطبله .

٢٤٨٢٠ - **لسان الفَرْزَال** *
Botrychium (S).
Botryche, Botrychie, Botrychion (F). Moon-fern, Moonwort (E). Echte Mondraute (D). Lunaria del grappolo, Sferia cavallo (I).

جنس نباتات عشبية من السراخس . انزاعه نحو ٢٠ اعطائها البلاد الباردة والمعتدلة . تعيش في المواقع الرطبة . تتميز باكياس يوفها السبيلية التجميع الباعدة الفتوح .

٢٤٨٢١ - **لسان الفَرْزَس**
Langue de cheval (F). هو السقتر اللسن ، اطبله .

٢٤٨٢٢ - **لسان الكتب *** ، **أَذَان الأَرْتَب** ،
أَذْن الفَرْزَال
Cynoglossum (S).

Cynoglossa, Langue de chien (F). Gipsy flower, Hound's tongue (E). Echte Hundszunge (D). Cinoglossa, Lingua di cane, Erba vellutina (I).

بجلة برية معمورة من فصيلة الحمحميات . ساقها زياه تملو من ٣٠ الى ٦٠ سم . اوراقها معتقة لسنة . تصلها ذرب الزمان الاخير ، حلي البشرة على صفحتها . انزاعها عذوقية التجميع ، مستجوبة اللون ، بيض الحدار || يقال ان جميع اجزائها طيبة قابضة تنفع الانهال والمفص . انزاعها يستمر من حزيران الى تموز .

٢٤٨٢٣ - **لسان الزَمْكَار** هو الكلم ، اطبله .
هو الكلم ، اطبله . يطلق ايضاً على اللهاة .

٢٤٨٢٤ - **لسان الوَحْل**
Langue de cerf (F). هو السرخس الحزني من النباتات الطيبة ، اطبله .

٢٤٨٢٥ - **ليستوس أزرق ***
Leistus caeruleus (S).
Léiste bleu (F). Leistus caeruleus (E).

حشرة قابضة من فصيلة التيريديات وربة عذبات الاجنحة تألف الاجراج الظليلة والمواقع الرطبة والجانان والحدائق . خنافسها وورقاتها تعيش على ما تقتنصه من حشرات وهوام || جسمها صغير اللثة يطول نحو ١٠ سم . ثوبها الى الزرقة الجميلة رأسها صغير الجرم . تكاها ذربان . زيانها عظيمان مستطيلان . عينها صغيرتان بارزتان . ظفورها متوسط الاحدياب ، مستدير الطرف اللانف ، ثماني التحزيز الغندي . ارساغها خماسية المثلث || الاثنى اسفر قدماً من الذكر وابنت ثوباً منه واقصر زياناً || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملة في اواسط الربيع وتعيش حتى اواسط الخريف . تسرح في النهار . تساهل في الليل . تتجمع المكن تحت الجفالة والطحالب والعليل || البرقة عنه تمام ادراكها تطول نحو ١٦ سم . جسمها اسطواني الشكل ، مداسي درواجب . ثوبها الى السمرة ، رأسها وشرجها ودواجيبها الى السواد الفحمي || طور الاكمال الذي يستمر نحو ٥٥ يوماً ينقضي في بيض عودوي النور تحفر البرقة على عمق ٥ او ٦ سم .

والنمط والكل وسرعة البول والنفث شرباً والاورام ملاء والقروح عباداً ، وتمنع المرح وذاك القيل || اشهر انزاعه ما يلي .

٢٤٨١٠ - **لسان الحمل السباني *** ، **أَذَان الكبش**
Plantago lanceolata (S). Plantain lanceolé, Oreille de lièvre (F). Great hen plant, Rib-grass, Ribwort (E). Sotzweigerich (D). Plantagine lanceolata, Lingue o botta (I).

نوع من لسان الحمل الطبي المألوف . اوراقه سنانية لسنة . انزاعه الى الياباس الجيبي . مناقه الطيبة عديدة كمنافع رفاقه .

٢٤٨١١ - **لسان الحمل القَرْيَبي *** ، **قَرْن الأَيْل**
Plantago coronopus (S). Plantain corne de cerf, Coronopa (F). Buck's-horn plantain, Star of the earth (E). Hirschwegerich (D). Plantagine corno di cervo, Minutina (I).

نوع من لسان الحمل الطبي المألوف ، اوراقه سنانية مستطيلة مطقة الحدار او منقطة . انزاعه الى الصفرة الباهتة . مناقه الطيبة منافع رفاقه الا ان مادته المنصرية اقل فعالية .

٢٤٨١٢ - **لسان الحمل الكبير *** ، **لسان حمدة** ،
لسان الكتب ، **مَصَّاصَة**

Plantago major (S). Plantain majeur, P. des oiseaux, Grand plantain (F). Greater plantain, Waybread (E). Grosser Wegerich (D). Plantagine maggiore, Arnoglossa, Pentaervi (I).

نوع من لسان الحمل وهو المألوف في المواقع الرطبة . اوراقه يفضية التصل ، مقنطرة القاطعة ، مستطيلة المدق ، بحرية الخشار . انزاعه الى الصفار الاخير . يزوره دقيقة ترغ فيها المصابير . وهو من النباتات الطيبة ، اوراقه الخضراء تعيد في التزيف والحروق والكدمات والحمره . تقطير قه الزعرية ينفع اللين . وصميره خلائص الحرارة ملطف الحوضه مفاد تلغ الهوام والحشرات .

٢٤٨١٣ - **لسان الحمل المتوسط *** ، **مَصَّاصَة صَغِيرَة**

Plantago media (S).
Plantain moyen, P. bätard (F). Lamb's tongue, Hoary plantain (E). Mittlerer Wegerich (D). Plantagine mezzana (I).

نوع من لسان الحمل الطبي المألوف ، انزاعه ودية اللون . اوراقه قابضة مجففة تضمد بها الجراح المزمنة والحية . واذا اكلت مطبوخة مثل ويلع اثنات في قرصة الاسماء والانهال المزمن . والمضغطة بعلي اوراقه تشفي قروح الفم واللثة الدامية . واحساح حصيره في صلبه يشفي قروح الرسم والروبووات التي تسيل منه » (الانطاي) .

٢٤٨١٤ - **لسان الحية *** ، **لُكِيَّة**

Ophoglossum (S). Ophoglossa, Herbe sans couture, Langue de serpent (F). Adder's tongue, Adder's spear fern (E). Echte Natterzunge (D). Lingua serpentina, Luccia, Erba senza nervi (I).

نبات عشبي طبي بري ممر من السراخس ، صغير اللثة يطول نحو ٣٥ سم . اوراقه حادة المروك . يتكرر في المناطق والمواقع الرطبة . جلوره طيبة تظم الجروح ورفيد الكبح .

٢٤٨١٥ - **لسان الصبّ** هو شوك فرياس ، اطبله .

٢٤٨١٦ - **لسان العصفور**

اسم شائع لا يجوز امثاله لانه يطلق حل عدة نباتات مختلفة انصها الدردار والمران والماتق والسرتة .



لسان الحمل السباني



لسان الحمل الكبير



لسان الفَرْزَس

لسان الحية



لسان الكتب



ليستوس أزرق

الاستوائية || نباتاتنا اثمار وحبيرات . اورثاقها ابيدة ، متعاقبة متعقة ، قلبية النصال . ازهارها سبليل الجميع . ازهارها خماسية البتلات ، عديدة الالوان ، جميلة الالوان الزاهية . ثمارها نورية || اشهر اجناسها السيتيم .

٢٤٨٣٤ - **لُسَيْتِيَّة** هي العلوك القرني ، الحله .

٢٤٨٣٥ - **لُسَيْن** Ligule (F). Ligula (E).
هنة في ورق التيجليات بين فصل العصفه ونحوها .

٢٤٨٣٦ - **لُسَيْن** Actinella (S). Actinelle (F).
جنس نباتات عشبية طيبة من فصيلة المركبات . انواعها عديدة جميعها حرة الرائحة مرة الطعم . اورثاقها لا قياسية الترتيب والتجميع منها المتعاقبة والفسيحة والجالية . ازهارها صفراء اللون رؤسيتها الزهرية عديدة اللبنيات ، تحترق عريانة . بزورها مذبة الشلور || احرف انواعها واشهرها ما يتبع .

٢٤٨٣٧ - **لُسَيْتِيَّة** Lingula (S). Lingule (F). Lingula (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفديات الاربيل وفصيلة السيتينات . انواعها المعاصرة المعروفة قليلة العدد تعيش لاصقة بالصخور المعنورة وبالنباتات البحرية || اصداقها متساوية المصارع ، يفيضة اللون ، مستطيلة بسيطة ، مقطوعة الرأس ، مذبة القلب . مفصلاتها عادية اللتبين . لورثاقها كثيفة الحلب الناعم اللين .

٢٤٨٣٨ - **لُسَيْتِيَّة حَطْبِيَّة الزَوْج** Actinella linearifolia (S). Actinelle à feuilles linéaires (F).
نوع من اللبين المحول . ساقها مزخرفة فراء تملو من ١٥ الى ٤٠ سم . اورثاقها بسيطة خطية النصل . رؤسيتها الزهرية صغيرة القد تحمل عشر لبنيات اهليجية الشكل . تنورها يستمر من ايار الى ايلول .

٢٤٨٣٩ - **لُسَيْتِيَّة كَبِيرَة الزَهَر** Actinella grandiflora (S). Actinelle à grandes fleurs (F).
نوع من اللبين المحمر . ساقها مزخرفة اللحاء متعقبة تملو من ١٥ الى ٢٠ سم . اورثاقها ريشية شمرة . رؤسيتها الزهرية كبيرة القد ، يراوح قطرها من ٨ الى ٨ سم || تنورها يستمر طوال فصل الصيف .

٢٤٨٤٠ - **لُسَيْتِيَّة تَجْمِيَّة** Actinella scaposa (S). Actinelle aculea (F).
نوع من اللبين الملمع الباهم الساق . اورثاقها جذعية الانكاز ، ضيقة الجميع ، مساوية النصل . رؤسيتها الزهرية مستطيلة اللبنيات المنفصلة الى الحجاج || تنورها يستمر من ايار الى تشرين .

٢٤٨٤١ - **لُسَيْتِيَّات** Lingulaceae (F). Lingulés (F). Lingulaceae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفديات الاربيل اللاصقة . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة ، معظمها من متحجرات الاحقاب القديمة ، جميعها بسيطة كالسان ملتصقة باصداقها يسوقات طيبة مستطيلة قابلة الانعاط || اشهر اجناسها واغربها السيتية .



لُسُون



لَبِي

٢٤٨٣٩ - **لُسَيْتِيَّة** Lasthenia (S). Lathénie (F).
جنس نباتات عشبية حولية من فصيلة المركبات . انواعها المعروفة قليلة . سوقها فراء تملو من ٢٠ الى ٥٠ سم . اورثاقها متعاقبة سنانية النصل . ازهارها رؤسية الجميع . قنابات قناباتها ملتصقة تشكل اقفاً احلها حولة من ١٥ سن . ازهارها مختلفة الالوان يكثر فيها الاصفر . تنورها يستمر من حزيران الى ايلول .

٢٤٨٣٧ - **لَسَد** Téter (F). To suck (E).
رفع . يقال لسد الظل انه ولعنا : رفع جميع ما في فمها .

٢٤٨٣٨ - **لَسَعَة** راجع لدغة .

٢٤٨٣٩ - **لُسُونِيَّات** Licina (S). Licine (F). Licinus (E).
جنس خنافس جاسة مفترسة من غدييات الاجنحة وفصيلة السنويات . انواعها المعروفة ١٢ موطنها حوض البحر الابيض المتوسط || اجناسها تطول من ١٢ الى ١٨ سم . يكثر فيها الشكل الاهليجي . احداها لافحة ، مخددة وعجيبة . اثارها الى السواد الفضي او الكسني الاسمر الاسبق || تعيش تحت الحجارة او في افاق تحلها قرب جلود النبات . تسرح من اواسط الربيع الى اواسط الخريف . قوتها كل ما تستطيع قتله من دويبات ويرقات وديدان .

٢٤٨٤٠ - **لُسُونِيَّات** Licinidae (S). Licinidés (F). Licinidae (E).
فصيلة خنافس جاسة مفترسة من غدييات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة اصلاها معظم مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة او متوسطة القد ، شبه اهليجية الشكل . رؤسها مخددة . قوتها الانتشارية مركبة من ١١ فصلة . احداها لافحة . قوتها نشطة . من ميزاتها ان ازهارا لاصدة وغالباً مشرورة . جوارسها ثنائية الفلق المخمصة . تكثيرها قصيرة وشقيقة . ملاسها الشفوية جزلة || اشهر اجناسها اللسوس .

٢٤٨٤١ - **لُسُونِيَّات** Phaneroglossae (S). Phanéroglossae (F). Phanéroglossa (E).
مرتبة حيوانات من رتبة البتر ، عديمات الذنب ، تشتمل على اثنين وعشر فصائل || جميع حيواناتها من مختلف الفصائل والاجناس تشتمل بوجود الالبان || لها اعضاء عيشيات والوكسيتيات .

٢٤٨٤٢ - **لُسَيْتِيَّات** Lacistema (S). Lacistème (F).
جنس نباتات حرجية من فصيلة السيتيمات . انواعها المعروفة ١٥ اصلاها امريكية الاستوائية . جميعها اثمار وحبيرات . سوقها متعقبة فراء . اورثاقها ابيدة ، متعاقبة ، متعقة ، جامدة النصال القلبية الشكل . ازهارها متبلل الجميع ، طري الانكاز وصوري . ازهارها صغيرة ، يكثر فيها اللون الاصفر . ثمارها نورية لا تكوكل انما يصفرح منها صباغ اخر شائع الاستعمال الهلي .

٢٤٨٤٣ - **لُسَيْتِيَّات** Lacistomaceae (S). Lacistomacées (F). Lacistomaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد . اصلاها بعض مناطق امريكية

انيلابها فتبدو زاهية اللون شفافة ثم خضراء زيتونية وتنتهي باللون الاسمر . أما الثآليل المصابة فتبدو كأنها موشمة بتدو لا قياسية الشكل والحجم تحضفها الزئان مختلفة قبل ان تستقر على الاسمر الذي يمتد الخلف مع الادراك .

٢٤٨٥٣ - لُصْفُ الْعَلَقِ ، لُصْفُ الْمَوْسَجِ

Echino veneta, *Plectodiscella veneta*, *Gloeosporium venetum*, *G. necator*, *Phyllosticta rosarum* (S). *Anthracoze du framboisier*, *A. des ronces* (F).
وصم يصيب الموصج والعلق في الفروع والأوراق والثآليل فتبدو رديقة بها الاضرار . سببه فطر مجهري من الفطريات . مظهره الخارجي يقع حراء اللون او بنفسجية ، ظهرها من ٣ الى ٥ سم . تركيب الأوراق فتتطيرها وتركيب الفروع فتشبهها ، أما الثآليل فيصيرها || يكافح باستعمال سائل بورديو المخلول ١٪ في اوائل الربيع .

٢٤٨٥٤ - لُصْفُ

Cateplasma هي البقعة توضع على مكان الألم من الجسم .

٢٤٨٥٥ - لُصُوفُ

Gloeosporium (S). جنس فطور مجهرية من فصيلة الرغيفيات . انواعه عديدة معظمها مؤلف || مشبه ينمو تحت الطبقة الادمية حيث ينتشر في اللون ثم يتوسع ويصل الى وليمية تقوم عليها الكتانة . قصباته قرصية او سرغولية . يورفاته وسيدة الخلية ، شفافة ، مستطيلة ، مستقيمة او منعققة || وصم متفاوت الاضرار والأذى يمتري الأوراق والثآليل والانتفاخ || اعرف انواعه ما يتبع .

٢٤٨٥٦ - لُصُوفُ الْإِسْبَاحِ

Gloeosporium spinaciae (S). فطر مجهري 'تركيب أوراق الإسباح فيوشها ببعض البقع المستديرة المتلاصقة السوداء اللون التي تشبهها وتبدو من قيسها التجارية || يكافح باستعمال احد مركبات النحاس .

٢٤٨٥٧ - لُصُوفُ الْبَيْنِ

Gloeosporium coffeanum (S). فطر مجهري تركيب أوراق البن فيلونها ويصيب الاذنان فيقرحها || مظهره على الأوراق قطع حطية اللون مستطيلة تركيب حافة التصل فتتضي على خلايا النسج الادمية . وهو على الاذنان قروح مستطيلة سمراء اللون تنقلب للماء وتنبها || يكافح بالقطاع الاضواء الموضوعة وينضج الاثمار عدة مرات ببعض الوسائل المركزة على املاح النحاس .

٢٤٨٥٨ - لُصُوفُ الْبَنْدُورَةِ

Gloeosporium phomoides (S). فطر مجهري تركيب ثمار البندورة عند اقترابها من الادراك . يبدو كالبقع الحطية او السمراء اللون يسببها مشج الفطر الذي ينتشر في الطبقة الادمية وتتسع معه البقع السطحية حتى الصداها الذي يعقبه شيء من الحريان || يكافح باستعمال احد الفوطير المركزة على الكبريت والنحاس .

٢٤٨٥٩ - لُصُوفُ الْجُوزِ

Gloeosporium epicarpi (S). فطر مجهري يصيب لباب الجوز فيطيه . مظهره الخارجي يقع مستديرة او يضيبة الشكل طلعاء اللون سمراء الهاء تركيب لباب الشرة . فان حصلت الإصابة في اثناء النمو اطاحت بالثمرة وان رقت ثمرة الادراك سبت حفن اللباب || اضراره غالباً محدودة لا تستوجب مكافحة لانها لا تفوق ٣ او ٥٪ .

٢٤٨٥٩ - لُصْفِيَّةُ الزَّرْعَر

Liguliflores (F). فطر من فصيلة المركبات .

٢٤٨٥٩ - لُصْفُ

اللس هو السباق او ثوره .

٢٤٨٥٩ - لُصْفُ

Echenels (S). *Echénide, Remora* (F). Sucking fish, *Remora* (E). جنس اسماك بحرية من شالكانات الزعانيف وفصيلة الكشكانات . انواعه نحو ١٠ اجسامها مستدقة ، طولها يراوح من ٢٩ الى ٣٢ سم . تتميز برووسها المكلفة بمجسات يضيبة الشكل مغطاة شائعة تمكها من الالتصاق بالاسماك والاشياء التي تريد احاطتها . وهي تلتصق بالحويت والبال والدلفين والجمجمة والبلواسخ .

٢٤٨٥٩ - لُصْفُ ، لُصْفُ

Homochromie (F). *Procrapsis* (E).

خاصة تتميز بها بعض الكائنات الحية من حيوان ونبات ، تمكها من الاختصاص بلون الاشياء التي تحيط بها .

٢٤٨٥٩ - لُصْفُ

Oxyria (S). *Oxyria* (E).

جنس نباتات عشبية برية ممررة من فصيلة الطبايطات . منها جبال حوض البحر الابيض المتوسط .

٢٤٨٥٩ - لُصْفِيَّةُ

Lachensalie (F). هي الزيجيل من الزنايق ، اطليه .

٢٤٨٥٩ - لُصْفُ

Zygotene (F). *Zygoten* (E). دور التطور الميزوي الذي يتميز بتلاصق النصب المتلاعبة .

٢٤٨٥٩ - لُصْفُ

Fluorescence (F). خاصة تمك بعض الاجسام من تحويل الاشعة الضوئية التي تنقلها الى اشعة ضوئية اطول موجة .

٢٤٨٥٩ - لُصْفُ

Clapier commun (F). هو الكبر الشائك وهو ثمر الكبر .

٢٤٨٥٩ - لُصْفُ الثَّمَارِ وَالْإِجْاصِ

Elsinoe piri, *Plectodiscella piri*, *Sphaceloma*, *Phyllosticta rosarum* (S). *Anthracoze du pommier et du poirier* (F).

وصم يصيب الثمار والاجاص والسفرجل في الاذنان والأوراق والثآليل . سببه فطر مجهري من الفطريات || مظهره الخارجي يقع صغيرة كثيرة العدد مشورة بدون ترتيب على فصل الأوراق وطلة الاذنان ويشرة الثآليل . وعده البقع التي يبلغ قطر الواحدة منها نحو المليمتر الواحد تبدو كسطوات متشعبة حراء اللون توضعها نقطة يضاء || يكافح باستعمال احد الفوطير المناسبة .

٢٤٨٥٩ - لُصْفُ الْحُمْصِيَّاتِ

Elsinoe fawcetti, *Sphaceloma fawcetti*, *Sporotrichum citri*, *Cladosporium citri*, *Sphacelia citri* (S). *Scab des agrumes*, *Maladie des verrues* (F).

وصم يصيب اكثر انواع الحمصيات في اثنائها واوراقها وثمارها . سببه فطر مجهري يمش ويكاثّر على النروي الغنية عندما يكون معدل الحرارة نحو ٢٠ درجة ستيفراد . لذلك فهو نادر الجريد في القلم حوض البحر المتوسط . مظهره الخارجي يقع صغيرة تظهر فصل الأوراق الغنية عند



لسك



لصف الثمار والاجاص



لصف الحمصيات



لصف البندورة

٢٤٨٦٥ - نُصُوفُ الطَّطَاو

Glucosporium albobructum (S). Anthracnose de l'hévéa (F).



نُصُوفُ الزَّيْتُون

٢٤٨٦٦ - نُصُوفُ الزَّيْتُون *

Glucosporium olivarum (S). Lèpre des olives, Galla (F).

فطر مجهرى يظهر في آب ويبلغ أوج انتشاره في أواخر أيلول، يركب الثآليل فيشوها ويصطبها || مظهره الخارجي بقع مستديرة تركب غلاف الثمرة فتسبب انغراس السطح ثم الصلاح البشرة وغيرها مادة لزجة يرتفألى تنصرف إلى السمرة مع الرطوبة || يكافح باستعمال أحد المبيدات الحماكية.

٢٤٨٦٦ - نُصُوفُ القُرَيْيَات *

Glucosporium caulivorum (S). Anthracnose des légumineuses (F).

فطر مجهرى واسع الانتشار يصيب بعض نباتات الفصيلة القرنية، أخصها النفل والبرسيم والقمصة والعرن || يركب السوق ومعايق الأوراق فيوشها بنقع حطية ثم سمراء اللون تصدع البشرة بمد ارتفاع التسقيج وانفلاكه || يكافح بتطهير البذار بمحلول سلفات النحاس المركز ١ ٪ بمد تغيير موقع الزراعة.

٢٤٨٦٧ - نُصُوفُ الكَرْمَةِ * ، سُودِيدُ الكَرْمُون

Glucosporium ampelophagum (S). Anthracnose de la vigne (F).

فطر مجهرى يتطفل على الأوراق والسروع والمناقيذ فيصطبها ويقع بها لثة الاذى || مظهره الخارجي بقع صغيرة، مستديرة ، لا قياسية التصنيع ، تركب فصل الأوراق. قتل حطية، قطرها من ١ إلى ٤ م. ثم تتسع فينحرف لونها إلى البياض الاخير تحرق حالة فضية السمرة بنفسجية المواج ، تقضي حل التسقيج المتخارفة فتلونها وتغتها || وهو على السروع يقع مستطيلة مبيضة تركب اللحاء فتحرقها وتقتور فيها حل الشكير والذكاك || وهو في المناقيذ يقع مستديرة متخلخلة تركب الحب فتبلو حطية اللون مبيضة تكثر في المنطقة الخامية ثم تتسع فينحرف لونها إلى السمرة يحيطها اطراف ضيق اسود || يكافح باستعمال سائل بورديو المخلول من ٢ ٪ أو السائل البورفوني المخلول ٢ ٪. ومن الضروري اقتطاع وحرق السروع الموصية.

٢٤٨٦٨ - نُصُوفُ اللُّوز *

Glucosporium amygdalinum (S). Anthracnose de l'amandier (F).

فطر مجهرى يصيب اللوز في اثنائه وأوراقه وتثماره. يذو على الثآليل قروح لثولية صغيرة ، حطية اللون تلوح بالزغب ثم تنفخض وتقتور إلى الداخل || وهو صلب الانسان مشج يمحج يمحج اللحاء ثم يحف على حين فرة قبل اكتمال نمو الأوراق || وهو على الأوراق يذو مبيضة سمراء اللون تجف وتثمت بسمرة || يكافح باستعمال سائل بورديو أو أحد المبيدات الفلوكسية.

٢٤٨٦٩ - نُصُوفُ اللُّيْمُون *

Glucosporium limeticolum (S). Anthracnose du citronnier (F).

فطر مجهرى يركب بعض أنواع الليمون أخصها الليمون الحلو والدارنج || يذو على ثوبى الاضخان بقع حطية مستطيلة يتألمها من نصل الأوراق بقع شديدة الغضار الاسمر تظن النصل وتقوده الالتهاب فييبس مع الانسان. ويركب الاضخان يطلوح بها. ويصيب الثآليل فيشوها ويؤلف ثوبا يمد ان يذوها ينقط حطية اللون تكلم القشرة وتقتور فيها || يكافح باستعمال سائل بورديو المركب ٣/٣ ٪ يضاف اليه ١ ٪ من الزيت قبل الاضخان وبمد الانتقاد.

٢٤٨٦٦ - نُصُوفُ المُرَّو *

Glucosporium musarum (S). Anthracnose de la banane (F).

فطر مجهرى يصيب المُرَّو في ثماره الثابتة وللدركة فيحطبها. مظهره الخارجي بقع مستديرة أو مستطيلة سمراء اللون تركب القشرة ثم تقور فيها فتصطب الب || يكثر في المراتع الرطبة الخلة. يكافح عند ظهوره باستعمال الفوطاير المركزة على الاملاح الحماكية.

٢٤٨٦٧ - نُصُوفُ بَمْعُورِ مَرِيم *

Glucosporium cyclaminis (S).

فطر مجهرى يركب الاضخان في ابل ثمرها فيوشها او يلونها || مظهره الخارجي بقع حطية تركب التوبج فتقبله وتركب زناد الزهرة فتقترحه وتحمته. وهو على الأوراق يقع حطية لا قياسية الشكل والحجم تركب النصل فتصمجه وتقتل فيه حركة التبادل التنسي || يكافح باستعمال اوكسيكلورور النحاس المركز ١ ٪.

٢٤٨٦٨ - نُصُوفُيْ هو الغاليلون الايض ، اسطيه .

٢٤٨٦٩ - نُصَامَةٌ

Indhiscence (F).

Indhiscence (E).

صفة الثآليل والبلور التي لا تنطلق تلقائيا عند الادراك.

الناس .

٢٤٨٧٠ - نُصُوفُيْ

Indéhiscant (F). *Indéhiscant* (E).

نعت تعريفى يطلق على كل ثمرة أو بذرة لا تنطلق تلقائيا

اي طوعيا عند الادراك التام .

٢٤٨٧١ - لُطْ *

Lecythis (S).

Lécythis, Marmita de singe, Quazalé (F). *Monkey*

pot tree, Sapumala-nut tree (E). *Topfbaum* (D).

Maudorio della Colombia (I).

جلس اشجار وشجيرات من الشليات وفضيلة الآسبات. أنواعه

نحو ٥٠ جميعها من نباتات المناطق الاستوائية الافريقية

والامريكية. أوراقها متعاقبة مدققة اعطليجية. أزهارها

تاجية. ثمارها جراد حليية مستطيلة صميكة الجوانب. سدادتها

فلسفية تنفتح من فوق تحوى حدة زمررة زر الطعم تأكلها

القرود وتستخدم في بعض العلاجات الصدرية .

٢٤٨٧٢ - لُطْ *

Lota (S).

Lote (F), Eel-pout (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة النامسيات. أنواعه قليلة

تألف السميرات وبياء الانهر الزاكمة . اجسامها تطول

من ٣٥ إلى ٧٥ سم. حراشفها صغيرة دقيقة لزجة . الثوبيا



نُصُوفُ الكَرْمَةِ



نُصُوفُ اللُّيْمُون



"لُطْ"



"لُطْ"

متفاقية معتقة كاملة أطيحية تصغر عند تجفيفها ويستخرج منها ومن لحاء السوق مادة غضائية صفراء اللون . أزهارها خاسية والفصل والبنتلات ، عديدة الأسدية ، ثمارها عنبية ، صغيرة القند ، حلوة || أحراف أنوعه وأشهرها ما يلي .

٢٤٨٨٠ - لُطْر الصَّبَاغِين (S) Symlocos tinctoria

Symlocos des teinturiers, Lotur des teinturiers (F).
نوع من اللطر البوروي . مهدد البلاد الأيركية . تجتره تملو من مَرَيْن إلى سبعة أمتار . افتادها وإفانها إلى الصهبة . أزهارها عابلة ، نصلها سميك الصفحة سكري الطعم . أثمارها خضبة التجميع ، صفراء اللون ، فواحة العرف العطري . ازدهارها يستمر طوال شهر نيسان .

٢٤٨٨١ - لُطْر اليابَان (S) Symlocos japonica

Symlocos du Japon, Lotur du Japon (F).
نوع من اللطر الأترشي مهدد اليابان . جنبتة تملو من ١٠٠ إلى ٣٠٠ سم . أزهارها أبيضه مألسة . أزهارها عقودية التجميع ، لونها إلى الصفرة الباهتة . ثمارها حمراء اللون . ازدهارها يستمر طوال شهر حزيران .

٢٤٨٨٢ - لُطْر عَشْكَوِي (S) Symlocos paniculata, S. crataegoides

Symlocos paniculé, Lotur paniculé (F).
نوع من اللطر البوروي . مهدد الشرق . تجتره تملو من ٤ إلى ١٢ م . ساقها فراء . أفانها زباء . أزهارها عابلة ؛ نصلها مسن الحافة ، خلي البشرى على صفحته السفلى .

أزهارها عشكوية التجميع ، محورية الارتكاز وتاجية . لونها إلى الأبيض أو الأصفر . ثمارها كروية ، قطرها نحو ٨ سم . لونها إلى الزرقه || أزهارها يستمر من أيار إلى حزيران .

٢٤٨٨٣ - لُطْر عَشْكَوِي (S) Symlocos en grappes

هو الأيلاك يستخرج منه مادة قوية تدعى لطرين .

٢٤٨٨٤ - لُطْرِيَات (S) Symlocaceae

Symlocacées (F). Symlocaceae (E).
فصيلة ثنائية كانت في التصنيف الماضي سبطاً مسن الأسطروكيات . أشهر أجناسها اللطر .

٢٤٨٨٥ - لُطْيَات (F) Lécythidées

سبط من فصيلة الآسيات ، نباتاته لا قياسية الانتظام الوردي تتميز بملوحها من الجيوب الانحرافية .

٢٤٨٨٦ - لُطْيَسَة (S) Lepas

Lépas, Anafie (F). Lepas (E).
جنس دوبيات بحرية وبهرية من القشريات الدنيا هدايات الارجل وفصيلة اللطيسيات . أنوعها المحروقة عديدة منتشرة في معظم بحار وأبهر العالم || أجناسها صغيرة . صوبها مزندة . الحفتها خاسية القطع . ارطها الصدريه هداية || جميعها تتصلق بانابيب كلسية المادة تشبه التوالق تشديدا على الصخور المغفورة وعلى وحاف المرجان وعلى الاغشاب العائمة والمراكب .

٢٤٨٨٧ - لُطْيَسِيَّات (S) Lepadidae

Lépadides (F). Lepadidae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من القشريات هدايات الارجل . أجناسها قليلة العدد أما أنوعها فكثيرة منتشرة في جميع بحار العالم || تتميز بمعانيها التي تنشب في كل شيء مدفون من الصخور إلى الاصمأك .

إلى الصفرة تملوها زراكل مخلفة . سمره اللون . تسرا في الشتاء من كانون الأول إلى شباط || لحما جيد الصنف مستحب الطعم مرغوب فيه .

٢٤٨٧٢ - لُطْ بِحَرِّي مَبْدُول (F) Lotte de mer vulgaire

سمكة بحرية تدعى كواضة مبدولة ، أطلابها .

٢٤٨٧٤ - لُطَّاس (S) Molothrus

Molothre (F).
جنس طير من فصيلة الكاروجيات . أنوعه المعروفة نحو ١٢ . جميعها من طيور القارة الأيركية . تألف السباب والمراعي وصفات مجاري الماء . نظامها الحياتي جامعي . تجميعاتها لإقياسية العدد منها الفوج ومنها السرب || أجناسها تطول من ١٧ إلى ٢١ سم . مناقبها غروبية ، صغيرة وقوية . اجنحتها محتالة الطول . أفانها مستديرة الأطراف . أرساها معتدلة الارتفاع . أثقابها متباينة التضييق . أناتها أسفر قدماً من ذكورها وأبنت غضاباً . وهي لا تحسن البيض بل تقصفه في أعشاش فيرها من الطير ولا تضع في الملو الواحد أكثر من بيضتين . يرفع أجناسها تبيض في موعها الحمول من ١٢ إلى ١٤ بيضة || قويا الحشرات المختلفة وبعض البذور البرية || أحراف أنوعه وأشهرها لطلاس المشاية .

٢٤٨٧٥ - لُطَّاسُ الْمَاشِيَةِ (S) Molothrus pecoris

Molothre des troupeaux (F). Cowbird (E).
مائل من اللطاس . موطنه بعض مقاطعات أمريكا الشمالية . يألّف المراعي وصفات مجاري الماء . فوجه يمد من ٢٠ إلى ٤٠ زوجاً || جسمه رشيق القوام يطول نحو ١٨ سم . ثوبه أسود اللون يملو موج أزرق في الظهر والصدر . سحقة عينه سوداء . مناقده ورساها إلى السرة السوداء . الأثني عادمة الموج الأزرق || أحلافه مرسة ، هنيئة . قوته الحشرات وبعض البذور البرية . يرافق قطعان البقر والبيسين فيجتم على ظهورها ويقضي على الاساربع والكرزود التي تكثف جلودها || الأثني تضع البيض في أعشاش فيرها من الطير .

٢٤٨٧٦ - لُطَّحَاتِيَّات (F) Dématiées
عمارة طيور مجهرية من فصيلة الكتريات . تتميز ببهرها الملون الشديد السمره || أجناسها ثلاثة : الحشف والزريعة والشيابة .

٢٤٨٧٧ - لُطَّحِيَّات (S) Dematiaceae

Dématiacées (F). Dematiaceae (E).
لفصيلة لطور مجهرية من مرتبة الحفانيات ورتبة الزروحيات . تتميز بهنجا وكنائدها السمره اللون ، بويغاتها ثنائية الخلية ، مشبيها لرحي اللؤلؤ || أجناسها عديدة تجميعها أربع حمارات : الحفانيات ، الرديانيات ، الزرحانيات والأزناحيات .

٢٤٨٧٨ - لُطْحَة (F) Macule

Macule, Stain, Spot (E).
٢٤٨٧٩ - لُطْر (S) Symlocos

Symlocos, Symploque, Lotur (F). Lohd tree (E). Lotbaum (D). Simploco (I).
جنس اشجار وجيريات برية وزيينية من اللطريات . أنوعه نحو ١٦٠ . جميعها من نباتات المناطق الحارة . أزهارها



لُطَّاسُ الْمَاشِيَةِ



لُطْر



لُطْ

الطول . ميناها صغيرتان ، ناشرتان . زباناها دقيقان كسولها قمي الشكل . حنجرتها صغيرة . حنجرتها ظهورها مشحنتان بالأحمر والأسمر . ظهرها يماذي اللون ، أصفر المروق . روثهاا شفافان . يبلها إلى الحلي الأسمر . يلقوه حمار مصدف . قوائمها نسيطة ، حنطية ، سمره المولج || تألف المروج والحفل والبساتين . قوتها ثلاث الاثمار والاوراق الفتية .



لستوم

٢٤٩٠٢ - **لُجْدَد**
Lagopède (F).
هو الجند ، الحلي .

٢٤٩٠٣ - **لُغْرِيس الرُّقُوق**

Lygis du prunellier (F).
فراشة مزودة مشهورة باسم أرقية الخوخ . الحلي .

٢٤٩٠٤ - **لُكُسْتُوم**
Lagostomus (S).
Lagostome (F).

حيوان لين قاضم سجد الجنس والنوع من فصيلة الشفطيات . موطنه فياني امريكة الجنوبية . جسمه ربع القامة يطول من ٥ إلى ٦ سم . وذنبه نحو ١٨ . ظهره مقوس الشكل . رأسه عريض القامة . مقضه قصير مقطوم . سباله كثيفة الحلب الجامد . اذنانا معتدلتان بارزتان . جروانه الامامية قصيرة ثلاثية الاصابع والخلفية طويلة رباعية الاصابع . اطافره قوية حادة || جسمه قسح الارباع يتألف من اربع دناه متراكبة فوق بعضها . مداعله ومخاربه انفاق عديدة تُمَرَّضها دهايز متصالية ، تجتمع فيها الاناث من ١ إلى ٢٠ يحافظون عليها ويحميها ذكر واحد . قوته الاشباب والجُلُود وجميع المواد النباتية يتغلبا الى مدخل جمره || يعيش جماعات كبيرة العدد . تبلغ مساحة قوته في بعض مناطق الارضاني نحو ٤ كيلومترات مربعة .



لغوريش

٢٤٩٠٥ - **لُغْلُغ**
هو اللغلق الاسود ، الحلي .

٢٤٩٠٦ - **لُغُو**
هو نباح الكلاب .

٢٤٩٠٧ - **لُغُوْرِيَش**
Lagothrix (S).
Lagothriche (F).

جنس قرد امريكية من فصيلة السبويات موطنها البرازيل والبنان وكولومبيا والبيرو || اجسامها تطول نحو ٧٥ سم . واذانها كذلك . الثوباء الى الكفة السوداء المولج . شمارها ناعمة لينة ورفيرة || له فوكان بالآلاف الثغبات والاسراج الجبلية . قوتها الجار .

٢٤٩٠٨ - **لُغُوْرِيَا**
Lagocla (S). Lagoecle (F).
نبات حشبي بري طلي من السكيات . يطول نحو ذراع . اوراقه مركبة ، مشطية ، بحرية اللون . ازهاره خيمية النسيج لونها الى الزرق . زروه طيبة وهي دقيقة مسطيلة حنطية اللون مرة الطعم حريفة تقيد الصدر وقتي البلغم وتقضي على الريح والمغص .



لغوريا

٢٤٩٠٩ - **لُفَاح**
Mandragera (F). Mandragora (E).
هو اليربوع ، الحلي . ويدي السابرك . قيل وينسي القند . قال الانطاكي : « وهو يسكن غليان اللهم والشفراء وسرة البقول والخفغان ويقطع الاسهال والدم شرابا ويسكن الصربان مطلقا وكذا الصداع دلاء ويسبت فيمنع الهرم والقلق » .

٢٤٨٨٨ - **لُعَاب ، لَعَم ، لُعَام**
Saliva (F).
Saliva, Spit (E).
اللعب واللمع غليط حاصل من افراز الفم اللبانية والخطاطة للفم . وهو نوحان : اللعاب التكني او المصفي واللعاب البليسي . أما اللعاب اللبانية فهي حل ثلاثة انواع : الكفكية والفكسية واللسانية || أما اللعاب فهو زبد الجبل يلقفه من فيه .

٢٤٨٨٩ - **لُعَابَات**
Racines de mandragore (F).
Roots of the mandrake (E).
جذور الفلاح غراسها كثيرة النفع تستعمل في الصيدلة .

٢٤٨٩٠ - **لُعَادَاة**
Ethologie (F). Ethology (E).
درس حياة الحيوان ونشاطه الجسموي والخلقي في محيطه الطبيعي .

٢٤٨٩١ - **لُعَانَة**
Légume tendre (F).
New green (E).
كل نبات لين من احرار البقول . واللنعانة ايضا ج لعاع . وفي القول المأثور « أما الدنيا سامة وبتاعها لعانة » اي قليل البقاء كالنبات اللين .

٢٤٨٩٢ - **لُعْلُ** ، **يَاثُوتِ أَحْمَر**
Rubis (F). Ruby (E).
حجر كريم من الالوين المبلور الشفاف ، لونه الى الحمرة الصنائية الزاهية . اجمده ما جاء من التبت والهند .

٢٤٨٩٣ - **لُعْلُ**
هو الماليزيه ، الحلي .

٢٤٨٩٤ - **لُعْلَاع**
Réfringent (F).
Refringent, Refracting (E).
نعت تعريفي يطلق على كل ما تحل بخاصية كسر الاشعة الضوئية اي تغيير اتجاهها .

٢٤٨٩٥ - **لُعْلَعَة**
Réfringence (F).
Refringency (E).
اللمعة خاصة تتميز بها الاجسام الشفافة بكسرها للاشعة الضوئية .

٢٤٨٩٦ - **لُعَم**
Saliva des reptiles apodes (F).
Saliva of apodous reptile (E).
القلم لعاب الزحافات المرقالة أي العامدة الاربيل كالخيات .

٢٤٨٩٧ - **لُعَوَة**
Chienne (F). She dog (E).
هي الكلبة وبهم من غصها بالكلية الحائل . قالت العرب : اجبر من لوعة واضع من لوعة .

٢٤٨٩٨ - **لُعُوس**
هو اللذب ، الحلي .

٢٤٨٩٩ - **لُعِيْث**
Labé (F). Labiate, Lipped (E).
نعت تعريفي يطلق على كل زهرة مغلفة التويج كالشفتين .

٢٤٩٠٠ - **لُعَارِيْصَة ، لُؤْهَارِيْصَة**
Logarithme (F).
Logarithm (E).
علم انساب الاعداد .

٢٤٩٠١ - **لُعَاسُ المُرُوج**
Lygis pratensis (S).
Lygis des prés (F).
حشرة غاصلة من فصيلة الضمحيات . جسمها صغير القند يطول نحو ٧ م . ثوبها متراكب الشقعة والصفرة وممشج ابيض واسمر وأحمر . رأسها صغير عرمم . غطوها مثل

وهو على الدورات وشاح اسر اللون يلحف البشره بكاملها
او يجهز منها فيطليها ويتلفها || يكافح باستعمال احد
الفواظير الحديثة او لحول ووردو المركز على الشكل التالي :

سلفات النحاس ٣ كيلو
كلس حراق ٣ كيلو
مساه ١٠٠ لير

ومنهم من فضل محلول « يورينين » المركز على الشكل
التالي :

سلفات النحاس ٣ كيلو
كربونات الصودا ٣ كيلو
مساه ١٠٠ لير

٢٤٩١٨ - لَفْعَةُ الْبَيْض *

Phytophthora nicotianae (S). Black shank (E).

وصم يسيبه فطر مجهري يركب التبغ في المشل وفي الحقل.
مظهره الخارجي على شتول المشل يبدأ باسوداد وبقن السخن
والجلود ثم ينتهي بالمريان والاضمحلال || وهو على شتول
الحقل، في اول عهد، يبق تظهر على الاوراق بيضيه
الشكل ، لا قياسه الحميم . لوها اشد اخضراراً من النسيج
الذي يحويها ثم يتحول تدريجاً الى الشقرة فالصبه فالسج
ضمن إطارات خفيفة فاصلة قليلة الوضوح . وفي دوره
النهائي يذبل الاوراق ويمطب السوق ويسبب اسودادها من
السخن وصاعداً على ارتفاع ٢٠ او ٣٠ سم . وعند شق
او فلق الشتل المصابه يبدو مكهاك جافاً متفصلاً متقطعاً
اسود اللون || يكافح في المشال باستعمال الفواظير المركزة
لحد النحاس او الزنك ويكافح في الحقل باجتناب الزراعة
في المواعظ الربليه .

٢٤٩١٩ - لَفْعَةُ الشَّمْسِ * Coup de soleil (F). Sun scald (E).

عارض يسبب لاه الاجمار في خلايا نسيجها البشورية
والبروتينيه سبه اشعه الشمس الحارقة التي ترشفها وتستوعبها
قسراً لاه السوق الممرضة الى الجنوب ثم يدركها البرد القارس
فجأة فيعطها ويسبب يباسها || يكافح بلسلي السوق
بالكلس لان اللون الابيض يمنع تخزين الحرارة .

٢٤٩٢٠ - لَفْعَةُ الصَّبَّارِ ، لَفْعَةُ التَّفَمِ *

Phytophthora cactorum, Ph. omnivora (S). Pourriture du collet, Maladie des semis du hêtre (F). Crown-rot, Omnivorous phytophthora disease (E). Kragenfäule, Keimlingsfäule (D).

وصم مرق يسيبه فطر مجهري يركب مختلف النباتات الحميمه
وشاتل النباتات الحريميه ويترى النشم بعضه فنيشيه .
مظهره الخارجي يبق شقر ثم سمر ، لا قياسه الشكل والحجم
تقلب فيها الاضطالة ، تلعب بالنسج فتشبهها || يكافح
كثيره من تطور اللعنه بمركبات النحاس او الزنك .

٢٤٩٢١ - لَفْعَش * ، لَفْعَاش *

Diastichodus (S).
جنس اسماك ثورية من مفتوحات المثانة وفصيله السلونيات.
انواعه المعروفة قليلة العدد اجسامها مستطيلة ، ملامحها
معدية ، اعطائها مقلطه . سهها صغير القد برياني
الطرف . اشهر انواعه لفش التيل الذي يطول نحو ٦٠ سم .
ثويه الى الحصار القضي الموج .

٢٤٩٢٢ - لَفَّالَان * Cuscute (F). هو الكشوث ، الحلبه .

٢٤٩١٠ - لَفَّاشَة *

Salmo salvelinus (S). Ombie, O. chevalier, Salvaïn (F). Char (E).

سمكة ثورية بيض من السلونيات ، اعطائها منظم بجيرات
ارديه وتركيا || جسمها كبير القد ، يطول نحو ٨٠ سم .
ثويها ، عند اكثال ثويها ، ثنائي الين ، ظهرها والقم
الاكبر من جانبيها الى الردهه الخضراء . بطنها وما تبقى
من جانبيها الى الصغار البرتقالي يملو موج ردي يبق
عند حافة البطن . اما ثويها في طور النمو فكثير النقط
البيض || لحمها فاخر الصنف يعتبر من اجود لحوم
اسماك المياه العذبة .

٢٤٩١١ - لَفَّالَةُ الْوَرْدِ *

Blennocampa pusilla (S). Rouleuse des feuilles, Tenchrade des feuilles du rosier (F). Rose leaf sawfly (E). Kleinste Rosenblattwespe (D).

حشرة من الفطريات، جسمها صغير القد اسر الثوب .
ورقاتها مستعدة ليراه اللون تمش على ورق الورده فتلفه
وتلتصق به ثم تروده وتلقي عليه .

٢٤٩١٢ - لَفَّافِيَّة *

Diptosiene (F).
جنس ثنائيات جنبيه من السليانيات تدعى عيته ، اطليها .

٢٤٩١٣ - لَفَّت *

Brassica rapa (S). Rave, Navet (F). Rape, Turnip (E). Wasserrübe, Welsche-Rübe (D). Rapa (I).

بقلة زراعية من فصيلة الصليبيات . جذرها مستدير الشكل
مفلطح ، يؤكل طرياً ومطبوخاً وغلاً ، ومنه ضرب
عالية كبيرة تأكلها الحميم والخنزير || جزوه
زيتية طية تحوي بعض الفسفور والمواد الحريميه المحميه .
قد شاع استعمالها للاعطاء منذ زين الفراعنة الذين اطلقوا
عليها اسم (دجم) اي جز اللقت او زيت جز اللقت.

٢٤٩١٤ - لَفَّت بَرِّي *

Rapponce naine (F).
هو الفتيوه الرضيعة ، اطليها .

٢٤٩١٥ - لَفِّيَّة *

Napiforme (F). Napiform (E).
تمت تعريفه وصي يطلق على الجلود القصيرة المستطيلة
التي تشبه اللقت .

٢٤٩١٦ - لَفْعَة *

Phytophthora (S).
جنس فطور مجهريه من مارة الرصليات وفصيله الصنانيات
تتميز بنموها البريانية الناجية الاكثاز والتشمب || انواعها
عديدة . اشهرها واغبرها للاقتصاد الزراعي لفعة البطاطا
ولفعة التبغ ولفعة النشم .

٢٤٩١٧ - لَفْعَةُ الْبَطَاطَا * ، مِلْدِيُو الْبَطَاطَا *

Phytophthora infestans, *Botrytis infestans*, B. devastatrix (S). Mildiou de la pomme de terre (F). Potato blight (E). Kraut-und knollenfäule der kartoffel (D).

وصم وريح العدائية يسببه فطر مجهري يترى معظم نباتات
الفصيلة الباذنجانية واعصها البطاطا والبننور || يركب
الورق والسوق والجذور والدرنات . مظهره الخارجي على
الاوراق يبق لا قياسه الشكل والحجم تبدو خطية اللون
ثم تتحول الى السرة يقابلها على صفحة النصل السفلي
فبار ايض فسجاني ، يطو حمار البقع فيحدها ويستقر
بعض الرقت ان يشمل القليل كامل النصل فيطرح به .





لفوت المتوسط

Pompilus (S). **لِقْ-٥* ، لِقْ٥**
Pompilidae, Centrolophidae (F).
جنس حشرات من فصيلة اللقيات . أنواعه عديدة منتشرة في معظم البلاد المعتدلة الحرارة . جميعها متوسطة القد هيئات الجسم تطول نحو ٣ سم. ألوانها إلى السواد اللامع يعلو تجلج معمر من أحر اللون أو أصفر. تتميز بقصبتها وتهدئتها الناكب التي تدفعها في مكانها كذا لبنيتها الخديث النقب .

Inoculum (F). Inoculum (E). **لِقَاح** - ٢٤٩٣٠
الجرثومة النقية الصالحة للتلقيح .



لقية

Vaccin (F). **لِقَاح ، طَعْم** - ٢٤٩٣١
Vaccine matter (E).
نوعية محدودة الفاعلية النسبية تحقن في جسم الحيوان لوقايتها بعد حدوث اللقاحة المقصودة .

Eteules, Gleanings (F). **لِقَاط ، لِقَاعَة** - ٢٤٩٣٢
Gleanings (E).
ما يقطعه الحاصد من السبليل تحتلظه الناس .



لقيم

Colaptes (S). **لِقَاط ٥*** - ٢٤٩٣٣
Colaptes (F). Flicker (E).
جنس طير من فصيلة القناريات ورتبة المتسلقات. أنواعه المعروفة ستة جميعها أمريكية المهد إلى أجسامها معتدلة القد تطول من ٢٧ إلى ٣٠ سم. بسطها عراجل من ٤٠ إلى ٤٥ سم. ألوانها إلى السمر البهجة والمروقة بالأصفر والاحمر والأشهب. تتميز بتقيدتها المستمرة القواعد وباراسها المستطيلة في قوتها الأسرع والديان والتمل وأغشحات وتآثر البرية والبلور والباطور . وهي من الطيور الخازنة التي تجمع البلوط في تجاويف الأشجار ويحويها قوون بندق مونة فصل الشتاء . أنثاها تمث في تجاويف الأشجار وفي صلعوها وتبيض من ٦ إلى ٧ بيضات على مرتين في الحول . الصغار تسرح في طبع القوت بعد التفنق بأسبوعين إلى شهر أنواعه المعروفة :

Colaptes chilensis (S).
Colaptes du Chili (F).

لقاط الشيلي

Colaptes mexicanus (S).
Colaptes du Mexique (F).

لقاط المكسيك

Colaptes auratus (S).
Colaptes doré, Pic doré (F).

لقاط ملهب



لقا

لِقَاعَةُ الْعُلْجُومِ ٥* - ٢٤٩٣٤
Hypoderma bovis (S). Hypoderma du bœuf, Varron (F). Ox warble fly, Cattle grub (E). Dasseliege (D).
حشرة من الصيديات ، طولها يراوح من ١٢ إلى ١٥ سم. وهي كبيرة الرأس ، قصيرة الطعم ، مستطيلة المزد. تمتص مكبا على ظهور البقر فينتفخ عن رقات غريبة طيبة تنقلها البقرة بلسانها من جلد البقر إلى حلقها فيطبا حيث تنسل وترثي حتى التسح الجلدية فتنتفخ المجلع مع انتهاء دورها البرقي وتنسحق على الأرض فتختفي في التراب وتنسل إلى كروم ثم إلى حشرة تعيد سيرتها الأول .

لِقَاعَةُ الْعُلْجُومِ ٥* - ٢٤٩٣٥
Lucilia bufonivora (S). Lucille du crapaud (F).
حشرة من الصيديات ، طولها يراوح من ٨ إلى ٨ سم. ألوانها إلى الخضار القاتم تكثر في الأماكن الرطبة . رقاتها طفيلية تركب جميع الضفادع اغصها العالجوم .



لقاعة البقر

Lophotes (S). Lophote (F). **لَقُوت ٥*** - ٢٤٩٣٣
جنس سمك بحرية من فصيلة السمكيات. أنواعه المعروفة قليلة العدد اصطناعا بحار البلاد الحارة والمعتدلة . أشهرها لقوت المتوسط .

لَقُوتُ الشُّوسُط ٥* - ٢٤٩٣٤
Lophotes capedianus (S). Lophote de la Méditerranée (F).
لوع من اللقوت وهو سمكة بحرية مأكولة لها متوسط الصنف . جسمها مبسط الشكل يطول نحو ١٥٠ سم. زعنفتها الظهرية تمتد من قاع الرأس إلى طرف الذنب وتلحي عند الرأس بقرن منحنى غروبي الجسم عظمي المادة . ثوبها إلى الخضار الرصاصي تلوو رقعة بيضاء .

Laphygma toxigus (S). **لَقِيْعَمَة ٥*** - ٢٤٩٣٥
فراشة من فصيلة الليليات موطنها البلاد الحارة . طولها يراوح من ١٢ إلى ١٤ سم. بسطها نحو ٢٥ سم. جسمها وروشتها الأصباغ إلى الرمادي العايق . ورشاتها الخلفيان إلى البياض اللامع ، اطرافها وأعصابها سمر . الأني أكبر قدأ من الذكر تمتد مكبا الذي يد نحو ٥٠٠ كتأ متفرقة لا قياسية الشكل والعدد على صفحات أوراق القطن المغل فينتفخ به منته بثلاثة أو أربعة أيام من رقات تسلم خمس مرات . طولها البرقي يروح من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع وقد يطول أكثر من هذا في الشتاء . ثم تتحول في البرية إلى حوراء . أجسامها الخلفية مدنية ، الصبي يدوم نحو ٣ أسابيع وللشوي من ٤ إلى ٦ أسابيع . رقاتها تدعى دودة القطن الخضراء ، الملهية .

Levulose (F). **لَقِيْلُوز ، لَقِيْلُوز** - ٢٤٩٣٦
Levulose (E).

قرب من السكر ينتمي إلى فئة الغلوكوز يوجد في معظم ثمار الفاكهة وفي اللسان والصل .

لَقِيْم ٥* ، هَوَيْسَة ، أَمْ هَوَيْس - ٢٤٩٣٧
Lophomyia imhausi (S). Lophomyia d'imhaus (F).
حيوان لبون قاصم من فصيلة القميبيات . موطنه يمتد من حوض البحر الأحمر إلى الحبشة . يألف الزير والأفدال والحراج المتجاورة الأشجار . ملجته الحيائي جامي . جماداته قليلة العدد إلى جسمه مستطيل الشكل ، يطول نحو ٤٥ سم. بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ١٥ سم. يتميز بكثرة في ألوانه المستطيل الخشن تمتد من قاع الرأس إلى أواخر الزم الثالث من الذنب . رأسه صغير القد ، مخروطي الشكل ، مبسط الجرم . سباله كثيف مستطيل . مينا وأذناه صغيرة. قوائمها قصيرة ، خاصة الأصابع . ثوبه إلى الكلبة السوداء مملووا قميص الغير في الرأس والظهر والبطن . طرف ذيله أمرط عادم الزير إلى مسرحة دهوي . يتسلق الأشجار بشفة السنباب . قوته الجلود والأوراق والحبوب والبلور .

لَقِيْمِيَّات ٥* - ٢٤٩٣٨
Lophomyiidae (S). Lophomyiidae (F).

فصيلة حيوانات لبونة من رتبة القرواص . اجتماعها وأنواعها قليلة العدد . اصطناعا يمتد من حوض البحر الأحمر إلى أفريقية الشرقية والحبشة والسودان وأفريقية الوسطى إلى اجسامها صغيرة القد ، مستطيلة الشكل ، كثيفة الزير ، مستطيلة السبال والأذنان الكاسية . قوائمها قصيرة ، خاصة الأصابع . حادة البرائن القليلة التنجيم . جميعها شاجرة . قوتها الجلود والأوراق والحبوب والأمار وبعض البلور .

Glanage (F). Gleaning (E).

اللقط واللقاط هو جمع السائل التي يسطها الحاصد فتبقى في الحقل بعد الريجاد .

٢٤٩٤٧ - لَقَطَكَة

و بقلة طيبة تبعها الدواب ه ج . لقط .

Défaut apparent (F).

Visible default (E).

٢٤٩٤٨ - لَقَع

العيب الظاهر .

Happer (F). To snatch (E).

٢٤٩٤٩ - لَقَفَ

Parol (F). Coat (E).

٢٤٩٥٠ - لَقَفَ

القف جانب البئر والحوض ه ج القاف .

Ciconia (S).

٢٤٩٥١ - لَقَلَقَ - لَقَلَقَات

Cigogne (F). Ciconia, Stork (E).

للقلق ج . لقلق . جلس طير من فصيلة اللقلقيات ورتبة طوال الساق . صوته لقلقة . انواعه خمسة جميعها من القواط طويلة السيقان والاذنات والناظر . قوتها الاقاعي والبرذآن والخشرات والجيف والناغيات || اشهر انواعه .

٢٤٩٥٢ - لَقَلَقَ اَبْيَضَ * ، بَلَارَاجَ ، اَبُو حُدَيْج

Ciconia alba (S). Cigogne blanche, C. commune (F). White stork (E).

نوع من اللقلق ابيض الثوب ، اسود القوائم ، اجر الساقين والمنقار . طوله نحو ١١٠ سم . وبسطه نحو ٢٣٠ سم . مسرعه يمتد من ايران الى العراق وآسية الصغرى وأروبة وإفريقية الشمالية والجنوبية والشرقية حيث يعطي فصل الشتاء ثم يهجر البحر الى ايران والعراق .

٢٤٩٥٣ - لَقَلَقَ اسْوَدَ ، تَلْعَلَعَ ، عَنَزَ ، اَبُو سَعِيد

Ciconia nigra (S). Cigogne noire (F). Black stork (E).

نوع من اللقلق طوله نحو ١٠٠ سم . وبسطه نحو ٢١٠ سم وهو اسود الثوب ، ابيض الكتفين والذنب والصدر والبطان والاذنك . اجر الساقين والمنقار . مسرعه يشغل الهند ومنشورة وآسية الصغرى وأروبة وإفريقية .

٢٤٩٥٤ - لَقَلَقَ اَقَاعِي

هو الكرم المتوج ، اطلبه .

٢٤٩٥٥ - لَقَلَقَ حَمَلِيَّ * ، عُنَاز

Ciconia abdimii (S). Cigogne d'Ethiopia (F). Ethiopian stork (E).

نوع من اللقلق ، طوله نحو ١٠٠ سم . وبسطه نحو ٢٠٠ سم . ثوبه الى السواد الابيض والبرقاج . بطنه ابيض . رأسه وقوامه سود . حقه ومقار وسقاء حر . يكثر في الجبفة ويحوي معظم الاقطار الافريقية .

٢٤٩٥٦ - لَقَلَقَ مَسْرُوجَ المِيطَار

هو المكثير الاثري ، اطلبه .

٢٤٩٥٧ - لَقَلَقِي

هو الطير ه اطلبه .

Ciconiidae (S).

٢٤٩٥٨ - لَقَلَقَات

Ciconiidae (F). Ciconiidae (E).

فصيلة طير من طوال الساق ورتبة باشويئات الشكل . انواعها المروفة ١٧ بعضها ابد اعطانه البلاد الاستوائية وحارة والبعض الآخر قاطع يحوي البلاد في طلب المصيف والمشي || ملجئها الخاني زوسجي وجامعي . قوتها الصفاد

٢٤٩٥٩ - لَقَاعَةُ حَمَلِيَّة * Lucilla sericata (S).

Lucille soyeuse (F).

حشرة من الصدينيات ، طولها براوح من ٧ الى ١٠ مم . جسمها خلي البشرة يكثر ويبدوها من اذار الى تشرين الثاني . رقاتها هواكة وثائلة وقد تكون وانجة وطفيلية .

٢٤٩٦٧ - لَقَاعَةُ قَيْصَرِيَّة * ، لَقَاعَةُ عَصْرَاكَة

Lucilla caesar (S). Lucille impératrice (F).

حشرة من الصدينيات ، طولها براوح من ٧ الى ١٢ مم . تظهر من نيسان الى تشرين تكثر على الازهار والاقطار المعرضة لاشعة الشمس ، رقاتها وانجة وهواكة . تركيب الحيوانات القفارية .

٢٤٩٦٨ - لَقَاعِيَّات

Calliphoridae (F).

هي الصدينيات فصيلة حشرات ذبابية من ذوات الجناحين .

٢٤٩٦٩ - لَقَلَقَات

Freluche (F). Butterfly-net (E).

جيب ، غمرطي الشكل ، من النسيج الناعم اللين ، يستعمل لاقتراس الحشرات والذراشات .

٢٤٩٦٠ - لَقَاعَة

Phagocytosis (F).

Phagocytosis (E).

عمل ارتشاف المحتامات والجراثيم التي تقوم به بعض الحيوانات الحيوانية .

٢٤٩٦١ - لَقَاعَة

Phagocyte (F). Phagocyte (E).

اللقاعة حبييرة في الجسم الحيواني وظيفتها القاعة . وتسمى راعية وقافوسيت وعضامة .

٢٤٩٦٢ - لَقَاعِيَّ

Phagocytaires (F).

Phagocytic (E).

نمت تجريفي يطلق على كل ما هو خاص بالقاعة .

٢٤٩٦٣ - لَقَعَة سَوْدَاة

Centrolophus nigra (F).

سمكة بحرية تدعى رطمة ، اطلها .

٢٤٩٦٤ - لَقَس

Epinephelus (S).

Epinephelus (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الصرايات ورتبة شالكاك الزعانف . انواعه المروفة عديدة منتشرة في معظم بحار العالم . اجسامها اهلجية اللون ، متوسطة الحجم ، مستطيلة الرؤوس ، مقطوعة الاضلاع ، مسنة الزعانف الاسامية في الظهر والبطان . اثنائها كسنتية اللون تملوها رقشة ملونة وبعض الاماجات الزاهية والمابقة || اشهر انواعه القسي الجبار والصغري والردي .

٢٤٩٦٥ - لَقَسَ جَبَّار * ، صَرَّانَ جَبَّار

Epinephelus gigas (S). Epinephelus géant, Serran géant, Marou (F). Epinephelus gigas (E).

سمكة بحرية يمرض من القس . اصطنها البحر ابيض المتوسط . جسمها كبير القد اهلجي الشكل ، يطول نحو ١٠٠ سم . ثوبها الى الجوزة المنطية السمره المواجه تملوها رقشة لبراه منسوبة التوزيع تكتنفها من الراس الى الذنب || قوامها مفلطح الخصر الاضلع . فكاهما كيران . شغلها رجب . حينها كيرتان ، صفدتا التنشور . زعانفها الظهرية والشرجية مستطيلة يعلوها في اقسامها الاول مناعن حادة ، زعنفتها الذيلية متفرجة الطرف المستدير || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .



لقاعة قيصريّة



لقس جبّار



لقلق ابيض



لقلق حشبي

حايقة. تحمل في مؤخر اجنحتها الخلفية زوائد دقيقة. مكبا مستدير الشكل. ذري القند. رقابها قصيرة غليظة تستطيع اخفاء رؤوسها تحت حلقائها الصدرية الا انزل. غادرتها عاريات. بيائها لا يقاسي النمط والشكل يختلف مع الاجناس. فيه المتدب المائلة بمرورها والمطوقة المائلة بيائها والمنطقة والسليمة. البع.



لقمة الحمل الحبيفة

٢٤٩٦٧ - **لِقْمِيَّةُ الْبَازِيلَا** *
Lycaena baetica (S).
Licène des pots (F).
حشرة من القنديات كثيرة الانتشار وسعيدة الجبل الحولي. اقليمها حوض البحر المتوسط. يستعمل نحو ٣٠ م. ثوبها الى الزرقة الجسدية يملو موج خلي واطار اغبر في الذكور، اسمر في الاناث. قرونها الاستشعارية دقيقة، قوسية الشكل، صقبة الطرف || رقابها عند اكبال تطردوسا تطول نحو ٢٠ م. ثوبها الى الخضار المائل يملو موج بني لا يخلو من الاحمر وسط اسمر قاطب وينطوط جانبية متعرجة غيرا اللون || تركيب البالوا والباقي و اكثر القنديات. تنوش لدخل السقات تلهم الحب وتقضي عليه.

٢٤٩٦٨ - **لِقْمِيَّةُ الصَّعْتَر** *
Lycaena arion (S).
Licène arion (F).
حشرة من القنديات صغيرة القند، زرقاء اللون، مزرقة الرواشن. اناثها اكبر تما من ذكورها واهي لونا وقل زراكتش || رقبها دقيقة الجسم ممرار اللون ووديد المروج. تركيب الصعتر حتى السنانها الرابع ثم تقسم قري السبل قتلهم الرصع.



لقمة النجمة

٢٤٩٦٩ - **لِقْمَوَة** *
Aigle femelle (F). She eagle (E).
الغاب الاثني.

٢٤٩٧٠ - **لِقْمَوِيَّات** *
Leucosilides (S).
Leucosilides (F).
فصيلة دوبيات بحرية من القنديات عشاريات الانجبل محرمحات الاقواء || اجناسها وانواعها قليلة العدد، نحو ٥٠، منتشرة في معظم بحار العالم || اجسامها صغيرة بيضية الشوزن او مكورة. معدودة الطهر، مفرصة القفصم والخضر. ملاصقتها دقيقة، مسطيلة، سنية الشفار الداخلية.

٢٤٩٧١ - **لِقْمَوَة** *
Leucothoe (S).
Leucothoe (F).
الاسم العلمي من الميثروبييا الافريقية. جفت جنبات برية وزراعية تزيينية من فصيلة الخنجات، منها بعض الاصصاق الامريكية. سوطها متصبية تلو من متر الى ثلاثة امتار. اوراقتها متعاقبة، سنية الختار. ازهارها خاسية الفصل، اسطوانية التويجات، مشارية الاسدية، يكثر فيها اللون الالبيش || انواعها المعروفة عديدة، اشهرها التالية.



لقمة البازيلا

٢٤٩٧٢ - **لِقْمَوَة حَسَفَة** *
Leucothoe catesbeii (S). *Leucothoe spinulosa* (F).
نوع من القوطة الزينية. ساها غرعا تلو من ١٠٠ الى ١٨٠ سم. اوراقتها متعاقبة. انتقلت الى الحرة. نساها اهلجية ذرية سنية الختار، مسطيلة الانسان الحسفة الشاككة. ازهارها غمي التجميع، محوري الارتكاز. ازهارها بيضاء اللون، ناطقة العرف انتف || تنويرها يستمر طوال شهر ايار.



لقمة الصعتر

والغطاء والشعابين والاسماك والقنديات والقنوام الصغيرة والحشرات. بعض انواعها، اخصتها الكثير، يعيش على الجفث وقد يتعمد في النور التي تخشاه عندا تصيب جيفة || اجسامها عصبية متباينة الهجوم، منها الوسطى والكبيرة. تتميز باستطاعة القنوام والمنقذد الكبيرة، المستقيمة، الدرية، الوشيبة الشكل. جميعها بكية، عادة الهجاز الصوت || تدلن اعشاشها في المواقع الرطبة وفي اعالي الانجاز الباسقة. اناثها تقص من ٣ الى ٥ بيضات تحضنها بمناوبة الذكور من ٣ الى ٥ بيضا.

اشهر انواعها القلق الالبيش، والاسود، والخبشي، وتلقن الافاعي المعروف بالكرم المتوج، والمكثير، والسطام، والارطل المعروف بابي من.

٢٤٩٥٩ - **لِقْمَوَة** *
Condyle (F).
نوع المفاصل او حيد مستدير في العظام.

٢٤٩٦٠ - **لِقْمِيَّةُ الْحَمَلِ، لُوتِيَّة، تَمُول** *
Alternanthera (S). *Alternanthera* (F). *Chaff-flower* (E). *Weckelskölbchen* (D). *Alternanthera* (I).
جنس نباتات برية وزراعية بقلية من فصيلة القنديات. انواعها نحو ١٠ جميعها اعشاب حولية او معمرة. اوراقتها كثيرة العدد لا يقاسية الشكل والحجم. ازهارها مزرورة عمادة العلالوة يكثر فيها اللون الالبيش. اوراقتها صنية تنفع المدة.

٢٤٩٦١ - **لِقْمِيَّةُ الْحَمَلِ الْعَفِيَّة * لِقْمَوَة** *
الغزال، تَمُول لاطي *
Alternanthera sessilis (S). *Alternanthera sessile*, *Brède-chevratte* (F). *Sessile flowered globe amaranth* (E). *Garneleukraut* (D). *Alternanthera* (I).
نوع من لقمة الحمل اوراقتها كبيرة القند لاطة. تترك ملطومة. تنفع المدة وتفيد النضر.

٢٤٩٦٢ - **لِقْمِيَّةُ الْقَاضِي** *
Ottelia (F).
هي اذن الشيطان، اطلبها.

٢٤٩٦٣ - **لِقْمِيَّةُ التَّمْجَة * كَبَاش، مِخْبَطَة** *
Plantago ovata (S). *Plantain triomphe* (F). *Spogel plantain* (E). *Spogel Wegerich* (D). *Lingua d'angelino* (I).
نوع من لسان الحمل وهو نبات عشبي، مقري، بري، طبي، معم، يكثر في المواقع الرطبة.

٢٤٩٦٤ - **لُقْن** *
Lutage (F). *Luting* (E).

٢٤٩٦٥ - **لِقْمَوَة** *
Lagune (F). *Lagoon* (E).
القنة كل بحر قريب اللج وقد تكثر فيه الحشاش والمخومر. ج ليقنا.

٢٤٩٦٦ - **لِقْمِيَّات * هَرْمِيَّات** *
Lycanidae (S). *Lycanidae*, *Lycnidae* (F). *Lycanidae*, *Hainstreake*, *Gossamer wings* (E). *Blau-linge* (D).

فصيلة حشرات من رتبة حرشفيات الاجنحة. اجناسها وانواعها كثيرة العدد. اجسامها متوسطة القند، قوامها الانامية ناقصة التركيب. اسراع ذكورها صيدة القلة. قرونها الاستشعارية تفلظ مع ابتعادها عن الرأس. انواها

Chêne chevreul (F).

٢٤٩٨٢ - لُكَّ

هو السديان الأشعر ، اطلبه .

٢٤٩٨٣ - لُكَاث ، لُكَاثَة

دله يأخذ الثمن في اشتها وفطاهها وهو مثل القرح .

٢٤٩٨٤ - لُكَاث

للکاث : الحجر البراق الاملس يوجد في الجص .

Lachesis (S).

٢٤٩٨٥ - لُكَاژَة

Lachésis (F). Lachésis (E).

جنس حيات سرلوة سامة من انبويات الاحادية وفضيلة الالفيات . انواعها المروفة نحو ٤٠ موطنها بعض مناطق امريكا الجنوبية والوسطى اخصها المناطق الاستوائية || اجسامها كبيرة تطول من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم . رؤوسها غليظة شبيه برؤوس ذوات الاجراس وتحتل مثلها بنقر واضحة بين العمود والاذنوف . اعناقها دقيقة واذنابها كذلك . اذنبها تحمل من ١٠ الى ١٢ صف من الحراشف الشاذكة المنقطة كالكلاليب . اولياها تختلف مع الانواع معظمها مرقط بالاصفر والاحمر والاشقر والاشهب || اشهر انواعها الكَاژَة الصاعدة والكَاژَة السانبة .

٢٤٩٨٦ - لُكَاژَة سَيَايِيَّة * ، سَيَان الرُومِ *

Lachesis botrops (S).

Lachésis lancolé, Fer de lance (F).

نوع من الكَاژَة . موطنها جزر الفيليبين . تألف الغابات والمواقع الرطبة . يكثر ويصيدها في زراعات المصان والموز . قوتها القتران والجردان والصفاد والظاء والتانبر الصغيرة والعلير || جسمها يطول نحو ٢٠٠ سم . ثوبها الی الصفرة النحاسية الموج . سمها ناعم . لدغها تقضي على الانسان باقل من ثلاث ساعات .

٢٤٩٨٧ - لُكَاژَة صَامِيَّة *

Lachesis mutus (S).

Lachésis muet (F).

نوع من الكَاژَة . موطنها بعض مناطق امريكا الاستوائية . تألف الغابات الرطبة ولا تقترب من الاماكن الآهلة . قوتها كل ما استطاعت اليه من حيوان وعلير || جسمها يطول نحو ثلاثة امتار . ثوبها يراوح بين البرتقالي والاربعوني تلو تلوين سود ورقيقة شهباء . سمها زائف . لدغها تقضي على الانسان باقل من ساعة .

Odynerus (S).

٢٤٩٨٨ - لُكَاع *

Odyneré (F). Odynerus (E).

الواحدة لكاعة . جنس حشرات قاضية وثامة ناعمة من الحمويات غشائيات الاجنحة المحصورة وفضيلة الدغاسيات . انواعها المروفة نحو ٣٠٠ منتشرة في جميع اقطار العالم . || اجسامها متوسطة القد وحماها كذلك . اولياها ملونة يكثر فيها الاسود المجلع بالاصفر او الالصاني او البرتقالي وبعضها جلوي مجلج بالاصفر الذهبي ومنها الاحمر القرميدي المجلع بالاصفر الكبريتي والاسود || تصفن في التربة والحيطان والاشجار النخرة وفي سلايات القصب . اصنافها رداء رحيمة غروبية المداخل المستطيلة || قوتها الاساريع واللعاصيص تقتنصها فتفخدها وتنقلها الى اصنافها زادا لها وليرقاتها .

٢٤٩٨٩ - لُكَاع * ، رِيَمِيز *

Rhapis (S). Rhapis (F).

الواحدة لكاعة . جنس نباتات زربية من فصيلة النخلات .

٢٤٩٧٣ - لَقَوَظَة حَوَرِيَّة الورق *

Leucothoe populifolia (S).

Leucothoë à feuilles de peuplier (F).

نوع من الققوة التريبتية . ساقها فراء تملو من مترين الى اربعة امتار . لفتاحها عادة الخمل والزغب . اوراقها باهتة المرقع على الصفحات السفلى ، طولها يراوح من ٨ الى ١٢ سم . ازهارها حنقودي التجميع . ازهارها مستطيلة المعلق ، متدلية ، لونها الى اليباض العاصبي || تنويرها يستمر من حزيران الى آب .

٢٤٩٧٤ - لَقَوَظَة سَلِيَّة *

Leucothoe racemosa (S). Leucothoë à épis (F).

نوع من الققوة التريبتية . ساقها تملو من متر الى ثلاثة امتار . اوراقها عابلة . يضيئة التصل ، ذلقة الزام الاخير ، تطول نحو ٧ سم . وتعرض نحو ٣ سم . ازهارها سنبل التجميع . ازهارها صغيرة القد ، يضاء اللون || تنويرها يستمر من ايار الى حزيران .

٢٤٩٧٥ - لَقَوَظَة لُوبِي *

Leucothoe Lobbl (S).

Leucothoë de Lobbi (F).

نوع من الققوة التريبتية . ساقها تملو من ٥٠ الى ١٥٠ سم . اوراقها اميدة ، جلدية التصل ، مسنة الحمار ، تطول نحو ٧ سم . ازهارها حنقودي التجميع ، طرفي الازتكاز . ازهارها يضاء اللون || تنويرها يستمر طول شهر حزيران .

Pompilidae (S).

٢٤٩٧٦ - لُفِيَّات *

Pompilidés (F). Pompilidae (E).

فصيلة حشرات من غشائيات الاجنحة . اجسامها وانواعها عديدة منتشرة في جميع الاسواق الحارة والمعتدلة . قوتها ما تقتربه من الحشرات والحوام . تحفر مكاهي في التربة على اصقاع تراوح من ١٠ الى ١٥ سم . تشعب عنها عدة سراديب تنهي رداء مستطيلة مسحة الالصل تقع في كل ردة منها ٤ الى ٨ مكات تنقف بعد ٩٦ ساعة . اشهر اجناسها الق اطلبه .

٢٤٩٧٧ - لُقَيْس *

هو ما طال زين نوح . راجع قصب .

٢٤٩٧٨ - لُقَيْط *

Dracunculus mucivorus, Helicodicerus mucivorus (S). Serpentinaire atrape-mouches (F).

نبات عشبي اردبي بري وزيتي من فصيلة النفلديات . ارضه صقولي مقطعة . اوراقه برتلية مستطيلة الزناد ، وريقاتها وربة التجميع نصلها ثنائي الصفحة المزركشة والمجنية بالاحمر والاصفر . شراخه يعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم . شراخه خلى الصفحة الداخلية جلوي اللون متوسطه قبة حجة تكسوها لياث شمرة الشكل .

٢٤٩٧٩ - لُقَيْمَة ، لُقَيْفَة *

Ophlogosse (F).

عشبة طيبة تترف بلسان احية . اطلها .

٢٤٩٨٠ - لُقَيْفِيَّات *

Ophloglossaceae (S). Ophloglossacées (F).

فصيلة من البراميس تشل بعض الاجناس والانواع اشهرها القيقفة ولسان الفزال .

٢٤٩٨١ - لُكَّ *

Laque, Gomme-laque (F).

Lac, Gum-lac (E).

حصارة وراتنجية صمغية قترنزا بعض الاجنحار

تلقاتيا بمد حوها او برولصة الحشرات .



لُقَيْط



لُكَاژَة سَانِيَّة



لُكَاع



لُكَاع

٢٤٩٩٧ - لُكْتُارِيُوسُ حَرِيفٌ *

Lactarius acris, *L. sanguifluus* (S). *Lactaire acro*, *L. à lait rouge* (F).
من الفطور الجعلالية المؤذية يكثر في الأجراف والنباتات الغليظة في الصيف والخريف. عصارته حمراء اللون حريفة المذاق. ساقه تملو من ٤ إلى ٥ سم. حشيتة يحلوها توضح طوق أحمر المالح. طولها يراوح من ٥ إلى ٦ سم.



لُكْتُارِيُوسُ اشْعَق

٢٤٩٩٨ - لُكْتُارِيُوسُ سَامٌ *

Lactarius torminosus (S). *Lactaire vénéneux*, *L. aux tranchées*, *L. à toison* (F).
من الفطور الجعلالية المؤذية يكثر في الأجراف والنباتات. عصارته بيضاء اللون حريفة المذاق. نكتة أظفئة الصفعة الهلدية، طويقة التشنيد، زهاب الحمار والحالة، لوئها إلى الوردي يملو موج أصفر وتوضح حائب.



لُكْتُارِيُوسُ رَتَقَالِي

٢٤٩٩٩ - لُكْتُارِيُوسُ لَدِيدٌ *

Lactarius deliciosus (S). *Lactaire délicieux* (F).
من الفطور المأكولة اللذيذة الطعم. يكثر في ظل الأجراف الصنوبر والسرور. عصارته حمراء اللون سكرية المذاق. ساقه تملو من ٤ إلى ٧ سم. نكتة تجلو محمية ثم مستوية أظفئة وتنتهي مقعرة. قطرها يراوح من ٥ إلى ١٥ سم. لوئها إلى الحمرة البرتقالية تملوها رقعة خضراء وأطراف مابطة.



لُكْتُارِيُوسُ حَرِيف

٢٥٠٠٠ - لُكْتُارُ
هي البنات ، اطلبا .

Lactase (F).

٢٥٠٠١ - لُكْتُورُ
هي البنوز ، اطلبا .

Lactose (F).

٢٥٠٠٢ - لُكْتُوسٌ *

Lycet (S).
Lycet (F). *Lycet* (E).
جنس حشرات مؤذية من غديات الاجنحة وفصلية الكوتويات. أنواعه المروفة نحو ٢٥ منتشرة في معظم أقطار العالم || اجسامها صغيرة القدد ، مستطيلة الشكل ، وحيدة اللون السوي || يرقاتها غاشبة لكنها لا تقرب من احشاش الفصلية الصنوبرية || أعرف أنواعه واشهرها الكتوس الاسمر والعيطي والهند.



لُكْتُارِيُوسُ سَام

٢٥٠٠٣ - لُكْتُوسُ أَسْمَرُ ،
Lycet brunneus (S). *Lycet brun* (F).

حشرة غاشبة من الكتوس. طولها نحو ٣ سم. قوفا إلى السمرة الحظيفة المابطة || يرقها تنية اللون ، حمراء الرأس ، مستطيلة المقدم. تركيب الكثير من الاحشاش وبها التينة فتفترها وتعضها. وعندما تصمم من المرقوس. فانها تفصله كل كل فذاء.



لُكْتُارِيُوسُ لَدِيد

٢٥٠٠٤ - لُكْتُوسُ عِطِيٌّ ،
Lycet linearis (S). *Lycet linéaire* (F).

حشرة غاشبة من الكتوس. تألف الحراج والمنازل المسقوفة بالخشب. طولها نحو ٤ سم. قوفا إلى السمرة الكستنية || لها جيل واحد في الحول. يرقها مقومة ، مستطيلة المقدم ، مستعقة المخصر ، مائلة القشار. سداسية الرؤوب ، تنية اللون ، سوداء الرأس. تسردب مع خنافسها الشكير تحت الحما وتنتشر الاضاعة والاخشاب المصنوعة لكنها لا تقرب احشاش الصنوبريات.

أنواعه قليلة العدد اصطلحها المناطق الحارة. جلوسها عنه وجودها دائمة مستقيمة كثيرة ائمد ضمية التجميع تكسوها بشرة من اللبف الاسمر. اوراقها مستديرة الشكل ، غوصها جبل الغفار الزاهي ، كرها مستطيل الجرم سرع الصفعة أو شالك الجوانب || والكالك يعيش في اقل الحفصيات حيث يزرع في المراكب في الحدائق الخاصة التي لا تحصى القر. يتكاثر بالفسل. اشهر أنواعه التزينية ما يلي.

٢٤٩٩٠ - لُكَاةٌ قَرْمَةٌ

Rhaphis humilis, *R. strobilata* (S). *Rhaphis nain* (F).
نوع من اللكاع. ساقها جمعة. تتكاثر بالفسل. تعيش في المراكب. اوراقها دقية الشكل. كرها منصف الشوك الاسمر المتباح الاثرتا.

٢٤٩٩١ - لُكَاةٌ مَرُوحِيَّةٌ

Rhaphis flabelliformis (S). *Rhaphis en éventail* (F).
نوع من اللكاع. ساقها تملو نحو ١٠٠ سم. اوراقها مروحية الشكل. غوصها جبل الغفار الزاهي. كرها قليل الشوك الحظي المتباح. تزرع في المراكب والحدائق. ترطب في الارربة الدبالية اختصوة الرطوبة.

٢٤٩٩٢ - لُكَاةٌ نَاشِطَةٌ

Rhaphis major (S). *Rhaphis major* (F).
نوع من اللكاع. ساقها مستندة تملو نحو ١٢٠ سم. اوراقها مستديرة. غوصها فسفي اللون. كرها سرع الصفعة. تزرع في المراكب والحدائق. ترطب في الارربة الدبالية الحفصة.

٢٤٩٩٣ - لُكَاةٌ

« شوكية تحطب لها سوقة قدر شبر لينة كانه سير ولما فروع مملوءة شوكاً وبى خلال الشوك وريقة لا بل بها تنقيش ثم يبقى الشوك فاذا جفت ابيضت » (اللسان).

٢٤٩٩٤ - لُكْتُارِيُوسُ ، لُتِيَّةٌ

Lactarius (S). *Lactaire* (F).
جنس فطور من الفاريتونيات أنواعه عديدة منها المأكولة والجعلالية جميعها دماة اذا جرت. عصارته لينة لزجة حلوة الطعم أو حريفة المذاق. لوئها تختلف باختلاف الأنواع ، منها الابيض والاصفر والاحمر والاريد والبنفسجي || أعرف أنواعه واشهرها ما يلي.

٢٤٩٩٥ - لُكْتُارِيُوسُ اشْعَقُ *

Lactarius rufus (S). *Lactaire roux* (F).
من الفطور المؤذية يكثر في الصيف والخريف يعيش في ظل الصنوبر والسرور. عصارته بيضاء اللون حريفة. ساقه تملو من ٥ إلى ٦ سم. نكتة أظفئة الصفعة الملوية طولها يراوح من ٦ إلى ٩ سم. لوئها إلى الشفعة.

٢٤٩٩٦ - لُكْتُارِيُوسُ بُرْتَقَالِيٌّ *

Lactarius volemus, *L. lactifluus* (S). *Lactaire orangé*, *L. à lait abondant* (F).
من الفطور المأكولة اللذيذة الطعم. عصارته كالخشب لوئها ولزبية وتديفقا. ساقه تملو من ٦ إلى ٨ سم. نكتة تينو قلندرية في اقل مهادا ثم أظفئة وتنتهي مقعرة بتوسطها تملو غليظ. قطرها يراوح من ٨ إلى ٢٠ سم. لوئها يستمر حل الصفرة البرتقالية حتى تتغير فينصرف إلى ذلك إلى الجروي وهو يربد في النباتات الغليظة الرطبة في حمز إلى آب.

فراء اللون يملأها مزاج ذهبي، قطرها نحو ٤ سم. اطرافها مستدلة الكثافة بنسجتها اللون || لحيتها جيدة الصنف، مأكولة.

٢٥٠١١ - **لُكُوسَةٌ شَحِيحَةٌ** *
Laccaria laccata (S).
Laccare laqué (F).

نوع من اللكمة. توجد في المواقع الرطبة. ساقها رفيعة، فراء اللون. اروسيتها شبه صاجية الشكل، قطرها نحو ٤ سم. لونها الى الفضة الصفراء اللامعة، اطرافها بلون الساق || لحيتها جيدة الصنف، مأكولة.

٢٥٠١٢ - **لُكُوسٌ بَلَسْتِيدٌ**
Leucopaste (F).
Leucoplast (E).
هي البوصية الماددة اللون اي مواد الخلية الماددة اللون.

٢٥٠١٣ - **لُكُوسَاتٌ**
Phytolaccaceae (S).
Phytolaccaceae (F).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين. اجناسها ١٧ وانوعها ٩٠. امكانها المناطق الاستوائية والحارة. معظم انواعها حولية ومعمرة. اوراقها بسيطة. ازهارها خشوية او ثنائية المسكن. لا تلياسية التجميع والارتكاز. ثمارها عنبية يستخرج منها صبغات اريوانية. عصارة جذورها حلابية دقة لكمة صناعية.

٢٥٠١٤ - **لُكُوسَةٌ** *
Phytolacca (S).
Phytolaque (F). Dyer's grapes, Poke (E). Gewöhnliche kermesbeere (D). Fitolacca, Amaranto (I).
جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة اللُكُوسَات. انواعها قليلة منها الاشجار والجنابت والاعشاب. اوراقها كاملة متعاقبة بيضية النصل او اهليجية. ازهارها عقنودي التجميع صغيرة القند، ملونة. ثمارها نورية غزيرة العصارة الحمراء تستعمل في سبائك الحمر. جذورها طيبة || اشهر انواعها ما يتبع.

٢٥٠١٥ - **لُكُوسَةٌ ثُنَائِيَّةُ الْمَسْكَنِ**
Phytolacca dioica (S). Phytolaque dioique, Balombra (F).
نوع من اللكمة الشائعة. ثمرتها تملو من ٦ الى ١٥ سم. ساقها فراء فناء، قلقسوية القند ورافة الطل. اوراقها بيضية داكنة طولها نحو ١٢ سم. وتعرض نحو ٧ سم. نصلها اخضر الصفحة الجامدة ينفض في كانون. ازهارها ثنائية المسكن، مستطيلة المتناظرة الاكبرية والاثورية || تنويرها يستمر من ايار الى تشرين.

٢٥٠١٦ - **لُكُوسَةٌ عَشَارِيَّةُ الْأَسَدِيَّة**
Phytolacca decandra (S). Phytolaque à 10 étamines (F).

نوع من اللكمة التزيينية. ساقها منتصبه فراء تملو من ١٠ الى ٣٥٠ سم. اوراقها اهليجية سنائية، نصلها يطول من ١٠ الى ٤٠ سم. ويعرض من ٣ الى ١٠ سم. وهو رطل النسيج اجر الصفحة. ازهارها عقنودي التجميع مستطيل الشكل. ازهارها عشارية ثنائي الاسدية تبدو بيضاء اللون ثم تتحول الى الازرقواني. ثمارها بنسجية عشارية الاصمغ || تنويرها يستمر من حزيران الى اواسط الخريف.

٢٥٠١٧ - **لُكُوسٌ** *
Donovania (S). Lachésis (F).
جنس حيوانات بحرية مقرنة من الرخويات مديات الاربل وفصيلة المريفيات. انواعها المعاصرة المعروفة قليلة

٢٥٠٠٥ - **لُكُوسٌ مُخَدَّدٌ** *
Lycet unipunctatus (S). Lycta canaliculá (F).
حشرة غاشية من اللكوس. طولها نحو ٤ سم. ثوبها الى الشبهة الخطية السمراء المواج، تتبع في الرأس والكتويل وتظهر في غمها المحدثين || يرتها غيرة اللون، جزوية الرأس. حلطية الصدر، مستدلة المؤخر، تركيب معظم الاغشاب الصلبة ومنها المصنوعة، باستثناء العنوبريات.

٢٥٠٠٦ - **لُكُوسِيَّاتٌ**
Lycetidae (S).
Lycetidae, True powder-post beetles (E). Splintkäfer, Holzmehlkäfer (D).
فصيلة حشرات من رتبة لمفديات الاجنحة. اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد. اعطائها جميع مناطق بلاد الشام || حشراتها صغيرة القند، مستطيلة الشكل، فضية الالوان الخطية، صقية الزباني، خاسية الفم الرسنية || يرتها غاشية تنخر وتوردب جميع انواع الاغشاب اعصها الصلبة.

٢٥٠٠٧ - **لُكُوسٌ مُسْتَطِيلٌ** *، **لُكُوسٌ مُسْتَطِيلٌ**
Lixus elongatus (S).
Lixe elongé (F). Lixus elongatus (E).

حشرة غاشية مؤذية من فصيلة السوسيات ورتبة مفدمات الاجنحة. تألف زراعات الشوندر والمواقع التي يكثر فيها السرق. خنافسها تعيش على ما تقتضيه ويخصه من عصارة نصل الارواق. يرتها تخليج الاسناخ وتوردبها فتعطها || جسمها متوسط القند يطول من ١٠ الى ١٥ سم. ثوبها الى اللكمة السمراء يملأها طيل جزوي. رأسها صغير الحجم ينتهي بمخك قاصر ثابت وراش. عينها صغيرتان. زبانا مرتقبان صولجانان ظهرها مستطيل الشكل، مستدير المؤخر للاش. فضاء متابنتا التميزيز الدقيق الغالب. ارسافها رباعية المقل الفاهرة || الاثنى اكبر قدماً من الذكر ورايت ثوباً منه والطول سراً ويتكا || لها جيل واحد في الحول. تظهر الحشرة الجملانة في اوائل الربيع. تسرح في التبار. تسافد بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع وترز المكن ميساديا في اسناخ الشوندر وفي سوق السرق || والبرقة عند بلوغها الكمال تطول من ١٤ الى ٢٢ سم. جسمها شبه اسطواني الشكل، مستدق المؤخر، عادم الرواج، مبهر الحلب، حطلي اللون، اسر الرأس والشرج والمذبل || طوبو الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع ينقضي في التربة قرب النبات المائل.

٢٥٠٠٨ - **لُكُوسٌ**
Piquer (F). To prick (E).
لكع ولدغ ولسب واسع ونخس ونس.

٢٥٠٠٩ - **لُكُوسَةٌ** *
Laccaria (S).
Laccare (F).
جنس فطور من فصيلة الفاريفونيات. انواعها المعروفة قليلة العدد. اعطائها بعض غابات وحراج مناطق البلاد المعتدلة الحارة. جميعها مأكولة لذيلة الطعم، مستحبة المذاق.

٢٥٠١٠ - **لُكُوسَةٌ بَتَسْمَسِيَّةٌ** *
Laccaria amethystina (S). Laccare améthyste (F).
نوع من اللكمة توجد في حراج السديان. ساقها رفيعة، عوياء، ليلكية اللون. اروسيتها شبه صاجية الشكل،



لُكُوسٌ مُخَدَّدٌ



لُكُوسٌ مُسْتَطِيلٌ



لُكُوسَةٌ بَتَسْمِيَّةٌ



لُكُوسَةٌ شَحِيحَةٌ



لُكُوسَةٌ



لُكُوسٌ

۲۵۰۲۳ - **لَمَاجِيَة تَائِبَة** *
Clubiona erratica (S).
Clubiona erratique (F). *Erratic clubiona* (E).

هوبية من العناكب الساعية القانصة ثنائية الروايا ، سداسية الأشقان تنتمي إلى فصيلة الهابيات . موطنها معظم مناطق البلاد المعتدلة الحارة من العالم القديم . جسمها صغير القد بطول نحو ٨ م . عند التكب ونحو ١٢ م . عند التكبنة . صدرها مسطلي الدغلة . سرع في التبار . عندها ستة أحر المولج . صينها زيمتان . شيفهاا ضليمان . فكهاا ديقان . جرازهاا مسطلية ، نجيله ، كثيفة الحب . بطهاا اسر اللون ، أحر المولج ، مابق التزيم . تألف البراري والمواقع الدغلة . تسرح في التبار . عندها ستة بنتلية الشكل والقد تنسجها حيث تبث لانها جولة لا تستقر في مكان معين . قربها الحشرات الصغيرة والاساريع والديدان . يباتها الشتوي يستمر من ١٨ إلى ٢٠ أسبوعا تقريبا في مكعبة جوزية الشكل ، غبراء اللون ، جامدة الحليكة تنسجها تحت الهجارة وفي كل مكان أمين . ملجهاا الحياتي لا يختلف من ملحين سائر العناكب . تعتبر من الدوبيات النافعة .



نم

۲۵۰۲۴ - **لَمَاجِيَة رِيْبِيَة**

Clubiona nutrix, *Chiracanthium punctator* (S).
Clubiona nourrice (F). *Nutrix clubiona* (E).

نوع من العناكب الساعية القانصة ثنائية الروايا ، سداسية الأشقان تنتمي إلى فصيلة الهابيات . موطنها المناطق الحارة من حوض البحر الأبيض المتوسط . جسمها متوسط القد بطول نحو ٢٠ م . عند التكب ونحو ٢٤ م . عند التكبنة . صدرهاا انبوبي الشكل ، اسر اللون أحر المولج . صينهاا زيمتان . شيفهااا نطيطا القفلات الدرة . فكهاا ضليمان . جرازهاا مسطلية مهدبة . بطهاا وفي الشكل ، حنلي اللون ، جوي المولج تملو رشة سودا . تألف الإدغال والسباحات حيث تكثر الباتات الشاككة . تسرح في التبار . قربها الحشرات واساريعها . يباتها الشتوي يستمر من ١٨ إلى ٢٠ أسبوعا . مأولهاا عكوبة صلبة الشكل لا عنقوقة الوسط ، ومتينة الحليكة ، مدغلها من الجهة السفلى . تعيش نحو ثلاث سنوات . الاثنى تموت بعد تقف المكان وضن الصغار ، أما الذكر فيبد الكرم اذ تقضي عليه الاثنى . نشتهاا مؤلفه . سمهاا شديد الفاعلية يؤذي الانسان .



لَمَاجِيَة تَائِبَة

۲۵۰۲۵ - **لَمَاجِيَة مَرْكَبَة**

Clubiona compa (S). *Clubiona parde* (F).

نوع من الهابية الساعية القانصة . موطنها بعض المناطق الحارة من العالم القديم . جسمها صغير القد بطول نحو ٨ م . عند الذكر ونحو ٨ م . عند الاثنى . صدرهاا مسطلي الشكل ، اسر اللون ، أخضر المولج . صينهاا زيمتان . شيفهااا مجهزان ببقاا عجنه نحو الدابل . فكهاا صغيران . جرازهاا نجيله مسطلية ، كثيفة الحب . بطهاا اهليجي الشكل ، اسر اللون . أحر الراكش . تنتهي برزالتين صغيرتين . تألف المروج والمراعي والاراض تسرح في التبار . قربها الحشرات الصغيرة . عندها عكوبة بلاطية الشكل ، حريرية الثواس ، يفضهاا اللون ، تحبهاا تحت قشور الاشجار . تعتبر من الدوبيات النافعة .



لَمَاجِيَة مَرْكَبَة

۲۵۰۲٦ - **لَمَاجِيَات** *
Clubionides (S).
Clubionides (F). *Clubionides* (E).

فصيلة عناكب من رتبة الريتلوات . اجسامها وانواعها

الندد ، اعطانها بحار البلاد المعتدلة الحارة . اصلهاا غرطية عازلة يطوهاا تخنيد قاطب ويمزج ممتزج يست من الفوية إلى السب . فويتهاا اهليجية الانفراج ، جالسة الاريفة العادمة التضخين .

۲۵۰١٨ - **لَم** *
Uria (S). *Lumme*, *Guillemot* (F).
Guillemot (E).

جنس طير من عارة القيات وفصيلة البليريديات . انواعها المعروفة ثلاثة اعطانهاا المناطق الباردة والقطبية ، تزوح عنها في فصل الشتاء والجلد إلى المناطق المعتدلة الحارة . ملجهاا الحياتي جامعي الب . جماعتهاا اسراب لا يحصي لما عدد . قربهاا الاسماك والقشريات والدعايمص . اجسامهاا كبيرة مناقبهاا مسطلية جالسة مهدبة الاطراف المفروسة . مناقبهاا كاسية ، ضيقة ، نافذة من جانب إلى جانب . اجنحتهاا معتدلة الجسم ، ذلقة ، اذناهاا قصيرة ، مستديرة الاطراف الضيقة . اسراهاا قصيرة ، سرية التشبيك . احطبتهاا تحيط بكامل الاسباع . وكناتهاا نقر في الواهز القضاة المشرفة على البحر . الاناث تحضن بمنابرة الذكور . يبيضهاا اجامهاا الشكل والحجم بطول من ٨ إلى ١٠ م . الحطنة بيضة واحدة والترغيم يستمر من ٣٠ إلى ٣٥ يوما .

۲۵۰١٩ - **لَم اِدَجَمَل**

Uria troile (S).
Lumme à capuchon, *Guillemot à capuchon* (F).
Common foolish, *Common guillemot* (E).

نوع من الطير موطنه يست من التاروج إلى جزر القطب . يزوح في الشتاء إلى بعض المناطق المعتدلة الحارة اصحهاا الجزر البريطانية والخطوط الفرنسية والاسبانية والايطالية في المتوسط . جسمه بطول نحو ٢ م . ثوبه اسود الرأس والعنق والرداء والجناحين والذنب ، ابيض الصدر والبطن والتركبي . منقاد إلى الرعدة السوداء المولج . حذقة عينه إلى الشفحة السوداء . رسهاا إلى السمرة الخاطئة .

۲۵۰۲۰ - **لَم اَعْتَس**

Uria grylle (S).
Lumme grylle, *Guillemot grylle* (F).
Black-throated diver (E).

نوع من الطير . موطنه بعض المناطق القطبية . يزوح في الشتاء نحو مجادح البليكي . جسمه بطول نحو ٥٠ م . ثوبه اسود الرأس والعنق والرداء والجناحين والذنب ، ابيض الصدر ، ابيض البطن ويعلمو من عناكب الجناح والاباهر والكل تخنيد مغرض ابيض . حذقة عينه حطلة اللون . منقاد اسود . رسهاا إلى النعسة .

۲۵۰۲١ - **لَم حَرْكَنْدَة**

Uria Mendit (S).
Lumme de Mandt, *Guillemot de Mandt* (F).
Bridled Guillemot (E).

نوع من الطير . موطنه لوازه غرلندة ومجادهها . يزوح في الشتاء نحو جنوب كندا . جسمه بطول نحو ٤٥ م . ثوبه إلى البياض الناصع تملو في الظهر رشة جهورية ويعلمو في الرأس تبقيع اسود أحر المولج وضمان جويواناين وأيسر يمتدان من الشدق إلى الظهر . حذقة عينه متابية اللون . منقاد ادھس ورسهاا كذلك .

۲۵۰۲۲ - **لَمَا**

Raja limma (S).
 سمكة من فئتين البحر اعطانهاا جنوب المتوسط تكثر في المناطق الرملية القاع .

٢٥٠٣٧ - **لثفا ، لثف ، ليمفا**

Lympe (F). Lymph (E).

إخلاط صفراء اللون أو عادية تنقل مصحوبة بالكريات البيض في الاوعية اللمفاوية .

٢٥٠٣٨ - **لثمكسيليات**

Lymexylidae (S). Lymexylidae (F). Lymexylidae (E).

فصيلة حشرات غاشية من رتبة لمديات الانجبة || اجناسها وانواعها عديدة منتشرة في معظم مناطق البلاد المعتدلة الحارة || اجسامها صغيرة القد ، مستطيلة الشكل تتميز بقلعة صلبة القشور وباستعراض الرأس وبكبر العينين الجاحضة وباستطالة الزنابق المركبة من ١١ فصلة . اغدادها قصيرة لا تلتصق كامل البطن . ارباغها خماسية التركيب || يرقاتها تعيش على الاثمار اليابسة او السائرة نحو الياس وعلى الاغصان الممنونة || اشهر اجناسها الكسكيل .

٢٥٠٣٩ - **لثمناريات**

Laminariaceae (S). Laminariaceae (F). Laminariaceae (E).

فصيلة نباتات بحرية من الخفيات السف .

٢٥٠٤٠ - **لثمنارية**

Laminaria (S). Laminaria (F). Laminaria (E).
جنس نباتات غشية من فصيلة اللمناريات تعيش على الصخور البحرية المنورة بالماء ، اوراقها قدية محززة تطول عدة امتار ، فصلها اصفر اللون اسمر المراج . منها انواع مأكولة واخرى علفية وصناعية يستخرج منها اليود والصودا . جميعها مهادية تفقد التربة والنبات .

٢٥٠٤١ - **لثمنارية سكرية**

Laminaria saccharina (S). Laminaria saccharina, Baudrier (F). Devil's-apron, Sweet-tangle (E). Zuckerrentang, Zuckertang (D). Cinture di Nettuno (I).

نوع من اللمنارية المأكولة والمالحة . اوراقها سكرية الطعم تأكلها شعوب البلاد الشتائية .

٢٥٠٤٢ - **لثمنة**

Limnaea (S). Limnée (F). Limnaea (E).

جنس حيوانات مائية من الرخويات مهاديات الارجل وفصيلة اللمنيات . انواعها المعروفة كثيرة العدد منتشرة في جميع بحار العالم ومنها انواع تعيش في المياه العذبة كالبحيرات والخلجان || اصداؤها غشوية المادة ، شبه غلرؤية الشكل ، محلزنة ، مدهية الانقباض ، شداة القلب . اجسامها مستطيلة . لولبية . مستعرضة الرؤوس ، مسطحة الياس السانانية الشكل . عيونها قاعدية الاركانز . ارجلها فردية ، مبططة ، مستديرة الطرف الامامي ، مستنقطة الخلفي .

٢٥٠٤٣ - **لثمنورية**

Limnoria (S). Limnoria (F). Limnoria (E).

جنس دويبات بحرية من القشريات العليا متساويات الارجل وفصيلة الدوبريات . انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض بحار البلاد المعتدلة الحارة || اجسامها صغيرة ، مبططة ، بيضية الشوزن ، نحيلة القوام المعتدلة الطول || اعرف انواعها واشهرها لثمنورية ثاقبة الخشب Limnoria terebrans (S). Limnoria perce-bois (F). مشهورة بالاضرار التي توهمها في اغصان الاسداد واهوافض السفن غير المعالجة ضد هذه الافات .

عديدة تناهز المئة ، منتشرة في معظم البلاد الحارة والمعتدلة الحارة || جميعها مقترنة ، صغيرة القد ، ثنائية الروايا ، سداسية المشاقن ، شياستها مجهزة بقفاز مجعنة نحو الداخل || اثارها تراوح بين الصلبة والشفقة . تعيش في متكادب بلوطية الشكل ، حريرية النراس ، بيضاء اللون ، تحبها تحت قشور الاثمار او تحت الحجارة وبينها || اشهر اجناسها الياجة والكفامة .

٢٥٠٣٧ - **لثماس**

Tactile

صفة التي الذي يتحسس باللمس .

٢٥٠٣٨ - **لثمات**

Palpigrades (F). Palpigrades (E).

فئة من المتكربات . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة ، ففة من المتكربات ، عادمة الجهاز التنفسي ، تطول نحو ١ سم . اجسامها لثنية بدهنية خفيفة ، قصيرة || تعيش تحت الحجارة وفي الماخور الرطبة .

٢٥٠٣٩ - **لثماعة**

Lemna (S). Lemna (F). Lemna (E).

هي القباب اللحية ، اعطبا .

٢٥٠٣٠ - **لثمام**

Lemna (S). Lemna (F). Lemna (E).

عروض تمهدي لاثبات قضية .

٢٥٠٣١ - **لثمام**

Lemna (S). Lemna (F). Lemna (E).

هو النتح الاغضر ، اعطبا .

٢٥٠٣٢ - **لثميركا ، لثميرفيا**

Lambertia (S). Lambertia (F).

نبات مقدود التعريف على اسم العالم الانكليزي ا.ب. ليرت (١٧٦١ - ١٨٤٢) وهو جنبة معمرة برية وريشيتية من فصيلة القصبيات مهادا استراليا . ساقها قرعاه تملو نحو ١٢٠ سم . اوراقها سنانية تطول نحو ٥ سم . وتعرض نحو ٥ سم . فصلها ملت الحافضة ، شاكك النقصه لامع الصفحة العليا خلي السفل . ازهارها مستديرة التجميع صغيرة القد ارجوانية اللون . ثماره جزائية الشكل مسلمة بقفزين مستطيلين . تنوره يستمر من تموز الى آب .

٢٥٠٣٣ - **لثمبروش**

Lampid (S). Lampid (F). Lampid (E).

هي كرة لبروش ، اعطبا .

٢٥٠٣٤ - **لثميد السنف**

Lampid (S). Lampid (F). Lampid (E).

فراشة من فصيلة اللقنيات . اعطباها فصيلة الارباء تشغل البلاد الاسيوية والافريقية . جسمها احمر اللون ازرق المواجه . ذكرها يطول نحو ٣٤ سم . رواشه الى الزرة البنفسجية يعطها تمشيع سلق حاق وبوطها اطار اسمر || انتاعها تطول نحو ٣٨ سم . رواشها ازرق الانتشاب خطية اللون يعطها تمشيع افر || يرقاتها تركب سف نباتات الفصيلة القرنية وتقرض البور قبل ادراكها .

٢٥٠٣٥ - **لثمة**

Lamod (S). Lamod (F). Lamod (E).

مجموعة افراد نباتية من صرم واحد تتميز بصلفات خاصة ثابتة . والمة لا تأتي الا عن طريق التمثيل والتفصيل . واذا تكاثرت بالبرر فقدت صفاتها المميزت ولم تعد لمة .

٢٥٠٣٦ - **لثمدور**

Lamod (S). Lamod (F). Lamod (E).

جنس نباتات طفيلية من السطيليات . انواعها المعروفة قليلة . اوراقها متراكبة سرغشية الشكل واللدة ، زرقاء النصل . ازهارها سنبلية التجميع . ازهارها صغيرة بنفسجية اللون || منبتها الادوية والمواقع الظليلة الرطبة .



لثمد السنف



لثمنارية سكرية



لثمة

الناشة . تنبت برؤسها الجزلة وبقوائمها الامامية الشديدة النطق الهجزة لما السطفت كما في البرصوة أو القيقص كما في المغرب بواسطة اطرافها المثلثية الشكل || جمع اجناسها غائلة تعيش من قنصها . اشهرها البعيدة .

٢٥٥٥ - **لَمِيَسَة** *
Gnathopode (F).
Gnathopodite (F).
زائفة متكية أو ضفوية تكون عند بعض القشريات .

٢٥٥٦ - **لَمِيَطَة** *
Limulus (S).
Limule (F). Limulus (E).

جنس حيوانات بحرية من المفصليات وفضيلة العظيديات . انواعها قليلة العدد منتشرة في بعض بحار البلاد الحارة || اجسامها شبه مستديرة الشكل ، ملحوفة الظهر بدروع مجننة يتصل بها في مؤخرتها سراديب مستطيلة حادة الاطراف . واجسامها هذه تتكون من جزئين ، جزء امامي ملحوف يحمي نصف دائري يغلظ الصدور والبرص والبرص والبرص ورسه ازواج من القواس التي تحرق اللحم . زوائدها الصدرية تستعمل كجهاز للانتقال والركوب . اما الجزء الثاني ففلاحة شبه محرم الشكل ينتهي بمجرود حاد الطرف . وهو عند قاعدته يلفف حبة ازواج من الجرامز المعدة للعباسة || بعض انواعها مأكول . انحصار ليطه انثونسيه ويتكاثرون نوع آخر كبير القد يطول نحو ٢٥٥ سم . يكثر وجوده في بحار شمال الولايات المتحدة .

٢٥٥٧ - **لَمِيَطَة أُنْدُونِيَسِيَّة** *
Limulus moluccanus (S). Limule des Moluques (F).
نوع من اليطه يكثر وجوده في مياه اندونيسية . جسمها كبير القد ، يطول من ٩٥ الى ١١٥ سم . بما فيه المروء || لحمها مأكول ، مرغوب فيه .

٢٥٥٨ - **لَمِيَطِيَّات** *
Limulidae (S).
Limulids (F). Limulidae (E).
فضيلة من المفصليات الشبيهة بالمرسويات . اجناسها وانواعها القليلة كانت عديدة وقد انقرضت ولم يبق منها سوى بعض الانواع تنتمي الى جنس واحد يلحق ليطه .

٢٥٥٩ - **لَمِين** *
Lemmus (S). Lemming
جنس حيوانات ليلية قاصفة من المفصليات وفضيلة العظيديات . انواعها عديدة . اجسامها صغيرة القد مبطنة البلاد الباردة تجوزها من الجنوب الى الشمال || اجسامها ربعة ، طولها يراوح من ١٥ الى ١٨ سم . وذانها من ٢ الى ٣ سم . مقاسها مقنونة . اذنانها صغيرة . جرامزها خامة الاصابع . انظروها حادة حامة . اذواها الى الفردة الصفراء يعلوها تبيج اسمر . يطونها الى الصفراء الرلي . جرامزها وذانها صفر || قوتها الاشباب والجلود والحزاز .

٢٥٥٥ - **لَمَارِيَّة** *
Lanaria (S).
Lanaira (F). Lanaria (E). Lanarie (D). Lanaria (I).
جنس نباتات عشبية جسمية مادة معمرة من فضيلة الترجيبات . انواعها قليلة تنبتا افريقية الجنوبية . تزود لثريين .

٢٥٥٦ - **لَمَنَجُور** *
Sennopithaque (F).
نوع من القردو المقصدة يدهي حبار ، اطلبه .

٢٥٥٧ - **لَمَنَجِيَّات** *
Lonchitis (F).
هو القسم ، من النباتات الطيبة والثرينية .

٢٥٥٤ - **لَمَنِيَّات** *
Limnidae (S).
Limnoides (F). Limnidae (E).
فضيلة حيوانات مائية من الرضويات مغذيات الاصيل ورتبة الرلويات المائية . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار وبحيرات العالم . قوتها التوت المائية والفرع || اصنافها لاحقة ، شبه خلروفية الشكل . مغزلة الاطراف ، سدفاً الولب || اعرف اجناسها واشهرها اللبنة والياكم والولب والاصليل .

٢٥٥٥ - **لَمُونِيَّة** *
Lemonia (S).
Lemonia (F). Lemonia (E).
جنس حشرات من فصيلة اللوليات ورتبة حشرقيات الاجنحة . انواعها المعروفة ٢٥ بعضها يألف الاقاليم الباردة وبعضها الآخر يعيش في المناطق المعتدلة الحارة والباردة || اجسامها كبيرة ، عضلية ، يفرها الخمل . بسطتها تراوح من ٤٥ الى ٥٥ سم . رؤوسها مزوانية الشكل . حيويتها صغيرة ، بارزة . اخطائها وبلاستها قصيرة . قرونها الاستدمارية مشطية . اجنحتها كبيرة ، ملونة ، مجنحة ومتقطعة . اذواها قليلة الزخرفة || اسارها مثاقط يعلوها طب دقيق . تألف البراري جميعها عاصلة تعيش على معظم ثبوت فضيلة المركبات واعصها المتدب .

٢٥٥٦ - **لَمُونِيَّات** *
Lemoniidae (S).
Lemoniids (F). Lemoniidae (E).
فضيلة حشرات من رتبة حشرقيات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد ، معظمها شبيهة بالاطان وبعضها يألف المناطق الحارة والمعتدلة الحارة || اجسامها كبيرة ، عضلية ، يغلظها خمل مستطيل . بسطتها تراوح من ٤٥ الى ٥٥ سم . رؤوسها معتدلة الجرم . حيويتها صغيرة . اخطائها شديدة القصير . ملاسها صغيرة . قرونها الاستدمارية مشطية مزدوجة . اجنحتها كبيرة عادمة الزخرف . اذواها زخرف || اسارها مثاقط التفتار يعلوها بعض الحلب || اشهر اجناسها القمونة .

٢٥٥٧ - **لَمِيَّات** *
Uriens (F).
عمارة طير من فصيلة البطرقيات . اجناسها وانواعها قليلة العدد جميعها من طيور المناطق القطبية والباردة || تتميز باجسامها الكبيرة ، بريشها البلس ، بارساها البردية ، ويمتدتها المائلة الافلاك المعتدلة الاحدياب ، القليلة الانضغاط والارتفاع || اما اجناسها فهي الخم والمرغول والرخيلان .

٢٥٥٨ - **لَمِيَّاتَة** *
Phymata (S).
Phymate (F). Phymata (E).
جنس حشرات قاصفة من فصيلة الهيديات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في بعض مناطق البلاد المعتدلة الحارة والباردة || اجسامها صغيرة تطول من ٦ الى ١٥ سم . اشكالها مستغربة لأمأثرة . رؤوسها جزلة شاذكة . اخطائها قصيرة شديدة النشط . قوائمها الامامية مجنحة للخطف || اذواها متباينة الالوان تكثر فيها الشقعة والسمرة || جمع انواعها ناعمة لانها تنقص على الحشرات الضارة .

٢٥٥٩ - **لَمِيَّاتِيَّات** *
Phymatidae (S).
Phymatids (F). Phymatidae (E).
فضيلة حشرات من رتبة مختلفات الاجنحة وطبقة تصفيات الجناح . اجناسها وانواعها المعروفة كثيرة العدد بعضها من علم المناطق الحارة || اجسامها صغيرة غريبة الاشكال



لَمِيَطَة



لَمِيَطَة



لَمِين



لَمِين

* ٢٥٠٥٨ - لندلفية

Lennos

جس نباتات عشبية طفيلية من فصيلة النورات . انواعها المعروفة ثلاثة منها بلاد المكسيك .

* ٢٥٠٦٤ - لنويات

Lennosaceae (S).

Lennosaceae (F). Lennosaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين متعددة العقالات . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد . اعطائها بعض مناطق المكسيك || جميع نباتاتها عشبية طفيلية . اوراقها سهقية . ازهارها صغيرة ، سنية الازتكار || اشهر اجناسها لنوا .

* ٢٥٠٦٥ - لينغود

Lignyodes (S). Lignyode (F).

جس حشرات خاضعة من مخدبات الاجنحة رضية السويات . انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض مناطق البلاد المعتدلة الحارة . يكثر وجودها على المران واليك والباس ، خاصة في زين الازهار || اجسامها صغيرة ، شبه بيضبة الشون ، تطول من ٤ الى ٦ سم . اذواها الى الشقعة السفلى ويلوها ، في بعض الانواع ، تبقي اصود متفاوت الراسبة يكتنف الاحاد .

* ٢٥٠٦٦ - لنس

Lanlo (S).

Lanlon (F). Lanlo (E).

جس طير من الجوامح مخروطيات المنابر وفصيلة التنفريات انواعها المعروفة خمسة موطنها المناطق الاستوائية من البلاد الامريكية . تألف الاجراج . ملجئها الحيائي جماعي باستثناء زن التسايف والحضانة والتعليل ، جماعاتها قليلة العدد . قوتها الحشرات والبرود والثار النبتية البرية والزراعية || اجسامها ريمة تطول من ١٥ الى ٢٥ سم . رؤوسها معتدلة القد . مناقبها مخروطية . اجنحتها مستطيلة ، ذلقة . اذناها مقعرة شبه مفروقة . اذواها تختلف مع الانواع فيها الاسفر والاحمر والاداس والخضر الاسم ، جميعها مبلقة او مبيضة بالاداس || تدث اعشاشها في الادغال القريبة من سطح الارض . الاناث تحضن صدها من ٥ الى ٧ بيضات بينا الذكور تؤذن لها الحاية والذاد .

* ٢٥٠٦٧ - لهاسة ، ليسان المزمار

Epiglottae (F).

Epiglottis (E).

الهاسة او لسان المزمار سقاط لبني - غصنوني يقع في الجزء العلوي من الحنجرة .

* ٢٥٠٦٨ - لهاسة الجروود

Xanthorhoe montanata (S). Xanthorhoe des

montagnes (S). Xanthorhoe montanata (E).

فراشة من فصيلة الازليات ورتبة حرشليات الاجنحة . موطنها بعض جبال حوض البحر الابيض المتوسط والمناطق الداخلية الناحية . قوتها رقيق الازهار . سرقتها خاضعة تدث على اوراق النبات || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٣ سم . يسلها نحو ٣٧ . رأسها حنطي اللون . عينها صغيرتان . زباناها مشطيان عند الذكر ، عيطيان عند الانثى . جوشها ويطها في الحنطي الاشعع المالح || وراشها عند الشقير الى الحنطي الاكثف يملو في الزوج الامامي تحفج ابيض واخر وبقعة وسطى شديدة السرة تنتهي بشقين متصلها نقطة سمر . ويملو في الزوج الخلفي تحفج اسمر وعضان من الزراكش . اهداها الى الشقعة || لها جبل واحد في الحول . تظهر الفراشة في

Landolphia (S).

Landolphie, Vahé (F). African rubber tree (E).

Kanschuklane (D). Landolphia (I).

جس اشجار وشجيرات برية وزراعية من فصيلة البفليات . منها افرقية افريقية ومغسفر . سوقها جاسية ، مائبة سمر اللون . اوراقها متعاقبة ، نصلها لامع الصفرة الجاسدة . ازهارها تائبة || يستخرج من جلونها بالحز عصارة مطاطة صناعية تستعمل استعمال المطاط .

* ٢٥٠٥٩ - لنزيت

Lanztees

نظر من السيات ركب الاشخاب المقطوعة من فصيلة الصنوبريات . مظهره الخارجي قطر صغير القد لونه الى الجلوة ، نكتة مفلطحة ، قطرها نحو ٣ سم . سطحها الادل مستدير التخذيد ، تملو احاديده حراشف ورر هيفية متناسبة البعد شبهة اللون . لبابه قليل السابة ، لبني التركيب ، حنطي اللون . يوفاته اسطوانية الشكل قياها نحو ٣٨٨ ميكرون || مشبهه بتمري الاشخاب المقطوعة فيسب عنها وانحلاها يمد ان ينطقها بوشل كندف القطن لونه الى الصفرة البرتقالية ثم ينحرف الى الحنطي || يكاتب عرق الاشخاب المصابة ويصطبر السلطة بأحد المركبات القعالة كالفيتول والكرينول .

* ٢٥٠٦٥ - لنسان

Linsang (S).

Linsang (F). Linsang (E).

جس حيوانات لاحمة مفترسة من فصيلة الزباديات . انواعها المعروفة ثلاثة موطنها الهند الصينية وجزر الزايج . تألف النابات والرايض . ملجئها الحيائي شري الذكر يكوم عدة اناث والاثى تحاطط عدة ذكور || اجسامها مستطيلة الشكل هيفاء تطول من ٦٥ الى ٨٥ سم . بما فيه الذنب . رؤوسها صغيرة ، شبه مخروطية الشكل . اذناها صغيرة ، كاسية . عينها مائحة ، حادة البصر . اذناها مستطيلة ، سداسية او ثمانية الاطواق ، بالنسبة الى النورح . فرائها قصيرة اللوير اليد النام . اذواها سبيقة ، مرقشة ومندرة || اناثها ثنائية الاثداء والجارء ، تضع على مرقين في الحول . المرة الاولى في اواخر شباط والثانية في اواسط آب || سرعتها دجوي . قوتها الطير والحيلون الصغير || اما انواعها الثلاثة فهي :

Linsang pardicolor (S).

Linsang pardicolora (F).

Linsang gracilis (S).

Linsang gracieux (E).

Linsang maculosa (S).

Linsang maculé (F).

* ٢٥٠٦١ - لنشون

Ammodysse lanceolatus (S).

Lançon (F).

سكة بحرية من فصيلة الرماليات . اعطائها مظهر شطوط بحار البلاد المعتدلة الحارة || جسمها شبه اسطواني الشكل قليل التبسيط يطول من ٢٥ الى ٣٥ سم . رأسها صغير الجسم مستطيل الحنط . فكها السفلي يتقدم العلوي . زعنفتها الظهرية قاطبة يتقدمها متخس حاد . زعنفتها الشريعية تمتد من اواسط البطن الى الذيل . زعنفتها الذيلية فارقة ، ثوبها الى الرقعة القضيية يسر ويميق في النصف العلوي || لحما جبه الصفه مرقوب فيه .

* ٢٥٠٦٢ - لنشف

Lançon (F). Lançon (E).

Lançon (S). Lançon (E).

Lançon (F). Lançon (E).



لندلفية



لانس



لنسون



لنيدود



لنيدود

٢٥٠٧٨ - **لَهْوِيَّةُ لَاطِفَةٌ** (S). *Uvularia sessilifolia* (F).
نوع من اللهوية تملو نحو ٣٠ سم. أوراقها لاطفة أحليجية
نصلها بطول من ٤ إلى ٨ سم. صفته السفل إلى الخصار
الازرق للملج. أزهارها توليئة الانتشاب صغيرة القد
تطول من ١٥ إلى ٢٥ سم. لونها إلى الصفرة الباهتة .
أزهارها يستمر من أيار إلى حزيران .



لهوة

٢٥٠٧٩ - **لَهْوِيَّةٌ مُتَقَوِّيةٌ** (S). *Uvularia perfoliata* (F).
نوع من اللهوية تملو من ١٥ إلى ٥٠ سم. أوراقها متقوية
تتحرقها السوق وهي متعاقبة سنائية الشكل، نصلها بطول
من ٤ إلى ٨ سم. وهو مائل الصفحة، أخضر العليا،
باهت السفل. أزهارها تطلو من ٢ إلى ٣ سم. يتلأها
مدنية الاطراف لونها إلى الصفرة الجليسة || أزهارها
يستمر من أيار إلى حزيران .



لهوة

٢٥٠٨٠ - **لَهْوِيَّةٌ مُهْدَبَةٌ** (S). *Uvularia puberula* (S).
Uvularia à feuilles ciliées (F).
نوع من اللهوية السروية تملو نحو ٤٠ سم. أوراقها
متعاقبة سنائية، نصلها جامد صفحة، أخضر اللون،
مهذب الحافة، بطول نحو ٥ سم. أزهارها مقطوعة البتلات
تطول نحو ٢٥ سم. لونها إلى الصفرة الكبريتي || أزهارها
يستمر من أيار إلى حزيران .

٢٥٠٨١ - **لَهَيْبٌ ، حَمِيرَكٌ**
Ruticilla, Phoenicurus (S). *Rouge-queue* (F). *Redstart* (E).
جنس طير من فصيلة الشروريات. أنزاه كثيرة العدد
أصلها العالم القديم تكثر في البلاد الاسيوية || جميعها
صغيرة القد، رشيقة القلوب، قصيرة المتنار، مستطيلة
الجناح، ونية الراس، دجلة الريش، جميلة اللون.
أثواب أناتها أقل زركشة وزاه من أثواب ذكورها.
قوتها الحشرات على اختلاف أنواعها. تنش || غذائها
الصغور وتجاويف الأشجار || أشهر أنواعها ما يلي .



لهيب أسود الرأس

٢٥٠٨٢ - **لَهَيْبُ أَسَدُ الرَّأْسِ ؟**
Ruticilla tithys, Phoenicurus ochruros (S). *Rouge-queue tithys, Rouge-queue noir* (F). *Black redstart* (E).
طائر من اللهب طوله نحو ١٦ سم. ثوبه ثوب اللهب
الاسود الأزود باستثناء الرأس الذي يمه السواد والألأهر
المنجبة بالأبيض. تفريده في الإلأخ. حصفته تراوح
من ٥ إلى ٦ بيضات تقوم بها الإلأخ دون الذكر.

٢٥٠٨٣ - **لَهَيْبُ أَسَدُ الزُّورِ ؟**
Ruticilla phoenicurus, Phoenicurus phoenicurus (S). *Rouge-queue à gorge noire, Rouge-queue à front blanc, Rouge-queue de muraille* (F). *Common redstart* (E).
طائر من اللهب طوله نحو ١٥ سم. ثوبه جميل الألوان
المترابكة، وأسه إلى الكمية الزرقاء تتوسطه بقعة بيضاء
تمتد إلى الجبهة. زوره اسود، ظهره إلى الكمية الرمادية
يطوها موج أزرق. جوش وإيلأه وذكاه وذنبه إلى
الصهبة الصنابية الزاهية. ريشه عزالانه وقوامه جناحه إلى
السرة الخفيفة، أباهره إلى الصهبة. حدة عينه سنائية
اللون. منقاره وبيلاؤه إلى السرة السوداء || أنثاه تحضن
مرتين في العام، الأولى في أواسط نيسان والثانية في أوائل
حزيران. حصفته تراوح من ٥ إلى ٨ بيضات .



لهيب اسود الزور

أوائل حزيران وتبقى حتى أواخر تموز. تشرح من البصر
إلى قصبة الليل. تماثل بعد ظهورها بنحو ستة أسابيع
وتتبع لكن ميحادا على الصفحات السفل من نصل
الازراق || السرة تملو نحو ٢٨ سم. جسمها اسطواني
الشكل، كثيف الحب القصير. ثوبا يماثل البيت التي
تدلى بها وهو يبراح من الخصار البصري إلى الربة
والفهي الصفر، يملو ثلاثة خطوط قاطبة إلى الجوفة.
رواجبها البطينية الوسطى ماسحة مما يجعلها تنقص عند
الانقصال || طول الكامل الذي يستمر نحو ١٥ يوما
ينقص في الجافة .

٢٥٠٦٩ - **لَهَاقُ**. *Taureau blanc* (F). *White bull* (E).
الهاق: الثور الأبيض. وكل أبيض لاق ولواق. بقرة
لاق ولقة. ثم، ملهق اللون: أبيضه .

٢٥٠٧٠ - **شَجَّةٌ ، نَحْطَةٌ**
Emphysème pulmonaire (F). *Pulmonary emphysema* (E).
تعريف أيضا بارتفاع الرئة، داء يصيب الهائم في صدورها
لا تكاد تسلم منه، وهو في الخليل من السيوب المبطة
ليبح .

٢٥٠٧١ - **لَهْمٌ**
اللهم هو اللبن من الحيران ولخصها حيران القعابية
كالبقر والغنم والماعز. ج. لوم .

٢٥٠٧٢ - **لَهْمٌ**
Lehm (F). *Loam* (E).
عن الأمير مصطفى الشهابي. تربة مكونة من غرين وبل
وصلصال بنسب متعادلة لا يسد فيها عنصر حل آخر .

٢٥٠٧٣ - **لَهْوِبٌ**
قابل للإلتهاب أو سريع الاشتعال أو الاحتراق .

٢٥٠٧٤ - **لَهْوِيَّةٌ**
في قابلية الإلتهاب أو الاشتعال .

٢٥٠٧٥ - **لَهْوَرَةٌ ؟**
Isothecium (S). *Isothecium* (E).

جنس طحالب من جانبيات اللحاء. أنزاه المعروفة نحو
٣٠ مبتها المناطق المحتلة للحارة من العالم القديم. تعيش
على الصخور في المواقع الرطبة || سوقها دقيقة، نخيلة،
مدادة. أوراقها مترابكة شديدة الصفر. ضباطها جرابية
مستطيلة المالحق المنصبة .

٢٥٠٧٦ - **لَهْوِيَّةٌ ؟**
Uvularia (S). *Uvulaire* (F).
جنس نباتات جلمورية عشبية زربنية معمرة من نصيلة
الزنبقيات. أنزاهها المعروفة ستة. سوقها دقيقة، نخيلة
نزهة. أوراقها لا قياسية الشكل والانتظام. أزهارها
لردية أو توليئة الانتشاب، أبعية الانتكاز، سدنية
البتلات المستطيلة المتدلدة، لونها إلى الصفرة || أصر
أنزاهها ما يتبع .

٢٥٠٧٧ - **لَهْوِيَّةٌ كَبِيرَةٌ الزَّهَرِ**
Uvularia grandiflora (S). *Uvulaire à grande fleur* (F).
نوع من اللهوية السروية. تملو من ٣٠ إلى ٥٠ سم.
أوراقها متعاقبة سنائية، نصلها بطول من ٦ إلى ١٠ سم.
وهو مائل الصفحة العليا الخضر، خلى السفل الطحلاء.
أزهارها كبيرة القد تطلو من ٣ إلى ٤ سم. لونها إلى الصفرة
الجليسة || أزهارها يستمر من نيسان إلى حزيران .

٢٥٠٨٩ - **لُوبَابُ الْمُتَوَسِّطِ** * ، **لُوبَابُ مُسْتَحَقَّ** *
Lupa hastata (S). Lupa armée (F).

نوع من اللوباب. اطلانه بعض مناطق البحر الابيض المتوسط جسمه صغير القد بطول نحو ٣٠ سم. ويمرض نحو ٦ سم. ثوبه متداخل الالوان فيه الاصفر والاديس والاصفر والاشعث والاصفر ويملو في القسم الخلفي من دربه ثلاث نقط مستديرة جوية اللون.

٢٥٠٩٠ - **لُوبَابُ الْهِنْدِ** *
Lupa des Indes (F).

نوع من اللوباب. اطلانه شطوط الهند الجنوبية. جسمه كبير القد بطول نحو ١٥ سم. ويمرض نحو ٣٠ سم. ثوبه متداخل الالوان الجسيلة فيه الازرق والاحمر والبزقالي والاصفر والاشعث والصفاني.

٢٥٠٩١ - **لُوبَابُ**

Carnassiers, Carnivores, Fauves (F). Carnivorosa, Fallow-deer (E).
رتبة من الحيوانات البقرة آكلات اللحوم. فصائلها عديدة اشهرها السنوريات والكلبيات والذبيات والضببات والسموريات والزباديات ...

٢٥٠٩٢ - **لُوبَاة** *
Loasa (S). Loasa, Loase (F).
Loasa (E). Loasa, Nesselinie (D). Loasa (I).

جنس نباتات شبيهة حولية برية وتربيتين من فصيلة اللوزيات. انواعها قليلة جميعها زباء. زهبا حارق كالفراس. اوراقها متعاقبة، مفرصة. ازهارها فردية، محورية الارتكاز، تقابل الاوراق وهي خماسية التركيب، جميلة الشكل، نارية اللون تصاحب بعض الوقت. ازهارها يستمر طوال الصيف.

٢٥٠٩٣ - **لُوبَايَات** *
Loasaceae (S).
Loasacées (F). Loasaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة القائلات اجناسها. وانواعها قليلة، معظمها اشجار حولية ومحولة. اطلانها امريكية الاستوائية.

٢٥٠٩٤ - **لُوبَاب** *
Abellés (F).

اللوب هو النسل والارب ايضا.

٢٥٠٩٥ - **لُوبِيَا** * ، **لُوبِيَاء**

Dolichos unguiculatus (S). Dolique, D. asperge (F). Black eyed dolichos, Asparagus bean (E). Riesen Spargelbohne (D). Dolico asparago, Fagiolo dall'occhio (I).

نبات حشبي زراعي حولي من فصيلة القرنيات الفرفاشية. ضروره كثيرة العدد زرع لقرونها الخضراء القليلة او لزورها الجافة || وهي تجود في جميع الارربة القليلة الانساج الممكن رعا. يزورها وافر المادة الغذائية تحوي مسا قدره:

من المواد الارزوية	٢٣,٢٤ ٪
من المواد الدهنية	١,٣٠ ٪
من المواد الهيدروكربونية	٥,٦٨٠ ٪

٢٥٠٩٦ - **لُوبِيَاءٌ بَلَدِيَّةٌ** *
Dolic de China (F).

هي الدجر الصيني، اطليه.

٢٥٠٩٧ - **لُوبِيَاءٌ سُوْدَانِيَّةٌ** *
Ambrevade (F).

هي البسلة الهندية، اطلبا.

٢٥٠٨٨ - **لَهَيْمَةٌ** *
Crenilabrus (S).
Crénilabre (F). Crenilabrus (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الكيدييات شائكات الزعانف. انواعها المعروفة نحو ٣٠ منتشرة في معظم بحار العالم || اجسامها شبه اطليجية الشكل تغطي من ١٥ الى ٣٥ سم. رؤوسها اسطوانية. زعانفها الظهرية مستطيلة. زعانفها الذيلية مقطوعة. سوافنها ملسة. الوبا جميلة الالوان المراكبة الزاجية تتركز على الريدة الفضية تعلوها خطوط ومجاذيب ومعييات ترواح من الاحمر الى الاصفر والاحمر || اسماك هذا الجنس تسرا في وكناث من الحث وتتفقد السر، وتحافظ عليه حتى التقف || لحومها متوسطة الصنف، مأكولة.



لهيمه طاروسية

٢٥٠٨٥ - **لَهَيْمَةٌ طَلُوسِيَّةٌ** *

Crenilabrus pavo (S). Crénilabre pavo (F).
Crenilabrus pavo (E).

نوع من لهيمه. سمكة بحرية بيضاء. اطلانها بعض اقالم البحر الابيض المتوسط. تعتبر من اسماك المباح وحشاش || جسمها اطليجي الشكل، معتدل التنطيط بطول نحو ٣٥ سم. لوبها متراكب الالوان القسطانية الجسيلة. الذكر اكبر قدا من الانثى واكثر تزويجا ولملح خضابا. رؤسها مخروطي الشكل. فكها قويان، متماثلان. شفتها معتدل الانترجاج. عينها كبيرتان، جاحطتان، باتوتيتان. زعنفتها الظهرية مستطيلة، لامتساوية الارتفاع. زعنفتها الذيلية مستديرة الطرف والزوايا || لحمها جيد الصنف، مرغوب فيه.



لهيمه مبدولة

٢٥٠٨٦ - **لَهَيْمَةٌ مَبْدُولَةٌ** *

Crenilabrus melops (S). Crénilabre common, C. mélope (F). Crenilabrus melops (E).

نوع من لهيمه. سمكة بحرية بيضاء. اطلانها معظم اقالم البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي. تعتبر من اسماك المباح وحشاش || جسمها اطليجي الشكل معتدل التنطيط، بطول نحو ١٨ سم. لوبها متباين الخضاب بين الذكر والانثى. اللون الجوزي يمسد عند الذكر والاخضر الخفني عند الانثى. ويلو عند الشقين. حائل اسود راء كل عين وبقيعة سوداء قرب قاعدة الزعنفة الذيلية. رؤسها مخروطي الشكل، ذلق الحلق، معتدل الشفق. عينها كبيرتان، جاحطتان. زعانفها ملوكة. الظهرية مستطيلة والذيلية مقطوعة الطرف || لحمها جيد الصنف مرغوب فيه.



لوب المتوسط

٢٥٠٨٧ - **لُوبَاء** *
Torcou (F).

طائر من النقاويات يعرف بابي لوي، اطلبه.

٢٥٠٨٨ - **لُوبَاب** *
Lupa (S). Lupa (F). Lupa (E).

جنس منوع من الشجيرات حشويات الارجل قصيرات القليل وفصيلة الخيتليات. انواعه المعروفة قليلة العدد اطلانها بحار البلاد الحارة اخصها المحيط الهندي || اجسامها متغايرة القد، شديدة التباين الجسمي. تتميز بدروعها المصمتة وبامتداداتها الجانبية التي تأخذ شكل الاسنة او الحراب. حمار دروعها الاسمية منشاري الشكل. ارجلها الخلفية عملاقة الفصل الطرفية. ملاقطها مستنة شبيهة || اشهر انواعها لوباب الهند ولوباب المتوسط.



لوبيه

٢٥١٠٧ - **لُوبِيَلِيَّةُ زَرْقَاءَ** ، **لُوبِيَلِيَّةُ السُّفْلِسِ**

Lobelia syphilitica (S). Lobélie syphilitique, Cardinale bleue (F).

بجلة طبية وزينة معمرة تملو من ٤٠ إلى ١٠٠ سم. ساقها فراء. أوراقها سنانية ذلقة طول نحو ١٥ سم. تصلها مالم الصفحة المسنة الحافة. أزهارها سبيلية التجميع تاجية الأبركان طول نحو ٣ سم. لوئها إلى الزرقاء البنفسجية المواج || أزهارها يستمر نمو إلى تشرين. كانوا ولا يزالون يستعملون أزهارها وزهورها وجذورها في معالجة السفلس.

٢٥١٠٨ - **لُوبِيَلِيَّةُ سَاطِعَةٍ** ، **Lobelia fulgens** (S). **Lobélie éclatante** (F).

بجلة زينة معمرة تملو من ٦٠ إلى ٩٠ سم. ساقها قليلة الفروع. أوراقها لاطئة لسة تصلها مسن الحافة ، أغصن جوي اللون خفي البشرة ، أزهارها كبيرة القد ، خلية القنابات الدرية ، برتقالية اللون || أزهارها يستمر من أيار إلى أيلول.

٢٥١٠٩ - **لُوبِيَلِيَّةُ قَاصِرَةً** ، **Lobelia splendens** (S). **Lobélie splendide** (F).

بجلة زينة معمرة تملو من ٦٠ إلى ١٠٠ سم. ساقها فراء. أوراقها لاطئة لسة تصلها مسن الحافة ، أغصن الصفحة ، جوي المختار. أزهارها كبيرة القد ، أرجوانية اللون ، برتقالية المواج || أزهارها يستمر نمو إلى تشرين الثاني.

٢٥١١٠ - **لُوبِيَلِيَّةُ قُرْعَاءَ** ، **Lobelia ramosa** (S). **Lobélie ramifiée** (F).

بجلة زينة معمرة تملو من ٣٠ إلى ٦٠ سم. ساقها أسطوانية زياء. أوراقها السفلى ريشية غرمة. أوراقها لاطئة سنانية مدببة الزام الأغير. تصلها خفي البشرة الحافة اللون. أزهارها كبيرة القد لوئها إلى الزرقاء || أزهارها يستمر نمو حيزان إلى آب.

٢٥١١١ - **لُوبِيَلِيَّةُ لِرْهَازِيَّةَ** ، **Lobelia cardinalis** (S). **Lobélie cardinale** (F).

بجلة زينة معمرة تملو من ٦٠ إلى ١٢٠ سم. ساقها قليلة الفروع ، أوراقها لسة سننة. تصلها مالم الصفحة يطول من ٥ إلى ١٥ سم. أزهارها قرمزية اللون لا متشاربة القنابات || أزهارها يستمر من أيار إلى أيلول.

٢٥١١٢ - **لُوبِيَلِيَّةُ كَرْلِيَّةَ** ، **Lobelia amana** (S). **Lobélie de la Caroline** (F).

بجلة زينة معمرة تملو من ٦٠ إلى ١٤٠ سم. ساقها فراء. أوراقها أحليبية سنانية تطول من ١٠ إلى ١٥ سم. تصلها مالم الصفحة المسنة الحافة. أزهارها سبيلية التجميع ، تاجية الأبركان، لوئها إلى الزرقاء الباهتة. أزهارها يستمر نمو إلى أيلول.

٢٥١١٣ - **لُوبِيَلِيَّةُ مُحَرَّرَةً** ، **Lobelia urens** (S). **Lobélie brûlante** (F).

بجلة برية طبية معمرة تملو من ٣٠ إلى ٧٠ سم. تعيش في المناطق والأراضي الرطبة ، مهدها الخد. يقال أنها جمالية المادة قلتها تغيد المدة ، كثرها مؤذية. ساقها زياء اللحاء. أوراقها مزغيرة. زغبها محرق قارس. أزهارها وردية اللون.

٢٥١٠٨ - **لُوبِيَلِيَّةُ عَشْوِيَّةَ** ، **Dolique balbeux** (F).

هي النامر ، أطبله.

٢٥١٠٩ - **لُوبِيَلِيَّةُ نَهْلَابِيَّةَ** ، **Dolic lablab** (F).

هي اللباب المصري ، أطبله.

٢٥١١٠ - **لُوبِيَلِيَّةُ سِيكَلَتَ** ، **Dolique à osil noir** (F).

هي اللجر ، أطبله.

٢٥١١١ - **لُوبِيَزَكَة** ، **Lopezia** (S).

Lopézia (F). **Lopezia** (E).

جنس نباتات عشوية برية وزينة من فصيلة الأحمديات. مهدها بعض مناطق أمريكا الجنوبية والمكسيك || ساقها ترتفع من ٣٠ إلى ١٢٠ سم. أوراقها متعاقبة ، مختلفة الأشكال. يكثر فيها السنائي. أزهارها عقودي التجميع. أزهارها لانظامية ، متباينة الألوان ، رباعية الفصل والبتلات اللانسواية ، ثنائية الإسدية المستعرضة الاطراف || أنوارها المعروفة قليلة المدة ، أشهرها التالية :

٢٥١١٢ - **لُوبِيَزَكَة زُرْجَنْجَرِيَّةَ** ، **Lopezia minima** (S). **Lopézia cinabre** (F).

نوع من القويزه. جنبية سهوية معمرة. مهدها المكسيك. ساقها خشيشية تملو نحو ٥٠ سم. أوراقها متعاقبة أحليبية سسة للفصل. أزهارها عقودي طرفي. أزهارها إلى الحسرة الزنجفريه اللامعة || تنويرها يستمر نمو إلى تشرين الثاني.

٢٥١١٣ - **لُوبِيَزَكَة كَثِيرَةُ الزَّهَرِ** ، **Lopezia grandiflora** (S).

Lopézia à grandes fleurs (F).

نوع من الوبيزة. جنبية سهوية معمرة. مهدها غواتيمالا. ساقها منتصبه فراء تملو من ١٠٠ إلى ١٦٠ سم. أوراقها متعاقبة أحليبية التصلال تطول من ٥ إلى ٩ سم. تصلها خلية مهدية الاطراف. أزهارها فردية ، محورية ، قطرها من ٢ إلى ٣ سم. لوئها إلى الحسرة السقماء المواج || تنويرها يستمر طوال فصل الصيف وأخره.

٢٥١١٤ - **لُوبِيَزَكَة مُتَوَجَّهَة** ، **Lopezia coronata** (S). **Lopézia couronnée** (F).

نوع من الوبيزة. عشية سهوية زينة حولية. مهدها المكسيك. ساقها مضطعة موزانية تملو من ٤٠ إلى ٦٠ سم. أوراقها متعاقبة ، بيضيه التصل المسن المختار. أزهارها عقودي طرفي. أزهارها إلى الوردية الأرجواني المواج || تنويرها يستمر نمو إلى أيلول.

٢٥١١٥ - **لُوبِيَلِيَّات** ، **Lobeliaceae** (S).

Lobéliacées (F). **Lobeliaceae** (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين متشعبة القعالات. أجناسها وأنوارها كثيرة المدة ، أشهرها اللوبيلية.

٢٥١١٦ - **لُوبِيَلِيَّةَة** ، **Lobelia** (S). **Lobélie** (F).

جنس نباتات عشوية حولية ومعمرة من فصيلة اللوبليات. أنوارها نحو ٢٠٠ منها بري وبعضها طبي وزيني. أوراقها متعاقبة لا قياسية الشكل. أزهارها لا نظامية التجميع والأبركان ، جملة الشكل مختلفة الألوان || أحرف أنوارها وأشهرها ما يتبع :



لوبلية

٢٥١٢٣ - **لَوْتُ** (E). Polluer (F). To pollute.

وسخ الشيء باخافه الإقذار عليه كتلوث مياه الأنهر ببعض المواد الكيماوية .

٢٥١٢٤ - **لَوْدِيَّات** (F). Eupaléodictyoptères (F). Eupaleodictyoptères (E).

رقة حشرات منقرضة من طبقة المفكيات . أحافيرها تعود الى الحقبة الرابعة من الأياج الأليل المعروفة أيضاً بالحقبة الكربونية || جميع حشراتنا كبيرة القدر خاضعة أو دامة .

٢٥١٢٥ - **لَوْدِيَّة** (F). Lucina (F). Lucina (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة اللوديات . أنواعها المعروفة نحو ٣٠ بعضها من شجيرات الحقبة السيلورية والبعض الآخر منتشر في معظم بحار العالم || أصدانها ثنائية الأشكال والألوان منها القمية والبغية والمالسة والمهددة والمضلة . جميعها ثنائية المآخذ الطليقة المستطيلة || تعيش في الرمال المغسورة بالماله قرب الشواطئ والجبالح .

٢٥١٢٦ - **لَوْدِيَّات** (S). Lucinidae (S). Lucinidae (F). Lucinidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرغويات صفيحيات الخياشيم . اجناسها وأنواعها المعروفة ، من غابرة ومعاصرة ، عديدة . الثابتة بجزء العصر السيلوري اما المعاصرة فنشأت في معظم بحار العالم || أصدانها لاقامية الشكل والحجم يكثر فيها البيضي المفلح . الطرفان مصاريهما مستننة الختار أو مائلة || أعرف اجناسها وأشهرها اللوينة والكربيس .

٢٥١٢٧ - **لَوْدِيَّة** (F). Planché à dessin (F). Drawing-board (E).٢٥١٢٨ - **لَوْحَس كِبْرِيَّي** (F). Cosmia fulvago (S). Cosmie jaune soufre, Calymnie jaune (F). Cosmia fulvago (E).

حشرة من فصيلة الفسيقات حرشيات الإحنة . موطنها بعض الأقاليم المعتدلة الحارة من الشرق الأوسط والأندلس وأروية . فراشها جارية قوتها رحيق الأزهار . سرقها تعيش على أوراق النباتات والأشجار الخرجية || جسمها مدني الشكل يطول نحو ١٢ سم . بسطها نحو ٣١ سم . رأسها كبريتي اللون . عينها كبيرتان . زباناها خيطيان . جوشها وبطنها الى الصفار الكبريتي || روشنها الاماميان الى الصفار الكبريتي يطو تبيح عنائي وتشبيك بني . روشنها الخلفيان الى الشبهة الصفراء || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في تموز وتبقى حتى ايلول . تسرح في الليل . تماثل بعد ظهورها بنحو خمسة أسابيع وتمتد المكن لطفاً على الصفحات السفلى من نصال الأوراق || السرة تطول نحو ١٨ سم . جسمها اسطواني الشكل ، مائل القشعر ، اسفر اللون . اسود اللاتي . رأسها اسود . منها ورواجها الى السرة || طول الاكامل الذي يستمر نحو ١٥ يوما ينقضي في التربة حيث تنفخ السرة ملتصقة بجلباب من الطين .

٢٥١١٤ - **لَوْبِيَلِيَّة هَانَكَة**

Lobelia heterophylla (S). *Lobelia heterophylla* (F). عشية حولية تزيينية تطول من ٣٠ الى ٦٠ سم . ساقها مفصلة سرسة قليلة الفروع . أوراقها السفلى ريشية مفردة ، أوراقها العليا اعليجية أو سنانية النصل . أزهارها عنقودية التجميع ، كبيرة القد ، خلية البصرة ، لونها الى الزرقة يطولها موج وردى أو ابيض || أزهارها يستمر طول فصل الصيف .

٢٥١١٥ - **لَوْتُ** (S). Sciaena (S).

Sciaena (F). Sciaena (E). جنس اسماك بحرية من فصيلة البحاريات . أنواعها نحو ٢٥ جميعها مفترسة ، قوتها الزنكة والسردين . معظمها من اسماك المحيط الاطلسي . تتميز بكبر اجسامها وزمانتها الطهرية . اقربها الى الكهبة السراء يطولها موج اسفح || أشهر أنواعها لوت المتوسط .

٢٥١١٦ - **لَوْتُ اَلْمَوَسَط** ، **لَمَطَرَاك**

Sciaena aquila (S). *Sciaène algie, Mègre, Persèque* (F). *Mègre* (E).

نوع من اللوت الميول في المتوسط . مسرحة ضمن المياه الاقليمية ، جسده كبير القد تطول من ٤٠ الى ٦٠ سم . ثوبه الى الريد الطلاء الصفراء الموج . لحمه لذيق الطعم جيد الصنف .

٢٥١١٧ - **لَوْتُس** (F). Lotus (F). Lotus (E).

هو اللوتس ، الطبل .

٢٥١١٨ - **لَوْتُيَا لَحْيَة اَلْحَبَل**

Anthyllis barba jovis (S). *Antyllide barbe de Jupiter, Barbe de Jupiter* (F). *Jove's beard, Jupiter's beard* (E). *Jupitersbart, Silberbart* (D). *Antillide, Barba Giova* (I).

عشبة برية مرموعة من القرنيات الفراشية تكثر في الاراضي الحشاه ، ساقها فروع مستقيمة . أوراقها مركبة متعاقبة وريقاتها ريشية متقاربة . أزهارها ابطية وطرفية الارتكاز مستحبة الطرف ، مفترية .

٢٥١١٩ - **لَوْتُيَا نَالَمَة** ، **حَتِيَشَة اَلْبِيْرَح** ، **حَتِيَشَة اَلدَّب**

Anthyllis vulneraria (S). *Anthyllide vulnéraire, Trèfle jaune* (F). *Kidney-vetch, Layd's fingers* (E). *Heiter Wundklee, Geißler Hasenklee* (D). *Vulneraria, Trifoglio giallo delle sabbie* (I).

عشبة برية طيبة ومرموعة من فصيلة القرنيات الفراشية ، تكثر في الاربة الرملية القاحلة . ساقها مستقيمة . أوراقها مركبة متعاقبة ، وريقاتها ريشية متبادلة الارتكاز . أزهارها مستقيمة المائلق صفراء اللون وريدة الموج . أوراقها طيبة تلثم الجرح بعد ان تقضي على الالتئاب .

٢٥١٢٠ - **لَوْتُسِيَوْم** (F). Lutécium (F). Lutécium (E).٢٥١٢١ - **لَوْتُين** (F). Lutéine (F). Lutéine (E).٢٥١٢٢ - **لَوْتُ** (F). Essaim (F). Swarm (E).

هو نول النحل من الهجرة الثانية والثالثة . أما النول من الهجرة الاولى فيسمى ديسماً .



لوت



لوتيا لية الجبل



لوتيا نامة



لوتية



لوحس كبريتي

٢٥١٢٩ - لَوْحَسْ مُدَّهَب *
Cosmia surgo (S). Cosmie dorée, Calymnia

dorée (F). Cosmia surgo (E).

حشرة من السليقات حشرغيات الاجنحة . موطنها بعض
الاقليم المعتدلة الحرارة من الشرق الاوسط والاندلس واروپة .
فراشها جارية قوتها رحيق الازهار . سرتها تمشي على
اوراق وتبارق الزان والميل || جسمها متوسط القده يطول
نحو ١٣ م . بسطها نحو ٢٢ م . رأسها الى الخلفي المذهب
المزاج . عيناها كبيرتان . زبالها خيطان . جوشها
وبطنها الى الصغار المذهب المزاج || ريشها الاصاين
الى الصغار الكبرى يملو تنقيط وتبضع عتاني . ريشها
الخفيفات الى الشهية الغراء تملوها شحة تبارج بين الخفي
والاندلس || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في آب
وتبقى حتى اواخر الخريف . تسرح في الليل . تعامل يد
ظهورها بنحو خمسة اسابيع . وتضع المكن لطفاً مستطيلة على
الصفحات السفلى من نصال الازهار || السرعة تطول نحو
٢٠ م . جسمها اسطواني الشكل . مالم القشار غزوي
الون . زيتي المزاج . رأسها الى الجوزة . منها الى السرة .
وراجها الى السرة السوداء || طور الاكمال الذي يستمر
نحو ٥ يوم ويتقضي في التربة حيث تنفس السرعة ملتصقة
بجلباب من الطين .

٢٥١٣٠ - لَوْحَف *
Parmophorus (S). Parmophore (F). Parmophorus (E).

جنس حيرلانات بحرية من الرغويات مبيات الارجل
وحيدات الاجزاء وفصيلة التيرويات . انواعه المعروفة قليلة
البد اعطائها البحر الاخر وبض البحار الاسيوية .
تمشي على المذيق قرب الشواطئ ؟ جميعها سرية وتختفي
التور تنفس في الحصىا وتحت الرمال || اصداها شبه
اعليجية الشكل . مقبولة المقدم . مستديرة المؤخر .
ناشرة التيج . قلبية الانفاخ . تلتفت كامل الظهر .
رؤوسها تنتهي باعظام اسطوانية . لوامسها شبه مخروطية
الشكل . عيونها جاسطة قاعية . عياشها ظهري
الاكتازك تقوم في تجويد خاص يلامس البق || اشهر
انواعه لوفقة البحر الاخر .

٢٥١٣١ - لَوْح *
Cluytia (S). Clutia; Cluytia (F). Clutia (E). Clutia (D). Clutia (I).

ليات حشري ليني زبيني من فصيلة السوسيات مهد البلاء
الاستوائية . ساقه كدنة . اوراقه خلية جميلة الخضار الاصل.
انهاره زائفة الالوان البنية || يزدهج في المراكب والمصارى .

٢٥١٣٢ - لَوْحَس *
Claviger (S). Clavigère (F). Claviger (E).

جنس حشرات من فصيلة اللوحسيات ورية غدييات
الاجنحة . انواعه المعروفة سبعة اعطائها تمتد من الهند
وايران الى اروبية . تعيش مع بعض انواع النمل اعصها
الكبار || اجسامها صغيرة تطول نحو ٣ م . رؤوسها
ضيقة . مستطيلة الشكل . عيونها طامسة . قرنها
الاستشارية صرطانية . تأثيرها وفكرها صغيرة .
ملاصها نحيلة . كواصها صغيرة . ش بضية الشكل .
بطونها اجاصية . امحادها قصيرة تلتف ثلث البطن .
اوتوها الى الصخرة المسفاه المتفاوتة للمجاث || تعيش
مع النمل في قراء غديتها ويلصق . ما تنفسه مسام بطونها .

٢٥١٣٣ - لَوْحَسِيَّات *
Clavigeridae (S). Clavigeridae (F). Clavigeridae (E).

فصيلة حشرات من غدييات الاجنحة . اجناسها وانواعها
المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم اقطار العالم لانها
تمشي في قري النمل مع اكثر اجناسه || اجسامها صغيرة
تطول من ٢ الى ٤ م . رؤوسها صغيرة . ضيقة . مستطيلة
الشكل . عيونها طامسة . قرنها الاستشارية صرطانية .
سداسية الفص . تأثيرها وفكرها صغيرة . كواصها
بضية الشكل . صغيرة الحجم . بطونها اجاصية الشكل .
امحادها قصيرة تلتف ثلث البطن || تعيش مع النمل
الذي يطنها بالفلس والذي يلصق ما تنفسه مسام بطونها
من مواد مائعة || اشهر اجناسها اللوحس .

٢٥١٣٤ - لَوْو *
Coregonus lavaretus (S). Lavaret (F). Gwyniad (E).

سمكة نهريّة وبحيرية من فصيلة السلوبيات . جسمها
اهليجي الشكل يطول نحو ٤٥ سم . لوبها الى الرقبة
الزرقاء يطولها موج فضي وتكت سود تكتنف الظهر من
جانبيه . ترغب في المياه المسيرة . تسرا في تشرير الثاني .
لحمها لذية اللحم جيد الصنف .

٢٥١٣٥ - لَوْرَاسِيَا *
Laurasia (F). Laurasia (E).

اسم يطلقه علماء الجيولوجيا والجيغرافية على المصوبة القارية
التي كانت . قبل تجزئها . تتألف من آسيا واروپة
وامريكا الشمالية .

٢٥١٣٦ - لَوْرَس *
Mouetta (F).

هو زج الماء . اعليه .

٢٥١٣٧ - لَوْرُوس *
Lorocera (S). Lorocrère (F). Lorocera (E).

جنس حشرات قانصة من فصيلة القورويات ورية غدييات
الاجنحة . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطائها بعض مناطق
البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها خفاه تطول من ٧ الى
١٠ م . رؤوسها كبيرة . ناشرة . كبيرة . قرنها
الاستشارية عقدية الفصل المجهزة بعض الحلب المستطيل .
تأثيرها ضلبيية . كواصها محدودة . محصورة . امحادها
لاحة . نحيلة التخنديد القاطب . قوتهاا تشبة مبيثة
الحلب . اوتوها الى السرة السوداء المتفاوتة للمجاث ||
الحشرة الجملانة قانصة . تألف المواقع الرطبة اعصها
ضفاف المنابع . البقرة والجم .

٢٥١٣٨ - لَوْرُوسِيَّات *
Loroceridae (S). Loroceridae (F). Loroceridae (E).

فصيلة حشرات من رية غدييات الاجنحة . اجناسها
وانواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها بعض مناطق البلاد
المعتدلة الحرارة || اجسامها مستطيلة الشكل . رؤوسها
كبيرة . عيونها كبيرة . ناشرة . قرنها الاستشارية
وكوكها مستطيلة الحلب الشالك . تأثيرها بارزة الاطراف
الخارجية المملكة . برارجها حادة الزناد . امحادها نحيلة
التخنديد القاطب الذي يمد ١٢ لعدود . قوتهاا محدلة
الطول . مبيثة الحلب || مكها به اسطواني الشكل .
عين الطرف اللقيق . تنصه الاثنى افراديا في التربة .
يرقاتها سداسية القوام والمقل . حورياتها تنحور في
التربة داخل اروقة البولية الشكل مسطوية الرأس والمقل ||



لوحس مذهب



لوحف



لوح



لوروس



لور



لوروس

٢٥١٤٤ - **لَوْرَجَر** (F). Olivier du Maroc.
هو الأركان ، اطلبه .

٢٥١٤٥ - **لَوْرَجَهْد** (F). Amandier des Indes.
هو الاميلج اللوزي ، اطلبه .

٢٥١٤٦ - **لَوْرَجَلُو**

Prunus amygdalus communis, *Amygdalus communis*, *A. dulcis* (S). Amandier commun (F). Common almond tree (E). Echte Mandel (D). Mandorlo comune (I).

هو اللوز المشهور المأكول الثمار غشوية كثيرة العدد تقسم الى فئتين : فئة الضروب ذات النواة الصلبة ، وفئة الضروب ذات النواة الطرية الممكن فقشها بالاصابع .
انجار غليظة السوق تملو من ١٢ الى ١٢ م . ثمارها مأكولة اللوب تحوي ما يراوح قدر :

من ٥٠ الى ٥٥ ٪ من المواد الزيتية

من ٢٢ الى ٢٥ ٪ من المواد الاسية

وهي شائعة الاستعمال في صناعة السكاكر ويستخرج منها زيت اللوز .

٢٥١٤٧ - **لَوْرَجَر** ، **هَزَج**

Prunus amygdalus amara, *Amygdalus amara* (S). Amandier amer (F). Bitter almond tree (E). Bittere Mandeln (D). Mandorlo amaro (I).

نوع من اللوز ثمرته سبروتية نشيطة تملو من ٦ الى ١٥ م .
زراعتها حيمة لانها تستعمل كطعم لفضوب اللوز الحلو .
ثمارها صلبة . لوبها مر الطعم يحوي بعض المواد الجعالية اعصها الاينفدالين (*Amygdaline*) التي ينشأ عنها الحامض السينيديريكي او الحامض البروسي الشديد الفعالية السامة . ثمارها تستعمل في الصناعة فيستخرج منها زيت اللوز المشهور وهو طيب ، عادم الاذى ، خصال من العناصر السامة . أما الكسب لثناج من عصره فهو سام ميت .

٢٥١٤٨ - **لَوْرَجَه** (F). Amande (F). Almond (E).
هي ثمرة للوز منها الحلوة والمرة .

٢٥١٤٩ - **لَوْرَجَه**

هي اللدة اللامبية ، اطلبه .

٢٥١٥٠ - **لَوْرَجَه**

Loeselia (S). *Loeselia* (F). *Loeselia* (E).

جنس نباتات عشبية حولية برية وتزيينية من فصيلة القشقيات معقودة التعريف على اسم العلامة «لورل» .
مدها بعض مناطق المكسيك . سيقانها تنسج تملو من ٥٥ الى ١٠٠ سم . اوراقها بيضبة النسل او سناية .
ازهارها زرقاء اللون او قرمزية . قناباتها مسنة ١١ انواعها المعروفة قليلة العدد ، اشهرها التالية .

٢٥١٥١ - **لَوْرَجَه زرقاء** (S). *Loeselia corules* (S). *Loeselia bleue* (F).

نوع من الورولية . عشبة حولية تزيينية . ساقها تملو من ٥٥ الى ٧٠ سم . فروعها نخيلة صلبة ، خلية اللحاء . اوراقها بيضبة الشكل ، صالها مسنة اخضر . ابرها زرقاء اللون . قناباتها صاملة وسردية ١١ تنويرها صيفي .

تميش حل صفات الاثر والبسوات والنتاج . معظم انواعها قانص ويضمها غاصل ١١ اشهر اجناسها القورس .

٢٥١٣٩ - **لَوْرَجَس** (F). *Loranth* d'Europe (F).
هي البتوية ، اطلبه .

٢٥١٤٠ - **لَوْرَجَس** (S). *Laurencia* (S). *Laurencia* (F). *Laurencia* (E).

جنس نباتات بحرية من اخيات الحمر . انواعها المعروفة نحو ٢٥ اعلابها معظم بجار العالم ١١ بعضها فضروني المادة والبعض الآخر حلاص . لوانها تراوح من الاصفر الى الاحمر ١١ بعض انواعها القفرونية حريفة الطم تستعمل استعمال التوابل في بعض مناطق اوروبا الشمالية .

٢٥١٤١ - **لَوْرِي** (F). *Domicella* (S). *Lori* (F).

جنس طير من الملققات وفضيلة البيفات . انواعها المعروفة ٢٢ موطنها يمتد من الهند الصينية الى ماليزية والفيليبين . جلها الجاني جماعي الا في زمن التصاد والحالة . تألف الثبات والمروج وصفات مجاري الماء . قوتها حبيب التبيبات ولثا ١١ اجسامها مستدة اللد ، قربة الشبه بالهام . انواعها متباينة الالوان القراكية يكثر فيها الاحمر الابيضوي ثم الاصفر فالاصفر فالازرق فالعناي . اجنتها ذلقة ، اذنها متوسطة الحجم ، مستديرة الاطراف .

٢٥١٤٢ - **لَوْرِي** (F). *Almond tree* (E). *Mandel* (D). *Mandorlo* (I).

جنس اشجار مشرة برية وزراعية من فصيلة الورديات . انواعها اثنان : لوز سلو ولوز مر ، فالخلو هو الزراعي وهو كثير القروب ولذر هو البري . وبجرة للوز من اي نوع كانت تستعمل بذات الشويبة الجلينة . جلورها وتديته تنور في القربة على اعماق بيضة . ساقها مستقيمة غشقة . اغصانها متفرجة كثيرة الافناد . افنادها فناد .

قنتها مستدة الشموخ ، قصيرة الذروة . اوراقها عابلة ، معتقة ، رمية ، ذلقة . نصلا يبر اخضر اللون في اول عهد ثم ينحرف الى العلة ويستقر عليها حتى اللول والاصال . ازهارها لوزية التجميع ، يضاء اللون ، ودية المروج . تتكون على الافناد الحولية والحولة . وهي تنور في اواسط الشتاء فيلج زهرها ، في لبنان ، خلال الزهرة الثانية من شباط وذلك قبل ابراق بعض البت . ثمارها

لوزية مستطيلة مدهية المقصة تتكون من غلاف لحمي اخضر اللون الحبل البيرة الكيفة الخسل يحف مع الادراك وهو يحسن عجمة غشبية النشاء تغلف نواة لوبها ابيض اللون جامد المكسر واخر المادة الزيتية ١١ واللوز يتكاثر بالبلد ومن المستحسن وضع البذور في مستقراها مباشرة دون اللجوء الى المشاغل لان نقل التربة من المشتل الى مستقراها يوجب قطع الجذور البتدية الحبل الذي يتناى مع سويحات هذه الشجرة ١١ وهو يعيش ويزدهر في جميع الاقاليم الحارة والمعتدلة لا يذوي سوى الصقيع لانه يسب اغلاص الزهر او القند ١١ وهو يحد في جميع الاثربة انما يرجع المتوسطة الانساج التي لا تقتدر الى الكس كما وانه لا يمر كثيرا في الاثربة العظيمة المندجة .

٢٥١٤٣ - **لَوْرَجَه** (F). *Cacaoyer* (F).
هو الكاكو ، اطلبه .



لوزية



لوري



لوز سلو



لوب

نحو ١٠٠ مظهر ثياب شبي وبفسها جنبي. اورلقها مركبة، ثلاثية، اذينية. انزعاجا لا قياسية التجميع والارتكاز جميعها مشفرة || اكثر انزعاجا علفية تماما لثامتها ومنها الطليقة المديدة الفولاذ، اشهرها.

٢٥١٦١ - لُوطُس اُرْجُولِي * ، لُوطُس زُرْكَاسِي حَفْص سَكْرِي

Lotus tetragonolobus, Tetragonolobus purpureus (S). *Lotier cultivé, L. pourpre, L. rouge, Pils café.* (F). *Garden winged pea (E), Rota Spargelherbs (D).* *Loto cultivato, L. rosso, Vaccia pisella (I).*

نوع من اللوطس البري والزراعي، وهو عشية سرورية حولية تملأ من ١٥ الى ٤٠ سم. ساقها منتفخة رفواء. وريقاتها واذيتاتها بيضيه الشكل. ازهارها فردية او ثنائية التجميع، ابطية الارتكاز، حراء اللون، سفلتها رباعية الاصلع. ازهارها يستمر من آذار الى ايار.

٢٥١٦٢ - لُوطُس اَصْفَر * Nalumbo lutea (S). Nélombo jaune, Lotus jaune (F).

نبات عشبي مائي جنموري من فصيلة النيلوفرينات. جذاميره صفولية نشوية المسادة المأكولة. اورلقها زنادية كبيرة مستطرفة قطرها براوح من ٣٠ الى ٦٠ سم. ازهاره صفراء اللون مدمجة البرف قطرها براوح من ١٥ الى ٢٥ سم. ترتكز على شواريح تطول من ١٠٠ الى ٢٥٠ سم. || انزعاجه يستمر من تموز الى آب.



لوطس ارجواني

٢٥١٦٣ - لُوطُس النِيل ، لُوطُس مِصْرِي ، عُرُوس النِيل ، وَرْدَةُ النِيل

Nelumbium speciosum, Nelumbo nucifera (S). *Lotus sacré, L. du Nil, Fève d'Egypte, Rose du Nil (F).* *East Indian lotus, Pythagorean bean, Sacred bean (E).* *Lotus blume, Agyptische bohne, Nillilie (D).* *Loto sacro, Fava del Nilo (I).*

نبات عشبي مائي جنموري مداد من فصيلة النيلوفرينات. اصطناعه مياه البلاد الحارة الهندية والافريقية. اورلقه زنادية كبيرة مستطرفة، تصلها يوم على سطح الماء قطرها براوح من ٣٠ الى ١٠٠ سم. أما زنادها فيطول من ١٥٠ الى ٢٥٠ سم. ازهاره كبيرة اللده وردية اللون قطرها براوح من ٢٠ الى ٣٥ سم. وهي ذكية البرف الطوي. تمارة طرية الشكل نشوية المادّة المأكولة || انزعاجه يستمر كلوية الصيف.



لوطس اصفر

٢٥١٦٤ - لُوطُس فلسطيني * عَفِيرَة

Lotus palestinus (S). Lotier de Palestine (F). *Four winged pea (E). Garten Spargelherbs (D). Loto di giardino (I).*

نوع من اللوطس البري المرموي المسمر. اصطناعه تشبه بلاد شرق البحر المتوسط. ساقه منتفخة رفواء. ازهاره ابطية وطرنية الارتكاز صفراء اللون. يزوره ما مأكولة تقبر من المقويات المادّة المقعول الرجعي.



لوتس فلسطيني

٢٥١٦٥ - لُوطُس قَرْنِي * ، قَرْنُ القَزَال ، كُنْهَكَة

Lotus corniculatus (S). Lotier corniculé, L. commun, Trêfle cornu, Corne du diable, Pied-de-poule (F). Bird's foot, Bird's-foot trefoil (E). Gemeiner Hornklee, Schotenklee (D). Loto corniculato, Baccellina, Ginestrina salvatica (I).

نوع من اللوطس الطلي البري العلي المعسر. ساقه منتفخة رفواء. ازهاره الى الصفرة زنادية يعلوا تبقيج احمر، وهو



لوطس قرني

٢٥١٦٢ - لُوزِيَّة قِرْمِزِيَّة *

Loasella coccinea (S). Loasella écarlate (F).

نوع من اللوزية. عشية حولية تزينية. ساقها تملأ من ١٠ الى ١٠٠ سم. اورلقها سنانية الشكل. نصلها مسنة الخمار، بجلة الخمار اللامع. ازهارها قرمزية اللون تطول نحو ٢ سم. ثنائياتها صاملة || تنورها يستمر طوال شهر حزيران.

Arbres à noyaux (F).

٢٥١٦٣ - لُوزِيَّات

Stone-plants (E).

هي الاشجار اللوزية البزور، اغلب حصيلات.

Amygdaline (F).

٢٥١٦٤ - لُوزِيَّين *

الوزين غلوكوزيد يوسد في لب عصيات الوز المر والدراق والكرز ... الوزين تمو في الماء وتحول الى غلوكوز وحامض سياليدريك والهديد يزدريك. وهي، في مدة الانسان، تحولت كما في الماء تقسب عارض تسد قد يكون ميثا.

Leucite

٢٥١٥٥ - لُوسِيَّت

جسم يتكون في ودة اخلايا النباتية. ج. لوسيات.

Otocyon (S).

٢٥١٥٦ - لُوتَب *

Otocyon, Chien oreillard (F). Otocyon (E).

حيوان لاحم مفترس وسيد الجنس والذئب من فصيلة الكنيبات. موطنه بعض مناطق افريقية الشرقية والجنوبية. يأنث الاذلال والاحراج البمشرة الاشجار. ملجته الحيات زوجي || جسمه قريب الشبه بنجم اين آري، طوله نحو ١٠٠ سم. بما فيه الذئب الذي يبلغ نحو ٣٨ سم. رأسه معتدل الحجم، ذلق الخضر. عيناه صغيرتان حادتا البصر. اذناه حريصتان كبيرتان. ذنبه كذئب الثعلب. ثوبه الى الكلبة الموشحة بالخطي. قوامه الى الكلبة السوداء وهي خاصة الاصابع في القاعين الاماميتين، ورباعيتها في الخلفيتين || يسرح في الليل ويبيت في النهار. قوته كل ما استطاع اليه سبيلا من الحيوان والاشجار اعصها الجراد.

٢٥١٥٧ - لُوتَبَة *

Paralepis (S). Paralépis (F).

جنس اسماك بحرية من مفتوحات المثانة وفصيلة الفوسيات. انواعها المرفوعة ثلاثة، اثنتان تمشان في البحر الابيض المتوسط واحدة في بحار الشمال. اجسامها وشعية الشكل، مستطيلة. رؤوسها مخروطية، ذلقة، عادمة السهف. ميزانها كبيرة صامتة. اصطناعها ربيبة الاشداد. زمانها الظهيرة صغيرة اللده، خلفية الارتكاز. زمانها الليلية فائقة || التراب الى الشبهة القفصية تبق في الظهور ويملوا مواج براوح من الرودي الى اليلكي في البطن || لحوبها جيدة الصنف، مغروب ليا.

Proscolie (F).

٢٥١٥٨ - لُوتُوس *

الفرس فدة مغنية ساقها شديدة الزوجة يلسق قطع عت السحليات.

٢٥١٥٩ - لُوطُس هو الاطلس، اطله.

٢٥١٦٠ - لُوطُس ، لُوطُس

Lotus (S). Lotier (F). Lotus (E).

جنس نباتات برية وزراعية من القرنيات الفرافرية. انواعه

Arum maculé (F).

٢٥١٧٣ - **لَوْفٌ مُبَكِّعٌ**
هو الاروم ، اطلبه .نبات طبي يلم الجرح ويضع من البواسير . تقيع اذناه
يفضي على التهاب العين .

Luffa acutangula (S).

Louffa anguleux (F).

نوع من اللوف الزراعي . هذه الهند . ساقه تطول من ٣
الى ٦ امتار . اوراقه شديدة الخضار خضاسية او مسابية
التفصيص القلبي الشكل . ازهاره ثلاثية الاسدية . ثماره
مستطيلة ، عشارية الاصلع البارزة تطول من ١٥ الى
٣٥ سم . وتعرض من ٦ الى ١٠ سم . لينها شائع الاستعمال .

Locés (F).

٢٥١٦٦ - **لَوْطِيَّاتٌ**

سبط من فصيلة القرنيات القرنية ، اشهر اجناسه اللولس .

٢٥١٦٧ - **لَوْطَانِيَّاتٌ ، سَبَجِيَّاتٌ**

Loganiaceae (S), Loganiaceae (F), Loganiaceae (E).
فصيلة نباتية من مزدوجات الفلقة متحدة الفلقات . تشمل
٣٥٠ نوعاً من النباتات الشبية والنباتية والنجبية
والشجرية . اوراقها بسيطة ، كاملة ، اذينية ، متقابلة .
ازهارها صغيرة القد ، لا قياسية الايزكان . ثمارها كرابل
مزدوجة ، متفلفة . اكثراً من نباتات البلاد الاستوائية
والحارة . معظمها جمالي يحوى بعض النامهر السامة
اخصها السركتين والبروسين .

Lophyrus pini (S).

Lophyre du pin (F). Pine sawfly (E). Gemeine

Kiefernblattwespe (D).

حشرة من اللشاريات ، طولها يراوح من ٩ الى ١٠ سم .
اجيالها الحولية ثلاثة . ذكرها اسود اللون . انثاها ملطخة
بالاصفر ، تمتص مكثها على بناتق الصنوبر فينثف عن
يرقات دقيقة همة تلثم الاهداب النامية وتقضي عليها .

٢٥١٦٨ - **لَوْفٌ ، لَيْفٌ ، قَيْلَجُوشٌ**Luffa (S). Louffa (F). Towal gourd (E).
Schwammkürbis (D). Luffa (I).

جنس نباتات خشبية حولية عارضة من فصيلة القرنيات .
انواعه ١٠ ينبتا المناطق الحارة ، سقتها متفلفة ، حولها
منشعبة . اوراقها متعاقبة ، منقطة ، قليلة الشكل ، خضاسية
او سباسبية التفصيص . ازهارها وحيدة المسكن ، كبيرة
القد ، صفراء اللون . ثمارها غبارية الشكل مستطيلة .
نسجها عشن اللبب الخاوي الاسفنجي التركيب || اشهر
انواعه ما على .

٢٥١٦٦ - **لَوْكَّاسٌ**

هو اللابيون الاقلد ، اطلبه .

٢٥١٧٧ - **لَوْكَّانِيَّاتٌ**

Leucaenidae (S). Leucaenidae (F).

فصيلة حشرات من رتبة حرشفيات الاجنحة . اجناسها
وانواعها كثيرة المدد جميعها متوسطة القد او صغيرة . اطباها
العالم . تمش على الاحشاب البرية والزراعية اخصها
التجليات .

Leucania (S). Leucanie (F).

جنس حشرات حرشفية من فصيلة اللوقانيات . انواعها
عديدة منتشرة في معظم اسواق العالم . اجناسها صغيرة
القد . وراشها قليلة الزراكش والاهداب يتكرر فيها الاسمر
وششتها || اشهرها واضرها لوقانية النجيل .

٢٥١٦٩ - **لَوْفٌ اسْطَوَانِيٌّ * ، لَوْفٌ مَصْرِيٌّ**

Luffa cylindrica, L. aegyptiaca, Poppla fabiana (S).
Louffa cylindrique, Eponge végétale, Pétrole, Tor-
chon (F). Egyptian towel gourd, Rag-gourd, Vege-
table sponge (E). Aegyptische Schwammkürbis (D).
Luffa d'Égypte, Petola, Pecuola, Spugna vegetale (I).

نوع من اللوف الزراعي الشائع الاستعمال . ساقه تطول من
٣ الى ٧ امتار . اوراقه خضاسية التفصيص الكلوي الشكل .
ازهاره خضاسية الاسدية . ثمار اسطوانية تطول من ١٥ الى
٣٥ سم . وتعرض من ٥ الى ٨ سم . لينها شائع الاستعمال
المزلي .

٢٥١٧٩ - **لَوْكَّانِيَّةُ التَّجِيلِ * (دودة الذرة)**

Leucania forey (S). Leucanie du maïs (F).

حشرة من اللوقانيات ، طولها نحو ١٧ سم . ثوبها حنطي
للون اسمر المواجه . وراشها الى السيرة الوردية . رقبها
دقيقة الجسم تطول نحو ٣ سم . رأسها الى الجلوة . ثوبها
حنطي اللون وردي المواجه يطوى تحطيط اسمر قاطب ويعترض
تنخله نقط سود نظامية الايزكان || تركيب التجليات
البرية والزراعية اخصها الذرة والمصان والحلعة نفثي
المصف وقد تقضي عليه عند كثرتها .

٢٥١٧٠ - **لَوْفٌ الْحَبَّةُ ، اُذُنُ الرَّاهِبِ**

Arum dracunculus, Dracunculus vulgaris (S). Ser-
pentaire commune, Gouet serpentaire (F). Common
dragon, Snake plant, Dragon arum (E). Drackenwurz,
Schlangenkraut (D). Aro sarpone, Dragontes, Serpentina (I).

نبات حشبي ارموي بري ورتبي من فصيلة القلقاسيات .
اروسه عشولية مبطلة . اوراقه برتية مستطيلة الزناد .
ورقاتها ورتية التجميع ، فصلها سناني الصفحة الخضراء
المزركشة والمبجبة بالاسمر والاحمر والاصفر . ثمرها
يطول من ٥٥ الى ١٠٠ سم . ينهي بفرشاف يحوى النبة
لونه الى الجلوة المايقة .

٢٥١٨٠ - **لَوْكَّانِيَّةُ دَكِسَّةٌ ***

Leucania impura (S). Leucanie impure (F).

حشرة من اللوقانيات ورتبة حرشفيات الاجنحة .
موطنها بعض اقاليم حوض البحر الابيض المتوسط والمناطق
الداخلية للناخا . فراشها جارية قوتها رقيق الازهار .
سرفتها تمش على عصف التجليات البرية || جسمها
متوسط القد يطول نحو ١٤ سم . بسطها نحو ٣٣ سم . رأسها
اكلس اللون اصعب المواجه . عيناها كبيرتان . زبابها
خيطيان . جرشها وبعثها الى الكلسة الصهباء المواجه ||
وراشها عند الشقين الى الكلسة تملوها مشقة سراء عند
الذكر ، شهبا عند الانثى || لها جيل واحد في الحول .
تظهر الفراشة في حزيران وتبقى حتى آب . تشرح في

٢٥١٧١ - **لَوْفٌ جَعْدٌ**

هو الاروم الايطالي ، اطلبه .

٢٥١٧٢ - **لَوْفٌ عَظْرِيٌّ**

هو الزاونه الثعباني ، من النباتات الطبية ، اطلبه .



لوف اسطواني



لوفر الصنوبر



لوقانية النجيل



لوقانية دسة

قسمين ، القسم العلوي رسامي المراج ، مبهر الهلب المشعب للثالث ، وقسم سفلي أخير المراج يملو بتجميع أسود يكتنف قواعد الروابي . رأسها أسود اللون . وأرجوها سمراء || طور الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة أسابيع ينقضي ضمن جراب تملقه في النبات .

٢٥١٨٨ - **لُوم** هو التلرج المتولي ، اطله .

٢٥١٨٩ - **لُوماسية** *Lomatia* (S). *Lomatia* (F).
جنس نباتات جنينية برية وهدائق من فصيلة الفصيات .
انواعها المعروفة كثيرة منها بلاد امريكية واسرالية . سيقها نرفاء . اوراقها لا قياسية الشكل منها البسيطة والمسننة والمقرضة . ازهارها عتقوي التجميع ، طرفي وضووي الارتكاز . ازهارها جميلة الشكل ثلوية التركيب لونها الى الصفراء الاخير || اشهر انواعها حثاقية ما يتبع .

٢٥١٩٠ - **لُوماسية بهيئة الورق**

Lomatia illicifolia (S). *Lomatia de houx* (F).
نوع من اللوماسية جنبها تملو من متر الى مترين . اوراقها بيضيه وأهليجية وسنانية الشكل . نصلها اخضر اللون حل صفحته ، مغرض الحلقه أو مسنن . حثاقية الزمرية مستطيلة رهلة . تنورها يستمر من تموز الى آب .

٢٥١٩١ - **لُوماسية حد يدية**

Lomatia ferruginea (S). *Lomatia ferrugineuse* (F).
نوع من اللوماسية جنبها تملو من مترين الى ٣ امتار . اوراقها مستطيلة الاعناق ثلاثية التفريض . نصلها ماس الصفحة العليا خلي السفلى خله حديدي المراج متاقية الزمرية متوسطة الحجم والكثافة معظمها طرفي الارتكاز . تنورها يستمر من تموز الى ايلول .

٢٥١٩٢ - **لُوماسية صباغية**

Lomatia tinctoria (S). *Lomatia colorante* (F).
نوع من اللوماسية جنبها تملو من متر الى مترين . اوراقها متوسطة القد لا قياسية التفريض . نصلها لاح البشرة حل صفحته . حثاقية الزمرية صغيرة الحجم كثيفة التجميع . يزورها صباغية تنضب الماء بالاحمر الودي . تنورها يستمر من تموز الى آب .

٢٥١٩٣ - **لُوهف**

Serrasalm (S). *Serrasalm* (F).
الواحدة لوهفة . جنس اسماك نهريه من مفتوحات المئاته وفصيلة القرصانيات . انواعها المعروفة قليلة العدد يكثر وجودها في بعض انهر امريكية الاستراية || اجسامها مسطحة . بيضيه الشوزن . متباينة الاحجام . رؤوسها مقطوعة . واسمة الاشدق . مرصوة الاسنان الحادة . اثوابها الى الخصار البحري المتفاوت المجاذبة تكثر فيه الفرقة . زماقتها الثليية ثابتة || تتميز بجسديها القافضة اذ انها تقسم كل ما تشاهد في الماء وكثيرا ما ترق شباك الصيادين || طوعها فاخرة الصنف مرغوب فيها .

٢٥١٩٤ - **لُويحي** هو البازي ، اطله .

٢٥١٩٥ - **لُويزة** ، **لُيسيه** *Lippia* (S). *Lippia* (F).
جنس نباتات خشبية برية وزيتنية من فصيلة رعي الحام . انواعها زهاء ٩٠ . اصنافها المناطق الاستراية والحارة . اوراقها كاملة ، صغيرة ، دقيقة السنن . ازهارها لا قياسية التجميع يكثر فيها السنن والتكوي || اشهر انواعها الزراعية ما علي .



لُويزة البنج



لوهف

الليل . تعامل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتمتص المكان لعلها تل الصفحات السفلى من نصال النصف || السرعة تطول نحو ٤٥ سم . جسمها اسطواني الشكل ، ماس القشار تملو نقط سود نظامية الارتكاز . رأسها الى الجرورة ثوبها حنطي اللون ، احمر المراج يملو تحطيط احمر قاطب ويمتد . مدها الى السرعة . رواجها سود || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوما ينقضي في الآخرة حيث تغمر السرعة ملتصقة بجلباب من اللبن .

٢٥١٩١ - **لُولاية**

Grand Nacré (F).
فراشة تدعى ارجينيس البرادي ، اطلها .

٢٥١٩٢ - **لُوتسب**

Vis (F). *Screw* (E).
قطعة اسطوانية معدنية أو خشبية مفروسة حلزونية تستعمل في اغراض تشي . اشهر اللولاب :

Vis d'Archimède (F).
لولب ارجيس

Vis sans fin (F).
لولب لا نهائي

Vis multiple (F).
لولب مضاعف

Vis tangente (F).
لولب ماس

Vis hollandaise (F).
لولب هولندي

٢٥١٩٣ - **لُوتسب سلاسي**

Cycle méritail (F).
هو الدورة السلاسية ، اطلها .

٢٥١٩٤ - **لُوتسي**

Spiral (F).
٢٥١٩٥ - **لُولزة**

Perle (F).
هي الدرة . ج لولز ولؤلؤ .

٢٥١٩٦ - **لُوليات ، مَطْبَقَة الأجنحة**

Plecoptera (S). *Plécoptères* (F). *Plecoptera*, May flies, Ephemeral flies, Shad flies, Lake flies (E).
Eintagfliegen (D).
رنية مشترات من طبقة مستقيبات الجناح . انواعها عديدة زهاء ٧٠٠ تجمعها بعض المتشابهات والاجناس . تتميز بعيناتها الفاخرة الثلاثية التركيب وبانطباع اجنحتها الى الوراء عند الراحة والاهمى || رفاقها مائية تعيش عاقلة على الصخور المنمورة بالماء .

٢٥١٩٧ - **لُولوية البنفسج**

Boloria salene (S). *Nacré des violettes* (F).
Boloria salene (E).
حشرة من فصيلة البشوريات ورنية حشرشيات الاجنحة . موطنها يشمل الاقاليم المتدلة الحارة من الشرق الاوسط الى اوروبا وافريقية الشمالية . فراشها واحة قوتها رحيق الازهار . سيقها تعيش على اوراق البنفسج البري والزراعي || جسمها مستطيل القد بطول نحو ١٥ سم . يستط نحو ٣٨ سم . رأسها كحلي . عينها كبيرتان . زياتها صولفانيان . مرشها دقيق الجسم . جوشها وبعنها الى الكسني || وراشها عند الشقق الى الصخرة الصناعية يملوها بتجميع ونقيج وتفتيط وثمة جميعها الى الكسني الحنطي المراج || لها جيلان في الحول . تظهر فراشة الجيل الاول في نيسان وتظهر فراشة الجيل الثاني في اواخر آب . تسرح في النهار . تعامل بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع وتمتص المكان ميعادها على نصال اوراق النبات المائل || السرعة تطول نحو ٣٢ سم . جسمها اسطواني الشكل . ثوبها الى العسلية الحفصاء يملوها غطان بجانيبان اسودان يفصلان الجسم الى

٢٥٢٠٤ - **ليكاح** *
Acinopus picipes (S).
 حشرة من فصيلة الهربولويات ، طولها يراوح من ١٢ إلى ١٧ سم . جسمها مخدوب الظهر . ثوبها إلى السواد الفحشي . تعيش في الأتربة الرملية الرطبة تقيم تحت الحجارة والاختباء . تسرح في الليل . قوتها البذور والحبوب وقد تصقب الديدان القارضة وتفتريها . يرقاتها غاشلة قليلة الاذن .

٢٥٢٠٥ - **ليكاح أسود** *
Acinopus picipes (S).
 حشرة دهوية غاشلة وقانصة من فصيلة الهربولويات ورتبة غدييات الاجنحة . موطنها بعض مناطق البلاد المتدلة الحارة من الشرق الأدنى وأروبة . جسمها صغير القد ، محضور الشكل ، مخدوب الصفة العليا ، عادم الجناح ، يطول من ١٥ إلى ١٧ سم . ثوبها إلى السواد الفحشي . رأسها كبير القد ، مستدير الشكل ، قصير الخنم . فكها ضليمان . زباناها عظيمان دقيقان . عيناها صغيرتان . الاذن اصغر قدأ من الذكر وأكـد ثوباً منه واقصر زبانا واضخم بطناً . لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اوائل حزيران وتبقى حتى اوائل ايلول . تسرح في الليل وتبيت في النهار تحت الحجارة . قوتها البذور والحبوب وتصقب الديدان القارضة وتفتريها .

٢٥٢٠٦ - **ليكاس**
Lias
 طبقة ارضية توجد في اسفل الاراضي الجورية .

٢٥٢٠٧ - **ليطاط**
Mortier (F). *Mortar* (E).
 غليظ من التلكس والزلل او من الاسمنت والزلل يضاف اليه الماء اللازم ويستعمل في البناء لتاسك الحجارة فيما بينها .

٢٥٢٠٨ - **ليبرالولا** *
Libratula (S).
Libratule (F). *Libratula* (E).
 جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفحيات الخياشيم وفصيلة الغلويويات . انواعها المعاصرة المحروقة قليلة العدد . موطنها علجان جزر اقانيا . تعيش بين رسات المرجانيات . اصداؤها شبه بيضية الشكل ، ثنائية المصاريع تلتشب في مدافع المرجان وتستقر عليها .

٢٥٢٠٩ - **ليبيريللا** *
Libertella (S).
 جنس فلور بحيرية من فصيلة الرغيفيات . انواعه قليلة العدد والاصرار تركيب السوق والافصان البايضة . ونبتته لا قياسية الشكل والشكل والحجم ، مشبهة عصير حلامي التركيب ، اصفر اللون او ودي . بويذاته خطية ، حلالية الشكل ، شفافة .

٢٥٢١٠ - **ليبيريتيه** *
Libertia (S).
Libertie (F). *Libertia* (E).
 جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة السوسنيات . جلورها لينة . سوقها منصبة معتدلة الارتفاع . اوراقها ضيقة النصال ، ثنائية التصنيف . ازهارها حرضية التجميع ، رقابية الترتيب تبدو كالكسابل وهي يضاء اللون او زرقاء . تزورع التزيين في المرائن والحدائق . انواعها المحروقة قليلة العدد ، اشهرها التالية :

٢٥٢١١ - **ليبيريتيه جميلة** *
Libertia formosa (S). *Libertia belle* (F).
 نوع من الليبرتية . عشبة تزيينية معمرة . ساقها منصبة

٢٥١٩٦ - **لوزية سكرية** ، **ليبة سكرية** *
Lippia dulcis, L. *asperifolia* (S). *Lippie sucré* (F).
 نوع من اللوزة وهي عشبة سبروتية تزيينية معمرة تملو نحو ٣٠ سم . ساقها فروع . اوراقها سكرية الطعم ، متعاقبة ، معتقة . نصلها يضي الشكل ذات الزام الاخير يطول من ٣ إلى ٤ سم . ازهارها عكركوي التجميع ، ابلي الارتيكار او طرفي . ازهارها صغيرة القد يضاء اللون فواحة العرف الطري . تنورها يستمر طوال الصيف .

٢٥١٩٧ - **لوزية ليمونية** * ، **ليبة ليمونية** *
Lippia citradora (S). *Lippie citronnelle*, *Citronnelle* (F). *Herb Louisa*, *Lemon verbena* (E). *Citronenkraut*, *Lemonkraut* (D). *Cedrina*, *Cetrina*, *Erba limoncina* (I).
 نوع من اللوزة التزيينية وهي جنبه سبروتية معمرة تملو نحو ٣٠٠ سم . ساقها منصبة فروع . اوراقها معتقة ثلاثية اوراقها رباحية الضمة . نصلها سنائي الصفحة يطول من ٨ إلى ١٠ سم . . ازهارها هري الشكل . ازهارها بنفسجية اللون . اوراقها وازهارها فواحة العرف الطري القريب الشبه من الليمون وهي تستعمل استهلاك الشاي . تنورها يستمر من تموز إلى آب .

٢٥١٩٨ - **لوزية ثوروية العبد** * ، **ليبة ثوروية العبد** ، **ليبيبة** *
Lippia nodiflora, L. *canescens* (S). *Lippie fleuri aux noeuds* (F).

نوع من اللوزة وهي عشبة تزيينية معمرة . منبها الاصقاع الحارة . ساقها مستقيمة مئدة . قروصها تملو نحو ٣٠ سم . اوراقها صغيرة القد ، اهليجية الشكل ، نصلها سنن الحلقه . ازهارها عكركوي التجميع ، صفدي الارتيكار . ازهارها صغيرة القد تملو من ٣ إلى ٥ سم . وهي عادمة العرف وردية اللون او ليلية . تنورها يستمر من ايار الى ايلول .

٢٥١٩٩ - **لوتيق**
Alcernanthare (F).
 نبات يضي لعة الحمل ، اطليه .

٢٥٢٠٠ - **لشفاعة** *
Innocuité (F). *Innocuousness* (E).
 اللثامة كون الشيء غير مضر او خلوص الشيء من الضرر .

٢٥٢٠١ - **لوتيق**
Hérison (F).
 هو اللغندل ، اطليه .

٢٥٢٠٢ - **ليكاح** * ، **قصص** ، **بليك**
Lamia (S). *Lamie*, *Touille*, *Naslang*, *Requin-mar-souin* (F). *Lamia*, *Porbeagle*, *White shark* (E).

سكة بحيرية مفترسة وحيدة الجنس والنوع من السنطقيات القرشيات . جسمها مردي الشكل يطول نحو ٨ امتار . غطها خروطي يشرف على الفم . نياهاها شقيقة مستطيلة . ثوبها رصاصي اللون يمين وزررق مع القزايه من ثوب الظهر وبدر ويبيض عند البطن . حياتها جهاية سرها يراوح من ٥ إلى ٢٠ زويجا . تألف البحار الباردة والمتدلة ، ويبد منها في المتوسط . قوتها الاسماك من اي نوع كانت . لحما مأكول . نجست منها واحدة حل الشاطئ اللبناني قرب نهر الكلب ، في ضيه ، وذلك في اواخر شهر شباط عام ١٩٥٨ .

٢٥٢٠٣ - **ليكاح** *
 اللباه : الارض البعيدة عن الماء .



لوزة ليمونية



لوزة ثوروية العبد



لياه



لياح



لياح أسود

ترتفع نحو ٤٠ سم. أوراقها ثنائية التصفيف ، ضيقة التصل . أزهارها شبه سنبل التجميع . أزهارها بيضاء اللون ، فواصة البرف أسطر || تنويرها يستمر طوال شهر أيار .

٢٥٢١٢ - ليبرييه رشيقة *

Libertia pulchella (S). *Libertia graciosa* (F).

نوع من الليبرييه . عشبة تزيينية معمرة . ساقها غليظة ترتفع من ١٥ إلى ٣٠ سم . أوراقها شبه سنانة الشكل تطول من ٨ إلى ١٥ سم . أزهارها شبه سنبل التجميع . أزهارها مستطيلة الأذن ، بيضاء اللون || تنويرها يستمر طوال شهر نيسان .

٢٥٢١٣ - ليبرييه زرقاء *

Libertia corulescens (S). *Libertia bleutea* (F).

نوع من الليبرييه . عشبة تزيينية معمرة . ساقها صلبة ترتفع من ٣٠ إلى ٦٠ سم . أوراقها مستطيلة ، ضيقة ، جامدة التصل . أزهارها شبه سنبل التجميع ، سنبل التريب . أزهارها صغيرة الجرم زرقاء اللون يملؤها تمسح اطول || تنويرها صيفي .

٢٥٢١٤ - ليبرييه كبيرة الزهر *

Libertia grandiflora (S).

Libertia à grandes fleurs (F).

نوع من الليبرييه . عشبة تزيينية معمرة . ساقها صلبة ترتفع من ٦٠ إلى ٩٠ سم . أوراقها كبيرة القند تطول من ٣٠ إلى ٧٥ سم . أزهارها سنبل التجميع . أزهارها كبيرة الجرم بيضاء اللون || تنويرها صيفي .

٢٥٢١٥ - ليت *

Erythraea (S). *Palmier bleu* (F).

جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة النخلات. أنواعها قليلة . أصلها البلاد الحارة والاستوائية . أجلاها منتصب مستقيمة . أوراقها مدورة ثنائية . غوصها ثنائي التخليل جامد التصل المنتصب || أعرف أنواعها وأشهرها ما يلي .

٢٥٢١٦ - ليت مسبح

Erythraea edulis, *Brahea edulis* (S). *Palmier bleu inerme* (F).

نوع من الليت الزراعي . مجمرته شجرة تطلو من ١٢ إلى ١٥ م . برهتها كثيفة الأوراق . أوراقها مستطيلة أطرافها كبيرة القند ، قطرها يراوح من ١٥٠ إلى ١٨٠ سم . غوصها جامد التصل . جيل الخسار البحري الزاوي . ثمارها بلحية التركيب ، بيضية الشكل ، صغيرة القند ، سكرية الطعم ، مأكولة .

٢٥٢١٧ - ليت شالكة

Erythraea armata (S).

Palmier bleu piquant (F).

نوع من الليت الزراعي التريبي . مجمرته تملو من ٤ إلى ١٢ م . برهتها مستعدة الكثافة . أوراقها الخسار الأزرق اللضي المراج . قطرها يراوح من ٥٠ إلى ١٢٠ سم . غوصها جامد التصل ، جرائدها تطول من ٧٠ إلى ١٥٠ سم . وهي شائكة الدرز ، غليظة الحشف الاسود المحة .

٢٥٢١٨ - ليت *

Spire (F).

Single turn, *Whoral* (E).

الية دورة الخط الحلزوني .

٢٥٢١٩ - ليت *

Lela (S). *Lela* (F). *Lela* (E).

جنس حشرات من فصيلة القرضيات ودية ذوات الجناحين . أنواعها المعروفة ٣٠ منتشرة في جميع مناطق البلاد المتحدة الحارة || أجسامها غليظة تطول من ٤ إلى ٨ م . رؤسها صغيرة . عينها متباعدة عند الشقين . قرونها الاستشعارية غليظة . ملابسها ربابية العقل . مرافقها نسيطة . كواسها شبه بيضية الشكل . بطونها أحليجية . أطرافها ملونة . رؤسها قسطانية التخصيب يملؤها تجلج وتيتج . قوائمها مستطيلة . ظنايبها مجزأة بمناسق قوية || تألف المراج والغابات والمروج وصفات مجاري الماء ، فتها طلع الأزهار ورحيقها . أساربها غاضلة أو دائمة ويضعها عار .



ليت نافلة

٢٥٢٢٠ - ليت نافلة *

Lytta vesicatoria (S).

Cantharide du frêne (F). *Green cantharide* (E).

حشرة طيبة نافلة من فصيلة الملويدات ، قوبها ذهبي اللون صناعي المراج . جسمها يطول من ١٥ إلى ٢٥ م . الذكر أصفر قدامًا من الأنثى . مرتها الأشجار الحربية أصحها الحران وقد تؤذيها بالتهامها أوراقها . ريقها تبيض حل بعض النباتات المشرية || كانوا وما زالوا ياتسطنها لتجفيفها وصنعها واستعمال مسوحها كنافط وناشط .

٢٥٢٢١ - ليتو ، ليتو

وسلة المكابيل المتوفرة وهو عبارة عن ديسيت مكعب . مضطافته الكاليتري (١٠ ليتو) والمكوكيتري (١٠٠ ليتو) أما أجزاء فهي الليتري والستيتري والليتري .

٢٥٢٢٢ - ليتشي

Litchi (S).

Litchi, *Poncou* (F). *Litchi* (E).

جنس اشجار برية وزراعية من فصيلة الملويدات . مهجها البلاد الاستوائية الاسوية . أنواعها قليلة . أوراقها متعاقبة مدعقة أحليجية . أزهارها حلقي التجميع ، محوري وثاني الأرتكاز ، أزهارها صغيرة القند بيضاء اللون . ثمارها ذكية العرف توكل وتستهمل في استحضار بعض التقشيد والمشروبات الروحية || أعرف أنواعها وأشهرها ما يلي .

٢٥٢٢٣ - ليتشي أصفر * ، رسيوطان

Nephelium lappaceum (S). *Néphélon*, *Ramboutan*

(F). *Rambutan*, *Rampontan* (E). *Rampontan-Frucht*

(D). *Nefelio* (I).

نوع من الليتي الزراعي . ثماره قليلة الشكل صفراء اللون مأكولة ويستخرج من حصيدا بعد تحميره وتقطيعه قشيد كحولي شائع الاستعمال في الشرق .

٢٥٢٢٤ - ليتشي صيني *

Litchi chinensis (S). *Litchi du Chine* (F). *Litchi*, *Lao-*

chee (E). *Litchibaum* (D). *Litchi* (I).

نوع من الليتي الصيني مهده الصين حيث تكثر زراعته الاستوائية . ثماره بيضية الشكل والحجر اللون مأكولة ويستخرج من حصيدا بعد تحميره وتقطيعه قشيد كحولي لاذع شاطئ شائع الاستعمال .

٢٥٢٢٥ - ليتو هي قوية الثقلر ، اطليا .

٢٥٢٢٦ - ليتوب *

Lichobius (S). *Lichobie* (F).

Lichobius (E). *Brauner Steinkriecher* (D).

جنس دويبات من فصيلة الليتريات . أنواعها كثيرة العمد



ليتشي أصفر



ليتشي صيني



ليتوب

أَبُو عُوَيْفٍ ، أُمُّ عُوَيْفٍ ، أُمُّ قَيْسٍ
Fourmil-ion, Myrméleon (F). Ant-lion, Myrmeleon (E).

جلس حشرات من عصبيات الجناح. أنواعه عديدة منتشرة في جميع اصقاع البلاد الحساسة وفي بعض مناطق البلاد المعتدلة. حشراتا مرتقة تعيش على رقيق الاثمار ، أما دعاميها لفترمة تصيد الحشرات الصغيرة اغصها النمل.

٢٥٢٣٣ - لَيْثَمِمْ
Licmetis (S). Licmetis (F). Licmetis (E).

جلس طير من المتسلقات وفصيلة البهارات. انواعه المعروفة ثلاثة موطنها استرالية ونيبانية وجزر سليمان. تألف العنايات والمواقع الرطبة. ملجئها الحيواني جاهي. افواجها قليلة العدد. قوتها البذور والبصل والمساقل وبعض الحشرات والاساريع || اجسامها مستدلة القد ، طولها من ٤٥ سم. تتميز بتقاعدها الحسنة الذرية التي طولها من ٥ سم. ٦ سم. ويقتصر اذناها المستديرة الاطراف. انوثها الى البياض الماسي يعده موج اصفر او اخضر ويشمل القصعة السفلى من الجناح ويمتد الى الاطيان والانفك. رؤوسها وحاسرها وكشاتها الى الحمرة التي تختلف ملامحها مع اختلاف الانواع.

٢٥٢٣٤ - لَيْثُوم
Lithium
فلزات قوية تبيد في الطبيعة وفي بعض النباتات اغصها النخج || وهو ابيض اللون ففي الرهبة اصلب من البوتاسيوم والصوديوم. نقله النوبي ٥٩٠. ينصهر في ١٨٠ درجة مع.

٢٥٢٣٥ - لَيْثِيَّة
Ligia (S). Ligie (F). Ligia (E).
جنس دويبات بحرية من القشريات متساويات الارجل وفصيلة الظرومليات. انواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع بحار العالم. تألف القطيوط البحرية || اجسامها صغيرة ، اهليجية الشكل ، معتدلة التبيط. رؤوسها صغيرة. عيونها جاحضة. قرونها الاستمدارية مستطيلة ، مركبة. ملامسها الشريفة فارة الاطراف المستدعية المستطيلة.

٢٥٢٣٦ - لَيْثِيَّة
Liche (F).
سمكة بحرية تدهى سمومها ملساء ، اطلمها .

٢٥٢٣٧ - لَيْثِدَة
Lyde (S). Lyde (F).
جنس حشرات من المشاريات غشائيات الاجنحة. انواعه نحو ٥٠ اجسامها صغيرة القد ، مستطيلة ، ملونة. اجنتها خفيفة. رفاقها مستدقة تهمة تركب الانجار الحرجية والمثمرة اغصها الصنوبر والتوتوب والدراق والاجاص فلتهم الارواق وتقتضي عليها || اشهر انواعها واغرها ما يلي .

٢٥٢٣٨ - لَيْثِدَة الْإِجَاص
Neurotoma flaviventris (S). Lyde du polier (F). Pear web-spinning sawfly (E). Gesellige Birnblattwespe (D).
نوع من الليفة وحيدة الجبل الحولي ، جسمها يطول من ١٢ الى ١٤ سم. لونه الى السمرة يطولها يتبع متعصر اصفر يمتد من الرأس الى الشرج || رقتها برفقالية اللون ، سوداء الرأس ، عديمة الارجل البطينية تظهر في الربيع . تركب اوراق الانجار المثمرة اغصها الاجاص .

منتشرة في معظم اصقاع العالم . اجسامها مركبة من ١٥ حلقة تحمل ١٥ زوجاً من الجرايم منها ثلاثة ازواج صغيرة القد .

٢٥٢٣٧ - لَيْثُوب مَبْدُول
Lichobius forcipathus (S). Lichobie à tenailles (F). Lichobius (E).

دويبة مفترمة مبدولة من فصيلة الليثوبيات ورثبة الشداعيات شقويات الارجل ، موطنها يشمل معظم مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحارة من الماين القدم والجلجد || جسمها قريب الشبه بجسم الحريش ، مبطل الشكل ، مستطيل . مركب من ١٥ سكة . الاكر اصغر قدماً من الاثني يطول نحو ٣٥ م. والاثنى يطول نحو ٦٠ م. رأسها صغير الجرم ، مستعرض الشكل . حنثاها زخميتان . شيفها ضليمان ، مقصوص ينثيان بكائنتين قويتين . زباناها مستطيلان اعرجان . جبرامها نشيطة . ثوربا الى الشفصة الحظية الملاج . مدنها وجبرامها الى الطلعة الثبراء || تألف الاراضي الزراعية والملاحة . مسرحها دجوي . قوتها الحشرات والرعويات الصغيرة . عضتها مؤلة لكنها قليلة الاذى .

٢٥٢٣٨ - لَيْثُوبِيَّات
Lithobiidae (S). Lithobies (F). Lithobiidae, Lithobius (E). Steinläufer (D).
فصيلة دويبات من الشداعيات الشقويات الارجل . اجسامها وانواعها عديدة ، اشهرها الليثوب .

٢٥٢٣٩ - لَيْثُوفَانَة سَمْرَاء
Lithophane semibrunnea (S). Lithophane semibrune (F). Lithophane semibrunnea (E).

حشرة من الشقيبات حشرشيات الاجنحة . موطنها بعض اسراج الشرق الادنى . فراثتها جارسة قوتها رقيق الاثمار . سرقتها تعيش على اوراق السنديان || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٧ م. بسطها نحو ٤١ م. رأسها فاسي الشكل ، اسمر اللون . عيناها كبيرتان . زباناها غيظان . جوثها اسمر اللون ، حثلي الملاج . بطها حثلي اللون اسمر الحيد || رؤسها الانمايان الى الحثلي الاسمر يطول تفيج اسمر قائم . رؤسها الخلفيان الى الحثلي الاخير يطول تقطيط اسود في اختار الخارجي . اهدابها حثلية || لها جبل واحد في الحول . تظهر القرافة في ايلول وتبقى حتى ايار . تسرح في الليل . تمتع الممكن لطفاً مستطيلة على الصفحات التشل من نصال اوراق السنديان || الرقة عند ادراكها الكمال الجسموري طولها نحو ٣٥ م. جسمها اسطواني الشكل ، مشددة القشار ، ارمد اللون ، اسمر الملاج يطول خط لثبي اثير ورقة خطوط جانبية متعرجة صفراء اللون . رأسها مخروطي الشكل ، اسود . مدنها وراجبها الى السمرة || طول الاكمال يستمر نحو ثلاثة اسابيع ويتقضي في التربة حيث تنضج الرقة ملتصقة بجلباب من العن .

٢٥٢٣٠ - لَيْث
Lion (F).
الليث هو الاسد . ج. ليث .

٢٥٢٣١ - لَيْث
الليث : نبات ملتص (اللسان) .

٢٥٢٣٢ - لَيْث عَفْرِين
بقرّة بيتي إسرّاكيل ،



ليثوب مبدول



ليثوبان سمراء



ليث عفريين



ليث



ليثة الاجاص



ليدة الدراق



ليدرك سوني العرف



ليدك شتم



ليدك حراير



ليدك مسيك



ليشة

انواعه المعروفة خمسة منها حوض البحر الابيض المتوسط
وجزر كنارية || جميعها نباتات نجمية قراءه. اوراقها
مركبة ، وقرية ، ثلاثية الوريقات ، غفلة الشكل .
ازهارها عقديدي طرفي . ازهارها صفراء اللون او ارجوانية .
ثمارها قرون مبطنة خلية القشار || اشهر انواعه اللبب
المخشب واللبب اليوناني .

٢٥٢٤٦ - لَيْدَبْ صُلْبَشَب

Adenocarpus divaricatus (S).
Adenocarpus divariqué (F).

نوع من اللبب . طوي في جبال لبنان . فروه مزينة
الساه . وريقاته السفلية بيضيه النصال . اما العليا
فسنانية || تنويره صيفي . ازهاره صفراء اللون .

٢٥٢٤٧ - لَيْدَبْ يُونَانِي

Adenocarpus graecus (S).
Adenocarpus de Grèce (F).

نوع من اللبب . طوي في جرد لبنان . فروه وكزوس
ازهاره مزينة وخليه || تنويره صيفي . ازهاره صفراء اللون .

٢٥٢٤٨ - لَيْدُون

هو الاسلخ ، نبات بري طوي ، اطلبه .

٢٥٢٤٩ - لِيْرِدَنْدْرُون

Liriodendron (F).

هي شجرة التوليب ، اطلبها .

٢٥٢٥٠ - لِيْسَر

Lysa (F). *Lysis* (E).

اسم تعريفي يطلق على الامخلل السنجي الذي تحبه
بعض الدوامل المتفوية المعروفة باليزين .

٢٥٢٥١ - لِيْزُول ، لِيْسُول

Lysol
سائل دهن كئيف المادة، جوزي اللون، اسمر المايه، مركب
من الكريوزيت والقطران والشمق والصابون . وهو من
المطهرات الفعالة الشائعة الاستعمال الزراعي .

٢٥٢٥٢ - لِيْسَيْن

Lysine (F). *Lysin* (E).

الليزين مادة عضوية مجهولة الطبيعة تملك خاصية تلويب
الكربات الحمر وحجيرات النسيج والبكتيريات .

٢٥٢٥٣ - لِيْسَكْسَيْن

Leycesteria (S).
Leycesteria (F).

جنية معمرة برية وتربنتين من فصيلة المانيات . منها
الباد الاسيرة الحارة . ساقها منتصبة فراءه جفاء تملو
من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . اوراقها عابطة متقابلة ، نصلها
بيضي الشكل ذات الزرام الاخير يطوي نحو ١٦ سم . ويعرض
نحو ٩ ازهارها حيلة القالب ، يسهام اللون ، وريدة
التنويح ، ارجوانية القنابات ، عقديدي التنجيم . متدلية .
ثمارها حنينة جلوية || تنورها يستمر من آب الى ايلول .

٢٥٢٥٤ - لِيْسِن

Chrysopogon (S).
Chrysopogon (F).

نبات عشبي بري مرعوي حولي من النجيليات . يكثر
في الاراضي الجبلية الملحاة . وهو من نباتات لبنان الطوية .

٢٥٢٥٥ - لِيْشِيَّة

Lichia amia (S). *Liche amia* (F).

مسكة بحرية من الاسقمريات . جسمها اهليبي الشكل ،

٢٥٢٥٦ - لَيْدَكَةُ الدَّرَاقِين

Neurotoma nemoralis (S). *Lyde du pècher* (F).
Apple web-spinning sawfly (E). *Gesellige Pflsch-*
blattwespe, *Steinobet-Gespinnstblattwespe* (D).

نوع من الليدة وحيدة الجيل الحولي ، جسمها يطوي من
٧ الى ٨ سم . لونها الى السمر السوداء . رأسها مبطع بالاصفر
يطها جمعد بالابيض . تظهر في اواخر نيسان ، تمتع
مكثا على سطوح الاوراق السفلى فينثف من رقصات
منطقة نمة لونها الى الخضرة المابقة لملوحا خطوط سمر
قائطة ، تركب بعض الاشجار المصرة انحصها الدراقين
واللوز فتلثم الاوراق بعد ان تمتطها ينزلها المتكوي
الدقيق .

٢٥٢٤١ - لَيْدَكَّة ٥ لَدَاك ٥

Rhodopaxillus (S). *Rhodopaxille* (F).

جنس فطور كاملة التركيب من فصيلة الداريقيات
انواعه المعروفة قليلة العدد اصطناعا النباتات والحراج الجبلية .
تتميز بالونها الزاهية . جميعها مأكولة مستحبة الطعم
والرطب || اعرف انواعها واشهرها الاربعة التالية :

٢٥٢٤١ - لَيْدَكَّة سُوْسِي الْعَرَف ٥

Rhodopaxillus irinus (S). *Rhodopaxille iris* (F).

نوع من اليدك . يعيش على الدبال والمواد النباتية المتحللة .
يوجد عند اطراف الغابات وفي منطقاتها . ساقه غليظة ،
مستضخمة القاعدة ، معتدلة الارتفاع ، غبراء اللون .
نكته قلنسوية الشكل ، سوسية العرف ، ليلكية اللون
يطولها موج صناعي ، قطرها نحو ٧ سم . اطراسها اصفر
اللون || لحيته مأكولة ، فاعرة الصنف .

٢٥٢٤٢ - لَيْدَكَّة شَمِيْم ٥

Rhodopaxillus saevus (S). *Rhodopaxille sinistre* (F).

نوع من اليدك . يعيش على الدبال في المراعي . ساقه
قصيرة ، مستضخمة ، بضعجية اللون . نكته كبيرة القند
قطرها نحو ١٢ سم . لونها الى البني الاسفع يزوه عند
الحافة . اطراسها الى الصفرة البنية الموج || لحيته جيدة
الصنف ، مأكولة .

٢٥٢٤٣ - لَيْدَكَّة حَرْبَان ٥

Rhodopaxillus nudus (S). *Rhodopaxille nu* (F).

نوع من اليدك . يعيش على المواد النباتية المتحللة . ساقه
معتدلة النلاخة والارتفاع ، مستضخمة القاعدة ، ليلكية
اللون . نكته صاجية الشكل ، قطرها نحو ١٠ سم . لونها
الى البضعجي يطوي موج كسني اسفع . اطراسها ليلكية
اللون || لحيته مأكولة فاعرة الصنف .

٢٥٢٤٤ - لَيْدَكَّة مَسِيْك ٥

Rhodopaxillus sordidus (S).

Rhodopaxille sordide (F).

نوع من اليدك . يعيش على الدبال في حواشي الغابات ،
ساقه معتدلة اجرم بنضجية اللون . نكته منتشة الصلحة
المنتدرة ، قطرها نحو ٦ سم . لونها الى البضعجي ،
اطراسها الى الليرة اليلكية الموج || لحيته جيدة الصنف ،
مأكولة .

٢٥٢٤٥ - لَيْدَب ٥

Adenocarpus (S).

Adenocarpus (F). *Adenocarpus* (E).

جنس نباتات برية وتربينية من فصيلة القرنيات الفراقية .

من عضوية ومعنية || أنواعها المعروفة كثيرة أشهرها الثلاثة التالية :

٢٥٢٦٢ - ليكوريديس بهي *
Lycoris radiata (S).
Lycoride rayonnante (F).

نوع من اليكوريدس . عشية دوفضية سريرية منبتها الصين واليابان . شراخها يعلو من ٣٠ إلى ٥٠ سم . أوراقها قديمة الشكل تفرش نحو ٢ سم . تصلها إلى الخضر البحري . أزهارها قصيرة الكؤوس منبسطة البتلات النجمية الشكل ، قطرها نحو ٤ سم . لونها إلى الأحمر القرمزية يطوقها إطار أبيض || تنويرها يستمر طوال شهر حزيران .

٢٥٢٦٨ - ليكوريديس مذهبي *

Lycoris sanguinea (S). *Lycoride rouge-sang* (F).
نوع من اليكوريدس . عشية دوفضية سريرية . منبتها اليابان . شراخها يعلو من ٣٥ إلى ٥٠ سم . أوراقها صغيرة نحيلة ، تظهر على الأزهار ، لونها إلى الخضر الالامس . أزهارها مستديرة الجرم تطول من ٤ إلى ٦ سم . قطرها نحو ٤ سم . لونها إلى الأحمر الدامية اللامعة || تنويرها يستمر من تموز إلى آب .

٢٥٢٦٩ - ليكوريديس مذهبي *

Lycoris aurea (S). *Lycoride dorée* (F).
نوع من اليكوريدس . عشية دوفضية جادة مطلية . منبتها الصين . شراخها يعلو من ٣٠ إلى ٥٠ سم . أوراقها قديمة الشكل ، تصلها إلى الخضر البحري . أزهارها مائدة البرف تطول نحو ٨ سم . لونها إلى الصفار الذهبي || تنويرها يستمر من تموز إلى أيلول .

٢٥٢٧٠ - ليكوس *

Lycus (S). *Lycus* (F). *Lycus* (E).
جنس حشرات من فصيلة اليكوسيات . وربة مبهديات الاجنحة . انوله المعروفة عديدة ، منتشرة في بعض المناطق الاستوائية والحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة ، مستطيلة الشكل ، هبها ، تطول من ٧ إلى ١٢ م . رؤوسها صغيرة . عيونها بارزة . تأثيرها وفكرها نظامية . قرونها ملاحسا صغيرة . قرونها الاستشعارية خيطية . كواسلها شبه مربعة الشكل . المهادها لاسفة . قوائها نشيطة . انولها ملوكة || الحشرة الجلجلة خاضعة وواضحة ، اما البرقة ففترسة .

٢٥٢٧١ - ليكوسيات *

Lycidae (S). *Lycidae* (F). *Lycidae* (E).
فصيلة حشرات من مبهديات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في بعض اصقاع البلاد الاستوائية والحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها مستطيلة الشكل ، معتدلة النحيط ، تطول من ٩ إلى ١٥ م . رؤوسها صغيرة . عيونها بارزة . تأثيرها وفكرها ملاحسا نظامية . قرونها الاستشعارية خيطية ، مركبة من ١١ فصلة . كواسلها صغيرة . المهادها لاسفة . رشفة . ارساها خاضعة المعقل || أشهر اجناسها اليكوس .

٢٥٢٧٢ - ليكوفوسيه أرجوانية *

Lycophotia porphyrea (S). *Lycophotia pourpra* (F). *Lycophotia porphyrea* (E).
حشرة من الفسقات حرشفات الاجنحة . موطنها بعض اقاليم حوض البحر الابيض المتوسط . فراشها جارية

كبير الله ، يطول نحو ١٠٠ سم . تتميز بمشطها الثاني الانسان الذرية الحادة الذي يتقدم الزمعة للظهرية . اصلاها شرق البحر المتوسط . يكثر وجودها في العنق . شها مأكول متوسط الصف .

٢٥٢٧٦ - لبطة *
Pellicule (F). *Pellicle* (E).
البط : قشر القصب اللازق به . الواحدة لبطة .

٢٥٢٧٧ - لبتييات *
Lypoidae
فصيلة حشرات من نصفيات الجناح تنهي أيضاً طيريات .

٢٥٢٧٨ - لبث *
هو اللوف ، اطبا .

٢٥٢٧٩ - لبثاني ، لبثي *
Filamenteux (F). *Filamentous* (E).
ما كانت نسجه لبثي التركيب .

٢٥٢٨٠ - لبثية ، لبثير *
Fibre (bot).
البث خلايا مستطيلة مردنية الشكل ، خشبية الجدران تجتمع على شكل نسج لبثي .

٢٥٢٨١ - لبثين ، لبثسوس *

Byssus (F). *Byssus* (E).
مادة لبثية شديدة التمدد تفرزها بعض الرغويات للالتصاق بالصخور المغمورة بالماء . وقد يحاك منها نسيج اتم من الحرير لونها إلى الخيطي اللبني المواج .

٢٥٢٨٢ - لبثسي ، لبثسوسية *

Byssogene (F). *Byssogenic* (E).
نمت تبرعني يطلق على كل ما له صلة باللبثين كاللدة اللبثية وغيرها .

٢٥٢٨٣ - لبثي *
Ligneux (F). *Ligneux* (E).
نمت تبرعني يطلق على النباتات الخشوية السوق والفرع .

٢٥٢٨٤ - لبثين *
Fibrine
هي القبرين ، مادة آسية حيوانية أو نباتية تستخرج من الدم في الحيوان على شكل خيط يبيض .

٢٥٢٨٥ - لبثكس *

Lycate (S). *Lycate* (F).
جنس نباتات معمرة نارية أو أمية من فصيلة السحليات . انواعها المعروفة نحو ٢٠ جميعا أمريكية المهد وقد انتشرت زراعتها المركبة الأريينية في معظم اقطار المعمورة || سيقانها دوفضية تطول من ٤ إلى ٨ سم . أوراقها قليلة العدد معتقة ، كبيرة التصل تطول من ٣٠ إلى ٦٠ سم . أزهارها وصيدة كبيرة قطرها يراوح من ١٢ إلى ٢٠ سم . تركزز على شراخ دقيقة لبثية تملو من ٢٥ إلى ٤٠ سم . ألوان أزهارها عديدة أكثرها الأبيض والاحمر والاصفر والأبيض الموشق بالجلودي والاصفر المرسط بالكتني ... تنويرها يستمر من تشرين الثاني إلى أواخر آذار .

٢٥٢٨٦ - ليكوريديس *

Lycoris (S). *Lycoride* (F). *Lycoris* (E).
جنس نباتات عشية دوفضية من فصيلة الترجسات . منبتها الصين واليابان . شراخها مصتة . أوراقها نبيقة التصل . أزهارها شبه قمية الشكل صفراء اللون أو حمراء || تزود للزيت من بين البتوت وفي الحقائق . قروب في الارابة المنسوبة التركيب المنصري الوافرة المواد النفاذية



ليكاس



ليكوس



ليكوفوسيه ارجوانية

كوكورن الرباعية الستين . يتلونها رباعية التخصيص .
اسديتها ثنائية التركيب . ثمارها جراء ثنائية المصارع .
اعرف انواعها واشهرها ما يتبع .

٢٥٧٦ - تيلك اوزق ، تيلك مبدل

هو الأفران ، اطليه .
Lilas commun (F).

٢٥٧٧ - تيلك اوزب

Syringa pubescens (S).
Lilas pubescent (F).
نوع من اليلك التريبي جنبته تملو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . فروعهما مجزوة اللون . اوراقها بيضيه ذرية ، نصلها خلي البشرة على صفحته . ازهارها مستطيلة الشكل ، ارجوانية اللون ، ياسمينية العرف المستحب || ازهاره يستمر طوال شهر ايار .



ليكوفوسب ناهمة

٢٥٧٨ - تيلك حماريا

Syringa emodi (S).
Lilas de l'Himalaya (F).
نوع من اليلك التريبي جنبته تملو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم . اوراقها اهلينية الشكل نصلها اسم العروق ، خلي البشرة الشغل . ازهارها زرقية ، غبراء اللون ، كريمة الرائحة || ازهاره يستمر طوال شهر حزيران .

٢٥٧٩ - تيلك ريشي

Syringa pinnatifida (S).
Lilas à feuilles pennées (F).
نوع من اليلك التريبي جنبته تملو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم . اوراقها مركبة ويشية . وريقاتها سباعية او تساعية العدد ، نصلها ازغب المقصعة الشغل . ازهارها ودية اللون خاتبة العرف || ازهاره يستمر من نيسان الى ايار .

٢٥٨٠ - تيلك صيني

Syringa chinensis (S).
Lilas de Chine (F).
نوع من اليلك التريبي تجرته تملو من ٥ الى ٦ أمتار . اوراقها سنائية النصل مستطيلة الانحاء المجزوة اللون . ازهارها الى البياض الثلجي شكل كريمة الرائحة || ازهاره يستمر من ايار الى حزيران .

٢٥٨١ - تيلك عريش القوق

Syringa oblata (S). Lilas à larges feuilles (F).
نوع من اليلك التريبي ، جنبته تملو من ٢٠٠ الى ٤٠٠ سم . اوراقها مستعرضة تعطي وتعرض نحو ١٢ سم . نصلها لامع البشرة على صفحته ، شبه الخشخاش الباق . ازهارها ليكية اللون فواحة العرف الطري || ازهاره قصير الامة يلوم نحو ٢٠ يوما ابتداء من النصف الثاني من نيسان .

٢٥٨٢ - تيلك فارسي

Syringa persica (S).
Lilas de Perse (F).
نوع من اليلك التريبي ، جنبته تملو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم . ازهارها واقتناحية نخلة . اوراقها سنائية ، نصلها جامد المقصعة زاهر الخشخاش يطول نحو ٤ سم . ازهارها بنفسجية اللون فواحة العرف الطري || ازهاره يستمر من ايار الى حزيران .

٢٥٨٣ - تيلك ياباني

Syringa japonica (S).
Lilas japonais (F).
نوع من اليلك التريبي ، شجرته تملو من ٧ الى ٨ أمتار . اوراقها سنائية ذرية ، نصلها خلي المقصعة الشغل ، بحري اللون ، ازهارها حادة العرف ، لونها الى البياض الثلجي ، قندما كبير القد يطول نحو ٣٠ سم . ويعرض نحو ٢٠ سم . تنوره يستمر طوال شهر حزيران .



ليك

قوتها رقيق الازهار . سرفها تمش على اوراق الخلفيات واخصها السوم || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٢ م . يسلها نحو ٣١ م . رأسها فاسي الشكل . عينها كبرتان . زباناها عيطان . مرفها معتدل الجرم والظلي . جوشها ويطها الى الكلفة المشيرة بالازجولي || ورشها الاماميان الى الحمة الاجوانية تملوها زركشة يضاء وتزاورق سود ورققة حطية . ورشها الخلفيان الى الكلفة يملوها موج اشع وجدار اسمي يستيق الانهداب التينة || لها جليل واحد في الحول . تظهر . القراشة في حزيران وتبقى حتى آب . تسرح في الجبل . تماطل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتفتح المكن مجاديا على الصفحات السفلى من نصل الارواق || السرعة عند بلوغها الادراك التام تطول نحو ٣٠ م . جسمها اسطواني الشكل ، مشدود القشار . قوتها الى الخشخاش الاطسل تملوه ثلاثة عطلون فضاء القرون يتوسطها الجوزي الاسود المواج . رأسها الى المجرة . مدتها الى النملة . رواجها سود || طور الاكمال الذي يضر من اسبوعين الى ثلاثة اسابيع يتغني في التربة ضمن جلباب من الطين يلحف السرعة .

٢٥٧٣ - ليكوفوسب ناهمة

Lycophotia saucia (S). Lycophotia polyphage (F).
Lycophotia saucia (E).

حشرة من فصيلة النسيقات حشرقيات الاجنحة . موطنها عند من الشرق الاوسط الى اوروبا وافريقية الشالية والبلاد الاريقية . فراشها جارة قوتها رقيق الازهار . سرفها خاضعة ناهمة تمش على اوراق النباتات المختلفة من البقول الى النباتات الزراعية والصناعية والتريبية والنجار الحشرة || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٨ م . يسلها تراوح من ٤٠ الى ٥٠ م . رأسها فاسي الشكل . عينها كبرتان . زباناها عيطان . مرفها معتدل الجرم والظلي . جوشها ويطها الى الخشخاش الاسود المواج || ورشها الاماميان الى المجرة السنائية المواج تملوها زركشة وتزاورق سمراء اللون . ورشها الخلفيان الى البياض الاخضر يطفو حشار حطلي || لها ثلاثة ابيال في الحول . تظهر فراشة الجليل الاول في نيسان وفراشة الجليل الثاني في حزيران وفراشة الجليل الثالث في ايلول . تسرح في الجبل وتماطل بعد ظهورها بنحو عشرة ايام وتفتح المكن مجموعوات متباعدة العدد على الصفحات السفلى من نصل الارواق التي تتلاشى التربة || الطور الاسروي يستمر نحو ستة اسابيع في الجليلين الاول والثاني ونحو ٣٧ اسبوعا في الجليل الثالث . والسرعة عند ادراكها الكمال الجسوري تطول من ٤٥ الى ٤٥ م . جسمها مستدق القدم مستطيل المخرج . قوتها متعادل السرعة والكهة يملوه خط لبي اسود متعرضة نقط صفر . رأسها منقط بالاسود || طور الاكمال الذي يستمر من اسبوعين الى ثلاثة اسابيع ، في جميع الاجيال ، يتغني في التربة ضمن جلباب من الطين .

٢٥٧٤ - تيل

Courilson (F). Whimbrel (E).
الليل هو فرخ الكروان . يفاك فلان اجين من ليل .

٢٥٧٥ - تيلك * و يسلج و يسلج

Syringa (S). Lilas (F). Lilac, Pipe tree (E). Lilac, Flender (D). Lilac, Siringa, Lilas, Serenella (I).
جس ثنائيات برية وتريبيتين من فصيلة التريبيتات . انواعها عديدة منها الجنيات والنجار . افتناها واراقها متقابلة . ازهارها قوتي التجميع ، ناهي الازنكار . ازهارها قصيرة

الكهبا اللون بين تكون الصفحة اليسرى يضاء اللون غبراء المواجه . وهي من الاسماك المأكولة المتسببة الطعم .

٢٥٢٩٣ - لِيْمُونُغَال عَقْدَاس

Limnogaes mergulus (S). *Limnogaes plongeur* (F). حيوان لين حاشر من فصيلة المذاليات . موطنه جزيرة مدسكير . يألف صفاق مجاري الماء . قوته الحشرات والديدان || جسمه صغير القند مكرود بطول نحو ٢٦ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ ١٣ سم . رأسه فيه غمرقوي الشكل مستطيل الخطم . عيناه وأذناه صغيرتان . جوارحه قصيرة . جميع أصابعه مخبئة عما يساعده على السباحة والغوص ثوبه الى الشققة السمراء . وبره دقيق ناعم || الاثني ثنود تقع في كل رصص من ٨ الى ١٠ جراء .

٢٥٢٩٤ - لِيْمُونُفِيلِيَّات

Limnophiliidae (S). *Limnophiliidae* (F). فصيلة حشرات من رتبة جلولويات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة كثيرة المنتشرة في معظم اقطار العالم || اجسامها متباينة الحجم . اثنائها تراوح من الطفلة الى السمر . ملابسها الفكية ثلاثية الاجزاء عند الذكور ، خماسيتها عند الاناث . رئامها مسووجة . اجنتها الامامية رقيقة يعطيها بعض الحمل المبهر . قوائمها الامامية مجهزة بمنحس ظنبوي الارتكاز . قوائمها الوسطى ثلاثية المنحس || اساريمها تمشي في الماء ملحوقة بجلايب مختلفة الاشكال منها الاسطوانية والمخروطية والمهرسة والمبطلة .

اشهر اجناسها :

<i>Limnophilus</i> (S).	الليمفيل
<i>Anabolia</i> (S).	الانابوليا
<i>Grammotaulius</i> (S).	الغراموتوليس
<i>Colpotaulius</i> (S).	الكولتوليس
<i>Mesophylax</i> (S).	الميزوفلاكس
<i>Halesus</i> (S).	الهلسوس
<i>Drusus</i> (S).	الدروسوس
<i>Enotylia</i> (S).	المنتيل

٢٥٢٩٥ - لِيْمُونُور

Lemur (S). *Lémur* (F). *Lemur* (E). جنس حيوانات لاحة صغيرة من الليموريات . انواعها المعروفة اربعة . مهداة فصاف وبرقعات جزيرة مدسكير . جميعها مستطيلة الشكل . مستطيلة الاجسام الرشيقة والاذناب المطلة || تألف الغنايات . تسرح في الليل او في النهار . قوتها الحشرات والمغاة ويختلف الزخافات والطير والثمار .

٢٥٢٩٦ - لِيْمُونُورِيَّات

Lémuriens, Prosimiens (F). رتبة حيوانات لينة من القربصيات الليمشيات تشمل و فصائل تضم بعض الاجناس والمند من الانواع . جميعها صغيرة القند ، رشيقة القوام ، مستطيلة الاذناب .

٢٥٢٩٧ - لِيْمُونُور

Citrus (S). جنس اشجار وتجويرات مشمرة برية وزارعية من الحمضيات . انواعها عديدة اعطانها البلاد الحارة . سوقها متنبية فراءه ، قنار ، حشفة . اوراثها معقنة . نصالها مستطيلة لامة الخضار . ازهارها غنثرية مشرقة عطرة . ثمارها مختلفة الاشكال والاحجام والالوان . يغلب فيها الاخضر الاصفر

٢٥٢٩٨ - لِيْمُونُورِيَّات

هي التفتيات ، فصيلة حشرات ، اطليها .

٢٥٢٩٥ - لِيْمُونُورِيَّات

هي التفتية من الحشرات ، اطليها .

٢٥٢٩٦ - لِيْمُونُورِيَّات

Haplatius humilis (S). *Héptale du houblon*. *Phalène du houblon* (F). *Ghost swift moth* (E). *Hopsfenwurzelbohrrer* (D).

حشرة من الليمونيات ، جسمها غليظ الشكل حشفي اللون ، بسطها تراوح من ٥٠ الى ٦٠ سم . الاثني اكبر حشبات من الاكبر . رواثها الى الصفرة الزردية يعطيها تقيح اخر . رواثن الذكر فضية اللون جزئية الاهداب . جيلها الحولي واحد . يكثر وجودها من حزيران الى تموز . تمشي رقتها على جلود الجنبل تسطها وتؤذيها .

٢٥٢٩٧ - لِيْمُونُورِيَّات

هي فرقة النودة القارضة ، راجعها .

٢٥٢٩٨ - لِيْمُونُورِيَّات

Laelia (S). *Lélie* (F). *Laelia* (E). جنس نباتات شتية امنية من فصيلة السطليات . شاربها لاقطاسية الارتقام . اوراثها مسيكة النصال القاسية . ازهارها متفوي التجميع ، طرفي الارتكاز . ازهارها كبيرة بعضها عطري المرف || انواعها المعروفة قليلة ، اشهرها التالية :

٢٥٢٩٩ - لِيْمُونُورِيَّات

Laelia furfuracea (S). *Lélie furfuracée* (F). نوع من الليمونيات منها المكسيك . ساقها رقيقة تملو نحو ٧٠ سم . اوراثها عديدة اهلجية النصال الخراشية الصفحات العليا . ازهارها كبيرة القند عطرة ، قطرها نحو ١٢ سم . لونها الى البياض المائي يماها في وسطها بقعة مستديرة صفراء || تنويرها يستمر طوال فصل الخريف .

٢٥٢٩٠ - لِيْمُونُورِيَّات

Laelia pumila (S). *Lélie naine* (F). نوع من الليمونيات . ساقها دقة مستطيلة متنبية تحمل ورقة واحدة اهلجية النصل . زهرها واحدة كبيرة القند ، وردية اللون ، قطرها نحو ١٠ سم . وهي فواحة المرف الطل ، تركيز على خراج يرتفع نحو ٥ سم . || تنويرها يستمر عدة اسابيع بين ايلول ونشرين الاول .

٢٥٢٩١ - لِيْمُونُورِيَّات

Laelia peduncularis (S). *Lélie à long pedoncule* (F). نوع من الليمونيات . منها المكسيك . ساقها خراشية قصيرة تحمل ورقة واحدة اهلجية النصل المقطوم الطرف . ازهارها وردية اللون مبقجة بالبنيجي || تنويرها يستمر طوال فصل الصيف .

٢٥٢٩٢ - لِيْمُونُورِيَّات

Limnoda vulgaris (S). *Limnoda*, *Lime* (F). *Dab* (E). سمكة بحرية من اللساوات الجانيبات الموم تنتمي الى جنس اسماك موسى . جسمها بيضي الشكل مبطل القالب يعطي نحو ٣٠ سم . وهي تتميز باختلاف لون صفحي جسمها وباتكاز منها الواحدة فوق الاخرى على الصفحة اليسرى



ليمونجول



ليمونور



ليمونور



ليمونور

منها الحلوة ومنها الحامضة ومنها الحامضة المرة. اشهر انزله ما يلي .

٢٥٢٩٨ - **لَيْمُونُ اَصَالِيَا *** ، **بَرْغَمُوت** ، **زُبُون**
Citrus bergamota, C. bergamia (S). Bergamotier, Bergamotier (F). Bergamot orange (E). Bergamot-tensitrone (D). Bergamotta (I).

نوع من الليمون الزراعي المجهول المهد. تكثر زراعته الصناعية في بعض مواسل المتوسط انحصا السواحل الايطالية حيث يستخرجون من قشور ثماره عطر البرغوث. شجرته صغيرة القد، اغصانها متفرجة. اثمارها ولونها خضراء اللون. اوراقها مستطيلة الاضلاع. ازهارها بيضاء اللون، فواحة العرف المطري. ثمارها برعمية الشكل مقطوعة الرأس. قشورها كثيفة الجيوب العطرية غزيرة المادة. عصارة حمورها حامضة.

٢٥٢٩٩ - **لَيْمُونُ اَلْهِنْدِي *** ، **يُوسُفُ اَلْهِنْدِي *** ، **يُوسُفِي** ، **هَمْدَرِين**

Citrus nobilis, C. nobilis deliciosa, C. deliciosa (S). Mandarinier (F). Mandarin orange (E). Mandarine, Jericho Orangenbaum (D). Mandarina (I).

نوع من الليمون الزراعي المشهر. حموره واصرامه حميدة، مهدا الصين وقد عمت زراعتها معظم المناطق الحارة انحصا البحرية. اجماره صغيرة القد تملو من سترن الى سبعة امتار. سوقها منتصبة، اغصانها متفرجة، انتادها فناء. اثمارها دقيقة مستطيلة، اوراقها متعاقبة، معتقة، بسيطة. نصلها احليجي الشكل، ذات الزام الاخير، لونه الى الحمرة الباقية. ازهارها بيضاء اللون خافتة العرف. ثمارها مستديرة منتفخة الظهين ترض من ٥ الى ٧ سم. قشورها مشطلة وافقة تقبض لا تلصق بالحموص. وهي غيرة المسواد العطرية الذكية العرف. لونها عند الادراك براوح من الاصفر الاخضر المالح الى الاصفر الصناعي الاحمر التزييح. لباب حمورها مستحب النكهة، سكري الطعم غني ببعض الملوحيات الصمغية النافعة. (راجع جفول القيتنين). . . اشهر اصرامه الحالية واعها زراعة التسبوسه (Satsuma).

ثمارها زاهية اللون الاصفر الصناعي، حامدة البلور، معتلة العرف والنكهة. شجرتها متوسطة القد تتحمل الصقيع خاصة اذا كان طمها ليمون بري || وايوبي يرضع في الارربة العميقة الفود، الحمضية والقليلة الانتداج. متطلياته الغالبية لا تقل من متطليات البرتقال لانه شمه يستأثر العناصر القشوية والمعدنية بسرعة.

٢٥٣٠٠ - **لَيْمُونُ الْبَحْرِ ***

Ximenia americana (S). Ximénia, Prune de mer (F). سببة مشمرة من فصيلة الازيتيات. مهدا المناطق الاستوائية الارريقية والاسيكية. ساقها فراه. فروصها افقية الاذنكاز قصيرة القاب. اوراقها متعاقبة، سائنية النصل الجلمد ثمارها خضوية الشكل والقد، حامدة الطعم، مأكولة.

٢٥٣٠١ - **لَيْمُونُ اَلْجَنَّةِ *** ، **كُوبُورُوت** ، **كُوبُورُون**
Citrus decumana paradisi, C. paradisi (S). Grapefruit (F). Grape-fruit (E). Lederorangenbaum (D). Pomei (I).

فرب من الليمون الهندي الزراعي. شجرته تملو من ٤ الى ٨ امتار. ساقها وانتادها قليلة الحنف القصير، اغصانها فاقلة. اثمارها قليلة الكثافة. اوراقها كبيرة الذكبة يضيعة. ثمارها كثار الليمون الهندي شكلا وصمما ولونا الا انها اجود عصارة واقل مرارة وحوضة وهي تركز مع السكر.

٢٥٣٠٢ - **لَيْمُونُ بَرْتَقَال**
Orange هو البرتقال، الحليه.

٢٥٣٠٣ - **لَيْمُونُ بَرِّي**
Citrus trifoliata, C. triptera, Poncirus trifoliatus (S). Citronnier à 3 folioles (F).

نوع من الليمون مهد الصين واليابان. شجرته سريضة صغرية القد تملو نحو ٣ امتار. ساقها منتصبة حشفة فراه. فروصها قليلة الانفرج متوسطة الانداد والانتان. اوراقها مركبة ثلاثية الورقيات. وروقها احليجية النصل المسن المقطوم الطرف. ازهارها كبيرة القد يضاء اللون خافتة العرف. ثمارها مجسم التفاحة الصغرية وهي حامدة مرة لا تركز. قشورها رقيقة لونها الى الصفار الباهت. وهو شائع الاستعمال كالتارنج لانه يفرس لتطعم نظرا لشاذه ومناعته وسرعة اثماره وقوة احتاله الصقيع.

٢٥٣٠٤ - **لَيْمُونُ حَامِض**
Citrus medica (S). Citronnier, Limonier (F). Lemon tree, Common lemon (E). Limonenitrone (D). Citreno, Limone (I).

نوع من الليمون الزراعي السبروتي. مهد المشرق الهند الصينية وجورار. حموره واصرامه حميدة. اجمارها تملو من ٣ الى ٦ امتار. سوقها وفروصها حشفة. حشفها حاد الحمة بطول نحو ٣ سم. اغصانها فاقلة. اثمارها وروقها موجحة بالبنفسجي. اوراقها متعاقبة معتقة. اغصانها حامدة الجناح، نصلها يضيعة الصغرة المستطيلة للشارة الحلاقة. ازهارها خماسية النصل، فواحة العرف المطري، لونها الى البياض تشوهه ماجة ارجوانية. ثمارها يضيعة مستطيلة تنتهي بنذلة صغرية حامدة الطعم. عصارة حمورها حامضة الطعم حامدة المرارة.

٢٥٣٠٥ - **لَيْمُونُ حُلُو**
Citrus aurantium aurantifolia, C. limetta, C. limonium dulcis (S). Limettier doux, Limonier doux (F). Sweet lemon tree (E). Süsse Limone (D). Limone douce (I).

نوع من الليمون الزراعي المأكول الثار. شجرته تملو من ٤ الى ٧ امتار. ساقها وفروصها حشفة. اغصانها متوسطة الانفرج. اثمارها ولونها فسقية اللون. اوراقها مجتمعة الاضلاع. نصلها يضيعة الصغرة، حشفة الحلاقة. ازهارها عطرية، يضاء اللون، صفراء المالح. ثمارها مستديرة تنتهي بحليمة مطبقة. قشورها ماسة، باحة الصفار. حمورها غزيرة العصارة الحالية من الحامض الليموني.

٢٥٣٠٦ - **لَيْمُونُ كَمُكَاث *** ، **كَمُكَاث ***
Citrus japonica (S). Kumquat (F).

نوع من الليمون الزراعي المشهر، مهد اليابان وفومونا شجرته تشبه شجرة الربي، اوراقها سائنية النصل العباوق الحفصار. ثمارها تركز بكاملها عند الادراك هي صغرية الحجم كروية الشكل او مستطيلة. قشورها ماسة صميكة اللباب، حمورها دقيقة لا تتخلو من الحموضة || اقليمه اقليم اليوبي وقد يترد منه شامة وانتادها طعم الى الليمون البري. حموره المشهورة اثنان المختدر والمستطيل. راجع كمكات.



ليمون اصيليا



ليمون اهندي



ليمون البحر



ليمون الحنة



ليمون حامض



ليمون حلو



ليمون كمكات

٢٥٣٢٦ - لينتارية دلماسية

Linaria dalmaica (S). *Linaire de Dalmaie* (F).
 نوع من اللينارية المعمرة وهي جنية سريرية تملو من ٦٠
 إلى ١٢٠ سم. ساقها منتصبة قليلة الفروع. أوراقها
 لائفة متعاقبة. نصلها ساني الشكل، مستعرض القاعد،
 بحري اللون. أزهارها كبيرة القد تطول من ٣ إلى ٤ سم.
 لونها إلى الصفرة الزاوية || أزهارها يستمر من تموز
 إلى آب .

٢٥٣٢٧ - لينتارية صنجابية ، حجاب الشجر
Linaria cymbalaria (S). *Linaire cymbalaire*, *Cymbalaire*, *Ruines de Rome*, *Lierre des murailles* (F).
Cymbalaria, Ivy leaved toad-flax, Kaniwortch-ivy
 (E). *Zimbalkraut*, *Gemeines Zimbalkraut* (D). *Linaria*
cimbalaria, *Rovine di Roma* (I).
 نوع من اللينارية للمعمرة، تعيش بين الصخور وعلى الجدران
 القديمة. ساقها منتصبة تطول نحو ٨٠ سم. أوراقها متعاقبة
 مستعرضة خاسية الفصوص. نصلها أحر الصغمة السفلى.
 أزهارها بليكية اللون صغيرة القد || أزهارها يستمر من
 أيار إلى تشرين .

٢٥٣٢٨ - لينتارية عادية * ، حجاب مبدل
 جوز أرماتليس ، مخلص
Linaria vulgaris (S). *Linaire commune*, *L. vulgaire*,
Muffier bâtard, *Lin sauvage* (F). *Butter and eggs*,
Dragon-bushes, *Toad-flax* (E). *Flackskraut*, *Frauen-*
flachsleinkraut, *Leinkraut* (D). *Linaria comune*,
Abrotano salvatico, *Urinaria* (I).
 نوع من اللينارية البرية الطيبة الميالة المعمرة ، تكثر
 في الجور وعلى حافة الطرق. مجتمها تملو من ٣٠ إلى
 ٧٠ سم. أوراقها متعاقبة ، نصلها ضيق الصغمة ثلاثي
 الفروع بحري اللون . أزهارها إلى الصفار الباهت بملها
 عند قواعدها مروج اسع || أزهارها يستمر من حزيران
 إلى أيلول . أوراقها وأزهارها كرية الرائحة تستعمل ضد
 البواسير .

٢٥٣٢٩ - لينتارية كبيرة الزهر

Linaria grandiflora (S). *Linaire à grandes fleurs* (F).
 نوع من اللينارية المعمرة وهي جنية سريرية تملو من ٧٠
 إلى ١٤٠ سم. أوراقها غنية التجميع ، نصلها عظمي الشكل
 بحري اللون . أزهارها نورية ، كبيرة القد تطول نحو ٤ سم.
 لونها إلى البنفسجي يملو بتجميد أرجواني ومشمعة صفراء .
 أزهارها يستمر من حزيران إلى أيلول .

٢٥٣٣٠ - لينتارية كركهانية

Linaria amethystea (S). *Linaire amethyste* (F).
 نوع من اللينارية الحولية وهي عشية مثنونة تملو نحو ١٥
 سم. أوراقها خطية لا قياسية التجميع والانتظام لونها إلى
 الأخضر البحري . أزهارها كركهانية اللون يملوها عند
 قواعدها مروج بنفسجي || أزهارها يستمر من تموز
 إلى آب .

٢٥٣٣١ - لينتارية مراكشية

Linaria maroccana (S). *Linaire marocaine* (F).
 نوع من اللينارية الحولية وهي عشية سريرية تملو من ٢٥
 إلى ٣٥ سم. أوراقها حديثة لا قياسية التجميع والارتكاز.
 نصلها خزل البشرة المحلل اللون . أزهارها كبيرة القد
 بنفسجية اللون أرومانية المواج || أزهارها يستمر طول
 فصل الصيف .

٢٥٣٣٢ - لينتارية مكندونية

Linaria macedonica (S). *Linaire de Macédoine* (F).
 نوع من اللينارية المعمرة وهي بجلة سريرية تملو من ٥٠
 إلى ١٠٠ سم. ساقها منتصبة قليلة الفروع. أوراقها
 لائفة، نصلها ينحني الشكل ذات الزوايا الأخرى . أزهارها
 مستطيلة الأذن ، متوسطة الحجم ، لونها إلى الصفرة الزاوية .
 أزهارها يستمر طول فصل الصيف .

٢٥٣٣٣ - لينتارية وراثية

Linaria genistifolia (S). *Linaire à feuilles de genêt* (F).
 نوع من اللينارية المعمرة وهي بجلة سريرية صغيرة القد
 تملو نحو ٦٠ سم. أوراقها لائفة ، متعاقبة ، نصلها
 كالوزل وهو جامد الصغمة بحري اللون . أزهارها
 مستطيلة القد ، قصيرة الأذن باعثة الصفار || أزهارها
 يستمر من حزيران إلى آب .

٢٥٣٣٤ - لينتارية ، لينتارية

Lignite
 هو أغلب المتخصص والمقيم الأذكن . نوع من الفحم
 الحجري الحديث المهد المتوسط الصلابة .

٢٥٣٣٥ - لينتارية

Lignite
 هي الخشبن ، للمواد الكيماوية الطبيعية ، التي تملو الصلابة
 والقررة في النج النهائية الخشبية .

٢٥٣٣٦ - لينتارية

Alstroemeria ligta (S).
Liuto (F).
 نبات عشبي زراعي من فصيلة الأرجسيات . أصله البلاد
 الأمريكية . تكثر زراعت في البيوت والشالي . ذواته
 مستطيلة لا قياسية الشكل والحجم يستخرج منها لبوب
 ينحني « فونو » لذية الطعم شائع الاستعمال فيبه المرعى
 وأصحاب المدة والأسماء الضعيفة لانه سريع المضم عديم
 الانفصال مع أي طعام كان .

٢٥٣٣٧ - لينتارية عفرين

Myrmelionides (F).
Myrmelionides, *Ant-lions* (E).
 هي الميرفيات ، فصيلة حشرات من صمليات الجناح .

٢٥٣٣٨ - لينتارية

Liods (S).
Liods (F). *Liods* (E).
 جنس حشرات من فصيلة اللينويات ذرية عديدات الاجنحة
 ازدها المعروفة قليلة ، نحو ١٢ ، أصلها تشمل معظم
 اقالم النصف الشمالي من الكرة الأرضية || أجسامها
 صغيرة ، ممددة ، اهليلجية الشكل ، تطول من ٤ إلى
 ٦ م. رؤوسها صغيرة ، مستعرضة . عينها صغيرة ،
 بارزة . تأثيرها وفكوكها نظامية . ملاسها قصيرة .
 قرنها الاستشعارية صولتانية . كواسلها مستعرضة .
 أقدامها لائفة ، تحلة التخديد القاطب ، قوائمها نشطة
 ممددة . أروابها ملونة لماة || تعيش على الفطور الأدابة
 وفي الأعشاب النخرة .

٢٥٣٣٩ - لينتارية

Liodides (S).
Liodides (F). *Liodides* (E).
 فصيلة حشرات من عديدات الاجنحة . أجسامها وأروابها
 الممرقة عديدة ، منتشرة في معظم اقالم العالم || أجسامها
 صغيرة ، ممددة ، تطول من ٢ إلى ٦ م. رؤوسها صغيرة ،
 مستعرضة . عينها بارزة . تأثيرها وفكوكها قياسية .
 ملاسها قصيرة . قرنها الاستشعارية صولتانية . كواسلها



لينارية عادية



لينتارية



ليود

فرعاء تملو نحو ٨٠ سم. أوراقها ايّدة بقسيّة الشكل ،
تطول من ٥ الى ٦ سم. نصلها جامدة ، مائلة الصفحات
اللامعة . ازهارها علقى التجميع ، طرفي الارتكاز .
ازهارها بيضاء اللون ، متاكها ارجوانية ، كمابرها ثلاثية
المصاريع || تنويرها يستمر من نيسان الى أيار .


مسترضة . اغمارها لاحقة . اثارها ملوئة لماعة || تميش
عل القطور الذائبة والمنحلة وفي الاعشاب النخرة والفردى
وتحت الحاء || اشهر اجناسها الاسود والفيّليل .

٢٥٢٤٠ - ليوفيل بقسيّ الورق °

Leiophyllum buxifolium (S).

Leiophylle à feuilles de buis (F).

جنبه برية وتزيينية معمرة من فصيلة الخلنجيات . ساقها



Diluter (F). To dilute (E). ٢٥٣٤٨ - مآث

مآث القوي اذابه . مآث الملح في الماء . مآث الكلس في الماء .

Candélabre (F). ٢٥٣٤٩ - مآث

Pyramidal fruit-tree (E). شكل من اشكال التشذيب خاص بالشجر المست ويسمى شمعان .

Reflet (F). Reflection (E). ٢٥٣٥٠ - مآث

مآث ، مآث ، زهرة المجد

Cianthus (S). Cianthe (F). Glory-pea, Parrot's-bill (E). Prachtwicke, Ruhmesblume (D). Cianthe (I). جنس نباتات ترابية معمرة من فصيلة القرقيات القرابية . انزلها المعروفة قليلة . اعطانها جزر المحيط الهادي . ساقها خشبية ، اوراقها وريزة التركيب مشطية . ازهارها كبيرة القد ، جميلة الشكل . سميت زهرة المجد لان ساقها يمجده الخالق || اعرف انزلها ما يلي :

٢٥٣٥٢ - مآث

Cianthus speciosus (S). Cianthe de Damier (F). نوع من المآث وهي جملة سرولية تملو نحو ٦٠ سم . ساقها فروع . وريقاتها سنائية الشكل . نصلها نام المس ، فني البثرة . ازهارها خماسية او سداسية التجميع ، كبيرة القد ، تطلو من ٨ الى ١٠ سم . لها الى الانحر الانبساطي يطوها عنه قاعدة الزهرة بقمة جلوية لامة . ازهارها يشمر طول الصب .

٢٥٣٥٣ - مآث

Cianthus punicens (S). Cianthe ponceau (F). نوع من المآث وهي جنبة سرولية عارضة تملو نحو ١٢٠ سم . ساقها مشقوفة القروع . وريقاتها احليلجية .

Eau (F). Water (E). ٢٥٣٤١ - ماء

جسم مائل عادم اللون والطعم والرائحة . نقله النبي ١ وزله الانبي ١٨ يحمده عنه بلونه درجة الصفرة وما فوقها من المقاييس الستينغرافي ويغلي عنه بلونه نحو ١٠٠ سم في الضغط الجوي العادي || وهو من اكثر مواد الكون انتشارا . يوجد في الطبيعة على ثلاث حالات : حالة بخار في الجو . وسالة جراد في المواقف الباردة فيكون جليداً عنه القطبين والجليا في الجبال العالية . وسالة سائل في البحار والانهار والينابيع || والماء كيمياً هو نتيجة تآلف حمضي بـ٢ بين الاكسجين والهيدروجين بنسبة ١ الى ٢ .

Eaux résiduelles (F). ٢٥٣٤٢ - ماء

Residuum water (E). هو الماء الناتج من معادل السكر والفاشا والتقطير .

Eaux fontales (F). ٢٥٣٤٣ - ماء

سائل لزج خاص يشمر الجنتين في الرزم .

Eaux aux jambes (F). ٢٥٣٤٤ - ماء

وصم يصيب الغرل في رجليها وسويها فيحدث فيها تشققات تسيل منه مادة مائعة كريمة الرائحة .

٢٥٣٤٥ - ماء

Eaux d'égoûts (F). Sewage, Sullage (E).

هو ماء المنازل والقوارع .

٢٥٣٤٦ - ماء

Eaux-vannes (F). Sewage (E).

هو غليظ من الماء والابول والروبع الصادر عن الكنف .

٢٥٣٤٧ - ماء

سائل مركب من بول الحيوانات والماء المستعمل من الزيل .



مآث



مآث

Substance (matière) (F). **مَادَّة** - ٢٥٣٣٢
Matter (E).

Article (jur.) **مَادَّة** - ٢٥٣٣٤
تقسم القوانين والمراسم والقرارات والمعقود الى مواد . والمادة هي النص الواضح الشيء المقصود .

Corps du délit (F). **مَادَّةُ الْجَرِيْمَةِ** - ٢٥٣٣٥
Corpus delicti (E).
هي الوقائع المادية التي تدل على الجريمة وصفتها .

Adjuvant **مَادِدٌ** - ٢٥٣٣٦
المواد المادحة، مواد قليلة تضاف الى بعض الادوية او الشحات الغذائية لزيادة نفعها الغذائي .

Némétocide (F). **مَادِدٌ** - ٢٥٣٣٧
Nematocide (E).
كل مادة تستعمل في القضاء على الديدان الثعبانية .

Matérialisme (F). Materialism (E). **مَادِّيَّة** - ٢٥٣٣٨
المادية ملتبس القائلين بانها لا يوجد في هذا الكون سوى مادة وسرعة ، وان الجيلة والحياة والضمير ما هي الا مناشع يفسرها تحطيل المادة والحركة .

Madia (S). Madi, Madie (F). **مَادِيَّة** * - ٢٥٣٣٩
Madi, Tarweed (E). Olmsdie (D). Madia (I).
نبات عشبي ينتمي صناعي من فصيلة المركبات ، مهدد الاصل بلاد الشيل زرع لزوره التي يستخرج منها مادة دھنية تستعمل في صناعة الصابون . وقد زرع ايضا لاستعماله كسبائك خضري .

مَادِّي - ٢٥٣٣٧
المادي : السِّلَ لايبس او الجديد او خالسه .

Capra falconeri (S). **مَارْخُور** * - ٢٥٣٣١
Bouquein markhor, Markhor, Chèvre de Falconer (F). Markhor (E).

اسم فارسي يعني آكل الحيات لانهم زعموا انه يأكلها . وهو نوع من الرول ضروبه المعروفة اربعة اعطائها اسراج ومزخرفات التبت والافغان وكثير... يتميز باستطاعة وانتصاب قروته الخضرنية الضليلة . جسمه يطول نحو ١٣٥ سم . ويعمل نحو ١٠٠ سم . الاثنى اصفر جنة وقرنا من الكبر . خالفه ثنائي الضرع وهي تقع من جدي الى جنين || والمارخور يعيش مجامعت اجلها يد من ٢٠ الى ٥٠ و ٧٠ نفراً وهو يتصالب مع المارز وتواجه بحسب السيلة .

Canna des Indes (F). **مَارْزُوان** - ٢٥٣٣٢
هو قننا الهند ، اطبخه .

مَارْزُوانِيَّات ، قَنَوِيَّات - ٢٥٣٣٣
Cannaceae (S). Cannacées (F). Cannaceae (E).
فصيلة نباتية من سبديات الفلقة عديدة الاجناس والانواع اشهرها المارزوان .

Enrymère (F). **مَارِغ** - ٢٥٣٣٤
مارغ او مارقة نمت تمرين يطلق على كل حشرة تركب النباتات في جميع اعضاءها اغصنها الهوائية من الساق الى الورقة والثمرة .

تصلها خيل البشرة ، حريري الملمس ، فضي اللون . ازهارها تخامية او سداسية التجميع تطول من ٨ الى ١٢ سم . لونها الى الازرقاني ، قاعدة رايها بيضاء || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

Majidae (S). **مَاجِيَّات** - ٢٥٣٥٤
Majidae (F). Majidae (E).

فصيلة من الثغريات حشرات الارجل . قصيرات الليل . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة جميعها بحرية اعطائها بحار البلاد المعروفة الحارة || اجسامها متباينة القد ، تطول من ١٢ الى ٢٤ سم . تتميز بدموعها اللينة الشائكة الاطراف وبملقطها الكبيرة الضليلة || بعض انواعها مأكلة ، مستحب الطعم .

Jaune d'oeuf (F). **مَاح** - ٢٥٣٥٥
Yolk of an egg (E).
المح : صفرة البيض .

Improductif (F). **مَاحِل** ، **مَاحِل** - ٢٥٣٥٦
Unproductive, Idle (E).
ماحل ومحال كل ارض لا تحسب قط .

Manettia (S). Manettie (F). **مَاحُور** * - ٢٥٣٥٧
جنس نباتات جنينية عارضة ممرية من فصيلة التفويات . انواعها قليلة معظمها بري وبعضها زرع . سوقها دقيقة متشعبة . اوراقها ابيضة متعاقبة متقنة . ازهارها قمية الشكل عوربة الارتكاز او تاجية || اعرف انواعها واشهرها ما يلي .

Manettia ignita (S). **مَاحُور قَرْمِزِي** - ٢٥٣٥٨
Manettie rouge feu, M. à fleurs vermillon (F).
نوع من الماحور الزرع . ساقه دقيقة لولية تطول نحو اربعة امتار . اوراقه اهلالية الشكل ، تصلها مقطوم القاعدة ذلق للزام الاخير . ازهاره عوربة وتاجية الارتكاز ، قمرية اللون ، لامة الموج . قطر قعها نحو ٤ سم || ازهاره يستمر من ايار الى تموز .

مَاحُور قَلْبِي الْوَرَق - ٢٥٣٥٩
Manettia cordifolia (S). Manettie à feuilles en coeur (F).

نوع من الماحور الزرع . ساقه دقيقة تطول نحو خمسة امتار . اوراقه قلبية القاعدة مستطيلة النصل الذروب في زامه الاخير . ازهاره كبيرة القد ، ابيضانية اللون السوي ، قطر قعها نحو ٥ سم || ازهاره يستمر من ايار الى تموز .

مَاحُور مَرْدُوحِ الْوَرَق - ٢٥٣٦٠
Manettia bicolor (S). Manettie bicolore (F).

نوع من الماحور الزرع . ساقه دقيقة نحيلة تطول نحو اربعة امتار . اوراقه متباينة مستطيلة الاضلاع ، تصلها ذروب القاعدة والطرف . ازهاره قمرية الانبوب ، ابيضانية القسم ، صفر الحمار والحافة . قطر اقاعها براوح من ٢ الى ٣ سم || ازهاره يستمر من ايار الى تموز .

Makaira (F). **مَاحِرَّة** - ٢٥٣٦١
سكة بحرية تدعى سارية ، اطبخا .

Amouillante (F). **مَاحِض** - ٢٥٣٦٢
About to calf (E).
الانثى من الحيوان ان سحير او بقره او ناقة او نمجة او حن وضعها .



ماحور



مادي



مارخور



ماره



ماروت



مارش



مازيون



مازيون هندي

Bois Joli, B. gentii (F), Mezereon, Dwarf laurel, Spurge olive (E), Echter Seidelbast, Kellereibals (D), Laureola gentile, Biondella, Mezereon (I).

نوع من الدفنة عديد القلوب يملو من ٧٠ إلى ٢٠٠ سم. أوراقه متعاقبة مستطيلة ، نصلها مائل لبشرة يطول نحو ٨ سم. ويعرض نحو ٢٠ سم. أزهاره طرفية ، غنية التجميع محورية الإرتكاز ، تسبق الأوراق . البتلات تختلط مع القلوب منها الأبيض والآخر والوردي || ثماره عينية لونها إلى الحمر . يستخرج منها ومن الأوراق مادة فعالة سامة يقال أن القليل منها يطلع من الاستسقاء واليرقان وضعت لكل.

Daphné alpestris (F). - **مَارُزُونٌ جَبَاسِي**

Daphné camélie (F). - **مَارُزُونٌ مَكْحَس**
نبات من الدفنة ، اطبل دفنة صغيرة.

٢٥٣٨٩ - **مَارُزُونٌ هِنْدِي * هُجْج ، بِطْرِيَّة ثِرْتَاك**

Clitoria ternata (S). Clitoria de Ternata (F), Blue clitoria, Butterfly-pea (E), Blaue Clitoria-blume (D), Fagfelo Indiano, Fior celaste (I).

نوع من البطرية من فصيلة القرنيات القراشية . وهو نبات عشبي زراعي متسلق يملو نحو ٩٠ سم. أوراقه مركبة ثلاثية ، وريقاتها بيضبة لسنة أزهاره كبيرة اللد زرقاء اللون تتميز بعدم انتظام بتلاتها . وهي تستعمل في الهند لتلوين الرز المطبوخ وبعض الحلويات . أما ثماره فسنفية دقيقة مستطيلة ، بزورها صغيرة مستديرة ممره اللون .

Thymelaeaceae (S). - **مَارُزُونِيَّات**
Thymélacées (F), Thymelaeaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة الثمالات . اجناسها وأزهارها كثيرة العدد معظمها عشبي وبعضها جنبي منه الطيب والمبهني والرائحي .

Oeufs de fourmis (F). - **مَارُون**
Eggs of the ants (E). يبيض النمل .

Mazout (F). Oil fuel (E). - **مَارُوت**
سائل وقود تشجع من تقطير النفط الخام .

Decalo (S), Martin-chasseur (F). - **مَارُور**
الرجاء تشيل من المازوريات . انواعه عديدة أطباقها فسيحة المتأثر الكيرة المتتالية الصلصة السفلى . اجناسها ريمة . اصاغها قصيرة بقوة || يألث الحيلة الجاهلية . اسرايه تمه من ١٠ إلى ١٠٠ || أعرف انوعه واشهرها المازور الجبار.

Decalo gigantea (S). - **مَارُور جَبَّار**
Martin-chasseur géant (F), Laughing jackass (E).

طائر من المازور ، قال فيه الجاسط : « طائر مبارك يتبين به اصحاب المقنع طوله يراوح من ٤٧ إلى ٥٥ سم. يسلط نحو ٦٥ سم. ثوبه هابك اللون . رأسه مستطيل الريش الدبيب الاسمر . يحصر مستعرض الحلق الاسود . ظهره إلى السمرة . يلقه إلى الصهبة يطولها ملح اسود . جناحه إلى الزرقه الباقية . فواده إلى السواد الكاسع . ذنبه إلى الجلوده

Dolichotis patagonica (S). - **مَارَه ***

Mara, Lièvre de Patagonie (F). حيوان لبون قاضم ويهد الجلس والنوع من فصيلة الثورديات. موطنه الهول والمراعي الايريكية القائمة بين مندوزا ومضيق بجان || جسمه متوسط اللد طوله نحو ٥٠ سم. ارتقاؤه ٤٠ سم. وذنبه ٤ سم. رأس صغير القد . عيناه مستطيلتان اذناه كبيرتان . عنقه طويل . كفه خفيف مستدير. قوائمه رقيقة دقيقة . برأته قوية حادة . ثوبه إلى الصهبة اليرداء يعلوها توشم ابيض . بطنه حاجي . وبره دقيق وكثيف ، شديد اللس ، نام الملس || يعيش بجاعات يراوح عدد افرادها من ١٠ إلى ٣٠ يسرح في النهار . قوة الاشباح البرية اخصها النمل || اثناء تقص مرتين في العام وتنتج كل مرة جريرين . جبره ردهة كبيرة يحفرها حل عمق ١٠٠ سم. مدخلها ويخرجها نفق واحد طوله نحو ٥ امتار .

٢٥٣٩٦ - **مَارُوت * شَمَر الكُتَب ، بَابُونج قَتَن**

Maruta (S). Maroute, Camomille puanta (F), Mayweed, Dog-fennel (E), Stinkhunds-kamille (D), Maruta (I).

نبات عشبي بري حولي من المركبات وهو نوع من الاقنوعون يكثر بين الزروع فيصح من الاشباح الفارة وهو كريح الرائحة عند اللمس . أزهاره صفراء اللون .

Marum (F). - **مَارُوم ، مَارُون**
هو صخر الحر ، اطبله .

Oryx (F). - **مَارِيَّة**
في الارخ ، اطبله .

Oryx beisa (F). - **مَارِيَّة اِفْرِيقِيَّة**
في الارخ الافريقي ، اطبله .

Oryx callotis (F). - **مَارِيَّة البَادِيَّة**
في ارخ البادية ، اطبله .

Oryx beatrix (F). - **مَارِيَّة الجَزِيرَة**
في ارخ الجزيرة ، اطبله .

Oryx gazelle, Passan (F). - **مَارِيَّة الصَّحْرَا**
في ارخ الصحراء ، اطبله .

Oryx de Nuble (F). - **مَارِيَّة سُدُودَانِيَّة**
في الارخ السوداني ، اطبله .

Bryopsis (S). - **مَارِيَش ***
Bryopsis (F), Bryopsis (E).

جنس نباتات بحرية من الخفيات الخضراء . انوعه المعروفة نحو ٢٥ . اطباقها تشيل معطر بجمار الماء || كلالها صغيرة . سوكها دقيقة ، شبه اسطوانية الشكل متتامة الانحدار المتراكبة الرقيقة التصلب .

Nitrière (F), Nitrebed (E). - **مَارَتَكَة**

المكان الذي يصنع فيه الأزوت او يتحول فيه إلى نترات والمادة قد تكون طبيعية كما في شيلي او اصطناعية كما في مصانع الأزوت .

٢٥٣٩٦ - **مَارُزُون * دَفْنَة سَكَمَة ، أُم**

Daphne mezereum, Thymelaea mezereum, Meze-reum officinal (S), Daphné mézéréon, D. jolibois,

٢٥٤٠٤ - **مَاشِيَّة ، بُهْم ، تَعَم ، مَال**
Betail, Bestiaux (F). Cattle, Livestock (E).
الابل والبقر والغنم والماعز . اخصصها ما كان منها للسل
والقنية . سميت ماشية لربما وهي تحشي وقيل لكثرة سلها ،
ج. مؤنثي .

٢٥٤٠٥ - **مَاصَات**
Cyclostomes, Siphonophores (F). Siphonophores (E).
هي الحلقيات الافواه رتبة من الاسماك .

٢٥٤٠٦ - **مَاصِيَّة**
Pipette (F). Pipet (E).
اداة مخبرية تستعمل لشفط السوائل ، واسع شفاطة .

٢٥٤٠٧ - **مَاصِر**
Enclos (F). Enclosure, Close (E).
الماصر هو الحاجز توضع به الخيل والبقر والمواشي لحصرها
في مكان معين ومنعها من ارتياد غيره .

٢٥٤٠٨ - **مَاصِيَّة**
البقرة التي ولي لبها .

٢٥٤٠٩ - **مَاصِرِيَّة**
Cephalosporium (S).
جنس فطور مجهرية من الماصيات وفصيلة البوطيات .
انواعه عديدة معظمها يبي يعيش ويتكاثر على المواد
النباتية المتحللة . امثاليها حويطة مدادة تركب سطوح
حوائلها .

٢٥٤١٠ - **مَاصِرِيَّات**
Céphaosporiées (F).
Cephalosporiées (E).
عمارة فطور مجهرية من فصيلة البوطيات . اجناسها ثلاثة
وهي التريكويدية والفلويدية والمناشوع .

٢٥٤١١ - **مَاصِر**
Acescent
لعت تمريني يطلق على جميع المواد الممكن ان تحبس .
قالبيل والثار والحليب تجبر من المواد الماصرة لها قابلة
للتحسيس .

٢٥٤١٢ - **مَاصِر**
Pliqué (F). Sour (E).
ياهي ماصراً كل مشروب يصير نحو التخليل او الفساد .

٢٥٤١٣ - **مَاصِر ، مُصْطَر ، شَات**
Pluvieux (F).
Rainy, Wet, Pluvieux (E).

٢٥٤١٤ - **مَاصِر**
Ovis capra (S).
Chèvre (F). Goat (E).
الماعز الذكر والانثى ج. معز ومعز ومعز . ويقال
للذكر تيس والانثى من . والماعز حيوان مجر داجن من
فصيلة التفتيات . انواعه عديدة تمت بلوات الشعر تميزاً
لها عن ذوات الصوف وهي الغنم . وهي تتميز ايضاً بقصر
اذنانها وقوة قوائمها وصلابة اظفارها التي تمكها من تسلق
الصخور . انثاها اصغر قدماً من ذكرها . ضرورها ثنائية
الحلف . يحلبها بدم ١٥٤ يوماً تقبع عند تمامه من جدي
الى ثلاثة جهاد || والماعز يربي لحليبهم وشعره . اشهر
الانواع ما يتبع .

٢٥٤١٥ - **مَاصِر التَّجْت**
Chèvre de Thibet (F).
Tibetan goat (E).
نوع من الماعز الموصوف بشعره انعام الاله لكنه يأتي
بعد الكشمير من حيث الجودة .

الحفلة بالاسود . أما طرف الريش فأبيض || يأتي
الشطوط ويجاري الله والاذفال ، قوته الاسماك والظاه
والزروع والثمار والحشرات والحيات || انتاه تضع من
٣ الى ٤ بيضات تحضنها وحدها نحو ٣ اسابيع .

٢٥٣٩٥ - **مَازُونِيَّات**
Dactyloctenium (F).
عمارة طير من القرلايات تشمل المازور والقيش والقيون
والمهاول . اصطلحوا بالبلاد الاسيوية والافريقية وجزر
اقبانية || طيورها تتميز ببناتها المستمرة القاعدة ،
الهوية الصفحة السفلى ، اللحية المنطق . وبها تنمو
الكثافة ، الواهب معتدلة الزحام واللحم || تألف الاجراع
والمناع والشطوط البحرية ويجاري الماء . قوتها التبدن
والخيرات والقتريات والاسماك . تدن في تجاوب جلود
وافصان الانهار اليابسة .

٢٥٣٩٦ - **مَاس**
Diamant (F). Diamond (E).
هو السامور المشقول حررت صفحاته بالنت .

٢٥٣٩٧ - **مَاصِح**
Arpenteur (F). Land-surveyor (E).
الماسح والمساح والاردي هو الذي يمسح الارض ليرسمها
ويقس طولها وعرضها الخ .

٢٥٣٩٨ - **مَاسِكَة**
Jonchale, Jonchère, Joncherale (F).
Bed or plantation of rushes (E).
مقع وما اشبه كثر فيه الأسل .

٢٥٣٩٩ - **مَاسِ**
ماش المطر الارض : سمها نهر مطر مئيش .

٢٥٤٠٠ - **مَاسِ ، كَشْرِي**
Phaseolus mungo, Ph. radiatus (S). Haricot d'Angola,
H. mungo (F). Green gram, Black gram (E). Mungo-
bohne, Schwarzerbohne (D). Fagolo a zigzag (F).
نبات عشبي زراعي حولي من الفاصوليات وفصيلة القرنيات
الفراسية . زراعته منتشرة في جميع بلاد الشرق . ساقه فراء
قائمة . اوراقه متفكة مركبة ثلاثية . وريقاتها بيضيه
التصل المنسج المذهب القمص . ازهاره خفية للجميع ،
زنادية الازتيكاز ، صفر اللون ، خضر اللولج . ثماره
قرون اسطوانية ضيقة مستطيلة . بذوره كروية الشكل
سمراء اللون او خضراء مغطاة بالاسود . تحوي من العناصر
الغذائية مسا قدره :

٢٢,٨٠ ٪ من المواد الازتية
١,٤٦ ٪ من المواد السعنية
٦,٢١٥ ٪ من المواد اللشوية

زراعته مروية يندر عمادة على صقير الحنطة بعد تريض
المزدرد وسره . يدار الدم يراوح من ١٣ الى ١٥ كيلو
وانتاجه من ٩٠ الى ١٢٠ كيلو .

٢٥٤٠١ - **مَاسِ شَرِي**
Dolce de Chine (F).
هو الدجر الصيني ، اطليه .

٢٥٤٠٢ - **مَاصِرِيَّات**
Mandibulata (F).
نفة من المفصليات تشمل الحيوانات المهمة يتأثير وزياتي .
اشهر مضطها القشريات والرخساعيات والحشرات .

٢٥٤٠٣ - **مَاصُوط**
Chematoble (F).
حشرة مؤذية تنمى ارضية الشتاء ، اطليا .



مازور جبار



ماش



ماص التوت



ماعز انقرة



ماعز سوري



ماعز كشمير



ماكاك القات



ماكاك بولون



ماكاك ريس

وربة التهنيع . وريقتها لا تقياسه البدن الذي يراوح من ١٩ الى ٢٩ ، تصلها ايليحي الشكل ، مالب الصفحة العليا خالي السفل . اذهرارها معقودي التجميع ، اذهرارها صليوة لينة يضاء اللون خضراء اللولج || تنورها يستمر من حزيران الى تموز .

٢٥٤٢٦ - مأكاك (S). Macacus (S). Macaco, Macaques (E). Malaken (D).

جنس قروود ذيلية من فصيلة المبرسيات . اناؤه ١٩ ، موطنها مختلف المناطق الاسيوية . اجسامها متوسطة او صغيرة القد . اعطلمها بارزة افعالها وسية . قوامها قوية ، اياها طرية ، اذناها لا تقياسه . اثارها تخلف مع الاناث || تعيش جماعات متوسطة او كبيرة البدن . تألف الاجراج والمضارب الصغرية والشطوط . قوتها الثار والحبوب والخشرات والنعن والظاء والصفاد || اناؤها تمزج جرراً واحداً يبلغ كمال شغلها بمره سنوات .

٢٥٤٢٧ - مأكاك الثيب (S). Macacus thibetanus (S). Macaque du Thibet (F).

موطنه ارجاع التبت الشرقية وبنشورية . جسمه متوسط القد ، رفيق القوام بطول نحو ٧٥ سم . وذنبه ١٥ سم . ثوبه جل الشعر المستطيل ، لونه الى الكهية السوداء زرقاء عند البطن وتبقى عند الظهر || يعيش جماعات كبيرة تد من ٦٠ الى ١٢٠

٢٥٤٢٨ - مأكاك القات (S). Macacus silenus (S). Ouanderou (F). Wanderoo (E).

موطنه تها ميلبار وانقات . جسمه بطول نحو ٧٥ سم . وذنبه ٢٧ سم . ثوبه اسود اللون ، جل الشعر المستطيل . حار وبه افرق الجبهة ، ابيض اللون || تألف لجانبات لكثيفة البالية ، جماعت تألف من ذكر وخص او ست اناث ويض الصغار .

٢٥٤٢٩ - مأكاك بولون (S). Macacus cynomolgus (S). Macaque de Buffon, M. crabler (F).

موطنه مناطق وادغال الهند الصينية . يكثر قرب مصبات الانهر . يتسلق الاشجار ويسبح ويغوص || جسمه بطول نحو ٥٦ سم . وذنبه ٤٨ سم . ثوبه ينحرف من الخطي الملعب الى الالكهية الاسمر . حار وبه افرق البياض . جماعت قليلة البدن تألف من ذكر وخص اناث ويض الصغار .

٢٥٤٣٠ - مأكاك ريس (S). Macacus rhesus (S). Macaque rhesus, Rhesus (F).

موطنه فصح الاربياء يمتد من الهند الى اناطام والصين ، جسمه متوسط القد ، معصوري الشكل ، كليل الشعر ، بطول نحو ٥٦ سم . ويرفع نحو ٤٥ . ثوبه الى الكهية الصفراء ينحرف الى الجلالة مع اترايه من فيج الظهر . وجهه واذناه الى البصرة الصفراء . ذنبه بطول نحو ٢٥ سم . قوته الثار والحبوب والحشرات على اختلافها يتسلق الاشجار ويسبح ويغوص || يعيش جماعات كبيرة البدن .

٢٥٤٣١ - مأكاك شائع (S). Macaque commun, Bonnet chinols (F). Bonnet macaque (E).

موطنه مناطق الهند الجنوبية حتى يمي . تألف الجانبات لكثيفة ويغزو الحقول والمزارع والمساكن . طول نحو

٢٥٤٣٢ - ماعز النوبة * ، ماعز الحبشة

Chèvre de Nubie (F). Nubian goat (E).

نوع من الماعز الافريقي . اجسامه كبيرة القد تمل من ٦٠ الى ٦٥ سم . يميز برؤوسه ابلج المفلطحة الماعدة اللحي وبقصة افة الهديبة وبقصر شعره . الاثني جيدة الدرع فصرها متوسط الحجم . مجموع درها الحلوي يراوح من ٢٥٠ الى ٤٥٠ ليتر .

٢٥٤٣٣ - ماعز انقرة * ، ماعز

Chèvre d'Angora (F). Angora goat (E).

نوع من الماعز المشهور باستمالة شعره الابيض الناعم . منه ضرب اسود الرأس والنعن ، غث اللحية موصوف بيرة شعره الناعم .

٢٥٤٣٤ - ماعز سوري *

Chèvre de Syrie, Ch. mambrine (F). Syrian goat (E).

نوع من الماعز موطنه جبال لبنان وسورية . جسمه بطول نحو ٦٠ الى ٧٠ سم . وطول الراس ، اكث اللحية ، كبير الاذن للتدلية الفارسة . الاثني جلد افراس كبيرة الفرس . متوسط مجموع درها الحلوي يراوح من ٤٠٠ الى ٥٠٠ ليتر .

٢٥٤٣٥ - ماعز كشمير *

Chèvre de Cachemire (F). Cashmirian goat (E).

نوع من الماعز الموصوف بشعره الناعم الحريري اللولج . يكثر في بلاد كشمير حيث يستخرجون شعره .

٢٥٤٣٦ - ماعز

Miauler (F). To mew (E).

ماع النور : ماع ومعا .

٢٥٤٣٧ - ماعل

Polycarpique (F). Polycarpic (E).

ماعل م . ماعلة نعمت ترميني يطلق على كل ليات ممر يهز ويضر اكثر من مرة في الحلوي .

٢٥٤٣٨ - ماعطوط

Vermicide (F).

هو كل مادة تستعمل للقضاء على الديدان .

٢٥٤٣٩ - ما قبل الحيوان

Protérozoïque (F). Proterozoic (E).

اسم يطلق على الحقبة الثالثة من اياج ما قبل الكمبري ؛ ذلك لان آثار المتحجرات والاحافير المكتشفة حتى الآن ، بالإضافة الى المادارج الجيولوجية المعروفة ، تنفي وجود حياة حيوانية حتى اواخر هذه الحقبة .

٢٥٤٤٠ - ما قبل الكمبري

Précambrien (F). Precambrian (E).

اسم يطلق على الاباج البدائي من تاريخ تكوين ضوور الارض . وهذا الاباج الطويل الازمان الذي تم فيه تنفيذ الصنوبر ، والذي يمثل خسة اساس هر الارض ، يقسم الى ثلاث حقبة : حقبة التكوين ثم الحقبة السحيقة ثم حقبة ما قبل الحيوان . راجع حياة .

٢٥٤٤١ - مأكية

Macula (S). Macula (F).

نبات معقود الصريف على اسم اليوناني الرومي « مأك » (١٨٢٧-١٨٨٦) وهي شجرة برية وحدائقية وحيدة الجنس والنوع من فصيلة القرنيات . ساقها تمل من ٥ الى ١٥ م . خشبها صلب المود اسمر اللون . اوراقها عابلة ، مركبة ،

٢٥٤٤٢ - مَالِي
Rouleur (F). Roll (E).
المالني والمالقة: معدلة أسطوانية تستعمل في حذل التربة أو تلميسها. راجع ملاءة.

٢٥٤٤٣ - مَالِك
Propriétaire (F).
Proprietor, Owner, Holder (E).
هو الذي له حق الملكية.

٢٥٤٤٤ - مَالِكُ الْخَرْتَرِين
Héron (F). Heron (E).
هو البيلشون، أطلبه.

٢٥٤٤٥ - مَالُوش
Courtlière (F). Mole-cricket (E).
حشرة مؤذية تدمي الحاروش والتمجوس، أطلبها.

٢٥٤٤٦ - مَامُوث
Mammoth
هو الصنجانة، أطلها.

٢٥٤٤٧ - مَامِيصَا & مَمِيصَا
Glaucium (S).
Glaucia, Glaucière (F).
جنس نباتات عشبية من فصيلة الخشخشيات. أنواعه قليلة منها الحولية والمصرى، أوراقها حاشنة، متعاقبة، كبيرة اللثة مقرصة. أزهارها كبيرة الحجم، فردية التجميع. ثمارها حقية. بزورها دهنية يستخرج منها مادة زيتية عذبة الخواص تستعمل في الطب كزيت الخشخاش. وهو ينفع من التسمم والروطيات واسترخاء الجفن وضعت البصر كسلا، والارام والفاصل الحادة ملاء ويقطع الدم والاسهال مطلقاً. ووجهه يسمن جداً وهو يضر اللحال ويصلحه اللوز.

٢٥٤٤٨ - مَامِيصَا حَمْرَاء * & عَشَخَاش فِينِيقي
Glaucium corniculatum (S). Glaucium cornus, G. à fleurs rouges, Glaucienne (F). Red horned poppy (E). Roter Hornmohn (D). Papavero cornuto piccolo (I).
نوع من الماميشا الحولية ساقها حليلة اللحاء تملحو من ٥٠ سم. أزهارها حمراء اللون، كبيرة اللثة، قطرها نحو ٥ سم. ثمارها مبعثرة الحشف، حقية الشكل، تظل من ١٠ إلى ٢٠ سم. || زرع القزوين ولاستخراج الزيت من بزورها. أزهارها يستمر من أيار إلى حزيران.

٢٥٤٤٩ - مَامِيصَا صَفْرَاء * & عَشَخَاش مُقَرَّن
Glaucium flavum (S). Glaucium jaune, G. à fleurs jaunes, Pavot cornu (F). Sea poppy, Yellow horned poppy (E). Gelber hornmohn (D). Papavero cornuto giallo, P. marino, Parallo (I).
نوع من الماميشا الحولية. ساقها مرطبة تملحو من ٥٠ إلى ١٠٠ سم. أزهارها إلى الصفار اللهب. قطرها يراوح من ٦ إلى ٨ سم. سقاها مقوس الشكل يطول من ١٥ إلى ٣٠ سم. || ترطب في السواحل الرملية. زرع القزوين ولاستخراج الزيت من بزورها || أزهارها يستمر من حزيران إلى آب || والماميشا الصفراء شديدة الرائحة والمرارة، قابضة، كانت تستعمل في الاكحال. ويصير زهرها قطرة قيرين.

٢٥٤٥٠ - مَامِيرِكَن
Curcuma (F).
اطلب كركم صباغي.

٢٥٤٥١ - مَامِيرِكَن صَبْغِي
Renoncule ficaroides (F).
هو الخيوان النثي، أطلبه.

٢٥٤٥٢ - مَان
هو الترحمان، أطلبه.

٥٠٠. وذنبه ٥٥٠. ثوبه إلى الكهبة الخضراء يطولها مواج اسمر. وجهه وأذناه ويده إلى السمرة العابقة || جماعته تعد من ١٢ إلى ٥٠.

٢٥٤٣٧ - مَآكَكَ مَسْتَرَج *
Macacus pileatus (S).
Macaque couronné (F).
موطنه جزيرة سريلنبي. يألف الغابات الكثيفة ويغزو الحقل والحدائق. جسمه ربع الوجة. طولهُ نحو ٥٠ سم. وذنبه ٥٠ سم. ثوبه إلى الصبغة الصفانية. بطنه وباطن قوائمهِ إلى البياض الأثير. حمار جبهة منتصب الشعر، تاسي الشكل، جماعته تعد من ١٠ إلى ٢٥.

٢٥٤٣٣ - مَآكَكَ مَسِين *
Macacus nemestrinus (S). Macaque malmon, Singe-cochon (F). Pig tailed macaque (E).
موطنه برمايه ولفقه ويجزو الزايج. جسمه يطول نحو ٤٦ سم. ويرتفع ٤٠ سم. رأسه مخروطي الشكل، مستطيل الخلف. قوائمهُ قوية وغلظية، ذنبه مقوس يطول نحو ١٨ سم. ثوبه إلى السمرة يعق مع اقترابه من ثوب الظهر.

٢٥٤٣٤ - مَآكُول
Comestible (F).
Edible, Estable (E).
هو الصالح للأكل.

٢٥٤٣٥ - مَآكِين *
Ovicida
الماكُون هو كل دواء يقضي فصل مكن الحشرات، ج. موكين.

٢٥٤٣٦ - مَآكِي
Aristotelia macqui (S).
Maqui de Chili (F).
نوع من الأريستوتلية، جنسية زراعية من فصيلة اليزونديات. ساقها منتصبه تملحو نحو ثلاثة أمتار. أثمارها حمر القلاء. أوراقها أبيض، متعاقبة، بيضية الاتصال اللدنة المسنة الخفاف، تظل من ٦ إلى ١٢ سم. وتقرض من ٣ إلى ٦ سم. أزهارها عنقودي التجميع، محوري الارتكاز. أزهارها صغيرة، بيضاء اللون. ثمارها عنبية أبيضانية اللون مأكولة تعتبر من المرطبات الناعمة.

٢٥٤٣٧ - مَآكِيَة
Machine (F).
Machine, Engine (E).
كل جهاز آلي هدفه الاقتصاد يسمى ماكينة. لذلك فالماكينات كثيرة الممد أشهرها الصناعية والكهربائية والزراعية والتجارية.

٢٥٤٣٨ - مَال
Biens (F). Weals (E).
المال ما ملكته من جميع الأشياء. يقال هو المال وهي المال. قال الشاعر:

و المال تلدي بقولم ذوي حسب

٢٥٤٣٩ - مَالَات
Malate
ملح حفص التلخاف.

٢٥٤٤٠ - مَالِين
Maltine (F).
هي الملتين، أطلها.

٢٥٤٤١ - مَالَكَة *
Biodinosa (F). Biodinosis (E).
منج سلكي تتبته بعض الحشرات في كامل دورتها الحياتية أو في جزء منها.



ماكك شائع



ماكك متوج



ماكك مسين



ماميشا حمراء



ماميشا صفراء

وغاباتها || تنبت بجبال ويسال اذئاب الذكور وبقلة الطيران وبسرعة النمو . سفوحها متحدة الارتفاع . اصابعها نشيطة . غالبا جالسة || اعرف اجناسها واشهرها المانور والعرلون .

Mahogon (F).

٢٥٤٩٠ - مأكون

هو الاكاجو ، اطلبه .

Mahonia (S).

٢٥٤٩١ - مأكونية *

Mahonia, Mahonie (F). Mahonia (E).

جنس نباتات جنينية مسمرة من فصيلة البرباريسيات . انواعها عديدة معظمها بري وبعضها زراعي وتربي . اوراقها ابيدة مركبة . وريقتها وثيرة العدد ، متشاربة الحافة . ازهارها متقوية التجميع ، صفراء اللون ، مستحبة العرف . ثمارها نووية الشكل ، باذنجانية اللون ، مأكولة وترب || اعرف انواعها واشهرها ما لي .

٢٥٤٩٢ - مأكونية بهشية الورق

Mahonia aquifolium (S). Mahonia à feuilles de houx (F).

جنس سرقية تملو من ٧٠ الى ٢٠٠ سم . وريقات اوراقها بيضا الشكل تمد من ٣ الى ٩ ، نصلها ضيق الصفحة الامة المستطيلة . ازهارها الى الصفرة الموشة بالاحمر . متقوية الزهرية تطول من ٨ الى ١٠ سم . || ازهارها يستمر طوال شهر اذار .

٢٥٤٩٣ - مأكونية حزمية

Mahonia pinnata, M. fascicularis (S). Mahonia fasciculé (F).

جنس سرقية فضاء تملو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم . وريقات اوراقها تمد من ٧ الى ١٣ ، نصلها يفي الشكل ، جامد التسنين الثالث . متقوية الزهرية كيفية التجميع تطول نحو ٨ سم . ازهارها صغيرة الله صفراء اللون || ازهارها يستمر طوال شهر ايار .

٢٥٤٩٤ - مأكونية رباعية العروق

Mahonia nervosa (S). Mahonia nervé (F).

بجلة سرقية مثقوبة تملو من ٢٠ الى ٤٠ سم . وريقات اوراقها تمد من ٩ الى ١٧ ، نصلها يفت الخصار رايحي العروق البارزة . متقوية الزهرية تطول من ١٠ الى ٢٠ سم . ازهارها الى الصفار الكبيرتي || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

٢٥٤٩٥ - مأكونية مدادكة

Mahonia repens (S). Mahonia rampant (F).

بجلة ركوبية مدادة تطول من ٣٠ الى ٥٠ سم . وريقات اوراقها تمد من ٣ الى ٧ ، نصلها يفي الشكل ، مغرم القاعدية ، يجري الصفحة الماعدة الامة . ازهارها الى الصفرة السوية || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

٢٥٤٩٦ - مأكونية نباتية

Mahonia nepalensis (S). Mahonia du Népal (F).

جنس سرقية شائعة تملو من ٣ الى ٥ امتار . وريقات اوراقها تمد من ١١ الى ٢٥ ، نصلها ضيق الصفحة ، جميل الخصار الاعم . متقوية الزهرية تطول نحو ٣٠ سم . ازهارها كبيرة الله بجلة الصفار اللهب || ازهارها يستمر طوال فصل الربيع .

٢٥٤٩٣ - مأكس

جنس حيوانات لبونة من القرد . اسمها الشائع ام قرق . اما مأكس فهو ترجمة الاسم العلمي .

Fort (F).

٢٥٤٩٤ - مانع

نعت تعريبي يطلق على كل شيء يحول بسورة مانعة مركزها التسميني دون العالفة ولفق الناطقة .

٢٥٤٩٥ - مانع

عائق يحول دون ايجاد حمل ما كازواج مثلا وذلك لانعدام إحدى الشرائط القانونية المطلوبة . وللمانع قد يكون :

مانع حاصر
Empêchement prohibitif (F).
Prohibitive hindrance (E).

مانع معطل ، مانع فاسخ
Empêchement dirimant (F).
Invalidating impediment (E).

٢٥٤٩٦ - مأكور ، طائر البشارة

Menura (S). Menure, Oiseau-lyre (F). Menura, lyre-bird (E).

جنس طير من فصيلة المانوريات . انواعه المعروفة ثلاثة : اصطناعها بلاد استرالية حيث تالف المراج والنباتات || اجسامها متوسطة الله . متقوية قوية ، قليلة الاسدياب والتسنين . اجنتها قصيرة . ارفاقها متوسطة الطول حبيبة البشرة . ازقادها حمراء || ذكورها كبيرة الاذنان البشارية الشكل . انثاهما ماعدة الزينة . اما انواعها الثلاثة المعروفة فهي :

مانور ألبرتي

Menura Albirdi (S).

مانور لكتوريا

Menura Victoriae (S).

مانور ميلون

Menura superba (S).

نخص منها بالوصف المانور المبلول ، اطلبه .

٢٥٤٩٧ - مأكور مبلول ، مأكور أثيق

طائر البشارة الأثيق

Menura superba (S). Menure commun, M. superba, Oiseau-lyre superba (F).

نوع من المانور . مهد اجراج استرالية . جسم الذكر يطول نحو ٤٠ سم . وزنه ٦٠ سم . جسم الانثى ، بما فيه الذنب ، لا يتجاوز ١٠ سم . || ثوبه الى الرعدة الخطية الماعقة ، افنيكه جقوي المراج . ذرون احمر . يطنه الى الرعدة الرمادية . قوادمه واباهه ومناكه الى السرة الخطية الحمراء المراج . ذنبه قيثاري الشكل لونه الى السرة الخطية المبعدة بالريدة الفضية . ثوب الانثى داكن الالوان القليلة الزهاء || يأنف الاجراج التي تتخللها الصفور والاراضي الملاحسة ، يردد جميع اصوات الطير والحيوان وينها المواء والتنباح || قوته الحشرات والديدان يلتقطها ايها كانت وفي الجلالة التراكمة || يذئن حشه في الادغال او في الاجراج المشددة الشائنة على اسمع الادوية . حشته يفض واحدة ترخها الانثى دون الذكر الذي يذئن لها اللهاء .

٢٥٤٩٨ - مأكوري

سمكة بحرية تسمى حنجلية ، اطلبها .

٢٥٤٩٩ - مأكوريات

Menuridae (S). Menuridae (F). Menuridae (E).

فصيلة طير من الجوارح لاقتات النمل وريقات المتناثر . اجناسها وانواعها قليلة العدد . اصطناعها جبال استرالية



مانور ميلون



ماهونية

- Râperie (F). **مَبْرَشَة** ٢٥٤٨٤
معمل لبشر الجلود وتقطيعها أو سحقها .
- Orangerie (F). **مَبْرَكَة** ٢٥٤٨٥
Orangery (E). هي بستان البرتقال .
- Sardine (petite) (F). **مَبْرُوم** ٢٥٤٨٦
Plichard (small) (E). للبروم السردين الصغير لا يتجاوز طوله ٥ سم .
- Porte-graines (F). **مَبْرُوكَة ، مَبْرُوكِيَّة** ٢٥٤٨٧
هي البهزرة ما يزرع من البقول ويختلف النباتات العشبية المسمول على يزرعها . ج. مبرزات و بزارى .
- ٢٥٤٨٨ **مَبْرُوسَة**
المبسوسة أو القدم المبسوطة نجم ثير من كوكبية برج التولمين مركزة على الركبة اليسرى من التولم المتقدم .
- Omnivore (F). **مَبْشَار** ٢٥٤٨٩
Omnivorous (E). نمت تعريفي يطلق على كل حيوان قوته اللحم والنبات .
- Racle (F). Scraper (E). **مَبْشَرَة** ٢٥٤٩٠
Oignonière (F). Onionbed (E). **مَبْشَلَة** ٢٥٤٩١
هي حقل البصل .
- Canardière (F). **مَبْشَرِي** ٢٥٤٩٢
Duck-pond (E). غدير شمس ياليط أو غدير حفر لصيد البط البرى .
- Melonnière (F). **مَبْشَطَة** ٢٥٤٩٣
المبشطة حقل للقيام .
- Culture du pastèque (F). **مَبْشَخَة** ٢٥٤٩٤
هي حقل البطيخ .
- Jardin potager (F). **مَبْشَلَة** ٢٥٤٩٥
Kitchen-garden (E). هي البستان الممد لزراعة الخضار .
- ٢٥٤٩٦ **مَبْشَكَر ، مَبْشَكَل ، مَبْشُور ، مَبْشَر**
Hatif, Précoc (F). Early, Precocious, Forward (E). صفة النبات السريع النمو والقريب الإدراك .
- Drosomètre (F). **مَبْشَل** ٢٥٤٩٧
Drosometer (E). المبالل جهاز يستعمل في قياس ما يسقط من سلى وندى في وقت معين ؛ غالباً من الغروب الى الشروق .
- ٢٥٤٩٨ **مَبْشَق**
Accrescent لمت تعريفي توصف به مختلف اعضاء الزهرة ، دون المبيض ، التي تتابع نموها بعد الانحساب .
- Houssale (F). **مَبْشَنَة ، مَبْشَنَة** ٢٥٤٩٩
Holly-grove (E). منبت البشينة .
- Mabouya ponctué ٢٥٥٠١ **مَبُونِيَّة مُنْقَطَعَة**
هي الحكانة المنقطعة ، اطليا .
- Mahonia japonica (S). **مَاهُونِيَّة بَابَانِيَّة** ٢٥٤٩٧
Mahonia du Japon (F). جنينة سرودية فروعها تملو من ٢٥٠ الى ٣٠٠ سم . وريقات اوراقها تمد من ٩ الى ١٩ ؛ فصلها غصق الصفحة ؛ خرب الزام الاخير ، يطول نحو ١٢ سم . عنايقها الزهرية مستدلة الكثافة تطول نحو ١٥ سم . ازهارها متوسطة القد جميلة الصفار الزاهي . ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .
- ٢٥٤٩٨ **مَاهُونِيَّة**
Métaphysique (F). هي الميتافيزيك ، اطليا .
Macaphysics (E).
- ٢٥٤٩٩ **مَالِك**
Liquide (F). Liquid (E).
- ٢٥٥٠٠ **مَالِي**
Hydraulique (F). Hydraulic (E).
- ٢٥٥٠١ **مَاهَا**
Rache (F). Hivo (E). الهامة والكمرة والقدير هي مأوى للثعلب .
- ٢٥٥٠٢ **مَاهَاة الركامير**
Guépier (F). Wasps' nest (E). هي خلية النازير .
- ٢٥٥٠٣ **مَاهَاة ، مَاهَاة**
Coéchangiste, Copermutant (F). Permutor (E). هو احد الطرفين في عقد الديل أو المقايضة .
- ٢٥٥٠٤ **مَاهَاة**
Réciprocity (F). Reciprocity (E). هي الاتفاق على موضوع معين .
- ٢٥٥٠٥ **مَاهَاة**
Concours (F). Concourse (E). هو الاشتراك في عقد قانوني .
- ٢٥٥٠٦ **مَاهَاة زراعية**
Concours agricoles (F). Cattle show (E). مسابقات تقيّمها الحكومة أو الجمعيات والزراعية توزع فيها الجوائز المالية والشهادات . وهي تتناول الحيوانات والانتاج والمصنوعات والآلات الخ... الخ .
- ٢٥٥٠٧ **مَاهَاة**
Cisailles (F). مقص ، مقص ، مقصير
Shears, Clipper (E). مقص كبير يستعمل في جز الخضير وبتر الانثان الزائدة في جنبات وانحمار الكروين .
- ٢٥٥٠٨ **مَاهَاة**
Evaporimètre (F). مقياس القوة المبخرية في الجو .
Evaporimeter (E).
- ٢٥٥٠٩ **مَاهَاة**
Convertible آلة تستعمل في ثمر البدار أو الاسمدة .
- ٢٥٥١٠ **مَاهَاة**
Semoir (F). Seed-bag, Sowing-machine, Drill (E). آلة تستعمل في ثمر البدار أو الاسمدة .
- ٢٥٥١١ **مَاهَاة**
Cénolide (F). Czenolide (E). * نمت تعريفي يطلق على الاجسام التي تملو اطرافها الطليقة بعض الاحداث الدلبة الشائكة كما في بعض الاسماك .
- ٢٥٥١٢ **مَاهَاة ، مَاهَاة**
Fulgurimètre (F). مقياس قوة الكهرباء الجوية .
Fulgurometer (E).
- ٢٥٥١٣ **مَاهَاة**
Râpe (F). Grater, Rasp (E). آلة تبرش الجلود المسقولة كالشوندو والجوز...



مِبْرَش حَرْشَة الْفَرْخ



مبتاع

٢٥٥١ - مِسْجَرٌ ^٥ Focometre (F), Focometer (E). مِسْجَرٌ - مُتَبَاعِدٌ ، قَبَاعِدِي Divergent
 جهاز يستعمل لتحديد المسافة البؤرية. ما كان مختلف الاتجاه.

Dissemblable (F).	مُتَشَبِّهٌ - ٢٥٥١٦	Cellier (F).	مَيْبَرَةٌ - ٢٥٥٠٢
Distimilar (E).		Cellar, Store-room (E).	

Volatil (F). Volatile (E). **متطاير - ٢٥٥١٧** Diagramme (F). Diagram (E). **٢٥٥١٣ - مخطط**
 من الميال، اطله .

Fissuré (F). Cracked (E). ٢٥٥١٨ - مقبلة

Dispersé (F). Scattered (E). = 20019

تحت ترميزي يطلن على المصارات النباتية والادوية الحاشورية
التي تقضى على الحياة.

٢٥٥٢٠ - متبقة ٥

Toubatière (F).

توبستلر (F). **مقبلة** - ٢٥٥٢٠
كل رتبة تورع ثبنا عدة سنوات متتابعة. ج. متابع ,
والاي يتمايز , زوايا التبخر لهم , لياغا .

Ovairs (F). Ovary (E). **مبيض** - ٢٥٥٥٥

٢٥٥٢١ - عَقَبَنَة ، لَبَان Fenil (F). Hayloft (E). سقنة لحفظ الحشيش والتبن .

ويصير ثمرة بعد الاغصاب .

Homoptera (S), Homoptères (F), Homoptars (E), مبرقة - ٢٥٥٦
 رتبة حشرات من طيقة نصفيات الجناح ، فصائلها وأنواعها
 Mulberry plantation (E), مزرعة التوت

٧٥٥٠٧ - مِقْدَار Odomètre (F), Odometer (E).
آلة تقاسم المسافة.

٢٥٥٠٨ - مشاعر * وديع
Gynécée (F).
والزريات ...

هو مجموع اعضاء التأنيث في الزهرة وهو مؤلف من المبيض
يطوله ثلث انوي يتشعب بالمعلقة .
يقال باض الطير رسا السمك وتسم الحشرات .

Endosmomètre (F).	٢٥٥٢٤ - متحال	Métaldéhyde (F).	٢٥٥٠٩ - ميتالديهيد
Endosmometer (E).	مقياس التحال أو التناخل	Metaldehyde (E).	

Fossiles (F). Fossils (E).
٢٥٥٢٥ - عَشْحَجَرَات
مادة كيميائية معدنية تستعمل في البناء على (ص. ٢٥٥٢٥)
الرخويات التي تتركب المروصات. تمثل بمعدل ٥ %
وليس أكثر من زجاجة بالنخاله. انفسه وقتنثر على
الترية حيث الحلاز ون والزئبق وبفرها لتنفص عليها جميعا.

التربة حيث الحزن والبزاق وغيرها تفشي عليها جميعها.

٢٥٥٢٦ - متحد البؤرة Homofocal

۱۹۹۱ء - میلاد ما بین کلی محمدین .
 ۲۵۲۷ - متحدہ انٹرنیٹات
 Monadelphie (F).

Monadelphous (E). ۲۵۱۱ - متان ، متان

غاز متحبي قديم اللون. Méthane (F), Marsh gas (E).

٢٥١٢ - مائة ٥٠٠ *Phaeocontaria falcata* (F)
٢٥١٨ - معبد المركز ، مشرف المركز *Concentraria* (F) *Concentraria* (F)

Phanéoptère (F).

حشرة من الجنادب ونسيلة القهوطيان . جسمها صلب

القند ، أخضر الثوب ، سمر النخلة والمشمحة ، يطول عند الذكور من ١٢ إلى ١٥ سم. ويطول عند الإناث من ١٦

الى ١٨ م. جناحاهما بطولان من ٢٠ الى ٢٣ م. وساقاهما من ١٨ الى ٢٢ م. مرز الاثنى خليط الحجم احسن الشكل

مبطط الطرف المستقيم بطول من ٥ الى ٦ م. || انثائها
تمتص السرة في حشائر الاوراق والعصيف داخل الوثن فينتفخ

Réductible (F), Reducible (E). (مُخَفَّفٌ - ٢٥٥٣) والنظ.

Consistency (E) Consistency (E) $\text{فِیْلَا} = \text{YAAI}$ $\text{يَكُنْ} = \text{GILLU}$

Consistency (F), Consistence (E), متساقطه - 1991

Acidifiable (F). **متحفظ** - ٢٥٥٢٢ **Figuerie (F).** **مقاة** - ٢٥٥١٤

المئات كرم التبن أو المكان الذي تكثر فيه الشجار التبن . نمت تعريفي يطلق من كل مادة قابلة التحمض .



معاد

أزواجها المرفوعة قليلة العدد اعطائها بعض مناطق المحيط الهادي. تعيش على الصخور المنصورة قرب الشواطئ || اصداؤها شبه هرية الشكل وحيدة المصارع. سفاط اصداؤها يتطور مع العمر ويصبح كالنفسوة. اجسامها مخروطية. رؤوسها شبه اسطوانية. ميوزنا قاعدية. لواسها انبوبية قليلة الاستطالة. خياشيمها نظامية. ارتباطها وحيدة بسيطة.

Isométrique (F). **مُتَسَاوِي الأبعاد**
Isometric (E).

Isotrope (F). **مُتَسَاوِي الاتجاه**
Isotropic (E).

Équilatéral (F). **مُتَسَاوِي الأضلاع**
Equilateral (E).

Équidistant **مُتَسَاوِي البُعد**

Équiangle, isogonex (F). **مُتَسَاوِي الزوايا**
Equiangular (E).

Isomorphe (F). **مُتَسَاوِي الشكل**
Isomorphic (E).

Isobare (F). **مُتَسَاوِي الضغط**
Isobaric (E).

Isocèle (F). **مُتَسَاوِي الضلعين**
Isosceles (E).

Isodynamique (F). **مُتَسَاوِي القوة**
Isodynamic (E).

Isopoda (S). **مُتَسَاوِيات الأرجل**
Isopods (F). Isopods (E). Asellin (D).
رتبة حيوانات من القشريات.

Grimpeurs (F). **مُتَسَلِّقات**
Climbers (E).

رتبة من الجوسحيات طيورها صغيرة القد أو متوسطة تتميز بتسلقها الأشجار. ضلالتها عديدة اشهرها البينسارات والبقليات والطرفونيات والطرقانيات والتقويريات والنقاريات.

Grimpante (F). **مُتَسَلِّقة**
Climbing, Twining (E).

النباتات المتسلقة والمبارجة التي تتميز سورها حسن الانتصاب بدون عائل.

Accipens **مُتَسَلِّم**
للتسلل أو القايض هو من يترقب المفود عليه أو الملكية.

Homologue (F). **مُتَسَاوِيَة ، مُتَسَاوِيَة ، مُتَسَاوِيَة**
Homologous (E).

Isomère (F). **مُتَسَاوِي الأجزاء**
Isomeric (E).

Isotope (F). **مُتَسَاوِي الخواص**
Isotopic (E).

Démagogue (F). **مُتَشَرِّص**
Demagogue (E).

المتشرف من يتظاهر بخدمة الشعب لامتلائه اليه.

Lézardé (F). **مُتَشَقِّق ، مُتَشَقِّق**
Cracked (E).

Converti (F). **مُتَحَوِّر**
Converted (E).

20034 **مُتَح**
متح الجراد : إذا رز ذنبه وفرد لبيض.

Hibernant (F). **مُتَحَدِّر**
Hibernating (E).
صفة الحيوان الذي يبيت زمن الشتاء متحدرًا باستمرار النوم.

Catamétopes (F). **مُتَحَوِّلات**
Catamétopa (E).

لغة من القشريات حشريات الأرجل تنتمي الى مرتبة فصار الدليل || اجناسها وازواجها المرفوعة قليلة العدد. اعطائها بحار البلاد المحدلة الحرارة || اجسامها صغيرة القد أو متوسطه. تتميز بدورها شبه المربعة والقليلة الاضدياب.

Intercabre (F). **مُتَحَلِّل**
Intercabre (E).
صفة الاشياء المتخللة. راجع تع.

Interlobaire (F). **مُتَحَلِّل الفصوص**
Interlobular (E).

Adaptation **مُتَّكِد**
هو الالاد والازواب.

Mètre (F). **مِتر**
Mètre (E).
وحدة قياسية وضمتها الثورة الفرنسية وقد شاع استعمالها الآن في جميع اقطار العالم باستثناء البلاد الانكليزية والامريكية || يعتبر طول المتر مساويًا لجزء واحد من العشرة ملايين جزء التي تولدت زام الحاضرة أو المسافة بين القطب وسط الاستواء || اجزاء المتر هي السيمتر اي عشر المتر، والسنتمتر اي جزء من متر، والمليمتر اي جزء من ألف. اما مضاعفات المتر فهي الديكاسمتر اي عشرة امتار والميكسومتر اي مائة متر والكليسمتر اي ألف متر.

Métrer (F). **مِتر**
To measure (E).
قاس بالمتر.

Centiare, Mètre carré (F). **مِتر مربع**
Hundredth part of an are (E).

وحدة مساحة قياسها الطولي والمربعي متر واحد.

Mètre cube (F). **مِتر مكعب**
Cubic meter (E).

وحدة حجمية قياسها الطولي والمربعي والمكعب متر واحد.

20044 **مِتر حُرَاق**
نمت تعريبي يطلق على كل طوب من بقرة ونسجة ومنز وناقة ينقطع دنها بسرعة. تقبل بقرة منراج. ج متارح.

Conjugué (F). **مُتَرَاكِب ، مُتَوَالِف**
Conjugata (E).

20046 **مِتر حُرَاقات الأسنان**
Opacérodontes, Typhlopléas (F). Typhlopléas (E).
مرتبة من الحيات تكين أسنانها إما في الفك الاعلى أو في الفك الاسفل.

20047 **مِتر حُرَاقَة**
Mitularia (S).
Mitularia (F). Mitularia (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات مميزات الأرجل اماميات الخياشيم وحيوانات الاجهزة وعضلية المينيسيات.



مترلة

٢٥٥٦٦ - مُتَصَرَّف (F). Settlor (E). مُتَكَلِّف

هو من يملك الثبر تبرعاً سواء هبة في حياته أم بوصية بعد موته .

٢٥٥٦٧ - مُتَصَلِّب ، عَيْن ٥ Sciérophyte (F).

٢٥٥٨٢ - مُتَوَلَّن Multicolore (F). Multicolour (E).

كثير الألوان المختلفة .

٢٥٥٦٨ - مُتَعَلِّقات Rudistes (F).

٢٥٥٨٤ - مُتَعَالِل Amétole, Homomorphe (F).

نمت تعريفي يطلق في علمي الحيوان والنبات على الأعضاء أو الأجزاء المتشابهة الشكل .

٢٥٥٦٩ - مُتَعَارَف Axiome (F). Axiom (E).

٢٥٥٧٠ - مُتَعَمَّيات Organismes (F). Organisme (E).

٢٥٥٨٥ - مُتَعَالِل الأجزاء Métamérise (F).

نمت تعريفي توصف به الأجزاء المتألفة في كامل الجسم أو في قسم منه .

٢٥٥٧١ - مُتَعَارَف Axiome (F). Axiom (E).

٢٥٥٨٦ - مُتَعَالِل الأصابع Homopode (F).

نمت تعريفي يطلق على كل حيوان أصابعه متألفة المند في قوائم الأربع .

٢٥٥٧٢ - مُتَعَمَّد Soumissionnaire (F).

٢٥٥٧٣ - مُتَعَمَّد Tenderer (E).

الشاهد المتكفل بأجراء أمر .

٢٥٥٨٧ - مُتَعَالِلات الأسنان Denticles, Odontocites (F).

مرتبطة حيوانات بحرية لبونة من رتبة الحويطات تشمل الحيتان من ذوات الأسنان المتألفة غير قابلة التجديد || أجسامها المرفوعة ٢٤ تمسحها أربع ضلأل : الجبلديات والفلنديات والنبريات والقيطات .

٢٥٥٧٤ - مُتَعَمَّد هو الملتزم أو المقاول .

٢٥٥٨٨ - مُتَمَسِّك ، مُتَدَمِّج Compact

٢٥٥٨٩ - مُتَمَمِّج ، حَزْرَوِيَّة Spirille (F).

٢٥٥٩٠ - مُتَمَكِّب Tropicalis (F).

٢٥٥٩١ - مُتَقَنَّ Châtré (F).

٢٥٥٩٢ - مُتَقَنَّ To castrata, To geld (E).

٢٥٥٩٣ - مُتَقَنَّ القومى

٢٥٥٩٤ - مُتَنَابِب طَرْدًا Directement proportionnel (F). Proportional directly (E).

٢٥٥٩٥ - مُتَنَابِب عَكْسًا Inversement proportionnel (F). Proportional inversely (E).

٢٥٥٧٥ - مُتَقَبَّل ، مَعْبَان Tâcheron (F).

٢٥٥٧٦ - مُتَقَبَّل Discontin (F).

٢٥٥٧٧ - مُتَكَ Anthère (F). Anther (E).

٢٥٥٧٨ - مُتَكَّ Rostre (F). Rostrum (E).

٢٥٥٧٩ - مُتَكِّي ٥ Stamén (F). Staminate (E).

٢٥٥٨٠ - مُتَعَالِم النِمَار Gymnocarpe (F).

٢٥٥٨١ - مُتَعَالِم ٥ Billonneur (F). Ridger (E).

٢٥٥٨٢ - مُتَعَالِم ٥

٢٥٥٨٣ - مُتَعَالِم ٥

٢٥٥٨٤ - مُتَعَالِم ٥

٢٥٥٨٥ - مُتَعَالِم ٥

٢٥٥٨٦ - مُتَعَالِم ٥

٢٥٥٨٧ - مُتَعَالِم ٥

٢٥٥٨٨ - مُتَعَالِم ٥

٢٥٥٨٩ - مُتَعَالِم ٥

٢٥٥٩٠ - مُتَعَالِم ٥

٢٥٥٩١ - مُتَعَالِم ٥

٢٥٥٩٢ - مُتَعَالِم ٥



متك



متك

٢٥٥٩٣ - مُتَقَنَّ القومى

٢٥٥٩٤ - مُتَنَابِب طَرْدًا

٢٥٥٩٥ - مُتَنَابِب عَكْسًا

٢٥٥٩٦ - مُتَنَابِب عَكْسًا

٢٥٥٩٧ - مُتَنَابِب عَكْسًا

٢٥٥٩٨ - مُتَنَابِب عَكْسًا

دون سولما . تثلث في تجاويف الاشجار . اناتها تبيض مرتين في العام، المرة الاولى في اواخر اذار والثانية في اواسط حزيران . ذكروها تقتناب مع اناتها في حضان البيض الذي يستمر نحو اسبوعين .

٢٥٦١١ - مَتَوَقِّلُ الْغَابِ (S). *Certhia familiaris* (S). Grimpereau des bois (F). Tree-Creeper (E).

طائر من المتقلات . اطائه تشمل الشرق الادنى واروپا . يأنف المناطق الجبلية واصحها اخرج الترنب والتربين || جسمه صغير اللد بطول نحو ١٤ سم . يحضه نحو ١٦ سم . ثوبه متداخل الالوان . رأسه ورديا وظهوره وصفر الى الشقعة السمره تعلوها رشفة بيضاء . جناحاه مجذمان بالابيض . زوره وصدره وبعته الى البياض المعاني تشوبه شحمة قهراء . ذنبه متوسط الطول وتاجي الریش ، اسمر اللون ، اشجع المواج . متقاده بين الاحديداد اسمر اللون . رسده قصيرتان صخيتان . خالبه صبيحة ، حادة الاطراف ، سوداء اللون || يأنف معطر اخرج الجريد . يتسلق ساق الصخرة حتى القنة ويرتبي منها الى الارض ثم يتسلق غيرها متقبيا عن الحشرات ويرقاتها ومكبتها . طيراته قصير الشوط وانتقاله على الارض حرقصة حرقاء || يثن عشه في تجاويف الاشجار . الاث تبيض مرتين في الدم الاول في اواخر اذار والثانية في اواسط حزيران . الذكر يتنارب الاث في حضان البيض الذي يستمر نحو اسبوعين . بيضها حاجي اللون تملو رشفة جوية تتكاثف عند الغلب || قوته الحشرات ويرقاتها ومكبتها لذلك فهو من الطيور الجزئية النفع .

٢٥٦١٢ - مَتَوَقِّلَات (S). *Certhidae* (S).

***Certhidés* (F). *Certhidae* (E).**
فصيلة طير من الجواثم رقيات المناقير . اجناسها وانواعها عديدة جميعها من الطيور النافعة . قوتها الحشرات .

٢٥٦١٣ - مَتَوَقِّي (S). *Métonien* (F). *Metonic* (E).

من متون (*Méton*) اسم علم . نعت تعريفي يطلق على دورة فلكية مدتها ١٩ سنة ، تدعي الدورة المتوقية ، يقع بعدها كل من ايام الاسابيع في التاريخ ذاته من الاشهر . والدورة المتوقية تشمل ٢٣٥ هلة او شهر قري او ٦٩٢٩٧ يوما و ٧٠ ٪ من اليوم .

٢٥٦١٤ - مَتَبَّاصِر (F). *Lévogyre* (F). *Levogyrate* (E).
ما كان سطح استقطابه متجها الى اليسار .

٢٥٦١٥ - مَتَبَّائِن (F). *Dextogyre* (F). *Dextogyre* (E).

ما كان سطح استقطابه متجها الى اليمين .

٢٥٦١٦ - مَتَبَّيْرَكَة (F). *Mutisia* (S). *Mutisia* (F).

جس نباتات جنينة مبررة عارضة من فصيلة المركبات . انواعها المعروفة ٣٠ اصنافها بلاد امريكا الجنوبية . اوراقها متعاقبة لا لقياسة التركيب منها البسيطة ومنها المركبة التي تلتبي بمواقي دقيقة مستطيلة . وريقاتها شفعية متعاقبة . ازهارها كبيرة اللد متراكبة السيدات الثلاثية التسنين . بزورها مخروطية مسطيلة تدنبي بقنازع ريشية || اشهر انواعها التزيينية ما يتبع .

٢٥٥٩٦ - مَتَبَّة (F). *Sapinière* (F).

***Fir wood, Fir-grove* (E).**
مفرس تنوب او حرجة تنوب .

٢٥٥٩٧ - مَتَبَّج (F). *Récensif* (F). *Recessive* (E).
نعت تعريفي يطلق على الصفات الوراثية المسودة .

٢٥٥٩٨ - مَتَبَّة (F). *Oryx belia* (F).
هي الاربع الافريقي ، اطبله .

٢٥٥٩٩ - مَتَبَّهْدُج (F). *Hydrogéné* (F). *Hydrogenated* (E).
مركب مع الهيدروجين او يحوي بعض الهيدروجين .

٢٥٦٠٠ - مَتَبَّه (F). *Inculpé* (F). *Defendant, Accused* (E).
هو من وقع عليه الاتهام .

٢٥٦٠١ - مَتَوَاكِل (F). *Parallèle* (F). *Paraleil* (E).

٢٥٦٠٢ - مَتَوَاكِلِي الْحَرَاكَة (F). *Isotherme* (F). *Isotherm* (E).
مطابقة درجة الحرارة في اماكن مختلفة .

٢٥٦٠٣ - مَتَوَاكِلِي السُّطُوح (F). *Parallélopipède* (F). *Parallelepiped* (E).

٢٥٦٠٤ - مَتَوَاكِلِي الْمُسْتَقِيلَات (F). *Parallélopipède rectangulaire* (F). *Rectangular parallelepiped* (E).

٢٥٦٠٥ - مَتَوَاكِلِيَة (F). *Progression* (F). *Progression arithmétique* (F). *Arithmetical progression* (E).
وقد تكون متوالية حسابية .

٢٥٦٠٦ - مَتَوَاكِلِيَة (F). *Progression géométrique* (F). *Geometrical progression* (E).
او متوالية هندسية .

٢٥٦٠٦ - مَتَوَاكِلِيَة (F). *Mutata* (S). *Mutata* (F). *Mutata* (E).

جنس حيوانات بحرية من القشريات حشاريات الارجل قصيرات الذيل المهرمات وفصيلة الكوليبيات . انواعها المعروفة قليلة المدد اعطائها بحار البلاد الحارة اعصها شواطي البحر الاحمر والمحيط الهندي || اجسامها صغيرة اللد رافضة الدروح المعقدة المجهزة بسنين جاليتين كبرين . ارجلها الخلفية والاسامية ملقية الاطراف . ملاقطها كبيرة ونشطة || غلوها كاتمة الصنف لا تتوكل .

٢٥٦٠٧ - مَتَوَسَّج (F). *Dele* (F). *Déle* (E).
هو المطلوب من صاحب الحساب .

٢٥٦٠٨ - مَتَوَسَّطُ الطَّوِيل (F). *Médioligne* (F).

نعت تعريفي توصف به بعض سلالات الحيوان والطيور كالحيل والابهار والاشغام والمناجر والنجال المستطيلة الطويل .

٢٥٦٠٩ - مَتَوَسَّطُ يَسْبِي (F). *Moyenne proportionnelle* (F). *Geometrical mean* (E).
المتوسط النسبي والمتوسط المناسب والمتوسط التناسبي واحد .

٢٥٦١١ - مَتَوَقِّل (F). *Certhia* (S). *Grimpereau* (F). *Tree creeper* (E).

جس طير من فصيلة المتقلات . انواعه عديدة جميعها نفعه . تألف المناطق الجبلية اعصها المخرجية . قوتها الحشرات



مَتَبَّة



مَتَوَقِّل



مَتَوَقِّلُ الْغَاب



مَتَبَّة

levkoje Matthiole (D). Violacciocco (I).

نوع من المتيولا الأريينية. ضروريا عديدة، جميعها حولية أو حولية تملو من ٣٠ إلى ٨٠ سم. سوقها فراءه. أوراقها بحرية اللون حنايقها الزهرية كبيرة اللد. أزهارها مكسبة مختلفة الألوان يكثر فيها الأحمر والبنفسجي. جميعها فواحة اللوف المستحب || أزهارها يستمر طوال فصل الربيع.

٢٥٦٢٦ - مَكْبَة الشا، هو القرائس.

Emblavement, Emblavage (F). مَكْبَة Wheat-sowing (E).

هو الحقل وكل مزروع سم وكرب ويلد وأثير.

Prototype مَكْبَة هو السب، الطهب.

Vessie (F). Bladder (E). مَكْبَة، مِيْلَة عضو وريسي في الجهاز البولي. والثلاثة تتكون من جراب عضلي يستلوي البول ويصم بعض الوقت.

Fixateur (F). Fixing solution (E). مِفْطَة ٢٥٦٢٧

نعت تعريف يطلق على كل مادة تتميز بخامسة تثبيت. ج. مثابت.

٢٥٦٢٨ - مِفْطَة ٥، مِفْطَة

Limnimètre, Limnomètre (F). Limnimeter (E). جهاز يستعمل في تقدير ارتفاع مستوى البحيرات والاهوار.

Mixtion مِخْج ٢٥٦٢٩

مِخْج آلي: خلطه.

Siphon مِفْطَة، مِفْطَة، سِفُون ٢٥٦٣٠

مِفْطَات، مِفْطَات Siphonées (S). Siphonées (F). Siphoneas (E). فصيلة من الخفيات الجفهر.

Tarière (F). Auger, Drill (E). مِفْطَة ٢٥٦٣١

هي البريمة، أداة تستعمل للقب.

٢٥٦٣٢ - مِفْطَات

Trematoda (S). Trématodes (F). Trematode (E). صف من الديدان المريفات.

Trypanosoma (S). مِفْطَات ٢٥٦٣٣

Trypanosomes (F). Trypanosoma (E).

حيوانات دنيا طفيلية من الالاري السوطيات.

Orbicle (F). Orbicole (E). مِفْطَة ٢٥٦٣٤

نعت تعريف يطلق على كل حيوان أو نبات يستطع الالباد في مختلف اقاليم المسورة.

Perversité (F). Perversity (E). مَكْبَة ٢٥٦٣٥

الكلية عيب خلقي أو فساد في الاخلاق. مثالب الحكم والقضاء.

٢٥٦٣٦ - مِفْطَة حَبْلَة الْوَرَق

Mutisia linearifolia (S). Mutisia à feuilles linéaires (F). نوع من الميزة. ساقها قصيرة تملو نحو ١٠٠ سم. أوراقها عطية الشكل. نصلها ملتصقة الاطراف تنبت عواقل مستطيلة. أزهارها ثمانية اللبسات، كبيرة اللد، قرمزية اللون || أزهارها يستمر طوال فصل الصيف.

Mutisia decurrens (S). مِفْطَة سَاخِيلَة ٢٥٦٣٧

Mutisia decurrens (F). نوع من الميزة، ساقها دقيقة فراءه تملو من ٢٥٠ إلى ٣٠٠ سم. أوراقها ساعدة كاملة، نصلها سناني الشكل بحري اللون ينبت بطفة فراقه || أزهارها برتقالية اللون تملو من ١٥ إلى ١٢ سم. أزهارها يستمر طوال فصل الصيف.

٢٥٦٣٨ - مِفْطَة مُسْتَعْرِضَة الْوَرَق

Mutisia latifolia (S). Mutisia à feuilles larges (F). نوع من الميزة، ساقها تملو نحو ٢٠٠ سم. أوراقها ساعدة لاطفة لولية الشكل، نصلها سنن الحافة ثلاثي الأذنان. أزهارها وردية اللبسات، صفر الاقراص، مرفية القلائد، ساعدة القنابات الفارشة || أزهارها يستمر من ايلول الى تشرين.

Mutisia clematicis (S). مِفْطَة مَكْبَة ٢٥٦٣٩

Mutisia clematicis (F). نوع من الميزة، ساقها دقيقة تحلة تملو من ٦ إلى ١٠ امار. أوراقها مركبة، وريقاتها شعية التجميع ثمانية أو عشارية الاذواج. نصلها اهليجية الشكل، خلية البثرة. حوافها ثلاثية الانحناء. أزهارها كبيرة اللد، حمراء اللون، مستطيلة الاضلاع، متدلية || أزهارها يستمر من الصيف الى الخريف.

٢٥٦٤٠ - مِفْطَة مَكْبَة

Matisia (S). Matisie (F). جنس الاجار برية وزراعية من فصيلة الجيازيات مهددا بعض مناطق امريكا الاستوائية || اجارها كبيرة داخمة. سوقها منتصبة تملو من ١٢ إلى ١٥ م. أوراقها متماقية، مدقة. نصلها سنانية الشكل، جامدة الوثل، ناشرة اللروق السباحية الاذواج. أزهارها عسي التجميع. أزهارها مستطيلة الاضلاع، بيضاء اللون، وردية المواج ثمارها نووية، بيضية الشكل، خامسة الخلود، مأكولة مستحبة الطعم القريب من طعم المشمش.

٢٥٦٤١ - مِفْطَة ٥

Matico (F). هو التامبول الضيق الورق.

٢٥٦٤٢ - مِفْطَة

Méchylène (F). Mechylene (E). كحول مستطير من الخشب.

٢٥٦٤٣ - مِفْطَة

Matthiola (S). Matthiole (F). جنس نباتات حشوية وجسنية من فصيلة الصليبيات. انواعها عديدة، معظمها بري منه الممر والحوالي. جميعها قريبة الشبه من الخيري، سوقها وأوراقها زياء. أزهارها عقرودية، طرفية، عطرية. ثمارها غردلية ثنائية الخلد. زهورها دقيقة مبطلة سنطية اللون.

٢٥٦٤٤ - مِفْطَة مَكْبَة *، مِفْطَة ليلي

Matthiola bicornis (S). Matthiole à 2 cornes, Giroflée des jardins (F). Night scented stock (E). Garten-



مِيزَة



مِيزَة مَكْبَة

2٥٧٠٧ - مِجَسَّةُ الحَقْوَيْنِ (E). Sirloln (F). Aloyau

2٥٧٠٨ - مِجَسَّةُ الخِصْرِ (E). Travers (F).

2٥٧٠٩ - مِجَسَّةُ العِجْرَيْنِ (E). Breadth (F).

2٥٧١٠ - مِجَسَّةُ رَأْسِ الكَتِفِ (E). Avant-cœur, Paleron (F).

2٥٧١١ - مِجَسَّةُ رَأْسِ الوَرْدِ (E). Bord (F).

2٥٧١٢ - مِجَسَّمُ مِرْبَعِ الوُجُوهِ (E). Tétrahédre (F).

2٥٧١٣ - مِجَسَّمُ لَاحِظٍ (E). Ellipsoïde (F).

2٥٧١٤ - مِجَسَّوْسِيَّةٌ ، مِجَسَّوْسِيَّةٌ (E). Ellipsoid (F).

2٥٧١٥ - مِجَسَّوْسِيَّةٌ (E). Palpabilité (F).

2٥٧١٦ - مِجَسَّوْسِيَّةٌ (E). Palpabilité (F).

2٥٧١٧ - مِجَسَّوْسِيَّةٌ (E). Palpabilité (F).

2٥٧١٨ - مِجَسَّوْسِيَّةٌ (E). Palpabilité (F).

2٥٧١٩ - مِجَسَّوْسِيَّةٌ (E). Palpabilité (F).

2٥٧٢٠ - مِجَسَّوْسِيَّةٌ (E). Palpabilité (F).

2٥٧٢١ - مِجَسَّوْسِيَّةٌ (E). Palpabilité (F).

2٥٧٢٢ - مِجَسَّوْسِيَّةٌ (E). Palpabilité (F).

2٥٧٢٣ - مِجَسَّوْسِيَّةٌ (E). Palpabilité (F).

2٥٧٢٤ - مِجَسَّوْسِيَّةٌ (E). Palpabilité (F).

2٥٧٢٥ - مِجَسَّوْسِيَّةٌ (E). Palpabilité (F).

2٥٧٢٦ - مِجَسَّوْسِيَّةٌ (E). Palpabilité (F).

2٥٧٢٧ - مِجَسَّوْسِيَّةٌ (E). Palpabilité (F).

2٥٧٢٨ - مِجَسَّوْسِيَّةٌ (E). Palpabilité (F).

2٥٧٢٩ - مِجَسَّوْسِيَّةٌ (E). Palpabilité (F).

2٥٧٣٠ - مِجَسَّوْسِيَّةٌ (E). Palpabilité (F).

2٥٧٣١ - مِجَسَّوْسِيَّةٌ (E). Palpabilité (F).

2٥٧٣٢ - مِجَسَّوْسِيَّةٌ (E). Palpabilité (F).

2٥٧٣٣ - مِجَسَّوْسِيَّةٌ (E). Palpabilité (F).

2٥٧٣٤ - مِجَسَّوْسِيَّةٌ (E). Palpabilité (F).

2٥٧٣٥ - مِجَسَّوْسِيَّةٌ (E). Palpabilité (F).

2٥٧٣٦ - مِجَسَّوْسِيَّةٌ (E). Palpabilité (F).

2٥٧٣٧ - مِجَسَّوْسِيَّةٌ (E). Palpabilité (F).

2٥٧٣٨ - مِجَسَّوْسِيَّةٌ (E). Palpabilité (F).

2٥٧٣٩ - مِجَسَّوْسِيَّةٌ (E). Palpabilité (F).

2٥٧٤٠ - مِجَسَّوْسِيَّةٌ (E). Palpabilité (F).

2٥٧٤١ - مِجَسَّوْسِيَّةٌ (E). Palpabilité (F).

2٥٧٤٢ - مِجَسَّوْسِيَّةٌ (E). Palpabilité (F).

2٥٧٤٣ - مِجَسَّوْسِيَّةٌ (E). Palpabilité (F).

2٥٧٤٤ - مِجَسَّوْسِيَّةٌ (E). Palpabilité (F).

2٥٧٤٥ - مِجَسَّوْسِيَّةٌ (E). Palpabilité (F).

2٥٧٤٦ - مِجَسَّوْسِيَّةٌ (E). Palpabilité (F).

2٥٧٤٧ - مِجَسَّوْسِيَّةٌ (E). Palpabilité (F).

2٥٧٤٨ - مِجَسَّوْسِيَّةٌ (E). Palpabilité (F).

2٥٧٤٩ - مِجَسَّوْسِيَّةٌ (E). Palpabilité (F).

2٥٧٥٠ - مِجَسَّوْسِيَّةٌ (E). Palpabilité (F).

2٥٧٥١ - مِجَسَّوْسِيَّةٌ (E). Palpabilité (F).

2٥٧٥٢ - مِجَسَّوْسِيَّةٌ (E). Palpabilité (F).

2٥٧٥٣ - مِجَسَّوْسِيَّةٌ (E). Palpabilité (F).

2٥٧٥٤ - مِجَسَّوْسِيَّةٌ (E). Palpabilité (F).

2٥٧٥٥ - مِجَسَّوْسِيَّةٌ (E). Palpabilité (F).

2٥٧٥٦ - مِجَسَّوْسِيَّةٌ (E). Palpabilité (F).

2٥٧٥٧ - مِجَسَّوْسِيَّةٌ (E). Palpabilité (F).

2٥٧٥٨ - مِجَسَّوْسِيَّةٌ (E). Palpabilité (F).

2٥٧٥٩ - مِجَسَّوْسِيَّةٌ (E). Palpabilité (F).

2٥٧٦٠ - مِجَسَّوْسِيَّةٌ (E). Palpabilité (F).

2٥٧٦١ - مِجَسَّوْسِيَّةٌ (E). Palpabilité (F).

2٥٧٦٢ - مِجَسَّوْسِيَّةٌ (E). Palpabilité (F).

2٥٧٦٣ - مِجَسَّوْسِيَّةٌ (E). Palpabilité (F).

المُجَلَّةُ الشَّكْلُ . فصائلها وأقسامها وأقسامها كثيرة العدد . أصلها جمع البحار والمياه المذبة تفيض متقلبة على الأسماء .

Multiple - مِجَلَّور : الحاصل من ضرب عدد في نفسه .

Fœtus (F). Fœcus (E). - مِجْجُر : ما في بطون الحوامل من اللحم وفيها من خوات الظلف .

Blef (F). Reasch, Laval (E). - مِجْجَر : قناة معطمة بحر الماء .

Héliomètre (F). Heliometer (E). - مِجْجَرَامٌ ، هِلِيُومِترٌ : جهاز يستخدم في قياس قطر دائرة الأجرام السماوية .

Vole lactée (F). - مِجْجَرَّةٌ ، شَرَجُ السَّيَّاءِ : Galaxy, Milky way (E).

بياض يرى في السماء يتكون من ألوان النجوم المتقاربة التي تلمس نور بعضها بعضاً فصارت كأنها سحب أبيض . وهي ترى في الشتاء أول الليل في ناحية من السماء . وهي تدور دورة بحوية تراها نصف الليل متدة من المشرق إلى المغرب وفي آخر الليل من الجنوب إلى الشمال .

Houe dentée (F). Hoc (E). - مِجْجَرَّةٌ : أداة زراعية تستعمل لرفع التراب وترتيبه .

Courant d'eau (F). - مِجْجَرَى مَاءٍ : Current, Stream (E).

Tondeuse (F). Shearer, Clipper (E). - مِجْجَرَى : أداة يذوّق أو آلية تستعمل لجزّ صوف الدواجن .

Balsamine des jardins (F). - مِجْجَرَاكَةٌ : هي البساتين التي تربيته .

Contre-espallier (F). - مِجْجَرَاكِيَّةٌ : Espalier facing another (E).

في الأشجار المثمرة القائمة على الأسلاك وقد صارت تشذيباً وفقاً لقناة .

Filet (F). Dash (E). - مِجْجَرَاكَةٌ ، شَبَكَةٌ : الشبكة يصاد بها السمك .

Manet, Maniement (F). Handling (E). - مِجْجَرَاكَةٌ : ما يمسك باليد من جسم الحيوان لحرقته أو هزاله .

Stéréoscope (F). - مِجْجَرَاكَةٌ : Stereoscope (E).


منظار جسم . جهاز بصري يمكن من مشاهدة الرسوم بتشابهها بفضل التنظيد الذي تكتبه النظارتان .

Stéréoscopique (F). - مِجْجَرَاكِيَّةٌ : Stereoscopic (E).

Oreillette, Oreillon (F). - مِجْجَرَاكَةٌ : Auricle, Earlet (E).



مِجْجَد



مِجْجَلَّة



مِجْجَلَّة

Cheiroptères **مَجْنَحَات الأَيْدِي**

Genre	جنس	Sous-Famille	عائلة	Famille	الصفة	Sous-ordre	مرتبة
Roussettes	شفاعة			Pteropodidés	وطوايطات	Mégachiroptères	وطاويط
Cynonycteris	رقاعة						
Epomophores	حيئر						
Cynoptères	سقطوم						
Harpie (Céphalote)	مساخة						
Macroglosse	لثانة						
Eonycteris des cavernes	مرحاب						
Nésonycteris	حييرش						
Rhinolophes	عماش			Rhinolophidés	عماشيات	Microchiroptères	مخفاطيش
Triadenops	خناطيل						
Phyllorhines	ذبابش						
Authops orné	دملوح						
Coleps	ذباب						
Mégadermes	مطاب			Nyctéridés	وسرديات		
Nyctères	وحرة						
Oreillardes	طمروق			Vespertilionidés	خفاشيات		
Synotes, Barbastelles	سحاة						
Vespérugos	خفاف						
Scotophiles	ذعاط						
Vespertillions	خفاش						
Minioptères	زبابع						
Furies	دوس	Emballonurines	رماسات	Emballonuridés	رماشيات		
Saccotéryx	غضوف						
Diclidures	دماس						
Noctilions	نكتيل						
Emballonures	رماس						
Taphiens	شقلمان						
Rhinopomes	عينوم						
Chiromèles	زغداب	Molossinés	هيرات				
Molosses	هيرة						
Nyctinomes	ضفوف						
Mystacops	خوبر						
Vampires	زراف			Phyllostomidés	ورقيات		
Phyllostomes	ورقية ، فيلستوم						
Glossophages	مصاص						
Desmodes	عروق						
Diphyllies	عولق						

كثيرة المدد تقسم الى فئتين الاولى تشمل عمار المياه البحرية وهي منتشرة في معظم عمار العالم . والثانية تشمل عمار المياه العذبة التي تعيش في الأنهار والبحيرات || وهو من الرخويات الضخمة الاحساس، القليلة الحركة، يتغذى بالكائنات الدنيا الحيوانية والنباتية التي تدخل مع له الماء .

٢٥٧٥٧ - **محار مائل** * ، **توكاي**
Ostreus edulis (S). Huitre ordinaire (F). Edible oyster (E).
نوع من عمار المائل المأكول . يكثر على الصخور المنصورة بالماء على طول الشاطئ اللبناني . وهو يربي في اسواق خاصة مؤدية فينكاثر بسرعة .



محار

٢٥٧٥٨ - **محاركة**
الحايتان هما رأس الورق المشتريان اللذان تكون لهما رؤوس الفضلن .

٢٥٧٥٩ - **محاركة ، قوف ، صيون**
Pavillon de Foraille (F). Pavillon, Auricle (E).
رأس قوف صيون .

٢٥٧٦٠ - **محاركة**
Ostréicole (F).
٢٥٧٦١ - **محاركة ، إسطرأوكيت**
Ostréidae (S). Ostréidae (F). Ostreidae (E).
فصيلة من الرخويات ذات الصدفتين .

٢٥٧٦٢ - **محار** *
Vinago (S).
Vinago (F). Vinago (E).
جنس طير من الجوارح حاميات الشكل وفصيلة الترونيات . انواعه المعروفة قليلة المدد اعطائها البحر الاحمر وبعض مناطق المحيط الهندي . تعيش في تجاويف مدافع الرجان || اصداها كلبية المادة ، بيضاء اللون ، تحبة التحيز ، صفراء ، مكررة ، ثلاثية الوب او رباعية في اول عهدها ثم تطول مع مرور الزمن تصبح كالشرب الاسطوانية الشكل .



عمار مائل

٢٥٧٦٣ - **محاسب**
Comptable (F).
Accountable, Responsable (E).
الوكيل المؤتمن على الحساب .

٢٥٧٦٤ - **محاسبة ، مسك الدفاتر**
Comptabilité (F). Accounts, Book-keeping (E).

٢٥٧٦٥ - **محاق ، مُحَقَّق ، مُحَقَّق**
الحاق او الاقتان وجه من اوجه القمر يحدث عندما يتوسط القمر بين الارض والشمس ويكون نصفه المضيء متجهاً نحو الشمس فتستحيل رؤيته . والحاق يتبقى حرف الحلال يوم .



محاس

٢٥٧٦٦ - **محاسبات** *
Anelytropidae (S).
Anelytropidae (F). Anelytropidae (E).
فصيلة حيوانات زرافة من رتبة السقا قصيرات الالسة . اجناسها المعروفة ثلاثة وانواعها سبعة . موطنها افريقية الاستوائية والجنوبية وبعض مناطق المكسيك . جميعها جامة تسرح في الليل ويبيت في النهار || اجسامها مدوية الشكل ، عادمة القوام ، تطول من ١٥ الى ٢٥ سم .

بالستيمر المربع . ويختلف الجهود باختلاف الفرض المطروح لذلك فهو قد يكون :

٢٥٧٦٧ - **محسب** * ، **محسب** *
Effort de sécurité (F).
Safe stress or strain (E).

٢٥٧٦٨ - **محسب**
Effort de torsion (F).
Torsional stress (E).

٢٥٧٦٩ - **محسب**
Effort de compression (F).
Compressive stress (E).

٢٥٧٧٠ - **محسب**
Effort de traction (F).
Tensile stress (E).

٢٥٧٧١ - **محسب**
Effort de rupture (F).
Ultimate stress (E).

٢٥٧٧٢ - **محسب** * ، **محسب** *
Aéromètre (F). Aerometer (E).
جهاز خاص يستعمل في تحديد كثافة الهواء .

٢٥٧٧٣ - **محسبات ، لاحشريات**
Coelenterés (F). Coelenterata (E).
شعبة من الحيوانات لا اعضاء لها فيها مجموع واحد له فتحة واحدة الى الخارج تقوم مقام الفم والامتصاص .

٢٥٧٧٤ - **محسبات القرون**
Cavicornes (F).
Cavicornes (E).
قسم من الحشرات ذات القرون الحية كالبرق والغم والثنايا .

٢٥٧٧٥ - **محسب** *
Magilus (S).
Magile (F). Magilus (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مدليات الارجل وفصيلة المحليات . انواعه المعروفة قليلة المدد اعطائها البحر الاحمر وبعض مناطق المحيط الهندي . تعيش في تجاويف مدافع الرجان || اصداها كلبية المادة ، بيضاء اللون ، تحبة التحيز ، صفراء ، مكررة ، ثلاثية الوب او رباعية في اول عهدها ثم تطول مع مرور الزمن تصبح كالشرب الاسطوانية الشكل .

٢٥٧٧٦ - **محسبات** *
Magilidae (S).
Magilidae (F). Magilidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات مدليات الارجل . اجناسها وانواعها المعاصرة المعروفة قليلة المدد منتشرة في بعض عمار المناطق الحارة || اعرف اجناسها واشهرها المحل .

٢٥٧٧٧ - **محسب ، محسب**
Vitelus
صفرة البيض ، وهو العرقل .

٢٥٧٧٨ - **محسبات** هي الخلمي القروزي ، اطليه .

٢٥٧٧٩ - **محسابة** *
Phytosomie (F).
Phytotomy (E).

الحاجة او الفيتوتوميه علم يبحث في تشريح النبات .

٢٥٧٨٠ - **محسب** *
Paucliflore (F). Paucliflorous (E).
نمت نمرين يدل على قلة الزهر في أي شكل كان من اشكال الانفرار . تفكرل منالها ومناقيدها ومساكنها ولورها محاس .

٢٥٧٨١ - **محسب ، إسطرأوكيت**
Ostrea (S). Huitre (F). Oyster (E).
جنس حيوانات من الرخويات وفصيلة المحاريات . انواعه

الاسم الفرنسي	التاج	الحبل باليوم	الحويان	Transmission (F).	مَحَاكِلَة - ٢٥٧٧٧
Guenon	١	٢١٠	دحية	Transmission, Transmittal (E).	جهاز ميكانيكي .
Lièvre	٥-٣	٣٣	ذراة	Pouille de transmission (F).	مَحَاكِلَة - ٢٥٧٦٨
Fouline	٧-٢	٥٦	دلق	Pulley (E).	هي البكرة العديدة السفات التي تستعمل في رفع الأثقال .
Louve	٦-٣	٦٨	ذئبة	Egrappoir (F).	مَحْبِلَة - ٢٥٧٦٩
Lale	٨-٥	١٣٠	رث		آلة تفصل حب الثمن عن التفروق أي الملوث .
Renne	١	٢٤٦	رنة	Terra fertile (F).	مَحْبِلَة - ٢٥٧٧٠
Civetta	٤-٣	٧٢	زبادة	Fruitful soil (E).	المهار : الأرض الغنية السريعة النبات . « لنا جبال
Rat des moissons	٩-٣	٧٢	زبادة		ومى محار « ج . محار .
Girafe	١	٤٥٠	زرافة	Granulaire, Granuleux (F).	مَحْبِلَة - ٢٥٧٧١
Muscardin	٧-٢	٧٨	زغبة	Granular, Granulos (E).	ذو حبوب .
Belette	٨-٣	٣٥	سرغوة	Jus de grenade (F).	مَحْبِلَة - ٢٥٧٧٢
Marta	٦-٢	٥٦	سمند	Juice of pomegranate (E).	الحبرم : ماء حب الرمان .
Ecreuil	٤-٣	٧٨	سجباب	Stalle, Box (F).	مَحْبِلَة - ٢٥٧٧٣
Chamois	٢-١	١٦٥	شمواء	Stall, Box (E).	الحبس والحبس : مرقة الفرس الواحد في الأصطبل .
Chat sauvage	٤-٣	٥٦	فسيون	Désoperculeur (F).	مَحْبِلَة - ٢٥٧٧٤
Taupe	٥-٣	٢٨	طوفين		أداة خاصة يفتتح بها العمل .
Biche	١	١٨٥	ظبية	Gestation (F).	مَحْبِلَة - ٢٥٧٧٥
Campagnol	٧-٤	٢٢	عكبر الحقل	Gestation, Pregnancy (E).	الحبل هو مدة الحمل ، أي زمن تكوير الجنين ، يستمر
Chèvre	٣-١	١٥٤	عنز		من الانحساب إلى الوضع تدهت تختلف مع نوع الحيوان ،
Eléphant	١	٧٦٠	عنبر		أصغرهما ١٣ يومًا وأطولها نحو ٧٦٠ وقد ذكرنا في
Blaireau	٥-٣	٦٥	غريراء		الجدول التابع أشهر أنواع الحيوان ومدة حملها باليوم
Gazelle	١	١٥٤	غزاله		ومدد نتاجها :
Souris	٨-٥	٢١	فأرة		
Jument	١	٣٤٥	فرس ، حبر		
Lérot	٦-٤	٢٨	فوقب		
Tigresse	٥-٣	١٠٠	فزاره		
Morse	١	٢٦٠	فظ		
Phoque	١	٢٧٦	فقمة		
Léoparde	٥-٣	٩٦	فهدة		
Hermine	٨-٥	٦٠	قائم ، هرين		
Hamster	٧-٣	١٦	قد آد هستر		
Loir	٦-٢	٢٨	قرقند		
Loutre	٣-٢	٦٣	قضاة		
Hérissonne	٦-٤	٤٨	قنطلة		
Rhinocéros	١	٥٥٠	كركلان		
Chienne	١٠-٣	٦٣	كلية		
Cobaye	٥-٢	٦٨	كوباي		
Lama	١	١٦٨	لاما		
Lionne	٣-٢	١١٠	لبرة		
Mara	٢	٦٠	ماره		
Marmotte	٦-٢	٣٥	مردوت		
Mandrill	١	٢٧٠	ميسون		
Chamelle	١	٣٢٠	نائلة		
Brebis	١	١٤٧	نسجة		
Panthère	٥-٣	٩٦	نمرة		
Chatte	٧-٥	٦٠	هرة		
Lynx	٤-٢	٦٣	رشق		
Bouquetin	١	١٦٧	رسل		
Chevreuil	٢-١	٢٧٠	يأمور		



محبس

٢٥٨٢٣ - مَحْشٌ هَشُّ الْجِلْدِ : قشره من اللحم .

٢٥٨٢٤ - مَحْشٌ Brouisure, Brûture (F).
Blight, Frost-nip (E).

الحش الاحتراق في البشرة . الصقيع يحش البشرة والنمل اي يحرقها .

٢٥٨٢٥ - مَحْشٌ * ، مَحْشَةٌ Faucheur, Tondeuse de gazon (F). Lawn-mover, Mowing-machine (E).

آلة ميكانيكية تستعمل لحش كلأ المروج .

٢٥٨٢٦ - مَحْشٌ مَائِيٌّ Faucaeur (F).
آلة ميكانيكية تستعمل لحش النباتات المائية في الانهار .

٢٥٨٢٧ - مَحْشَةٌ Rétailleur (F). Rack (E).
وهما خاص بركز فوق الملفف العادي يوضع فيه الكلا وتائن لتخلط البهايم شيئاً نفيساً دون ان تبصره .

٢٥٨٢٨ - مَحْشَةٌ Grève (F). Strand (E).

الحصبة شط مطبق بحري او نهري تغمره الحصى والزمال الخشنة . ج محاسب .

٢٥٨٢٩ - مَحْشَدٌ ، مَحْشَدَةٌ ، حَصَادَةٌ .
Moissonneur (F). Reaper (E).

راجع حصادة ومنها الجامة والرابعة الخ .

٢٥٨٣٠ - مَحْشُولٌ ، مَحْشِيٌّ ، حَشِيٌّ ، حَشَّةٌ ، نَزَلٌ Récolte (F). Harvest, Crop, Vintage (E).

ما يحش من زراعة الارض .

٢٥٨٣١ - مَحْشَرٌ Procès-verbal (F).
Official report (E).

مقد يدين فيه للامور المورج الوقائع المادية والاعمال التي قام بها .

٢٥٨٣٢ - مَحْشَنٌ ، مَحْشَمٌ Incubateur, Couvoir (F). Incubator (E).

هو المرنك ، اطلبه .

٢٥٨٣٣ - مَحْشَبٌ * ، مَحْشَدٌ Serpe (F).
Bill-hook, Hedge-bill (E).

اداة سادة منقطة الطرف تستعمل في تشذيب الاشجار وقطع الاشخاب .

٢٥٨٣٤ - مَحْشَبٌ Aslette (F).

اشجار الحرج المعدة للقطع .

٢٥٨٣٥ - مَحْشَّةٌ جَوَائِيَّةٌ Station météorologique (F). Meteorological station (E).

مركز مجهز بما يلزم لتتوّن الاحوال الجوية ودرسها .

٢٥٨٣٦ - مَحْشَّةٌ زُرَاعِيَّةٌ Station agronomique (F). Agronomic station (E).

مركز علمي وعلمي يبحث في مختلف النباتات والفطون الزراعية والاختبارية لاستخلاص نتائجها .

٢٥٨٣٧ - مَحْشَطَارٌ Sirex
جنس حشرات من فصيلة المظاريات . انواعه المروفة ١٢ اجسامها اسطوانية الشكل طويلا يراوح من ٣٠ الى ٤٠ سم .

٢٥٨٠٧ - مُحَرَّرٌ Triangulaire (F).
Triangular (E).

ما كان شكله مثلث الزوايا .

٢٥٨٠٨ - مُحَرَّرِيَّاتٌ Oxytomes (F).
Oxytoma (E).

لثة من القشريات عشاريات الارجل تنتمي الى رتيبة قصار الذيل . اجناسها وانواعها المروفة متوسطة العدد جميعها من مطر بحار البلاد الحارة || اجسامها صغيرة . تتميز بدرورها المستديرة وبانواعها الهرسة الشكل || اشهر فصائلها الكوليبيات .

٢٥٨٠٩ - مُحَرَّكٌ Moteur (F). Motive, Motor (E).

كل كاشي او جهاز آلي يقوم بعمل ميكانيكي . لذلك فالحرركات تقسم الى حية ومجاندة . الحركات الحية كالرجل والقرص والطور... والحركات الجسامية هي الآلية التي تديرها إحدى القوى المتصرفة كالتواء والرياح والكهرباء والحرارة ، الخ .

٢٥٨١٠ - مُحَرَّكٌ جَسَادِيٌّ Moteur inanimé (F).
Inanimate motor (E).

٢٥٨١١ - مُحَرَّكٌ حَرَوِيٌّ Moteur thermique (F).
Thermic motor (E).

٢٥٨١٢ - مُحَرَّكٌ حَيٌّ Moteur animé (F).
Animated motor (E).

٢٥٨١٣ - مُحَرَّكٌ كَهْرَبَائِيٌّ Moteur électrique (F).
Electric motor (E).

٢٥٨١٤ - مُحَرَّكٌ مَائِيٌّ Moteur hydraulique (F).
Hydraulic motor (E).

٢٥٨١٥ - مُحَرَّكٌ هَوَائِيٌّ Moteur aérien (F).
Aerial motor (E).

٢٥٨١٦ - مَحْرُوقَةٌ

الحرقة واحدة المحرقت ، بجرة يفسد تجمل في الملح لا تخالف شيئاً الا غلب ريحها عليه وتنت في البادية وهي ذكية الريح جداً . (عن ابن شبل ، اللسان) .

٢٥٨١٧ - مِجْرٌ Inciseur, Coupe-sève,
Pince-sève (F). Ringing-knife (E).

اداة تستعمل لحز الاشجار المطلوب استغلال عصاريتها .

٢٥٨١٨ - مِجْرَمَةٌ Bottaloir, Botteleuse (F).
Binder, Sheaf-binding machine (E).

اداة تستعمل في ضم صالغ الحليون وتخزينها .

٢٥٨١٩ - مِجْسَةٌ Estrille (F). Curry-comb (E).

٢٥٨٢٠ - مَحْشَرٌ ، مَحْشَرٌ loue (F). Cheek (E).

هو الجزء الجانبي من الرأس في الحيوان والظفر ومن البهق في الحشرات ، وهما محبران .

٢٥٨٢١ - مَحْشَرِيٌّ ، مَحْشَرِيٌّ Jugal

٢٥٨٢٢ - مِجْسَلٌ Ebarbeur (F).
Paring machine (E).

آلة ينزع بها شعاع الشمر بعد التدريس .



محرار القصوى والدنيا



محر



محش



محشد



محشد



محطب

٢٥٨٥٠ - مَحْكَمَةٌ
Cour, Tribunal (F).
Court, Tribunal (E). هي المحكمة التي تلي القضاء .

٢٥٨٥١ - مَحْكَمَةُ الاسْتِنْفَافِ

Cour d'appel (F). Appel court (E).
هي المحكمة التي تنظر في جميع القضايا التي حكم فيها ابتدائياً .

٢٥٨٥٢ - مَحْكَمَةُ الْيَدَايَةِ

Cour de première instance (F). قضاء أول درجة .

٢٥٨٥٣ - مَحْكَمَةُ التَّحْكِيمِ الدَّوْلِيَّةِ

Cour internationale d'arbitrage (F).
انشتت هذه المحكمة بمقتضى اتفاق لاهاي عام ١٩٩٩ لكي تفصل بطريق التحكيم في جميع المنازعات الدولية التي لم تفلح الطرق السياسية في حلها . مركزها مدينة لاهاي .

٢٥٨٥٤ - مَحْكَمَةُ التَّحْيِيزِ ، مَحْكَمَةُ النِّقْضِ

Cour de cassation (F). Highest court (E).
هي اهل المحاكم درجة لانه يطلب منها النظر في الاحكام التي صدرت من محاكم الدرجة التالية فهي تنقض منها ما ترى فيه مغايرة للقانون او تفسيراً خاطئاً له .

٢٥٨٥٥ - مَحْكَمَةُ الْجَنَائِياتِ

Cour d'assises (F). Assize court (E).
هي المحكمة التي تنظر في المسائل الجنائية وهي تتلّف من ثلاثة اعضاء تعيينهم محكمة الاستئناف من المستشارين يكون اقدم رئيساً .

٢٥٨٥٦ - مَحْكَمَةُ الْعَدْلِ الدَّوْلِيَّةِ

Cour internationale de justice (F). International justice court (E).
هي الادارة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة لايتها تشمل كل ما هو متصوّر عليه في الميثاق والماعداات والاتفاقات المصنوعة بها .

٢٥٨٥٧ - مَحَلُّ الْإِقَامَةِ

Domicile de fait, Résidence (F). Dwelling, Ordinary residence (E).
هو المكان الذي يقم فيه المرء دون ان يكون زائماً موطنه القانوني .

٢٥٨٥٨ - مِحْلَابٌ

Galactophore (F).
Galactophorous (E).
لمت تمريرني يطلق على كل وعاء ينقل الحليب أو يقوده الى الخارج .

٢٥٨٥٩ - مِحْلَالٌ

Bordereau (F).
Memorandum, Schedule, Account (E).
هو البيان التفصيلي الذي يوضح الاعمال والحسابات .

٢٥٨٦٠ - مَحْلَبٌ *

Cerasus mahaleb, Prunus mahaleb (S). Mahaleb, Cerisier mahaleb, C. Ste Lucie (F). Perfumed cherry, Ste Lucie cherry (E). Lucienholz, Stein-Weichsel, Weichselkirsche (D). Cillego mahaleb, C. odoroso, Pruno odoroso, C. canino, C. S. Lucia, Legno di S. Lucia (I).
نوع من الكرز البري، فبرته كبيرة لثقة متضبة الباق تملو نحو ١٠ امتار . فرومها واغصانها متفرجة . اوراقها صفيرة النصل . انماها نورية التجميع . ثمارها حصى

الوانها مختلفة ، قرونها الاستعمارية غليظة ، مرزاتها مستطيلة || ريقاتها غاشية تركب الصنوبريات تقسردب، الشكير والحشب .

٢٥٨٦٨ - مِخْطَارُ أُسُودٍ *، مِخْطَارُ شَالِخِ

Sirex juvencus (S). Sirex noir, Sirex commun, Bouvillon (F). Polished horntail (E). Kiefernholzwespe (D).
مِخْطَارٌ كبير القد ، طوله نحو ٣٠ سم. لونه الى السواد الاعم . جبرامزه الى الحمرة . مرزه مخزني الشكل . يمتح مكنه داخل قشور الصنوبريات فوق الشكير يفتق من ريقات ترسوب الشكير والحشب بانفاق مستطيلة ومنجرجة .

٢٥٨٦٩ - مِخْطَارُ جَبَّارٍ *

Sirex gigas, Urocerus gigas (S). Sirex géant (F). Giant horntail (E). Riesenholzwespe (D).
نوع من المِخْطَارِ ، طوله نحو ٤٠ سم. رأسه وجوشره وصلقات بطنه الوسطى سود . سائر جسمه مع جبرامزه الى الصفار اناري . مرزه ينتهي بشفة حادة || ريقاته غاشية تركب جميع الصنوبريات تقسردب الاشخاب وتطسها .

٢٥٨٦٠ - مِخْطَارِيَّاتٌ *

Siricidae (S).
Siricidés (F). Siricidae, Horntails (E). Holz-wespen (D).
فصيلة حشرات من رتبة غشائيات الاجنحة . اجناسها وانواعها قليلة العدد . اعطائها البلاد المعتدلة الحرارة . جميعها اسطوانية الشكل، كبيرة القد ، طول اجسامها يراوح من ٢٠ الى ٤٠ سم. || ريقاتها غاشية مؤذية تميش حل الصنوبر والتنوب .

٢٥٨٦١ - مِخْفَافَةٌ ، لَلَاغَةُ

Arracheuse, Arrachoir (F). Grubbing plough (E).
آلة تستعمل لقع البطاطا والثوندر والجزر .

٢٥٨٦٢ - مِخْطَارٌ

Sablère (F).
Sand-pit, Gravel-pit (E).
هو المرطلة ، منجم يستخرج منه الرمل .

٢٥٨٦٣ - مَحْفُوظَاتٌ ، كَنْسِرَوَاتٌ

Conserves (F). Preserves (E).
الحق : الشجر المقارب بيته في الغرس .

٢٥٨٦٤ - مَحَقٌّ

Ferme (F). Farming, Farm (E).
الحقله في الزرعة . ج محقل . وفي الحديث « ما تضمنون محاقكم » .

٢٥٨٦٥ - مَحْفَلَةٌ

الحق : الشجر المقارب بيته في الغرس .
Ferme (F). Farming, Farm (E).
الحقله في الزرعة . ج محقل . وفي الحديث « ما تضمنون محاقكم » .

٢٥٨٦٦ - مِخْلَتٌ

Injecteur (F).
Seringue (F).
Syringe, Squir (E).
اداة تحقن بها السوائل في جسم الحيوان وفي جوفه .

٢٥٨٦٧ - مِخْلَنَةٌ *

٢٥٨٦٨ - مِخْلَكٌ ، مِشْبَعٌ

Raclette, Raclor (F). Scraper (E).
١

٢٥٨٦٩ - مِخْلَكَةٌ

Tribomètre (F).
Tribometer (E).
الحكاك جهاز يستعمل في قياس قوة الاحتكاك .



مِخْطَارُ أُسُودٍ



مِخْطَارُ جَبَّارٍ



مِخْلَتٌ



مِخْلَبٌ

Axle, Axillaire (F). **مِخْوَرِي** ٢٥٨٨٠

Axial, Axillary (E).

Herbe d'Inde (F). **مِخْوَر** ٢٥٨٨١
نبات بري طبي يعرف باسم اخيراكنس ، اطلبه .

Fascié (F). **مِخْوَرَف ، مُفَسَّطِل** ٢٥٨٨٢

Fasciated (E).

نمت تعريفي يطلق حل كل ما هو موزون بمصالب ،
وعلى النباتات المصاب بالشملة اي الاغراب .

Biennal, Bisannuel (F). **مِخْوَر** ٢٥٨٨٣

Biennial (E).

Transformateur (F). **مِخْوَر** ٢٥٨٨٤

Transformer (E).

جهاز يغير درجة توتر التيار الكهربائي .

Teneur (F). **مِخْوَرِي** ٢٥٨٨٥

Tenor, Percentage (E).

هو ما تموله كل مساهمة معينة من الناصر المطلوب او
الناصر المطلوبة ، ج . محوي .

Cercle (F). Circle (E). **مِخْط** ٢٥٨٨٦

هو الدائرة ، اطلبه .

Océan (F). Ocean, High sea (E). **مِخْط** ٢٥٨٨٧

البحر هو قسم شاسع المساحة من سطح ماء الكرة الارضية.
الخصائص المحددة أربعة : (١) المحيط الهادي الذي تبلغ
مساحته نحو ٨٨ مليون كيلومتر مربع اي ما يقارب
مساحة اليابسة بكاملها . (٢) المحيط الاطلسي الذي تبلغ
مساحته نحو ٥٣ مليون كيلومتر مربع . (٣) المحيط
الجنوبي ومساحته نحو ٤٨ مليون كيلومتر مربع .
(٤) المحيط الهندي ومساحته نحو ٢٧ مليون كيلومتر مربع .

٢٥٨٨٨ - **مِخْط الدائرة ، مِخْط دائرية**

Cercle de la circonférence, Périmètre, Périphérie,
Pourtour (F). Circle of circumference, Periphery,
Perimeter (E).

Pectes fourmis (F). **مِخِيل** ٢٥٨٨٩

Small anta (E).

المخيل : اصغر الدّر . قال الاخلط :

« ولو بات يسري الدّر فوق جلودها

لأثر في ابشاره » مخيلها »

Méliee à petites fleurs (F). **مِخِيلِيَّة** ٢٥٨٩٠

هي الخشخاش الصغير ، اطلبه .

Mosle (F). **مِخْ** ٢٥٨٩١

هو النخاع ومن المكاك ، اطلبه .

Tenants (F). Adjacent lands (E). **مِخَارَج** ٢٥٨٩٢

هي قطع الارض المجاورة للملك من جهة العرض .

Docks, **مِخَارَن عُمُومِيَّة** ٢٥٨٩٣

Magasins généraux (F). Docks, Ware house (E).

٢٥٨٩٤ - **مِخَاس الزُّعْرُور ، مِخَاس ثَمَاسِي**

الْمِخَاس

Cryptocéphalus **مِخَاس** ٢٥٨٩٥

octopunctatus (S). Cryptocéphale octoponctué (F).

Cryptocéphalus octopunctatus (E).

حشرة غاشقة من النضاريات مصفات الاجنحة . تألف

القد ، سواء اللين ، حريقة العلم . امتشاحها صلبة
معرفة طيبة الرائحة مرغوب فيها || والجلب يستعمل خاصة
كطعم لبعض انواع الكرز لانه نبات سروتي يعيش في
مظلّم الارضية || « نجارة مفرحة » مقوية للمواس
مطلقاً ، تمنع الخفقان والتهر وشيق النفس واللبم ، وتقي
للعدة وابواب الكبد والكلى والطحال والخصى وصر البول
شرباً . ويقلل به يتقلع الكلف والجرب . »

Escargotière (F). Snailry (E). **مِخْطَرَة** ٢٥٨٩٦

هي المكان المدة لتربية الحلزون .

Réducteur (F). Reducer (E). **مِخْطَل** ٢٥٨٩٧

Solution

مِخْطَلُون ٢٥٨٩٣

Bouillie (F). Wash (E). **مِخْطَلُون ، سَائِل** ٢٥٨٩٤

Vernaculaire (F). Vernacular (E). **مِخْطَلِي** ٢٥٨٩٥

ما هو خاص بالبلد كقولك الاسماء المحلية او اللغة المحلية .

Pèse-acide (F). **مِخْطَلِي** ٢٥٨٩٦

Acetometer (E). مقياس او ميزان الحموضة .

Edulcoré (F). Sweetened (E). **مِخْطَلِي** ٢٥٨٩٧

نمت تعريفي يطلق حل كل دواء ثاله العلم او مرّ أخيف
اليه بعض السكر تحسناً للمذاق .

Acidifiant (F). Acidifying (E). **مِخْطَلِي** ٢٥٨٩٨

نمت تعريفي يطلق حل كل مادة تقود الى التخمض .

Mammoth (F). **مِخْطَلُون** ٢٥٨٩٩

هو الصنابة ، اطلبه .

Scammonée d'Alep (F). **مِخْطَلُونَة** ٢٥٩٠٠

هي السقمونيا ، اطلبه .

Convulvaceae **مِخْطَلُونِيَّات** ٢٥٩٠١

فصيلة نباتية مشهورة باسم اليلابيات ، اطلبه .

Cumulo-nimbus **مِخْطَلُونِي** ٢٥٩٠٢

هو الركام ، لوح من البوم ، اطلبه .

Test **مِخْن ، مِخْن** ٢٥٩٠٣

مِخْطَلُونَة كثيرة الحيات . يقال ارض مخرطة .

Axe (F). Axis, Axon (E). **مِخْطَلُون** ٢٥٩٠٤

هو نقطة الارتكاز .

٢٥٩٠٦ - **مِخْطَلُون أَكْثِي ، مِخْطَلُون سِنِي**

Abecisse (F). Abcissa (E).

٢٥٩٠٧ - **مِخْطَلُون التهر**

اعمق خط في قامه . واذا كان الهر بين دولتين حد
محوره حدّاً بينهما .

Ordonnée (F). **مِخْطَلُون صَادِي** ٢٥٩٠٨

Ordinate (E).

Peupleraie (F). **مِخْطَلُونَة** ٢٥٩٠٩

Plantation of poplar trees (E).

مغرس الحور وكل مكان فيه حور .



مَخَاسِ الزُّعْرُورِ

٢٥٨٩٧ - مخاض السافي السقط

Cryptocéphale octoponctué (F).

هو مخاض الزعرور ، اطلبه .

٢٥٨٩٨ - مخاض distinguished

Cryptocéphale distingué (F).

هو مخاض المشب ، اطلبه .

Dentelure du limbe (F).

٢٥٨٩٩ - مخاض

Indenting of limb (E).

استان حافة نصل أورة .

Prise à partie (F).

٢٥٩٠٠ - مخاضة السافي

وسيلة طعن غير حادة مؤداها رفع دعوى على القاضي امام محكمة الاستئناف او التقاضي والارام يطالب فيها بتجويض عن ضرر وقع من عمل صدر منه يتصل بوظيفته ويمتلك عليه القانون .



مخاض المشب

Gué (F). Ford (E).

٢٥٩٠١ - مخاضة

كل مكان من النهر قليل العمق والماء يمكن اجتيازه على الاقدام .

Ecrémeuse (F).

٢٥٩٠٢ - مخاضة * قروزة

Separator (E).

آلة تصعمل للرز الكتانة من الحليب .

٢٥٩٠٣ - مخاضة

بيع الثار ويخر ليد صلاحها .

Sébastien (F).

٢٥٩٠٤ - مخاضة

هي شجرة السبستان وتسمى اهلها الكلية .

Mucilagineux (F).

٢٥٩٠٥ - مخاطي ، ثعالي

Mucilaginous (E).

الاجسام الغاطية اجسام لزجة مركبة من الكربون والاكسجين والليدروجين توجد في عدة نباتات .

Myxinième (S).

٢٥٩٠٦ - مخاطيات

Myxinième (F). Myxinième (E).

فضيلة السمك الغاطي من قسم المصاصات .

Quittance (F). Racapt (E).

٢٥٩٠٧ - مخاضة

هي الاراء .

Contravention

٢٥٩٠٨ - مخاضة

العمل الذي يقوم به المرء علاناً لاسكان القانون او النظام .

Braconnage (F).

٢٥٩٠٩ - مخاضة الصيد

Poaching (E).

علم التقيد بالنظمه الصيد المرعية الاجراء .

Tube à essai (F).

٢٥٩١٠ - مخبر

Tube of trial, Pipe of essay (E).

Laboratoire (F).

٢٥٩١١ - مخبر

هو المختبر ، اطلبه .

Fournil (F). Bake house (E).

٢٥٩١٢ - مخبز

بناء الفرن وادوات الخبازة .

Boulangerie (F).

٢٥٩١٣ - مخبزة ، مخبازة

Baking (E).

صناعة الخبز ومكانها .



مخاض السرين



مخاضة



مخبر

البراري والاحراج للبعثة الاشجار . مختلفها ويرقاتها تعيش على اوراق الزعرور والبوق والنباتات النفضية || جسمها صغير القد يطول من ٥ الى ٦ م . ثوبها متراكب الاوان ، كوسلها الى السرة السوداء طولها تزايدت حاجية . ظهراتها الى الحمرة البرتقالية يعلوها تنقيط اسود ثنائي العدد . بطنها وبرازها سود || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في ايار وتبقى حتى تموز . تسرح في التار . تسلف بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع وتفتح المكان مباحداً على الصفحات السفلى من نصال الارواق || والبرقة عند ادراكها الكمال الجسدي تطول نحو ١٠ م . جسمها اسطواني الشكل ، دقيق الجسم ، سداسي الرؤوب ، حطلي اللون ، اصفر الموج ، اصبح الرأس والرؤوب .

٢٥٨٩٥ - مخاض المشب * ، مخاضة

Cryptocéphale primarius (S). Cryptocéphale

distingué (F). Cryptocéphale primarius (E).

حشرة خاضعة من التضراريات مفدمات الاجنحة . تألف البراري والااضي للمساء . مختلفها ويرقاتها تعيش على النباتات الشبية || جسمها صغير القد يطول من ٥ الى ٦ م . ثوبها متراكب الاوان . رأسها وكوسلها وطبها وبرازها الى السوداء الاخضر الموج . ظهراتها الى الحمرة الابرجوانية يعلوها عشر نقط سود . رأسها صغير الجسم . عينها صغرتان . زباناها حيطيان . ظهراتها مستدبل الاحدياب مقطوع الطرف للاتص . غذاءها متناهية التحيز الخفيف || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في ايار وتبقى حتى ايلول . تسرح في التار . تسلف بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع وتفتح المكان على الصفحات السفلى من نصال المعص والاوراق || والبرقة عند بلوغها الادراك تمام تطول نحو ١٠ م . جسمها اسطواني الشكل سداسي الرؤوب ، اخبر اللون ، اصفر الموج ، اسود الرأس ، يعلو من جانبيه خط من التقط السر المتينة يزوج من الحلب القصير || طور الاكمال ينقضي في التربة ضمن حبيرة جرابية الشكل .

٢٥٨٩٦ - مخاض البيرين *

Cryptocéphale Marise (S).

Cryptocéphale de Marie, C. des églantiers (F).

Cryptocéphale Marise (E).

حشرة واحة خاضعة من التضراريات مفدمات الاجنحة . تألف البراري والاحراج . مختلفها تعيش على اثمار السرين والعصر والابل والدراهم ... يرقاتها تعيش على الارواق فتقتط الخشب بين الشقوق ثم تلم النصل وتعيش في داخله || جسمها صغير القد يطول من ٣ الى ٤ م . ثوبها الى الشقة الصفراء البرتقالية الموج . كوسلها ثلاثي الزاويق السود . ظهراتها يعلو بالاسود || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اواسط ايار وتبقى حتى اواسط آب . تسرح في التار . تسلف بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع وتفتح المكان على الصفحات السفلى من نصال الارواق || والبرقة عند ادراكها الكمال الجسدي تطول نحو ٧ م . جسمها شبه اسطواني الشكل ، ثني اللون ، اصبر الرأس والرؤوب تملو ثلاثة خطوط لاذية حمراء اللون || طور الاكمال الذي يعيش نحو اربعة اسابيع ينقضي في التربة ضمن جراب من المواد النباتية المنجونة بالبراز والرياح .

Reyonneur (F). مِخْبَطْ * - مِخْبَذْ *
Drill (E).

جهاز ثنائي أو ثلاثي أو خماسي الإنسان يستعمل في تخديده التربة خطوطاً مستقيمة متساوية الأبعاد البينية .

Cansiculé (F). مِخْبَذْ
Channelled, Furrowed (E).

نمت وصفي يطلق على بعض أعضاء الحشرات كالكلوالس والأعقاد الميزانية التخديده .

Narcotique (F). مِخْبَذْ * - مِخْبَذْ *
Narcotic (E).

كل نبات يحوي اشياء قلبية مخدرة كالتيغ والحشاش وما اشبه .

Dominant (F). مِخْبَذْ * - مِخْبَذْ *
Dominating, Ruling (E).

هو الطغاة الذي ينتفع من الارتفاق .

Employeur (F). Employeur (E). مِخْبَذْ *
الخدم أو المستخدمم هورب العمل الذي يستعين على عمله بالذين يستخدمهم .

Haichoir (F). Chopping-board, Chopping-knife, Chaff-cutter (E). مِخْبَذْ *
آلة لا قياسية الشكل والحجم تستعمل في أغراض مختلفة اخصها تقطيع اللحم وفرم ورق التبغ وفرم الجذور الخ .

Stylé, Styleire (F). Stylar (E). مِخْرَزِي *
شكل من زيات الحشرات ونصال الأوراق يشبه المخرز .

Cueille-fruits (F). مِخْرَفْ *
Gathering-fruits (E). أداة تستعمل لقطف الثمار .

Cône (F). Cone (E). مِخْرُوطْ
Conique (F). Conical (E). مِخْرُوطِي

Conoïde, Cunéiforme (F). Conoid, Cuneiform (E). مِخْرُوطِي الشَّكْل
نمت تعريفي توصف به الاشياء المخروطية الشكل .

Confères (F). مِخْرُوطِيَاتْ
Confère (E). فصيلة نباتية مشهورة باسم صنوبريات .

Conirostres (F). مِخْرُوطِيَاتْ المَسَالِير
Conirostres (F). رتيبة من الطيور الجوارثم تشمل عدة فصائل ، اشهرها الششوريات والقيريات والقرقيقيات .

Conicisé (F). Conicalness (E). مِخْرُوطِيَّة
Clapier (F). Hutch (E). مِخْرَزْ

مكان تربية الأرانب ان يقفص او رديبة .

Official مِخْرَنِي
نمت تعريفي يطلق على كل نبات يستعمل في تركيب الادوية .

Fosse à fumier (F). مِخْرَنِيَّة
Midden-pit (E). مِخْرَنِيَّة

سفرة تصطنع لجمع الزبل على اختلاف مصادره .

Malaxeur (F). مِخْبَطْ * - مِخْبَطْ *
Kneader (E).

Laboratoire (F). Laboratory (E). مِخْبَطْ
مكان التحريات والفحوصات والتحليل المختلفة .

Mixtiligne (F). مِخْبَطْ الخطوط
Mixtilineal, Mixtilinear (E).

كل رسم يختلف الخطوط بين المستقيمة والمستديرة .

Hétéromères (F). مِخْبَطَاتِ الأجزاء
Heteromera (E).

رتيبة حشرات من مبدئات الاجنحة .

Hétérocardes (F). مِخْبَطَاتِ الأذنين
Heterocarda (E).

رتيبة حيوانات من الرخويات الحدية الأماميات الخياثيم .

Hétéropodes (F). Heteropoda (E). مِخْبَطَاتِ الأرجل
رتيبة حيوانات بحرية من الرخويات مبدئات الأرجل .

فصلاتها واجناسها وأنواعها عديدة جميعها شقية ، صمجة ، مفترسة . ملجئها الحياتي جماعي . تعيش في عرض البحر ولا تقرب الشطوط . اصطناعها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . تسبح وتقوم على ظهورها ، بطرتها موجهة نحو سطح الماء || اجسامها حلالية . رؤوسها تنتهي بأخطام متعاقبة الطول . ارساها زعنفية الشكل تناسب الحياة البلية || اشهر فصائلها الانقليصيات والريانات .

Hétérocères (F). مِخْبَطَاتِ القرون
Heterocera (E).

رتيبة حشرات من حرشيات الاجنحة تشمل عدة فصائل . اشهرها القزليات والناريات والنسقيات والحليلات والارقيات والقتليات والقاتلات الخ... تتميز بالوانها المتراكمة المادمة الزعاد ويقرونها الاستعمارية اللاقائية . خادمتها مجلبة بشرفة .

Hétérotriches (F). مِخْبَطَاتِ الهدب
Heterotrishes (E).

رتيبة حيوانات دنيا من الهديات او التقيقيات الهدبية .

Hétéroptères (F). مِخْبَطَاتِ الأجنحة
Heteroptera (E).


رتيبة حشرات من طبقة نصفيات الجناح . فصلاتها واجناسها وأنواعها كثيرة العدد جميعها تدريجية التطور . منظمها متوسط القدد او صغير . منها الجنحة والمادمة الجناح . قرونها الاستعمارية قصيرة . اخطامها ثاقبة ماصة تمكها من ثقب الانسجة النباتية واختصاص النسج . من ميزات بعض فصائلها ما تنقله ، عند الدفاع عن النفس ، من سوائل كركبة الرائحة مخزنها في خلد خاصة || اشهر فصائلها : القمصيات والبيقات والبلاريات والفاسياليات .

Hétérocarpe (F). مِخْبَطَاتِ الثمار
Heterocarpous (E).

نمت تعريفي يطلق على الاشجار اللاقائية الثمار .

Fosse à fumier (F). مِخْبَطَاتِ مِخْبَطَاتِ
Midden-pit (E).

سفرة تصطنع لجمع الزبل على اختلاف مصادره .



مِخْبَطْ



مِخْرَزِي



مِخْرَفْ

وفي حرم السباد الممد لتكاثر الفطور المأكولة كالناراريقون المرئي وغيره || مظهره الخارجي كتل نغيفة الشكل يضاف اللون او صفراء تركيب طبقة البصرة السطحية حيث تتشب خيوطها المشابكة التي تحول دين لشرة الناراريقون وغيره || يكاتف باجتناب الاسمدة التي يبلوها البغن والاسمدة المضوية الكثيرة المواد المنحلة التي قمل فيها التخدير.



مخصل

Rayonneur (F). Drill (E). آلة تستعمل لتخفيف صفوف الفرس ، راجع مخداد .

Mégamètre (F). Megameter (E). جهاز آل يستعمل في تحديد خطوط الطول وهو شائع الاستعمال في الملاحة وفي الرصد .

Lobipes (S). Lobipède (F). * مخطاف * طائر وحيد الجنس والنوع من عائلة الطماليات واصله دجاجيات الارض . طوله نحو ٢٥ سم . ثوبه اسمر الظاهر يملوه تنسيق ورقيق . بطنه وصدره واثنيك يبيض . رأسه اسود القمة ابيض الحمار . عيناه مكشطان بالاصفر . منقاره مقطوع الطرف . ارساه قصيرة وقوية . اصابه مفصصة الحطاب || يرتاد البحار والبحيرات يسبح ويومر كطيور كفتيات القدم . قوته الحشرات والشرافيف والقشريات والرخويات والاسماك الصغيرة || الاثني تدثر في البر ، قرب الماء ، بين الاشجار . تبيض نحو ٤ بيضات تحضنها بتناوبة الذكر من ١٧ الى ١٩ يوماً .



غصير لوتيا

Graphique (F). Graphic (E). مخطط . هو الخط البياني .

Zébré (F). Striped like the zebra (E). مخطط ، زردية نعت تعريفي توصف به الاثواب الحيوانية المجلدة بمخطوط متعززة كما في سمار الزرد .

Mandibule (F). Mandible, jaw (E). مخنطم . هو الفك أي فك منقار الطائر وخلاصته ج خالط .

Rhynchocéphales (F). مخنطوات الرؤوس . رية من الزحافات يعود ظهورها الى الاباح الثاني وقد انقرضت ولم يبق منها سوى النوع المعروف بالمخربيه الذي يعتبر اقدم الزحافات المعاصرة لانه مثلك المسب الاول .

Psychromètre (F). Psychrometer (E). مخنكل * أداة تقاس بها رطوبة الهواء وذلك لمعرفة مقدار بخار الماء الموجود في الجو .

Levier (F). Lever (E). مخنل . هو الرافعة والمثلة ، اعطجا .

Musseta (F). Nose bag (E). مخنلا . كيس صغير يوضع فيه المثلث ويعلق برأس الدابة .

Acétomètre (F). Acatometer (E). مخنلال . الحلال جهاز يستعمل في قياس حوضة الخل . ويسمى ايضاً قياس التحليل .

Griffe, Serre (F). Claw, Talon (E). مخنلب . ظفر سباع طيور كالبرن من سباع الرشح .

Xylomètre (F). Xylometer (E). مخشاب *

المخشاب جهاز يستعمل في تعيين حجم قطعة من خشب غير مستقيمة . وذلك بقياس كمية الماء التي ترسلها تلك القطعة .

Glacière (F). مخشفت . راجع مثجلة .

Tamis (F). Sieve, Sifter (E). مخشبكة . أداة تستعمل لفرز الحبوب والثمار والاجرام المختلفة بالنسبة الى الحجم .

Ligneux (F). Ligneous, Woody (E). مخشوشب ، ليثي * يكون النبات خشبياً عندما تجمد اليافه فتكثر فيها المادة الخشبية الصلبة القاسية ، ومكسه النبات المشي . وما بين الخشبتين يسمى اثناب المخشوب أي الليثي .

Éliminé (F). Eliminate (E). مخشول * كل حين من الحيوان او النبات صار ابعاده لنقص في صفاته المطلوبة او المرغوب فيها .

Fertile (F). Fat, Rich (E). مخشاب . هي التربة الجيدة الآتية بالمادة الجلب .

Réconduteur (F). مخشيب ، مزيكم . الغضب والمزكم من الحيوانين كان يحل طاعة الاغصاب .

Barattage (F). Churning (E). مخشفس . فرز الكتاة يمد مزها لاجناب واندهام الكريات الزبدية وانفصالها عن الخشفس .

Gazonnant (F). Grassy, Turfy (E). مخشفسر ، مخشوفير . ارض كثيفة المشب الاخضر العمر . راجع خضير ونخضور .

Gazon (F). Grass, Turf, Sward (E). مخشفسرة . ارض كثيفة المشب الاخضر العمر . راجع خضير ونخضور .

Psychromètre (F). Psychrometer (E). مخشفسل *

أداة تقاس بها رطوبة الهواء وذلك لمعرفة مقدار بخار الماء الموجود في الجو .

Eburné (F). Dentine (E). مخشفسون * المحنسون للذهب بالاج .

Mycelophthora (S). مخشفسير *

جنس فطور مجهرية من فصيلة الفولجيات . يتميز بكتانه القيصرة الشعب ، الصغيرة اللد ، البشبية الشكل ، اللاكيسية التجميع اذ انها تحوي الفردية والفصية || انواعه قليلة ، امريها خضير لوتيا .

Mycelophthora lutea (S). Vers-de-gris du champignon de couche (F). مخشفسير لوتيا * ، مخشفسير اصفر * نوع من الخفسير وهو فطر مجهرى يعيش على المواد المضوية



مخطاف

أزهارها نورية التجميع . ثمارها تطفئ لونها إلى الحمرة البرتقالية .

٢٥٩٧٦ - **مُحْتَلَبَة**
Linale commune (F).
عشبة مشهورة باسم ليناريه عادية ، أطباها .

٢٥٩٧٧ - **مُخَلَّقِي**
Créature (F). Creature (E).
كل كائن حي يدمى خلقياً . وأخلوقات الحية تقسم إلى ملكيتين مملكة الحيوان وملكة النبات || مملكة النبات تقسم إلى نحو ٢٥٠ مليون نوعاً تنتمي إلى مئات الفصائل والرتب والصنوف || أما الملكة التفرعية فختلف أنواع الحيوان المعروفة فهو نحو مليون ونمائية عشر ألفاً كما هو مبين في الجدول التالي .

العدد التقريبي لخطف أنواع الحيوان المعروفة
Nombre approximatif d'espèces animales connues

صف	صنيف	عدد الأنواع	Sub-Classes	Classes
فلازيات	٩٠٠٠٠	Verstébré		
مفصليات	شحرات	٧٥٠٠٠	Arachnides	Anthrôpodes
	مفصليات	٣٠٠٠٠	Crustacées	
	فلازيات	٢٥٠٠٠	Myriapodes	
	دعادات	٨٠٠٠		
رغويات	١٠٠٠٠٠	Mollusques		
حلقيات	٨٠٠٠	Annelides		
حويلات عظمية	٤٠٠٠	Bryozoaires		
شوكيات	٥٧٠٠	Echinodermes		
سلكات	١٠٠٠٠	Némertes (vers ronds)		
فريسات	١٤٥٠٠	Vers plats		
ميجرات	١٠٠٠٠	Cnidaires		
إسطنجات	٤٣٠٠	Spongiaires		
أوكبات	٣٠٠٠٠	Protozoaires		
دورات	١٥٠٠	Racifères		
خطف	٢٠٠٠	Divers		
	١٠٨٠٠٠			

٢٥٩٧٨ - **مِيْطَسْكَر** (F). Zymosimètre, Zymoscope (F).
Zymosimeter (E).

المُحَار جهاز تقاس بواسطته درجة اختار السوائل .

٢٥٩٧٩ - **مُحْتَسَس**، **مُحْتَسَس** الزُّوْأَيَا، **مُحْتَسَس** الأضلاع
Pentagone (F). Pentagone (E).
من الاشكال الهندسية وغيرها ما هو مركب من خمس زوايا أو خمس اضلاع .

٢٥٩٨٠ - **مُحْتَسَسِي**
Pentagonal
ما كان شكله شكل الخمس .

٢٥٩٨١ - **مُحْتَسَلَة**
Tagetes (S). Tagète (F).
Margold (E). Samblume, Studentenblume (D).
Tagete, Puzzoloni (I).
جنس نباتات من الشرويات وفصيلة المركبات . ألوانها عديدة معظمها بري . أوارها لا تقياسية الشكل والارتكاز . أزهارها صفراء اللون أو برتقالية . بتلاتها حلقة اللبس يفرح منها عند اللبس رائحة مسهجة || أشهر ألوانها البرتقالية ما غلي .

٢٥٩٨٢ - **مُحْتَسَلَة جَنِيلَة**، **قَرْتَقُفَل** الهند
Tagetes patulus (S). Tagète confue, Cillet d'Inde, Veloutine, Passo-velours (F).
نوع من الحمضية البرتقالية المشهورة . غروها عذبة

٢٥٩٧٧ - **مُحْتَلَب**
Griffe (Hort.) (F). Root (E).
كلمة تطلق على جلور وقصور وبيداير يفسد النباتات لقرب شيها بالخشب .

٢٥٩٧٨ - **مُحْتَلَب التَّخِين**
Pterospora (S).
Pterospora (F). Dragon-root (E). Drachenroot-baur (D). Pterospora (I).
عشبة طفولية معمرة في فصيلة الخنجيات . أصلها البلاد الباردة . تتميز بأزهارها المتعدية التجميع الطريقة الشكل .

٢٥٩٧٩ - **مُحْتَلَب القَلْبَاب**
Astragale (F).
هو الاسطراغالوس، من نباتات الفصيلة القرنية ، أطباها .

٢٥٩٧٠ - **مُحْتَلَبَات**
Crassulaceae (S).
Crassulacées (F).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة القامات . اجناسها وألوانها زهاء ٢٠٠ معظمها نبات عشبي وبعضها جني . أوارها متتابة لحية صنية . أزهارها ، في الغالب ، عشوية وهي ابلية أو هامة الارتكاز ، حيلة الشكل ، زاحية الألوان . نباتها وفيرة تعيش في جميع الاربة وقد تغفل القليلة الحبس .

٢٥٩٧١ - **مُحْتَلَبَة * دَم العَاشِي**، **زَرَّ حَبِيْ**
Gomphrena (S). Gomphréne, Amarantoide (F).
Globe amarant (E). Gemelner Kugelamarant (D).
Amaranto, Amarantoide (I).
جنس نباتات عشبية مزينة من فصيلة القطيفيات . ألوانها للمرة نحو ٨٠ معظمها بري وبعضها ترسي . أوارها لاطة متعاقبة . أزهارها نورية التجميع ، ابلية الارتكاز أو طرية . أشهر ألوانها الزرنية ما غلي .

٢٥٩٧٢ - **مُحْتَلَبَة بَرْتَقَالِيَة**
Gomphrena haageana, G. aurantiaca (S). Gomphréne orange, Amarantoide de Haage (F).
عشبة حولية جادسة فرها تملو نحو ٤٠ سم . أوارها بيضية النصل . أزهارها برتقالية اللون ، نورها ثلاثية الاثمار الكبيرة القد || أزهارها يستمر طول الصيف .

٢٥٩٧٣ - **مُحْتَلَبَة كَرَوِيَة**
Gomphrena globosa (S). Gomphréne globe, Amarantoide globe, Amarantine, Immortelle violette (F).
وقس (عاشق ويمشوق) عشبة حولية فرها مشونة تملو من ٢٠ إلى ٣٠ سم . أوارها سنانية النصل . أزهارها بنفسية اللون ، نورها ثلاثية الاثمار || أزهارها يستمر طول الصيف .

٢٥٩٧٤ - **مُحْتَلَبَة لَطِيْفَة**
Gomphrena pulchella (S). Gomphréne gracileuse, Amarantoide gracieuse (F).
عشبة حولية مبروية فرها تملو نحو ٥٠ سم . أوارها سنانية صنية تقطول نحو ٥ سم . أزهارها ودية اللون ، نورها ثلاثية أو خلسية الاثمار ، قظرها رايوح من ٢ إلى ٣ سم . || أزهارها يستمر من الصيف إلى آخره .

٢٥٩٧٥ - **مُحْتَلِس**
Sorbus aria (S). Alouchier (F). Chequer tree, Maple service, Wild service tree (E). Wilder Elsebeerbaum (D). Bacarello, Mangiolo (I).
نوع من الصريرة وهي شجرة برية فرها برمية الشكل تملو من ٣ إلى ١٥ م . أوارها معتقة ، متعاقبة ، صابله . نصلها يطول من ٦ إلى ١٤ م . ويعرض من ٤ إلى ٩ سم .



عذلة



عخلص



عُجَار



عُضْلِيَة

٢٥٩٩٥ - **مُخَمِّلَةٌ** Culture de concombre (F).
زراعة الخيار وموضع هذه الزراعة .

٢٥٩٩٦ - **مُخَمِّلٌ** Babeurre, Lait écorché (F).
Whey, Buttermilk (E).
الحليب الباقى بعد فرز شدة ، ويؤخذ أيضاً بالمخفوف .

٢٥٩٩٧ - **مُخَمِّلُ الْمَاءِ** Cayx
جنس طير من القريبات. أنزاع ثمانية مطبها البلاد الاسيوية.
تستعمل بتقارها الكبيرة للعد الطليقة القاعدة الحمراء اللون .
اجتنبها طويلة . أذناها وراسها قصيرة . قوتها الى
الصعبة البرتقالية . رؤوسها واجتنبها سود ثلثها ثمة
بيضاء || تألف الشطوط البحرية ويجاري الماء . قوتها
الاسماك والقدريات والحشرات حل اختلاف فصائلها .
انثا تلد في صدف الصغور تبقي من ٧ الى ٩ بيضات
تحضنها نحو الاسيويين .

٢٥٩٩٨ - **مُخَمِّلَةٌ** Sébeste (F). Sebeaton (E).
ثمرة الخاطة اي اللدق . كانت ولا تزال تستعمل في الطب
لتنين الصدر . كما تستعمل في صناعة ديق الطير .

٢٥٩٩٩ - **مُخَمِّلَات** Cordiaceae (S).
Cordiacae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين . اجناسها وانواعها كثيرة
العدد ، اصطناعها البلاد الحارة والاستوائية . اشهر اجناسها
الحاطة المعروفة بالبستان .

٢٦٠٠٠ - **مُخَمِّلَةٌ** Nimbus
هي السحابة ، نوع من الغيوم ، اطلها .

٢٦٠٠١ - **مَدَّ**
المد ، مكيال لا يقيس الحجم يختلف من بلاد الى بلاد
ومن منطقة الى منطقة في ذات البلاد . ج امداد ومدة
ومداد .

٢٦٠٠٢ - **مَدَّاعِيل** Aboutissants (F).
Bordering upon (E).
هي قطع الارض المجاورة للحد من جهة الطول .

٢٦٠٠٣ - **مَدَّاد** Piagiotrops (F).
نمت وصفي يطلق على كل نبات نوعه يجود اقلية
الانتساب .

٢٦٠٠٤ - **مَدَّاد** Hemidactylus turcicus (S).
Hemidactylus verruculeux, Margouillat (F).
حيوان يبيس من النطاء وفصيلة الزفقيات . جسمه صبر
القد يطول نحو ١٠ سم . رأسه يضيء القرون . عيانه
ماحتان . اجفانه شفافة ثابتة . اذناه رافعتا الدماء
الصواني المكفوف . لسانه تفلق الطرف . ظهره مشط .
بلته كثير الحراشيف الصقة . ذنبه سريع الانقسام .
قوائمه صلبة . اصابعه نصفية الخطاط مجزئة بلواقط
عززة تمكنها من السير على السقف || قويه الى الصعبة
الخطية المرفوعة بالانمن والاغير ، لكنه يفتن الخيط
المويبد فيه || يألف الموائع الكثيرة الحليمة والساكن
الارضية . يسرح في التبار وفي الليل . قوته اللدباب والميوس
والنساك والديدان || يعتبر من الزسافات النافعة .

٢٦٠٠٥ - **مَدَّاد** Trapan (F). Running (E).
نمت تمرني يطلق على الجلود الاقلية الانتساب وعلى
الوق التي تفتش البرية .

فوارقها لك النبات ولون الانزاع . جميعها حولية تملو من
٢٠ الى ١٢٠ سم . اوراقها لا قياسية الارتكاز ، خلية
التصل . انزاعها طليقة التجميع ، تاجية . لونها الى الصفرة
المشاعة التوشيح والمواج || تنورها يستمر من تموز
الى ايلول .

٢٥٩٨٣ - **مُخَمِّلِيَّةٌ لَامِيَّة** Tagetes lucidus (S).
Tagète luisante (F).
حشبة سريرية معمرة ، طرغونية الرائحة والطعم ، تملو من
٣٠ الى ٥٠ سم . اوراقها كاملة متعاقبة . فصلها ساني
الشكل ، مسن الحافة ، لامع الصلصة الشديدة الخسار .
ازهارها احادق متعاقبة كالمقود . ازهارها لينة نارية
اللون || تنورها يستمر من آب الى تشرين الثاني .

٢٥٩٨٤ - **مُخَمِّلِيَّةٌ مَرْقَلَةٌ** Tagetes signatus (S). Tagète mouchée (F).
حشبة سريرية معمرة تملو من ٦٠ الى ٧٠ سم . اوراقها
متعاقبة طرفية وسننة . ازهارها حلقي التجميع . ازهارها
ذهبية اللون مرقلة بالجلوي || تنورها يستمر من تموز
الى تشرين .

٢٥٩٨٥ - **مُخَمِّلِيَّةٌ مُتَشَبِّهَةٌ ، وَرْدَةُ الهِنْد** Tagetes erectus (S). Tagète dressée, Rose d'Inde (F).
حشبة سريرية حولية تملو من ٨٠ الى ١٠٠ سم . اوراقها
لا قياسية الارتكاز ، كثيرة التشرع القدسي المسن . ازهارها
طليقة التجميع ، كبيرة القد ، لونها الى الصفار الكبريتي
اللامع || تنورها يستمر من تموز الى تشرين الثاني .

٢٥٩٨٦ - **مَخَن** مخن مخن من العود : قشره .

٢٥٩٨٧ - **مِخْنَات** Androgyne (F).
Androgynous (E).
نمت تمرني يوسف به كل نبات يجبل الانزاع الذكرية
والانثوية معاً كالجزء مثلاً .

٢٥٩٨٨ - **مَخْفِق** Etouffoir (F). Extinguisher (E).

٢٥٩٨٩ - **مَخْمِيَّات** Hyalostilbacées (F).
Hyalostilbacaceae (E).
عمارة فلور مجهرية من فصيلة الكميبيات . تتميز باصناعتها
المزائية للشفافة . اجناسها وانواعها عديدة اما المؤذي منها
قليل . اشهر اجناسها المؤذية الازارية والكحية .

٢٥٩٩٠ - **مَخْمِيٌّ ، مَخْمِيَّيْنِي** Sensorial (F).
Sensorial (E).
نمت تمرني يطلق على كل ما هو منسوب الى الخفيج .

٢٥٩٩١ - **مِخْيَاف** Hétérogame (F).
Heterogamous (E).
نمت تمرني يطلق على النباتات المزواجية التي تحمل زهوراً
ذكوراً واناثاً في تزهير واحد . راجع ميزن .

٢٥٩٩٢ - **مَخْيَاف** Epidiascope

٢٥٩٩٣ - **مَخْمِيَّع** Sensorium (F). Sensorium (E).
الخفيج مركز الحواس في الدماغ اي اذه المركز الذي يتلقى
الاحساس وينظمه .

٢٥٩٩٤ - **مَخْمِيْر ، مَدْيَق ، مَهْر** Lait mouillé (F). Milk and water (E).
هو الحليب الميرب بالماء .



خيط الماء



مَدَّاد

٢٦٠١٧ - مَدَّاهِين صُفْصَالِي الْوَرْقِ *

Helianthemum salicifolium (S). Hélianthème à feuilles de saule (F). Willow leaved rock-rose (E). Sonnenröschen, Citrörschen (D). Elantemo (I).
 مجلة صبروتية تملو من ١٠٠ الى ١٢٠ سم. فروعها منفرجة مسترسلة. اوراقها مستطيفة الشكل. ازهارها حثولية التجميع، محورية الاذنكاز، ولها الى الصفار اللهبى الالامع تملو رشفة ارجوانية || ازهارها يستمر من ايار الى آب.

٢٦٠١٨ - مَدَّوَاكَة (F). Trestment (E).
 هي المالجة ، اطبا .

٢٦٠١٩ - مَدَّسَب ، مَوْتَسَب (F).
Acuminata (E).
 لمت تعريفى توصف به اعضاء النبات والحشرات التي تنسب لى شكل الحمة وبنتها .

٢٦٠٢٠ - مَدَّيْعَة ، مَدَّيْعَة (F).
Tannerie (F).
Tannery (E).

٢٦٠٢١ - مَدَّيَة (F).
Délai (F). Delay, Time (E).

٢٦٠٢٢ - مَدَّكَرَات (F).
Entélégyes (F).
Entelegyna (E).

فئة من المناكب تتميز بيمينها المركبة من ثمان زلأم وبالنسوات الشَّوَارِيَّة المفرطة عند الذكور والاناثا .

٢٦٠٢٣ - مَدَّج * ، مَشَّق * (F).
Notacanth (F).
 جنس اسماك بحرية من فصيلة المَدَّجيات. انواعه المعروفة قليلة منتشرة في جميع بحار العالم . اجسامها مستطيلة الشكل مدنية، تطلو من ٣٠ الى ٤٥ سم. رؤوسها مقبوضة، انخفاها منقبضة صغيرة . عينها مستديرة بارزة . زعانفها الظهرية مؤلفة من ٦ اشواك حادة . اذواها الى السمة الرصاصية يملوها مزاج اسفع . لحويها ماكولة متوسطة الصنف .

٢٦٠٢٤ - مَدَّج مَدَّوْل * ، مَشَّق مَدَّوْل (F).
Notacanthus vulgaris (S). *Notacanthus commun* (F).
Common Notacanthus (E).

سمكة بحرية يبروس من فصيلة المَدَّجيات ورتبة شالكاكات الزواحف . اصلها منظم بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة ونها البحر الابيض المتوسط . تتميز من اسماك النفاث المتوسطة الغور الى جسمها سطوي الشكل ، مستطيل الذنب ، متعدل التتبطط ، يطول نحو ٤٠ سم. ثورها الى الحسلطة الرصاصية السفاه المزاج . ظهرها شاذية السمة . بطها باحت انخفاط . رأسها شارف الجبهة . منقبض انظم ، صغير الفم ، قصير الشفق العريض . اسنابها صغيرة ، ذرية . عينها صغيرتان ، بارزتان . حدة عينها سبوا لامة . زعنفتها الظهرية كثانة من ستة مناسخ متتامة منطقة ، شاذكة . الصدرية تساعية الشع السرة . الخوضية بطنية الاذنكاز ، سباعية الشع . الفرعية مستطيلة ، غيضة ، تمتد حتى طرف الذيل ويتقدمها تسعة مناسخ حادة الاطراف . ذيلها عادم الزعفة ، دقيق الطرف || لحويها متوسط الصنف ، مأكول .

٢٦٠٢٥ - مَدَّجَجَة (F).
Poulailler (F).
Hen-house, *Hen-roost* (E).
 هي ذرية الدجاج المشيدة وفقاً لقواعد الفن والمغتصبات الصحية .

٢٦٠٠٦ - مَدَّكَدَة (F).
Vermière (F).
 حفرة يرقي فيها البود الذي يحمل طاماً السك .

٢٦٠٠٧ - مَدَّكَر ، فُلَّك (F).
Orbite (F). *Orbit* (E).
 طريق الكوكب السيار .

٢٦٠٠٨ - مَدَّكَوَكَة ، وَكَبَة (F).
Orbitale (F). *Orbital* (E).
 المدارة خط سير اجرم المتحرك .

٢٦٠٠٩ - مَدَّكَوَي ، فُلَّكَي ، وَكَي (F).
Orbital (F).
 لمت تعريفى يطلق على كل ما له صلة بخط سير الاجرام المتحركة .

٢٦٠١٠ - مَدَّاقَة (F).
 كل سمكة تعيش بين الصخور لا تبعد عنها ثدى مَدَّاقَة .

٢٦٠١١ - مَدَّام (F).
Vin
 هو الخمر والنيذ واين الحامه واين اللذ .

٢٦٠١٢ - مَدَّامَكَة (F).
Oenologie (F). *Oenology* (E).
 هي علم الخمر ، علم يبحث في صنع الخمر وسفلها .

٢٦٠١٣ - مَدَّان (F).
Eau salée, *Eau de mer* (F).
Sea-water (E).
 الماء الملح ، ماء البحر .

٢٦٠١٤ - مَدَّان * (F).
Plectranthus (S).
Plectranthus, *Germaine* (F). *Plectranthus*, *Chinese basil* (E). *Mahnensporn* (D). *Plectrantho* (I).
 جنس نباتات جنتية ممرمة عطرية من فصيلة الشفويات. انواعه زهاء ٤٠ معظمها بري وبعضها زرعى . سوقها فروعها تملو من ٦٠ الى ١٥٠ سم. فروعها غيضة الانفرج زباه اللها . اوراقها كاملة متعابلة مستطيفة . نصلها قلبي الشكل ، منن الحافة ، خلى البشرة حسل صفحتيه . ازهارها صغيرة القد زرقاء اللون حثولية التجميع فواحة العرف المستعب الذي ينفر منه العث .

٢٦٠١٥ - مَدَّاهِين ، زَهْرَة الشَّمْس (F).
Helianthemum (S). *Hélianthème* (F).
 جنس نباتات مجلية ممرمة من فصيلة الالذنيات . انواعه عديدة، معظمها بري منبت الجبال والخصاب وبعضها زرعى . يزرع بين الصفور . سوق فروعها . فروعه مستطيلة . اوراقها لا قياسية الاذنكاز والشكل . ازهاره صغيرة القد متعددة الالوان . وهو يرغب في المواقع الجافة وفي الامراض الجنوبية الكثيرة الصم || احرف انواعه واشهرها ما يلي .

٢٦٠١٦ - مَدَّاهِين شَالَع (F).
Helianthemum vulgare (S). *Hélianthème commun* (F).
Herbe d'or (F). *Sun-rose*, *Common rock-rose* (E). *Echtes Sonnenröschen* (D). *Panaces*, *Chironia*, *Erbo d'oro* (I).

نوع من المدايين ، شروبه الزراعية عديدة، تملو من ٢٠ الى ٦٠ سم. فروعها مستطيلة . اوراقها متعابلة اذنية . نصلها بيضي الشكل يطول من ١٠ الى ٤٠ م. ويمر من ٥ الى ١٥ م. ازهارها بسيطة او مكسية تعرض من ٢ الى ٤ سم. الوانها عديدة تختلف باختلاف الشروب منها الاصفر والابيض والوردي والاحمر || ازهارها يستمر من ايار الى آب .



مَدَّان



مدايين شالاع



مدايين صفصالي الورق



متج مَدَّوْل

تنقيش وتكوير عند الطلب . بعض اجناسها أورد والبعض الآخر جزئي التستين || اشهر اجناسها التاتو والتاتوزيه والعبار .

Ferme d'élevage (F).

٢٦٠٢٦ - مَدْرَجَةٌ ٥

Rearing farm (E).

هي المزرعة المخصصة لتربية الدواجن من أي جنس كانت . وهي تشمل الأرض ربا عليها من أبنية ومعدات .

٢٦٠٤٢ - مَدْرَوَان * Crocethia alba (S).

Cocorli des sables (F). Sanderling (E).

طائر من طوال الساق القواطع وفصيلة الزرقائيات . مشاه بعض شطوط البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر . مصيفه شطوط البحار الشمالية . قوته البذبان والقشريات والرخويات التي تلتفها الأمواج || جسمه صغير القد يطول نحو ١٨ سم . ثوبه الصفي إلى السوداء تملو رقطة صناعية يتخللها الأبيض في الرأس والرقاء والجناح والذنب ، صدره إلى الشقعة ، بطنه أبيض . متفاده وساقه إلى السمرة السوداء . ثوبه الشتوي إلى البنية في الرأس والرقاء والجناح والذنب وآل البياض الناصع في الصدر والبطن . الأني تتسلل بنفس اللون || يكثر الضحوة في الربال . الأني تحضن وحدها من ٢ إلى ٤ بيضات . الترسيم يستمر نحو ١٧ يوماً .



مدشة

٢٦٠٤٣ - مَدْرَسَج دوية تسج كالسكرت (الكلسان) .

٢٦٠٤٤ - مَدْرَسَج Tropisme (F). Tropism (E).

شذو عرشي في نحو بعض أصناف الاجسام الحيوانية والنباتية تكثر فيه وتوجهه بعض العوامل الخارجية كالنور والحرارة والضغط والاختفاء .



مدروان

٢٦٠٤٥ - مَدْرَسَق Déversoir (F).

Overfall, Waste-Weir (E).

المدرق المكان الذي يفيض منه الماء المعبور .

٢٦٠٤٦ - مَدْرَشَاشَة زَبَا * Henicopus pilosus (S). Henicope poilu (F).

Henicopus pilosus (E).

حشرة وأشعة قانصة من فصيلة المنخيات ورثية سمذات الإجنسة . تألف البراري والحقول المزيرة . غناصها تعيش على رقيق الأزهار وبساتينها . يرقاتها تعيش تحت لحاء الأشجار وفي الأخشاب النخرة ساعية وراء أساريع الحشرات الخائبة لاقتناصها || جسمها صغير القد ، كثيف الزغب والحلب ، يطول من ٧ إلى ٨ سم . لونها صفراوات بارزات . زيانها غيليان مستطيلان . ظهورها مستدير الطرف اللامع ، تحيل التحزيز الضدي . أرسافها خافية المقل || لها جيل واحد في الجيل . تظهر الحشرة الجالطة في أيار وتبقى حتى أواخر تموز . تتجحر في التار . تسالده بعد ظهورها بنحو أربعة أسابيع . تمكن ميساريا تحت لحاء الأشجار وبشرها ويحت الانفاص وفي الجافة والميل || البرقة عند بلوغها الإدراك التام تطول من ١٢ إلى ١٤ مم . جسمها شبه أسطواني الشكل ، مستطيل الرأس ، اسمر اللون الكادمي ، سداسي الجوارب النحيلة || طور الإكمال الذي يستمر نحو ٣٠ يوما ينقضي في آخر سداب دخلته البرقة .



مدشاة زبا

٢٦٠٤٧ - مَدْرَع * Requéant, Demandeur (F). Plaintiff, Pétitioner (E).

٢٦٠٤٨ - مَدْرَعَة

جوزة التاربيل المرفقة من لها يتفرع بها .

Notacanthidae (S).

٢٦٠٢٧ - مَدْرَجَات ٥

Notacanthidae (F). Notacanthidae (E).

فصيلة اسماك بحرية من شالكانت الزعانف . اجناسها المعروفة اربعة اشهرها المدج .

Pondol d'austruche (F).

٢٦٠٢٨ - مَدْرَحِي

Nest of ostrich (E).

افصوص تحفره الفلوس أي النعامة الأني في الرمل . قطره نحو ١٠٠ سم . وعقه نحو ٣٠ سم . تضع فيه من ١٢ إلى ١٨ بيضة تحضنها بمناوبة الظلم .

Rechaussament (F).

٢٦٠٢٩ - مَدْرُخ

عملية زراعية قوامها حفر جلع الشجرة أو ساق الشثيلة الغنية بقليل من الأرباب لحماية .

Fumivore (F).

٢٦٠٣٠ - مَدْرَحَان ٥

Smoke-consuming (E).

نعت تعريفي يطلق على كل جهاز يتنص الدعان فيحرقه .

Polypter (F). Polyp (E).

٢٦٠٣١ - مَدْرَحَة *

مجموعة من المذيع تعيش على قاعدة كلسية واحدة .

Provision (F).

٢٦٠٣٢ - مَدْرَحَر

المدرح هو الذخيرة ، اطلها .

Apport (F).

٢٦٠٣٣ - مَدْرَة

Lactigène (F).

٢٦٠٣٤ - مَدْرَار ، مَرْمَدَار ٥

Lactigenous (E).

كل ما ينشط اللز ويؤدي من قدر .

Tubérigène (F).

٢٦٠٣٥ - مَدْرَارَان

نعت تعريفي يطلق على الجين المدرة الشكل .

Glaube, Moete de boue (F). Giebe, Sod, Clod (E).

٢٦٠٣٦ - مَدْرَارَة ، قَلْعَة

الكثرة من التراب المماسك .

Galéga (F).

٢٦٠٣٧ - مَدْرُور

هي المكثنة ، اطلها .

Processus (F). Process (E).

٢٦٠٣٨ - مَدْرُوج

انظور التدرجي للنبق المتتابع .

Batteuse (F).

٢٦٠٣٩ - مَدْرُوس

Threshing-machine (E).

آلة ميكانيكية تستعمل لدرس الحنطة والشعير .

Armadille (F).

٢٦٠٤٠ - مَدْرُور

هو التاتو ، سيوان صلب الجلد المدرع ، اطلها .

Dasypodidae (S).

٢٦٠٤١ - مَدْرَعَات ٥

Dasypodidae (F). Dasypodidae (E).

فصيلة حيوانات لبونة . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة جميعها ملهقة بدروع عظمية وفقرولية خزمية التركيب

Dopé (F). Doping (E). **٢٦٠٦٤ - مَدْمُوش**
من اجترع اللعنة ان كان انساناً او جرّع اللعنة ان كان حيواناً .

Cuverte, Cuvier (F). **٢٦٠٦٥ - مَدَكَّة**
السرداب او البناد الذي تحفظ فيه دنان الخمر .

Pommelé (F). Dappled (E). **٢٦٠٦٦ - مَدَكَّر**
شبه من شيات الخليل وهو ان يكون في شعر الفرس لكت ثقافات سائر لونه .

Oléomètre (F). **٢٦٠٦٧ - مِدْهَكَان** ، **مِدْهَات**
Oleometer (E).
جهاز تقاس به كثافة الادمان والزيوت .

٢٦٠٦٨ - مَدْهَوْب
Nécrosique, Nécrotique (F). Necrotic (E).
المدهوب من النباتات ما كان مصاباً بالذهب أي النخر .

Orbiculaire (F). Orbicular (E). **٢٦٠٦٩ - مِدْوَكَر**

Spatule rose (F). **٢٦٠٧٠ - مِدْوَاس**
هو الملاحقي لآودي، طائر من طول الساق ، اطيح .

Trochanter (F). **٢٦٠٧١ - مَدَوَّر ، مِدَوَّر**
عضو يجمع الحرقلة الى اللعنة .

Cyclomètre (F). Cyclometer (E). **٢٦٠٧٢ - مِدَوَّر**
جهاز يستعمل لقياس الدوائر .

٢٦٠٧٣ - مَدَوَّس * ، **مَدَوَّر ، قَرَجَ البَحْر**
Medusa (S). Méduse (F). Medusa, Jelly-fish (E).
الواحدة ملوسة وملوسة . جنس حيوانات حلالية بحرية . انواعها واشكاله عديدة تغلب فيها الاستدارة . الزواجا تراوح من الاصفر الباهت الى الازرق الساجوني . وهي نفسي في الليل وتبدو في بعض الظروف والحالات شغافة كالزجاج . واذا ذهرت من شيء قلفته برشاش نالط يلاخ كثرها النار . اشهر انواعه قنديل البحر ورلة البحر .

٢٦٠٧٤ - مَدَوَّسِيَّات
Méduses (F). Medusae (E).
حيوانات حلالية بحرية صغيرة القند لتلبي الى عدة فصائل واحتملها ملوسة .

٢٦٠٧٥ - مَدَوَّكَة *
Madoqua (F).
جنس ظباء افريقية متوسطة القند ، ريمة الجسم ، جميلة الشكل ، سطيحة القرب ، مستطيلة الاذن ، قصيرة الذنب . انثاها جهار . قرون ذكورها صغيرة القند ، مبطلة القرواح المتنامية الجسدية ، مائلة الاطراف المستديرة المنحنية . انثاها المعروفة ستة . اصطناعها شامة الاطراف تمتد من تمام البحر الآخر الى السودان والحيفة والصيدا وركيبا .

٢٦٠٧٦ - مَدَوَّلَم ، **مَدَوَّلَم**
Médulla (F). Medulla, Pith (E).
اسم يطلق على كامل الملاك النباتي ، الداخلي والخارجي .

٢٦٠٧٧ - مَدَوَّلَم ، **دَوَّلَمِي**
Dolomitique (F). **دَوَّلَمِي**
Dolomitic (E).
نعت تعريفي يطلق على ما كان تركيبه الدولوم .

Plaignant (F). **٢٦٠٤٩ - مَدْعِي**
Plaintiff, Complainant (E).
هو من رفع تلامته او دعواه أمام المحكمة .

Défendeur (F). **٢٦٠٥٠ - مَدْعَى عَلَيْهِ**
Defendant (E).
هو الذي ترفع عليه الدعوى .

Conjugues (F). **٢٦٠٥١ - مَدْعَمَات**
Conjugata (E).
فصيلة نباتية من رتبة الخفيات الخضر . اجناسها وانواعها عديدة ، جميعها من نباتات المياه العذبة ، تتميز بأشكالها الخيطية الماددة الفروع .

Alléomorphe (F). **٢٦٠٥٢ - مَدْعُوش**
نعت تعريفي يطلق على الصفات المتباينة المتناقضة المخططة .

Amont (F). **٢٦٠٥٣ - مَدَقَّق**
Up-stream, Up-river (E).
المدقق او حالية النهر هي الجهة التي تصدر عنها المياه الجارية . يقابلها المسب .

Enfouisseur (F). Barier (E). **٢٦٠٥٤ - مَدَقَّقَة**
هي المطورة ، أداة تضاق الى المحراث فتدفعه للزبل في التلم ليظهر مقبب المحراث .

Légende (F). Legend (E). **٢٦٠٥٥ - مَدَقَّال**
تفسير ما في رسم او خارطة من حروف وعلامات وتصاوير والوان الخ .

٢٦٠٥٦ - مَدَقَّة *
Pistil
هي طرف المتاع اي عضو التأنث في الزهرة . وهي عند ادراكها تفرز مواد لزجة تمكن جملوات الطلع من الالتصاق للخصاب .

٢٦٠٥٧ - مَدَقِّي
Pistil6 (F). Pistillote (E).
صفة الاظهار السعيدة التي المجهزة بمققات اي اعضاء انثوية .

٢٦٠٥٨ - مِدْلال ، اَلْدَرِيس
Indices (F). Index (E).

٢٦٠٥٩ - مَدَكَّة
Piscinale (F).
Plantation of plane-trees (E).
غابة الدلب والارض الكثرية الدلب .

٢٦٠٦٠ - مَدَكُج
Hérisson (F).
هو القنفذ ، الحلب .

٢٦٠٦١ - مِدْكَال
Cordon du maçon,
C. du charpentier (F). String, Strand (E).
للمدك هو حبل البناء والتجار . وقد شاع استعماله للدلالة على سائر الحبال المبنية .

٢٦٠٦٢ - مَدَكَة
Râteau (F). Rake (E).
أداة تنهي بنحيفة ممتدة تتصلها اسنان من حديد قديم بها التربة أي تسوي .

٢٦٠٦٣ - مَدْعَدِي
Fluvialite (F). Fluvialite (E).
نعت تعريفي يطلق على كل حيوان يعيش في المياه العذبة . وعمل كل نبات يعيش فيها او ينبت على ضفافها ويربها .



مدقة



ملوس



مدركة

Dichogamie (F).

Dichogamy (E).

تفاوت زمن الإدراك التناسلي الذي يحصل بين الأعضاء الذكورية والانثوية في تنور بعض النباتات .

Coursier très rapide (F).

٢٦٠٨٩ - مدّاق

الفرس السريعة جدا .

٢٦٠٩٠ - مدّال * ، عتوق مبدّل *

Centetes ecaudatus (S). Tanrec commun (F).

Tanrec, Tanrec (E).

حيوان لين حاشي وحيد الجنس والنوع من فصيلة اللقيايات . موطنه جزيرة مدغشكر . يألّف المناطق الجبلية حيث تكثُر السراخس . سره دجوي . قوته اللبدان والحشرات وبعض جلود النبات || جسمه شوكي صمغوي يطول نحو ٤٠ سم . رأسه شبه غروبي الشكل ، مستطيل الخطم . فكك الأعلى يتقدم الإصغر . عيناه صغيرتان . أذناه مستعرضتان . ذنبه ماسح لا ربيد له . جرائره قصيرة . أصابعه قوية . ظافره مخيطة ، حادة الأطراف . عليه لب قصير تتخلله مسال ذرية الأطراف متباينة الطول والشفافة تكثف الرأس والعتق ويخرج الظهر حتى الكتل || يباته الشتوي يستمر نحو خمسة أشهر . جمره نفق مستطيل يحضره في التربة || الاتق ثورود تضع في كل رمص من ١٥ الى ٢٥ جرأ .




مدّيد

Centetidae (S).

٢٦٠٩١ - مدّاليات *

Centetidae (F). Centetidae (E).

فصيلة حيوانات لبونة حاشرة . اجناسها وأنواعها قليلة العدد أعطتها جزيرة مدغشكر || اجسامها صغيرة ، مكردة ، متقبضة ، أخطاها مستطيلة جرائرها قصيرة . أظافرها قوية ، ذرية . بعضها كثيف الوير الناعم ، قصير الذنب أو مستطيل والبعض الآخر ماسح الذنب أو عاده ، حليبي الوير وتطوّر مسال متباينة الشفافة واللؤلؤ . اعرف اجناسها اللذال والميسل والميرقولي والميكروغال والسينغال .



مدّية

Gobe-mouches (F).

٢٦٠٩٢ - مدّيكاب *

هو أكاك الذباب ، اطليه .

Musciapidae (S).

٢٦٠٩٣ - مدّيكابيات *

Musciapidae (F). Musciapidae (E).

فصيلة طير من الجوائم السليات المتأثير . أنواعها نحو ٣٧٥ جميعها من العصائير الصغيرة لبق . أخطاها تشتمل مختلف مناطق السلال القديم . تألف النباتات والحداق والجائن . قوتها الحشرات اغصها الذباب .

Autel, Vesta (F). Ara (E).

٢٦٠٩٤ - مدّيح مريخ *

المريخ كوكبة نجوم جنوبية الميخ مركزها تحت ذنب العقرب || عدد نجومها ثمانية منها ثلاثة من المرتبة الثالثة .



مدّال

Terre nue (F). Naked land (E).

٢٦٠٩٥ - مدّحالة *

الأرض البور لا شجر فيها .

Gécor (F).

٢٦٠٩٦ - مدّور *

To spoil, To damage (E).

مذرت البضة : فسدت فهي مذرة . والجوزة كذلك .

Polype (F). Polyp (E).

٢٦٠٧٨ - مدّيع *
جنس حيوانات بحرية من المحفوات . أنولسه عديدة . أشكالها الكائبات . أفرانها كلسي المادة سريع التحجير تموش عليه وفي داخله .

Barbotage (F). Meas, Mash (E).

٢٦٠٧٩ - مدّيد *
شراب مرطب للعداين يرتكز على التليق وبعض التخاله .

Cynanchum (S).

Cynanche, Cynanque (F). Scamony plant (E). Roter Hundswürger (D). Scamones (I).

٢٦٠٨٠ - مدّيد *
جنس نباتات مدادة من فصيلة السقلايات . أنولسه عديدة منتشرة في جميع أصقاع العالم . معظمها بري وبعضها ترابي . سوقها مدادة حاملة يستخرج منها عصارة لبنة || أوراقها مدقة متقابلة مزائقية التصل . أظافرها خلسية الزكيب ، صيوانية التجميع ، محورية الارتكاز . اعرف أنولاه واشهرها المدية العطر .

Cynanchum indicum (S).

٢٦٠٨١ - مدّيد عطر *

Cynanque odorant (F).

جنية مصمرة متسلقة تطول نحو ٣٠٠ سم . ساقها وبروصها عطرية للواء الحولية . أوراقها مستطيلة الاثاق . نصلها خلي الصنفه يطول نحو ١٤ سم . ويرص نحو ٨ . أظافرها جرسية الشكل ، صفراء اللون ، عطرية الرائحة الشبيهة بالياسمين || أفرارها يستمر من أواسط تموز الى أواسط آب .

٢٦٠٨٢ - مدّيكه *

Turbo (S). Turbo, Sabot (F). Turbo, Turban-shell (E).

٢٦٠٨٢ - مدّيكه *
جنس حيوانات بحرية من الرغويات مدنيات الارجيل وفصيلة المدنيحات . أنواعها المعروفة قليلة العدد أعطتها بحار البلاد الحارة || أصدافها كبيرة القد ، متساكة ، محززة الاعقاب ، لؤلؤية الصفحات الداخلية ، فسيمة اللووات شبه المستديرة || لحومها مأكولة وأصدافها صناعية .

Turbinidae (S).

٢٦٠٨٣ - مدّيكيات *

Turbinidae (F). Turbinidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرغويات مدنيات الارجيل أمانيات الجهاشم . اجناسها وأنواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة والاستوائية || أصدافها حلزونية متساكة لؤلؤية الصفحات الداخلية بعضها يشبه المدية والبعض الآخر يشبه المداس || اعرف اجناسها واشهرها المدية والدرعية والنبهية .

Débiteur (F). Debtor (E).

٢٦٠٨٤ - مدّين *
هو في التمول من يجب عليه تنفيذ الالتزام وفي التخصيص من كان عليه الدين .

Débit (F).

٢٦٠٨٥ - مدّين * ، مدّين * ، مدّين *

Debit (E).

هو ما على المرء من حساب ودين أو ما هو مطلوب منه .

٢٦٠٨٦ - مدّاخير *

Intestin (F). Bowel (E).

٢٦٠٨٧ - مدّاع *

Intestine, Bowl, Gut (E).

في الامعاء . يقال ملأت الدابة مداعها .

٢٦٠٨٧ - مدّاع *

Porc-épic à queue blanche (F).

هو الشحم الأبيض الذاب ، اطليه .

الى الصفرة يملؤها تجذع ممترض لا يقاسي الشكل اسود اللون. وروشاها الخلفيان مذنبان ويبتجان بالاحر والاسفل. تظهر في اوائل الربيع ، تمتع مكها على اوراق اللوز والدرناق والحوخ والكركوز فينبف من رقات غاصلة تلثم بعض اجزاء الاوراق .

٢٦١٠٧ - مَذْنَاب مَكُون * ، مَكُون *

Papilio machaon (S). Machaon, Grand porte-queue (F).

فراشة كبيرة القد من عارة اللانبايات . جسمها اسود اللون . بسطها لا تقل من ٧٥ م . ورواشها الى الصفرة يملؤها تجذع وثقبج وتنسج وتسليج متراكبة الاالوان يكمر فيها الاسود والاسفل والاحمر . وروشاها الخلفيان مذنبان. تظهر في اوائل الربيع . تمتع مكها على اوراق الجزر والشيار فينبف من رقات تيمش على الاوراق فتلتهمها .

٢٦١٠٨ - مَذْنَابِيَّات *

Papilionine عارة شحات من فصيلة الفراشيات ورثية شرفيات الاجنحة صرولانيات اللون . اجناسها والوانها كثيرة العدد . منتشرة في جميع بلاد العالم . فراشاها متوسطة القد وكيرة . الواجهات متباينة الالوان الغامقة . اشهر اجناسها المذنب والمذئاب والميضام .

٢٦١٠٩ - مَذْنَب *

Comète (F). Comet (E). كوكب طالع منتقل تلبه محابة مغشية . حركة دورانه حول الشمس مستقيمة المدار || عدد المذنبات المعروفة حتى الآن يتنازع ١٥٠٠ اشهرها « مذنب هالي » الذي يظهر كل ٧٦ سنة وقد ظهر عام ١٩١٠ ويظهر ايضا عام ١٩٨٦ .

٢٦١١٠ - مَذْنَب *

Urodèle (F). Urodele (E). نعت تعريفي يطلق ، في علم الحيوان ، على كل دوية او يرقة او اسروع مجهزة بذنب او بزايدة تشبه الذنب .

٢٦١١١ - مَذْنَبِي * *

Sperme (F). Sperm (E). هو مني الحيوان عامة ، راجع في .

٢٦١١٢ - مَذْنَابِيَّاب ، حَال * *

Solvant (F). Solvent (E). مذيب

٢٦١١٤ - مَذْنَبِي ، مَذْنَبِي ، مَهْو *

Lait mouillé (F). Whey (E). اللبني والخير والمهز ، مزيج من اللبن والماء .

٢٦١١٥ - مَر * ، شَوْكَة *

Croc, Trident (F). Hook, Trident (E). اداة تستعمل في الزراعة لقلب التراب .

٢٦١١٦ - مَر *

Amer (F). Bitter (E). نعت يطلق على ما كان طعمه ضد الحلو .

٢٦١١٧ - مَر *

Myrrhe (F). Myrrh (E). صمغ راتنجي يستخرج من سوقه شجر المر . قال الدكتور بديوي مفتاح في احياء المذكرة من الانطاني ما سرليته : وهو السمري في المقالات وهو معروف يسيل من شجرة للغرب فيجعد قطعاً الى حرة صافية . ومنه ما يرشد على ساق الشجرة وقد جد كالجواهر وهذا هو المر المعروف بالبطارخ لانه يحساكي بعض السمك في دسوته وصفقره

٢٦١١٧ - مِذْرَاق * ، مِذْرَاقِي *

Fourche (F). Fork, Pitchfork (E). اداة من خشب او حديد تلوى بها الحنطة ويرفع بها الكلا والزبل وغيرها .

٢٦١١٨ - مِذْرَاق *

Semoir (F). هي المبدرة .

٢٦١١٩ - مِذْرَاق *

المذراع من الخيل والبرق وسائر الدواب من كانت امة اشهر سلالة او حرقا واجيد اصلا من ابيه .

٢٦١٢٠ - مَذْنَق ، مَذْنَق ، لَس *

Mouillage (F). Soaking, Wetting (E). هو المزج بالماء كغسل اللبن بالماء فهو مذيق وغير .

٢٦١٢١ - مَذْنَقَرَة *

Polyphyllie (F). Franching (E). علة جمهورية قليلة الاذن شاملة في جميع بلاد العالم تسمى الصبح تشبه تصالاوراته وتقتفي على صفه || مظهرها الخارجي اصفرار في الاوراق يبدأ من حافة النصل وينتشر تدريجاً نحو الداخل الى ان يتلثم الصلغ فينبف الورقة صفراء النسيج ، غضراء الصلغ والعروق ، رافعة الوثني الثنين || وفي حال اشتداد اللملة فانها تسبب وباط الشتلة وترا كب الاوراق التي تسبب ملمقرة ، مستطيلة النصال الضيقة ، متصبية الأطراف ، ملتوية الرؤوس || اسبابها الرئيسية عديدة ومتباينة اعصها قلبية التربة وفرد وطوبها وضمت بعلمها الازوتي وقلة موادها الضوية وصيرها الجربوي || يقول العالم « ويتنبرج » ان للمقرة علة ينجها خذيان خاص يفرزه نقطور تري يدعي بافليس سريوس . وان هذا اللبنيان الذي يجب اختلال الايض الازوتي في النبات ينشط تكورن الحولمض الامينية اللبالية التي تحدث هذه الشوائب او تفرد اليها .

٢٦١٢٢ - مَذْنَق ، مَذْنَق *

Adulte (F). Adult (E). من دخل في الدور الثاني من حياته وهو الدور القام بين الفترة والشينوخة .

٢٦١٢٣ - مَذْنَقَرَة *

Mémoire (F). Memorandum, Bill (E). عرضة تفصيلية تسرد وقائع القضية واسبابها وما آلت اليه .

٢٦١٢٤ - مَذْنَق *

Travail (F). Trava (E). آلة تربط بها الحيوانات الكبيرة لتدل فتسهل مداواتها .

٢٦١٢٥ - مِذْنَاب الحَبِيَّاتِي *

Papilio alexanor (S). فراشة متوسطة القد من عارة اللانبايات . جسمها اصفر اللون يملو غط مستعرض قاطب اسود . بسطها نحو ٦٥ م . ورواشها الى الصفرة يملؤها تجذع اسود اللون مختلف الاشكال والاحجام . وروشاها الخلفيان مذنبان ويبتجان بالاحر || تظهر في اواخر الربيع ، تمتع مكها على معظم نباتات الفصيلة الصبوانية فينبف من رقات غاصلة تيمش على الاوراق فتلتهمها .

٢٦١٢٦ - مِذْنَاب اللَوْز *

Papilio podalirius, P. sinon (S). Flambé (F). فراشة متوسطة القد من عارة اللانبايات ، جسمها حنفي اللون يملو غط قاطب اسود ينقطع عند مؤخر الظهر ثم يعد فيملو البطن الى الترج . بسطها نحو ٦٥ م . ورواشها



مذرة



مذنب الحبيبات



مذنب اللوز



مذنب مقون



مَر

وسهره وليس بالردى. ومنه ما يهصر فيسيل ماء ثم يجمد
مالكا الى السواد ويحكى المية السائلة ويسمى المر الحار
ومر دين الثاني || وهو ركن عظيم في المرام والاكحال
على اختلاف انواعها. وهو ينفع سائر التزلات والصداع...

يكتسل به فيحل المدة وغلظ الجفن، ويزيل القرد بلين
اللسان. والقرقة بماء الورد والحلبة. ويحل سائر القروح
اذا نثر فيها وقتها فسلت قبله بماء لسان الحلي. ويشد
اللفة ويزيل قروصها ووجعها الانسان بالتمر والزيت
مصفىة. والصال ووجع الظهر. وشربة القصبه استحلوا
في اللث. ووجع الكبد والكلى. والمثانة والبنيدان شربا
مخصوصا مع الترس والافستين. وامراض الارصام خصوصا
الصلابة والكتن حتى احاله ولو بماء الاس. ويلجم الفتق
اذا تموي عليه ويحل حرق اللسان والمفاصل والتهرس
مطلقا. ويزيل ثن الايط بالثب وصف الشعر. وانتاره
بالتمر واللاذن ودهن الاس. والقوان بالسل. والتاكيل
والاثار كلها. دخاله ينبت شعر الاجفان وينرم نفسه شأ
ويحفظ المحرق طلاء مع دهن اللوز المر ينفع في امراض
الاذن. ومع التنع امراض الانف. وهو يفسر المثانة
وينسقط الاجنة ويصلحه السمل وشرته الى ثلاثة ويده
فلفل او قسط او جذباستر.

٢٦١١٨ - **مر** Commiphora myrrha (S).
Commiphora, Arbre à myrrhe (F). Myrrh tree,
Myrrha (E). Myrrhenbaum (D). Albero del mirra (I).
نوع من البسان من فصيلة البخوريات. شجيرة صغيرة
القد شائكة، بغطر الصمغ من ساقها على شكل مدوع حواف
اللون شاحبة مضيئة. اوراقها مسنقة مركبة ثلاثية
الورقيات. اغشائها ولحاؤها عطرية الرائحة النفاذة. صمغها
جيد الصنف شائع الاستعمال الطبي.

٢٦١١٩ - **مر افريقي** Commiphora schimperi (S).
Commiphora d'Afrique (F). African myrrh tree (E). Echter Myrrhenbaum
(D). Albero del mirra d'Africa (I).
نوع آخر من المر، اعطانه البلاد الافريقية في كثير
الجزائر ومراكش. شجيرة صغيرة القد شائكة. يشجر
من صمغ صمغ راتنجي المادة جيد الصنف جنابي اللون،
شائع الاستعمال الطبي.

٢٦١٢٠ - **مر حبشي** Commiphora abyssinica (S).
Commiphore d'Abyssinie (F). Coarsa myrrha (E). Afrikanischer Myrrhenbaum (D). Commifora (I).
نوع من المر، اعطانه الحبشة وسائر افريقية الشرقية
وبجزيرة العرب. شجيرة صغيرة القد شائكة. ثمارها مجزعة
الجوز كانت ولا تزال تستعمل في بعض المستحضرات
الطبية. صمغ راتنجي المادة جيد الصنف يأتي بعد المر
الافريقي جودة.

٢٦١٢١ - **مر اسع** Mézayer (F). Mézayer (E).
هو من استعمال الارض بالمزارعة، اطبل مزارع.
٢٦١٢٢ - **مرأة مسككة** Andromède (F).
Andromeda (E).

المرأة المسككة كوكبة نجوم بعضها قرب القطب الشمالي.
عدد نجومها ٥٩ اشهرها ثير الرأس والسر والقدم
وربع بالقرب من هذه الكوكبة سديم لولبي اكتشف
عام ١٦١٢ يبعد عن الارض نحو ٨٠٠٠٠٠ سنة
ضوئية وقطره نحو ١٠٠٠٠٠ سنة ضوئية.

٢٦١٢٣ - **مرارة** Enflourage (F).
طريقة صناعية لاستخراج المر تتركز على مرث الاثمار
في الدهن او الشحم.

٢٦١٢٤ - **مرح** Etable (F). Scabie (E).
هو ماوى البقر والتمز والتمز وسائر الدواب، اي موضع
راسها في الليل.

٢٦١٢٥ - **مرار** Centauree étoilée (F).
هو القنطريون النجسي، اطبل.

٢٦١٢٦ - **مراركة** Vésicule biliaire (F).
Gall-bladder (E).

٢٦١٢٧ - **مراركة** Amertume (F). Acerbic (E).
وصم ميكروي يترى ا لمر فيفسداه بعد ان يبيب طمها
اذ يجمله مر اللقاق.

٢٦١٢٨ - **مرارة الحنظل** * قنطريون صغير،
قصبة الحية، قنطريون

Erythra centaurium (S). Erythrae centaurée, Pe-
dite centaurée, Herbe à la fièvre (F). Earch-gall,
Centaury, Fever wort (E). Echtes Tausendgülden-
kraut (D). Centaures minore, Blondella, Caccia-
febbra (I).

نوع من الار يتروا وهو نبات حشوي بري حول طلي صغير
القد. ساقه فروع مستدقة. اوراقه متعاقبة صغيرة. نصلها
ضيق المسفة. حلي البشرة. اطبل اللون، شديد
المرارة || يستعمل منه في الطب القمم الزهرية والاوراق.
وهي مقوية المعدة دافعة الحسيات. ويحضر منه متفوق
هائم يستعمل في حالات زيادة الحموضة وقرحة المعدة
او المعوية ذلك لان هذا النبات يحوي بعض الاملاح القلوية
بنسب كبيرة لها منافعها الطبية.

٢٦١٢٩ - **مرارة الصحاري** Chicotin (F).
هي الخنظل، اطبل.

٢٦١٣٠ - **مراس** * Ophonus sebulicola (S).
حشرة من فصيلة المربليات. طولها يراوح من ١٤
الى ١٧ مم. راسها وكسلها الى التمرة السوداء. عندها
الى القرقة السطوح يملوها مراح اغبر || تكثر في
الآثرة الكلسية. تتركب ازهار نباتات الفصيلة الصبوانية
وتلتهم البلور منذ تكوينها || يرقاتها خافتة قليلة الاذى.

٢٦١٣١ - **مراس** * Chiroseuthis (S).
Chirotauthis (F). Chiroseuthis (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات راسيات الاجنل
وفصيلة المراسيات. انواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها
بعض مناطق المحيط الاطلسي والبحر الابيض المتوسط ||
اجسامها شبه وشمية الشكل. زناقتها مستديرة طرفية
الارتكاز. وروسها اسطوانية. عينها كبيرة صامخة. ثمانية
من جراسها ملطقة بحجة متقاربة الطول واكتناها شديدا
الطول عادتا الحامض تنهباها برسي سنانية الشكل.

٢٦١٣٢ - **مراسيات** * Chiroseuthidae (S).
Chiroseuthidae (F). Chiroseuthidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات راسيات الاجنل،
ثلاثيات الخياشيم، عشاريات الجرامر. اجناسها وانواعها
المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض مناطق المحيط الاطلسي



مر



مرارة الحنظل



مراس



مراس

تنبية اللون صناعية. أوراقها طيبة وصالية || كانت قشور المران تستعمل استعمال الكينا قبل معرفتها وهي معروفة عاقضة للحرارة. أما الأوراق فتفيد الفوصة والقرص. احرف انواعها واشهرها ما يتبع .

٢٦١٤١ - **مران أبيض** * Fraxinus alba (S).
Frêne blanc, F. d'Amérique (F). American white ash (E). Amerikanische Weissesche (D).
شجرة سبروتية باسقة تملو من ٢٠ الى ٤٠ م. مهدا امريكية الشايية. أوراقها تطوي نحو ٣٠ م. وريقتها تدم من ٧ الى ٩ ، تصلها ساني الصفصه بطول ١٥ سم. ويعرض ٥ سم. وهو اطلل اللون مدبب المقصه مسنن الحافة. ازهارها حشكولي ، طرني وبحوري الايتكاز ، بطول نحو ١٠ سم. ازهارها بيضاء اللون .

٢٦١٤٢ - **مران أحمر** * Fraxinus pubescens (S).
Frêne rouge (F). American ash, Red ash (E). Amerikanische Rotesche (D). Frassino rosso americano (I).
شجرة سبروتية تملو من ١٢ الى ١٨ م. وريقتها تدم من ٧ الى ٩ ، تصلها اخضر اللون بحمر في الخريف وهو ساني الشكل مدبب المقصه ، مسنن الحافة بطول نحو ١٢ سم. صفحته السفلى خلية البشرة. ازهارها حشكولي ، طرني وبحوري الايتكاز ، بطول نحو ١٥ سم. ازهارها فستقية اللون .

٢٦١٤٣ - **مران أسود** * Fraxinus nigra (S).
Frêne noir, F. à feuilles de bureau (F). American black ash (E). Amerikanische Schwarzesche (D). Frassino nero (I).
شجرة سبروتية جميلة الشكل، تملو من ١٠ الى ٢٠ م. غراعيها خضر نمشة بالاسود. وريقتها تدم من ٩ الى ١١ ، تصلها بيضي الشكل ، لاملئ الانتشاب، حابن اخضر. ازهارها حشكولي التجميع ، كبير القد. ازهارها فستقية اللون .

٢٦١٤٤ - **مران ذرب الورق** * Fraxinus oxyphylla (S). Frêne oxyphyllé (F).
شجرة متوسطة القد تملو من ١٠ الى ١٥ م. براعيها الى الشقة السفعاء المواج. وريقتها تدم من ٧ الى ١٣ ، تصلها ساني الشكل ذرب الزام الاخير، صفحته السفلى خلية البشرة. ازهارها حشكولي التجميع طرني الايتكاز. ازهارها بيض .

٢٦١٤٥ - **مران شامخ** * Fraxinus excelsior (S).
Frêne élevé (F).
اكبر انواع المران واشهرها واسرعها نموًا واعمرا ، فبهره سبروتية تملو من ٣٠ الى ٤٥ م. غراعيها اسطوانية، براعيها سيد. وريقتها تدم من ٩ الى ١٥ ، تصلها ساني الشكل، مسنن الحافة. ازهارها حشكولي التجميع، طرني الايتكاز وبحوري. ازهارها بيض يملها مواج اخضر. يستخرج من سوطها بالخر لا بأس به سكري الحليم يحوى نحو ٧٠ ٪ من المنبت .

٢٦١٤٦ - **مران شائع** * **صتي** * Fraxinus ornus (S).
Frêne à fleurs, F. à manne, Orne commun (F). Manna-ash, Flowering-ash (E). Blumen Esche, Manna Esche (D).
شجرة سبروتية مبلولة تملو نحو ١٥ م. فروعا حر

والبحر الابيض المتوسط || اجسامها شبه وشية الشكل او جرابية. زفافها مستديرة طرفية. رؤوسها مستطلة. عريضها كبيرة ماحكة. اجرامها لامتناهية الطول والشكل || احرف اجناسها واشهرها المرشش والمريش .

٢٦١٤٣ - **مرشش** * Spinax (S).
Spinax (F). Spinax (E).
جنس اسماك بحرية مفترسة من فصيلة المرششيات. انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها مسطوية ، شبه وشية الشكل. اعطائها ذلقة شاردة. اسنانها مشطارية ، حادة تقطع كل شيء. جلودها مغطاة بزفافها كبيرة. اللبالية لامتناهية الشطرين || اشهر انواعها واعرفها المرشش الاسود (S. niger) الذي يحوي البحر الابيض المتوسط .

٢٦١٤٤ - **مرشكة** * Mulch
مواد عضوية مختلفة انحصاها الورق والقص تقش على التربة لحفظ رطوبتها ولتبع تكاثر اعشائها الطوبية ولقيائها من قسوة البرد .

٢٦١٤٥ - **مرششيات** * Spinacidae (S).
Spinacidae (F). Spinacidae (E).
فصيلة اسماك بحرية مفترسة من الاشلاق. اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد. اعطائها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || جميعها وشية الشكل ، متبانية القد والحجم منها الصغير والوسط والكبير || اعطائها شرسة ماحكة ، لا تمر بسكة الا قسبتها الى شطرين .

٢٦١٤٦ - **مرشكة** * Plaidoirie, Plaidoyer (F).
Pleading, Speech for the defence (E).
المرافعة هي عرض وقائع الدعوى ومطالب المتقاضين شفهيا امام المحكمة ، وهي حق يحق للقانون لكل متقاض .

٢٦١٤٧ - **مران** * المراق نجم ثير من كوكبة الدب الاكبر .

٢٦١٤٨ - **مرشكة** * Dosimétrie, Titrage (F).
Dosimetry, Titration (E).
فن قياس التركيز والاعلاط .

٢٦١٤٩ - **مرشاعي** * Kobus (S). Cobe, Kob (F).
جنس حيوانات لبونة من الفيلة الكبيرة لقد. انولمه حسة اعطائها البلاد الافريقية . اجسامها منسجمة القوام طرفية الشكل تطول من ١٧٠ الى ٢١٠ سم. وتعلو من ١٤٠ الى ١٥٠ سم. اذبالها الى الخصى الاخر المواج ومنها البلقا. للذكر منها قرنان كبيران لولبيان . أما الانثى فليها عني رباعية الاختلاف ، اصغر قدما من الذكر || يالفت النسيب والناميات يصاري الماء . اجله يراوح من ١٥ الى ٢٥ نفرا .

٢٦١٥٠ - **مران** * **لسان المصفر** * Fraxinus (S). Frêne (F). Ash-tree (E). Esche (D). Frascio, Frassino (I).
جنس اشجار حرجية ويزينة من المرانيات وفصيلة الزيتونيات. انواعها عديدة منها الجنيات والشجيرات والاشجار الباسقة. اوراقها مركبة وريية متعاقبة عابلة . ازهارها حشكولي. ازهارها بيضاء اللون او فستقية . ثمارها جناحية . براعيها سيد. لحاء سوطها واعطائها الى الربة السوداء . اخشابها



مرشش



مرامري



مران احمر



مران شامخ

٢٦١٥٥ - مرثياني (E). Epigé (F). Epigenous (E).
تنت تمرثني يطلق حل البزور التي ترتفع ذراتها عنه
الانتاش فوق سطح التربة .

٢٦١٥٦ - مرثياني (E). Lais (F). Saddle (E).
المرثاة . ج مرابي . هي الشجرة البالية عند قطع الغابة .



مران شائع

٢٦١٥٧ - مرثياني (E).
طائر من طير الماء قبيح الهيئة (الجاحظ) .

٢٦١٥٨ - مرثياني (E).
المرثد هو عيس المواشي . وفي الحديث أنه قيم مبريد
الغنم . وهو القضاء وراء البيوت يرتفع به . وهو الموضع
الصالح لتجفيف البتر .

٢٦١٥٩ - مرثياني (E). Paddock (E).
Enclos pour caprine et ovine (F).
حظيرة الغنم والماعز .

٢٦١٦٠ - مرثياني (E). Carré (F). Square (E).
شكل حتمي قائم الزوايا المتساوية الاضلاع .

٢٦١٦١ - مرثياني (E). Quadrangulaire (F).
Quadrangular (E).

٢٦١٦٢ - مرثياني (E). Tétragone (F).
Tetragon (E).

٢٦١٦٣ - مرثياني (E). Trapèze (F).
Trapezium (E).
مربع متوازي القاعدتين الكبرى والصغرى .

٢٦١٦٤ - مرثياني (E). Confitures (F). Preserve (E).
المربيات هي الثمار المخبوزة بالسكر .

٢٦١٦٥ - مرثياني (E).
وبقلة تنفري حل الارض لها ورق مثل ورق الخنثباء
او اعرس ولها نورة صفراء واروية يضاء وتقطع مع اروعها
ففضل ثم تؤكل بالخل والحلزون فيها حلقة سيرة (من ابي
حنيفة) . ج مر وأمرار .

٢٦١٦٦ - مرثياني (E). Heron goliath (F).
هو البشون الجبار ، الطليه .

٢٦١٦٧ - مرثياني (E). Lithophage (F).
هو الحمار ، الطليه .

٢٦١٦٨ - مرثياني (E). Vivarium (F). Vivarium (E).
المرتقظ قصص لانياس الطويل والعرض والارتفاع ، غالباً
مزيج او مغلوب يشريط ضيق التناوب ، يشتمل تربية
النبويات والحشرات .

٢٦١٦٩ - مرثياني (E). Fastigiat (F). Fastigiate (E).
تنت تمرثني يطلق حل الفروع النهائية المرتفعة الاطراف
نحو العلان .

٢٦١٧٠ - مرثياني (E). Anticyclone (F).
Anticyclone (E).

٢٦١٧١ - مرثياني (E). Superior ovary (F).
تنت تمرثني يطلق حل اثمار البياضات المرتفعة المبيض
من فئة الخصومات المتعالات .

اللحاء ، صخر التمشيح . وريقاتها تد من ٥ الى ٩ ،
نصلها اعليلجي الشكل بطول نحو ٩ سم . ويعرض نحو ٥
تسنيه مستدير الاطراف ، ازهارها حنكولي ، طري ،
لبد التجميع ، بطول نحو ١٥ سم . ازهارها يضاء اللون .
يستخرج من سوقها باخر من لا بأس به يحوى ٧٢ %
من الميت .

٢٦١٤٧ - مرثياني (S). Fraxinus chinensis (S).
Frêne de Chine, Orne de Chine (F).

شجرة سرورية تريينية مهددا الصين تملو من ١٢ الى
١٥ م . براعمها سود في الشتاء حمر في الربيع . وريقاتها
تد من ٥ الى ٧ ، نصلها اعليلجي الشكل بطول نحو ١٤
سم . ويعرض نحو ٦ سم . حروفه بارزة ، تسنيه متشاري .
ازهارها حنكولي طري بطول نحو ١٨ سم . ازهارها يضاء
اللون . حمارها جلوية .

٢٦١٤٨ - مرثياني (S). Fraxinus floribunda (S).
Frêne floribond, Orne florifère (F). Bitter-ash (E).

شجرة سرورية مهددا الهند تملو من ١٠ الى ١٢ م .
وريقاتها تد من ٧ الى ١٣ ، نصلها سناني الصنفه بطول
نحو ١٥ سم . ويعرض نحو ٥ وهو مائل البشرة ، دقيق
التسنيه الحاد . ازهارها حنكولي طري بطول نحو ٢٥ سم .
ازهارها يضاء اللون غبراء اللواج .

٢٦١٤٩ - مرثياني (S). Fraxinus parvifolia (S).
Frêne rhomboidal, Orne de Bunge (F).

جنبة تريينية سرورية مهددا الصين تملو نحو ٢٥٠ سم .
وريقاتها تد من ٣ الى ٧ وهي مربعة الشكل تطول نحو
٤ سم . وتعرض نحو ٢ ، نصلها سنن الحافة ، عتقا
مزفر اللحاء . حثاكلها الزهرية طرفية الاوتكان تطول
من ٥ الى ٧ سم . ازهارها يضاء اللون .

٢٦١٥٠ - مرثياني (S). Fraxinus mandshurica (S).
Frêne de Mandchourie, F. du Japon, Tamo (F). Japanese ash, Tamo (E).
Japanese Esche, Tamo (D). Fraxino giapponese, Tamo (I).

شجرة شائعة تملو من ٢٥ الى ٣٠ م . مهددا منشوريا .
فروعها رباحية التصلح . وريقاتها تد من ٧ الى ١١
نصلها ضيق الصنفه ، مذهب القمصه ، مستطيل المتق،
يأخذ الحصار البحري . ازهارها حنكولي التجميع مستطيل
الشكل . ازهارها يضاء ، خضر اللواج .

٢٦١٥١ - مرثياني (F). Frénale (F).
Ash-grove or plantation (E).
مفري المران او حربة المران .

٢٦١٥٢ - مرثياني (F). Fraxinées (F).
سبط من فصيلة الزيتونيات اشهر اجناسه المران .

٢٦١٥٣ - مرثياني (F). Fraxinea (F).
Fraxinea (F).
فلوكوزيه يكثر بروجده في غاه المران . ويوجد ايضاً في
غاه القندل الهندي . يستخرج من اللحاء يده نفعها بالما
ولطائها . يلبوره ايري الشكل ابيض اللون . طسه مر
حريف . يلوب في الماء وفي الكحول .

٢٦١٥٤ - مرثياني (F).
المرب : الارض الكثيرة النبات .



مران كبير الزهر

٢٦١٨٢ - **مرتقيشية *** Martynia (S). Martynie (F).
جنس نباتات عشبية من المرتقيات. أنواعها قليلة، جميعها
أمريكية المنبت منها البرية ومنها الزينة. أوراقها متدقة
لا قياسه الشكل والارتكاز. أزهارها جيلة القلب،
زاهية الألوان، لا نظامية التجميع والارتكاز. ثمارها جراه
مقرنة الأطراف. احرف أنواعها وأشهرها ما يلي.

٢٦١٨٣ - **مرتقيشية حويلية** Martynia annua,
M. diandra (S). Martynie annuelle (F).
عشبة حويلية زباه غدية لزجة تملو من ٤٠ إلى ٥٠ سم.
أوراقها متدقة متقابلة قلبية الشكل، نصلها خلي البشرة
خماسي التنسيت. أزهارها بيض القنأة أرجوانية الأطراف.
ثمارها بيضية مالة قلتيه برألة متقادية الشكل قصيرة.
أزهارها يستمر من حزيران إلى تشرين.

٢٦١٨٤ - **مرتقيشية مخروطية** Martynia proboscidea (S). Martynie à trompe,
Bicorne trompe d'éléphant, Cornares, Ongles du
diable (F).
عشبة حويلية زباه لزجة تملو نحو ٩٠ سم. أوراقها متدقة
متقابلة قلبية الشكل، نصلها مستطيل الزناد خلي الصفحة
المتصبة المستعرضة التنسيت. أزهارها كبيرة القد، معوجة
القنأة، غائرة الأطراف الخامسة التفريش. قناتها إلى
البياض الاصفر المروج يطوئ تنسيت اغصن واجر، أطرافها
موجحة بالبنفسجي يملو مروج أرجواني. ثمارها غرطوية
الشكل تملو نحو ١٥ سم. || أزهارها يستمر من
حزيران إلى آب.

٢٦١٨٥ - **مرتقيشية صفراء الزهر** Martynia lutea (S). Martynie à fleurs jaunes, Bicorne
jaune (F).
عشبة حويلية زباه لزجة تملو نحو ٦٠ سم. أوراقها متقابلة،
متدقة، قلبية الشكل، مستديرة الطرف. نصلها خلي
البشرة مسن الخلفة. أزهارها عنقودية التجميع مذهية اللون
يطولها عند انشائها مروج آخر || أزهارها يستمر طوال
شهر آب.

٢٦١٨٦ - **مرتقيشية عطرية** Martynia fragrans (S). Martynie odorante, Bicorne
odorante (F).
عشبة حويلية زباه لزجة تملو من ٦٠ إلى ١٠٠ سم. أوراقها
متدقة متقابلة ثلاثية التفريش. نصلها خلي الصفحة
المقارنة التنسيت. أزهارها عطرية، بنفسجية اللون، أرجوانية
المشعة، منقارية التجميع. ثمارها تملو نحو ١٢ سم.
أزهارها يستمر من تموز إلى ايلول.

٢٦١٨٧ - **مرتقيشية كلبية** Martynia craniolaria (S). Martynie craniolaire, Craniolaire
(F).
عشبة زراعية حويلية زباه غدية تملو من ٥٠ إلى ٦٠ سم.
أوراقها متدقة متقابلة كلبية الشكل مسنلة الخلفة. أزهارها
بيضاء اللون كبيرة القد تملو نحو ٨ سم. ثمارها كبيرة
كرويس المصافير، غرطوية الزائدة. جلودها حنابية
الشكل، مأكولة ورتب.

٢٦١٨٨ - **مرتقي ومرتقي** Macératation (F).
Maceration (E).
نقع جسم صلب في الماء أو في سائل آخر ليئين أو لاذابة
بعض اجزائه الكيماوية.

٢٦١٧٢ - **مرتقيش، حخاديم** Dominé, Servant (F).
المرتقي والمرتقي به. هو الذي عليه حق ارتفاق لمعار آخر.

٢٦١٧٣ - **مرتقيش** Dominane (F).
المعار المرتقي أو المخدوم هو الذي ينتفع من الارتفاق.

٢٦١٧٤ - **مرتقي، مرتقي، مرتقي** Litharge, Protoxyde de plomb cristallisé (F). Li-
tharge (E).
هو بروكسيد الرصاص المنصهر المتبلور البرتقالي اللون.

٢٦١٧٥ - **مرتقيش الجنبعة، منجورم** Délinquant (F). Delinquent, Offender (E).
هو الذي يرتكب لملة يعتبرها القانون الجنائي جنحة
يعاقب عليها.

٢٦١٧٦ - **مرتقيشية *** Mertensia (S). Mertensie (F). Blue-bells (E). Lun-
genwurz (D). Mertensia (I).
جنس ليات من فصيلة الحمصيات معروف للترتيف باسم
الطيب مرتس (١٧٦٤-١٨٣١). أنواعه المعروفة ١٥،
جميعها عشبية معمرة. أصلها البلاد المعتدلة الحرارة.
أوراقها كاملة متقابلة. نصلها موجحة بنده شفافة. أزهارها
عنقودية التجميع. تويجات أزهارها انبوبية الشكل.
اشهر أنواعها الزينة ما يلي.

٢٦١٧٧ - **مرتقيشية قلبية** Mertensia ochioides (S). Mertensie vipérine (F).
عشبة من المرتقيات تملو نحو ٤٠ سم. ساقها وقرورها
مزقة اللحاء. أوراقها سنانة الشكل، نصلها خلي البشرة
حل مسطح. أزهارها كثيفة التجميع متوسطة القد لوناً
إلى الزرقاء الباقية || أزهارها يستمر من أيار إلى حزيران.

٢٦١٧٨ - **مرتقيشية سيبيرية** Mertensia sibirica (S). Mertensie de Sibérie (F).
عشبة عشبية من المرتقيات تملو نحو ١٠٠ سم. ساقها
وقرورها سرحة. أوراقها قلبية الشكل متدقة، نصلها
ناعم النسيج المتجمع. أزهارها بنفسجية اللون متصبة.
أزهارها يستمر من أيار إلى تموز.

٢٦١٧٩ - **مرتقيشية حنكالية** Mertensia paniculata (S). Mertensie paniculée (F).
عشبة من المرتقيات تملو من ٤٠ إلى ٦٠ سم. ساقها وقرورها
مهذبة اللحاء. أوراقها سنانة التصل المستطيل الضيق.
توزعها حنكلي التجميع غلاف سائر. أنواع جلها ١٠
أزهارها إلى الزرقاء الكلبية. تويجاتها خلي الصفحة، مسن
الخلفة. أزهارها يستمر من أيار إلى حزيران.

٢٦١٨٠ - **مرتقيشية فيرجينية** Mertensia virginica (S). Mertensie de Virginie (F).
عشبة من المرتقيات تملو من ٣٠ إلى ٥٠ سم. ساقها
وقرورها حنكالية. أوراقها اهليلجية مقطوعة تملو من ١٠
إلى ١٥ سم. وتعرض من ٥ إلى ٨ سم. أزهارها كبيرة القد
متعالية، لوناً إلى الزرقاء الجسيلة. أزهارها يستمر من
أذار إلى حزيران.

٢٦١٨١ - **مرتقيشيات** Martyniaceae (S).
Martyniacées (F). Martyniacées (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة القممالات. أجناسها
وأنواعها قليلة العدد، اشهرها المرتقيشية.



مرتسية



مرتسية



مَرْجَان



مَرْجَان



مَرْجَان



مَرْجَان



Pageau, Pagel (F). مَرْجَان ٢٦٢٠٠
هو القويدي، جلس سمك من فصيلة الاسبوريات.

Zoanthaires (F). مَرْجَان زَهْرِي ٢٦٢٠١
Zoantharia (E).
رَبِيَّة حَيَوَانَات بِحَرِيَّة عَدِيدَةُ الْفَصَائِلِ وَالْأَجْنَاسِ. مِنْهَا
جَسِيَّة الْإِفْرَازِ كَالْمَرْجَانِ، مَدَامُهَا فِسْحَةُ الْإِبْرَةِ تَتَكَثَّرُ
مِنْهَا الشَّعَابُ وَالْمُسْتَمَرَاتُ وَالْجُرُز.

Corallaires (F). مَرْجَانِيَّات ٢٦٢٠٢
شعبة حيوانات بحرية من صف المحرقات.

Barberidopsis corallina (S). مَرْجَانِيَّة ٢٦٢٠٣
Berbérídispe coral (F).
جنبة ترينيدية مصرية من فصيلة النشويات. ساقها سرمية
الفروع متسلقة تلمو من مترين إلى ثلاثة أمتار. أوراقها
أخضراء، متعاقبة، معتقة، قلبية الشكل. نصليها جامدة
الصفحة الأمامية، ملتبس التسنين الشالك. ازهارها حنقودي
التجميع، طرفي الارتكاز. ازهارها تسامية التلات والفصل،
ساحية الإسدية، مرجانية اللون، كروية الشكل،
متدلية || تنورها يستمر طوال فصل الصيف.

Coralline (F). مَرْجَانِيَّة ٢٦٢٠٤
شعبة تعنى ثور الماء، المظله.

Chaudière, Cuiseur, مَرْجَل ٢٦٢٠٥
Ebouillanteur (F). Copper, Boiler (E).
قدر كبير من النحاس أو الحديد يملأ فيه الماء.

Fronde (F). Sling (E). مَرْجَمَة * ٢٦٢٠٦
هي الصفحة السفلى من نصل ورقة البرخس حيث توجد
الحفاق. وقد تستعمل بصيغة الجمع قتل عمل مجسوة
الصفحات السفلى من أوراق البرخس الواحد.

Praticulture (F). مَرْجَمِيَّة ٢٦٢٠٧
المرجمية علم يبحث في زراعة المروج والمراعي.

Praticole (F). مَرْجَمِي ٢٦٢٠٨
نعت تعريفى يطلق على كل حشرة أو طائر أو حيوان
ملوَأه المروج.

Emergínula (S). مَرْجَمِيَّة ٢٦٢٠٩
Emergínula (F). Emergínula (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مملوَأة الأبريل
أمانيات الخياشيم الحلقية وفصيلة الصدفيات. أنوعها
المعروفة نحو ١٠٠ منها ٤٥ منتشرة في بحار البلاد المعتدلة
الحرارة. تعيش على الصخور قرب الشواطئ || أصدافها
شبه مخروطية الشكل، مضطربة السطح المحززة الخشنة،
شبه بيضوية الشكل، قطرها من ١ إلى ٣ سم. || أجسامها
صغيرة، رمية اللونية الفضفاضة، صغيرة
الرؤوس، كبيرة العين المجاطبة القائمة على قواعد اللواس
الانغرافية، لولاسها قصيرة، مخروطية. أصدافها وحيدة
مستعصمة، مبطنة بزوائد انبوعية الشكل.

Eplér (F). To ear (E). مَرْج ٢٦٢١٠
مرج أثدود: شرج منبله.

Etàgère (F). Whacnoe (E). مَرْكَلَة ٢٦١٨٩
رف مستقل لا يستند إلى سائط، ج مراكله.

Couvolo (F). مَرْكَلَة، مَحْفَضِيْن ٢٦١٩٠
Incubator (E).
مخس في سلة أو في صندوق وما أشبه ترشم فيه الدجاجة
الرفقاء حضانها. وهو أيضاً بناء تجمع فيه الخواضن والحضان.

Naz (F). Nosa (E). مَرْكَم ٢٦١٩١
المَرْكَم والمَرْكَم الْإِنْفَاقَ وَقَدْ كَثُرَ اسْتَدَاةُ إِلَى الْخِيَوَانِ.
ج مَرْكَمِيْن.

Faire paltre (F). مَرْج ٢٦١٩٢
To graze, to feed, to tend (E).
مرج الدابة: أرسلها رعى في المَرْج.

Prairie (F). مَرْج ٢٦١٩٣
Meadow, Grass-land (E).
أرض نسيحة معشوبة ينبت فيها العشب طويلاً أو يزار
وتمرج فيه الماشية أو يحش ويحفظ. نباتاته مختلفة
وعديدة أشبهها من القطنيات والنجيليات. والمَرْج قد
يكون:

Prairie artificielle (F). مَرْجَا صَنَعِيَا ٢٦١٩٤
Artificial meadow (E).
ترتكر أعشابه على القطنيات كالبرسيم والقمصة والباقية...

Prairie naturelle, Pré (F). Meadow (E). مَرْجَا طَبِيعِيَا ٢٦١٩٥
وهو المَرْج اللدوف بالمرعى أو المنتجع.

Prairie temporaire (F). مَرْجَا وَقْتِيَا ٢٦١٩٦
Temporary meadow (E).
هو الذي لا يبقى أكثر من بضع سنوات وتكون أعشابه
من النجيليات والقطنيات.

Pré-verger (F). مَرْج لَبَاس ٢٦١٩٧
Orchard-meadow (E).
مرج طبيعي غرس فيه شجر مشير كالأجاص والتفاح
للاستفادة من اللعب ولأثمار مأك.

Piezographe (F). مَرْجَجَاك ٢٦١٩٨
Piezograph (E).
المَرْجَجَاك جهاز يستعمل في قياس القوى الأمتازية وضغطها.

Faneuse (F). Hay-making (E). مَرْجَجَاك ٢٦١٩٩
أداة تستعمل في تقليب الأعشاب المحشوة اجتناباً لسطها
وتسبيلها في جلفها.

Sonde (F). مَرْجَجَاس ٢٦١٩٧
هو السبار، المظله.

Séismographe, Stomographe, Trometromètre (F). مَرْجَجَال ٢٦١٩٨
Séismograph, Tromometer (E).
آلة تسجيل الحزات الأرضية بما في ذلك مدة الزلازل وصفه.

Corail (F). Coral (E). مَرْجَجَان ٢٦١٩٩
سبون بحري من المنخ المحرقات وهو من الحيوانات الركنية
التي تعيش راحة على صخور وأصباح التفاح. إفرانها جسي
عديد الألوان يكثر فيه الأحمر القويدي (المَرْجَجِي)
من مابق وباهت. والأسود والأبيض. أما الأبيض
فنادر الوجود.

۲۶۱۳۲ - مِرْدَلِيَّات Mouche des nardasses (F).

حشرة من الذباب مشهورة باسم سرفيد النرجس .

۲۶۱۳۳ - مِرْدَلِيَّات Vanne (F). Sluice, Water-gate (E).

۲۶۱۳۴ - مِرْدَلِيَّات Oviscaptes (F). Oviscapt (E).

جهاز متح السرة أو المكنز في بعض الحشرات، ويحيط أشرة، أطليا .

۲۶۱۳۵ - مِرْدَلِيَّات Pal Injecteur (F).

Injecting tube (E).

أداة تحقن بها التربة لأغراض شتى اغصانها لتطهير والتسييد للملح للملاح .

۲۶۱۳۶ - مِرْدَلِيَّات * مِرْدَلِيَّات ، مِرْدَلِيَّات ،

Hygromètre (F).

Hygrometer (E).

أداة تستعمل في معرفة الرطوبة الجوية أي كمية بخار الماء الموجودة في الجو بالنسبة إلى درجة الحرارة .

۲۶۱۳۷ - مِرْدَلِيَّات شمعي ، مِرْدَلِيَّات شمعي

Hygromètre à chevaux (F).

مِرْدَلِيَّات يرتكز على تمدد وانكماش الشعر النباتي بالرطوبة

۲۶۱۳۸ - مِرْدَلِيَّات * Balance de précision (F).

هو ما يعينه ميزان القوة لانه دقيق التركيب يتأثر بكسور اللبغرام .

۲۶۱۳۹ - مِرْدَلِيَّات Circus (S).

Busard (F). Buzzard (E).

جنس طير من حمارة المزيات وصيلة الصقريات. أنواعه عديدة منتشرة في معظم انحاء العالم . جميعها من الكواس التي تقتنص القوافض والجربان والصائير والظلاء والحشرات. اجسامها متوسطة الحجم، طولها يراوح من ٤٠ إلى ٦٠ سم. اجنتها وارجلها واذاهاها طويلة . أوتهاها إلى البقعة المرقطة . تكمن في الاثجار الحرجية الباسقة أو على الحفصيف وفي أوتاب الصخور . انثاها تحضن من ٣ إلى ٤ فريانات مدة ٤ أسابيع || أشهر انولها الاربعة التالية .

۲۶۱۴٠ - مِرْدَلِيَّات البَطْلَاح * Circus strigiceps (S).

Busard blefard, B. des steppes (F). Pallid harrier (E).

طائر من المردة صغير الجثة، الجملد الثوب المرقط بالاسمر، اسيد المنسر ، احر البينين والرجلين . وهو من القوافض يألف السبب والبطلان، قوته الزخافات من مظاء وميات وديويات وبعض الحشرات .

۲۶۱۴١ - مِرْدَلِيَّات الدجاج * ، صكر الفيران

Circus cyaneus (S). Busard Saint-Martin (F). Hen harrier (E).

طائر من المردة، متوسط القد طويل الجناحين والرجلين والذنب . ثوبه إلى البقعة المرقطة بالاسمر، وهو اسيد المنسر ، اصفر البينين والرجلين . يصيد القوافض والصائير والفسادع والظلاء والحشرات ورايح الدجاج . يدخن وكه على الحفصيف بين القصب والزار .

۲۶۱۴٢ - مِرْدَلِيَّات الصائغ * ، دُرَّاج

Circus ceruginosus (S). Busard des marais, B. harpaye, B. des roseaux (F). Marsh harrier (E).

طائر من المردة، كبير الجثة طوله يراوح من ٥٥ إلى ٦٠ سم. ثوبه إلى الصبغة المرقطة . وهو من القوافض يألف



مردولة البرقوق



مِرْدَلِيَّات



مِرْدَلِيَّات



مِرْدَلِيَّات



مِرْدَلِيَّات

كيرتزان . زباناها عظيمان . ظهراتها لا يلاحظ كالمطير . بطنها مستطيل السمكة الشرجية المذبية الطرف || لها جيل واحد في الجيل . تظهر الحشرة الجملانة في اواخر نيسان ويمض حتى اواخر آب . تشرح في النهار . ثلثه في تموز || البرقة عند بلوغها الكمال الجسموي تطول نحو ١٢ م . جسمها مبطل الشكل ، مستطيل المقدم ، سداسي الرؤوس ، ضخم الرأس ، ضلع القفاير الذككية، اطحل اللون ، يسود في الرأس والشرج || طور الاكمال الذي يستمر نحو ٢٥ يوماً ينتهي تحت السماء مليقاً من كل غلاف .

۲۶۱۴۳ - مِرْدَلِيَّات * Mordellidae (S).

Mordellidae (F). Mordellidae (E).

فصيلة حشرات واسعة من رتبة غدييات الاجنحة || اجنتها وانولها المعروفة قليلة المدد مضطها من حشرات المناطق الحارة . خناتها تألف نباتات الفصيلة الحرجية . يرقاتها دامتة تعيش على المواد النباتية السائلة نحو الانحال || جميع حشرات صغيرة القد قلياً يتجاوز طولها ١٠ م . اجسامها لاقفاية الشكل . انحادها لا تلتص بطنها بالبقرة المستطيلة المذبة الاطراف الشرجية . لوناتها خضيطة ، مستطيلة ، مركبة من ١١ فصلة . ارساخ جرابها الخلفية رباعية المقل اما ارساخ الجراب الوسطى والامامية فخاصة || أشهر اجنتها المردلة والزلفوية والريسية .

۲۶۱۴٤ - مِرْدَلِيَّات ، مِرْدَلِيَّات Quenouille (F).

Distaff (E).

شكل من اشكال الهيكله المتينة في تشذيب بعض الاثجار الشجرة والثرينية || وللشكل المردني يكون اضيق قاعدة وجسماً من الرشي واكثر ارتفاعاً .

۲۶۱۴٥ - مِرْدَلِيَّات البَرِّقُون * Odonestis pruni, Gastropacha pruni (S).

Odonestis du prunellier, Bombyx du prunellier (F).

Odonestis pruni (E).

حشرة من فصيلة الحفصيات ورتبة حشرقيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الأقصى إلى اربوية . فراشتها صيفة تعيش على غزونها الاماني . سرتها تعيش على اوراق البرقوق والزهرور والاباصس ... جسمها مستطيل مكرم طويل نحو ٢١ م . بطنها نحو ٤٤ م . رأسها حطلي اللون . مينها كيرتزان . زباناها مشطيان . مرقها جمة . جوشها وبطنها إلى الحطلي الاكلاف || ريشها الاماميان إلى الحطلي الاكلاف ملوحة مابة حمراء وضعت مرقس اسمر ولقطة وسطى بضاء . ريشها الخلفيان إلى الحطلي الاثضع اهداباً إلى الشقعة || لها جيل واحد في الجيل . تظهر الغفراة في تموز . تشرح من الثروب إلى الثجر في اليالي المقترة . تماثل بده ظهورها بنصو اربعة ايام وتضع المكن لطخاً على مله الجلدول والاضافات || السرفة عند بلوغها الكمال تطول نحو ٤٤ م . جسمها شبه اسطواني الشكل . ثوبها إلى الحطلي الاسمر المالح يطولوا من الرأس إلى الشرج خط عريض من الملبب القصير تتخلله منه كل مفصل صيدي ضمة من الملبب المستطيل . منها وشرجها ودواجها كاسية . شرجها ينتهي بزاكمة صيرة لمثلوية الشكل || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينتهي تحت القشور وبين السماء ضمن صلجة يثقلها غشاء كالنخامة اغبر اللون .

٢٦٢٥٤ - **مرسوم** (F). Décret (F). Decree, Order (E).
هو كل قرار يصدره رئيس الجمهورية. وتختلف أسماء
المراسم باختلاف مؤسساتها فتكون جمهورية وسكوية
وعامة وتنظيمية وخاصة.

٢٦٢٥٥ - **مرسوم قانون** (F). Décret-loi (F).
Order in Council (E).
هو كل نص تشريعي يصدره رئيس الدولة في أثناء غياب
المجلس النيابي ويكون نافذاً كالقانون بشرط موافقة المجلس،
عند انعقاده، عليه.

٢٦٢٥٦ - **مرسونية** (S). Marssonina, Marsonia (S).
جنس فطور مجهرية من فصيلة الرغيفيات. يتميز بكتلاته
الشعاعية الثنائية الخالية البيضاء الشكل أو المستطيلة المنعقدة.
يركب الأوراق فيلطحها. قصبته أدمية الارتكاز تصعد
البشرة || أنواعه عديدة لكنها قليلة الأذى. أضرها ما يلي.

٢٦٢٥٧ - **مرسونية البرسيم** (S). Marssonina medtagnis (S).
فطر مجهرية من المرسونية يصيب البرسيم والقصة والنفل
في سوريا وأورانيا. مظهره الخارجي بطور صغيرة لا قياسية
الشكل، حنطية اللون، سمراء الاطار، تركيب السوق
والأوراق فتتوزع || يكافح بالخش عند ظهور الوم
ومنهم من سرح الماشية في المقاضب لترحائها.

٢٦٢٥٨ - **مرسونية التفاح** (S). Marssonina betulae (S).
فطر مجهرية من المرسونية يصيب التفاح في أورده.
مظهره الخارجي بطور صغيرة مستديرة شعراء اللون حنطية
الاطار لا قياسية الترتيب تركيب تفصل الأوراق حصل
صفحاتها العليا || أضراره زهيدة لا تستوجب المكافئة.

٢٦٢٥٩ - **مرسونية الحور** (S). Marssonina populi (S).
فطر مجهرية من المرسونية يصيب أوراق الحور وبصيلها.
مظهره الخارجي بطور متتابعة طحلاء اللون جوية الاطار
تركيب تفصل الأوراق وقد تشاهد يرقة تقصب الذبول
والاحبال.

٢٦٢٦٠ - **مرسونية الخس** (S). Marssonina panattoniana, M. perforans (S).
فطر مجهرية من المرسونية يصيب الخس فيؤذيه. مظهره
الخارجي يقع مستديرة لونها الى السمره ظاهراً من ٢ الى
٣ مم. تنمو مبررة على صفحات تفصل الأوراق الخارجية
ثم تمتد وتتلاصق وتركيب الأوراق الفواصة تلو الاخرى
حتى الساق || يكافح بتقلع النباتات الموصية وينفخ
التهابات الباقية بمحلول كربونات النحاس او سائل يورده
المحود المركز ٠.٨ ٪ || من الواجب تطهير البذار قبل
استعماله بواسطة الاغصن المكنيني (Vert malachite)
المركز ١ ٪.

٢٦٢٦١ - **مرسونية الصفصاف** (S). Marssonina salicicola (S).
فطر مجهرية من المرسونية يصيب أوراق بعض انواع
الصفصاف. مظهره الخارجي يقع لا قياسية الشكل والرحم،
مسنة الاطار، حنطية اللون، تركيب تفصل الأوراق
فتبدو كالبثور الرفافة || أضراره زهيدة لا تستوجب
المكافئة.

المنافع والبحيرات ويجاري الماء. قوته القواض والطيور
المائية والصفصاف.

٢٦٢٦٣ - **مرزة ومزده** (S). Circus cinereus (S). Busard cendré, B. de montagne (F). Montagn's harrier (E).
طائر من المرزة، متوسط القد، أبيض اللون المتباعد الرقعة،
أسود المنصر، أصفر العينين والرجلين. وهو من القواطع،
يألف الجبال والمنافع والبحيرات وشطوط الأنهار. قوته
الماء والصفصاف والحشرات.

٢٦٢٦٤ - **مرزة** (F). Rizière (F). Rice-plantation (E).
هي عملة الارز أو الارض المغروسة رزاً.

٢٦٢٦٥ - **مرزح، مسالك، مشحط** (F). Charasson, Echale, Etançon de vigne, Paiseau (F).
Vine-prop, Vine-stick, Stay, Shore (E).
مسند يستعمل للحم الكريمة أو لرفعها عن التربة.

٢٦٢٦٦ - **مرزوم، مرزوم** (F). Flamant (F).
Flamingo (E).
هو النعام من طير الماء، طويل الرجلين والرق، أبيض
المقار، في أطراف جناحيه سواد، اطلب نحام.

٢٦٢٦٧ - **مرزوم** (F).
الميرزومان نجان مع الشريرين.

٢٦٢٦٨ - **مرزوم الذرواع** (F).
مرزوم الذرواع نجم يتر يعرف أيضاً بالذرواع المبعولة، اطلبه.

٢٦٢٦٩ - **مرزويات** (F). Busards, Circiens, Circinés (F).
عارة طير من فصيلة البقريات. انواعها عديدة تتميز
بقدمها الرشيق الاحف. تناسرها صغيرة عجمية. سوطها
مستطيلة. اذناها بيضة. ارباغها مستعدة معتلة الطول.
غالبها عامرة || اخطائها العالم. تألف الاماكن الرطبة.
قوتها القواض والحشرات.

٢٦٢٧٠ - **مرسب** (F). Précipité (F).
المرسب والراسب واحد.

٢٦٢٧١ - **مرسوبيات** (F). Mérostomes (F).
Merostoma (E).

صف من المفصليات التحجيرات ترقبه الصنفي يأتي
بين الثريات والمكنيتيات || من هذا الصف يوجد
رتبة واحدة ماصرة تقوى مريدات الاذنان.

٢٦٢٧٢ - **مرسج** (S). Amphicomis (S).
Amphicome (F).
جنس غنطس من فصيلة العمليات ورتبة مندبات الاجنحة.
انواعه عديدة، اعطائها الشرق الاوسط. اجسامها متوسطة
القد زيا. رؤوسها قصيرة. قرونها الاستشارية صفحية
التركيب. ارباغها خاسية الفصل. اناتها اكبر قدماً من
ذكورها || تعيش على ثلاث الانواع والاوراق الفتية.
رقاتها مقبنة الشكل، سداسية الاربعل تعيش في التربة
على المواد العضوية والنباتية السائرة الى الانحلال.

٢٦٢٧٣ - **مرسن** (F). Nez des solipèdes (F).
Nose of soliped (E).
المرسن هو أنف ذوات الحافر.



مرزة المنافع



مرج



مرسونية البرسيم

٢٦٢٧٤ - مَرُوسَنَةُ ٥ Robot (F), Robot (E).

جهاز آلي يقوم مقام الانسان في انجاز بعض الاعمال .

٢٦٢٧٥ - مَرُوسُون ٥ Parasité

٢٦٢٧٦ - مَرُوسَدَةُ الْجَوَائِثِ

Observatoire météorologique (F), Meteorological observatory (E).

مكان مجهز بالعدة اللازمة لرصد العوامل الجوية .

٢٦٢٧٧ - مَرُوصِي ٥ Adhérent (F).

يقال لجوز مَرُوصَقٌ ومَرُوصِقٌ اذا تعلق خروج له .

٢٦٢٧٨ - مَرُوصُ ، وَهَم Maladie (F).

Illness, Diseases (E).

انحراف صحي سببه تقاوس الصفو من القيام بوظيفته على الوجه الاكل || الاوصام التي تصيب الحيوان والنبات حادثة منها داخلية وخارجية وطفيلية وبكتيرية . الخ .

٢٦٢٧٩ - مَرُوصُ البُتُونِ السَّازِي ، دَرُمِيَت Dermite (F), Pili-evil (E).

وصم سار يصيب الخيل والبقرة .

٢٦٢٨٠ - مَرُوصُ الحَرَاثِفِ Lépidorthose (F).

Lépidorthosis (E).

وصم جرثومي يصيب الاسماك بحراشفها .

٢٦٢٨١ - مَرُوصُ الْخُرُونَاتِ

Coccirose, Maladie du gros ventre (F).

وصم جرثومي يصيب الارانب خاصة والطيور الفداجة مفعلة .

٢٦٢٨٢ - مَرُوصُ الصَّخَنِ Bleime (F).

Sand-crack (E).

وصم يصيب باطن حافر الخيل .

٢٦٢٨٣ - مَرُوصُ الظِّلْفِ ، تَعَقُّنُ الظِّلْفِ

Necrosis bacillaris (S), Pétion (F), Foot-rot (E).

مرض معد يصيب اطراف الضبان .

٢٦٢٨٤ - مَرُوصُ الْفُطْرِ الشَّعَامِيِّ

Actinomycose (F), Actinomycosis (E).

هو الحاروش وصم يصيب الفواشي وينتقل الى الانسان . سببه الفطر الشعامي . مظهره قباب في الفك واللسان . حوافره هزال وضعف وحى وانخفاض في الوزن . وقد يمتد الى اشحاء الحيوان وظلمة جلده .

٢٦٢٨٥ - مَرُوصُ الْقَسَمَلِ Phtiriasis (F).

Pthitiriasis (E).

كل مرض جلدي سببه الحشرات من قمل وقراد...

٢٦٢٨٦ - مَرُوصُ الْمُتَمَمِّجَاتِ Spirillosis (F).

Spirillosis (E).

وصم يلقأ من وبادة المتصمجات في الدم .

٢٦٢٨٧ - مَرُوصُ بَكْتِيرِي Maladie bactérienne (F), Bacterial illness (E).

كل مرض سببه البكتيريا .

٢٦٢٨٨ - مَرُوصُ جِلْدِي ، دَرُمَتُوز Dermatoses (F), Skin disease (E).

تعبير شامل يطلق على جميع الاوصام الجلدية مهما كان سببها .

٢٦٢٩٢ - مَرُوسُنِيَّةُ الثَّقِيبِ ٥

Marssonina acerina (S).

فطر مجهري من المرسونية يصيب اوراق الثقيب وقد يمتد الى الاذنات والافناد . مظهره الخارجي يقع صغيرة مفرقة الزوايا تبلو سمراء اللون ثم تتحول نحو الصبغة البيضاء . تركيب نصل الوراق ولحاء الاذنات والافناد . انضارو زبيدة لا تستوجب المكافحة .

٢٦٢٩٣ - مَرُوسِيَرِيَّات Mercidées (F).

سبط من فصيلة الجرسيات يشمل الكثير من الاجناس والانواع معظمها بري وبعضها زراعي زينة .

٢٦٢٩٤ - مَرُوسِيَس Peuplier de l'Euphrate (F).

هو الخور الفراتي الجليل لشكله ، اطله .

٢٦٢٩٥ - مَرُوسِيَلَّة ٥ Marsilea (S).

Marsilée, Marsilie (F), Marsilea, Nardoo (E).

Marsilie, Kleeforn (D), Marsilea (I).

جنس نباتات حشوية مائية معمرة من فصيلة المرسيليات ، انواعها قليلة العدد . سوقها جذمورية ممددة تنسج في الماء . جلودها نحيلة تقور في السيل تقابلها اوراق مستطيلة الزناد رباعية الوريقات المتقابلة الغافية على سطح الماء . اشهر انواعها :

مرسيلة السنغال ٥ Marsilée senegal (S).

مرسيلة صغرية ٥ Marsilée pygmée (F).

Marsilée aegyptiaca (S).

Marsilée d'Egypte (F).

٢٦٢٩٦ - مَرُوسِيَلِيَّات ٥ Marsilicaceae (S).

Marsilicacées, Marsiliacées (F), Marsilicaceae (E).

فصيلة نباتية من المتصليات . اجناسها وانواعها عديدة ، جميعها اشواب جذمورية ممددة تعيش في اسماح المياه القليلة النور .

٢٦٢٩٧ - مَرُوسِيَس ، مَرُوسِيَن Myrte commun (F).

هو الآس الجربي ، اطله .

٢٦٢٩٨ - مَرُوص Terre imperméable (F).

Impervious earth (E).

هي الارض المسبكة التي اذا أسطرت سالت مريما ، ج مروض وامراض .

٢٦٢٩٩ - مَرُوصَاء Stérile (femelle) (F).

القدور من كل حيوان .

٢٦٣٠٠ - مَرُوصَاد ٥ Robotologie (F).

Robotologist (E).

من تعامل المروشة .

٢٦٣٧١ - مَرُوصَة * Arrosoir (F), Watering-pot (E).

وهاء لاسقاء بالرش .

٢٦٣٧٢ - مَرُوصَدَة ٥ Robotologie (F).

Robotology (E).

المروشة علم يبحث في تطوير الاجهزة الآلية وتمكينها من انجاز ما يقوم به الانسان من اعمال .

٢٦٣٧٣ - مَرُوصَت ، مَصَصٌ

Suoir, Trompe d'insecte (F), Sucker (E).

جهاز انبوي لثقب يمكن الحشرات من ارتشاف السوائل .



مرسيلة



مرصة

٢١٣٠٣ - مِرْعَاوِيلَا شَرِيبَة

Echinops tournefortii (S). Boulette de Tournefort, Echinope de Tournefort (F).

حشبة معمرة تملو من ١٠٠ إلى ٢٠٠ سم. سوقها خالية اللحماء، حلجها غطي مستطيل أكثره أبيض اللون وبضه أحر. أوراقها جامدة النصل الخامسي التفريش، والشالك الحلقه. أزهارها وردية وبيض، ورؤسها متوسطة القد.

٢١٣٠٤ - مِرْعَاوِيلَا لَرَجَة

Echinops viscosus (S). Boulette visqueuse, Echinope visqueux (F).

حشبة معمرة تملو من ١٠٠ إلى ٢٠٠ سم. ساقها كثيرة الفروع اللدنية الزبنة. أوراقها كبيرة القد، خدية التفريش، زغبية لتصل القد للزج، شالكة الحلقه، أزهارها غبراء اللون، ورؤسها صغيرة الحجم.

٢١٣٠٥ - مِرْعَاوِيلَا وَهِيَة

Echinops humilis (S). Boulette humble, Echinope humble (F).

حشبة معمرة قليلة الفروع تملو نحو ٦٠ سم. أوراقها قطعية البشرة حل صفحتها. أزهارها زائفة الزرقة، قطر الرؤية نحو ٤ سم.

٢١٣٠٦ - مِرْعَا

Porzana (S). Porzana (F). Porzana (E).

المرعة. ج. مرع. جنس طير من دجاجيات الماء وفصيلة التفصليات، أنواعه المروفة ١٦ جميعها من طيور العالم القديم. أجسامها متوسطة القد وصغيرة. أثوابها إلى الصبهة الخفيفة يعلوها رقيق أبيض وتبقي أسود || أعطائها تمتد من الحنك إلى الأروية ومن الصواري إلى مراكش. معظمها من القواطع يحوي منافع البلاد في طلب الرزق والمصيف والمشي. أحرف أنواعها وأشهرها المرعة الشائعة.

٢١٣٠٧ - مِرْعَا شَالِمَة * مِرْعَا مِرْطَة

Porzana maruette (S). Porzana marouette, Marouette (F).

طائر من المرع، قدوه قدر السباقي، ثوبه إلى الصبهة الخفيفة السمراء اللواح. رأسه متمش بالابيض. زوره ويطنه إلى البياض الناصع. صدره إلى الطحلة الخفيفة المراج. ظهره أسود التقيق أبيض الخمار. جناحه مجذع بالآخر. منقاره جالس الانكاز، اسر القاعدة، أحر الطرف. ساقه إلى الخضار الاسفر || وألف المنافع وضفاف البحيرات والأنهار. قوته الحشرات والبراقي وزهر النباتات المائية. مرتبه من الغروب إلى الظلمة ومن الفسي إلى الفجر. ينش منه وسط جم السعادي. أثناء تمضن نحو ١٢ بيضة.

٢١٣٠٨ - مِرْغِي

Chèvre d'Angora (F).

هو مازن انقره، اطلبه.

٢١٣٠٩ - مِرْعَوِي

Pratral (F). Meadow (E).

Embouche, Gagnage, Herbage (F). مِرْغِي

Pasture-land, Rich meadow, Grass-land (E).

مرج طبيعي تسوم الماشية أعشابه.

٢١٣١١ - مِرْعِي الحُوت

Clio (F).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات تدهى مرزوة، اطلها.

٢١٣١٢ - مِرْعَاد

Hygrophite (F).

نمت تمرغفي يطلق على كل نبات ينمو في المواقع الرطبة.

٢١٣١٩ - مِرْعِي دُودُ الْأَمْعَاء

Helminthiasis (F). Helminthiasis (E).

هو الملمتياز، وصم تسببه الديدان في الأمعاء.

٢١٣٢٠ - مِرْعِي ساري، مِرْعِي وَيِيل، وَيَاء

Maladie infectieuse (F). Infectious disease (E).

كل مرض جرثومي أو ميكروبي ينتقل بالمعدوى من حيوان إلى آخر.

٢١٣٢١ - مِرْعِي قُطْرِي

Maladie cryptogamique (F). Cryptogamic disease (E).

كل مرض تسببه الفطور، مجهرية كانت أو غير مجهرية.

٢١٣٢٢ - مِرْعِي سُعْدِي

Maladie contagieuse (F). Contagious disease (E).

كل مرض جرثومي أو ميكروبي ينتقل بالمعدوى من فرد إلى فرد.

٢١٣٢٣ - مِرْعَايِي

Siagogue (F). Siagogic (E).

نمت تمرغفي يطلق على كل مادة تسبب افراز الرضاب.

٢١٣٢٤ - مِرْعَاخ، مِرْعَاخَة

Concasseur (F).

هو الجاروش، اطلبه.

٢١٣٢٥ - مِرْطَاب، مِرْطَب

Hygromètre (F).

هو المرزاق، اطلبه.

٢١٣٢٦ - مِرْطَاب شَعْرِي

Hygromètre à cheveux (F).

هو المرزاق الشعري، اطلبه.

٢١٣٢٧ - مِرْطِيش، مِرْطُوشَة

Améchyta (F).

هو الكركمان، اطلبه.

٢١٣٢٨ - مِرْع

مرع ومرع المكان: انخصب بكثرة الكلا.

٢١٣٢٩ - مِرْعَان

Clématite toujours verte (F).

هو اللامي البني، اطلبه.

٢١٣٣٠ - مِرْعَاوِيلَا *، شُوكَة الْجِمَعَال

Echinops (S). Echinope, Boulette (F).

جنس نباتات برية عشبية من فصيلة المركبات الانبورية ازره. أنواعه عديدة منها الحلوية والحمولة والمصرة. سوقها فرماء. أوراقها كبيرة القد شالكة النصل. أزهارها رؤسية كروية الشكل || أحرف أنواعه وأشهرها ما يلي:

٢١٣٣١ - مِرْعَاوِيلَا زَرْقَاء

Echinops ritro (S).

Boulette azurée, Echinope azuré (F).

حشبة معمرة تملو من ٣٠ إلى ٧٠ سم. أوراقها كبيرة القد فلقية التفريش. نصلها اخضر الصفحة العليا المائلة، أبيض السفلى الخلفية، شالك الحلقه. أزهارها زرق. قطر الرؤية يراوح من ٣ إلى ٤ سم.

٢١٣٣٢ - مِرْعَاوِيلَا شَالِمَة، شُوكَة الْجِمَعَال الشاكع، وَهِي الْإِبِل، سَكَايِي

Echinope commun (F).

نوع من المرعاويلا، مشهور باسم دهي الايل، اطلبه.



مرعاويلا



مرعة شائعة

٢٦٣١٢ - مَرْغَعة

المرقة والمرغ : الروضة الكثيرة النبات .

٢٦٣١٤ - مَرْغُودُ الياسمين

Margarde du jasmin, Pyrale du jasmin (F).

فراشة من المرحشقيات وفصيلة الناريات مشهورة باسم نارية الياسمين ، يرتبطها مذبذبة .

٢٦٣١٥ - مَرْغُورِيَت

Reine Marguerite (F).
Queen Margaret (E).

نبات زينة حولي يعرف بالخنكار ، اطلبه .

٢٦٣١٦ - مَرْغُورِيَن

Margarina
زبدية صناعية مركبة من ادهان نباتية مع شحم البقر .

٢٦٣١٧ - مَرْغُوف

Marcgravia (F).

جنس نباتات برية وتربينية عارضة من فصيلة المرفغيات . منبتها التلويحي بعض مناطق امريكا الاستوائية || انواعه المعروفة قليلة العدد منها السريعة ومنها المتسلقة المارشة . اوراقها مزينة الشكل ، ابيدة ، متعاقبة . ازهارها عتقودي التجميع . ثمارها كروية ، جامدة ، حمراء اللون .

٢٦٣١٨ - مَرْغُوفِيَّات

Marcgraviaceae (S).
Marcgraviaceae (F). Marcgraviaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقين . اجناسها وانواعها متوسطة العدد . اصطلح بها بعض اصفاغ امريكا الاستوائية || نباتاتها متباينة الاشكال ، منها الاجبار والشجيرات والمتسلقات . اوراقها ابيدة ، متعاقبة ، جامدة النصال المسننة الاطراف . ازهارها لاقحيات التجميع منه الصيواني والمدقوي والسلي ، جميعها مستطيلة المالحق . ازهارها لاقحية الحجم . كذاوصها لانظامية التركيب منها الثنائية للفصل والثلاثية والحادية . عدد بتلات توجعها بمائل عدد الفصل . جميعها ملونة . ثمارها كروية ، ديوام ، جامدة القشور || اشهر اجناسها المرفغ .

٢٦٣١٩ - مَرْغُوعَة

Mérogonia (F). Marogony (E).
المرقة احصاف بويضة متساقطة بحويين متوي .

٢٦٣٢٠ - مَرْغُوعِي

Mérogonique (F).
Merogonic (E).

نعت تدرفعي يطلق على كل ما له صلة بالمرقة ككوك احصاف مرقي .

٢٦٣٢١ - مَرْغُوسَكة

Prolifiqua (F). Prolific (E).
نعت تدرفعي توصف به الاثنى الكثيرة النتاج .

٢٦٣٢٢ - مَرْغُول

Margulus (S).
Margule (F). Margulus (E).

جنس طيور بحيرة من فصيلة البطريقيات . انواعه المعروفة قليلة العدد . اصطلح بها مناطق الدائرة القطبية . لا تركه الم الى اليابسة الا في زمن الترخيم والحياة . الرحالة القطبية تلقبها بطير الجليد || ملجئها الحياتي جاحي . اسرابها وافرة العدد . قوتها الحوام والخشرات والدعاصيص والقشريات والاسماك الصغيرة || اشهر انواعه وامرؤها واعما انتشاراً المِرْعُولُ القَرْمُ أو المِرْعُوشُكة .

٢٦٣٢٣ - مَرْغُولُ قَرْمٍ ، مَرْغُولَة

Margulus alie (S).
Margule nain (F). Little suik, Dovekie (E).

جنسها صغير لثقة ، يطول من ٢٠ الى ٢٢ سم . رأسها مستدلاً جرم ، قصير المتقاد الاسود . حذقة منها كسائية الابن . ذنبها مخروطي الشكل . قصير . ويغاما الى السمرة والصفرة اللوام . ثوبها الصفيبي اسود الرأس وازداد والذنب السفلى من الجناح . اباهرها بيض الاطراف . ثوبها الشتوي يتقلص فيه الاسود ليشمل كله الاكعب || الاثنى ايزر قداً من الذكر ويحتل بنفس الثوب . ملجئها لثقة بين حضور المهادح . الاثنى تحضن بمناوبة الذكر بيضة واحدة شبه اجاصية الشكل ، اصفر من بيضة الدجاجة . الترخيم يستمر نحو اربعة اسابيع والصغير يحوم على سطح الميم بعد التلق باسبوع .

٢٦٣٢٤ - مَرْغُوي

Casarca (F).

هو الشهران ، طائر من الدمل مشهور باسم ابو فرقة .

٢٦٣٢٥ - مَرْغُوي ، سينور بتري

Felle tigrina (S).
Margay, Chat tigré (F). Margay (E).

حيوان لاحم مفترس من فصيلة السنوريات . موطنه بعض اصفاغ امريكا الوسطى والبرازيل . يألف الاسراج ولا يبتعد عن الماء حيث يكثر قصه . ملجئها الحياتي غري اي ان الذكر يكوم عدة اناث || جسمه احيف النوام وشعرها يطول نحو ٨٥ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ٢٨ سم . رأسه مستدل الجرم . اذناء صغيرتان ، مستديرتان كاسيتان . عيناه صغيرتان مكملتان . ثوبه الى الصبهة الصفراء ويلوحها بتيجيح وتندبر اسود . صدره الى الصبهة البتراء المشيرة بالاسود . بطنه الى الصبهة الخفيفة المرقشة بالاسمر . ذنبه متتابع الاطراف السود || سرعه دجوي . يتسلق الاشجار بفعلة ويمدو على الارض بسرعة . قوته الطير والجوزان والقدار والذخايف والفتاقد .

٢٦٣٢٥ - مَرْغُوط

Erodium à feuilles de bryone

هو الجزأب الفاشري الورق ، اطلبه .

٢٦٣٢٦ - مَرْقَاع

Grue (F). Crane (E).

آلة رافعة ، تفيض الانتقال وتنقلها .

٢٦٣٢٧ - مَرْقَع

Élévateur (F). Elevator, Lift (E).
جهاز ثابت أو لتدال يستعمل في رفع وتنسيف الجرايل والستاديق والبالات الخ .

٢٦٣٢٨ - مَرْقِيق ، مَرْقِيق

Coudé (F). Elbow (E).

موصِل للدراع من الحديد . ج مرقاق .

٢٦٣٢٩ - مَرْقِيق

المرقق نجم ثير من كوكبة سيلاس .

٢٦٣٣٠ - مَرْقِيقُ الثَرِيَا

مرقق الثريا نجم من كوكبة الجبار .

٢٦٣٣١ - مَرْقِيقِي

Coudé (F). Elbow (E).

شكل من اترباتي ، قائم لقزاية ، يشبه المرقق .

٢٦٣٣٢ - مَرْقِيق ، مَرْقِيق

Morphine (F).
Morphia (E).

مادة شبه قلوية غدرة ويسكنة تستخرج من الافيون .



مرغول



مرقي

Composante (F). ٢٦٣٤٩ - مَرَكَبَة
Component (E). وهي قد تكون اقلية أو راسية .

Centre, Point central (F). ٢٦٣٥٠ - مَرَكَز
Centre, Middle (E). هي نقطة الدائرة .

Centre de gravité (F). ٢٦٣٥١ - مَرَكَزَ النِّقْل
Centre of gravity (E).

٢٦٣٥٢ - مَرَكَز الدَّائِرَة ، نُقْطَة الدَّائِرَة
Centre d'un cercle (F). Centre of circle (E).

Centre astatique (F). ٢٦٣٥٣ - مَرَكَز مُطْلَق
Astatic centre (E).

Accumulateur (F). ٢٦٣٥٤ - مَرَكَم
Accumulator (storage cell or battery) (E).

Pot (F). ٢٦٣٥٥ - مَرَكَن ، قَارُورَة
وهو من فخار تزوع فيه النباتات أو تستنبت ريشاً تنقل
إلى مستقرها . ج مراكن وقوارير .

Investi (F). Invest (E). ٢٦٣٥٦ - مَرَكُون
نمت تعريفى يطلق عل الاموال ، اخصها غير التقديرة ،
المبسطة لعل ما او المشروع معين .

Merlus, Merluccius (S). ٢٦٣٥٧ - مَرَلُوش
Merluce (F). Hake (E).

جنس اسماك بحرية بيوضة من فصيلة الفلادسيات . اصلها
بحار البلاد الحارة والمتصلة بالحارة || اجسامها اهليجية .
رؤوسها كبيرة . اشدافها مسلحة بسانان قوية هربية
الشكل . زعانفها الظهرية والشرجية مستطيلة الشكل ،
خالية من الناحس الشائكة || انواعها المعروفة اثنان المرلوش
البلبل الذي يكثر وجوده في البحر الابيض المتوسط
والمرلوش الامريكى المعروف أيضاً بمرلوش الشيلي .

٢٦٣٥٨ - مَرَلُوش صَدَلُوش
Merluccius merluccius (S).

Merluce commune, Merlu (F). Common Hake (E).
نوع من المرلوش . سمكة بحرية بيوض مقشرة نعمة يكثر
وجودها في البحر الابيض المتوسط || سرها واقر العدد .
سرسها عرض البحر خارج المياه الاقليمية ، لا تقترب
من الاحاد الا في زين التشرة || جسمها شبه اهليجي
الشكل ، بطول من ١٠٠ الى ١٣٠ سم . رأسها كبير
الجرم . ثوبها الى الطحلة الثبراء السفهاء الموج . غطها
الاجناني اسود . بطنها الى البرة البيضاء || زعانفها الظهرية
اثنان . زعنفتها الشرجية واحدة || لحمها جيد الصنف .
كبدها وافر المادة الزيتية الجيدة .

٢٦٣٥٩ - مَرَمَحُون
Amaraque (F). هو المرء ، اطلبه .

Germandrée ambrée (F). ٢٦٣٦٠ - مَرَمَحُون
هو الطوقيون الكوربي ، ليات عطري مدي مقو
للأصصاب ويغيد لها . وهو منه وقابض ويضاد للتشنج .

Babine, Babouine (F). ٢٦٣٦١ - مَرَمَة ، مَرَمَة
Lip (pendulous) (E). المرة والمرة : شفة البقرة وكل ذات ظلف لانها ترتم بها .

Barbe du blé (F). Beard (E). ٢٦٣٣٣ - مَرَق
هي سمكة السبلة وتسمى سفا وشام . ج أمراق .

Puccinia ٢٦٣٣٤ - مَرَق
وصم نظري يمتري النبات ويؤذي ، اطلب سحام .

Progression (F). ٢٦٣٣٥ - مَرَقَة
هي التوالية وقد وضمتها لانها تلوي سنى التوالي والمزيد
وهو المطلوب .

Uranomètre (F). ٢٦٣٣٦ - مَرَقَاع
Uranometer (E).

جهاز يستعمل في تقدير المساحات الفضائية ان بين
الكواكب او بينها وبين الارض .

Aplatisseur (F). ٢٦٣٣٧ - مَرَقَاك * ، مَرَقَاكَة
Grain-crushing mill (E).

آلة لتريق الحبوب المليفة ، مركبة من اسطوانتين تتوران
في اتجاهين مماكسين تسحق الحبوب التي يمر بينها دون
ان تكسرها .

Apode (F). Apod (E). ٢٦٣٣٨ - مَرَقَال
هي الحشرة العديمة الارجل . ج مرقاليل .

Télescope (F). ٢٦٣٣٩ - مَرَقَاب ، رَاصِدَة
Telescope (E).

آلة مجهزة لرصد كواكب الفلك وسياراته ونجومه .

Stalle (F). Stall (E). ٢٦٣٤٠ - مَرَقَد
شقة الفرس الواحد في الاصطبل .

Pyrite (F). Pyrites (E). ٢٦٣٤١ - مَرَقَشِيَتَا
هو كبريتور الحديد ويكون اصفر اللون او ابيض .
واحد بيريت .

٢٦٣٤٢ - مَرَقَى عَشْرِي ، مَقْيَس عَشْرِي
Echelle décimale (F). Decimal scale (E).

Dosim (F). ٢٦٣٤٣ - مَرَكَاك * ، مَرَقَاك
Dosimeter (E). جهاز المراككة او قياس التركيز .


Sarcloir (F). Spud (E). ٢٦٣٤٤ - مَرَكَاش
اداة لركش التربة ، يستعمل باليد .

٢٦٣٤٥ - مَرَكَب الفرس
مركب الفرس يتم نحر من كوكبة السفينة .

Composé (F). Composé (E). ٢٦٣٤٦ - مَرَكَب
Multiple (F). ٢٦٣٤٧ - مَرَكَب

Compositae (S) ٢٦٣٤٨ - مَرَكَبَات
Composées (F). Compositae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين وسيدة القمامة سفلية
الاسدية . تتميز من اكبر الفصائل النباتية ، اناؤها حدة
آلاف تجمعها ثلاثة اسباط : الشعامية وانبوية الزهر
ولسنية الزهر . منها الاجار والشجيرات والجنات والاشعاب .
حصارتها مألوفة او لينة . اولفها متعاقبة او متعاقبة .



مرقال



مرقاب



مرلوش مبدول

٢٦٣٨٠ - ميرهاة *
Hypsometre (F).
Hypsometer (E).
جهاز آلي يمكن المرء من تحديد ارتفاع المكان أو الشيء .

٢٦٣٨١ - ميرهاة
نمت وصني يطلق على الاسكة القليلة الشجر كقولك حديقة مرهاة أو غابة مرهاة أو أرض مرهاة .

٢٦٣٨٢ - مرهبل ٥
Impondéré (F).
Unweighed (E).
المرهل ما كان عادم الوزن أو القياس .

٢٦٣٨٣ - مرهكة
Etang artificiel (F).
Artificial mere, A. pond (E).
هور صناعي تخزن فيه مياه الشتاء .

٢٦٣٨٤ - مرهم
Liniment, Onguent, Pommade (F). Liniment, Unguent, Ointment, Pomade (E).
مركب دهنى يخلط بمختلف العناصر والالوان، استعماله خارجي.

٢٦٣٨٥ - مرور
Quartz
ضرب من الصوان يختلف الاشكال البلورية والاحجام للثباتية .

٢٦٣٨٦ - مرور* ، حقيق الشيوخ ، خربتاش ، مرماحوز ، برده كوش معقد ، زغبير

Origianum maru, O. amaracus, Majorana maru (S).
Amaraque, Marjolaine vrale (F). Amaracus (E).
Amarakuschubline (D). Amaraco (I).
بجلة معمرة صطوة برية وزراعية من فصيلة الفويات .
تتلو من ٢٠ الى ٥٠ سم . ساقها وفروعها جزوية اللون .
فروعها منفرجة مسترسلة . اوراقها لائقة كاملة اهليلجية ،
نصلها خلي البشرة على صفحتيه . ازهارها سنبلية التجميع .
ازهارها قليلة العدد وودية اللون || ينبت من التوابل
وهو مقو للعدة ، منه ، طارد الرياح . يستخرج منه
بالتقطير زيت طيار كافوري الرائحة له استعماله الطبي .

٢٦٣٨٧ - مروكة
Maerus (S).
Maerus (F). Maerus (E).

جنس نباتات بجملية وجبلية معمرة من فصيلة الكريات .
انواعها المعروفة نحو ٢٠ منبتها بعض المناطق الافريقية
اغصنها المشرقة على البحر الابيض المتوسط || ساقها فروع .
اوراقها بيضيه النصال الجاهدة ، صغيرة الربيبات .
ازهارها صفودي التجميع .
من الابيض الى الاصفر والاحمر والاريجاني . ثمارها
منية ودية البلور أو شعية || تنويرها دهنى .

٢٦٣٨٨ - مروكاز ٥ ، بارومتر
Baromètre (F).
Barometer (E).

جهاز خاص وضع لقياس الضغط الجوي وهو يتكون
عادة من وعاء للزئبق وانبوبة شمية ترفس في الوعاء وسام
دقيقة ينقل منها الهواء وسواقي مدرج يدل على ارتفاع
الضغط أو انخفاضه .

٢٦٣٨٩ - مروكاز مسجل ٥
Baromètre enregistreur (F). Registrer barometer.
Self-registering barometer (E).
مرواز جهاز بالعدة اللازمة لتكوين انفعالات الضغط الجوي.

٢٦٣٨١ - مرهكة
Clapier (F). Hutch (E).
اقفاص الارانب وكل مكان خصص لتربية الارانب
وتكاثرها .

٢٦٣٨٢ - مرهكة *
Coregonus marana (S).
Corégone, Marène (F).

سمكة نهرية من مفتحات المائنة وفصيلة السلمونيات .
اصطادها معظم بحيرات الشرق الاوسط وادوية الوسطى ||
جسمها متوسط القد ، متدل التبطيط ، بطول نحو ٣٠ سم .
نورها الى الزبداء الفضية المواج يبقى في الرأس والظهر ويغير
في البطن . زعنبتها الخلفية غائبة ، شبه هلالية الشكل ||
لحمها ان مدخن او ملح رائع السوق في ادوية الوسطى .

٢٦٣٨٣ - مرهكة
Mochringia (S). Méringie (F).

عشبة معمرة من فصيلة القرنفليات . مهدا حشاب وريام
بعض التام البحر الابيض المتوسط . ساقها نخيلة وريام
اوراقها سنائية بطول من ٢ الى ٣ سم . نصلها مقعرة
السطوح ، بحرية الخضار . ازهارها بيضاء اللون ، صغيرة
القد . ترفس في المواقع الوعرة والاثربة الكلسية || تنويرها
يستمر من حزيران الى آب .

٢٦٣٨٤ - مرهكة
Laurière (F).
كل مفع تكثر فيه اشجار اللند اي القار يدعى مرهكة .

٢٦٣٨٥ - مرهكة
Maranta (S).
Marante (F). Arrow-root plant (E). Arrowroot-
pflanze (D). Cannacoro, Erba da freccle (I).

جنس نباتات جندومية برية وزراعية من المرنطيات
وفصيلة الزنجبليات . انواعها المعروفة خمسة ، منبتها المناطق
الحارة . اوراقها كبيرة القد مستطيلة الزيد الحاشية . نصلها
سنائي الشكل بارز المروى . ازهارها سنبلية بارز عقدونية
التجميع بيضاء اللون || اعرف انواعها واشهرها الثلاثة
التالية .

٢٦٣٨٦ - مرهكة اسلية
Maranta juncea (S).
Marante élancée (F).
نوع من المرنطة الزراعية ترفس في الاربة الرطبة . اوراقها
سنائية كبيرة منتقصة . شاربونها الزهرية تملو من ١٠٠
الى ١٥٠ سم . ازهارها سنبلية التجميع || جذاميرها
دقيقة مستطيلة قليلة المادة النشوية .

٢٦٣٨٧ - مرهكة قصيرة* ، ارونو
Maranta arundinacea (S). Marante arundinacée (F).
نوع من المرنطة الصنعية الشائعة الاستعمال ، تزرع من
اجل جذاميرها النشوية الغالب التي يستخرج منها الارونو
وهو نوع من النشا النذالي ، دقيقه يجرى :

١٠٢٥ ٪ من المواد الاثرية
٠٢٢٠ ٪ من المواد الدهنية
٨٥٠٢٥ ٪ من المواد النشوية والسكرية

٢٦٣٨٨ - مرهكة هندية *
Maranta indica (S).
Marante de l'Inde (F).

نوع من المرنطة الزراعية ترفس في الاربة الهذلية الحشبة .
يستخرج من جذاميرها الارونو الهندي الجيد الصنف
والانتاج الذي يحتل المركز الثاني بعد الارونو الصيني .

٢٦٣٨٩ - مرهكة
Marantacées (F).
Marantaceae (E).
سبط من فصيلة الزنجبليات ، اشهر اجناسه المرنطة .



مرهكة



مرهكة قصية



مرهكة هندية



مرهاة



مرو



مرواز



مرواز مسجل

Palimpestris or, * مَرَّوْش الحَمَزُ *
Cymatophora or (S). Cymatophora or, l'Or (F).
Palimpestris or (E).

حشرة من فصيلة الشمرقيات ورتبة شمرقيات الاجنحة .
موجتها بحث من الشرق الاسود الى اوروبا . فراشيها واسعة
قوتها رقيق الاضرار . مرشها تعيش على اوراق الخور
والصنصنصا || جسمها وبني الشكل يطول نحو ١١ م .
يسقطها نحو ٣٤ م . رأسها حليق اللون . عيناها كبيرتان .
زباناها خطيتان . مرشها مثلث الطول . جوشنها وبطنها
الى الخنطلي الملعب المراج || ورشها الاسمان الى الخنطلي
الاثير تملوه رقة الى الصخرة وتطوط معتزلة الى السرة .
ورشهاا الخنطلي الى الخنطلي الكاكت الملعب المراج
تملوه حجة وسطى هلالية سمراء || لها جيلان في الحول .
تظهر فرائة الجيل الاول في نيسان وتظهر فرائة الجيل
الثاني في تموز . كسر من العصر الى فصحة الليل . تماطل
به ظهورها بنمو اربعة اسابيع وتفتح المكن لطفا على
الصنصنصا السفلى من نصال الاوراق || السرة عند بلوغها
الكامل تطول نحو ٢٦ م . جسمها شبه اسطواني الشكل ،
مائل للقتار . ثوبا الى الخضار البحري الجرد بالابيض
والاصفر . رأسها جزوي اللون . مدنها ورواجها الى
السرة || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوما
يتقضي ضمن صلبة تحميها السرة تحت القشور او بين
شقوف الحاء .



مَرَّوْش التبع



مَرَّوْش الحور

Laité (F). Soft-wood (E). * مَرَّوْش *
كل سمكة ذكر لا يزال جرابها الشفني مليء بالروث
تمت بالروث . كقولك طرمتوج مروي .

Irrigée (F). مَرَّوْشِي ، مَرَّوْشِي *
Irrigated (E). هو النبات أو الزرع الذي يسمي .

Oesophage (F). مَرَّوْشِي *
Oesophagus, Gullet (E).

جزء من انبوب الحضم مركز بين البلعوم والمعدة .

Anémomètre (F). مَرَّوْشِي ، مَرَّوْشِي *
Anémomètre (E). جهاز يحدد مهب الريح وسرعته وشماله .

Rentable (F). مَرَّوْشِي ، مَرَّوْشِي *
Profit-earning (E).

كل استثمار يعود له صاحبه بإيراد سنوي يغطي الاكلاف
ويؤتي بعض الدائل الصافي .

Prolifère (F). مَرَّوْشِي ، مَرَّوْشِي *
Proliferous (E).

صفة الشيء الذي يتكاثر . ونعت تعريفي توصف به الازهار
والثآليل التي تنبت باطن موزة .

Mars (F). مَرَّوْشِي ، مَرَّوْشِي *
Mars (E).

كوكب سيار من الفلكس ينتمي الى مجموعة النظام الشمسي .
يمده من الشمس يأتي بعد الارض . لونه الى الصفار الاحمر .
جرمه يقل عن جرم الارض نحو ٧ مرات وكذلك نحو
عشر مرات . سرعة دورته الانتقالية في الفضاء نحو
٨٧٩٦٦ كيلومتر بالساعة . دورته الفلكية حول الشمس
تستغرق نحو ٦٨٧ يوما . دورته المحورية الذاتية تستمر



مَرَّوْش

Balloea (S). مَرَّوْشِي *
Baliota, Marrube (F).

جلبس نباتات عشبية بوية ميمرة من فصيلة الشفويات .
انواعه المعروفة متوسطة المدد . اصطناعها تشمل بعض مناطق
الشرق الاسود والاحد واروية وافريقية الشالية || سوفيا
عفائية فراءه تملر من ٣٠ الى ٨٠ سم . اوراقها متعاقبة ،
اهليلجية النصال الخشنة المسننة الختار . ازهارها محوري
الارتكاز . ازهارها بيضاء اللون وبها الابيض الاصفر
المراج . ازهارها واوراقها فواحة البرق للاستصحب ||
تؤثرها سيلي .

Eventail (F). مَرَّوْشِي *
Fan-shaped (E). شكل من اشكال تقليم الشجر ، يشبه المروسة .

Palmier éventail (F). مَرَّوْشِي *
هي اللؤلؤ نوع من التخلل التريبي .

Flabellé, Flabelliforme (F). مَرَّوْشِي *
Flabelliform (E). نمت وصني يطلق على ما كان شكله كالمروسة .

Stylot (F). مَرَّوْشِي *
كل انبوب من مججمة الانابيب التي تشكل قلم اللقطة
في الزهرة . وهو محور البكرة والحديدية التي تدور في الجلام
وكل نصل دقيق مثلث . ج مرلود .

Xiphosures (F). مَرَّوْشِي ، مَرَّوْشِي *
رتبة من المفصليات الشيفينية الميرتويات . نصالها
واجناسها وانواعها كثيرة المدد . منظمها الساحة من
متحجرات الاحقاب الاول || المعاصر منها الآن فصيلة
واحدة تدعى لميطيات .

Epithrix parvula (S). مَرَّوْشِي ، مَرَّوْشِي *
Flea beetle (E).

حشرة من مفصليات الاجنحة وفصيلة الخنازريات . جسمها
صغير القد يطول نحو ٣ م . ثوبا الى السرة المابقة .
وفي من الحشرات التي تطير وتقفز حسب تقفي الحاجة .
اجسامها الحولية تراوح من ٢ الى ٣ . اناثها تمتع المكن
على الاحصاب البرية ينبت من رقات دقيقة تحمله غبار
اللون يبلغ طرفه عند كمال تطورها نحو ٤ م . || ازهارها
تمد الى الحفرة والبرقة . الحفرة تقضم نصال التبغ على
صفحاتها العليا في المشتل وعلى صفحاتها السفلى فيالحقل
تقتو الاوراق ويحط من قوتها . اما البرقة التي تعيش
على المواد العضوية في التربة فانها لا تتأخر عن قرض
جلود الشتلات الثالثة || مكافحتها نظرا لسرعة حركتها
واختباثها في التربة وبين الاحصاب تبدأ بتنظيف المشتل
او الحقل من جميع الاحصاب البرية واذا كان لا بد من
دواء فيجب ان يكون شديد الفعالية . كاخضر باريس
وزرنايات الرصاص والروتينون .

Rejet, Rejston (F). مَرَّوْشِي *
Shoot, Sprout (E). هو الرود والفصيلة والبتلة والقرع وقد يحسن تخصيصه
بركة النبات المخشوب .

مريضة في المسانف ، عارضة في الغابات حيث يبلغ طولها نحو ٥٠ متراً . ثمارها رشيعة الجراب الذي يطول من ٣٠ إلى ٤٠ سم . ويعرض نحو ٤ سم . بزورها كثيرة العدد ، صغيرة القد ، مستطيلة الشكل ، لونها إلى السرة الصنائية يملؤها تبييض ذهبي . رائحتها صريحة ، مقنة . طعمها يبدو كطعم البنوت ثم يتحول فوراً إلى مرارة العظم || يستخرج منها نحو ٢٢٪ من الدهن الجمالي الطبي الأخضر اللون .

٢٦٤٢١ - مريضة الغابون ، مريضة لطيفة

Sterophantus gratus (S). *Sterophante agréable* (F).
نوع من المريضة . مهدا الغابون وبعض مناطق نيجيريا الجنوبية والكونغو . جنبها داسية أو سريفة في المسانف ، عارضة في الغابات . ثمارها متوسطة الحجم . بزورها اهليلجية الشكل ، تطول من ١٢ إلى ١٥ سم . وتعرض من ٣ إلى ٥ سم . لونها إلى السرة الكستانية الزيتية المزاج . رائحتها صريحة ، مقنة ، لا تقبل الانقباض . طعمها شديد المرارة مثل الاول || يستخرج من بزورها نحو ٣٤٪ من الدهن الجمالي الطبي الأخضر اللون .

٢٦٤٢٢ - مريضة تشاد ، مريضة كعب

Sterophantus Kombe (S). *Sterophante de Kombe* (F).
نوع من المريضة ، مهدا مناطق تشاد وبيجيات افريقية الوسطى . جنبها داسية في المسانف ، عارضة في الغابات . ثمارها اصفر قدماً من ثمار مريضة السودان اما بزورها فانجم وقد يبلغ طولها نحو ٣٠ سم . لونها إلى السرة الخضراء المزاج . رائحتها قليلة الصراخة النوية . طعمها شديد المرارة || يستخرج من بزورها نحو ٣٠٪ من الدهن الجمالي الطبي الأخضر اللون .

٢٦٤٢٣ - مريضة * Histiotecthis (S). Histiotecthis (F).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات وأسد الارجل وفصيلة الراسيات . انواعها المعروفة قليلة أعطتها بعض مناطق البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي || اجسامها جرابية الشكل مستطلة الاقطاب . هيونها كبيرة ماصة . زعانفها طرفية نصف دائرية الشكل . رؤوسها اسطوانية كبيرة مندرجة مع الاجسام . جرابها متباعدة الاشكال منها ستة محطة وعضية متساوية الطول واثنان طويلتان محصتان واثنان مستطيلتان تلتصبان برس ستانية الشكل عادمة الحاجم .

٢٦٤٢٤ - مريضة Myrris (F).

هو السرفال الطري ، اطبه .

٢٦٤٢٥ - مريضة Fertile (F). Fertile, Fruitful, Rich, Fat (E).

صفة الحصب في التاج والانتاج والثمار والواتا .

٢٦٤٢٦ - مريضة * Laemargus (S). Laemargus (F).

جنس اسماك بحرية ولودة من فصيلة السمنديات . انواعها المعروفة اربعة ، منها لومان بحويان بحار الشمال ونوع محبوس المحيط الهندي والاربع يحبوس البحر الابيض المتوسط وهو اصفرها قدماً لانه لا يعطي اكثر من متر بينا الانواع الاخرى تطول من ٤ إلى ٦ امتار || وتتميز مريضة

نحو ٢٤ ساعة و٣٠ دقيقة || والمربيع كالارض له بحار وجو ويوم في تلكه قران « مريضة » و« مريضة » ، دورة الاول تستمر نحو ٧ ساعات و٣٠ دقيقة ، ودورة الثاني نحو ٣٠ ساعة و٢١٠ دقيقة || والمتمجمون يسمونه النحس الاصفر لانه دون زمل في النحوية . واضافوا اليه البش والقتل والتهرب .

٢٦٤١٦ - مريضة المادة الصلبة البيضاء الكاثية في جوف القرن .

٢٦٤١٧ - مريضة * Pieris (S). Pieride (F). Yellow succory (E). Bitterich (D). Pieride (I).

جنس نباتات عشبية طيبة من فصيلة المركبات اللبينة الزهر . انواعها عديدة جميعها برية . سوقها فراء غزيرة المصارة اللبينة المرة الطعم . اوراقها متعاقبة ، لاطقة ، متباعدة الشكل صغيرة القد . نصليها مشاري الحافة خلي البشرة على صفتها ، بحري اللون . انذارها رؤوسية جويصة الصغار || والمرير يزيل الجرب والحكة ويهدد البيل وينفع من ضمت الكبد والقصة وإذا اخذ مع التوتوة فتحت الحصى والطلق البيل وهو يصدح وتصلحه الكثيراء .

٢٦٤١٨ - مريضة Chondrilla (F). Chondrilla (E).

هي الخنثويل ، نبات طبي ، اطبه .

٢٦٤١٩ - مريضة * جيفلكة Sterophantus (S). Sterophante (F).

جنس نباتات برية ، طيبة ، ممررة ، من فصيلة الفديقات . انواعها المعروفة ٤٥ مهدا المناطق الاستوائية والاقليم المتاخمة من البلاد الافريقية والمحتمية . تحديد انواعها ونباتاتها الطوية هو التالي :

افريقية الشرقية والوسطى	تثبت ١٥ نوعاً
افريقية الثالية	تثبت ١١ نوعاً
افريقية الجنوبية	تثبت ٤ انواع
مدغسكر	تثبت ٣ انواع
اخذت وبالريضة	تثبت ١٢ نوعاً

سوفها رها كلها متباعدة الاشكال ، منها الشجيرات والجنبات والمواد والسرمية الفروع والداسية . يبدو ان شكلاتها الرئيسية تعود الى بعض العوامل التوضعية ، اخصها الضع . اوراقها اهليلجية ، مقنة ، لاقامية الانظام ، منها المتعاقبة والمتعاقبة والقصية ومنها المائلة النصال والمريضة . ازهارها عطرية التبييض ، طرفية الارتكاز ، مخلفة الالوان . كوروسها قوية ، حامية الانطلاق . بتلاتها قديمة مستطيلة . ثمارها سميكة ، ملبنة الاطراف . ثمارها مركبة من جرابين متقابلين . بزورها مستطيلة ، متكية الطرف ، لتتصبي بقزعة من الحلب المستطيل الدقيق الناعم || يستخرج من بزورها ، باستثناء القزعة ، مادة جميلة طيبة . شديدة المرارة تدعى ستريفنتين (*Sterophantine*) كانت ولا تزال تستعمل من قبل بعض قبائل مجاهل افريقية في علاج التبال السامة . وتشتمل طبياً في علاجات القلب وانقباضه وفي تحسين الدورة الدموية واستقرار النيفس والقضاء على شيق التنفس || اشهر انواعها الطبية الثلاثة التالية .

٢٦٤٢٠ - مريضة السودان ، مريضة مريضة Sterophantus hispidus (S). Sterophante hérissé (F).

نوع من المريضة . مهدا السودان وغمبيه وليجيري . جنبها



مريضة



مريضة



مريضة



مريضة



مرقة



مرق



مرقة



مرنوس

سنة، سيقها منتصب، أوراقها متقابلة، نصلها شريط الصفة المسنة الشائكة. أزهارها مستقيمة العرف، لا قياسية الانكناز، خطمية الشكل، خمسة الانقسام، ثنائية القصرص الكأسية والاسدية الخمسة || اشهر انواعها ما يتبع .

٢٦٤٣٥ - مرقطة صكره الزهر

Morina couleriana (F.), *Morine de Coulter (F.)*
بجلة ترينينة تعلو من ٦٠ الى ٩٠ سم . ساقها فراءه فناء . أوراقها خطمية، نصلها يطول نحو ٢٠ سم . ويمرض نحو ٢ سم . أزهارها صفراء اللون، ثنائية التجميع، ابطة وقاجية الانكناز || أزهارها يستمر من تموز الى ايلول .

Morina bulleyana (S.), *مرقطة صينية*
Morine de Chine (F.)
بجلة سرورية ترينينة تعلو نحو ٦٠ سم . ساقها فراءه تعلوها خطوط مستطيلة من الزغب الاطلس . أوراقها سنانية تطول من ١٢ الى ١٥ سم . أزهارها بيضاء اللون، ثورية التجميع، طرفية الانكناز || أزهارها يستمر من حزيران الى تموز .

Morina perica (S.), *مرقطة عجمية*
Morine de Perse (F.)
جنية سرورية ترينينة تعلو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . ساقها فراءه . أوراقها متقابلة خفيفة، نصلها يطول نحو ١٥ سم . ويمرض نحو ٣ سم . صفحت خلية البشرة متباعدة السنين التي الحف . أزهارها ابطة وطرفية الانكناز ، وردية اللون ، خلية الصفة || أزهارها يستمر من تموز الى ايلول .

٢٦٤٣٨ - مرقطة مستطيلة الورق

Morina longifolia (F.), *Morine à longues feuilles (F.)*
جنية ترينينة تعلو من ٨٠ الى ١٢٠ سم . ساقها فراءه . أوراقها خفيفة، نصلها يطول من ١٥ الى ٣٠ سم . ويمرض من ٢ الى ٤ سم . حجارة متفرجة الخلقة ، دقيق الحف . أزهارها متوسطة القد، ابطة وطرفية الانكناز ، ثيرة يضاء اللون ثم تتحرف الى الوردي وتستقر على الحمرة القاننة . أزهارها يستمر من تموز الى آب .

Mérinos (F.), *مرقطة*
Morino sheep (E.)
فان بي مرن ، سلاطة من الصان المشهور بقرارة صفة ونموته وجودة صفته .

Murenidae (F.), *مرققات*
هي فصيلة الشقيبات ، اطلمها .

Mérione (F.), *مرقون*
هو الزيد ، اطلمها .

Alibite (F.), *Nueritive (E.)*, *مرقشي*
للمادة او المواد الغذائية القابلة للتشيل المباشر في الجسم .

Vin de bon goût (F.), *مرء*
الخمر اللذيذة الطعم .

٢٦٤٤٤ - مراد الائتمار

Adjudication au revidage, à la revision (F.)
هو المراد الذي ينضم لاتفاق قوم تأسروا على ان لا يتناصروا في المزايدة العلنية وذلك ليسر المطروح بمن

المتوسط باستطالة خطمها وبشويها الاطلس الارزق المولج الذي يميل مع انزياحه من الظهر ويبيض عند البطن || سرورها فاعرة الصفن مرغوب فيها . غوبها مأكولة متوسطة الصنف ، ويستخرج من اكبادها الصفة مادة زيتية شائعة الاستعمال .

Margaritana (S.), *مرقطة*
Margaritana (F.), *Margaritana (E.)*

جنس حيوانات مائية من الرخويات فصليات الخياشيم ولصيلة النبادات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في منط انهر وبحيرات افريقية واروپية وآسية وامريكة || اصداها في البضية الشكل ، محدبة ، مستطيلة ، لا متساوية الصاريل والاطلس . بعض انواعها ينتج الدالي الفاعرة || تعيش بين الصخور او في الرمال والاسمال . لحوبها مأكولة متوسطة الصنف .

Carthame (F.), *مرق*
هو القرقم ، نبات من فصيلة المركبات ، اطلمها .

Murex, *مرق*
جنس حيوانات بحرية من الرخويات المصليات ذات الاصداق . انواعها عديدة اشهرها المريق القيني (ابو دينار) والمريق اليوناني || اصداها مدنية شائكة . كانوا يستخرجون منه في الزمان الكافر خضابا ارجوانيا ثابثا يستعمل في صبغ انفس الثياب .

Muricidae (S.), *مرققات*
Muricidae (F.), *Muricidae (E.)*

فصيلة حيوانات بحرية مفترسة من الرخويات مصليات الارجل وصيدات الاجزة . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد اعطائها بحار البلاد الحارة والمتحدة الحارة . كان لها شهرة في الزمان القابر ايام الفينيقيين اذ كانوا يستخرجون من بعض انواعها الصباغ الازرق المشهور || اعرف اجناسها واشهرها الحريق والقرنفرة والكسوس .

Marica (S.), *مرقكة*
Marique (F.), *Marica (E.)*

جنس نباتات عشبية جلمورية سرورية من فصيلة السوسنيات . منبتها البرازيل ، شجارتها منتصب ، رفيعة . أوراقها خفيفة النصل ، بجلة الخضار الزاهي . أزهارها زرقاء اللون او بيضاء || تزود القرين في الحدائق . انواعها المعروفة قليلة العدد اشهرها الزرقاء .

Marica corulea (S.), *مرقكة زرقاء*
Marique bleue (F.)

نوع من المريككة . منبتها البرازيل . شجارتها مستظلل الجرم يرتفع من ٦٠ الى ١٠٠ سم . أوراقها صغيرة الحجم ، خفيفة النصل ، بجلة الخضار الزاهي . أزهارها كبيرة القد ، قطرها نحو ١٠ سم . لونها الى الزرقاء اليلكية المولج || تنويرها يستمر من ايار الى حزيران .

Sauge officinale (F.), *مرقمية*
لبات طبي ، يعرف بالقوسية الحزنية ، اطلمها .

Morina (S.), *مرقمة*
Morine (F.), *Whorl flower (E.)*, *Quirkarde (D.)*, *Morina (I.)*
جنس نباتات ترينينة معمرة من فصيلة البهباسيات . انواعها

٢٦٤٥٧ - **مَزْكَايَكَة** (Enchère (F). Auction (E)).
هي عرض مبلغ أجل من الأثن الاساسي أو من المبالغ التي سبق عرضها في أثناء المزاد .

٢٦٤٥٨ - **مَزْكَايَة** (Bouurerie (F). Butter factory (E)).
هي ممحل الزبدة، بناءخصص لصنع الزبدة ويبيعها .

٢٦٤٥٩ - **مَزْكَلَة** هي الخشاة ، اطلبها .

٢٦٤٦٠ - **مَزْكَة** (Mazus (S). Maze (F). Mazus (E)).
جنس نباتات عشبية معمرة برية وتزيينية من فصيلة الخنازيريات . أنواعها المعروفة قليلة العدد بعضها من نباتات الهند والبيض الآخر من استراليا وتساوية || سوقها قصيرة أو جعدة أو مدادة . أوراقها أهليلجية ملطية . أزهارها متدفقة التجميع ، شمراخي الإزهار || أعرف أنواعها وأشهرها النيران الثلاث .

٢٦٤٦١ - **مَزْكَة حَصِينَة** (Mazus rugosus (S). Maze rude (F)).
نوع من المَزْكَة . ساقها فراء قصيرة تملأ من ١٠ إلى ٢٠ سم . أوراقها مشرمة غشنة . عناقيدها الزهرية تعلل من ٨ إلى ١٥ سم . أزهارها إلى الزرقاء الباهتة الجميلة || تنويرها يستمر من أيار إلى أيلول .

٢٦٤٦٢ - **مَزْكَة قَرْمَة** (Mazus pumillo (S). Maze pygmée (F)).
نوع من المَزْكَة . ساقها جعدة . أوراقها غشمية مستنة النصال . شمراخيتها الزهرية قصيرة . أزهارها بيضاء اللون || تنويرها يستمر من أيار إلى حزيران .

٢٦٤٦٣ - **مَزْكَة** (Amandier amer (F)).
هي شجرة اللوز المر . ج . مزج ، اطلبها .

٢٦٤٦٤ - **مَزْكَل** (Zemzel (F)).
الزبل : الموضع الذي يرسل منه الحمام الزاجل الهادي .

٢٦٤٦٥ - **مَزْكَامِي** (Concurrentiel (F). Competitive (E)).
نعت تعريفي يطلق على ما هو قابل للمزاخة .

٢٦٤٦٦ - **مَزْكُف** (Sep (F). Frame of plough (E)).
قطعة من الخرافات ترسب في قعر التلم عند الحراثة .

٢٦٤٦٧ - **مَزْكُوع** (Terroir (F). Soil (E)).
هو الميصر ، اطلبه .

٢٦٤٦٨ - **مَزْكُوج** (Binaire (F). Binary (E)).
هو كل مركب من عنصرين .

٢٦٤٦٩ - **مَزْكُوج الْأَطْرَاف** (Bilatéral (F). Bilateral (E)).
هو كل اتفاق أو عقد ملزم للجانبين المتعاقدين .

٢٦٤٧٠ - **مَزْدَوِجَاتُ الْأَذْنِ** (Diotocardes (F)).
قسم من الرنويات الممدية .

٢٦٤٧١ - **مَزْدَوِجَاتُ الْأَرْجُلِ** (Amphipodes (F). Amphipoda (E)).
رتبة من القشريات .

يخس كل أحدهم فيميته ويقسمون الفرق بين الاثنين وهو من الاعمال غير المشروعة التي يمارها القانون .

٢٦٤٤٥ - **مَزْدَاةُ النَّهْرِ** ، **مَزْدَاةُ الْأَسْتِرْسَالِ** (Adjudication sur folle enchère (F)).
هو ما يعرف بإعادة المزاد على ذمة الملتزم .

٢٦٤٤٦ - **مَزْدَاةُ النَّاقِصَةِ** ، **مَزْدَاةُ النَّاقِصَةِ** (Adjudication au rabais (F)).
هو أن يرسو الالتزام أو البيع على من يعرض أدنى ثمن يلتزم به القيام بالعمل على الوجه المفصل والشروح في دفتر الشروط وفي البيان التفصيلي للمروفس لتنافس المتنافسين .

٢٦٤٤٧ - **مَزْدَاةُ جَبْرِي** (Adjudication sur saisie immobilière (F)).
هو المزاد الذي يتم حقه الجبر العقاري بعد الاجراءات القانونية المعروفة من تسجيل ونشر .

٢٦٤٤٨ - **مَزْدَاةُ قَضَائِي** (Adjudication judiciaire (F)).
هو الذي يجري في المحكمة وفقاً لنص قانوني أو امر رسمي بعد استكمال الاجراءات القانونية .

٢٦٤٤٩ - **مَزْدَاةُ تَعْدُّرِ الْقِسْمَةِ** (Adjudication sur licitation, Licitation (F)).
هو مزاد يقع على مقدار شائع بين ملاك كانوا اشترىه أو ورثوه ولا يمكن قسمته حيناً .

٢٦٤٥٠ - **مَزْدَاة** (Bletchissement, Bletchissure (F)).
المزارة كالقوب والتفول هو زيادة نضج الثمر أو ابتلاء ذبوله بعد تمام نضجه .

٢٦٤٥١ - **مَزْدَاة** ، **مَزْدَاة** ، **مَزْدَاة** ، **مَزْدَاة** (Métayer (F). Métyayer (E)).
هو من استعمل الأرض بالمزارة .

٢٦٤٥٢ - **مَزْدَاة** ، **مَزْدَاة** (Métayage, Colonage (F). Métyage (E)).
هي اجارة مزرية إلى أجل ما يدفع المستأجر بمقتضاها إلى المؤجر قسماً من حاصلاتها بنسبة يتفقان عليها . ويقال للمستأجر مزاري . وهذه المزارة قد تكون :

مزارة المخاصة (Colonage partiaire (F)).

مزارة مستديمة (Colonage perpétuel (F)).

٢٦٤٥٣ - **مَزْدَاةُ بِالْقَوَكِيلِ** (Absentéisme (F). Absenteeism (E)).

استغلال الأرض بالمزارة على أن يشغل صاحب الأرض بوكيل .

٢٦٤٥٤ - **مَزْدَاة** (Hérison (F)).
هو القنطز ، اطلبه .

٢٦٤٥٥ - **مَزْدَاةُ الْعَمَلِ** (Vacation (F)).
هو الوقت الذي يقضيه بعض الأشخاص للزور بهم عمل معين في القيام بأعمال هذا العمل أو المهمة .

٢٦٤٥٦ - **مَزْدَاةُ حَقِيْقِي** (Command (F)).
هو الذي يستمر يوم المزابدة حتى يرسو المزاد على سواء ظاهراً في حين انه صاحب الصفقة .

٢٦٤٧٢ - مُزْدَوِجَات الأصابع

Artiodactyles (F). Artiodactyla (E).
رَبِية من البليات منها الخنازير والحمير.

٢٦٤٧٣ - مُزْدَوِجَات التَّنَفُّس

Dipnès, Dipneustes (F). Dipnoi (E).
طائفة من الأسماك تعتبر حلقة الانتقال بين الأسماك والقرود.

٢٦٤٧٤ - مُزْدَوِجَات الخَيْضَرُوم
Dibranches (F).
رَبِية حيوانات من الرخويات الرأسيات الأليل.

٢٦٤٧٥ - مُزْدَوِجَةُ التَّقْطِيع
Décussée (F).
Decussate (E).
في الأوراق المتقاطعة اثنين اثنين تقاطعاً عمودياً.

٢٦٤٧٦ - مُزْدَوِجَةُ الفَلَقْة
Dicotylédones (F).
Dicotyledon (E).
أحد قسمي مستورات البذور من النباتات. راجع ثنائية الفلقة.

٢٦٤٧٧ - مُزْدَوِجَةُ السَّكَم
Distyle (F).
Distyle (E).

نمت تمريني يطلق عل كل نبات أزهاره مزدوجة أقلام الهمات.

٢٦٤٧٨ - مُزْدَوِجَةُ المَيْسَم
Distigmate (F).
Distigmat (E).
نمت تمريني يطلق عل كل نبات أزهاره مزدوجة المياس.

٢٦٤٧٩ - مَزْرُ
Bière (F). Beer (E).
هو البيرة تحميصاً وهو القندب المحتلص من سائر الحبوب للشوية كالشعير والحنطة والذرة ...

٢٦٤٨٠ - مَزْرَبَ اخْتِزَارِ
Forcherie (F).
راجع زريبة الخنازير.

٢٦٤٨١ - مَزْرَدَة * ، مَزْرَعْ جَبَّار

Priodontes giganteus (S).
Priodonte, Tatou géant (F).

حيوان لبون أهدر وحيد الجنس والنوع من فصيلة المَرَدَّات. موطنه ساط غابات أمريكا الجنوبية. يأكل الحوام القريبة من الماء. مسرعه دجوي يستمر من الغروب إلى الفجر. ملجئه الحياتي فردي إلا في زمن التساقط والحضانة التي تستمر نحو ستة أشهر. وجاره نفق تسجل مستطيل يحفره بين جذور الأشجار. قوته اللعناء والحيات والوزغ والقذران وبعض المواد النباتية إلى جسمه شبه الطليجي الشكل، قليل الفلحة، بطول نحو ١٦٠ سم. بما فيه الذب الذي يبلغ ٥٠ سم. رأسه مخروطي الشكل. أذناه يوقيتان قصيرتان. جرابه قصيرة خاسية الأصابع الامتدادية الطويل المسلحة بالظافر حادة أعصها الظافر الأصابع الثالثة والرابعة من الجرايم الامامية. رأسه وجسمه وفليه مغطاة بدمع من الزرد العظمي المادة. لونه أسود أبيض باستثناء الرأس والبطن والذنب فإنها إلى البياض اللاتير.

٢٦٤٨٢ - مَزْرَعَة ، مَشَارَكَة ، جَرَبَة ، كَرْدَة ،

عَزَبَة
Ferre, Méclairie (F).
Lasse, Farming, Land, Small farm (E).

٢٦٤٨٣ - مَزْرَكَة

المزركة. ج. مزارف. هي الميقات في التربة وقد سالت بها الدرة عيس فيها الماء حتى تمتلئ ثم يساق الماء إلى فيرها.

٢٦٤٨٤ - مَزْرَق
Closque (F). Closca (E).
فجوة المسالك البولية والمعدة والتناسلية عند بعض الفقاريات وأخصها الطير.

٢٦٤٨٥ - مَزْعَامِيَّات *
Boinés (F).
عمارة من فصيلة البوليانيات. اجناسها وأنواعها عديدة. منظمها من ساط المناطق الاستوائية الأمريكية ويبرز المحيط الهادي، أخصها مدخكر. وبعضها أسيري وأفريقي إلى اجسامها متينة الاطوال التي تراوح من متر إلى عشرة أمتار إلى أشهر أنواعها:

Anascuda (F).
Bœ constrictor (F).
Bœ arc-en-ciel (F).
Bœ de Cook (F).
Bœ javelot (F).

٢٦٤٨٦ - مَزَق *
Epinette (F).
Spinet, Box for fattening poultry (E).
قفس يرب فيه للدجاج الممد للتسمين.

٢٦٤٨٧ - مَزْرَكَة * ، مَسْهَر
Luscinia suctora (S).
Gorge-bleue à miroir roux (F).
طائر من الفزار وفصيلة اللعليات. صغير أبيض طوله نحو ١٥ سم. ثوبه متركب الألوان الجميلة التفتيق والزعفر. صفته مقلد بالازرق إلى وهو من القواطع محبوب البلاد في طلب الرزق. قوته الحشرات والديدان وبعض الثمار المتينة التي تملك في الحريف. يأكل الملتع ويجاري الماء وصفات البحيرات. يفتن انصومه بين الأعداء وفي المقاصب. انتاه تحضن من ٤ إلى ٦ بيضات نحو ١٥ يوماً.

٢٦٤٨٨ - مَزْرَكَة
Gaveuse (F).
Cranning apparatus (E).
أداة لرق الطير.

٢٦٤٨٩ - مَزْرَكُوب *
Hybride (F).
Hybrid, Mongrel (E).
المزكروب كالمسلاج، نمت تمريني يطلق عل كل حيوان أو نبات جبين.

٢٦٤٩٠ - مَزْرَكُوم *
Fécondé, imprégné (F).
Imprégate (E).
نمت تمريني يوصف به الأبيض المكوش الصالح لترسيم.

٢٦٤٩١ - مَزْرَاق
Glissière (F). Slide (E).

٢٦٤٩٢ - مَزْرَاو
Glottes (F). Glottis (E).
هو فم الخجيرة أو فم قصب الرنة.

٢٦٤٩٣ - مَزْمَار الراعي * ، مَسَاك
Alisma (S). Alisme, Pléauze (F). Water plantain (E).
Froschküpfel, Wasserflesch (D). Alismo (I).
جنس نباتات جلوسودية مائية معمرة من فصيلة الزماريات. أنواعها عديدة معظمها يعيش في الأهوار والنانع المشمورة



مَزْدَة



مَزَق



مَزْرَقَة



مَزْمَار الراعي

٢٦٥٠٢ - ميزوكاه Parallax (F). Parallax (E).
المزوا زاوية عند كل نجم أو كوكب يقابلها قطر الفلك الأرضي أو نصفه .

٢٦٥٠٣ - ميزواكة Pantomètre (F).
Pantomètre (E).
جهاز يستعمل في قياس جميع الزوايا والأبعاد .

٢٦٥٠٤ - ميزواك Clinomètre (F).
Clinometer, Inclinator (E).
المزواك جهاز يستعمل في قياس الميل الحاصل بين خط مستقيم وخط أفقي .

٢٦٥٠٥ - ميزوان Gonionètre (F).
Goniometer (E).
هو المنقلة، جهاز يستعمل في قياس زوايا الأرض عند مسحتها .

٢٦٥٠٦ - ميزواكسي Anguleux (F). Angulus (E).
نمت تعريفي وصفي يطلق على ما كان شكله كائزواية .
٢٦٥٠٧ - ميزود Crèche (F). Manger (E).
هو وعاء الزاد .

٢٦٥٠٨ - ميزود المزود والملطف والثرة ثلاثة أسماء لنجم واحد من كوكبة برج السرطان .

٢٦٥٠٩ - ميزور Masoreus (S).
Masorée (F). Masoreus (E).

جنس حشرات من فصيلة المزوريات ورثة غديات الاجنحة . انواعها المعروفة عشرة اصنافها بعض مناطق افريقية والهند واروپية . بعض انواعها اصبح عكاشي لانتقاله مع الفسق السوداني الى جميع مرائ العالم || اجسامها صغيرة ، معتدلة اتبسط ، تقو من ٤ الى ٦ مم . رؤوسها معتدلة الجرم . عينها صغيرة ، بارزة . قرونها الاستشعارية قلادة الشكل . تأشيرها وفكوكها وملاسها قياسية . كواسلها ضيقة القواعد . بطونها مفلطحة . الحادها لاسعة ، سباعية الاغادي النحلة القاطية ، يملؤها بعض الحلب . غنايبها قوائمها مجهزة بمخاض مشارية التستين || الحشرة الجلجلة مفترسة ودائمة البرقة ايضاً .

٢٦٥١٠ - ميزوريات Masoreidae (S).
Masoreidae (F). Masoreidae (E).

فصيلة حشرات من لمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة محتصة العدد ، منتشرة في بعض مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة تقو من ٤ الى ١٠ مم . رؤوسها صغيرة ، مستعرة القفن . عينها ناشرة . تأشيرها وفكوكها قياسية . قرونها الاستشعارية ضيقة ، مركبة من ١١ فصلة . كواسلها مستعرة ، ضيقة القواعد المنصورة . الحادها سباعية الاغادي النحلة القاطية ، يملؤها في حنارها بعض الحلب . قوائمها نشطة . غنايبها كثيرة الحلب الشائكة ومجهزة بمخاض كبيرة ، مشارية التستين || تألف الحلق المزدودة وريال السواحل جميعها دامة ومفترسة || اشهر اجناسها المزور الذي يكثر وجوده في زراعات الفسق السوداني .

ويضها ويكثر على صفات الجيرات والاخر . اوراها اروبية الانتشاب ، لا قياسية الشكل والحجم . انماها ضمية التجميع صغيرة القد سريعة الشطب . قال الانطاكي : نباتاته طيبة الرائحة يزورها تحلل الارام والسوم مطلقاً وارجاع الارام وتدر البول وتقت الحصى وتخلل الانتفاخ والملص مع يدر الحز والصل . واذا شل به الشمر طوله ويطيب رائحة القرس .

٢٦٤٩٤ - ميزمار الزايعي المائي * ، اذان العنتر Allenu plantago (S). Flotteau plantain, Plantain d'eau (F). Mad-dog weed (E). Echer Froschölffel (D). Plantagine acustica, Barba silvana (I).
نوع من مزمار الرعي تكثر زراعته في احواس الماء للترين . عشته تقو من ٣٠ الى ١٠٠ سم . اوراها كبيرة القد بيضية الشكل ، نصلها قلبي القاعدة ذلق الزام الاخير . انماها كثيرة العدد صغيرة الحجم لونها الم الياس المخض بالوردي . وهو نبات طبي صيره مرطب خافض لحرارة ويدر البول .

٢٦٤٩٥ - ميزماريات Allismaceae (S).
Allismacées (F). Allismaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقة . اجناسها وانواعها كثيرة المدد، جميعها نباتات جلمورية متغمة او مائية . اوراها اروبية الانتشاب معتقة . انماها معتدلة التجميع مستطيلة الزناد المنصب .

٢٦٤٩٦ - ميزميج Luxuriant (F). Luxuriant (E).
نمت وصفي يطلق على النباتات الريان النضر الرخم .

٢٦٤٩٧ - ميزمبول * Myzomela (S).
Myzomèle, Misomèle (F).
جنس طير من الجوامث يقبقات المناقير وفصيلة المغتريات . انواعها المعروفة نحو ١٥ موبلها يمتد من استراليا الى ماليزية . ملجنها احيائي جامي . جاماتها قليلة العدد . تألف البراري والادغال . قوتها الحشرات الممنعة والديدان ورسق الانهار || اجسامها صغيرة القد تقو من ١٢ الى ١٥ سم . مناقيرها معدبة الاطراف المدبة . اجنتها معتدلة الجرم . اذانها مقنوعة . اقوابها متباعدة الالوان جميعها زاهية الخصب || انثاها ايمت عصباناً من ذكورها . قدان احاشها في الادغال . انثاها تحض متبادية الذكور ، على مرتين في الحول ، من ٤ الى ٦ بيضات . الترخيم يستمر نحو ١٣ يوماً .

٢٦٤٩٨ - ميزم Intrusif (F). Intrusive (E).
نمت تعريفي يطلق على ما كان له صفة التزم .

٢٦٤٩٩ - ميزماره Multiflore (F). Multiflorous (E).
نمت تعريفي يوصف به كل نبات كثير الازهار .

٢٦٥٠٠ - ميزماريات Anthozoaires (F).
Anthozoa (E).
فئة حيوانات بحرية من المبرقات تتميز بمداخلها المشاة بالازهار البحرية .

٢٦٥٠١ - ميزهر Florifère (F). Floriferous (E).
نمت تعريفي يطلق على كل نبات مزهر او كثير الزهر .



ميزمار الراعي المائي



ميزول



ميزران



ميزور

بسطها من ٤٠ الى ٤٥ سم. ورؤسها مستديرة، خناباتها البنيوية الشكل فارقة || تنوش جهات قليلة البدن. تأثت الانجبار الحربية الطويلة. مسرهما من القس الى الصبر. قوتها الجار على اختلاف انزاعها.

٢٦٥٢١ - مَسَاوِي - مساد Pot (F).
نحي السنن أو السلل.



مَرْوَزَقَة

٢٦٥٢٢ - مَسَادِع مَسَامِيَة Paramètres climatiques (F).
Climatic parameters (E).
المساحد المناخية مجموعة العوامل الواجب معرفتها في تحديد اقلهم معين أو كورة || بقمة || اهمها ملجن الاطار وكبتها وتوزيعها. التبخر. الاشعاع الشمسي. الحرارة القصوى والدنيا والرياح. الرطوبة الجوية النسبية. الرطوبة. الرياح. الضغط الجوي.

٢٦٥٢٣ - مَسَار Electroda
هو للابح، اطلية.

٢٦٥٢٤ - مَسَارِي، مَسَارِيَة Mésentère (F).
Mesentery (E).
هي طباط الصفاق.

٢٦٥٢٥ - مَسَارِي الْخَصِيَة Mesorchium

٢٦٥٢٦ - مَسَارِي الْمَبِيص Mesovarium

٢٦٥٢٧ - مَسَاس Allame (F).
نبات طبي جلموري مائي يعرف بملار الرامي، اطلية.



مَرْوَلَة

٢٦٥٢٨ - مَسَاسَة Anredera (S). Anrédère (F).
جنس نباتات معمرة عارضة من فصيلة المرمقيات. انزاعه قليلة منها البرية والزراعية الفريينية. اطلاتها البلاد الحارة. انزاعها جملة الشكل ملونة.

٢٦٥٢٩ - مَسَاعِدَة Assistance (F).
هي الاسعاف، راجية.

٢٦٥٣٠ - مَسَاقَاة، مَسَارِيَة Baill à complant
هي ان يجر المالك مزدوا مفرسوا او غير مفرس فيلزم المسأجر أما يتهدد اغراسه او يفرسه مقابل مقدار معين من الثار. ويشترط فيه وجوب قيام المسأجر بالزراعة حل اكل وجهه والا تلحق الاجارة حتما بدون مقاضاة.

٢٦٥٣١ - مَسَالِف Passéiste (F).
المساليف الخشاع المنجب بالمعني.

٢٦٥٣٢ - مَسَالِك تَنَاسُلِيَة Conduites génitales (F).
Gential ducts (E).
هي الموادر التناسلية.

٢٦٥٣٣ - مَسَكَمِي Poreux (F). Porous (E).
ذو مسام.

٢٦٥٣٤ - مَسَامِيَة Porosité (F). Porosity (E).
كون الشيء ذا مسام.

٢٦٥٣٥ - مَسَاهِم Actionnaire (F).
Shareholder (E).
هو كل من يملك سهما في شركة سلمية.



مَسَاهِمَة

٢٦٥٣٦ - مَرْوَزَقَة *، كَبِدَمَة مَرْوَزَقَة

Labrus turdus (S). Labre tourd, Tourd (F).
Labrus turdus, Wrasse (E).

نوع من الكيدم. سمكة بحرية بيوض. اطلاتها معظم قنالم البحر الابيض المتوسط. تتميز من اسماك الجاهج والخنشاف || جسمها احليجي الشكل، يطلون من ٢٧ الى ٣٠ سم. قوتها قليل لتباين بين الشقين. اللون السالط هو الاخضر يميل وتشتد لخته عند الظهور ويغير عند البطن. خنشاب الذكر اميق ولحم من خنشاب الانثى || رأسها مخروطي الشوذن. شكلها متعادلان. شفقتها متوسط الانفرج. اسناتها كبيرة، حادة. عيناها كبيرتان جاسطتان. زعنفتها الظهرية مستطيلة، ارجوانية اللون يملوها بليج ازرق واخضر. زعانفها الصدرية والشرجية تتحلل بخنشاب الظهرية. الخوضية جوية اللون اما الذيلية مسنانية الشكل، جوية اللون يملوها كالظهرية تبيج ازرق واخضر || لحمها جيد الصنف، مرغوب فيه.

٢٦٥٣٧ - مَرْوَزَقَة * Gnomon, Cadran solaire (F).
Sun-dial, Gnomon (E).

هي الساعة الشمسية، قولها قضيب عمودي ميل ظله يحدد الوقت.

٢٦٥٣٨ - مَرْوَزَقَة ٥ Goniométrie (F).
Goniometry (E).

هي علم قياس الزوايا.

٢٦٥٣٩ - مَرْوَزَقَة Dasyphyllie (F).

من الاوراق ما كانت نسلها كثيفة الزوبر.

٢٦٥٤٠ - مَرْوَزَقَة ٥ هو المدعان او مقياس الاحداث.

٢٦٥٤١ - مَرْوَزَقَة ٥ Oléagineux (F).

Oleaginous, Oily (E).

هي الاغضاء النباتية، اغصنها البزور والثار، الثنية بالمواد الزيتية.

٢٦٥٤٢ - مَسَاح، مَسَاح Arpenteur, Géomètre (F).
Surveyor, Geometer (E).

الذي يمسح الارض فيقيس طولها وعرضا لحرفة مساحتها.

٢٦٥٤٣ - مَسَاحَة Superficie (F).

Superficies, Area (E).

قياس سطح الشيء.

٢٦٥٤٤ - مَسَاحَة Cadastre (F).

Cadestral survey, Survey (E).

للمساحة هي مجموعة الفاتر والرسوم والمرايط التي تذل على مساحة الاراضي الزراعية وغير الزراعية وبيان الابنية والمقارنات وتخطيطها وتحديدها حل وجهه التفصيل في البلاد. ويراد بها ايضا الاحمال نفسها التي يقوم بها الاختصاصيون الذين تنوب بهم الادارة هذه المهمة. الفرض الرئيسي من هذه الاحمال هو تحديد الملكية العقارية بالفتة الواجبة ثم تقدير الضرائب التي يتقوى الملاك حل دفعها منظورا لئلا الى ثمن الاملاك ودخلها.

٢٦٥٤٥ - مَسَاحَة ٥ Harpyis (S).

Harpie céphalote

جنس حيوان من فصيلة البطاطيات. انزاعه المعروفة ثلاثة، موطنها الشرق بيزور المحيط الهادي حتى استرالية. اجسامها صغيرة للقد، طولها يراوح من ١١ الى ١٢ سم.

Intimé (F). مُستأنف عليه
Respondent, Defendant (E).
هو المتداعي الذي استأنف الحكم الصادر بحقه .

Néophyte (F). مُستجيد
Neophyte (E).
التحق حديثاً .

Mire à œufs (F). مُستجلي
أداة خاصة بفحص البيض حل الضوء الصناعي تميزاً
لمركزهم من غير المركز .

Creux (F). مُستجرف
نمت تعريفي يطلق حل التبورج البادئة الطعم المائل أو
التي يتميز عليها ببب فافع بمبه اللوق .

Lapidifique (F), Lapidific (E). مُستحجر
صالح للحجر .

Bénéficiaire (F), Beneficiary (E). مُستفيد
Emulsion مُستحلب

Emulsion مُستحلب
سائل مائع يحل زائداً من المواد النعنية أو الراتنجية
المعلقة .

Sensitive (F). مُستحسنة
حسبة زينية مركنية تلمى حساسة ، أطلها .

Employeur (F), Employer (E). مُستخدم
رب العمل الذي يستعين على عمله بالذين يستعملهم .

Employé (F). مُستخدم
Employed, Servant (E). كل من أدى الخدمة المنوطة به .

Extrate (F), Extract (E). مُستخرج ، مُخلص ، مُخلصة
هو جزء من عقد رسمي أو حكم يسلخ بحرفه ويسلم إلى
طالبه ويكون له قوة الالابات التي لستد الاصل .

Polygalées (F). مُستدراة
هي البوليفالانيات ، أطلها .

Latier (F). مُستدرة
هي البوليفان ، أطلها .

Echauffent (F), Heating (E). مُستفيط
نمت تعريفي يطلق حل الاطلاق والحبوب التي تلتظ حرارة
الجسم وتسبب الادفاء .

Commodataire (F). مُستجير
هو الذي يأخذ المين المارة من المير في عقد المارية .

Firme (F), Firm (E). مُستقل
Firme agricole, مُستقل زراعي

Exploitation agricole (F), Farming (E). مُستفيدة
Futurisme (F). مُستفيدة
Futurism (E).

Futurisme (F). مُستفيدة
Futurism (E).
المستفيدة نظرية حديثة في فلسفة الفن قولها مزيج من

Contribution مُساهمة ، مُساهمة المُرمكة
هو أن يسام كل واحد من الزموا دفع دين مشترك في
دفع حصة من هذا الدين من الجميع .

Equivalent مُساو ، مُكافئ

Egalité (F), Equality, Parity (E). مُساواة

Limnomètre (F). مُستباح
Limnimeter (E).
هو المثبات جهاز يستعمل في تقدير أوضاع مستوى
البحيرات .

Sonde (F). مُستبار ، مُرجاس
Sounding-line, Lead (E).
أداة السبر ، تقع حل اشكال مختلفة . تستعمل في الطب
والزراعة والأرض .

Parure (S). مُستبال ، مُستبال
Parure, Mésange des roseaux (F).
جنس طير من فصيلة القرقنيات . أنواعه المروعة قليلة
العدد ، أصلها الشرق الاوسط وأوروبية الجنوبية والشرقية .
اجسامها وأذناها مسطبة . اجنتها محتلة القد ،
منقروها الأطراف . منقروها قصيرة مستعرجة القواعد ،
مستعرجة أطراف الخافض العليا البيضة الصمغين || أعرف
أنواعه وأشهرها المسال القضي .

Parurus blaricus (S), Parure à moustaches (F). مُستبال فيفي
Bearded titmouse (E).

Parurus blaricus (S), Parure à moustaches (F). مُستبال فيفي
Bearded titmouse (E).
طائر من المسال . طوله نحو ١٧ سم . سباله لطفة سوداء
خلفية تمتد من الزنبد وقاعدة الجفن إلى طرف العين . رأسه
إلى الزنقة الرمادية الموج . عنقه ووجهه إلى الأبيض
القضي . ظهره إلى الصبهة الصنابية . جناحه إلى السرة
الخطية الجعدة بالأبيض . بطنه إلى الصبهة الفاتحة ، ذنبه
وتاجي الريش المتراكب ، أصغر اللون ، حنطلي الموج .
منقاره وصنطة عنقه إلى الصفار المايق . ريشه وأصابعه إلى
الردة الرصاصية || أصلها الشرق الاوسط وأوروبية الجنوبية
والشرقية بألف المناطق والمناقص وبجاري الماء || قوته
الحفارات وبلور الثباتات المنعقة والمالية || يدشن في
الادخال والاسل . عنه كالجرب تقع فيه الاثن من ٦
إلى ٨ بيضات تحضنها بمنارة الذكر نحو ١٢ يوماً .

Parurus blaricus (S), Parure à moustaches (F). مُستبال فيفي
Bearded titmouse (E).

Parurus blaricus (S), Parure à moustaches (F). مُستبال فيفي
Bearded titmouse (E).
طائر من المسال . طوله نحو ١٧ سم . سباله لطفة سوداء
خلفية تمتد من الزنبد وقاعدة الجفن إلى طرف العين . رأسه
إلى الزنقة الرمادية الموج . عنقه ووجهه إلى الأبيض
القضي . ظهره إلى الصبهة الصنابية . جناحه إلى السرة
الخطية الجعدة بالأبيض . بطنه إلى الصبهة الفاتحة ، ذنبه
وتاجي الريش المتراكب ، أصغر اللون ، حنطلي الموج .
منقاره وصنطة عنقه إلى الصفار المايق . ريشه وأصابعه إلى
الردة الرصاصية || أصلها الشرق الاوسط وأوروبية الجنوبية
والشرقية بألف المناطق والمناقص وبجاري الماء || قوته
الحفارات وبلور الثباتات المنعقة والمالية || يدشن في
الادخال والاسل . عنه كالجرب تقع فيه الاثن من ٦
إلى ٨ بيضات تحضنها بمنارة الذكر نحو ١٢ يوماً .

Fonderie (F). مُستبل ، مُستبل
Foundry (E).
لعمل المعجز لتلويب المعادن وصبا .

Organe mâle des insectes (F), Manly organ of insects (E). مُستبل ، مُستبل
عضو الذكر في الحفارات .

Locataire (F). مُستجير
Tenant, Lodger (E).
هو الذي تستعد الاجارة من مالك المين باسمه .

Appellant (F), Appealing (E). مُستأنف
هو المتداعي الذي يستأنف الحكم الصادر .



مسبار (١)



مسبار (٢)



مسبال فيفي



مستبل

٢٦٥٧٧ - مُسْتَكْتَفُ الْحَلِيبِ *

Lacto-densimètre (F). Lacto-densimeter (E).
ميزان خاص يقيس كثافة الحليب .

٢٦٥٧٨ - مُسْتَكْتَفُ الزُبْدِ *

Lacto-butyromètre (F). Lacto-butyrometer (E).
ميزان خاص يقيس زبدة اللبن أي مقدار المواد السنية في الحليب أي اللبن .

٢٦٥٧٩ - مُسْتَقْلَقُ (DÉCOMBANT (F). DECUMBENT (E).

نمت تعريفى وصلى يطلق حل غثت الجروع والقروع النباتية المسترخية التي لا تستطع الانتصاب .

٢٦٥٨٠ - مُسْتَقْبِة (ABSORPTIOMÈTRE (F). ABSORPTIOMETER (E).

جهاز يستعمل في قياس مدى الحسور القوارة للفساز الكربونيكى .

٢٦٥٨١ - مُسْتَنْبَت (PÉPINIÈRE (F). NURSERY (E).

هو المشتل ، اطلبه .

٢٦٥٨٢ - مُسْتَد (DOCUMENT, TITRE (F). DOCUMENT, TITRE (E).

هو السند ، اطلبه .

٢٦٥٨٣ - مُسْتَقْبِة (HÉLOËS (F).

نمت تعريفى يطلق على كل ما له صلة بالمستقبات كالتنباتات المستقبية والحيات المستقبية .

٢٦٥٨٤ - مُسْتَوْبِة (MYCETOBIA (S).

Mycoctobia (F). Mycetobia (E).

جنس حشرات من فصيلة المستويبات رزقية ذوات الجناحين . أنواعها المروقة سبعة منتشرة في بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة والباردة || أجسامها صلبة ، نحيلة ، طولها من ٢ الى ٤ م . رؤوسها مكورة . حوزنها متقاربة عند الذكور ، متباعدة عند الاناث . قرونها الاستشعارية عجيطة . ملاسها مستطيلة . أعينها صلبة وقصيرة . كواسلها وبطنها شبه اسطوانية . رواشها ملونة . قوائمها مستطيلة ، مهدبة الظنايب || اسرارها عاردة ، تمش على الفطور .

٢٦٥٨٥ - مُسْتَوْبِيَات (MYCETOBILIDES (S).

Mycetobillides (F). Mycetobillides (E).

فصيلة حشرات من رزية ذوات الجناحين ، اجناسها وانواعها المروقة قليلة العدد منتشرة في بعض مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحارة || اجسامها صلبة ، طولها ٢ الى ٦ م . رؤوسها شبه مكورة . حوزنها متباعدة عند الاناث ، متقاربة عند الذكور . زلثها ثلاثية عند الفلين . قرونها الاستشعارية قصيرة ، مركبة من ١٧ فصلة . ملاسها ملونة . قوائمها مستطيلة || يرقاتها ملوكية تمش على العصاره النباتية التي ترشع من الجروح || اشهر اجناسها المستوية .

٢٦٥٨٦ - مُسْتَوْدَع ، مَعْدَنَة ، حَاصِل (DÉPÔT (F). DEPOT, Warehouse (E).

Office (F). Dispensary (E).

٢٦٥٨٧ - مُسْتَوْدَعُ عَقَاقِير *

Aréomètre, Densimètre (F). Aræometer, Densimeter (E).

الاككار الخالية للتضاربة . ركيزتها مادة مدهورة مستمرة التجديد . وصل الكلمة ان تستحث الشعور وإلا فلا لزوم لها .

٢٦٥٩٥ - مُسْتَقْرَاتُ أَنْبِيَاثِيم *

Párentibranches (F).

فئة من السرفويات تتميز باستمرار وجود جهازها الفلوسفي في مختلف اطوارها الخالية ، من الطور البلمبى الى الطور البالي .

٢٦٥٩٦ - مُسْتَقْطَب (Polarimètre (F).

Polarimeter (E).

مقياس الاستقطاب .

٢٦٥٩٧ - مُسْتَقْطَب (Polarisant (F).

Polarizant (E).

٢٦٥٩٨ - مُسْتَقْلَقَةُ الْفِعَالَات (Dialypécales (F).

Dialypetalous (E).

نمت تعريفى يطلق على النباتات ذات الأزهار المستقلة البتلات .

٢٦٥٩٩ - مُسْتَقِيمُ الْأَطْرَاف (Rectiligne (F).

Rectilinear (E).

الحيوان الذي تشكل اطرافه خطوطاً مستقيمة لا احيدباب فيها ولا تقعر .

٢٦٥٩٠ - مُسْتَقِيمُ الزُبَان (Recticorne (F).

نمت تعريفى يطلق على كل حشرة مستقيمة الزبان .

٢٦٥٩١ - مُسْتَقِيمُ الْمُنْقَاد (Rectirostre (F).

نمت تعريفى يطلق على كل طائر متقاده مستقيم الشكل .

٢٦٥٩٢ - مُسْتَقْبِةَاتُ الْجَنَاح (Orthoptéroïdes (F). ORTHOPTEROIDES (E).

طبقة حشرات تنتمي الى شعبة اليرقانيات وطائفة الحشرات اصك . تشمل حالياً خمس رتب وهي اللزليات والاشيانيات والقصصيات ومستقيمة الاجنحة والجلفقيات . جميعها كبيرة النفع مستطيلة الساق . ارسافها مفصليّة تتكون من ثلاث عقل أو أربع . اناتها تتميز بأجهزتها التناسلية المسلمة بمرزات قوية .

٢٦٥٩٣ - مُسْتَقْبِةَاتُ مَقْلَافِيَّة (Lignes droites concourantes (F).

٢٦٥٩٤ - مُسْتَقْبِةُ الْأَجْنَحَة (Orthoptera (S). ORTHOPTÈRES (F). ORTHOPTERA (E).

رتبة حشرات من طبقة مستقيبات الاجنح . فصائلها واجناسها وانواعها كثيرة العدد تشمل اكبر مجموعة من الحشرات الكبيرة القند . اجسامها واشكالها والوانها عديدة || من اشهر فصائلها الجندبنيات والجراديات والقبوطيات .

٢٦٥٩٥ - مُسْتَقْبِةُ الْعُرْوَى (Rectinerve, Rectinerviée (F).

نمت تعريفى يطلق على كل ورقة متوازية العروى المتجهة من القاعدة الى القمة .

٢٦٥٩٦ - مُسْتَكْتَفِ *

Aréomètre, Densimètre (F). Aræometer, Densimeter (E).

مقياس الكثافة .



مستكن



مستكف الحليب

Triangulation ٢٦٦٠٣ - **مِسْحَقَة**
علية تأريخ ورم بواسطة المثلثات تمهيدا لكليل المساحة.

Oserale (F), Oser-bed (E). ٢٦٦٠٤ - **مِسْحَرَة**
منبت السور أي المصفاة .

Broyeur (F). ٢٦٦٠٥ - **مِسْحَق**
Braking machine (E).
آلة تستعمل لسحق المسائل وللكسب وما أشبه .

Broyeur-effibreux (F). ٢٦٦٠٦ - **مِسْحَق مِسْحَق**
آلة لسحق وأشقر أكل من المسحق العادي .

Broie (F), Brake (E). ٢٦٦٠٧ - **مِسْحَقَة**
آلة تسحق بها سوق القنب والكتان قبل مشقتها .

Gourmette (F). ٢٦٦٠٨ - **مِسْحَل**
Curb, Curb-chain (E).
سلسلة منبوعة متصلة بطرفي الشكبة تكون تحت جملة الفرس السفلى .

Catalyse (F), Catalysis (E). ٢٦٦٠٩ - **مِسْحَلَة**
هي التحليل باللماسة أو الإختلال بمجرد ملامسة مادة أخرى لا تتغير .

Catalytique (F). ٢٦٦١٠ - **مِسْحَلِي**
Catalytic (E).
هو ما يتميز بالإختلال اللسي .

Poudre de sang (F). ٢٦٦١١ - **مِسْحَقُ الدَّم**
مركب عضوي تجد فيه النسج النباتية والحيوانية معظم المواد الغذائية اللازمة لحياتها . وهو يستخرج من الدم بعد تجفيفه ومعالجته للقضاء على رائحته الكريهة . مظهره الخارجي حبيبات دقيقة سمره اللون سواء المواجه للانعكاس يستعمل في أطراف البوابين على اختلاف أنواعها ويستعمل في الزراعة كمهاد أزوتي عضوي لأنه يحوي من ١٠ إلى ١٤ ٪ من الأزوت . وهو من أنشط الأسمدة الطبيعية لكنه يبطئ الاندخال والتأدية .

Poudre d'os (F). ٢٦٦١٢ - **مِسْحَقُ الْعَظْمِ**
صماد فسفوري عضوي يصنع من العظم الذي يحوي الكثير من فسفات الكلس وكربونات الكلس || أشكاله التجارية المستعملة ثلاثة : الخام والاشجيمي والاشجيمي .

Poudre d'os brut (F). ٢٦٦١٣ - **مِسْحَقُ الْعَظْمِ الْخام**
هو الخشبي من صنف العظام كما هي دون معالجتها وهو يحوي من ١٥ إلى ٢٥ ٪ من الحامض الفسفوري ومن ٣ إلى ٥ ٪ من الأزوت .

غير أن ما يجود من شحم ، يؤثر فاعلية الحسب ويثقل بعض الأوصاف البكتيرية المؤذية ، يجعله محدود الاستعمال .

٢٦٦١٤ - **مِسْحَقُ الْعَظْمِ الْأَشْجَمِي**
هو الخشبي من صنف العظام بعد استخلاص ما فيها من شحم . وهو يحوي :
من ١٥ إلى ٢٠ ٪ من الحامض الفسفوري
ومن ٣ إلى ٥ ٪ من الأزوت
وهو قليل الاستعمال كمسحوق العظم الخام .

٢٦٥٨٨ - **مَسْتَوَاتِ الْبُزُور**، **وَعَالِيَاتِ الْبُزُور**
Angiospermes (F), Angiosperms (E).
أحد قسمي باديات الزهر وهو يشمل النباتات التي تكون بيضها في مبيض وزرعتها في ثمرة || تقسم مستورات البزور إلى قسمين : وحيدات القلفة وذوات القلقتين .

٢٦٥٨٩ - **مَسْتَوَاتِ الزَّهَر**، **عُضَيَّاتِ الْوَكَيْع**
Cryptogames (F), Cryptogams (E).
قسم من المملكة النباتية ، نباتاته مستورة أعضاء التناسل تنحصر إلى ثلاثة صنفين : مستورات الزهر الوعائية ، الطليقيات والمشريات .

٢٦٥٩٠ - **مَسْتَوَاتِ الزَّهَرِ الْوَعَائِيَّة**
Cryptogames vasculaires, Pteridophytes (F), Vascular cryptogams, Pteridophyta (E).
صنف من النباتات الخفيات الأعضاء التناسلية . أشهر نباتاتها السراخس والكتنبات التي تحمل ثلاثة أعضاء فقط وهي الجذور والسوق والأوراق .

٢٦٥٩١ - **مَسْتِيك**، **مَسْمُوجُونِ التَّطْعِمِ**
Mastic à greffer (F), Mastic for graft (E).
مادة مركبة عازلة يستعملها البستاني في ستر جروح التطعيم أو التقليل لوقايتها من الهواء والحرارة .

٢٦٥٩٢ - **مَسْجَلَة**
Marnière (F), Mart-pit (E).
المسجلة هي مقلع الحسيل .

٢٦٥٩٣ - **مَسْجَلَة**
Marnière (F).
هي المسجلة

٢٦٥٩٤ - **مَسْجَح**
Arpentage (F).
قياس مساحة الأرض .

٢٦٥٩٥ - **مَسْجَحَة**
Terre plate (F), Flat land (E).
أرض مستوية ذات حصى صفار . ج. مساح وسلي .

٢٦٥٩٦ - **مَسْجَاب**
Néphoscope (F).
Nephoscope (E).
جهاز يستعمل لدرس تحركات السحب .

٢٦٥٩٧ - **مَسْجَلَة**
Nivaleur (F), Leveller (E).
أداة يستعملها البستاني لتسطيح الأكوداد ومنع أعضاده .

٢٦٥٩٨ - **مَسْجَلَة آليَّة**
Ravale (F).
آلة زراعية مجرورة تستعمل لبسط التراب وتوسيته .


٢٦٥٩٩ - **مَسْجَح ***
Anémographe (F).
Anemograph (E).
جهاز يسجل سرعة الريح واتجاهها ومقدارها .

٢٦٦٠٠ - **مَسْجَح** هو الهواء ، أطلقه .

٢٦٦٠١ - **مَسْجَحِي**
Aérifère (F).
Aeriferous (E).

نمت تعريفي يطلق على ما هو غصن ينقل الهواء اللازم لتنفس هذه النباتات والحويون . نسيج مسامي ، فيمرات مسامية ...

٢٦٦٠٢ - **مَسْجَل ***، **وَسِيط**
Catalyseur
جسم يحدث التحليل باللماسة .



مساح

٢٦٦١٥ - مَسْحُوقُ الْعَظَمِ الْأَهْلَامِيِّ

(F). Poudre d'os déglutins.

هو الماتى من سحق العظام بعد استخلاص ما فيها من شحم وعلام . نظيره الخارجى مسحوق ناعم اريد اللون يحوي : من ٢٩ الى ٣٤ ٪ من الحامض الفسفوري ومن ١٥ الى ١٢ ٪ من الازوت وهو جزيلى الفاتلة شائع الاستعمال .

٢٦٦١٦ - مَسْحُوقُ الْقَرْنِ

(F). Poudre de corne.

(E). Horn meal.

سماد عضوي يتجم من سحق القرن والظلوف بعد تجميعها او معالجتها بالبخار . وهو يحوي : من ١٠ الى ١٥ ٪ من الازوت من ٤ الى ٦ ٪ من الحامض الفسفوري من ٧ الى ٩ ٪ من الكلس

يعتبر من الاسمدة الجزيلة النفع المولدة الاجل لانه يغنى من التربة اكثر من سولين .

٢٦٦١٧ - مَسِخْ

(F). Monstruosité.

(E). Monstrosity.

ج . مسوخ . شاذ عارفة او وراثية تشوه الشكل المألوف .

٢٦٦١٨ - مِسْخَكَةٌ

(F). Cultivateur.

(E). Cultivator.

آلة تستعمل المرح السطحي تنفق التربة دون ان تقلبها ويتبثر ذراتها .

٢٦٦١٩ - مَسْجُودٌ

(F). Sympode (E). Sympode.

نعت تعريفي يوصف به كل حيوان او نبات شذت بعض اعضاءه عن قاعدة الانفراد الذاتي كما في خروف البحر الذي تصمت ريملاه . وكما هي حال القمامة في النباتات .

٢٦٦٢٠ - مَسَكٌ

(F). Fibre.

(E). Fibre.

ج . ساد وأساد .

٢٦٦٢١ - مِسَدَاسٌ

(F). Sextant.

(E). Sextant.

جهاز يمكن من قياس الابعاد المزاوية وتحديد ارتفاع الكواكب عن الأفق .

٢٦٦٢٢ - مِسَدَاسٌ

(F). Sextant d'Uranie (E). Sextans.

المسداس كوكبية نجوم جنوبية الموقع شكلها يشبه المسداس ||

نجومها قليلة العدد جميعها من المرتبة الخامسة وما دونها .

٢٦٦٢٣ - مِسَدَاسٌ

(F). Nébuleuse (E). Cloudy.

(E). Cloudy.

أداة آلة تستخدم في ذر المساحيق فتشدها كالمباب .

٢٦٦٢٤ - مَسَدَسٌ

(F). Hexagone (E). Hexagon.

(E). Hexagon.

شكل هندسي سدس الزوايا والاضلاع .

٢٦٦٢٥ - مِسَدَسُ السُّطُوحِ

(F). Hexaèdre (E). Hexahedron.

(E). Hexahedron.

٢٦٦٢٦ - مَسَدُومٌ

(F). Obnubilé (E).

(E).

نعت تعريفي يطلق على الاشياء التي يشاهد كالمباب او الغمام او الدخان ...

٢٦٦٢٧ - مَسَدِيٌّ

(F). Fibreux (E). Fibrous.

(E). Fibrous.

٢٦٦٢٨ - مَسْرَا

(F). Frayère.

(E). Spawning place or season.

المكان حيث يبيض السمك .

٢٦٦٢٩ - مِسْرَكَةٌ

(F). Oviducta (E). Oviduct.

(E). Oviduct.

الممر قناة البيض .

٢٦٦٣٠ - مَسْرَكَةٌ

(F). Pili glanduleux (E).

(E). Glandulous down.

عضو ليفاني خلي ادب ينشأ على مختلف اجناس لثنيات .

ج . مسارب .

٢٦٦٣١ - مَسْرَطٌ ، مِسْرَطٌ

(F). Esophage (E).

(E). Esophagus.

هو مجرى الطعام في الحلق ويدعى بالهم والاري .

٢٦٦٣٢ - مَسْرُوكٌ

(F). Balzane haut-choussée (E).

(E). Balzane haut-choussée.

القرن مسرك اذا بلغ التجنيب الركبتين او المرفقين .

٢٦٦٣٣ - مَسْرِيٌّ

(F). Régime (E). Rule.

(E). Rule.

هو مججمة القواعد المفروضة او المنية .

٢٦٦٣٤ - مِسْطَاحٌ

(F). Planimètre (E).

(E). Planimeter.

جهاز يستعمل في قياس الطرح .

٢٦٦٣٥ - مِسْطَارٌ ، مِسْطَارَةٌ

(F). Moile (E). Must (E).

(E). Must (E).

عصير القنب الجديد قبل أن يستحيل الى خر .

٢٦٦٣٦ - مَسْطَبَةٌ

(F). Banquette (E).

(E). Bench terrace.

سطح من الارض كفافه من التراب أو الحجارة يصنع في التواضع للحدادة منشا لانجراف التربة .

٢٦٦٣٧ - مِسْطَحٌ ، مَسْرُوكٌ

(F). Palier (E).

(E). Landing, Stair-head.

٢٦٦٣٨ - مِسْطَحٌ مُتَوَكِّزِي الْأَضْلَاحِ

(F). Parallélogramme (E). Parallelogram.

(E). Parallelogram.

٢٦٦٣٩ - مِسْطَحٌ مُسْتَقِيلٌ

(F). Parallélogramme rectangle (E). Rectangular parallelogram.

(E). Rectangular parallelogram.

٢٦٦٤٠ - مِسْطَحٌ مَعِينٌ

(F). Parallélogramme oblique (E). Oblique parallelogram.

(E). Oblique parallelogram.

٢٦٦٤١ - مَسْطَرَّةٌ ، أَنْمَرَجٌ

(F). Echarrillon (E).

(E). Sample, Pastern.

هي المينة والبنينة .

٢٦٦٤٢ - مَسْطَرَّةُ الْإِرْتِفَاعِ

(F). Mire (E). Stigt (E).

(E). Stigt (E).

هي المير ، جهاز يمكن من تحديد الارتفاع النسبي .

٢٦٦٤٣ - مِسْطَرَكٌ

(F). Calorimètre (E).

(E). Calorimeter.

جهاز يستعمل في قياس كيات الحرارة الناتجة والصادرة والواردة .

٢٦٦٤٤ - مِسْمَرِيٌّ ، مَسْرُوكِيٌّ

(F). Calorifique (E).

(E). Calorific.

نعت تعريفي توصف به الاشياء التي تولد الحرارة .

٢٦٦٤٥ - مِسْمَرِيَّاتٌ

(F). Calorimétrie (E).

(E). Calorimetry.

درس طبيعي يبحث في قياسات الحرارة .



مسففة



مسداس



مسطاح



مسار

Arrhas (F). **مُسْكَنَة** - ٢٦٦٦٣
Earnest, Deposit (E).
هو البرين الذي يلقه احد طرفي القند الى الآخر
ساحة التماقد .

٢٦٦٦٤ - **مُسْكَبَة ، كَوْدَة**
Planche à semis, Planché surélevée, Plate-bande (F).
Border, Bed, Seed-bed (E).
مستطيل من التراب أربع من سطح التربة مستقيم الاضواء
عاط بمس صيد .

Bouillon blanc (F). **مُسْكِر الحُرُوت** - ٢٦٦٦٥
هو البوسير ، اطلبه .

Local d'habitation (F). **مُسْكَن** - ٢٦٦٦٦
Dwelling-local (E).
المسكن او محل السكن هو المكان الذي يخصصه المرء
لسكنه .

Habitation rurale (F). **مُسْكَن زُرَاعِي** - ٢٦٦٦٧
Rural residence (E).
كل بناء او بيت ريفي يسكنه من اقام في الريف او
توجد حل الريف بها كانت طيفته الاجتماعية . راجع
بيت زراعي .

Massicot **مُسْكُوت** - ٢٦٦٦٨
هو بروكسيد الزئبق الاصفر اللون .

Moschifère (F). **مُسْكِي** - ٢٦٦٦٩
Moschiferous (E).
نمت تعريف يطلق على الاجهزة الخاصة التي تتركز مادة
المسك ويجمعها عنه الحيوان .

Muscat (F). **مُسْكَاة ، مُسْك** - ٢٦٦٧٠
صفة العنب المسكي العرف وفي الكرومة غروب عديدة
مشهورة بهذا العرف المذاقي .

Moschins (F). **مُسْكِيَات** - ٢٦٦٧١
نفة من فصيلة الآليات تشمل جنساً واحداً يدعى آبل
المسك .

٢٦٦٧٢ - **مُسْلَاح**
النخلة التي يكثر برها وهو اخضر . وفي حديث مسا
يشتره المشتري على البائع انه ليس له مسلح ولا بحصار .

Erode (F). **مُسْلَكة** - ٢٦٦٧٣
نوع من الجزأب ، مشهور باسم ابو مسلفة ، اطلبه .

٢٦٦٧٤ - **مُسْلَاح ، مَهْيَاح**
المكان الذي يكثر فيه سلح الطير .

Abattoir (F). **مُسْلَاح** - ٢٦٦٧٥
Slaughter-house (E).
المكان المد لتحر وسلح وقضابة الحيوانات ويدهى الجوزر .

٢٦٦٧٦ - **مُسْلَكة * ، مِسْكَن**
Scarificateur (F). Scarificator, Hoeling-machine (E).
اداة تيسر ذرات التراب وتسوي سطح التربة وتقلع
الاشعاب .

Malcolmia (S). Malcolmia (F). **مُسْمَاح** - ٢٦٦٧٧
جنس نباتات عشبية حولية او معمرة من فصيلة الصليبيات .

Pai injecteur (F). **مُسْقَطَة** - ٢٦٦٤٦
Soil injector, Root injector (E).
أداة زراعية تستعمل في حقن التربة لكافة بعض الحشرات
والاصنام النباتية .

Homéotherme (F). **مُسْقُور** - ٢٦٦٤٧
Homéothermal (E).
نمت تعريف يطلق على كل حيوان ثابت الحرارة المستقرة .

Courbine (F). **مُسْقَار** - ٢٦٦٤٨
مسكة بحرية تدعى مسقار ، اطلها .

Masca (F). **مُسْقَة** - ٢٦٦٤٩
مسكة بحرية تدعى ايضاً خليد ، اطلها .

Projection **مُسْقَط** - ٢٦٦٥٠

Projection horizontale (F). **مُسْقَط اُفْقِي** - ٢٦٦٥١
Horizontal projection (E).

Projection verticale, Élévation (F). **مُسْقَط رُفْي** - ٢٦٦٥٢
Vertical projection, Elevation (E).

Projection orthogonale (F). **مُسْقَط عَمُودِي** - ٢٦٦٥٣
Orthogonal projection (E).

Cypres (S). **مُسْقَلَة * ، وَدَعَة** - ٢٦٦٥٤
Porcelaine (F).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات المدليات . اولوها
مدينة . اصداؤها صغيرة اللد ، شبه بيضية ، مبطلة .
تكثر في مجار البلاد الحارة . تستعمل لتزيين القواب .

Irrigée (F). Irrigate (E). **مُسْقُوتِي** - ٢٦٦٥٥
المسقوي او المروي هو كل زرع يسقى .

Pau de poisson (F). **مُسْك** - ٢٦٦٥٦
Fish skin (E).
المسك هو جلده المسك . ج سوك .

Musc (F). Musk (E). **مُسْك** - ٢٦٦٥٧
مادة دعنية عطرية سمراء اللون يفرزها آبل المسك .

٢٦٦٥٨ - **مُسْك الجَن**
اسم يطلق قسلاً على نباتات انصها حشيشة الريح
والنيسوم .

٢٦٦٥٩ - **مُسْك اللَقَائِر** هي الحاسبة .

Tubreuse (F). **مُسْك زُونِي** - ٢٦٦٦٠
هو الزبيب نبات تزييني من الترسبات .

Saccharimètre (F). **مُسْكَار *** - ٢٦٦٦١
Saccharimeter (E).
جهاز يستعمل في قياس مقادير السكر الموجودة في
السوائل . ويدهى ايضاً مقياس السكر ومقار .

٢٦٦٦٢ - **مُسْكَاة** هو الجبلوه ، اطلبه .



مسفة



مسكار



مسفة

Brousse (F). Bush (E). ٢٦٦٨٨ - مِسْتَك ٥

المست كل غلاة أو فيفاء أو سهب تعلوها بعض الاشجار
المبشرة الجميع . ج سائف .

Odontoglosses (F). مِسْكَنَات الِأَلْسِنَة ٢٦٦٨٩

لغة من الرضيات تحمل في أطراف ألسنها بعض الانسان
الصغيرة الذرية .

Courant d'air (F). ٢٦٦٩٠ - مِسْجَح ٥

Wind current (E).
مر الريح وبجراها في اي مكان أو مفتح كان .

Gorge-bleue (F). ٢٦٦٩١ - مِسْجَر ٥

هو المرقعة ، طائر من السحليات ، اطلها .

Aristolochie siphon (F). ٢٦٦٩٢ - مِسْكَوْرَة ٥

هو زراوته سيلو ، اطلها .

Courant d'air (F). ٢٦٦٩٣ - مِسْكَك ٥

Air current (E).
هو المسح اي مر الريح أو مجرى الهواء .

Purgatif (F). ٢٦٦٩٤ - مِسْجِل ٥

Purgative, Purging (E).
دواء يطلع البطن . اشهر مسهلات الحيوان : سلفات السودا
وسلفات المغنيزا وزيت الخروع .

Cheval demi-sang (F). ٢٦٦٩٥ - مِسْجَم ٥

Half-bred horse (E).
الفرس المجين .

Spatule (F). ٢٦٦٩٦ - مِسْوَاط ٥

Spatula, Paleace-knife (E).
أداة من خشب تستعمل لطبخ الزينة وسائر المصنوعات .

Cedran (F). Dial-plata, Dial (E). ٢٦٦٩٧ - مِسْوَاقِي ٥

Oldenlandia (S). ٢٦٦٩٨ - مِسْوَاك ٥

Oldenlandia (F). Indian madder (E). Oldenlandia (D). Oldenlandia (I).
جلس نباتات عشبية وجينية من فصيلة القرويات ، أنواعها
نحو ٢٠٠ ، اطلها البلاد الحارة. مسطها بري وبضها
زراعي صناعي يستخرج من جلونها مادة صينية حمراء
اللون .

Paseorage (F). ٢٦٦٩٩ - مِسْوَاك الرَاحِي ٥

هو النصاب ، نبات من فصيلة السليبيات ، اطلها .

٢٦٧٠٠ - مِسْوَكَ ، مِسْجَنَك ، مِسْجَنَكَة ٥

Préure (F). Rannat (E).
خيرة قابلة للذوبان تستخرج من منطقة الجدي الرشيح .
تستعمل في تجميد الحليب .

Dominé (F). ٢٦٧٠١ - مِسْوَ ، مِسْوَكَ ٥

Dominated (E).
نمت تمرني يطلق على كل خيرة لا يزيد ارتفاع سنها
عقب قمة الشجرة السالكة .

Eau saumâtre (F). Briny (E). ٢٦٧٠٢ - مَسُوس ٥

المسوس الماء بين المالح والمليح . قال الرازي :
و لو كنت ملاك كنت لا طب المالح ولا مسوا ٥

انواعها عديدة منها حوض البحر المتوسط . سفيها فرماء
تلقو من ٢٠ الى ٦٠ سم . أوراقها متعاقبة أحليجية مقطوعة .
نصلها على البثرة مسن الحافة . ازهارها طرفي الاوتكاز ،
عشودوي التجميع . ازهارها صغيرة القد يكثر فيها الابيض
والاحمر والقرنزي || اشهر انواعها الزينية ما يتبع .

Malcolmia maritima (S). مساح مجري

Malcolmia bicolor (S). مساح ثنائي اللون

Malcolmia litorea (S). مساح جهادي

Palisseau (F). Vine-stick (E). ٢٦٦٩٨ - مِسْكَك ٥

هو المرزح ، مسند يستعمل لدم الكرمة أو لرصها من التربة .

Acanthe-ursine (F). ٢٦٦٩٩ - مِسْكَس ٥

نبات يدمي اقتنا رهلة ، اطلها .

٢٦٦٨٠ - مِسْكَكَة ، مِسْكَكِرَان ٥

Aristolochie cotonneuse (F).
هو الزراوته الازرق ، اطلها .

Piscine, Vivier (F). ٢٦٦٨١ - مِسْكَكَة ٥

Fish-pond, Fish-wall, Stew (E).
حوض كبير ترب في الاسماك .

Digue (F). Dike, Embankment (E). ٢٦٦٨٢ - مِسْكَة ٥

حاجز يقام في وجه المياه لتحويل جزء منها أو لتخفيف
سرعة انسيابها .

Bigarré, Rayé (F). ٢٦٦٨٣ - مِسْج ٥

Motley, Streaked, Striped (E).
صفة التلو الجلبج .

Anergid (F). ٢٦٦٨٤ - مِسْجَل ٥

نمت تعريف يطلق على من اضمحلت فيه عوارض الاندفاع .

Tuteur (F). Prop (E). ٢٦٦٨٥ - مِسْجَد ٥

هو كل حود يوضع بجانب القرية أو الشجيرة لتسند اليه .
لذلك يحسن أن يكون مستقيماً وأن لا يقل متوسط طوله
من ٤ سم . افضلها اصله كالستديان والمليح... تقطع
المسند في اواخر الربيع فتتلف وتتقر اطرافها العليا
بالمخاض وقوت اطرافها السفلى التي تستعمل التربة بالمنجل
أو بالقدم ثم تقطع بمحلول سلفات النحاس وتبقى
كذلك حتى ينشج المحلول من قة المسند . والمحلول يتركب
من كيلو سلفات النحاس في مشرين لتر ماء . وهو يحفظ
المسند من النخر نحو سيمة احوام . ويصعبها من الخمران
الذي ان اصابها تفشى الى جميع الاغراس والاشجار .

Espalier (F). ٢٦٦٨٦ - مِسْجَد ٥

الخط من الاشجار المشرفة القائمة على جدار . ج مسندات .

Mussenda (S). Mussende (F). ٢٦٦٨٧ - مِسْجَد ٥

جلس نباتات جنينية من فصيلة القرويات . انواعها الممرية
زهاء ٥٥ . بعضها من نباتات العالم القديم . اصنافها البلاد
الاستوائية والحارة . سفيها فرماء . أوراقها متعاقبة أحليجية .
ازهارها على التجميع ، تاجي الاوتكاز . ازهارها خالصة
التركيب ، مسطلة الانابيب . لحاء سفيها وفادها حافصة .
أوراقها تدمل القروح . ازهارها تنفع الصغر وتلب بالمسال
وتلازم الجروح .



مسند



مسوك

٢٦٧١٧ - مِسْقَة * ، شَجَرَة الجِرْح ، نَبْت
Nicotiana glauca (S).

نوع من نبت رتيكيا وهو بعينه بريقة معمرة في المناطق الحارة ، حولية في المعتدلة . يعيش على السواحل اللبنانية . ساقه خشبية منتصبة فراءة تلي من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم . أوراقه متعاقبة ، متبادلة الارتكاز ، معقنة ، مستطيلة الزناد . نصلها وهي الشكل ، جامد الصلابة ، بحري اللون . ازهاره خماسية التركيب ، طرفية الارتكاز ، صفراء اللون . ثماره جزاء رباعية الفلق تلتف بعض بعض الزور اللينة ، الكروية ، الكستانية اللون || يقال ان أوراقه طيبة تفيد الجراح وفلأها .

٢٦٧١٨ - مِسْقَة
Terre Imperméable (F).
Impermeable soil (E).

المسكة من الارضين التي تمسك الماء وتمنع انصرافه .
Armoise dorée (F).

٢٦٧١٩ - مِسْقَة
Erodium moschatum (F).

هي القيصوم الكافوري ، اطبله .
Hydromètre (F).

٢٦٧٢٠ - مِسْقَة
Hydrometer (E).

مقياس كثافة السوائل وقوة انطاعها .
Baradine (F).

٢٦٧٢١ - مِسْقَة
هو الخنثى الذي يصنع في الارض الجبلية المنحدرة طبع الاقطار وقوتها خفيفاً من اضراسها .

٢٦٧٢٢ - مِسْقَة
Péripatéticien (F).

المشاه من أتبع فلسفة ارسطو .
Péripatetic (E).

٢٦٧٢٣ - مِسْقَة ، إشتراط
Pépinériste (F).

هو من تعاطى استنار المشتال .
Nurseryman (E).

٢٦٧٢٤ - مِسْقَة
Apomixis (F).

هو التكاثر آتيل المعاد الاخصاب .
Ferme, Métairie (F).

٢٦٧٢٥ - مِسْقَة ، شريك
Farm, Small farm (E).

ارض زراعية يجرها صاحبها بقده .
Sculpation (F).

٢٦٧٢٦ - مِسْقَة ، إشتراط
هي كل شرط او اتفاق او قيد ينص عليه في العقد .
Sculptation (F).

٢٦٧٢٧ - مِسْقَة *
Solarium (S).

Solarium, Cadran (F). Solarium (E).
جلس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وعضلة المشقيات . انواعها المعاصرة المعروفة نحو ١٥ منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة || اصداها مدورة محززة الحمار والصلابة ، ملوكة ومرتفعة اجسامها مستطيلة . رؤوسها قصيرة مادمة الانطام ثنائية الواس المعروفة . اصفاها قرينة المادة .

٢٦٧٢٨ - مِسْقَات
Solarilidae (S).

Solarilidae (F). Solarilidae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل اصمايات الخياشيم . اجسامها وانواعها المعروفة قليلة العدد اصفاها بحار البلاد الحارة || اصداها مدورة ، صابية الطبع ، محززة الحمار ، ملوكة ، مرقوشة ، متساوية الزخرفة والرفشة || اعرف اجسامها واشهرها المسقة .

٢٦٧٢٩ - مِسْقَة
Responsabilité (F).

Responsability (E).
هي الالتزام بازالة الضرر الواقع على الغير بفعل المرء او بسببه او بفعل غيره . وتتضمن في الصبح التالية :

٢٦٧٣٠ - مِسْقَة
Responsabilité délictuelle (F).

مسؤولية المرء عن فعل غيره
Responsabilité du fait d'autrui (F).

٢٦٧٣١ - مِسْقَة
Responsabilité du fait des animaux (F).

مسؤولية المرء عن اجهادات
Responsabilité du fait des choses inanimées (F).

٢٦٧٣٢ - مِسْقَة
Responsabilité du fait des bâtiments (F).

مسؤولية المرء عن مبانها
Responsabilité contractuelle (F).

٢٦٧٣٣ - مِسْقَة
Responsabilité légale (F).

مسؤولية قانونية
Responsabilité atténuée (F).

٢٦٧٣٤ - مِسْقَة
Responsabilité civile (F).

مسؤولية مدنية
Responsabilité partagée (F).

٢٦٧٣٥ - مِسْقَة
Capacimètre (F).

٢٦٧٣٦ - مِسْقَة
Capacimeter (E).

جهاز يستعمل في قياس السعة الكهربائية .
Fluximètre (F).



مسقة



ميس

Haras (F).

٢١٧٣٨ - مُشَبَّكَة

٢١٧٣٧ - مُشَاش هو النظم الطويل ، اطليه .

Breeding-stud, Stud (E).

موسسة تخني يكرام الخيل المدة للزود .

٢١٧٣٨ - مُشَاشَة Cartilage de l'extrémité des os

Caniveau, Emissaire (F).

٢١٧٣٩ - مُشَبَّرَة

٢١٧٣٩ - مُشَاش * Notopterus (S).

Channel stone, Gutter, Overflow channel (E).

Notoptera (F). Notopterus (E).

قناة لصرف المياه ، وهي قناة الصرف الاساسية التي تنتهي اليها مياه الاسراب وما شبه .

جنس اسماك بحرية من فصيلة المشاطيات . انواعها المرفوعة قليلة العدد منتشرة في بعض الانهر الاسيريه اخصها انهر واخوار العراق واثنت . جميعها كبيرة القند تطول من ٦٠ الى ١٠٠ سم . زعانفها الظهرية صغيرة ضيقة . زعانفها البطنية والشرجية متباعدة كالمخبط . لحويها مأكولة متوسطة الصنف || اشهر انواعها مشَاش شيلاتا (Notopterus chilata) الذي لا يقل طوله عن ١٠٠ سم . والذي يكثر وجوده في اخوار الهند ومليزيا .

Amentifère (F).

٢١٧٤٠ - مُشَبَّرَقِي *

من النبات ما كان ازهاره قد نثي الشكل كالشجرية .

Rassasiat (F).

٢١٧٤١ - مُشَبَّع

نمت تمرني يطلق على كل تبع ملجم الصفات الملائمة التي تتمركز دون القامة وفوق الموزونة .

٢١٧٤٢ - مُشَبَّع ، مُشَرَّب ، مُشَمَّم

Imprégné (F). Imprégnated (E).

Prévenu (F).

٢١٧٤٣ - مُشَبَّو ، فَتِين

Accused (E).

هو الذي تلقى عليه شبه اقتراف الجريمة .

Dispersif (F). Dispersive (E).

٢١٧٤٤ - مُشَبَّات

Extracteur (F). Extractor (E).

٢١٧٤٥ - مُشَبَّار *

جهاز آلي يستعمل لاستخراج الحسل من الخوايرب وذلك بتأثير القوة الانائية .

٢١٧٤٦ - مُشَبَّاع ، مَالِك على الشُّعُوع

Indivisaire (F). Co-parcaner (E).

هو ما يملك مع غيره مالا على الشيوع .

Collectif (F). Collective (E).

٢١٧٤٧ - مُشَبَّرَكَة

Hamamelidaceae (S).

٢١٧٤٨ - مُشَبَّرَكات

Hamamelidacées (F). Hamamelidaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقين . نباتاتها اشجار وشجيرات . اوراقها منتنة اذنينة . ازهارها عثرية . ثمارها جواء صغيرة . معظم انواعها بري وبعضها طبي وزينة .

٢١٧٤٩ - مُشَبَّرَكَة * ، هَمَامِلِيش

Hamamelis (S). Hamamelis, Hamamelis, Noisetier sorcier (F). Witch hazel (E). Zambarnus (D). Amamelide, Trilipo (I).

جنس شجيرات وجنات برية وزينة من فصيلة المشركات . انواعها قليلة العدد . اوراقها متعاقبة منتنة مائلة . نعلها يبيح الصفحة مسن الحلق . ازهارها مجرورة الارزكاز ، بحيلة الشكل ، وباحية او خلية البتلات || اوراقها وطاه سويها طيبة تستعمل في بعض العلاجات الصغرية . . اشهر انواعها الزينة ما يلي .

٢١٧٥٠ - مُشَبَّرَكَة عَمَلِيَّة

Hamamelis mollis (S). Hamamelis velouté (F).

شجرة متوسطة القند غارسة تعلو نحو ١٥ اطار . موها الصين . اوراقها خلية البتلة على صفحتها السفل . ازهارها كبيرة القند ، عذبة المرف ، لها الى الصفرة الزخمية ، كروها خرية عابقة || ازهارها يستمر من اواخر كانون الى اواخر اذار .

٢١٧٣١ - مُشَبَّاع Indivis (F). Undivided (E).

الملكية الشاملة غير المنقصة .

Pecten (S).

٢١٧٣٢ - مُشَاق * Peigne (F). Pecten (E).

Peigne (F). Pecten (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة المشطيات . انواعها المرفوعة عديدة منتشرة في معظم بحار العالم واخصها البلاد المتحدة الحرارة || اصداؤها كبيرة القند ، شبه مرسية الشكل ، شعاعية التخذيد ، لامتلاوية المصاريم ، الايمن منها شديد التخذيد قليل التخذيد || تعيش طليقة على الرمال وتتغذى بسرعة . لحويها مأكولة جيدة الصنف .

٢١٧٣٣ - مُشَاق ، مُشَقَّة ، هُبُر

Filasse (F). Filasse, Hari, Tow (E).

ما غلس بالثمن من لحاء النباتات الليفية كالكتان والقنب قبل نزله .

٢١٧٣٤ - مُشَاقَّة Tille, Taille (F). Hemp-harb (E).

هي قشور القنب والريزوفن .

Pectinidae (S).

٢١٧٣٥ - مُشَاقِيَّات * Pectinidae (F). Pectinidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم الرباعية عذامات الخشب . اجناسها وانواعها المرفوعة عديدة معظمها من متحجرات الاراضي الثالثية . انواعها المصارمة منتشرة في معظم بحار البلاد المتحدة الحرارة || اصداؤها متباينة الاشكال والاحجام ، بالغة التخذيد ، لامتلاوية المصاريم || احرف اجناسها المصارمة المشكل .

Nardache (F).

٢١٧٣٦ - مُشَاق

هو الكريسان ، اطليه .

Péripecticisme (F).

٢١٧٣٧ - مُشَاقِيَّة * Peripecticism (E).


المشاقية اسم يطلق على فلسفة ارسطو لانه كان لا يلتقي بدوره الا ماشيا بصحبة طلابه .



مشط



مشاق



مششار



مشركَة

٢١٧٥٩ - مِشْجَارٌ ٥
Dendromètre (F).
Dendrometer (E).
أداة تستعمل في قياس الانحجار لتقدير الملو والمجم .

٢١٧٦٠ - مَشْجَرٌ
Bois (F). Wood, Forest (E).
موضع الشجر ونبتته الطبيعي .

٢١٧٦١ - مِشْحَارَةٌ ٥
Nigrospora (S).
جنس فطور مجهرية من الدخيات وفصيلة الطحنيات. تتميز
ببغاياها الثنائي التكوين والشكل . الخصب منها بسيط
التركيب ، فردي التجميع ، متصبب الإزتكاز ، عايق
اللون . أما الآخر ففسي التجميع مداد . كئاشدا
كروية ، متناهية ، كثيرة العدد || أحرف الأنواع مشحارة
الذرة ومشحارة الموز .

٢١٧٦٢ - مِشْحَارَةٌ الدُّرَّةُ ٥
Nigrospora oryzae (S).
فطر مجهرى مركب غرائس الدرة قرب ادراك حبا فيفسد
الالفاف بعد ان يسبب الخللها واسودادها ما يلذي من
تساقط الحب قبل الانعاش والظافات || يدركها باجتباب
المواقع الرطبة ويكافح باستعمال مسحوق شيرلان تمفيرا
حل النبات .

٢١٧٦٣ - مِشْحَارَةٌ المَوْزُ ٥
Nigrospora musae (S).
فطر مجهرى مركب ثمار الموز المخفوفة فيسبب اللباب
ويقوده الى الخلل دون ان يدور حل القشرة ما يتم من
الاصابة || يكافح عند ظهور اول اصابة بفسخ الكباشات
المخفوفة بسائل شيرلان المركز من ١ الى ٢٪ .

٢١٧٦٤ - مِشْحَبٌ
Racloir (F). Scraper (E).

٢١٧٦٥ - مِشْحَةٌ
Teinte (F).
Tint, Shade, Hue (E).

٢١٧٦٦ - مِشْحَرَةٌ ، مِشْحَمَةٌ
Fauille (F).

٢١٧٦٧ - مِشْحَطٌ
Charasson, Pisseau
هو المرحض اى المسموك، عويد يوضع تحت قضيب الكر
يرفعه عن التربة .

٢١٧٦٨ - مِشْحَتَابٌ ٥
Lactomètre, Pèse-lait (F).
Lactometer (E).
هو ميزان الحليب، جهاز يستعمل لتقدير نسبة المواد
السكرية المحيصة في الحليب .

٢١٧٦٩ - مِشْحَلٌ ، مِشْحَلٌ
Baliveau (F).
Saddle (E).
كل فرع او شجرة من الخشب تركت بدون قطع لتكبر
وتصير حجة . ج . اعجاز .

٢١٧٧٠ - مِشْحَدٌ ٥
Serpette (F).
Pruning-knife, Serpette (F).
سكين خاص يستعمل في قطع الفروع والقضبان الخشبية
وفي التطعيم .

٢١٧٧١ - مَشْرٌ ، مَشَرٌ
مشر ويشر للشجر : مخرج ورقه واكتس خضرة .

٢١٧٥٩ - مُشْتَرَكَةٌ رَيْبِيَّةٌ
Hamamelis vernalis (S). Hamamelis plantanet (F).
جينة سبروتية تملو نحو ٢٠٠ سم . مهدا البلاد الاسيكية .
ساقها فراء . فرجها متصببة . اوراقها تطول نحو ٦ سم .
نصلها مائل المسفة . ازهارها صلبية الرائحة ، حر
الكروس ، صفر البتلات || ازهارها يستمر من
كانون الثاني الى اواخر اذار .

٢١٧٥٢ - مُشْتَرَكَةٌ فِيرْجِينِيَّةٌ
Hamamelis virginiana (S). Hamamelis de Virginie (F).
جينة سبروتية تملو من ٣ الى ٤ امتار . مهدا امريكا
الشالية . اوراقها مائلة المسفة تطول من ٥ الى ٨ سم .
ازهارها صفراء اللون . ازهارها يتنشق عند اقبال الورق
ويستمر من اواسط ايلول الى اواسط كانون .

٢١٧٥٣ - مُشْتَرَكَةٌ يَابَانِيَّةٌ
Hamamelis japonica (S). Hamamelis japonica (E).
شجرة سبروتية صغيرة القد فارشة تملو من ٤ الى ٧ امتار .
مهدا اليابان . ضرورها الازيينية اربعة . الوران ازهارها
تختلف باختلاف ضرورها منها الاسفر الذهبي والكبريتي
والبيروني والبرتقالي . جميعها صرة مستحبة الورد .
ازهارها يستمر من شباط الى نيسان .

٢١٧٥٤ - مُشْتَرِي ، بِرْجِيسٌ
Jupiter (F).
Jupiter (E).

المشتري او البرجيس اكبر كوكب في مجموعة النظام
الشمسي . يعتبر المم كوكب بعد الزهرة . يقفه بين المريخ
وزحل . جرم كتله يفوق جرم الارض نحو ١٢٩٥ مرة
وتطهر يفوق قطر الارض نحو ١١ مرة . سرعة دورته
الانقلابية في الفضاء نحو ٤٦٩٨٠ كيلومتر بالساعة .
دورته المحورية حول الشمس تستمر نحو ١٢ سنة . مدة
اليوم البرجيسي نحو عشر ساعات . ويدور في فلكه اربعة
االقار كبيرة ومائة صغيرة . اسماء الكبيرة : ليو ، اربعة ،
غائيد ، كليليو . أما الصغيرة فاراقها من ٥ الى ١٢
لانها لا تحمل اسماء || والنبشون يسكن المشتري السد
الاكبر لانه فوق الزهرة في السعادة وانما الى الخيرات
الكبيرة والساعات العظيمة .

٢١٧٥٥ - مُشْتَقٌ
Dérivé (F).
Derivative, Drifted (E).

٢١٧٥٦ - مِشْكَلٌ ، مِشْكَبَتٌ ، دُلْدَالَةٌ
Pépinière (F). Nursery (E).
مكان تستنبط فيه الكراس والنباتات المخلطة فشتا فيه
وتكثف فترة من الزمن الى ان تنقل وتزود في مستقرا .

٢١٧٥٧ - مِشْكَلُونٌ ، شَالِيلٌ
Plantoir (F).
Dibble (E).
أداة من حديد او خشب تفضل في التشتيل اي غرس
الشجر .

٢١٧٥٨ - مِشْكَنٌ ٥
Filtre (F). Spinneret (E).
المشكن القوعة التي يخرج منها الخيط عند نفس المشرات
كمكيط الحرير عند دودة القز وكالتواس عند الرقباد ||
وهو ايضا جهاز من الفولاذ يستعمل في جذب الماد
ومدها وتحويلها الى اسلاك .



مشتلون



مشحارة الموز



مشخاب



مشذب



مشط



مشط الزامي



مشط الزامي البري



مشط الزهراء

عشب فيها انسان تسمى بها التصاب ويغسل بها الحب .
وللمشط اشكال ، اهمها استعمال :

- Herse en bois (F). مشط خشبي
- Herse rotative (F). مشط دوّار
- Herse tralante (F). مشط زاحف
- Herse canadienne (F). مشط كندي
- Herse émotteuse (F). مشط مدري
- Herse souple (F). مشط مرن
- Herse articulée (F). مشط مفصل
- Herse norvégienne (F). مشط تروجي

Herbage (F). - مُشَطَط ، تَمَشِيط

Harrowing (E). حراثة سطحية بالمشط؛ القصد منها تنعيم التربة وتغطيتها من الاشاب .

Chromis (F). - مُشَطَط

هو البلطي، جنس اسماك بحيرة ونهرية من فصيلة المشطيات.

٢٦٧٩١ - مُشَطَط الذئب

وهو صغير طيب الرائحة يقارب الكزبرة .

٢٦٧٩٢ - مُشَطَط الزامي * ، شوك الدوّاج

Dipsacus fullonum (S). Chardon à foulon (F). Draper's teasel, Fuller's teasel, Teazle (E). Weberkarda, Kardendistel (D). Cardo del lanajo, Dissaco, Lattugoni (I). نبات عطري زراعي صناعي من فصيلة الدبسيات . رؤوساته الزهرية حراشف ثلاثية متراكبة متراصة منبسطة الاطراف تولّد اكباداً اسطوانية تصعل في تهبّيد الصوف.

٢٦٧٩٣ - مُشَطَط الزامي البري *

Dipsacus sylvestris (S). Cardère sauvage, Cabaret des oiseaux, Baignoire de Vénus (F). Wild teasel, Shepherd's rod, Barber's brushes (E). Schuttkarde (D). Dissaco salvatico, Erba messella, Varga da pastore (I).

نبات عطري يري شائك من فصيلة الدبسيات . يزود مأكّل للصافير انصها الحصى وشاهيه . يستعمل من قبلات الفارة لانه يملئ على سائر النباتات التي تفسد بقره .

٢٦٧٩٤ - مُشَطَط الرجل

Métatarses (F). Metatarsus (E).

٢٦٧٩٥ - مُشَطَط الزَّهْرَاء * ، مُشَطِطَة

Scandix جنس نباتات عشبية من فصيلة البنيانيات . انواعها المعروفة ١٠ ، جميعها برية . اولها متعلقة مركبة طويلة الزناد . انجازها غنية للتصنيع يدهاش اللون . تكثر بين التزودع وتوجد في جميع البلاد . اشهرها وامها مشط الزهراء الطويل.

٢٦٧٩٦ - مُشَطَط الزَّهْرَاء الطَّوِيل

Scandix pecten-veneris (S). Scandix peigne de Vénus, Aiguille de berge (F). Shepherd's needle, Venus' comb (E). Echter Nadelkerbel, Venus-kamm (D). Scandica, Forasacco, Pettine di venera (I).

نوع من مشط الزهراء يكثر في الاودية والبيور وبين التزودع فيجمعها ويؤخذها .

Liquemètre (F). - مُشْرَاب *

Liquometer (E).

المشرب هو ميزان المشروبات ، جهاز يستعمل لقياس درجة الكمحول في المشروبات الروسية .

٢٦٧٩٢ - مُشْرَبَة

Thalle (F). Thallus (E).

هي جهاز شجاع غشيات الزهر كالظهور والالاع .

٢٦٧٩٤ - مُشْرَبَة

طائر صغير مدهج كان ثوب وفي (السان) .

٢٦٧٩٥ - مُشْرَبَة

Coulouvre à échelons (F).

هي الخشت الاقصر ، اطلب .

٢٦٧٩٦ - مُشْرَب على الوسي

Subrogatuteur (F). Deputy-guardian (E).

هو الذي يقوم مقام الوصي على القاصر اذا تضاربت مصالحها ، أما مهمته الاصلية فهي مراقبة اعمال الوصي .

٢٦٧٩٧ - مُشْرَبَة

Ecumeuse (F).

هي المصفاة ، آلة تحضّر الزرع عالياً غشية من الشجبان .

٢٦٧٩٨ - مُشْرُوب

Boisson (F). Drink, Beverage (E).

٢٦٧٩٩ - مُشْرُوج ، لاشيقي

Agave (F). Agamous (E).

٢٦٨٠ - مُشْرُوع ، تصميم

Projet (F). Project (E).

٢٦٨١ - مُشْرُوع استيعابي

Projet préalable (F). Previous project (E).

٢٦٨٢ - مُشْرُوع إعدادي

Avant-projet (F). Advance project (E).

٢٦٨٣ - مُشْرُوع العقد

Avant-contrat (F). Advance contract (E).

راجع عقد الودع .

٢٦٨٤ - مُشْرُوع قانوني

Projet de loi (F). Draft bill (E).

هو المشروع الذي تضمه الحكومة وتقدمه الى المجلس النيابي باسم رئيس الجمهورية ليقدر ويصبح قانوناً .

٢٦٨٥ - مُشْرُوبات المتكاثرة ، سنيات المتكاثرة

Dentostreas (F). Sicklebill (E).

رتيبة من الطيور الجارح تشمل بعض الفصائل ، اشهرها الدغليات والحريرات والمشروريات والصرديات .

٢٦٨٦ - مُشْرِيَّات ، نباتات عكسوية

Thallophytes (F). Thallophyta (E).

صف من المملكة النباتية . نباتاته تتكون من جرم يمس فطرًا او ثلا . وهي عاصدة الجلود والسوق والاوراق والازهار . ابناءها وانواعها تعد بنسبة الاف جميعها ثلاث عشب : البكتريات والطحيات والفطريات .

٢٦٨٧ - مُشْتَش

Suros (F). Splint, Tumeur (E).

حلة تسمى الخيل وهي تزيّات في الرظيف .

٢٦٨٨ - مُشَطَط

Herse (F). Harrow (E).

أداة تستعمل لتشيط التربة . وهي شعبة من حديد او

Actinaires ٢٦٨١١ - مُشَعَّات
رَبِيَّة من المرجانيات تشغل العديد من الفصائل والاجناس
والانواع .

Indicateur (F), ٢٦٨١٢ - مُشَعَّاو *
Indicator, Indicatory (E).

Radiomètre (F), ٢٦٨١٣ - مُشَعَّاع
Radiometer (E).
المشاع جهاز يستعمل في لقياس شدة الضوء .

Compte-gouttes (F), ٢٦٨١٤ - مُشَعَّاف
Dropper, Drop-tube (E).

Terebellum (S), ٢٦٨١٥ - مُشَعَّيَّة *
Térébelle, Tarlère (F), Terebellum (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات مميزات الارجل
وتفصيلة الدلاحيات . انواعها المعروفة عديدة ، بعضها من
متحجرات الاحقاب الثالثة والبيض الآخر معاصر
متشتر في بعض بحار البلاد الحارة اغصها المحيط الهندي ||
اصداؤها صاروخية الشكل ، مستطيلة الذقنة القليلة
الانفراج . اجسامها صغيرة القد ، غرطية الاغظام
المستطيلة .

Fané (F), Faded (E), ٢٦٨١٦ - مُشَعَّوْن
نمت تدريجي توصف به الاعداء النباتية القابلة .

Atelier, Local de travail (F), ٢٦٨١٧ - مُشَعَّل
Work shop (E).
هو المكان المد للشدل .

Ēnanthe (F), ٢٦٨١٨ - مُشَعَّلِيل
هو الرأزيانة ، نبات من الصيرانيات ، اطلها .

Phellandre (F), ٢٦٨١٩ - مُشَعَّلِيل مَائِي
اطلب رأزيانة مائية .

Pneumatique (F), ٢٦٨٢٠ - مُشَعَّلَاق *
Pneumatic (E).

Diaphanomètre (F), ٢٦٨٢١ - مُشَعَّلَاق *
Diaphanometer (E).
جهاز يمكن من درس وتحديد شفط الاجسام والوسائل .

Babine du chameau (F), ٢٦٨٢٢ - مُشَعَّلَر ، مُشَعَّلَر *
المشعر من الهجر كالجملغة من الفرس . ج مشاعر .

٢٦٨٢٣ - مُشَعَّلِي سمكة بحرية مشهورة باسم مدجج .

٢٦٨٢٤ - مُشَعَّلِي مَبْدُولِي

Notacanthus commun (F),
سمكة بحرية تسمى مدج مبدول ، اطلها .

٢٦٨٢٥ - مُشَعَّلِي ، مُشَعَّلِي

Teillage (F), Stripping (E).
نصل المشاقة اي القشرة من سوق القنب والكتان وما
اشبه .

Ebroutage ٢٦٨٢٦ - مُشَقَّاق ، مُشَقَّاق * هَتَّ
فصل ورق التوت من السالاج قبل تقديمه الى دود القز .

Dérayure (F), Water-furrow (E), ٢٦٨٢٧ - مُشَقَّقِي
منخفض يترك بين السكينين في الحراثة تسوية لصرف
المياه .

Métacarpe (F), ٢٦٦٩٧ - مُشَطَّ الَيْدَة
Metacarpus (E).

Fissifolié (F), ٢٦٦٩٨ - مُشَطَّوَر التَصَل
Fissifoliat (E).

نمت تدريجي يطلق على كل نبات يحمل أوراقا ناصفا
مشطورة الاطراف .

Diatomaceae (S), ٢٦٦٩٩ - مُشَطَّوَرَات
Diatomacées (F), Diatomaceae (E).

فصيلة من الحث السمر . اجناسها وانواعها كثيرة العدد
جميعها نباتات مجهرية من سحيدات الخلية . تعيش في
المياه الملمة والخلية .

Kigélie (F), ٢٦٨٠٠ - مُشَطَّوَرَة
هي الكيجلية ، اطلها .

Pinnal, Pinné (F), Pinnate (E), ٢٦٨٠١ - مُشَطَّيِي
شكل من اشكال أوراق النبات يشبه المشط .

Pectiné (F), Pectinate (E), ٢٦٨٠٢ - مُشَطَّيِي
شكل من الزباني يشبه المشط .

Ctenodonte (F), ٢٦٨٠٣ - مُشَطَّيِي الِاسْتَان
Ctenodonte (E).

من الحيوان والاسماك من كانت اسنانه كالشط .

Bipectiné (F), ٢٦٨٠٤ - مُشَطَّيِي مُزْدَوِج
Bipectinate (E).
شكل من الزباني يشبه المشط المزودج من جهتي الطول .

Chromidae (S), ٢٦٨٠٥ - مُشَطَّيِيَات
Chromidés (F), Chromidae (E).
فصيلة اسماك من رتبة شالكات الزعنات .

Ctenophores (F), ٢٦٨٠٦ - مُشَطَّيِيَات
Ctenophora (E).
رَبِيَّة حيوانات دنيا من شعبة مجربات البطون .

٢٦٨٠٧ - مُشَطَّيِيَات الخَيْشَمِي
Ctenobranches (F), Ctenobranches (E).

رَبِيَّة من الرغويات مميزات الارجل اماميات الخيشم .
نصائلها واجناسها وانواعها عديدة . جميعها وحيدة المشط
الخيشومي والاذنين والحقوق . وجميعها ايضا مميَّزة الاعداء
لأن الاعداء الحساسة المقابلة ضامرة لا عمل لها .

Rétribution (F), ٢٦٨٠٨ - مُشَقَّاق *
Remuneration, Reward (E).

المشع حيلة تدفع اجراً او مكافأة لمن يقوم بعمل .
فالملك والراغب والجزاء والشكر والاعصاب والبصلة والجمالة
والتمريض جميعها تعتبر من الامشاع .

Radiomètre (F), ٢٦٨٠٩ - مُشَقَّاق ، مُشَقَّاق *
Radiometer (E).
مقياس شدة اشعة النور .

Flustra (S), ٢٦٨١٠ - مُشَقَّاق *
Flustrelle (F), Flustra (E).

جنس حيوانات طليعية بحرية ثولية التجميع متشعبة تعيش
على الفوس .



مشعة

البشرة ، من الحافة . ازهارها خشوية كبيرة اللد ، بيضاء اللون ، ودية الموالج . ثمارها لحمية السويك ، لا قياسية الشكل ، خلية البشرة ، قصيرة الاذن ، للذلة العلم ، مستحبة البرف والنكهة . صمغها بيضيه خشبية مطيقة وبنفسطة تحضن برزة جامدة للساب الايض . وثمره المشمش لكل طازية ورطب ويحبف ويوصح من صمغها رطب ناشف لدن يملك اجزاء صفيحي الشكل ينحى قر اللين يكثر استهلاكه في البلاد العربية .

٢٦٨٢٨ - **مُشَقَّاسِي** ° Commensurable
نعت تعريفي يطلق على ما يمكن قياسه هو وغيره بمقياس واحد مشترك .

٢٦٨٢٩ - **مُشَقَّاسِيَّة** ° Commensurabilité (F).
Commensurability (E).
امكان قياس كيتين او أكثر بمقياس واحد .

٢٦٨٣٠ - **مُشَقَّة** Filasse (F). Tow (E).
هي الطاقة التي ما يخص بالمشق من لحاء النباتات اللينة كالقنب والكتان .

٢٦٨٣١ - **مُشَقَّن** Scarificateur (F).
المسلفة تسوي بها التربة المبلورة .

٢٦٨٣٢ - **مُشَقَّقُ الْجَنْجَاح** Fisiptenne (F).
Fisipinna (E).
نعت تعريفي يطلق على كل طائر مشقوق الجناح .

٢٦٨٣٣ - **مُشَقَّقَاتُ الْأَرْجُل** Schizopodes, Fisiopeds (E).
رتبة حيوانات من الثعريات .

٢٦٨٣٤ - **مُشَقَّقَاتُ الْأَنْسَكَة** Fissilingues
رتبة من الطائيات تشمل بعض الفصائل . تتميز بالسنبها المستطيلة المشققة الفارقة الإعاذة .

٢٦٨٣٥ - **مُشَقَّقَاتُ الْمَتَالِي** Fissirostres (F).
Fissirostros (E).
رتبة من الطيور الموالج .

٢٦٨٣٦ - **مُشَكَاة** Guirlande (F).
Garland, Wreath (E).

٢٦٨٣٧ - **مُشَكَّال** Allotropique (F).
Allocropic (E).

صفة بعض الاجسام كالكاربون والفسفور وغيرها التي تتصل بأشكال حكيمة مختلفة دون ان يتبدل شيئاً من تركيبها الجزيئي .

٢٦٨٣٨ - **مُشَكِّطَارَا** Menthe aquatique (F).
هو القونج المائي ، اطلبه .

٢٦٨٣٩ - **مُشَكَّكَة** Fraîtière (F).
Strawberry-bed (E).
قطعة ارض مفرسة شبيهاً ج مشاك .

٢٦٨٤٠ - **مُشَكَّلُوز**
هو المشمش اللوزي المحلو اللج . الواحدة مشكولة .

٢٦٨٤١ - **مُشَقَّاس** Mélioscope (F). Helioscope (E).
منظار الشمس .

٢٦٨٤٢ - **مُشَقَّاسِي** Mélioscopique (F).
Helioscopic (E).

٢٦٨٤٣ - **مُشَقَّاسِي** °
Prunus armenica, Armeniaca vulgaris (S). Abricotier (F). Apricot tree (E). Aprikosen, Echta Aprikose (D). Albicocco, Armellini, Melico (I).
شجرة عسرة من فصيلة الورديات . تطرم من ٧ الى ١٥ م . ساقها قصيرة . اثمارها وفروها منسقة . قشورها تكون في اهل جهندا مساهم تم تتلفق مع بروج الزين . اوراقها حابلة ، متعاقبة ، منقطة ، قلبية الشكل . لصلها مائل

مهده :
قبل انه من نبوت الجسم او ارضها وقد انقضا اثيراً على انه من نبوت الصين لانهم هربوه واستمروه منذ زهاء ٢٠٠ سنة قبل الميلاد ، وقد أدخل من الصين بالتتالي الى الهند فالسجم فالمرق فاروبيا فتركيا فالبرتغال فالناباليا .

الليم :
لو لم يكن المشمش من النباتات البكرية الاقرار ولو لم يكن ازهاره يستحق الاوراق ويتأثر من صقيع الربيع لكانت سائر النباتات الممتدة توافقه . لذلك فهو رطب في الاسكان الدافئة والمعارض الجنوبية والمواقع التي لا تكثر فيها الريح الموسما .

ترابسه :
ينمو ويوجد في جميع الارضية ولا يألف من كثرة الحمى اما يحض شدة الالتصاق والطرورية المستحكة || وهو من الاجشجار المسقوية التي تتطلب الري المنتظم وقد تنضج من الجلف .

تكميره :
يتكاثر بالبذر وبالعلم . والتعلم يتم عادة بالرقعة ، معلوم وفي . أما الاجشجار التي يحسن تغذيتها كاهيات فهي اللوز في الاربة الكلية والخوخ في الاربة المنجبة والذرات في الاربة العميقة القليلة الرطوبة والمشمس الكلاني في سائر الاربة .

فروبه :
فروبه عديدة تقسم الى لنتين : فة المشمش الكلاني وهو ما كانت يلموه مرة العلم غنية بالحامض السيانيدريكي وفة المشمش اللوزي (المشكولة) وهو ما كانت يلموه مأكولة عادمة الحامض السيانيدريكي || اثمره فروبه الوطنية ما يتبع :

- **المسوي** : فطره متوسطة اللد قارشة . ساقها جوية اللون قليل التشقق . اوراقها مابقة الخضار صغيرة اللد . ثمارها كبيرة الحجم غاذية الى الحمرة وهي للذلة العلم خافتة البرف والنكهة . بزودها حلوة مأكولة .

- **البلدي** : اصراره عديدة ، اثمارها الماردي وانجاشا . فطره متوسطة اللد كروية الشكل . ساقها جوية اللون عريقة التشقق . فروها منسقة متراصة . اوراقها كبيرة اللد زاهية الاخضرار . ثمارها كبيرة الحجم برتقالية اللون للذلة العلم يكثر استهلاكها في النفرج . بزودها حلوة مأكولة .

- **الحسوي** : له صرمان « البكين » و « القوس » فطره كبيرة اللد ساقها مرارة كثيرة التشقق . اثمارها منسقة متراصة . اوراقها زاهية الاخضرار . ثمارها متوسطة الحجم للذلة العلم ذكية البرف والنكهة لغيا الى الصفرة الذمية . بزودها حلوة العلم مأكولة .

- **السنشاني** : فطره كبيرة اللد شائعة . ساقها كهباء اللون مرارة الموالج . اوراقها صغيرة الصفحة مستطيلة البت



مشمش

٢٦٨٥٣ - مَشُوَسِي
Hypogée (F).
Hypogean (E).
لتمت تعريفه يطلق على البزور التي تستقر زباراتها ، عند الانتاش ، تحت سطح التربة وهي تماكس بذلك البزور المربانية التي ترتفع زباراتها فوق سطح التربة .

٢٦٨٥٤ - مَشُوط * عَشُوط الغُرَاب
Achrostichum (S). Acrostic, Acrostique (F). Full-fern, Horn-fern (E). Füllfarn (D). Acrostico (I).
جنس نباتات برية وتربينية من الرضويات البساجيات . انواعها المعروفة قليلة ، تروى في المناطق والمواقع الرطبة الغظلية . اوراقها قرصية الانتشاب تطول من ٣٠ الى ١٠٠ سم . تصحبها لا يعنى حدود الزايم الثالث . تشرى بها مشاري الشكل ، مستدير السن .

٢٦٨٥٥ - مَشُوط
Etrape, Etrapoire (F).
Small sickle (E).
منجل خاص يستعمل في تشويل الجملاد .

٢٦٨٥٦ - مَشِيَط
Hétérois (F). Heterosis (E).
المشيط هو هجلاج السب الاول اي السلالة الاول عندما يكون عظم القدر . ويحيث ان صفات المشيط صفات انتقائية لا مستقرة ولا وراثية فهجلاج السب الثاني لا يكون مشيطاً لانه يرد الى صفات دحه وعقله . ج. مشاييط .

٢٦٨٥٧ - مَشِيَطِي
Hétérotique (F).
Heterotic (E).
نمت تعريفه يطلق على بعض العوامل او الصفات المسيرة التي تقود الهجن الى الشلطة او التفوق الشياطي .

٢٦٨٥٨ - مَشِيَاع
Diagometer (F).
Diagometer (E).
جهاز يستعمل في قياس الاصلية اي قابلية النقل الحراري في الاجسام .

٢٦٨٥٩ - مَشِيَة
Allure (F). Carriage (E).
طريقة سير أنجل وسائر الدواب كالخيل والحملجة والغلب والعدو .

٢٦٨٦٠ - مَشِيَة
Muschle (S). Muschle (F).
جنس نباتات تربينية عشبية عشبية معمرة من فصيلة الجريسيات . انواعها المعروفة قليلة العدد ، وهذا حوض البحر المتوسط . سيقانها منتصبة فراء . اوراقها كبيرة ، فارشة ، مسننة الاطراف . فصلها ريلة مسترعية تطول من ٣٠ الى ٦٠ سم . ازهارها حثكولي التجميع ، هري الشكل . ازهارها صفراء اللون او حمراء اللون . في اى ه سم . || تنويرها يستمر من تموز الى ايلول .

٢٦٨٦١ - مَشِيَة الفُطُر
Mycellum (F).
Mycellum (E).
خيوط دقيقة متشابكة كثيفة التجميع ناعية تحمل البوغ في التطور . ج. امشاج .

٢٦٨٦٢ - مَشِيَة
Plantain triomphe (F).
هي لقمة النخبة ، اطليه .

٢٦٨٦٣ - مَشِيَة
Scandix (F).
هي مشط الزهراء ، اطليه .

باعت الحضار . ثمارها الى السفرة اللامعة وهي قرية الشبه من الحسوي لكنها دونه لذة وذكاة . بزورها حلوة مأكولة .

العصبي : شجرته كبيرة اللد شائعة . ساقها جذوية سرء قليلة التشقق . اغصانها فارشة منبسطة . اوراقها بيضية المسحة ، قليلة القاعدة ، حيلة الحضار القاتم . ثمارها كبيرة اللد حيلة الشكل صفراء اللون غصراء المواج

لباها جامد المكسر سكري الطعم غالت العرف والتكية . - الكلاوي : الكليبي ، اغصانه عديدة . اشجاره شائعة ، سوقها جذوية اللون متوسطة الخشونة والتشقق . اغصانه منفردة . اوراقه قليلة مديدة المعص . فصلها قليل الاغصان والزهرة . ثماره كروية الشكل صغيرة اللد غزيرة الصدارة تستعمل في صناعة قر العين . بزور مرة الطعم .

- للوزي ، المشلوز ، القهي : شجرته متوسطة اللد فارشة ، اوراقها شديدة الخضار . ثمارها كروية الشكل متوسطة اللد حيلة اللون الابيض تشوبه حرة ودية . لهاها غزير الصدارة لديد الطعم ذكي العرف والتكية . بزورها حلوة مأكولة .

٢٦٨٤٤ - مَشِيش اليابان
Kaki (F).
هو الكاكي ، اطليه .

٢٦٨٤٥ - مَشِيش امريكة
Mammée d'Amérique
شجرة عمرة مشهورة باسم جيباس امريكة ، اطليه .

٢٦٨٤٦ - مَشِيَة
Abricot (F). Apricot (E).
هي ثمرة المشش . راجع جدول الفيتاينات .

٢٦٨٤٧ - مَشِيَة
Mespilus (S). Néflier (F).
جنس شجيرات برية وزراعية من فصيلة الورديات . انواعها قليلة العدد ، البرية منها شائكة والزراعية سرسة . اوراقها حاملة منتقة اعطالية ، فصلها يارز العروق عشن المنس . ثمارها حلي البشرة . ازهارها كبيرة اللد بيضاء اللون . ثمارها كيار الاكيدنيا لكنها اصفر حجباً واقل سيقاً ، لونها الى السرة الكستنية || اشهر انواعها المشلة المحولة .

٢٦٨٤٨ - مَشِيَة مَبْدُولَة * دُغُور جرماني
Mespilus germanica (S). Néflier commun, N. germanique, Marlier, Nêle (F). Medlar tree, Dutch medlar (E). Deutsche Mispel (D). Nespolo (I).
نوع من المشلة وهي شجيرة زراعية تطول من ٢٥٠ الى ٤٠٠ سم . ساقها سرسة . اوراقها اعطالية منتظمة و فصلها يارز العروق ، حلي البشرة ، تحمل اللون . ازهارها كبيرة اللد تطول نحو ٤ سم . ثمارها كستنية اللون شديدة الحسوة الحامضة تكلل بعد تمام كبرها .

٢٦٨٤٩ - مَشِيَة يابانية
Néflier du Japon (F).
هي الاكيدنيا ، اطليه .

٢٦٨٥٠ - مَشَن
المن هي الجندوش او المشوش او المشزق التي يسبحا البرد في الثمار والاوراق || الثمار المشوشة هي الثمار التي حملها البرد .

٢٦٨٥١ - مَشَن
مشن البقرة والناقة : حلب ما في صرعها .

٢٦٨٥٢ - مَشَنق *
Local de pente (F).
هو المشنوق المد لتشتيق مشاكك التبع او عموه ودياً يمين وقت التصفيط والزم .



مشلة مبدولة



مشق



مشوط

٢٦٨٩٣ - **مصفت**
المصت هو ادخال اليد في رحم الانثى لمصته واستخراج ما فيه .

٢٦٨٩٤ - **مصبح ، مَصُوح** ، Virescence (F).
هو التبدل الطارى في لون الزهر .

٢٦٨٩٥ - **مصحفات القشكر** ، Placophores (F).
رقة من الرغويات اصدانها مصحفة القشكر . فصائلها واجناسها وانواعها عديدة معظمها من المتحجرات والمعاصر منها منتشر في جميع بحار العالم .

٢٦٨٩٦ - **مصحكار** ، Saxatile
نمت ترميزي يطلق على كل نبات يمشي وينمو على الصخور وفي الهاجر .

٢٦٨٩٧ - **مصدد**
المصد والمصداء الحظبة العالية ، وقيل اهل الجبال .

٢٦٨٩٨ - **مصددز ، مفتح ، مفتح**
Origine, Source (F). Origin, Spring (E).

٢٦٨٩٩ - **مصرب** ، Lacto-fermentateur (F).
جهاز يستعمل في قياس حوضة اللبن الرائب .

٢٦٩٠٠ - **مصرباد** ، Frielix(F).
لا يصبر على البرد .

٢٦٩٠١ - **مصراع** ، Valve (F). Vaive, Clack (E).
احد اجزاء الخلاف الثري في الآبار المفتحة .

٢٦٩٠٢ - **مصركمي** ، Valvulaire (F). Valvular (E).
٢٦٩٠٣ - **مصرد**

Clate à gravier, C. à sable, Tamis (F). Wastle, Screen, Sieve, Sifter, Strainer (E).
غربال يفصل الرمل عن الحصى والحجارة .

٢٦٩٠٤ - **مصروف** ، Drain, Bardeau (F).
Drain, Drain-pipe, Shingle (E).

سيل ماء تنصرف فيه المياه التي ترشح من الارض الزراعية عقب ريها وقد شاع استعمال انابيب الأجر لهذه الغاية . والمصارف تنتهي بالبرب . والمصارب تنتهي بالمشيرة .

٢٦٩٠٥ - **مصرك ، بَنَك** ، Banque (F). Bank (E).
هو كل عمل أئلى المتاجرة بالثريد او الأوراق ذات البدل المالي .

٢٦٩٠٦ - **مصرك الإصدار**
Banque d'émission (F). Issuing house (E).
هو المصروف الممنوح له امتياز اصدار أوراق النقد من الحكومة .

٢٦٩٠٧ - **مصرك زراعي ، بَنَك زراعي**
Banque agricole (F). Agricultural bank (E).
مصرف يختص بامداد ارباب المزارع الزراعية بالمال على سبيل القروض الطويلة الاجل .

٢٦٩٠٨ - **مصرك عقاري ، بَنَك عقاري**
Crédit foncier (F). Loan society (E).
مصرف يقرض المال لاجال طويلة لقاء رهن العقار .

جفاف التسج || يكافح بتطوير البدار بمادة الفوديول المركز $\gamma_3 \dots /$ أو متغيراً بأحدى المركبات الزئبقية .

٢٦٨٨٣ - **مصاع الشوندر** *
Pleospora betae, Phoma betae, Ph. tabifica, Ph. sphaerosperma, Phyllosticta tabifica (S).
فطر مجهرى يصيب أوراق الشوندر فيؤذيها ويسبب ذبولها. مظهره الخارجى يقع صغيرة مستديرة حطية اللون ، تركب الأوراق فتسبب جفاف التسج ويقيه الذبول ثم العطب . يكافح عند ظهوره باستعمال احد الفوطاير الممتدة المنصر الفعالم .

٢٦٨٨٤ - **مصاع المسكن** *
Pleospora putrefaciens, Clasterosporium putrefaciens, Sporodesmium putrefaciens (S).
فطر مجهرى يركب أوراق الشوندر في اواخر مهدها اي قبيل الاقلاص منه وبيته || مظهره الخارجى يقع مهدية لقياسية يملوها حل اسمر تركب القسم الاكبر من النصل لا يفوض منه الا البت والارام الاول || اغراضه زبيدة الا اذا استحكم في كامل الزراعة وهذا لا يكون الا في مواقع خاصة || يكافح باستعمال احد الفوطاير المادية المتوسطة المادة الفعالم .

٢٦٨٨٥ - **مصاع المسند ياك** *
Pleospora albicans, Phoma albicans (S).
فطر مجهرى يركب جهازز الهندي فيؤذيها ويسبب اغلاص انجازها ويقتدها || مظهره الخارجى يقع مهدية لا قياسية الشكل والحجم ، لونها الى الحمية ، اطرافها المهدب ينصرف من الخيطي الى الاسود وعنه وصولها الى هذا الطور يملوها في وسطها شحمة حلقة بيضاء . تركب نصل الاوراق وسويقات الازهار || يكافح عند ظهوره على الاوراق باستعمال احد الفوطاير المادية الممتدة المنصر الفعالم .

٢٦٨٨٦ - **مصاعة** *
Boeryomycose (F). Boeryomycosis (E).

المصاعة مرض جلدي يمتري الخيول . مظهره الخارجى دمال صغيرة منفكة شبيهة بالمصع تسبها بعض الميكروبات اعصبا الكروية .

٢٦٨٨٧ - **ميصالة** ، Sérologie (F). Serology (E).
هي دوس الامصال ونوعاها المختلفة وانفمالاتها وتائجها .

٢٦٨٨٨ - **ميصالة ، مصل** ، Petite lait (F). Whay (E).
الماء الذي يخرج من الحليب المخبين عند اصططاع الجبن .

٢٦٨٨٩ - **ميصالحة ، تسويكة** ، Transaction
هو الاتفاق الذي يقدّم الخنازمن ليلفوا به نزاماً قائماً او متعلّقاً بنزول كل منهم من شيء من مطالبه .

٢٦٨٩٠ - **ميصلي** ، Sérologique (F). Serologic (E).
منوط بالمصل او مختص به .

٢٦٨٩١ - **مصان** ، Canne à sucre (F).
هو قصب السكر ، اطلبه .

٢٦٨٩٢ - **مصبة ، محوّر** ، Embouchure (F).
Embouchure, Mouth (E).
ملتقى مياه الأنهر بالبحر .



مصاع الشوندر

Laminole (F). ٢٦٩٢٦ - **مِصْلَاح**Flattening-mill, Rolling-mill (E).
الآلة الخاصة بتصفيح المعادن .Dolichocephale (F). ٢٦٩٢٧ - **مُصَنِّعُ الرَّأْس**Dolichocephalic (E).
نمت تصنيي يميز يوصف به الرأس المستطيل عند بعض الحيوانات الألفية كالإبقار والأخنام .Conchacé (F). ٢٦٩٢٨ - **مُصَنَّد**

نمت ثمريني يطلق على الإصداف أثنائية المصراع .

Courbine (F). ٢٦٩٢٩ - **مِصْكَار ، مِصْكَار**

مكة بحرية تدمي لوت القنوط ، اطلبا .

Sérum (F). Serum (E). ٢٦٩٣٠ - **مَصَل**Petit lait (F). ٢٦٩٣١ - **مَصَل**

هو المصالة ، اطلبا .

Tuberculin (F). Tuberculin (E). ٢٦٩٣٢ - **مَصَلُ السِّل ، لَنْفَاكُوسُخ**

مصل كاثف تخمن به الإبقار الثيقن من أنها مصابة أو غير مصابة بالسِّل البقري .

Bac-croisé (F). ٢٦٩٣٣ - **مُصَلَّب**

هو الصيق ، طائر من الشرشوريات ، اطلبه .

Amendements agricoles (F). Improvement, Manuring of ground (E). ٢٦٩٣٤ - **مُصْلِحَاتُ زُرَاعِيَّة**

هي التي تصلح التربة فزيده غصبا . والمصلحات عديدة منها التسميد المضمري والمضمري والمندقي والإسماء والصفرت والقرميل والتندييل الخ .

Intérêt (F). Interest (E). ٢٦٩٣٥ - **مَصْلَحَة**

هو كل ما يصلح به المرء من شأنه بمنفعة تأتبه إذا هو زائل سقاً أو أقام دعوى .

Service des haras, S. de remonte (E). ٢٦٩٣٦ - **مَصْلَحَة الخَاصِي ، مَصْلَحَة خَيْل**

دائرة حكومية تابعة للبطابة البيطرية في وزارة الزراعة تمنى بشؤون خيل النزر .

Plein (F). Full (E). ٢٦٩٣٧ - **مُصَنَّب ، مُلْتَكِّ**

نمت وصي يطلق على ما لا جوف له كالقرون سلا .

Cervicornes (F). ٢٦٩٣٨ - **مُصَنَّبَاتُ الْقُرُون**

قنة من الحشرات ، قرونها مصمتة غير مجوفة كالأيل .

Gummifère (F). ٢٦٩٣٩ - **مُصَنِّع**Gummiferous (E).
ينتج الصمغ أو يحوي الصمغ ويصطنعه .Réservoir (F). Reservoir (E). ٢٦٩٤٠ - **مَصْنَع**

حوض تجمع فيه المياه للاستعمال الصناعي ويعرف أيضاً باسم حاووز .

Cynomoir (F). ٢٦٩٤١ - **مُصَرَّر**

هو الطروث ، اطلبه .

Cynomorides (F). ٢٦٩٤٢ - **مُصَرَّرَات**

سبط من الطروثيات يشمل بعض الاجناس والأتواع .

Dépense (F). Expenditure (E). ٢٦٩٤٣ - **مُصَرَّف**

هو المال المخرق .

Faux frais, Menus frais (F). Incidental expenses, Petty expenses (E). ٢٦٩٤٤ - **مُصَرَّفَاتُ ثَرَبَة**Faux frais, Menus frais (F). Incidental expenses, Petty expenses (E).
مصارف من زجاج ، يلدح او يستر هذه الحاجة ، تستثبت فيه ثباتات البلاد الحارة التي لا تحصل البرد .Serre (F). ٢٦٩٤٥ - **مِصْرَى ، وَام**Greenhouse (E).
بناء من زجاج ، يلدح او يستر هذه الحاجة ، تستثبت فيه ثباتات البلاد الحارة التي لا تحصل البرد .Serre froide (F). ٢٦٩٤٦ - **مِصْرَى بَارِدَة**Conservatory (E).
هي التي يكمن فيها بجمرة الشمس داخل الزجاج .Serre chaude (F). ٢٦٩٤٧ - **مِصْرَى حَارَة**Hot-house (E).
هي التي تستمد حرارتها بطريقة ثابتة حيث يراوح مطلقا من ٢٤ إلى ٢٨ سغ في زمن البرد والشتاء .Trieur (F). ٢٦٩٤٨ - **مُصْطَفِيَّة ، فَرَاذَة**Sorting-machine (E).
آلة تفرق الفلك من الحب والحب عن بقشه بعض بالنسبة إلى حبه .Lentisque (F). ٢٦٩٤٩ - **مُصْطَفَاكَة**

هو البطم الشرقي ، اطلبه .

Mûre de ronce (F). ٢٦٩٥٠ - **مُصَمَكَة ، مُصَمَكَة**Blackberry (E).
ثمرة المليق والياحه من مرجع وغيره وهي حمراء اللون تركل . ج معص ومع .Anode ٢٦٩٥١ - **مُصَمَّد ، أُنُودَة**

هو لاجب التيار الكهربائي في المفلط .

Ascenseur (F). Lift, Elevator (E). ٢٦٩٥٢ - **مُصَمَّد**

جهاز يستعمل في رفع الاشخاص والاثقال .

Sublimé (F). Sublimate (E). ٢٦٩٥٣ - **مُصَمَّد**Paratonnerre (F). ٢٦٩٥٤ - **مِصْطَكَة**Lightning-conductor (E).
راسع دافع الصاعقة .Liquidateur (F). Liquidator (E). ٢٦٩٥٥ - **مُصَنِّع**

من تباط به اعمال التصفية .

Raffinerie (F). Refinery (E). ٢٦٩٥٦ - **مِصْطَاكَة**

معمل مجهز بالآلة اللازمة لتصفية .

Filtre (F). Filter (E). ٢٦٩٥٧ - **مِصْطَاكَة ، رَاشِح**

أداة تصفى بها السوائل ، وقد تكون من غروف او رمل او فحم الخ ...



مصري

٢٦٩٥٢ - مَصَامُصٌ أَمْرِيكِي

Evonymus americana (S). Fusain d'Amérique (F).
نوع من المصامص ، جنته صفيرة اللثة تعلو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. فروصها منتصبية مائلة. أوراقها عابلة تطول من ٤ الى ٨ سم. وتعرض من ٢ الى ٣ ، نصلها خلي الصفحة السفلى حاد التستين. أزهارها وردية اللون رباعية البتلات ، حقايقها مستديرة جوزية اللون رباعية الفلق || أزهارها يستمر طول شهر حزيران .

٢٦٩٥٣ - مَصَامُصٌ حَرِيشِي الْوَرْق

Evonymus latifolia (S). Fusain à larges feuilles (F).
نوع من المصامص المبلول ، جنته تعلو من ٢ الى ٥ أمتار. فروصها مائلة. أوراقها عابلة تطول من ٨ الى ١٤ سم. وتعرض من ٤ الى ٦. نصلها جامد الصفحة، مسنن الحافة. أزهارها خماسية البتلات الأحمر. حقايقها قمرية خماسية الفلق || أزهارها يستمر من أيار الى حزيران .

٢٦٩٥٤ - مَصَامُصٌ قَلْوَم

Evonymus nana (S). Fusain nain (F).
نوع من المصامص ، جنته صفيرة اللثة مثولة تعلو من ٥٠ الى ٨٠ سم. فروصها مجذارية مستقيمة. أوراقها عابلة متعاعدة سنائية ، نصلها لامع الصفحة يطول نحو ٥ سم. ويعرض نحو ١. أزهارها رباعية البتلات والاسدية ، ثلاثية التجميع لويا الى الخضرة الحمراء المواج . حقايقها وردية اللون رباعية الفلق || أزهارها يستمر من أيار الى حزيران .

٢٦٩٥٥ - مَصَامُصٌ مَبْدُولِي * ، مَصَامُصٌ أُرُوبِي

Evonymus vulgaris, E. europaeus (S). Fusain commun, F. d'Europe, Bonnet de prêtre, Bois à lardoir (F).
نوع من المصامص المبلول، يجيرته تعلو من ٣ الى ٦ أمتار. فروصها رباعية التصلب مائلة. أوراقها عابلة سنائية تطول من ٢ الى ١٠ سم. وتعرض من ٣ الى ٤ ، نصلها مائل الصفحة الملبطة ، مسنن الحافة. أزهارها الى الخضار الاصفر. حقايقها رباعية الفلق الأحمر. زهورها وردية. أزهارها يستمر من نيسان الى أيار .

٢٦٩٥٦ - مَصَامُصٌ مَجْدَارِي

Evonymus radicans (S). Fusain radicate (F).
نوع من المصامص، جنته مثولة صفيرة اللثة، ساقها مجذارية. فروصها دقيقة بحرية اللون. أوراقها أبيضه تطول نحو ٥ سم. وتعرض نحو ٢ ، نصلها جامد الصفحة المسنجة بالايض الوردي. أزهارها رباعية البتلات والاسدية ، زينة اللون، حقايقها وردية رباعية الفلق || أزهارها يستمر من حزيران الى آب .

٢٦٩٥٧ - مَصَامُصٌ يَابَانِي

Evonymus japonica (S). Fusain du Japon (F).
نوع من المصامص، يجيرته منتصبه تعلو من ٣ الى ٨ أمتار. فروصها مسننة خضراء اللحاء. أوراقها أبيضه تطول من ٧ الى ١٠ سم. وتعرض من ٤ الى ٦ ، نصلها جامد الصفحة المسنجة والمزركشة بالايض والاصفر. أزهارها رباعية البتلات والاسدية لويا الى الخضار الفسفي. حقايقها حر رباعية الفلق || أزهارها يستمر من حزيران الى آب .

٢٦٩٥٨ - مَصَامُصَةٌ * Intégration (F). Intégration (E).

المصامصة الحلق شيء يأخر لإتمامه أو إتمام كماله .

٢٦٩٤١ - مَصْنُوعَةٌ * Sépiophores (F).

المصنوعة والمصنوعات فئة من الرعويات ثنائيات الخياشيم ، صهاريات الأرجل ، مجهزة بصنخ كالمصنار وأمثاله .

٢٦٩٤٢ - مِصْهَر Haut-fourneau (F).

Blast-furnace (E).
موقد خاص عمودي الارتكاز يستعمل لتلويب الحديد تحت تأثير الحرارة المرتفعة .

٢٦٩٤٣ - مِصْوَات Sonomètre (F). Sonometer (E).

جهاز يستعمل في قياس الاصوات ومقابلتها وتصنيفها .

٢٦٩٤٤ - مِصْوَح Viraceance (F).

هو المسح ، التبدل الطارئ الذي يغير لون الزهر الطبيعي .

٢٦٩٤٥ - مِضَادُ الْحَيَوِيَّةِ ، مُرْدُ ، أُنْكِسِيَوِي Antibiotique (F). Antibiotic (E).

مادة ينتجها كائن معين تمارس نحو غيره من الكائنات || المضادات الحيوية المعروفة حتى الآن تقسم الى فئتين : - فئة الفنجيات كالمبيسلين والستربتوميسين والتتراسكلين . - وفئة البكتيريات كالكلوتريسين والبايسترامين .

٢٦٩٤٦ - مِضَادُ السَّحَالِ Béchique (F). Béchic (E).

٢٦٩٤٧ - مِضَارُغَةٌ Polygamie (F). Polygamy (E).

المضارغة تعدد الزوجات عند الرجل .

٢٦٩٤٨ - مِضَامِص Eau saumâtre (F).

Brackish water (E).
المضامص : الماء لا يطلق ملوحة وشده التطلع وهو الصافي الزلال .

٢٦٩٤٩ - مِضَامِص Evonymus (S).

Fusain (F). Spindie tree (E). Spindelbaum, Pfaffenhütchen (D). Fusano, Evonimo (I).
جنس اشجار وجنات برية وزيينية من فصيلة القاتيات. انواعه عديدة ، أصلاتها فسيحة الاربعاء تشمل الشرق والغرب وامريكا . أوراقها متعابلة متعقة كاملة مرطاب. أزهارها متكوية التجميع ابطية الارتكاز . ثمارها جرداء مستديرة مقعصة . زهورها مرة الطعم مقيحة ومسهلة. اشجارها صفراء اللون شديدة الصلابة شائعة الاستعمال الصناعي . نحلها يستعمل في التصوير وفي صناعة الباردة || اعرف انواعه وأشهرها ما يتبع .

٢٦٩٥٠ - مِضَامِصٌ أَسْوَد * Evonymus atropurpurea (S). Fusain noir (F).

نوع من المصامص، يجيرته تعلو من ٣ الى ٧ أمتار. فروصها مائلة. أوراقها عابلة تطول نحو ١٢ سم. وتعرض نحو ٦. نصلها مسنن الحافة خلي الصفحة السفلى. أزهارها رباعية البتلات الازرقوانية. حقايقها الى الجزرة السوداء المواج. أزهارها يستمر طول شهر حزيران .

٢٦٩٥١ - مِضَامِصٌ أَلْتَمَت Evonymus verrucosa (S). Fusain varruqueux (F).

نوع من المصامص، جنته تعلو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. فروصها مثولة اللحاء. أوراقها عابلة يفضية ذرية، نصلها مسنن الحافة يطول نحو ٦ سم. ويعرض نحو ٣. أزهارها جزوية اللون رباعية البتلات. ثمارها برتقالية اللون. رباعية الفلق || أزهارها يستمر من أيار الى حزيران .



مِضَامِصٌ أَسْوَد



مِضَامِصٌ بِيضٌ



مِضَامِصٌ يَابَانِي

Embryon humain (F). **مُضَيِّعَة** ٢٦٩٧٣
Human embryo (E). هي الملقحة البشرية.

Embryonnaire (F). **مُضَيِّعِيّ ، جَيْفِيّ** ٢٦٩٧٤
Embryonic (E).
نعت تعريفى يطلق هل ما هو مختص بالمضغة أو الجنين .

Polygone (F). Polygon (E). **مُضَلَّع** ٢٦٩٧٥

٢٦٩٧٦ - **مُضَلَّع دائريّ ، مُضَلَّع مستدير**
Polygona circulaire (F). Circular polygon (E).

Quadrilatère (F). **مُضَلَّع رباعيّ** ٢٦٩٧٧
Quadrilateral (E). فيه مربع رباعي اضلاع .

Polygone régulier (F). **مُضَلَّع مُنْتَظِم** ٢٦٩٧٨
Regular polygon (E).

Manège (F). **مُضَمَكَل** ٢٦٩٧٩
Horsemanship (E). للبهان للمد لتضيق الخيل .

٢٦٩٨٠ - **مُضَمَكَلَة** صوت الحية من لسانها .

Ascence, Plûre (F). **مُضَوَّر** ٢٦٩٨١
Ascence (E).

٢٦٩٨٢ - **مُضَيِّعَة**
Photomètre (F).
Photometer (E). جهاز يستعمل في قياس حدة الضوء أو قوته .

Entomophyte (F). **مُضَيِّف** ٢٦٩٨٣
Entomophyt (E). نعت تعريفى يطلق على كل نبات من غقيات الريح
تتطفل عليه الحشرات .

Hampe (F). Stem, Flower-stalk (E). **مُطَا** ٢٦٩٨٤
الطاء هو الشمرخ . مثناه مطوان . ج أمطاء .

٢٦٩٨٥ - **مُطَاوَرَة** الأرض الكثيرة الطير .

Caoutchouc (F). **مُطَاط** ٢٦٩٨٦

Phanérogytes parasites (F). **مُطَايِل** ٢٦٩٨٧
هي النباتات الطفيلية من باديات الزهر كالجنفيل والكتشوث .

Fine (F). **مُطَايِل** ٢٦٩٨٨
راجع اغراض .

٢٦٩٨٩ - **مُطَايَلَة**
Réclamation (F).
Complaint, Request, Claim (E). الاتماس أو الادعاء بقرار حق أو حالة .

٢٦٩٩٠ - **مُطَايَلَة**
Revendication (F).

٢٦٩٩١ - **مُطَاوِع ، مُطَيِّع**
Chaining (F).
Plastique (F).
Plastic (E). رفق دعوى يطلب رافعها الاعتراف له بحق الملكية على مال معين .
هو ما كان قابلاً للشكل والتشكل .

٢٦٩٩٢ - **مِصْبَحَة**
Pompe (F). Pump (E). آلة تستعمل في رفع أو دفع المياه والسوائل وقد تكون يدوية أو محرك . أما اشكالها فثلاثة وهي :

٢٦٩٩٣ - **مِصْبَحَة دافعة**
Pompe foulante (F). Force-pump (E).

٢٦٩٩٤ - **مِصْبَحَة رافعة**
Pompe aspirante (F). Suction-pump (E).

٢٦٩٩٥ - **مِصْبَحَة رافعة ودافعة**
Pompe aspirante foulante (F).
Suction-force pump (E).

٢٦٩٩٦ - **مُضَر**
Ascence (F).
Ascence, Acidifying (E). ابتداء الحامضية في كل مادة .

٢٦٩٩٧ - **مُضَر ، مُضَرِّع**
Piqué (F). Sour (E). ما كانت فسدته الحامضية من بحر وجبة وما اشبه .

٢٦٩٩٨ - **مُضَرِّح**
Harpagus (S).

٢٦٩٩٩ - **مُضَرِّح**
Diodon, Harpagus (F).
جنس طير من حمارة البراة ونفسيعة لصقريات . أنولاه قليلة جميعها رقيقة الفراء صغيرة القد . أثوابها موشية تطلب فيها الجراوة الخطيعة للملوح . بطونها غير نمرة . أزوارها بيض . ارسافها سم . || موطنها الدابات الكثيفة . تعيش منفردة ، قوتها القوامم والصائير والحشرات . تدفن في الاثجار القريبة ، انثاها تحضن من ٢ الى ٥ وفتات مدة ٤ اسابيع .

٢٦٩٩٩ - **مُضَرِّم**
Pyromètre (F). Pyrometer (E). جهاز يستعمل في قياس الحرارة العالية .

٢٦٩٩٤ - **مُضَرَّوْب يه**
Multiplicande (F).
Multiplicand (E).

٢٦٩٩٥ - **مُضَرَّوْب يه**
Multiplicateur (F).
Multiplier (E).

٢٦٩٩٦ - **مُضَرَّوْب كذا**
Factorielle (F).
Factorial (E).

٢٦٩٩٧ - **مُضَرَّوْبَة**
Himanthalia (S).
Himanthalia (F).

جنس نباتات بحرية من الخفيات السمر . انواعها المعروفة قليلة العدد اصلاتها جميع بحار البلاد الحارة والمتعددة الحرارة || كلالها شديدة القصر . قوامها قسيمة الشكل ينشعب في قمرها غصن من السيور الفرقة يراوح طوطا من متر الى ثلاثة امتار .

٢٦٩٩٨ - **مِصْبَحَات**
Diplostémons (F).
نعت تعريفى يطلق على كل مصليل أو جش يكون عدد اسديته ضعف عدد التمايلات أو الفصل .

٢٦٩٩٩ - **مُضَعَف**
Narcisse tazette (F).
هو الزجرج الشرقي ، اسطبه .

٢٦٩٩٠ - **مُضَعِّع**
Mastication

٢٦٩٩١ - **مُضَعِّع التبغ**
Chiquer (F).
To chew tobacco (E).

٢٦٩٩٢ - **مِصْبَحَات**
Compresseur (F).
Compressor (E).

اسم يطلق على مختلف الاجهزة الضاغطة اعصها الملامسات ومضاميط الغاز .



مُضَر



مُضَر

Tourbière (F). **مِطْرَبَة** ٢٧٠٠٣
Peat-bog, Peat-moss (E).
هي التُّراب و منجم التُّراب العفوي .

Gaufrier (F). **مِطْرَمَة** ٢٧٠٠٤
Waffle-iron (E).
جهاز معدني رقائق يصطنع رقائق الشمع الملمدة لتجهيز
التقدير أي خلية النحل .

Pluvial (F). **مِطْرِي** ، **شَتَوِي** ٢٧٠٠٥
Pluvial, Rainy (E).

Porte-grefle, Sujet (F). Stock (E). **مِطْعَم** ٢٧٠٠٦
الإصل الذي يركب فيه الطعم أو الإصل الذي يفرس
في الأرض .

Pantogrefle (F). **مِطْمَعَة** ٢٧٠٠٧
أداة للتلميع تلمع بضعة قضبان في آن واحد .

Billot à peziée (F). Clog (E). **مِطْمَعِيَة** ٢٧٠٠٨

Greffon (F). Graft (E). **مِطْمُوم** ٢٧٠٠٩
هو الطعم ، أطلبه .

Parasite (F). **مِطْمَال** ٢٧٠١٠
Parasite, Hanger-on (E).
نمت تمرني يطلق على كل نبات يعيش طفلياً على غيره
من النبات .

Argillière (F). Clay-pit (E). **مِطْمَلَة** ٢٧٠١١
المخيط الذي يستخرج منه الطين أي الصلصال .

Diplodia (S). **مِطْق** ٢٧٠١٢
جنس فطور مجهرية من فصيلة الفصليات . يكتسبته
فردية كروية تنشأ محصورة ثم ترقى وتثرف . جرمها
مهيكل الثلاث ، حنطلي اللون يملو مق صغير . بويضاته
حنطية أحمرلية ، طولها نحو ١٥ ميكرون . غلبها ثنائية ،
غريبة الثمرة الفاصلة || أنزلها قليلة ، جميعها مؤذية ،
أضرها .

Diplodia griffoni (S). **مِطْقِي الأَجَاص** ٢٧٠١٣
فطر مجهرى يركب إخصان وإنفساد الأجاص والتفاح
ينطها ويحيط || مظهره الخارجي يشور كثيفة التصبغ
تركب الحباء فتصدع البشرة بعد أن تفرح الادمة وتشوه
يكتسبها بقطعاف الإخصان الموصوبة وينطهر الجروح مع
العلم أن هذا الفطر يتسدى على الانجراف الضعيفة دون سواها .

Diplodia zeae (S). Dry-rot du maïs, Pourriture sèche
des épis (F). **مِطْق الدَّرَّة الصَّفْرَاء** ٢٧٠١٤

فطر مجهرى يصيب الدرة الصفراء في سبوتها ويظهرها
ويصفها . مظهره الخارجي يقع لا قياسه الحجم والشكل
جرام اللون سريمة الإلتصاع تركب المصف فتؤذي . وهو
تركب البلاء والأمطار مشيح أغبر اللون ثم يتحول إلى البسرة
فيبدو كاللبن الأسود الجاف || يكتسبها ينطهر البذار
بواسطة أملاح الزئبق . ومن المسجن اجتناب الزراعة في
المواقع الرطبة والتخلي عن زراعة الدرة في الأتربة المويومة
نحو ثلاث سنوات .

Dama (F). Dam (E). **مِطْبَة** ٢٦٩٩٢
أداة من خشب أو حديد تضرب بها الأرض لتوس .

Plecoptera (S). **مِطْبَخَة الأَجْنَحَة** ٢٦٩٩٣
Plecoptères (F). Plecoptera (E).
هي اللؤلؤيات ، رتبة من الحشرات ، أطلها .

٢٦٩٩٤ - **مِطْبَخَة**
المطبخة هي مؤخر ظلف الشاة وقيل هنة كالظفكة في رجليها
تسبح بها الأرض .

Minotarie (F). **مِطْبَخَنَة** ٢٦٩٩٥
Flour-mill, Flour-store (E).
البثاء الملمد لصنع الطحين وهو يموي جميع أجهزة الطحن
ويستودعات التيق .

Pluie (F). Rain (E). **مِطْر** ٢٦٩٩٦
المطر هو الماء المنهمر من السحاب . ج أمطار . وأمطرة
هي الدفعة من المطر .

Rafle (F). **مِطْر** ٢٦٩٩٧
Head of maize stripped of all its fruit (E).
سنبول الذرة واللذين وإشباعها . ج أمطار .

٢٦٩٩٨ - **مِطْرَاق**
الائن المطارق هي القترية العهد بطرق القتل أياها .
تستعمل في التمية والبزرة والبقرة .

٢٦٩٩٩ - **مِطْرَاقِي البَحْر** * ، **نَضَار**
Sphyrna (S). Requin-marteau, Squal-marteau, Mar-
teau (F). Hammer-head (E).

من أحمائها : أبو مطرقة ومكة الاسكندر . جسد أحمك
مجرية بيوض ولون من فصيلة القرشيات ورتبة الأسماك .
أنواعها المعروفة ستة جميعها من الأسماك المفترسة الشرية
الغنية . قوتها الأسماك والقشريات وكل ما تستطيع إليه
سبيلا في البحر || أحمائها مياه مجاذج وأحوار البلاد
الحارة || أجسامها وشعة الشكل تقطع من ٣ إلى ٥ أمتار .
أقواسها إلى الكهبة تنقب أو ترعو وتغير مع اختلاف الأنواع .
رووسها كطرفة النحات ، أسطوانية الشكل ، مفرغة الارتكاز
يفرق طولها ربع طول الجسم . حينها كبيرة ، مستديرة ،
بارزة ، تحتل أطراف المطارق المقنطية . أحمائها لاطة
لكنها كبيرة الشدة وبسلة بثلاثة صفوف من الأسنان
الذرية الحادة القوية للتحركة . زعانفها سبع تمكثها من
سرعة الانقلاب والحركة . زعنفتها الثرجية فائرة حالية
الشكل || أهرق أنواعها وأشهرها الثلاثة التالية .

٢٦٠٠٠ - **مِطْرَاقِي البَحْر الأَعْلَسِي**
Sphyrna zygaena (S).

نوع من مطراق البحر ، تكثر في المحيط الأطلسي ، أحمائها
مجاذج البلاد الحارة . طولها يراوح من ٣ إلى ٥ أمتار .

٢٦٠٠١ - **مِطْرَاقِي البَحْر المَوْسَط**
Sphyrna tudes (S). Maillet (F).

نوع من مطراق البحر . أحمائها مجاذج البحر الأبيض
المحيط . طولها يراوح من مترين إلى أربعة أمتار .

٢٦٠٠٢ - **مِطْرَاقِي البَحْر المَهْدِي**
Sphyrna blochi (S).
نوع من مطراق البحر . أحمائها تمتد من مجاذج الهند
إلى الخليج الفارسي فالبحر الأحمر فقصير زنجبار . طولها
يراوح من ٣ إلى ٤ أمتار .



مطارق البحر



مطرقة



مطق الاجاص

٢٧٠٢٦ - مَقْلَقَات

Antiseptiques, Désinfectants (F). Antiseptic, Disinfecting (E).

مواد فعالة بسيطة أو مركبة تقضي على الجراثيم المرضية مثلًا حامض الفينيك والليزول، الخ.

٢٧٠٢٧ - مَقْلَقَات

Polyphasé (F).

Polyphase, Multiphase (E).

كثير الأطوار .

٢٧٠٢٨ - مَقْلَقَات

Montacuta (S).

Montacuta (F). Montacuta (E).

جنس حويالات بحرية من الرضويات فصليتها الخنافس وصليتها اليرسنيات . أنواعها المعروفة قليلة العدد ، جميعها من صلب بحار المناطق الشالية . أجسامها صغيرة القدد . أصدافها بيضيه اللون ، قليلة الإحدياد ، ناشرة السن للمصراعية . الألبا سوية تراوح من الأبيض التبي إلى المصفد .

Calandre (F).

٢٧٠٢٩ - مَقْلَقَات

طائر من فصيلة القُرْبَات يدعى عليل ، أظلم .

Couleuvre à collier (F).

٢٧٠٣٠ - مَقْلَقَات

هي الحفّات المطوّقة ، أظلم .

Aspius (S).

٢٧٠٣١ - مَقْلَقَات ، أم حَسْرَد

Aspe (F).

جنس اسماك بحرية ونهرية من الشبويات . أنواعها المعروفة قليلة يتكثر وجودها في البحر الاسود وفي بحيرات وآبار الشرق الاوسط وأروية الجنوبية . أجسامها مستطيلة الشكل طويلا يراوح من ٢٥ الى ٥٥ سم . زعانفها الظهرية صغيرة القدد عادية الحشف . أسناتها الأمامية السفلية محبة كخالب الطير . لحويها مأكولة متوسطة الصف .

Longe (F). Lunge, Tether (E).

٢٧٠٣٢ - مَقْلَقَات

المقود أو الخيل الذي يربط من مرسل الدابة لجرها .

٢٧٠٣٣ - مَقْلَق ، طعام الأرَب

Phagnalon rupestre (S). Phagnale (F).

نبات عشبي برّي طيب من فصيلة المركبات . مهدد البلاد الممتدة الحرارة . يوجد في المواقع الرطبة من التوسط البساتنة . أوراقه متعالية ، لينة ، صغيرة القدد . أزهاره غصية التجميع ، حامية الانتكاز ، مستطيلة المالحق الدقيقة . تنويره ربيعي . منافسه الطبية مبيحة .

Tropophyte (F).

٢٧٠٣٤ - مَقْلَقَات

Tropophyte (E).

نبت ترميلي يطلق على كل نبات يتكيف مع عوائل البيئة حيث يعيش فلا يتأقلم بحدائق ولا تفرده رطوبته .

Plastique (F). Plastic (E).

٢٧٠٣٥ - مَقْلَقَات

هو المطاوع ، ما كان قابلاً للشكل والتشكل .

٢٧٠٣٦ - مَقْلَقَات

Spectromètre, Spectroscope (F). Spectrometer, Spectroscope (E).

منظار طيفي ، مجلّة الاشباح .

Oisellerie (F).

٢٧٠٣٧ - مَقْلَقَات

Bird-catching, Bird-shop (E).

هي صيد الطيور وتربيتها وهي أيضاً محل تربية الطيور .

٢٧٠١٥ - مَقْلَقُ الصَّنَوِيرِ .

طير مجهري يركب أهداب الصنوبر فيميلها ويقود البنايات التي قعدت أهدابها إلى الذبول واليباس .

٢٧٠١٦ - مَقْلَقُ نَاقَالِ .

Diptodia natalensis (S).
طير مجهري يصيب النخل في كربه وأصوله سفه . منظره الخارجي بضع فسيحة مستطيلة غيراه اللون ثم سواه تركيب بشرة الثلج تقوينا ويمتري البسر تنصبه || يكافح عند ظهوره باستئصال سائل يورده الحبلون نحو ١ ٪ يضاف إليه حليل الكسبة أي ما يساوي نحو ١ ٪ من الزيتون الشتوية .

Problème (F). Problem (E).

٢٧٠١٧ - مَقْلَق

Débit (F). Sale, Retail (E).

٢٧٠١٨ - مَقْلَق

ما حل المرء من حساب أو ما هو مطلوب منه .

Pil du maçon (F).

٢٧٠١٩ - مَقْلَق ، زِيَق

Mason-line (E).

خيط البناء .

٢٧٠٢٠ - مَقْلَقَات ، هي اللغة ، أظلم .

٢٧٠٢١ - مَقْلَقَات .

Silo (F). Silo, Store-pit (E).

هي السيرة بناء خاص تحفظ فيه الحبوب والأعلاف .

Momot (F). Momot (E).

٢٧٠٢٢ - مَقْلَقَات

جنس طير من فصيلة المطويّات . أنواعها المعروفة ٢٠ أصنافها البلاد الأمريكية الحارة . تألف الإحراج والقنانات تتميز باستطالة أذنانها الرتابة التركيب الثنائية الرقال الخريطة قدور ثلاثة أصابع قبل الأطوار . مناقيرها خفيفة مستطيلة شارفة الحوافر العليا المستكة الطغاف || قوتها الحشرات والقنويات وألوزغ والفقران . تلتصق أوكارها في أوقاب الصخور . تضع اللاش من بيضتين إلى ثلاث بيضات فضتها بمنوبة الذكر نحو ثلاثة أسابيع || أشهر أنواعها المطوط الملبول .

٢٧٠٢٣ - مَقْلَقَات مَقْلَقَات .

Prionites momota (S). Momot vulgaire (F).

نوع من المطوط . أصله تشمل معظم مناطق البرازيل والفويان . طوله نحو ٥٠ سم . ثوبه متباين الألوان . غوره وأعلى جناحيه إلى الخضار الزيتي . مناكبه إلى الزرقبة المسنجرية . منقده وزوره وبيوضته ويطنه إلى الصبهة النحاسية المولج . مصراه وقلق رأسه سود . جبهة صفراء اللون يقابلها من الوراء حنار أخضر يطقو القطن . حياته إلى الجلفة . منقاره أسود . رساء إلى الريدة السراء || يألف الإحراج البعيدة من كل حمران . قوته الحشرات والوزغ والفقران .

٢٧٠٢٤ - مَقْلَقَات .

Momotidae (S). Momotidae, Prionitidae (F). Momotidae (E).

لفصيلة طير من الجوامع سنابات المناقير . أنواعها المعروفة عديدة يتبعها جنس واحد يدعى مطوط || مهدها معظم أصراج أمريكية الوسطى والجنوبية . قوتها الحشرات والوزغ والفقران .

Autoclave (F).

٢٧٠٢٥ - مَقْلَقَات

Autoclave, Vacuum-pan (E).

مرجل محكم اليد ترتفع فيه الحرارة والبخار المصفوط ، يستعمل لتطهير .



مطوط ملبول



مطاهر

٢٧٠٤٩ - مُعَادَاة بِنَائِيَّة ، مُعَادَاة تَقْصِيصِيَّة
Equation graphique (F), Graphic equation (E).

Formule dentale (F), مُعَادَاة سِنِيَّة
Dental formula (E).

Aptère (F), ٢٧٠٥١ - مُعَار
Apterous, Wingless (E).

هي كل حشرة عادمة الروشن أو الفمد .

٢٧٠٥٢ - مُعَارَض شرعي
Contradictoire légitime (F), Legitimate adversary (E).
« هو ما كان يمثل في قضية من قضايا النسب جميع خصوم
المتنازع في نسبة الموجدين والاحتاليين » .

Tierce-opposition ٢٧٠٥٣ - مُعَارَضَة من الغير
« هي إحدى طرق الطعن غير العادية في حكم لا يكون
العارض طرفاً أو مثلاً فيه ولكنه يكون قد أجبعت بمقتضى » .

Millieu (F), Medium (E), ٢٧٠٥٤ - مُعَاص
هو البيئة ، أظلم .

Ligne de conduite (F), ٢٧٠٥٥ - مُعَالَاة
Ligne of conduct (E).

الملك منج السلوك المتبع .

٢٧٠٥٦ - مُعَالَاة كَسْتِي *

Hyfacles castaneus (S), Mégalyonx châtain (F).
طائر من الجوارح سنيات المتأخرين وبصيلة لاققات التمل .
موطن بلاد الشيل . ملجته الحيثاني زويجي . يألف البراري
الدفقة ، يغتسل قصر غيره من الطير . قوته الحشرات
والتمل || جسمه ربة بطول نحو ٢٢ سم . يتميز بصغر
المنقاد والجناح والذنب . سقاؤه وأصابعه شديدة النشاط
تمكثه من العدو السريع . ثوبه كستني الرأس والرداء
والجناح وأطراف الذنب ، اشهب الزور والصدر والبطن .
بطنه مخمخ بالكستني . متقاد وسقاؤه الى الطحلة السوداء ||
الانثى تتحمل بغير الأكر .

٢٧٠٥٧ - مُعَالَاة ، مُعَادَاة ، مُعَالَاة
Traitement (F), Treatment (E).

حلة وسائل المنايا بالخوارق أو النبات لاققاء الامراض
أو لمداواتها . لذلك فالمعالجة قد تكون واقية أو شافية .

Sérothérapie (F), ٢٧٠٥٨ - مُعَالَاة بِاتْصَل
Serothrapy (E).

٢٧٠٥٩ - مُعَالَاة الْأَرْض
Abouissements et tenants (F), Adjacent lands (E).
هي قطع الأرض المجاورة للملك من جهتي الطريق والدررس .

Informatique (F), ٢٧٠٦٠ - مُعَالَاة
في الاستقصائية ، أظلم .

٢٧٠٦١ - مُعَالَاة ، مُعَالَاة ، مُعَالَاة
Alternative (F), Alternativa, Alternata (E).
نعت تعريفي يطلق حل كل شجرة تحمل عاماً وتختلف آخر .

٢٧٠٦٢ - مُعَالِيَات ، مُطَوَّر مُعَدِيَّة
Gastéromycètes (F), Gasteromycetes (E).

فصيلة تطور من الأعماقيات .

Volière (F), Large bird-cage (E), ٢٧٠٣٨ - مُطْجِرَة
البناء المدة تربية الطير .

Chambre à humidification (F), ٢٧٠٣٩ - مُطْجِع
Damping room (E).

حجرة رطبة يوضع فيها التبع الجاف ليلين .

Ductile (F), ٢٧٠٤٠ - مُطْجِيل
ما كان يتصف بخاصة اللط .

Grenadier sauvage (F), ٢٧٠٤١ - مُطْجِ
Wild pomegranate-tree (E).
هو الزمان البري ، جلناره مقري يحرسه التمل فيكثر صله .

Umbrella (S), ٢٧٠٤٢ - مُطْجَاعَة *

Ombrell (F), Umbrells (E).
جنس حيوانات بحرية من الرغويات مميزات الأرجل
سفقيات الخياشيم وبصيلة المظاعيات . أنواعها المعروفة
قليلة الممد أشهرها مظاعة المحت ومظاعة المتوسط || أصدافها
مظلية الشكل ، قليلة الارتفاع ، تلفت الغليل من الجسم .
اجسامها بيضية الشوزن ، متسامكة . صوبها كبيرة
قائمة . أرونها فضاغاة ، محيائها سفقية ، ورقية
الشكل . أرجلها وسيدة ، كبيرة ، مبطقة ، ماسة
الصفتة السفل .

Umbrellidae (S), ٢٧٠٤٣ - مُطْجَاعِيَات *

Umbrellidés (F), Umbrellidés (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرغويات مميزات الأرجل
سفقيات الخياشيم . اجسامها وأنواعها المعروفة قليلة الممد
منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة || أصدافها صغيرة
مظلية الشكل . أرونها غارضة بيضية الشوزن أو مستديرة ||
أعرف اجسامها المظاعة والتهلويين .

Culture sèche (F), ٢٧٠٤٤ - مُطْجَاعِي ، مُطْجَاعِي
Dry farming (E).
الذي تسقيه السماء من الزرع .

Expédient (F), Expédient (E), ٢٧٠٤٥ - مُعَات
المعات الطريقة المناسبة .

Pair (F), ٢٧٠٤٦ - مُعَادِل ، مُطْجِ
Equal, Even (E).

Equipollence ٢٧٠٤٧ - مُعَادَاة
التصادل في القوة أو القيمة .

Equation ٢٧٠٤٨ - مُعَادَاة
المعادلة في علم الرياضيات هي مائلة الشيء أن في النسبة
أو في الصيغة . والمعادلات عديدة منها :

Equation différentielle (F), المعادلة التفاضلية
Eq. du second degré (F), المعادلة الثانية
Eq. du temps (F), المعادلة الزمنية
Eq. annuelle (F), المعادلة السنوية
Eq. réciproque (F), المعادلة المتكسبة
Eq. simultané (F), المعادلة المتكسبة
Eq. incompatible (F), المعادلة المتكسبة



مُطْجَاعَة



مُطْجَاعِي

- 27080 Rhéostat (F). **مُعَدِّلَة ، رِيصَا**
Rheostat (E).
جهاز يزيد أو ينقص المقاومة في التيار الكهربائي المقصود تقويته أو تخفيفه .
- 27081 Mineral, Métal (F). **مُعَدَّن** (E).
المعادن اجسام طبيعية تتميز بصفاتها الكيماوية الفيزيائية وبخواصها الفارقة عنها الصلابة وقابلية الصهر والسحب والفرق باستثناء الزئبق المائع في الحرارة العادية .
- 27082 Epierrer (F). **مُعَدَّن ، صَافِرُور**
Cleanser (E).
آلة تنقل الحجارة من الارض وتجمعها .
- 27083 Minéralisation (F). **مُعَدِّلَة**
Mineralization (E).
المعدنة والتدينين واحد .
- 27084 Minéral (F). **مُعَدَّنِي** (E).
Mineral (E).
نمت .
- 27085 Minéralogie (F). **مُعَدِّلِيَة**
Mineralogy (E).
علم المعادن وهو يبحث في تكوينها وتركيبها الكيميائي والكميائي وطرق استغلالها واستعمالها وفوائدها .
- 27086 **مُعَدِّيَّات ، مُعَدِّيَّات الأَوْجُل**
Gastéropodes (F).
Gastropoda (E).
صف حيوانات من الرخويات .
- 27087 **مُعَدِّيَّات رُلُوِيَّة**
Gastéropodes pulmonés (F).
Pulmonata gastro-
poda (E).
صنف من الرخويات المعذبة .
- 27088 Erminette, Herminette (F). **مُعَدَّقِي ***
Adza, Howel (E).
أداة تستعمل لمرق التربة وانتاج الاخشاب الفسدة .
- 27089 **مُعْدِر** (F).
Pou profond (F).
Little deep (E).
رَبَة عمق : قليلة العمق وقليلة النبات .
- 27090 **مُعْدِر** (F).
Pelada (F).
Fox-evil (E).
الممر : سقوط الشعر والريش .
- 27091 **مُعْرَاج**
قال القزويني : دابة عظيمة صلبة مثل الاراب صفراء اللون حل راسها قرن واحد اسود لم يرها شيء من السباع والقباب الا حرب (الجباض) .
- 27092 **مُعْرَاجِيَة**
Hibernie (F).
هي معركة الشجر ، اطلبها .
- 27093 **مُعْرَاجَة ، عُرْجَة**
Tic
كل هادة مستقيمة يمتدحها القرس كصك الانسان وبلغ الهواء ونفس الجدران والاربعاج يمنة ويسرة الخ...
- 27094 **مُعْرَاجَة** هي المَعْرَاجَة ، اطلبها .
- 27095 **مُعْرِض**
Exposition (F).
Exhibition (E).
- 27096 **مُعَايِرَة**
Etalonnage (F).
Gauging, Standardization (E).
- 27097 **مُعَايِشَة**
Symbiose (F).
Symbiosis (E).
هي الاشراك التين في الميعة بين فردين مختلفين وهو لا يسري على الذكر والانثى والاب والابن والقطيع ومااله .
- 27098 **مُعَايِشَة**
Visita (F).
Visit, Search (E).
هي الجيتكو ، اطلبها .
- 27099 **مُعْتَرِشَة ، مُعَرِّشَة**
Liane (F).
Liana (E).
كل جنبه متسلقة مستطيلة الساق كثيرة الفروع .
- 27100 **مُعْتَصِب**
Herbivore (F).
Herbivore, Herbivorous (E).
ما كان قوته الشب .
- 27101 **مُعْتَرِشِي**
Elud (F).
كل مادة تنفصل عن غيرها بواسطة عائق تدعى معتقة .
- 27102 **مُعْتَن**
Fumigant (F).
- 27103 **مُعْتَجَال**
Hâtif, Précoce (F).
Early, Precocious, Forward (E).
صفة النبات الذي ينمو ويترك سريعاً .
- 27104 **مُعْتَجِن ، مُعْجِنَة**
Pétrin (F).
Kneading-trough (E).
- 27105 **مُعْتَجِنُ التَطْطِيم**
Mastic à greffer (F).
Graft mastic (E).
ويسمى صمغ التلميع ولاء التلميع ، اطلب و مستيك .
- 27106 **مُعَد**
هو البقل الرخص والشر القصر .
- 27107 **مُعَدَّات زُرَاعِيَّة**
Matériel agricole (F).
Agricultural material (E).
هي الادوات والاجهزة الزراعية الآلية .
- 27108 **مُعَدَّال**
Statoscope (F).
Statoscope (E).
المعدل مرزاز تتفاضل يتأثر باضعف تقلبات الضغط الجوي . يستعمل في الملاحة الجوية خاصة عند الارتفاع او الهبوط .
- 27109 **مُعَدَّكَة ، مُعْدَكَة**
Estomac (F).
Stomach (E).
جزء من جهاز الهضم في الحيوان . والمعدة انواع فهي بسيطة عند الطيليات ومرتبة عند المفترسات حيث تمكن اصحابها من اعادة الطعام الى الفم لمضغه الا اما الالفم المعدة المرتبة فاربعة وهي : أم التلافيف والأنفحة والفلسنة والكروش .
- 27110 **مُعَدَّل**
Taux (F).
راجع حق .
- 27111 **مُعَدَّلِي**
Statocyste (F).
Statocysts (E).
المعدل جهازان التوازن عند الرخويات . مركزه الرأس أو بالقرب منه .

مرة حاملة لها استعمالها الطبي || أشهر أنواعه المزروع
الميلوك .

٢٧١٠١ - مَغْرُورِيَّات مَبْدُول *

Cneorum tricoccum (S). Camélé commune (F).
نوع من المَزْرُورِيَّات وهو جنبة سرولية مبدولة تملو من
٩٠ إلى ١٢٠ سم. ساقها فراء . أوراقها أبيض زيتونية
الشكل . نصلها وسيد البرق ، ملتصق الحمار ؛ لاص
الصفة البحرية اللون . أزهارها صغيرة القند ثلاثية التجميع
صفراء اللون . ثمارها الى الحفرة الشديدة الاسمرار .
يستخرج من أوراقها وبزورها عصارة مرة حاملة مسهلة .

٢٧١٠٢ - مَغْرُورِيَّات ٥

Cneoraceae (S). Cneoraceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين مستقلات القساعات
مقتدات المبيض . اجناسها وأنواعها عديدة ، اصناف
الانعام المختلفة . أشهر اجناسها المَزْرُورِيَّات .

٢٧١٠٣ - مَغْرُورِيَّات مَبْدُول * (E). Bineuse (F). Hoer (E).

جهاز زراعي يستعمل في حرق التربة تجره العوالب او
الحركات .

٢٧١٠٤ - مَغْرُورِيَّات ٥

Caprinés (F). Caprinés (E).
ابعد قسي فصيلة الغنيمات .

٢٧١٠٥ - مَغْرُورِيَّات ٥

Laite (F). Milk (E).
المس هو اللبن ، يقال ما في النجسة مس .

٢٧١٠٦ - مَغْرُورِيَّات مَبْدُول * (F). Tubériss (F).

Désherbant (F).
كل مادة عاشوية تقضي على بعض الاعشاب الضارة
تدعى مشابك .

٢٧١٠٧ - مَغْرُورِيَّات مَبْدُول * (F). Désherbant (F).

Herbier du littoral (F). Herbal of littoral (E).
المعاشب المداحية هي المواقف القريبة من البحار
والتي تكثر فيها الثبوت والاعشاب البحرية .

٢٧١٠٨ - مَغْرُورِيَّات مَبْدُول * (F). Décagone (F). Decagon (E).

مِعْصَر * مِعْصَر * مِعْصَر *
Pressoir (F). Press (E).
كل آلة تستعمل للمصر من عصر البهار الى الحبوب لذلك
فالمصاصر حديد الاشكال والاصحاح .

٢٧١٠٩ - مَغْرُورِيَّات مَبْدُول * (F). Brontomètre (F). Brontometer (E).

جهاز آلي يسجل الموارض والظواهر الجوية (الترابولوجية)
اثناء الزوايح والمواسم والاصحاح . من البرق والصاعقة
وارعد الى مهب الريح وسرعتها الخطية والارضية الى الاقطار
وفزاراتها الى البرد وحجمه الى الضغط الجوي .

٢٧١١٠ - مَغْرُورِيَّات مَبْدُول * (F). Echenilloir (F). Branch-opper (E).

أداة تستعمل في الاصلح يمكن العامل من الوصول والقضاء
على الاساريع والديدان الخفية في احوال الاجبار .

٢٧١١١ - مَغْرُورِيَّات مَبْدُول * (F). Nimbus

هي الدجعة نوع من الغيوم ، اطلها .

٢٧٠٩٦ - مَغْرُورِيَّات زراعي (F). Exposition agricole (F). Agricultural exhibition (E).

مكان يمرض فيه كل ما له علاقة بالزراعة من النباتات
والآثار والحيوان والادوات والمعدات .

٢٧٠٩٧ - مَغْرُورِيَّات مَبْدُول * (F). Déchassée (F).

مُغْرِيَّة الشجر * مَغْرِيَّة الشجر *
Hibernia defoliari, Erannis defoliari (S). Hibernie
défoliante, Phalène effeuillante (F). Mottled-
umber moth (E). Grosser Frostspanner (D).
حشرة من فصيلة الذبذبات ، ذكرها صغير القند اصفر
الجسم والارواش المسجلة والمزركشة بالاحمر والاسمر .
انماها مارة بمراء اللون مستطيلة الجرازم والارواش والاشرة .
تمتص كبحا في اوائل الخريف عند انتشاب الانثى تفتت
في اوائل الربيع من رقات نمة تلثم البرام والارواش
التي || تتركب منظم الاجنار الحرجية وبعض المشرقة
كالستيدان والندارد والرازان والزيتر والبراقع والخلص
والبرود والبنق والفتاح والاجاص || تكافح في الشتاء
باستعمال احد المواكين الفدالة .

٢٧٠٩٨ - مَغْرِيَّة الشجر * (F). Hibernia leucophaearia, Erannis leucophaearia (S).

Hibernie gristère, Phalène du chêne (F).
Hibernia leucophaearia (E).
حشرة من الاقيات حرشفيات الاجنحة . ذكرها ممتدة
اناثها ممد . موطنها البلاد الممتدة الحارة من الشرق
الاصول الى اوروبا . فراشتها صفراء تميش على غزونها
الاماعي . سرتها تميش على اوراق الستيدان والقص ||
جسم الذكر صغير قشبي يطول نحو ٩ سم . بسطة نحو
٣٤ سم . رأسه الى الوريد . حناته صفراء . زبانه
مسطبان . جوشه ويطة الى الوريد السمر المواج . رواشته
ردادية اللون يعلوها قبيج بيوري وتسلج اسمر . احداها
الى الوريد القسبة || الاثى ممدرة . جسمها اعليحي
الشكل يطول نحو ١٠ سم . ويتنهي بمزج حاد . ثوبها
الى الوريد السمر تملوها رقة ممدرة . جرانها مستطيلة
نظيفة تكتبها من الانتفال بسرعة وين تلتق الاجنار ||
لها جيل واحد في الحول . تظهر في نيسان . تسرح في
الليل . تماثل بعد ظهورها بنحو ثلاث ساعات وتمتص
المكن مباحدا على اباط الارواش || السرعة عند بلوغها
الاكمل تطول نحو ١٨ سم . جسمها اسطواني الشكل ،
مبشر اطلب الدقيق القصير . ثوبها الى الكهبة تملوها ثلاثة
خطوط سود قاطبة منها خط نجبي مضاعف العرض . رأسها
الى الجفوة . فرجها ممدود الشكل ينتهي بزايدة ذلقة .
وراجها البنية الوسطى شديدة القصر مما يجعلها تقصر
عند الانتفال || طول الاكمل يستمر نحو ٣٨ اسبوعا
ويتقضي في التربة ضمن غلاف من الطين والبراز المصمون
بالريال .

٢٧٠٩٩ - مَغْرِيَّة الشجر * (F). Cneorum (S).

Camélé, Chamélé, Garousse (F). Spurge olive,
Widow-wall (E). Knester Knopspricke (D). Ca-
meles, Calmolea (I).
جنس شجيرات وجنيات يرية من فصيلة المَزْرُورِيَّات .
انواعها عديدة ، بعضها من نباتات المناطق المعتدلة . اوراقها
ابيدة متعاقبة . أزهارها خشوية ابطية الارتكاز وسيدة
او ثلاثية التجميع . ثمارها ثلاثية الفلقات المتناشفة . بزورها

٢٧١٠٠ - مَغْرُورِيَّات مَبْدُول * (F). Cneorum (S).

Camélé, Chamélé, Garousse (F). Spurge olive,
Widow-wall (E). Knester Knopspricke (D). Ca-
meles, Calmolea (I).
جنس شجيرات وجنيات يرية من فصيلة المَزْرُورِيَّات .
انواعها عديدة ، بعضها من نباتات المناطق المعتدلة . اوراقها
ابيدة متعاقبة . أزهارها خشوية ابطية الارتكاز وسيدة
او ثلاثية التجميع . ثمارها ثلاثية الفلقات المتناشفة . بزورها

٢٧١٠١ - مَغْرُورِيَّات مَبْدُول * (F). Cneorum (S).

Camélé, Chamélé, Garousse (F). Spurge olive,
Widow-wall (E). Knester Knopspricke (D). Ca-
meles, Calmolea (I).
جنس شجيرات وجنيات يرية من فصيلة المَزْرُورِيَّات .
انواعها عديدة ، بعضها من نباتات المناطق المعتدلة . اوراقها
ابيدة متعاقبة . أزهارها خشوية ابطية الارتكاز وسيدة
او ثلاثية التجميع . ثمارها ثلاثية الفلقات المتناشفة . بزورها

٢٧١٠٢ - مَغْرُورِيَّات مَبْدُول * (F). Cneorum (S).

Camélé, Chamélé, Garousse (F). Spurge olive,
Widow-wall (E). Knester Knopspricke (D). Ca-
meles, Calmolea (I).
جنس شجيرات وجنيات يرية من فصيلة المَزْرُورِيَّات .
انواعها عديدة ، بعضها من نباتات المناطق المعتدلة . اوراقها
ابيدة متعاقبة . أزهارها خشوية ابطية الارتكاز وسيدة
او ثلاثية التجميع . ثمارها ثلاثية الفلقات المتناشفة . بزورها

٢٧١٠٣ - مَغْرُورِيَّات مَبْدُول * (F). Cneorum (S).

Camélé, Chamélé, Garousse (F). Spurge olive,
Widow-wall (E). Knester Knopspricke (D). Ca-
meles, Calmolea (I).
جنس شجيرات وجنيات يرية من فصيلة المَزْرُورِيَّات .
انواعها عديدة ، بعضها من نباتات المناطق المعتدلة . اوراقها
ابيدة متعاقبة . أزهارها خشوية ابطية الارتكاز وسيدة
او ثلاثية التجميع . ثمارها ثلاثية الفلقات المتناشفة . بزورها

٢٧١٠٤ - مَغْرُورِيَّات مَبْدُول * (F). Cneorum (S).

Camélé, Chamélé, Garousse (F). Spurge olive,
Widow-wall (E). Knester Knopspricke (D). Ca-
meles, Calmolea (I).
جنس شجيرات وجنيات يرية من فصيلة المَزْرُورِيَّات .
انواعها عديدة ، بعضها من نباتات المناطق المعتدلة . اوراقها
ابيدة متعاقبة . أزهارها خشوية ابطية الارتكاز وسيدة
او ثلاثية التجميع . ثمارها ثلاثية الفلقات المتناشفة . بزورها

٢٧١٠٥ - مَغْرُورِيَّات مَبْدُول * (F). Cneorum (S).

Camélé, Chamélé, Garousse (F). Spurge olive,
Widow-wall (E). Knester Knopspricke (D). Ca-
meles, Calmolea (I).
جنس شجيرات وجنيات يرية من فصيلة المَزْرُورِيَّات .
انواعها عديدة ، بعضها من نباتات المناطق المعتدلة . اوراقها
ابيدة متعاقبة . أزهارها خشوية ابطية الارتكاز وسيدة
او ثلاثية التجميع . ثمارها ثلاثية الفلقات المتناشفة . بزورها

٢٧١٠٦ - مَغْرُورِيَّات مَبْدُول * (F). Cneorum (S).

Camélé, Chamélé, Garousse (F). Spurge olive,
Widow-wall (E). Knester Knopspricke (D). Ca-
meles, Calmolea (I).
جنس شجيرات وجنيات يرية من فصيلة المَزْرُورِيَّات .
انواعها عديدة ، بعضها من نباتات المناطق المعتدلة . اوراقها
ابيدة متعاقبة . أزهارها خشوية ابطية الارتكاز وسيدة
او ثلاثية التجميع . ثمارها ثلاثية الفلقات المتناشفة . بزورها

٢٧١٠٧ - مَغْرُورِيَّات مَبْدُول * (F). Cneorum (S).

Camélé, Chamélé, Garousse (F). Spurge olive,
Widow-wall (E). Knester Knopspricke (D). Ca-
meles, Calmolea (I).
جنس شجيرات وجنيات يرية من فصيلة المَزْرُورِيَّات .
انواعها عديدة ، بعضها من نباتات المناطق المعتدلة . اوراقها
ابيدة متعاقبة . أزهارها خشوية ابطية الارتكاز وسيدة
او ثلاثية التجميع . ثمارها ثلاثية الفلقات المتناشفة . بزورها



مغرية الشجر



مغرية ريداء



مزرور مبدول



مصاصر



مصاصر



مقام



ملاط الروج



ممل

٢٧١٢٨ - مَعْمَقِ البرعة البطيئة في ساق النبات الحولي .

٢٧١٢٩ - مَعْمَقِيَّات ٥ Articulés (F).

Articulata (E).

شعبة من ستورات الزهر الرئوية . رتبها وفصلها وأجناسها المعروفة عديدة ، منظمها من أحافير الصور الخالية أعصبا الحفوة الكربونية . الحاضر بها الآن ينتمي إلى فصيلة الاسوشيات . سفيها معقبة التركيب . أرواقها شديدة الصغر ، خضبة التجميع ، أجهزتها البويطة سبيلات محورية متغايرة الطول .

٢٧١٣٠ - مَعْمَكَّاس Commutateur (F).

Commutator, Switch (E).

أداة تمكس التيار الكهربائي .

٢٧١٣١ - مَعْمَلَاط المُرُوج ٥

Glaucopsyche cyllarus (S). Glaucopsyche des prairies (F). Glaucopsyche cyllarus (E).

حشرة من فصيلة القنليات ورتبة حشرقيات الأجنحة . موطنها مغربي الاصفاع المعتدلة الحرارة في العالم القديم . فراشها واحة قوتيا وحيق الانزار . سرقتها تمشي على أوراق النباتات المعروفة وأعصها النمل || جسمها متوسط اللد يطلو نحو ١٧ سم . بسطها نحو ٣٢ سم . رأسها صغير الجسم . صيغها كيرتان . زياتها شبه صليانيان . سرقتها دقيق الجسم . صيغها أزرق اللون تعلو بقية سواد . يطها إلى الزرقاة || ورائش الذكر إلى الزرقاة البنفسجية يطها حنار اسود وتلدب ايض . ورائش الانثى إلى الطحلة الكستنية يطوها حنار اسود وتلدب اغبر || لها جبل واحد في الخلق . تظهر الفراشة في حزيران . تسرح في النهار . تماثل بده ظهورها بنحو ستة اسابيع وتضع المنك مهاديا على الصفحات السفلى من نصال الأوراق || السرعة عند بلوغها الكمال تطلو نحو ١٥ سم . جسمها مقوس الشكل ، مستقيم المقدم والمؤخر . شوها إلى الرعدة الخضراء تعلوها خثة خطوط قاطبة جوية والطواق سكية سواد اللون . رأسها اسود . مدتها ورواجها إلى الطحلة لفرصانية || طور الاكمال يستمر نحو ثلاثة اسابيع تقريبا لتأخره متدلية برباط بمنطقها كالحزام تضفده الحضيصة .

٢٧١٣٢ - مَعْمَلَاق Pédoncule (F). Peduncle (E).

جسم دقيق مستطيل يحمل زهرة أو بعض اجزاء .

٢٧١٣٣ - مَعْمَلَايَة Podocorpe (F).

هي القشع ، اطلية .

٢٧١٣٤ - مَعْمَلَّس Expérimenté (F).

Experienced (E).

٢٧١٣٥ - مَعْمَلَّف ٥

Mangeoire (F).

Manger, Crib (E).

وهاء من خشب أو باطن من حجارة توضع فيه الاغلاف للئيل والبقر وغيرها .

٢٧١٣٦ - مَعْمَلَّف

الملف بمجموعة كواكب .

٢٧١٣٧ - مَعْمَلَّيَّات Informasique (F).

هي الاستقصائية ، اطلها .

Huilerie (F).

Oil-works, Oil-shop (E).

٢٧١٤٤ - مَعْمَصْرَة

معمل استخراج الزيت .

Cidrerie (F).

Cider making, Cider-factory (E).

المكان المد لمصر مصنع خمر التفاح مع ما يشمل من مختلف التجهيزات .

٢٧١١٦ - مَعْمَصْكَة Ecimeuse (F). Pollarder (E).

آلة تشترتف الأزود حاليًا قبل الاسبال خشيبة الصنمان .

٢٧١١٧ - مَعْمَصِد Emondoir, Serpe (F).

Pruning-hook (E).

أداة المقصد ويدهي المقصب .

Brachionidés (F).

Brachionidés (E).

٢٧١١٨ - مَعْمَصُونِيَّات

فئة درويبات مائية من دوارات المياه العذبة . تتميز باستطالة لإرجل الشديدة المرونة .

٢٧١١٩ - مَعْمَصِي Sciespare (F). Schizogenous (E).

متناسل بالانقسام إلى شطرين .

٢٧١٢٠ - مَعْمَصَّات ٥

Amblycephalidae (S). Amblycephalidae (E).

فصيلة حييات بيوضة من عادات السموم . أجناسها المعروفة خمسة ، جنسان يمشان في مناطق جنوب آسيا وثلاثة أجناس تعيش في البلاد الاسيوية || أجسامها متوسطة الطول ، شبه اسطوانية الشكل ، تطلو من ٦٥ إلى ٧٥ سم . رؤسها مستقيمة الاغظام ، رجة الاشدق فكرتها مستقيمة . صيغها صغيرة . اعتانها لا ملحوظة . انماها قصيرة . ألوانها مائلة أو مرقوشة || انواعها المعروفة ٤٢ . تألف الغابات والجبال الجبلية . تسرح في الليل . قوتها الفئران والجرذ والبطاء والتمارين الصغيرة .

٢٧١٢١ - مَعْمَصَن Routoir (F).

Retting-pond, Retting-pit (E).

مصنع أو حوض أو بركة أو غدير يملن فيه القنب والكتان .

٢٧١٢٢ - مَعْمَعَّاس ٥ ، مَعْمَعَّاس ٥ Putrescible (F).

Liabile to putrefaction (E).

صفة التي ، القابل للتلفن .

٢٧١٢٣ - مَعْمَعِّي Franc (F). Exempt (E).

خالص الاجرة أو طليق من الكس .

٢٧١٢٤ - مَعْمَعَّام ٥ ، مَعْمَعَّامَة Stérilisateur (F). Sterilizer (E).

جهاز لتطهير يركز على الحرارة المرتفعة .

٢٧١٢٥ - مَعْمَعَّة Drageonnante (F).

هي النباتات الكثيرة القسا والمملوخ كالتين والخرور والورد والرومان .

٢٧١٢٦ - مَعْمَعَّد Pancreas (F).

Pancreas (E).

هو الحولة ، اطلها .

٢٧١٢٧ - مَعْمَعِّي Articulation, jointure (F).

Articulation, joint, joining (E).

المحاق من التحل في المفاصل . فالروغ عند الحافر معقم والركبة معقم والمعقوب معقم || يقال فرس شديد المعاقم .

Hydroscope (F). **مِقْبَاش** ٢٧١٥٤
Water-diviner (E).
هو الذي يستكشف البنايع ويمن موائها .

Terrair (F). Soil, Ground (E). **مِقْبَاش** ٢٧١٥٥
صفة الارض بالنسبة الى الزراعة كقولك مِقْبَاش جيد
الآباء ، ويمع كرم ، وطعم الميس .

Losange, Rhombe (F). **مِقْبَاش** ٢٧١٥٦
Lozange, Rhomb, Rhombus (E).
جسم رباعي الاضلاع المتساوية .

Hydroscope (F). **مِقْبَاش** ٢٧١٥٧
Water-divining (E).
علم استكشاف البنايع وتبين موائها .

Rhomboidal (F). Rhomboidal (E). **مِقْبَاش** ٢٧١٥٨
Oculifère (F). **مِقْبَاش** ٢٧١٥٩
المعين من كان يعمل عيناً . راجع جاحم .

Misuler (F). To maw (E). **مِقْبَاش** ٢٧١٦٠
مفا ومباغ وباء السور : صَوْرَت .

Glossostemon (S). **مِقْبَاش** ٢٧١٦١
Glossostémon (F).
جنس نباتات عشبية برية معمرة من فصيلة الخبائيات .
انواعها قليلة العدد ، اصلها الشرق الاوسط . اوراقها
مستطقة متناقبة كفية . ازهارها صغيرة القد فردية || اشهر
انواعها اللغات المجي .

Glossostemon bruguleri (S). Glossostémon (F). **مِقْبَاش** ٢٧١٦٢
نوع من اللغات وهو عشبة برية طيبة تملو من ٥٠ الى
١٠٠ سم . جذورها حزائي الشكل احمر المادة اسود القلفة .
ساقها وفروعها زهاء اللحاء . اوراقها مستطيلة الاعتدال
خلية النصل . ازهارها صغيرة القد بيضاء اللون || جلوره
تستعمل مسبوقة وتدخل في عدة مركبات تقي المرأة النساء .

Avarias (F). **مِقْبَاش** ٢٧١٦٣
Damages, Averages (E).
هي القوار ، راجع .

Magas (S). **مِقْبَاش** ٢٧١٦٤
Magas (F). Magas (E).
جنس حيوانات بحرية من الرغويات عضديات الارجل
وفصيلة التثدييات || انواعها المعروفة عديدة جميعها من
متصبرات الاباح الاول .

Magas (S). **مِقْبَاش** ٢٧١٦٥
Magas (F). Magas (E).
المغائر والمغائير : صنع ينسجه العرط وهو حلو يلزك
الا انه مقت الرأفة .

Hétérotrope (F). **مِقْبَاش** ٢٧١٦٦
Heterotropous (E).
نعت تعريفي يطلق على كل نيت (ملقونة نباتية) رأس
طرفه لا يقابل انقور البزرة .

Néphélomètre (F). **مِقْبَاش** ٢٧١٦٧
Nephelometer (E).
جهاز يمكن من درس الغبش وتحديده .

Vivace (F). Perenniel (E). **مِقْبَاش** ٢٧١٦٨
نعت تعريفي يوصف به النبات الذي يعيش أكثر من
سنتين .

Novalé (F). **مِقْبَاش** ٢٧١٦٩
Newly broken-up (E).
كل ارض عمرة مستعمدة .

Fabrique, Manufacture (F). Fabric, Manufactory (E). **مِقْبَاش** ٢٧١٧٠
Brasserie (F). Brewery, Brewhouse (E).
معمل تصنع فيه البيرة اي البيرة .

Glicoserie (F). **مِقْبَاش** ٢٧١٧١
Glucose-house (E).
معمل يحول فيه النشا الى غلوكوز .

Grapperie (F). **مِقْبَاش** ٢٧١٧٢
Graperie, Vinery (E).
هي دفيئة العنب ، بناء زجاجي السقف وبفس الجوارب
مجهز بمدة التفتة يستعمل لفرس الكرونة وانتاج العنب
علافا لزبان الانتاج الطيب .

Insectarium **مِقْبَاش** ٢٧١٧٣
موسسة علمية مجهزة بالوسائل الخاصة التي تمكن من تربية
الحشرات لدرس اطوارها وبيوتها .

Fiduciaire (F). Fiduciary (E). **مِقْبَاش** ٢٧١٧٤
هو الذي اوصى له مال وفرض عليه دفعه للمستحق
المهدي .

Métamérisme (F). **مِقْبَاش** ٢٧١٧٥
نعت تعريفي يطلق على الاعضاء المماثلة المتماثلة في كامل
الجسم او في جزء منه .

Pioche (F). Pickaxe (E). **مِقْبَاش** ٢٧١٧٦
اداة زراعية تستعمل في ركاش التربة . اشكاله واحسانه
مدينة تختلف باختلاف الاعمال المطلوبة .

Colloque (F). Collic, Coliac (E). **مِقْبَاش** ٢٧١٧٧
Intestin (F). **مِقْبَاش** ٢٧١٧٨
Intestine, Bowel, Gut (E).
عضو من جهاز الهضم يمتد من المعدة الى المست وهو
يقسم الى عدة اقسام انحصارها للمي التثيق والمي التليظ .

Intestin grêle (F). **مِقْبَاش** ٢٧١٧٩
Small intestine (E).
القسم الوسطي من الامعاء .

Jéjunum (F). Jejunum (E). **مِقْبَاش** ٢٧١٨٠
المعي الصائم جزء من المعى التثيق مركزه بين التليظ وبين
المعي التليظ .

Colon (F). **مِقْبَاش** ٢٧١٨١
Colon (E).
القسم الاخير من الامعاء ينتهي في المست .

Iléon, Iléum (F). Ileum (E). **مِقْبَاش** ٢٧١٨٢
المعي التليظ هو القسم الثالث والاطول من المعى التثيق ،
مركزه بين المعى الصائم والاخضر .



مِقْبَاش



مِقْبَاش



مُتَكَلِّس



مُتَكَلِّس



مُتَكَلِّس



مُتَكَلِّس



مُتَكَلِّس الكَرَز

٢٧١٧٦ - مُتَكَلِّس غُرُوبِي *

Alnus glutinosa (S). Aune glutineux, Aune, Verne, Vergne (F). Common alder (E). Alder, Erlenbaum, Erle, Schwarzerle (D). Alno, A. ontano, Ancotano, Aunera, Verna russa (I).

نوع من المثلث المثلث. شروبه عديدة تملو من ٥ إلى ٣ م. منبها الشائع ويجاري الماء. سيقانها جالسة تشورها إلى السرة السوداء. فروصها زياه. أوراقها ثلاثية أو خماسية التفصيص. نصلها عديد المروق الدقة، لابع البشرة المائلة على صفحتيه.

٢٧١٧٧ - مُتَكَلِّس لُكِّي الْوَرَق *Alnus cordata* (S). Aune à feuilles en cœur (F).

نوع من المثلث، شجرته صغيرة تملو من ٨ إلى ١٠ أمتار. فروصها مائلة. أوراقها ثلثية الشكل تملو من ٥ إلى ١٢ سم. وتعرض من ٤ إلى ١٠ سم. نصلها مسنن، الحافة خلي الصفحة السفلى. غاريظها فردية التجميع جوزية اللث.

٢٧١٧٨ - مُغَيَّر، مُغَيَّر، مُغَيَّر *Miellet* (F). Honey dew (E).

مواد سكرية لزجة تنفصها ساق أوراق بعض النباتات فيجربها النمل وتميش عليها بعض الفطور المجهري كلفر الشام.

٢٧١٧٩ - مُغَيَّرِيَّات *Nectarinidées* (S).

Nectarinidées (E). فصيلة طير من الجوارم وزيقات النectar. أجسامها وأوراقها زهاء ١٢٠، جميعها صغيرة اللث. جملة الشكل، زاهية الألوان المُرَاكبة، مستطيلة المنابير النقيقة. مهنا البلاد الحارة. يجرس رقيق الأظفار وأجالي السكرة.

٢٧١٨٠ - مُغَيَّرِيَّة *Melica* (S). *Melique* (F).

Melice, *Meick* (E). *Nickendes* (D). *Melica* (I). جنس نباتات عشبية سولية أو معمرة من فصيلة النجيليات. أنومها عديدة جميعها علفية ترهاها للث. وهي تنبت في معظم الإحشاق المعتدلة الحارة. سيقانها نخيلة منتصبة. أوراقها عصفية، متبادعة، قليلة. أزهارها صغيرة اللث، حذركية التجميع، حطرية العروق، خزرية الرقيق يجربها النمل.

٢٧١٨١ - مُتَكَلِّس، مُتَكَلِّس *Málonghe* (F).

لبات زراعي مشهور باسم بانجنان، أمليه.

٢٧١٨٢ - مُتَكَلِّس *Pluvioscopa* (F).

Pluvioscopa (E). الملقاق جهاز يسجل زمن وقوع المطر بعدة استمراره ويقدره.

٢٧١٨٣ - مُتَكَلِّس *Rams* (F). *Or* (E).

الملقف جهاز مجلاني الشكل يكون منه بعض المفصليات والرضويات والقتشريات والحشرات.

٢٧١٨٤ - مُتَكَلِّس الكَرَز *

Magdalis cerasi (S). *Magdalis des cerisiers* (F). *Magdalis cerasi* (E).

حشرة خاضعة خالصة مؤذية من فصيلة السوسيات وربة مفصلات الاجنسة. تألف جناتن الاجار الشرة من قنقح واجامس وكروز وغوغ... غناظها تميش على نصال الاوراق. يرقاقها تنجج الاناد والافصان حتى

٢٧١٨٨ - مُتَكَلِّس، مُتَكَلِّس *Vache taurinaire* في البقرة الغلثة المستعدة أوداق أو الاستحمام.

٢٧١٨٩ - مُتَكَلِّس *Echadé* (F). *Scalded* (E). المتورم من النبات: الذي لقمه الحمر.

٢٧١٩٠ - مُتَكَلِّس، مُتَكَلِّس، جَمَر الماء

Alnus (S). *Aune* (F). جنس نباتات شجرية وجينية من فصيلة البتريليات. أنواعه ١٦، أصنافها البلاد المعتدلة. تميش جل ضفاف البحيرات ويجاري الماء. أوراقها مائلة. أزهارها قديمة، الأكثرية منها تظهر في الخريف والانتوية تأخر إلى الربيع. أعشاشها خالصة الاستعمال المناعي لا يعلها الماء. فحمها يستعمل في صناعة البارود. تشورها وافر الطنان تصلح للباغة. أشهر أنواعها ما يتبع.

٢٧١٩١ - مُتَكَلِّس أخضر *Alnus viridis* (S).

Aune vert, *Aunâtre* (F). *Green alder*, *Mountain alder* (E). *Grünerle*, *Drosle* (D). *Drosza*, *Drosale*, *Trosga* (I).

نوع من المثلث وهو شجرة جبلية مبلولة تملو من ٢ إلى ٦ أمتار. أوراقها بيضيه ذلقة. نصلها يطول من ٣ إلى ٨ سم. ويعرض من ٢ إلى ٥ سم. وهو ثنائي التستين. أخضر الصفحة العليا خلي السفلى.

٢٧١٩٢ - مُتَكَلِّس أُرْمَد *Alnus incana* (S).

Aune grisâtre, *A. de montagne*, *Aune blanchâtre* (F). *Black alder*, *Hoary alder*, *Speckled alder* (E). *Weisserle*, *Grauerle* (D). *Auzano*, *Marassola*, *Ontanella* (I).

نوع من المثلث المثلث. شروبه عديدة، أشجاره صغيرة اللث تملو من ٥ إلى ١٥ م. أوراقها مزرقية تملو من ٤ إلى ١٢ سم. وتعرض من ٣ إلى ٩ سم. نصلها باهت الأخضر، أريد اللون. كثير العروق، مزدوج التستين.

٢٧١٩٣ - مُتَكَلِّس اليابان *Alnus japonica* (S).

Aune du japon (F). نوع من المثلث، مهدد اليابان. شجرته متوسطة اللث تملو من ١٠ إلى ١٨ م. فروصها مائلة زياه. أوراقها سنائية تملو من ٦ إلى ١٤ سم. وتعرض من ٢ إلى ٦ سم. نصلها قابل الزيب والأخيل، متبادعة التستين، ينتهي بهبة مستدقة مستطيلة.

٢٧١٩٤ - مُتَكَلِّس بحرِي *Alnus maritima* (S).

Aune maritime (F). نوع من المثلث، شجرته صغيرة اللث تملو من ٨ إلى ١٠ أمتار. فروصها مائلة. أوراقها تملو من ٥ إلى ١٢ سم. وتعرض من ٣ إلى ٦ سم. نصلها مائل الصفحة العليا خلي السفلى لا قياس التستين ينتهي بهبة قصيرة. وهو يربح في المناطق الرطبة الساحلية ويجيد قرب الماء.

٢٧١٩٥ - مُتَكَلِّس صِبَاغِي *Alnus tinctoria* (S).

Aune tinctorial (F). نوع من المثلث، مهدد اليابان ومغشوربا. شجرته متوسطة اللث تملو من ١٢ إلى ٢٠ م. ساقها كثبة سمراء اللحاء. فروصها الفتية مزرقية. أغنانها قلبية الحمل. أوراقها أحليلجية متبادعة مقبولة للقاعدة تملو من ٦ إلى ١٢ سم. وتعرض من ٥ إلى ١١ م. نصلها مجري اللون خلي الصفحة السفلى. تشورها صبغية خالصة الاستعمال.

2٧١٩٨ - **مِفْرَكَة** Scoop, Ladle (F).
رشف مقعر يستعمل في إغتراف الماء والمواد المائعة .

2٧١٩٩ - **مِقْرُود** Truffe rouge (F).
هو الفطر الأحمر ، اطبخه .

2٧٢٠٠ - **مُقْرِي** Mougri (F).
نوع من الفجل الزراعي المأكول يعرف بفجل الهند أو فجل جاوا .

2٧٢٠١ - **مِقْرَل** Quenouille (F), Distaff (E).
هو المردن ، شكل من أشكال تشذيب الشجر .

2٧٢٠٢ - **مِفْشِيلُ الْوَرْدِ** *
Megachiles centuncularis (F), Mégachile (F).
حشرة من المِفْشِيلِيَّات طولها نحو ١٢ سم . تركيب الوردة والفلل تخفضم نصل الأوراق وتنقل اللقنات الى غشائها الذي تقيمه في بعض التجاويف الخفية حيث ترسبها اللقنات سنفاً متتامة يغطيها المكن ، يشاهد ويحيط به شيء من الصل || يعتبر من الحشرات الضارة لانه يلذي أوراق الوردة والفلل .

2٧٢٠٣ - **مِفْشِيلِيَّات** *
Megachilidae (F), Mégachilidés (F), Megachilidae (E).
فصيلة حشرات خاضعة جارية من رتبة غشائيات الاجنحة . اجناسها وانواعها قليلة العدد ، قريبة الشيء من النحل . جميعها صغيرة القدر ، طولها يراوح من ١٠ الى ١٥ سم . تقيم غشائياتها في تجاويف الاشجار اليابسة .

2٧٢٠٤ - **مَغْض** Colique (F).
Colic, Stomach-ache (E).
عارض يعترى بعض الحيوانات كالخيل والبقر . اسبابه غشلة وانواعه ايضاً اغصها الكولي والمومي .

2٧٢٠٥ - **مِغْضَن ، مِفْنَد ، مِقْصَب**
Ebranchoir (F), Pruning-tool (E).
اداة تستعمل في قطع الاغصان والاشاد .

2٧٢٠٦ - **مَغْض** Momordica (S), Momordique (F).
جنس نباتات عشبية مفادة وعارشة من فصيلة الغشائيات ، انواعها ١٢ منها الحولية والمصرة . اوراقها متعاقبة ، مستنقة ، كثيفة ، زغبية ، خشنة . ازهارها فردية التجميع ، كبيرة القدر ، وسيدة المسكن . ثمارها بيضية الشكل ، لثولية القشور . يزورها مبططة ، سحنية اللون ، بارزة التسنيج والازراكنش || احرف انواعه واشهرها ما يلي .

2٧٢٠٧ - **مَغْضُ الْكُوْشْتَشِين**
Momordica cochinchinensis (S), Momordique de Cochinchine (F).
نوع من المغض المسر ، منته الكوشتشين والهند . جذوره عسقية . ساقه تطول نحو ٨ أمتار . حوافه بسيطة . اوراقه ثلاثية او غشابة التفصيص . ازهاره كبيرة القدر قطرها نحو ١٠ سم . لونها الى الصفرة الباهتة ، بتلاتها سنانية الشكل ، مضطبة بالاسود . ثماره بيضية حمراء اللون تطول من ١٠ الى ١٨ سم .

2٧٢٠٨ - **مَغْضُ بَلَسِي** *
Momordica balsamina (S), Momordique baumier, M. balsamina, Pomme de merveille, Pomme de Jérusalem (F), Apple of Jerusalem, Balsam apple (E), Balsamapple, Wunderapfel (D), Momordica, Pomo balsamo, P. di meraviglia (I).
اشهر انواع المغض . اصنافه فسيحة الارباء تمتد من الشرق

الاقارب قطعها وتؤكلها || جسمها صغير القدر يطول من ٣ الى ٤ م . ثوبها الى السواد الكامد . رأسها كبير الجرم ينتهي بتمك قاصم ثاقب . عيناها كبيرتان . زباناها صوطانيان . ظهرها مستدير الخوضر اللامع القارق الطرفت . ارساغها رباعية المقل || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اوائل الربيع . تسرح في الليل . تساقط بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع . تتركز المكن في لواء الافئدة والافاصن في تقارب تغلجها بتمكها || البرقة مرقاة تطول عند تمام الادراك من ٦ الى ٧ سم . جسمها اهليجي الشكل ، سحنى اللون ، اصفر الخواج ، اسمر الرأس والفترج || طود الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع ينتهي في طرف النلق الذي احفرته البرقة .

2٧١٨٥ - **مُعْدٌ** Nutritif (F).

Nutritive, Nourishing (E).
نعت تعريفي توصف به المواد الغذائية او التي لها علاقة بالتغذية .

2٧١٨٦ - **مِغْرَاس** *
Transplantoir (F), Garden trowel (E).
اداة مختلفة الشكل والحجم تستعمل في تحجوب التربة لتسكيرها من اقبال الشتول المطلوب غرسها .

2٧١٨٧ - **مِغْرَاسُ الْكِي** *
Transplantoir mécanique (F), Transplanting-machine (E).
جهاز آلي يؤمن غرس الشتول في التربة على ابعاد متساوية .

2٧١٨٨ - **مُغْرَب** Albinos (F).
هو الاصعب ، اطبخه .

2٧١٨٩ - **مُغْرَكَة** Ocre (F), Ochre (E).
تراب صلبالي يستعمل في التخصيب .

2٧١٩٠ - **مُغْرَكَة حَمْرَاء** Ocre rouge (F).
تراب صلبالي اخر اخضاب .

2٧١٩١ - **مُغْرَكَة صَفْرَاء** Ocre jaune (F).
تراب صلبالي اصفر اخضاب .

2٧١٩٢ - **مُغْرَدٌ** Scare bird (F).
راجع ابو مقار ديك البحر .

2٧١٩٣ - **مُغْرُز**
المغرز او مغرز الذهب نجم ثير من كوكبة الدب الاكبر .

2٧١٩٤ - **مُغْرُزٌ** Empettement (F), Footing (E).
2٧١٩٥ - **مُغْرُزُ السَّيْبِ** Ecrouissage (F).
مغرز نصاب الحشرات .

2٧١٩٦ - **مُغْرُزُ الطَّعْمِ** Enture (F).
الموضع الذي يوضع فيه الطعم من المظلم .

2٧١٩٧ - **مِغْرَسٌ** Biron, Haque (F), Truck (E).
اداة من حديد مخروطية الطرف تفرز في التربة لتفتح حفرة توضع فيها التربة .



مغراس



مِفْشِيلُ الْوَرْدِ



مغض بلسي

- الأولى إلى الهند . ساقه تطول نحو ١٥٠ سم . حوالقه دقيقة .
اوراقه ثلاثية أو خماسية التفصيص تطول وتعرض نحو ٨ سم .
نصلها مائل الصفحة الالامعة ، مسن الحافة . أزهاره
صفراء اللون ، اهليلجية البتلات . ثنائياتها ثلثية الشكل ،
مسنة ، طرية الارزكان . ثماره برتقالية الشكل واللون تطول
نحو ٨ سم . وهي تزكك خضراء في أول حدها وتصبح طيبة
عند نضجها وقد تدخل في عدة مستحضرات دالة ومفيدة .

٢٧٢٠٩ - مغض خَلْيِي الْوَرْقِ *

Momordica charantia (S). Momordique à feuilles de vigne, Margose, Papsreh (F).

نوع من المغض ، منته البلاد الحارة . جلوهه ليلية التركيب .
ساقه حارفة تطول نحو ٣٠٠ سم . حوالقه بسيطة . اوراقه
خماسية أو سباعية التفصيص . نصلها مسن الحافة ، خل
البشرة قبالة العروق البارزة . أزهار صفراء اللون ، خفيفة
البتلات . ثنائياتها تتوسط المالحق . ثماره برتقالية اللون ،
مستطيلة الشكل ، ذرية الرأس والقلب ، ثملورية القشرة
الخشنة ، تطول إلى ١٥ سم . لها احمر اللون
ماكول .

٢٧٢١٠ - مغض قَلَالِي

Momordica involucrea (S). Momordique à involucre (F).

نوع من المغض ، منته افريقية الجنوبية . ساقه حارفة
تطول نحو ٣٠٠ سم . حوالقه بسيطة . اوراقه صغيرة القد
خماسية التفصيص . نصلها مسن الحافة يطول ويعرض
من ٤ إلى ٦ سم . أزهاره بيضاء اللون مستديرة البتلات
ثنائياتها ثلاثية طرية . ثماره ارضوانية ، بيضية الشكل
تطول نحو ٥ سم . لها احمر .

٢٧٢١١ - مغفِر
المغفر والمغفرة حشرة واحدة مشهورة باسم قرمزية .

٢٧٢١٢ - مغفِرِيَّات ، قَرْمِزِيَّات

Coccidae (S). Coccidées (F). Coccidées (E).
فصيلة حشرات من فصيلة الاجنحة . اجناسها وانواعها
كثيرة البند تتميز بصغر كدها وبازدواجها الشكل والشي
وبفرازاتها الشمية أو الككية || ذكروها تحية الجسم
مجسة . انائها معار يفضية الشكل أو مكورة تميز
حل النسج النباتية تنفثها وتمتص عصارتها .

٢٧٢١٣ - مغفِرِيَّة النَّحَّاحِ الدُّكْبَةِ

هي قرمزية النحاح ، اطلبها .

٢٧٢١٤ - مغفِرِيَّةُ الحُمْضِيَّاتِ

Pseudococcus citri (S). Cochenille farineuse des agrumes (F).

حشرة من القرمزيات ، بيضية الشكل ، صغيرة القد
مبططة الجسم ، محدبة الظهر ، صفراء اللون ، تحية الثلاث
الشمي القلبي التركيب || تركيب الحفصيات والمغفر
وبعض نباتات الزينة . اضرارها مخرقة . تكاثرها كثيرا
من القرمزيات .

٢٧٢١٥ - مغفِرِيَّةُ اليَاسْمِينِ

Orthazia insignis (S). Cochenille du jasmin (F).

حشرة صغيرة من القرمزيات ، ثوبها إلى الخضار البني
يلشها ندف شبي بمنطقها من كل صوب . طولها مع
كيس مكها يبلغ نحو ٧ مم . تركيب الياسمين والكرزات
وغيرها من نباتات الزينة || تكاثر كثر القرمزيات .

٢٧٢١٦ - مغفِرِيَّةُ مَدْكَبَةِ

Serpette (F). هي قرمزية فوريوزا ، اطلبها .

٢٧٢١٧ - مَغْفُورُ

هو المغر ، اطلبه .

٢٧٢١٨ - مَكَلَّة

النسبة والمز التي تنتج في عام مرتين . ج مغل .

٢٧٢١٩ - مَغْلَقِي

Indéhiscant (F). Indehiscent (E). تمت تعريفه يوصف به ما لا يتفتح أو لا يتشقق من البرور وغيرها .

٢٧٢٢٠ - مَغْلِج

راجع مغنطة .

٢٧٢٢١ - مَغْنَا ، مَهَارَكَة

Magma (F). Magma (E).

المغا ، فيزياليا وكيميايا ، كل مادة رغو شبه مائلة
كالبزاج المصهور أو كالطابع الذي يثقف به البركان
عند ثورانه .

٢٧٢٢٢ - مَغْمَدَة الْاَجْنَحَة

Coléoptères (F). Coleoptera (E).

رتبة من الحشرات تعرف بمقدمة الاجنحة ، اطلبها .

٢٧٢٢٣ - مَغْمَر

Essachour (F). Sacking (E). اداة تجمل الكيس قائما مفتوحا فيسمل ملوك حيا .

٢٧٢٢٤ - مَغْنِطَا *

Magnétomètre (F). Magnetometer (E).

جهاز يمسك في قياس الاقطاب المغنطة .

٢٧٢٢٥ - مَغْنَطِيسِي ، مَغْنِطِيسِي

Magnétique (F). Magnetic (E).

٢٧٢٢٦ - مَغْنَة ، مَوْغْنَتُو ، مَاهُون

Swietenia mahogoni (S). Mahogon, Mahogoni, Acajou à meuble (F). Mahogony tree (E). Mahogoni baum, Acajou baum (D). Mogano, Acagiu (I).

شجرة متوسطة القد من فصيلة الازهرجات . مهدا المناطق
الحارة الافريقية . خشبها اصفر اللون ، اسمر المراج ،
نام الرقعة ، فاسر الصنف ، يمتد من اجود أنواع
الأكاجيو . وهو شائع الاستعمال في البلاد الاستوائية لانه
عازل طبيعي للحرارة القوية المشقة .

٢٧٢٢٧ - مَغْنِطَ

Alimenter (F). To magnetize (E).

٢٧٢٢٨ - مَغْنِطَة

Magnétisation (F). Magnetization (E).

٢٧٢٢٩ - مَغْنِطَة حَيَوَانِيَّة

Zoomagnétisme (F). Zoomagnetism (E).

علم يبحث في تأثير المغنطية على الاحياء .

٢٧٢٣٠ - مَغْنَطِيس ، مَغْنَطِيس

Aimant (F). Magnét (E).

٢٧٢٣١ - مَغْنَطِيس كَهْرَبَائِي

Electro-aimant (F). Electro-magnét (E).

٢٧٢٣٢ - مَغْنَطِيسِي كَهْرَبِي

Magnéto-électrique (F). Electro-magnetic (E).



مغن خلي الورق



مغن

٢٧٧٤٠ - مَغْنُولِيَّةٌ كَبِيرَةٌ الزَّهَرُ

Magnolia grandiflora (S). *Magnolia à grandes fleurs* (F).

نوع من المغنولية الآزيبينية . مجهرتها كبيرة القد هريمية الشكل تملو من ٢٠ إلى ٣٠ م . أوراقها أبيضه تطول من ١٢ إلى ٢٥ سم. وتعرض من ٦ إلى ١٢ سم. نصلها لامع البشرة عائق الخضار على صفحته العليا ، أسفم اللون الزنجاري على صفحته السفلى . أزهارها مكسية بتبنة اللون ، عطرية العرف ، قطرها يراوح من ١٨ إلى ٣٠ سم . بتلاتها تعد من ٩ إلى ١٢ ، أقلام اسديتها رجبوانية || أزهارها يستمر طوال شهر حزيران .

٢٧٧٤١ - مَغْنُولِيَّةٌ كَبِيرَةٌ الْوَرَقُ

Magnolia macrophylla (S). *Magnolia à grandes feuilles* (F).

نوع من المغنولية الآزيبينية . مجهرتها متوسطة الحجم تملو من ٨ إلى ١٨ م . أثمارها وزيماتها خالية البشرة . أوراقها عابطة كبيرة مستطيلة ، طولها يراوح من ٢٠ إلى ١٠٠ سم. وعرضها من ١٠ إلى ٣٠ سم. نصلها أحليجي الشكل مسطووم القاطعة . أزهارها عظيمة القدر ، قطرها يراوح من ٢٠ إلى ٣٢ سم. وهي فواصة العرف ، بيضاء اللون ، سداسية البتلات المستديرة || أزهارها يستمر من أيار إلى حزيران .

٢٧٧٤٢ - مَغْنُولِيَّةٌ مَتَدُونَةٌ

Magnolia coco, *M. pumila*, *Talauma pumila* (S). *Magnolia coco* (F).

نوع من المغنولية الآزيبينية . مجهرتها متدولة تملو من ٢ إلى ٤ أمتار . أوراقها أبيضه سنانية ذرية تطول من ٨ إلى ١٥ سم. نصلها أخضر الصفحة العليا ، بحري السفلى . أزهارها صغيرة القدة قطرها نحو ٣ سم. وهي ثلاثية الفصل الخضر ، سداسية البتلات ، فواصة العرف الطري ، عاجية اللون . أزهارها يستمر طوال السنة .

٢٧٧٤٣ - مَغْنُولِيَّةٌ مَحْرَبَةٌ

Magnolia officinalis (S). *Magnolia officinal* (F).

نوع من المغنولية الطبية والزراعية ، مهدا الصين . مجهرتها هريمية الشكل تملو من ٦ إلى ١٦ م . أوراقها عابطة كبيرة تطول من ٣٥ إلى ٤٥ سم. وتعرض من ١٢ إلى ٢٠ سم. نصلها أخضر الصفحة العليا ، خلي السفلى البسرة اللون . أزهارها مكسية كبيرة القدة قطرها يراوح من ١٥ إلى ٣٠ سم. بتلاتها بيض اللون ، أقلام اسديتها قمرية . || أزهارها يستمر طوال فصل الربيع .

٢٧٧٤٤ - مَغْنُولِيَّةٌ مَطْلِيَّةٌ

Magnolia tripetala, *M. umbrellae* (S). *Magnolia parasol* (F).

نوع من المغنولية الآزيبينية . مجهرتها مظلية الشكل تملو من ٥ إلى ١٠ أمتار . أوراقها عابطة أحليجية مستطيلة ، طولها يراوح من ١٢ إلى ٦٠ سم. نصلها مائل البشرة جبل الخضار الزاهي . أزهارها بيضاء اللون . مستبجة العرف ، تسامية البتلات المستطيلة ، قطرها يراوح من ٨ إلى ١٢ سم . || أزهارها يستمر من أيار إلى حزيران .

٢٧٧٤٥ - مَغْنُولِيَّةٌ مُوَلَّغَةٌ

Magnolia acuminata (S). *Magnolia acuminé* (F).

نوع من المغنولية الآزيبينية . جنبها سربوية تملو من ٨٠ إلى ١٥٠ سم. وهي في أقلها وبديتها شجرة شائعة تملو نحو ٣٠ م . أوراقها عابطة بيضية ذرية ، نصلها يطول من ١٢ إلى ٢٢ سم. ويعرض من ٦ إلى ١٢ سم.

٢٧٧٣٣ - مَغْنُولِيَّةٌ

Magnétisme (F).

Magnetism, Mesmerism (E).

Magnolia (S).

Magnolier, Magnolia (F). *Magnolia* (E). *Magnolie, Lillienbaum* (D). *Magnolia* (I).

جنس اشجار وشجيرات ونباتات برية طيبة وزيبينة من فصيلة المغنوليات . أنوعها عديدة . أوراقها متعاقبة ، كاملة ، جلدية النصل اللامع . أزهارها كبيرة القدة ، ثلاثية الفصل ، عديدة البتلات المتركة ، كثيرة الاسدية ، فواصة العرف الطري . ثمارها مغاريط صغيرة القدة ناشقة || أشهر أنوعها ما يلي :

٢٧٧٣٥ - مَغْنُولِيَّةٌ بَحْرِيَّةٌ الْوَرَقُ

Magnolia glauca, *M. virginiana* (S). *Magnolia glauque, M. de Virginie* (F).

نوع من المغنولية ، مجهرتها تملو من ٥ إلى ٢٠ م . أوراقها أبيضه بحرية اللون خالية الصفحة السفلى . نصلها يطول نحو ١٨ سم. ويعرض نحو ٦ . أزهارها عطرية ، مكسية ، عديدة البتلات البيض || أزهارها يستمر من أيار إلى حزيران .

٢٧٧٣٦ - مَغْنُولِيَّةٌ بَقِيَّةٌ

Magnolia denudata, *M. conspicua*, *M. praeca* (S). *Magnolia magnifiqua, M. yulan* (F).

نوع من المغنولية الآزيبينية . مجهرتها تملو من ١٠ إلى ١٥ م . أوراقها عابطة ، لامة الصفحة ، تطول من ٧ إلى ٢٠ سم. وتعرض من ٥ إلى ١٢ سم. أزهارها عطرية ، تسامية البتلات المنصبة ، قطرها يراوح من ١٠ إلى ١٥ سم. لوها إلى البياض الثلجي ونها خضروب وزيدية اللون أو حراء . أزهارها يستمر طوال شهر نيسان .

٢٧٧٣٧ - مَغْنُولِيَّةٌ زَكَبِيَّةٌ الزَّهَرُ

Magnolia liliflora (S). *Magnolia à fleurs de lis* (F).

نوع من المغنولية الآزيبينية . ضروبها وأصنافه عديدة ، جميعها جنبات فواصة تملو من ١٠٠ إلى ٢٠٠ سم. أوراقها عابطة بيضية ، نصلها مقطوع القاطعة ذرب الطرف يطول من ١٠ إلى ١٥ سم. ويعرض من ٦ إلى ١٠ سم. أزهارها زنبقية الشكل ، سداسية البتلات الملونة ، فواصة العرف الطري . أزهارها يستمر من نيسان إلى أيار .

٢٧٧٣٨ - مَغْنُولِيَّةٌ صَغِيرَةٌ الزَّهَرُ

Magnolia parviflora (S). *Magnolia à petites fleurs* (F).

نوع من المغنولية الآزيبينية . مجهرتها تملو من ٣ إلى ٦ أمتار . أوراقها عابطة تطول من ٦ إلى ١٢ سم. وتعرض من ٤ إلى ٨ سم. نصلها مائل البشرة كثير المروق الواضحة . أزهارها بيضاء اللون ، عطرية العرف ، سداسية البتلات ، قطرها يراوح من ٨ إلى ١٠ سم. || أزهارها يستمر طوال شهر حزيران .

٢٧٧٣٩ - مَغْنُولِيَّةٌ صَفْصَافِيَّةٌ الْوَرَقُ

Magnolia salicifolia (S). *Magnolia à feuilles de saule* (F).

نوع من المغنولية الآزيبينية . مجهرتها هريمية الشكل تملو من ٣ إلى ٦ أمتار . أوراقها عابطة ، صفصافية الشكل ، بحرية اللون تطول من ٦ إلى ١٦ سم. وتعرض من ٣ إلى ٩ أزهارها عطرية العرف ، بيضاء اللون ، ثلاثية الفصل ، سداسية البتلات ، قطرها يراوح من ٨ إلى ١٢ سم. أزهارها يستمر طوال شهر نيسان .



مغنولية

٢٧٢٥٦ - مَفَاصِلُكَ ، مُبَايَرَكَةٌ

Dédifférenciation (F). Dedifferentiation (E).

المفاصلة أو المايزة الارتدادية ، بيولوجياً ، رجوع الحبيبات أو الخلايا إلى الحالة المضيئة عند زرع الانسجة.

٢٧٢٥٧ - مُفْتَحُ الثَّامِينِ

هو الزمن الذي يفتتح عنه الثامين بتطعيمه وإتزامه بمبلغ معين . وهو الذي يلبس ولبس على المومنين الآخرين الذين يقومون بعدد الأطلاق القبول .

٢٧٢٥٨ - مُفْتَرَشَةٌ ، قَارَشَةٌ

نمت تعريفي توصف به النباتات التي تلحف التربة بأوراقها والأشياء المتصلة بالصلصات الكبيرة .

٢٧٢٥٩ - مَكْتُورَمَاتُ المَلَكَاتِ

رقية من الاسماك تعرف أيضاً بلبينات الزمانيات .

٢٧٢٦٠ - مُفْتَحٌ

Carbonifère (F). Carboniferous (E).

٢٧٢٦١ - مُفْرَدُ التَّحْدُبِ

Plan convexe (F). Convex plane (E).

٢٧٢٦٢ - مُفْرَدُ التَّكَوُّرِ

Plan concave (F). Concave plane (E).

٢٧٢٦٣ - مُفْرَدُ الدَّوَرِ

Monophasé (F). Monophasic (E).

٢٧٢٦٤ - مُفْرَدَاتُ

Simplex (F). هي النباتات البلية التي يعالج بها بعض الأمراض .

٢٧٢٦٥ - مُفْرَدَاتُ الْأَصَابِعِ

Périostodactyles (F). Peristodactyla (E).

رقية حيوانات تشمل ثلاث فصائل : الحلييات والكركنديات والتابرييات .

٢٧٢٦٦ - مُفْرَعْدَةٌ

Acinaire (F). Acinous (E).

نمت تعريفي يطلق على كل نبات تطلو لحاء ساقه أو أغصانه حوصلات صغيرة تشبه القرمود ، وهي تزيينات طبيعية لا علاقة لها بالي وسم كان .

٢٧٢٦٧ - مُفَرَّقٌ

Potentiomètre (F). Potentiometer (E).

مقياس فروق الجهد الكهربائي .

٢٧٢٦٨ - مُفْرَعَةٌ

Hachoir (F). هي الخفحة ، راجعها .

٢٧٢٦٩ - مِفْصَاصٌ ، مِفْلَاقٌ

Multilobé (F). ما كان كثير الفصوص أو الفللق .

٢٧٢٧٠ - مِفْصَلَةٌ

Ecnassa (F). Shellar (E).

آلة تستعمل لآلتزاع زرد القرزيات من سطلها .

٢٧٢٧١ - مِفْصَصٌ ، مَكْلُوبٌ

Lobé, Lobulé (F). Lobate, Lobed (E).

٢٧٢٧٢ - مِفْصَعَةٌ ، قَصَاصَةٌ

Seringue (F). Syringe (E).

صفحة البليا بحيرة اللون لامة ، صفحة السفل خلية طلاء . انزعارها غادة العرف ، فسقية اللون ، تطرحها نحو ١٠ سم . ثمارها كالتانير الصغير تبلو بحرية الخضر ثم تحمر شيئاً فشيئاً حتى الإدراك || انزعارها يستمر من أيار إلى تموز .

٢٧٢٦٩ - مَقُولِيَّةٌ نَجْمِيَّةٌ

Magnolia stellata (S). Magnolia étoilé (F). نوع من المقولية النجمية . ثمرتها هريبة الشكل تملو ٣ إلى ٥ سم . أوراقها حابطة مائلة زاهية الخضر تطلو من ١٢ إلى ١٤ سم . وتعرض من ٢ إلى ٤ سم . انزعارها مكعبة نجمة الشكل تعد من ١٢ إلى ١٨ بتلة ، قطرها نحو ٨ سم . بتلاتها عطرية العرف ، بيضاء اللون ، قدية الصلصة ، مدببة الطرف ، منسطة الارتكاز || انزعارها يستمر من آذار إلى نيسان .

٢٧٢٦٧ - مَقُولِيَّاتٌ

Magnoliaceae (S). Magnoliaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة الفصائل . اجناسها ٢٢ ، تشمل زهاء ١٥٠ نوعاً جميعها أشجار و شجيرات . أوراقها متعاقبة بسيطة جلدية النصل . انزعارها خشوية أو وسيدة المسكن ، فردية أو متعدودة التجميع . منبهاً البلاد الحارة ، فيها الطبية والصناعية والزراعية .

٢٧٢٦٨ - مَقْشِيٌّ

Villa (F). هي الدارة ، أطبا .

٢٧٢٦٩ - مَقْشِيرِيَا

Magnésie (F). Magnesie (E). هي اكسيد المغنيزيوم ، يترى في تصنيف العناصر الغذائية النباتية من العناصر الأولية .

٢٧٢٥٠ - مَقْشِيرِيُومٌ

Magnesium (F). Magnesium (E).

مدن صلب ، لونه إلى البياض الفضي ، رمزه (Mg-م) وزنه الذري ٢٤٫٣٢ ، ثقله الذري ١٧٥٠ يتصور في ١٥٠ سم . وهو يمتزق في الهواء الطلق ، اختصاه بامر الالهة الحاجة . يستعمل في عدة مركبات صناعية . أما ملحه فسهل شديد القابلية .

٢٧٢٥١ - مَقْشَايٌ

Hygrophile هي تعريفي يوصف به كل نبات لا يعيش إلا في المواقف الرطبة .

٢٧٢٥٢ - مَقْشَاكٌ

Touffu (arbre) (F). Thick (tree) (E).

الشجرة الملتفة الأغصان الكثيرة الورق .

٢٧٢٥٣ - مَقْشَرَةٌ ، حَشِيَّةُ السَّاطِ

Mollugo (S). Mollugina (F). Mollugo, Carpet-weed (E). Weichkraut (D). Mollugo (I).

جنس اشباب برية حرلية من المثيريات . أنوعه نحو ٤٣٠ أصلاتها البلاد المعتدلة الحارة . جميعها مرصوة تستحبها الماشية .

٢٧٢٥٤ - مَقْشِيرِيَّاتٌ

Molluginas (S). Molluginées (E).

فصيلة نباتية قريبة الشبه من الرجلية . اجناسها وأنوعها قليلة العدد ، جميعها برية مرصوة .

٢٧٢٥٥ - مَقْشِيٌّ

Mare (F). Pool, Pond (E).



مليرة

Epouilleuse (F).

Cleansing apparatus (E).

صندوق صغير يضع فيه الطائر باستناده رأسه لمعالجته
لسد الحشرات الطفيلية والقضاء عليها .

Funiculé (F), Funiculat (E). ٢٧٧٩٠ - مُفْتَقِل ٥

نمت تعريفية يطلق في علم النبات على كل عضو مجهز
بفتل .

Argument a fortiori - مَقْهُومُ الْاَوْتُولِيَّةِ ٢٧٧٩١

حجة يراد بها تطبيق نص قانوني على حالة لم ينص عليها
لان هناك اسباباً تجعل تطبيقه على هذه الحالة اولى من
تطبيقه على المنصوص عليها .

٢٧٧٩٢ - مَقْهُومُ الْمُخَالَفَةِ

Argument a contrario (F).

حجة ثنائية للتدليل على المخالفة بين الامر الواقع والنص
القانوني .

Argument « pari » (F). ٢٧٧٩٣ - مَقْهُومُ الْمُوَافَقَةِ

حجة يراد بها تطبيق نص قانوني على حالة لم ينص عليها
لان اسبابها تدل على اسباب الحالة المنصوص عليها .

٢٧٧٩٤ - مَقْهُومُ الْيَتَوَكُّعِ

Fondé de pouvoir (F). Legal representative (E).

المفوض له بالتوكيع هو الذي يوكله غيره بالقيام بمقامه
في بعض ما له من سلطة .

Eléphantiasis (F). ٢٧٧٩٥ - مَقْهُومُ، ذِكَا الْفِيلِ

Elephantiasis (E).

التهاب مزمن يصدر جلد قوائم الخيل والبقر .

Ostiole (F). Ostiol (E). ٢٧٧٩٦ - مَقْ ٥

هو الثقب النقيق المستطيل الذي ينطلق عن البوغ عند
الادراك .

٢٧٧٩٧ - مَقَارُ الْقُطْب ، مَقَارُ رَاهِب ٥

Fratercula arctica (S).

Macareux arctique, M. moine, M. commun (F).

Sea-parrot, Coulter-neb, Puffin (E).

نوع من المقار ، طائر مائي من فصيلة البطريقيات .
أصله المناطق القطبية الاسيوية والاروبية والامريكية .
ينزع في زمن الشتاء الماصف الى البلاد الشمالية التي لا
يفترها الجليد || ملجئه الخياطين جامي . اسرابه وافرة
العدد . قوته الاسماك والقشريات وبعض النباتات ||
جسمه ريمية ، كثر ، يطول نحو ٣٥ سم . يتبين بمقاده
البريمي الشكل ، المتساوي الطول والارتفاع . ثوبه العلوي
الى السواد الاسم اللامع . ثوبه السفلي وعصره الى اليباض
الناصع . عنقه مطوق بقلادة عريضة الجعدة من لون الرأس
والرداء . مقاده اكهب اللون ، ازرق القاعدة ، اجر
الطرف . صدقة عينه عاجية . انبجانه وكحلة عينه الى
الجلوة . رساء الى الحمرة البرتقالية المولج || الاثنى امير

قدماً من الذكر وتحتل بنفس الثوب . وكنته يرضي
بحفرها وترتيبها في اهل مرتفعات الجبال المدة الحصن .
الحصنة تتألف من بيضتين فقط . الترخيم الذي يستمر
من ٥ الى ٦ اسابيع وتقوم به الاثنى بمنابذة الذكر ،
ينجز في الليل فقط .

Articulé (F), Articulata (E). ٢٧٧٩٣ - مُفَصَّلِي

نمت تعريفية يطلق على كل عضو مركب من فصل ،
كزبان الحشرة فهو مفصلي التركيب .

Arthropodes (F).

Arthropoda (E).

صنف من الحيوانات يشمل شبة الحشرات وكثيرات الارجل
والمنكبيات والقشريات .

Desmodie (F).

نبات تزييني من القرنيات مشهور باسم ارقيس .

Desmodie du Bengale ٢٧٧٩٦ - مُفَصَّلِي الْبَنْغَالِ

نبات تزييني مشهور باسم ارقيس هندي ، اطلية .

Champignonnière (F).

Mushroom bed (E). ٢٧٧٩٧ - مَقْلَرَة

المكان المد لزراعة الفطور .

Muselière (F).

هي الكأمة ، اطلية .

Octographe (F).

٢٧٧٩٩ - مِفْعَال ٥
المفعال جهاز يستعمل في تسجيل حركات كل كائن
حي لمرة مدى نشاطه .

Aphromètre (F).

Aphrometre (E).

٢٧٨٠ - مِفْعَاح ٥
جهاز يقاس به غلط الغاز الكربوني في قناني الخمر
القوار .

Rentable (F). Profit-earning (E). ٢٧٨١ - مِفْعَال

رابع مربح .

Van (F). Fan, Van (E).

٢٧٨٢ - مِفْعَلَة
اداة خاصة تستعمل في ذر اليبادر لفصل البر عن القذ .
ج مفائل .

Voltmètre (F). Voltmeter (E). ٢٧٨٣ - مِفْلَاط

مقياس التحليل الكهربائي .

Failli (F).

Bank-rupt, Insolvent (E).

٢٧٨٤ - مَفْلِس
هو كل صاحب مستقل او متجر حكمت المحكمة بشهر
افلاسه .

Plouronectidae (S).

Plouronectidés (F). Plouronectidae (E).

٢٧٨٥ - مَفْلَطَحَات

هي جانبيات الموم ، اطلية .

Décussé (F). Decussate (E). ٢٧٨٦ - مَفْلُوقِي

صفة النسب النباتي المتساوي الانغلاق الطولي .

Fissiflore (F).

Fissifloral (E).

٢٧٨٧ - مَفْلُوقِي التَفْوِجِ

نمت تعريفية يطلق على كل نبات متفلق التفرجات الزهرية .

Mouflon d'Europe (F).

٢٧٨٨ - مَفْلُون

نوع من الاروية يسمى اروية كورسيكة ، اطلية .



مَقَارُ الْقُطْب

27308 - **مُتَكَوِّل رَادِف** (F). Sous-entrepreneur (F).
Sub-contractor (E).
هو الذي يعمل على المقاول في جزء من العمل .

27309 - **مُقَاوِمَة** (F). Résistivité (F). Resistivity (E).
وَقِي كانت المقاومة .

27310 - **مُقَابِيسَة ، مَبَيِّن تَفْصِيلِي** (F). Dævis (F).
Estimate (E).
بيان مفصل بالاعمال المقصودة مقروناً بمسح كلفها .

27311 - **مُقَابِيسَة ، قِيَابِس** (F). Echange, Troc (F).
Exchange, Barter, Truck (E).
مقد يلحق احد طرفيه الى الآخر شيئاً او يتنازل له عن حق مقابل من احدى او حتى آخر . وفي كانت المقايضة بيع اعيان او حقوق باعيان او حقوق فهي القياس .

27312 - **مُقَابِلَة** (F). Rétrocession (F).
Retrocession (E).
التنازل الى الغير عن صفقة بما لها وما عليها .

27313 - **مُقَابِيس** (F). Mesures (F). Mesures (E).
27314 - **مُقَبَض ، مِقْوَم** (F). Mancheron (F).
Selle (E).

من اجزاء المحراث ، الخشب التي يقبض عليها الفلاح لضبط التلم .

27315 - **مُقَبِط** (F). Mélangeur (F). Mboer (E).
آلة تستعمل لتخلط الاشياء كالاسمدة وغيرها .

27316 - **مُقَبْرَوات** (F). Recettes (F).
Receipts, Returns (E).

27317 - **مُقَبْرَوة** (F).
المقبوضة نجم لير من كوكبة برج التوأمن مركزه على الزكية اليسرى من التوأمن المؤخر .

27318 - **مُقَبِي** (F).
هو القضاء عليه .

27319 - **مُقَبِير ٥** (F). Mactra (S).
Mactra (F). Mactra (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحات الخياشيم وقصبة المقطريبات . انبعاث المعاصرة المعروفة نحو ١٥٠ متنترة في معظم بحار العالم ٥ اصداقها شبه حرية الشرنج مالة السطوح . مثاقها متصلة الطول مزدوجة ٥ تعيش في الرمال المغمورة بالماء قرب المصبات والاعوار ٥ لحومها مأكولة ، جيدة الصنف .

27320 - **مُقَبِيرَات ٥** (F). Mactridae (S).
Mactridae (F). Mactridae (E).

نصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفيحات الخياشيم اجناسها وانواعها المعروفة كثيرة المدد جميعها متصلة اللحم ، متشابهة الاشكال ، ثنائية المصارع ، مستغلطة الرباطات القذاعية ٥ اصنافها معظم بحار العالم اغصها بحار المناطق المعتدلة الحارة ٥ أشهر اجناسها المقير والصبراع والسلمة والكومنجة .

27321 - **مُقَبَلَة** (F). Culture de concombre fleuveux (F).
زراعة الشتاء وموضع هذه الزراعة كالبيطخة اللطخ .

27298 - **مُقَارِب ، مُتَكَرِب** (F). Commanditaire (F). Sleeping partner (E).

هو الشريك في احدى شركات المقراض او المضاربة فلا يفرض من ديون الشركة الا قدر ما يوزي حصته فاذا كانت شركة المقراض بالسهم اطلق على المقارض اسم المساهم .

27299 - **مُقَاَسَمَة الْمُتَنَازِع فِيهِ** (F). Pacte de quota litis (F).

شرط يتمتد بين المتقاضين والمهاضي على ان اتأب القضية تكون جزءاً من كسبها وهو محظور في اللوائح المهنية .

27300 - **مُقَاَسَمَة** (F). Compensation (F).
Compensation (E).

وهي احدى وسائل البقاء ، تعريفها الشامل ان يتوافق الالتزامان متبادلان بين شخصين ويكون محل الالتزامين مبلغاً من النقد او اشياء مثلة من نوع واحد . ويكونان مستحقين اللقم خالين من النزاع واجبي البقاء في مكان واحد . واذا ارد احد الالتزامين على الآخر كانت المقاصة في المبلغ الاذلى فقط ٥ والمقاصة قد تكون :

مقاصة تامة
Compensation totale (F).
Total compensation (E).

مقاصة تعاقدية - بالتراضي
Compensation conventionnelle (F). Conventional compensation (E).

مقاصة جزئية
Compensation partielle (F).
Partial compensation (E).

مقاصة قانونية
Compensation légale (F).
Legal compensation (E).

مقاصة قضائية
Compensation judiciaire (F).
Judicial compensation (E).

27301 - **مُقَاَسَمَة** (F). Poursuite (F).
Sulte, Proceedings (E).

وهي القيام بالمساعي والتدابير القانونية للحصول على قرار قضائي أو حكم . وهي في القانون الجنائي الإجماعات والتحقيقات التي تجري للكشف عن الجاني أو المجرم . ٥

27302 - **مُقَاَسَمَة الضَامِن** (F). Appel en garantie (F).
إدخال الضامن في الدعوى وهو إجراء خاص يراد به ادخال من يمكن عليه ضمان في دعوى لم يكن داخلها فيها حتى يعمل من الضمون له ما يمكن ان يحكم به عليه . ٥

27303 - **مُقَطَّاع** (F). Colporteur (F).
Hawker, Pedlar (E).
هو البائع الجوال .

27304 - **مُقَطَّاع** (F). Tâcheron (F).
One working by the job (E).
هو العامل المتقيل .

27305 - **مُقَنَّم** (F). Dénominateur (F).
Denominator (E).

27306 - **مُقَنَّم** (F). Jockey (F).
هو الجوكي الذي يركب جواد الرهان .

27307 - **مُقَنَّم ، مُقَنَّم ، مُتَعَمِّد** (F). Entrepreneur (F). Contractor (E).

هو الذي يرتبط بتقيد المقولة ويأخذ على عاتقه القيام بعمل معين يساعده فيه عمال مأجورون .



مقير

٢٧٣٣٧ - مَقْرَأَس * مَقْصَس السُّنْطَانِي، مِقْصَس
التَّكْلِيم، مِقْصَس الشَّجَر (F).
Sécateur (F).
Pruning-scissors (E).
مقص تقلم به أغصان الشجر .

٢٧٣٣٨ - مَقْرَدُون *
Macrodon (S).
Macrodon (F). Macrodon (E).

جنس اسماك نهري من مفتوحات الفم وفصيلة القرشانيات
انواعها المعروفة أربعة أعطانها أنهر ومجريات المناطق
الاستوائية الامريكية || أجسامها مستطيلة الشكل ،
متعددة الطول الذي يراوح من ٢٥ الى ٣٥ سم ، رؤوسها
متوسطة الحجم . أشداقها ريشة . أسنانها كبيرة ، ذرية ،
قوية الصف في الفكين . زعانفها الظهرية محدلة الحجم
يطلب فيها الشكل المربع . زعانفها الخوضية غليظة
الارتكاز ، صغيرة القد ، تقابل الظهرية . زعانفها
الذيلية مستقيمة الأطراف عند جميع الأنواع . أطوارها تفرس
من الرتبة الى الكهبة . رؤوسها وتظهرها أصبق عسائبا
من بطونها || لحونها متوسطة الصفت ، مأكولة || أعرف
أنواعها وأشهرها مقردون ترانيرا (Macrodon trahira)
الذي يكثر وجوده في أنهر البرازيل والفويانا .

٢٧٣٣٩ - مَقْرَط
Pinceuse-rogneuse (F).
أداة تستعمل لتقليم شجوع الكروية .

٢٧٣٤٠ - مَقْرَعَة
Courgerie (F).
منبت القرع ويوضع زراعته .

٢٧٣٤١ - مَقْرَعَات
Ascoceratidae (S).
Ascoceratidae (F). Ascoceratidae (E).
مجموعة من الرخويات تنتمي الى رتبة رباعيات الخياشيم
فصلها وأجناسها وأنواعها كثيرة العدد جميعها من
متصمرات الارزعة الناعمة .

٢٧٣٤٢ - مَقْرِنَس *
Macrorrhinus (S).
Macrorrhine (F). Macrorrhinus (E).
جنس حيوانات لينة ، مائية ، من فصيلة الفقاعيات .
أنواعها المعروفة قليلة العدد ، أعطانها بعض مناطق المحيط
المحادي || أجسامها كبيرة القد . ذكورها أكبر من إناثها
وأضخم . رأس الذكر عديم القد ، غليظ الشكل ،
يلتهب ينتم احسن هذه العلوي يشرف على السفلي . عتفه
وتوأمنه صغيرة || قوتها الاسماك والرخويات والقشريات . عتفه
الانثى تضع جروا واحدا في العام || تصاد من أجل جلدها
وزيوتها وعظامها || أعرف أنواعها الضرماني والضيقي
الخطم .

٢٧٣٤٣ - مَقْرِنَس صِبْرَهَامِي *
Macrorrhinus leoninus (S).
Macrorrhine leonin (F).

نوع من المقرنيس . أعطانها مناطق جنوب المحيط المحادي .
طوله نحو ٩ أمتار . فوهه كستني اللون يمتد من الظهر
ويصفر عند البطن .

٢٧٣٤٤ - مَقْرِنَس صَبْقِ الخُطْم *
Macrorrhinus angustirostris (S).
Macrorrhine à rostre droit (F).

نوع من المقرنيس . أعطانها مجامع المكسيك وكاليفورنية .
طوله نحو سبعة أمتار . فوهه الى الجوف السفلى السواء المواجه
تتبع عند الظهر وتضيق وتبرز عند البطن .

٢٧٣٣٧ - مِقْصَحَة * مِقْصَحَة
Ratissoire (F).
Scraper (E).

نصل حريش قاطع مركب حل حفا لتقلم به الإكثار
والأصايب .

٢٧٣٣٨ - مِقْدَفَ خَارُجِي *
Exopodite (F).
المقذف الخارجي ، جزء مفصل من الفك
مركز في الجبال الخارجي من الحرقرة حيث يشرف على
الركبة || والمقذف الخارجي ، زوولوجيا ، جزء من
زوائد المفصليات يملأ ، مع المقذف الداخلي ، القسم
القاعدي .

٢٧٣٣٩ - مِقْدَفَ دَاخِلِي *
Endopodite (F).
المقذف الداخلي ، زوولوجيا ، جزء من زوائد المفصليات
يملأ القسم القاعدي .

٢٧٣٤٥ - مَقْدَمُ الْأَرْث *
Avancement d'hoirie (F).
هو التبرع لاحد الورقة الإبتدائية بجزء من نصيبه في
تركة التبرع .

٢٧٣٤٦ - مَقْدَمُ الْجِسْم ، مَقْدَمُ الْبَحْم *
Avant-main (F). Fore hand (E).
في التليل والاعلام وما أشبه .

٢٧٣٤٧ - مَقْدَمُ الْجَوْشَن *
Prothorax
هو في الحشرات القسم الاول من الجشون او الحلقة
الصدرية الاول .

٢٧٣٤٨ - مَقْدَمُ الْمِحْرَات ، مَقْدَمُ الْمِحْرَات *
Avant-train (F). Wheels (E).
أجزاء الامامي من المحرات حيث يوجد التناظم والصلابة .

٢٧٣٤٩ - مَقْدَمَات *
Primates
هي الرئيسات ورتبة من الثدييات تشمل مراتب البشرات
والقرديات والليموريات .

٢٧٣٥٠ - مَقْدَوْرُ الْقِسْمَةِ ، قَابِلُ الْقِسْمَةِ ،
مُقْتَسِم *
Divisible
هو ما كانت قسمته جائزة .

٢٧٣٥١ - مَقْدَوْلَس *
Parsil (F).
نبات بقلي مشهور باسم بقدونس ، أحليبه .

٢٧٣٥٢ - مَقِير *
Amer (F). Bicar, Marsh (E).
مقر الشئ : صار مرأ فهو مقر .

٢٧٣٥٣ - مَقِير ، مَقْعَدَان *
Aloes (F).
هو الألوة ، نبات صنائي وتزييني .

٢٧٣٥٤ - مَقِير *
Acule (F). Aculous, Stemless (E).
النبات العديم الساق ويدهى أيضا نجمة .

٢٧٣٥٥ - مَقِيرَاس ، مَقْرَادَة *
Réfrigérateur (F).
Refrigerator (E).

٢٧٣٥٦ - مَقِيرَاس *
Greffoir (F).
Grafting-knife (E).
سكين خاصة منقطة الأطراف تستعمل في التقليم .



مِقْصَح



مَقْرَأَس



مَقْرِنَس



مَقْرِنَس



مَقْرِنَس صِبْرَهَامِي



مقصب



مقاع



مقبي



مقل

Cotonnerie (F). **مَقَطَنَة** - ٢٧٣٦٣Cotton-plant (E).
الأرض التي تزرع فيها القطن . ج مقطن .Chapon (F). Capon (E). **مَقَطُوش** - ٢٧٣٦٤

هو الطير الذي فرخ الدجاج الخفي . ج مقاطيش .

Tronqué (F). Truncate (E). **مَقْطُوم** - ٢٧٣٦٥Epiclytus (S). Epiclyrta (F). * **مَقْطِي** - ٢٧٣٦٦جنس اسماك نهريّة من مقنحات المائدة فصيلة السلمونيات .
انواعه المعروفة قليلة البعد . اطلابها بعض انهر البلاد
الحارة الاسيوية والامريكية || اجسامها اطيبيية بسيطة
تطول من ٣٠ الى ٢٥ سم . رؤوسها مستطيلة ، قصيرة .
هيوتها كبيرة جاحظة . اشدانها رسيّة . ظهورها زليمة ،
مقمنها يشرف على الراس . كشميت يرتانها للترجمة
المستطيلة وبالنظرية الثنائية البعد المتطارة الجسم . اوتابها
الى الريكة يملوها موج نفسي || غوبها مأكولة .Alois (F). **مَقْطَدَان** - ٢٧٣٦٧

هو الآلة والمقر .

Gibbeux (F). Gibbous (E). **مَقْطَر** - ٢٧٣٦٨نمت تعريفي توصف به الاشياء المقرة السطح ونها
الاوراق والازهار .Concavilligne (F). **مَقْطَر الاطراف** - ٢٧٣٦٩

Concaviline (E).

نمت تعريفي وسني يستعمل في تصنيف النواحين اشصها
الخليل والاقطار . ويكون مقعر الاطراف ذا جبهة مقرة
وحجاج بارز وكفل منحن الخ...* **مَقْل** - ٢٧٣٧٠**Balsamodendron africanum**, **Moudeolotia africanum**
(S). **Balsamée d'Afrique**, **Arbre à baume** (F). **Bal-**
samodendron krs, **Bdellium tree** (E). **Afrikanischer**
Balsambaum (D). **Albero balsamo d'Africa**,
Bdelio (I).نوع من البلسان وفصيلة البفوريات ، منته البلاد الافريقية .
يكثر في تمام حوض البحر الاحمر . ثمرته متوسطة القد
فرواه . اوراقه مركبة ثلاثية الورقيات البنيية الشكل
المغطية الاطراف . ازهاره فردية محورية رباعية التركيب .
ثمارة جراه رباعية القلق . يستخرج من ساقه عصارة
ورائيتية بخورية فائرة الصنبر ويستعمل من زهره حطر
حزري .Marrube blanc (F). **مَقْل الصَيْف** - ٢٧٣٧١

هو الفراسيون الابيض ، اطلبه .

Bdellium indicum (S). **مَقْل الْبَهْد** - ٢٧٣٧٢**Balsamée de l'Inde** (F). **Indian bdellium tree**, **False**
myrrh gale (E). **Indisches Bdelliumbaum** (D).
Bdelio (I).نوع من البلسان وفصيلة البفوريات . يكثر في بعض
الاصقاع الهندية . ثمرته صغيرة القد . اوراقه مركبة
ثلاثية او خاسية الورقيات . ازهاره رباعية التركيب
قواعة العرف || يستخرج من ساقه عصارة رائيتية بخورية
تستعمل في الماياد ويستعمل من اذهاره دهن عطري
مروبو فيه .Malaxage (F). **مَقْس** - ٢٧٣٦٥Kneading, Working (E).
مقس الزبدة بعد فصلها من الخيض وضلها لتجانس
اجزائها بعد طرد الهواء منها .Sébastien (F). **مَقْسَاس** - ٢٧٣٦٦

هو الدبق ، ثخيرة حرجية صناعية .

Crémomètre (F). **مَقْسَاد** - ٢٧٣٦٧Crémometer (E).
مقياس اللبنة .Eboueuse (F). **مَقْشَر** - ٢٧٣٦٨

آلة تنزع القشور للشالكة التي تغلف ثمار الكستنا .

Décortiqueur (F). **مَقْشَرَة** - ٢٧٣٦٩Disbarcad (E).
أداة من حديد تستعمل في تنظيف سوق بعض الاشجار
من القشور اليابسة .Sécateur (F). **مَقْص الْبُسْطَانِي** - ٢٧٣٧٠Pruning-shears (E).
مقص البستاني . ويقص التقليم ومقص الشجر والمقراض
واحد .٢٧٣٥١ - **مَقْص الْخَضِير** هو المير ، اطلبه .Cannale, Roselière (F). **مَقْصَبَة** - ٢٧٣٥٢Cane-plantation, Reed-bed (E).
كل مكان زرع فيه المقصب بكثرة او نبت طيباً .Faux (F). Scythe (E). * **مَقْصَب** - ٢٧٣٥٣أداة كالنجل كبيرة الشفرة المستطيلة تستعمل في الحصد
والخش .Luxurière (F). **مَقْصَبَة** - ٢٧٣٥٤Lucerne-field (E).
المكان المخصص لزراعة المقصب أي النصة .٢٧٣٥٥ - **مَقْط** غيط يصاد به الطير .Colportage (F). Hawking (E). **مَقْط** - ٢٧٣٥٦

هو بيع التجوال .

Multipolaire (F). **مَقْطَاب** - ٢٧٣٥٧Multipolar (E).
كثير الاقطاب .٢٧٣٥٨ - **مَقْطَاع** ° ، **ميكروم** °Distillerie (F). **مَقْطَرَة** - ٢٧٣٥٩Distillery, Still-house (E).
صناعة التقطير وبصل انتاجه .Section **مَقْطَع** - ٢٧٣٦٠Soc (F). Ploughshare (E). **مَقْطَع** - ٢٧٣٦١جزء رئيسي من المحراث مكانه وراء السكين وظيفته قطع
كتلة التراب انقياً .Griffe (F). Root (E). **مَقْطَم** - ٢٧٣٦٢القطعج مقاط : هي الفروع الناشئة من اودية الحليين
واشباعه من النبات .

27373 - مِقْلَاب ٥ ، ذَاكِرَةُ الْإِنْقِلَاب

Lippe (F).

Thick lower lip (E).

هي الحمة أي شفة الحيوانات المَهْرَة كالإبقار والأغنام وللأعز .

Tropique (F). Tropic (E).

المقلاب أو دائرة الانقلاب الحزام القائم بين دائرتي الانقلاب الصيفي والشتوي أي دائرة السرطان ودائرة الجدي .

27374 - مِقْلَابِي ٥

Patte (F). Paw (E).

كف الأسد ، مخلب الأسد في مقبنة . ج قنوب .

Tropical (F). Tropical (E).

نعت تعريفي يطلق على كل ما له صلة بالمقلاب كقولك المناخ المقلابي والأمطار المقلابية والمنطقة المقلابية وهي أحر مناطق الكون .

27375 - مِقْلَابِي ٥

Chênevière (F). Hemp-field (E).

مزدراع القنب منها اتسع .

Atmomètre (F).

Atmometer (E).

جهاز خاص تقاس بوسلته مقادير سوائل تبخرت في مدة معينة .

27376 - مِقْلَب ٥

Mimule (F).

هي الفندل ، أظله .

27377 - مِقْلَبِي ٥ ، مَقْلَبِي ٥

Versoir (F). Mould-board (E).

جزء المحراث الذي يقلب كتلة التراب بعد أن يقطعها المقطع .

27378 - مِقْلَبِي ٥

Calyptraes (S).

Calyptrée (F). Calyptraes (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مميزات الأرجل وسيدات الأجهزة وفصيلة القروصيات . أنواعها المعروفة عديدة بعضها من متحشرات الطبقة الطباشيرية والثالثة والبنفس الآخر معاصر منتشر في جميع بحار العالم . جميع أنواعها تحضن الشلق على الصغور ملحوظاً بأرجلها || أصدانها يرمية الشكل . رؤوسها قصيرة مفلوكة المقدم . أقوامها مستديرة . لوامسها مسطيلة . عيونها صغيرة قاعدية . خياشيمها حلبيية الشكل ، قاسية .

27379 - مِقْلَبِي ٥ ، مَقْلَبِي ٥

Tropicalisation (F).

المقلية جعل المواد والأوازم الصناعية وغيرها لا تتأثر بالمناخ المقلابي .

27380 - مِقْلَوَانِي ٥

Miconia (S). Miconie (F).

Indian bush (E). Mikonie (D). Miconia (I).

جنس اشجار وشجيرات برية وزراعية من فصيلة القرايات . أنواعها زهاء ٥٥٥ جميعها من نباتات المناطق الاستوائية . أوزانها لا قياسه الشكل والترتيب . أزهارها أبطية وطرفية الانتكاز . مجارها حلبيية مستديرة قاسية القشور . منها أنواع حمية . أوزانها عطرة تستعمل استعمال الشاي ومنها بطيئة يستعملون مجارها في معالجة على المرارة . ومنها صناعية صبغية غشائها أصفر اللون جيد الصنف .

27381 - مِقْلَبِي ٥ ، مَقْلَبِي ٥

Melocactus (S). Mélocacte, Mélocactus, Melon-cardon (F).

Melon-thistle, Turk's-cap cactus (E). Melon-enkaktus (D). Papone spinoso (I).

جنس نباتات لحمية شائكة من فصيلة الصباريات . أنواعه نحو ٣٠ بعضها ترابي . أصلها البلاد الحارة . سوقها بطيئة الشكل ، محززة ، شائكة ، عادية اللون . أزهارها أبيضوية الانتكاز ، كبيرة القد ، جميلة القالب والألوان . أزهارها ، مجارها ، حنينة حمره اللون ، لمساء البشرة .

27382 - مِقْلَوَانِي ٥

Licol, Licou (F). Halter (E).

أداة من جلد أو حبل تستعمل لقيادة الدواب .

27383 - مِقْلَوَانِي ٥

Fauchard (F). Slash-hook (E).

المنجل يقطع به ألقت والشطب .

27384 - مِقْلَوَانِي ٥

Starter

حبل تصف عليه الخيل عند السباق . ج مقارص .

27385 - مِقْلَوَانِي ٥

Carrière (F). Quarry (E).

ويسمى المنجر والمقطع ، هو المكان الذي تستخرج منه الحجارة .

27386 - مِقْلَوَانِي ٥

Bouleté, lûché (F).

Upright on fetlock-joint (E).

تقويس في حشوب الفرس يعتبر من عيوب الخيل القاسية .

27387 - مِقْلَوَانِي ٥

Déplantoir (F).

Garden-trowel (E).

أداة تستعمل لقلع النباتات الصغيرة مع ثني من التراب يحفظ شروشها ردياً تقوس في مكان آخر .

27388 - مِقْلَوَانِي ٥

Arqué, Brassicourt (F).

Bandy-legged, Knee-sprung, Arched (E).

نعت يوصف به الفرس المقويس الركبة طبيعياً لا من مرض ولا عن هرم .

27389 - مِقْلَوَانِي ٥

Unturfier (E).

محراث مفلطح المقطع الريفي القصير ، له سكتيان ، يستعمل في التلاع الخضير .

27390 - مِقْلَوَانِي ٥

Conserves (F).

27391 - مِقْلَوَانِي ٥

Conserves, Preserves (E).

هي الاطعمة المحفوظة المقطوع منها الهواء . ويهتم من سائما معلبات . ويعدونها - في مصر ، الكنكسرة والكنكسرات .

27392 - مِقْلَوَانِي ٥

Machon (F).


فرافشة من المذانيبات ، يرتقا تعيش على أوراق الجزر والشيار . راجع مذنانب مقون .

27393 - مِقْلَوَانِي ٥

تقريب الثور والتيس والجلد . والمقلية : وهاء التقريب .



مقلة القاصي



مقنة

٢٧٤١٠ - مِقْيَافُ الْغُلُوكُوزِ ، هِيْرَانُ الْغُلُوكُوزِ

Pèse-moût, Glucomètre, Glucomètre (F). Glucometer (E).

أداة تقاس بها المواد السكرية في حصى العنب أو في الخمر .

٢٧٤١١ - مِقْيَافُ الْعَبْيَانِ

Ebulliomètre, Ebullioscope (F). Ebullimeter (E).

جهاز يمكن من معرفة درجة الحرارة اللازمة لعليان كل جسم أو مائع .

٢٧٤١٢ - مِقْيَافُ الْقَشْدَاةِ ، هِيْرَانُ الْقَشْدَاةِ

Butyroscope, Crémomètre (F). Creamometer (E).

هو المكتأة ، أداة تقاس بها نسبة القشدة في الحليب .

٢٧٤١٣ - مِقْيَافُ الْقُوَّةِ

Dynamomètre (F). Dynamometer (E).

هو المنشاط ، أطلبه .

٢٧٤١٤ - مِقْيَافُ الْكُحُولِ

Pèse-aspiris (F).

هو المكحال ، أطلبه .

٢٧٤١٥ - مِقْيَافُ الْكِلْسِ

Calcimètre (F). Calcimeter (E).

هو المكلاس ، جهاز يبين مقدار كربونات الكلس في التراب .

٢٧٤١٦ - مِقْيَافُ الْلِسَانِ

Glossomètre, Glottomètre (F). Glossometer (E).

هو اللسان ، جهاز يقاس به خطوط التمثل لسمرة الاتواع الأصغر من غيرها في ارتشاش رقيق الزهر .

٢٧٤١٧ - مِقْيَافُ الْقَوْنِ

Colorimètre (F). Colorimeter (E).

هو الملوان ، جهاز يقاس به مقدار تلوّن السوائل والمائات لا سياً أخضر ، أطلبه ملوان .

٢٧٤١٨ - مِقْيَافُ مَيَوِيٍّ

Centésimal (F). Centesimal (E).

٢٧٤١٩ - مَقْيَرٌ ، مَقْيَرٌ

Makaira (S). Makaira (F).

جنس اسمك بحمرية كبيرة القد من شاكات الزصائف فضيلة الاستقريات . أنواعه المروفة ثلاثة جميعها قريبة الشبه من سياف البحر ، أشهرها المقيّر الاسد الذي لا يقل طوله عن أربعة أمتار وهو يتميز بظهر زعنفته الظهرية التي تشبه الشراخ ويمجازه المظلي الذي يند من فكه الإحل على شكل السيف .

٢٧٤٢٠ - مِقْيَافُ

Ehretia (S). Ehretia.

Cabrillet (F). Ehretia (E). Ehretia (D). Ehretia (I).

جنس الشجار ومجبريات من فضيلة الحمصيات . أنواعه نحو ٦٠ جميعها من نباتات المناطق الحارة والاستوائية . أوراثها متفقا ، متقابلة أو متناوبة . أزهارها عسكولية التجميع ، أبطية الارتكاز وطولية . ثمارها مأكولة لكنها تفتحة وهي نوية ، طعية ، قدرها قدر الحمصة الكبيرة || أشهر أنواعه ما يلي .

٢٧٤٢١ - مِقْيَافُ كَبِيرِ الْوَرَقِ

Ehretia macrophylla (S). Ehretia à grandes feuilles, Cabrillet à grandes feuilles (F).

نوع من المقيّف ، ثمرته سريوتية تطو من ٥ إلى ٨ أمتار .

Mucuna (S).

Mucuna, Pois à gratier, Pois poulleux (F). Cowitch, Cowage (E). Jackfasel, Stechende Echte Fasel (D). Fagiolo di Rio Negro (I).

جنس نباتات حارثة من فصيلة الأريثيات القراشية . أنواعها نحو ٢٥ ، أصنافها البلاد الاستوائية والحارة . سوقها لوربية التبريش ، سوافلها ثنائية . أوراثها مركبة ، طويلة الزناد ثلاثية الوريقات . أزهارها كبيرة القد حراء اللون ، سفناتها مفلطحة عسنة مستطيلة الهدبة الطرفية الشاككة . بزورها مستديرة ، مبطلة ، هلبة البشرة ، تفعل عند لمسها ما يفعله القراص .

Echelle, Mesure (F).

Ladder, Scale (E).

٢٧٣٩٩ - مِقْيَافُ اخْتِمَارِ اللَّبَنِ ، مِصْرَابٌ

Lacto-fermentateur (F).

أداة تعرف بواسطها جودة اللبن . أساسها أن الحليب الرديّ يربوب قبل الحليب الجليد في حرارة معلومة .

٢٧٤٠٠ - مِقْيَافُ الْأَدْهَانِ

Oléomètre (F). Oleometer (E).

أداة تقاس بها كثافة الادهان وتسمى مدحان .

٢٧٤٠١ - مِقْيَافُ الْأَسْتِيْرَاءِ

Niveau (F). Level (E).

هو الفادان ، أطلبه .

٢٧٤٠٢ - مِقْيَافُ الْأَشْعَةِ

Actinomètre (F).

Actinometer (E).

آلة تقاس بها قوة الاشعة لا سياً الاشعة الشمسية .

٢٧٤٠٣ - مِقْيَافُ الْأَمْلَاحِ

Pèse-sels (F). Araeometer for salt liquids (E).

مستكشف يبين بسمرة درجة كثافة الأملاح .

٢٧٤٠٤ - مِقْيَافُ الْجِصِّ

Gypsomètre (F).

Gypsumeter (E).

هو المقيصاص ، أداة تستعمل لقياس كبريتات البوتاس في الخمر .

٢٧٤٠٥ - مِقْيَافُ الْحَبِّبِ

Aphromètre (F).

Aphrometer (E).

هو الملقفاح ، جهاز يقاس به ضغط الغاز الكربوني في قناني الخمر القذرة .

٢٧٤٠٦ - مِقْيَافُ الرُّطُوبَةِ

Hygromètre (F).

Hygrometer (E).

هو المرطاب ، أطلبه .

٢٧٤٠٧ - مِقْيَافُ السُّطُوحِ

Planimètre (F).

Planimeter (E).

هو المسطح ، أطلبه .

٢٧٤٠٨ - مِقْيَافُ السُّكَّرِ

Saccharimètre (F).

Saccharimeter (E).

هو المسكار وللمسار ، أداة تبن مقدار السكر المذاب في السائل المقصود .

٢٧٤٠٩ - مِقْيَافُ الشَّجَرِ

Dendromètre (F).

Dendrometer (E).

هو الشجار ، أداة تستعمل لتقدير طول الشجرة وسميها .



مقوّنة



مقيّر

Imperméable (F).

Imperméable, Impervious (E).

٢٧٤٣١ - مِكْتَمَم

صفة التربة التي تسلك الماء .

Acquis (F).

Acquired, Secured (E).

٢٧٤٣٢ - مِكْتَسَب

نمت تعريفي تمت به الصفة المكتسبة من الحيوان او
النبات حصة كانت ام سيفة . وكلمة مكتسب هي تعريفي
عقلي اي فريقي .

Acquies (F).

An acquisition (E).

٢٧٤٣٣ - مِكْتَسَبَات

هي الاموال التي يكتسبها الزوجان في انهاء الزواج .

٢٧٤٣٤ - مِكْتَكَل ، سَلْ

Vendangeoir, Vandangeret (F). Grape-basket (E).
وعاء ينقل فيه العنب من الكرم الى المعصرة .

Bréviligne (F). Breviline (E).

٢٧٤٣٥ - مِكْتَكَل

نمت تصنيفي يطلق على الحيوانات القصيرة الجال المحكي
بالنسبة الى متوسط مجال نومه او سلالته .

Enclave (F).

Enclave, Gore (E).

٢٧٤٣٦ - مِكْتَكَنَة ، حَيْبَكَة

كل ارض لا طريق لها ، واقلان يغطي صاحبها حق
المرور .

Mycterus (S).

Myctère (F). Mycterus (E).

٢٧٤٣٧ - مِكْتِير * *

جنس حشرات من فصيلة السليبيات ورتبة غمديات
الاجنحة . انواعها المعروفة سبعة منتشرة في بعض مناطق
البلاد المعتدلة الحارة والباردة || اجسامها صغيرة ،
صغيرة ، مستطيلة الاعظام . حبيتها بارزة . ثآليلها
وكوكها وملاسها نظامية . قرونها الاستشعارية ثلاثية .
كواسلها معدنية . اعانها لاصقة . قوائمها نشطة .
انثواها وحيدة اللون ، تكثر فيها السمرة الفحمة والجلوة .
كواسلها واعانها مغلفة بحمل دقيق اشبه اللون او اخضر .
تألف الحراجل والبراري والحادثي . جميعها واسعة ، اما
البقرة فنادسة .

٢٧٤٣٨ - مِكْتِير ، شَمِيرُو Mycteria (S). Jabiru

جنس طير من اللقالق ، انواعها المعروفة ثلاثة : المَكْتِير
الافريقي والاسرائيلي والاسرائيلي . جميعها كبيرة اللد ، تتميز
بمتابعتها النطيلة المستطيلة المرسومة القاعدة ، اجنحتها
رافلة . اذناها قصيرة مربعة . ارساغها زينة . اصابعها
كبيرة اللد صغيرة الخطاب والمخالب || اعرف انواعها
واشهرها المَكْتِير الافريقي .

٢٧٤٣٩ - مِكْتِيرِ افْرِيقِي * ، مَكْتِيرِ السَّنْعَالِ ،

لَقَلَقِ مَسْرُوجِ الْبَنْقَارِ . اَبُو مَيَّةَ ،

٢٧٤٣٩ - مِكْتَاكِي * Médullaire (F).

Médullary, Medulla (E).

٢٧٤٣٩ - مِكْتَاكِي * Médullary, Medulla (E).

٢٧٤٣٩ - مِكْتَاكِي * Médullary, Medulla (E).

٢٧٤٣٩ - مِكْتَاكِي * Médullary, Medulla (E).

٢٧٤٣٩ - مِكْتَاكِي * Médullary, Medulla (E).

٢٧٤٣٩ - مِكْتَاكِي * Médullary, Medulla (E).

٢٧٤٣٩ - مِكْتَاكِي * Médullary, Medulla (E).

اسطوانات فسيحة الارباع تمتد من الهند الى اليابان . ساقها
اسطوانية . فروجها مضطربة زباد اللحاء . اوراقها متعاقبة ،
بيضية ، مقطوعة الطرف ، طول نحو ٢٠ سم . ازهارها بيضاء
اللون . ثمارها مأكولة .

٢٧٤٣٢ - مِفْتَحُ مُدَبِّبِ الْوَرَقِ

Ehretia acuminata (S). Ehretia à feuilles acuminées,
Cab. illet à feuilles acuminées (F).

نوع من المقيف وهو شجيرة جاذبة لتلو من ٥ الى ٦ امتار .
مهدها الهند . ساقها وفروعها اسطوانية ملسة . اوراقها
متعاقبة ، سنانية الشكل ، ذرية وبديعية . نصلها يطول من ٥
الى ١٠ سم . ويبرس من ٢ الى ٤ سم . وهو مستطيل
المنح ، مسنن الحافة ، لاصع الصفحة || ازهارها بيضاء
اللون . ثمارها مأكولة .

٢٧٤٣٣ - مِفْتِيءَ Emétique (F). Emetic (E).

٢٧٤٣٤ - مِكَا ، مَكُو Terrier (F).

٢٧٤٣٥ - مِكَا * Burrow, Hole (E).

٢٧٤٣٥ - مِكَا * Lapidum meyanil (S). Maca (F).

نبات حولي يقل من فصيلة السليبيات . مهده بعض
مرتفعات جبال الالاند الاسريكية . ساقه لذنية الشكل
واللدة ، مأكولة . اوراقه قوسية الانشعاب ، مركبة ،
وريشية . شمرانه الزهري يطول نحو ٤٠ سم . ازهاره حشوكي .
ازهاره صغيرة اللد ، ودية اللون . غريثاته تحبة مستطيلة .
يزوره كروية دقيقة || يتكاثر بالبر . منته الاستان
الجزيرية . يرغب في الاربعة الحلاوة والوفرة العناصر الغذائية .

٢٧٤٣٦ - مَكَا * Certhilauda (S). Sirli (F).

٢٧٤٣٦ - مَكَا * Bifasciated lark (E).

جنس طير من فصيلة القيريات . انواعها ستة ، بعضها
صحراوي وبعضها من طيور الشرق الادف واروبة ولسا
جميعها تصيد في الجو وهيوت وهي في ذلك تمكو وتصفر .
اجسامها صغيرة اللد تطول من ٢٢ الى ٢٤ سم . انثواها
متعددة الانثوان يكثر فيها الاخراج والاضحل . صدورها
موشية . اعانها بيض . متغيرها قوية مستطيلة مشرفة
الطرف . مخالبها نشطة . سادة الاظفار ، تمكثها من
استقرار التربة || تألف الحجاب والاراضي للملح .
قوتها الحشرات والبروز البرية || تكثر منها في افروس
بين الاديال والحشم . حشنتها حولية تتألف من ٤ او ٥
بيضات تحضنها بمتابعة الذكر .

٢٧٤٣٧ - مَكَاكَا * Emolumenta (F).

٢٧٤٣٧ - مَكَاكَا * Remuneration (E).

٢٧٤٣٧ - مَكَاكَا * Emolumenta (F).

٢٧٤٣٧ - مَكَاكَا * Remuneration (E).

٢٧٤٣٧ - مَكَاكَا * Emolumenta (F).

٢٧٤٣٧ - مَكَاكَا * Remuneration (E).

٢٧٤٣٧ - مَكَاكَا * Emolumenta (F).

٢٧٤٣٧ - مَكَاكَا * Remuneration (E).

٢٧٤٣٧ - مَكَاكَا * Emolumenta (F).

٢٧٤٣٧ - مَكَاكَا * Remuneration (E).

٢٧٤٣٧ - مَكَاكَا * Emolumenta (F).

٢٧٤٣٧ - مَكَاكَا * Remuneration (E).

٢٧٤٣٧ - مَكَاكَا * Emolumenta (F).

٢٧٤٣٧ - مَكَاكَا * Remuneration (E).

٢٧٤٣٧ - مَكَاكَا * Emolumenta (F).



مَكَا



مَكَا



مَكِي



مَكْتِيرِ افْرِيقِي



مِكْنَاة



مِكْنَال



مِكْنَال الحِمْر



مَك



مَكْرَة مَبُولَة



مَكْرُور نَفِي



مَكْرُور مَبُول

القائمة ذرب الزام الاخير ، يبدو احمر اللون ويستقر حل
الخضار البحري تملوه خلة كثيفة . بتلات ازهارها صغيرة
ضخمة تطول نحو ٢ سم . ثمارها حامضة لا تؤكل .

٢٧٤٥٤ - مَكْرُورَة مَبُولَة * ، مِكْنَاة

Amelanchia rotundifolia, A. vulgaris (S). *Amélan-*
chier commun (F). *Savoy medlar*, *Service-berry* (E).
Felsenbeer, *Felsenbirne*, *Gemeine Felsenbeer*,
Traubenbirne (D). *Aronia* (I).

نوع من المكر وهي جنبة مذبذبة تطول من ١٠٠ الى
٢٠٠ سم . اوراقها بيضيه مستديرة الطرف تطول نحو
٤ سم . وتعرض نحو ٣ سم . نصلها يبدو قطي الصلصة
السليل ثم يستقر حل الحملة . بتلات ازهارها خلية البشرة .
ثمارها سكرية الطعم مأكولة قطرها نحو ١ سم .

٢٧٤٥٥ - مَكْرُورَة يَابَانِيَّة

Amelanchia asiatica (S). *Amélan-*
chier du Japon (F).
نوع من المكر وهي شجرة دائمة متوسطة القد تطول من ٥
الى ١٢ م . اوراقها سنانية ، نصلها خلي الصلصة مسنن
الحافة يطول نحو ٧ سم . ويمر نحو ٤ سم . بتلات ازهارها
قدية الشكل خلية الصلصة الخارجية . ثمارها سكرية الطعم
مأكولة قطرها نحو ٢ سم .

Carisale (S).
هي مزدور الكرّوز .

٢٧٤٥٧ - مَكْرُورُوم التَحْل

هو زفقوق التحل ، اطلبه .

٢٧٤٥٨ - مَكْرُور

Macurus (S).
Macroure, *Lépidolèpre*, *Grenadier* (F).
Macurus, *Rat-tail* (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة المَكْرُورِيَّات . انواعه
المبروفة ثمانية منتشرة في معظم بحار المناطق الحارة . جميعها
مستطيلة الاخطام الذلقة ، قصيرة الاشداق السفلي ،
كبيرة العين الجاحضة ، مستطيلة القدم ، مستديرة المؤخر
المام الزنفة . سفها مثلث الزوايا ، مستقيم الطرف
الشائك || اشهر انواعه المَكْرُور المبدل والنفسي .

٢٧٤٥٩ - مَكْرُورُوفِي

Macurus trachyrhynchus (S).
Macroure argenté, *Lépidolèpre argenté* (F).

نوع من المَكْرُور يكثر وجوده قرب الساحل الاطريفي
من البحر المتوسط والخليج الاطلسي . طوله نحو ٤٠ سم .
ثوبه الى البطلة الغضبية المواج يقيم مع اقترابه من الظهر
ويبيض عند البطن . لحمه متوسط الصنف مأكول .

٢٧٤٦٠ - مَكْرُورُ مَبُول

Macurus colorrhynchus (S). *Macroure commun*,
Lépidolèpre commun (F). *Common Rat-tail* (E).

نوع من المَكْرُور يكثر وجوده في البحر الابيض المتوسط .
طوله نحو ٣٠ سم . ثوبه الى الرعدة البنفسجية المواج يقيم
عند الظهر ويميل الى الفضي عند البطن . لحمه متوسط
الصنف مأكول .

٢٧٤٦١ - مَكْرُورِيَّات

Macroureidae (S).
Macroureidae, *Macruridae* (F). *Macroureidae* (E).

فصيلة اسماك بحرية من المملسات شالكات الزعانف .
اجناسها وانواعها متوسطة البدن . اطرافها بحار المناطق

سواء . ساقها الى الكعبة المابقة بطورها مواج احمر | يعيش
ذكراً وانثى لا يفترقان . يأنث مجاري للماء وضفاد الاخر
وشواطي البحر . قوته اخشرات والنظام والحيات والاسماك .
يثن في الانجار . انتفا تخمن اربع بويضات .

٢٧٤٦٠ - مِكْنَاة

Crémomètre (F).
Creamometer (E).

اداة تقاس بواسطتها نسبة القشدة في الحليب .

٢٧٤٦١ - مِكْنَال

Densimètre (F).
Densimeter (E).

اداة تستعمل لمرقة الثقل النقي في كل جسم .

٢٧٤٦٢ - مِكْنَف

Condenseur (F). *Condanser* (E).
Condensateur (F).
Condenser (E).

٢٧٤٦٣ - مِكْنَفَة

Alcoolomètre (F).
Alcoholometer (E).

هو ميزان الكحول ، جهاز يخطس في السائل الكحولي
فيبين نسبة ما يحويه من كحول .

٢٧٤٦٥ - مِكْنَال الخَمْر

Vinomètre, *Vinoscope* (F). *Vinometer* (E).

جهاز يستعمل لقياس درجة الكحول في الخمر .

٢٧٤٦٦ - مِكْنَلَة

Jacinthe muguet (F).
نبات زينة يضي جاسمت شرقي ، اطلبه .

٢٧٤٦٧ - مَكْه

Râteau (F). *Rake* (E).

اداة تستعمل لتشطيق التربة .

٢٧٤٦٨ - مَكْدَس

Grange (F).

هو السقيفة ، اطلبها .

٢٧٤٦٩ - مَكْدَسَة

Botteuse (F).
Binder, *Sheaf-binding machine* (E).

جهاز يلوي آلي أو يستعمل لكس اللث وانثى وما أشبه .

٢٧٤٦٠ - مَكْر

Irriguer (F). *To irrigate* (E).

سكّر الارض : سقاها . اسكروا الارض فاتها صلبة ثم
اسرفوها . والمكرو هي السقية . ج مكر ينكور .

٢٧٤٦١ - مِكْرُورَة

Rectificateur (F). *مَكْرُورَة* (S).
Rectifying (E).

جهاز خاص يستعمل لتكرير الكحول وذلك بإعادة
التقطير .

٢٧٤٦٢ - مَكْرَة

Amelanchia (S). *Amélan-*
chier (F).

جنس شجيرات وجنات رية ويزينية من فصيلة الورديات .
انواعها عديدة ، اطرافها بالأم . سقها فراء . اوراقها بسيطة
مابقة ، نصلها كثيفة البروق . ازهارها عتقدي التجميع
محوري الارتكاز . ازهارها قليلة العدد مستطيلة البتلات
البيضاء . ثمارها نورية ، سديرة الذة ، بنفسجية اللون || اصرف
الاوراحها سنا يلى .

٢٧٤٦٣ - مَكْرَة كَنْدِيَّة

Amelanchia canadensis (S). *Amélan-*
chier du Canada (F).

نوع من المكر وهي شجرة متوسطة القد تطول من ٥ الى ١٠
امتار . اوراقها مستطيلة ، نصلها يضي الشكل قلبي

٢٧٤٦٨ - مَكْرُوبُورِيوم المُرَّ *
Macrophoma musae, Phoma musae (S).

وصم يمتري الموز سببه فطر مجهرى يركب الاوراق والتآثر || مظهره الخارجى يقع مستدرة متناوبة حنطية او سمراء اللون تقطع النصل من الفلج الى الخلفة . وهو ان الثآثر يقع سود صغيرة متناوبة تشبه القشور دين ان تؤذي اللب || يكافح باستعمال سائل بودور وبتلقي معلق الكيماة عند اكتمال امشاطها بالورق الابيض او المستعمل من اي صنف كان .

٢٧٤٦٩ - مَكْرُون ٥
Mucron
من صغيرة بارزة مختلفة الاشكال ترتكز عليها بعض الاعضاء الفطرية او النباتية كارتكازها على محور او حل وثيرة . ج . مكان .

٢٧٤٧٠ - مَكْرُونِيكس
Macronyx (F).
هو الزحل ، اطليه .

٢٧٤٧١ - مَكْس ، جَمْرُوك
Douane (E).
Customs, Custom-house (E).

٢٧٤٧٢ - مَكْس المُرَّو
Péage (F). Toll (E).
رسم جمود تقرضه السلطة على كل شخص او سيارة تمر في مكان معين .

٢٧٤٧٣ - مَكْسَان ٥
Trigonocephalus piscivorus (S). Trigonocephale
Ancistrodont piscivorus (S). Motton-mouth (E).
حية سرلودة سامة من الانواع انبويات الاغادي . موطنها
يشمل امريكا الوسطى والمكسيك . تألف صنفات مجاري
الماء والمناقع والمرزات || جسمها يطول نحو ١٥٠ سم .
رأسها حرسائي الشكل . عنقها دقيق وذنبها كذلك . قروية
الشبه بالصنعية لكنها عادمة الجهاز الخرساني الصنعي
الصوت || تعتبر من الانواع الشرسة الجيئة الشديدة
الاذى .

٢٧٤٧٤ - مَكْسَحَة
Ratissoire (F). Scraper (E).
اداة يدوية تستعمل في تسوية التربة وتطهيرها من الاعشاب .

٢٧٤٧٥ - مَكْسِيَة الارنب
Myxomatose (F).
Myxoma (E).
تزيد حجروي يصيب الارنب فيعطى النسيج التي
يتشكر فيها .

٢٧٤٧٦ - مَكْسَف
Thermoscope
محرار هوائي يستعمل في درس الفوارق الحرارية بين وسطين
او بينتين .

٢٧٤٧٧ - مَكْسَف الجلكة ، مَكْسَلَة
Pagoscope
جهاز يذك على الصمغ وهو من ادوات البورات يستدل
به على اماكن حصول الصمغ ليك . راجع مجلد .

٢٧٤٧٨ - مَكْشَط
Avant-voe, Rasette (F).
Tuning-wire (E).
قلعة من المرات تقدم السكة وتطبخها كة التربة .

٢٧٤٧٩ - مَكْشَط ٥
Emousseir (F).
Moss-scraper (E).
صفحة معدنية مسنة او قفاز من قريط يستعمل في كشط
الطحلب عن الشجر .

الحارة . جميعها سامة تألف اللجاج قليلا تقترب من الجاحد
والشطوط || اجسامها شبه رحيمة الشكل ، مستطبة الاذيال
المعدة الزعانف . مخروطية الرؤوس اللذقة ، كبيرة
البون المستديرة الجاحطة ، قصيرة الاشدق السفلى المنقعة .
حراشها مثلثة الزوايا ، مستطبة الاطراف الشائكة .
زعانفها الظهرية والشرجية تمتد كالنواصير المتناوبة القصيرة
حتى اطراف الاذيال || اعرف اجناسها واضهرها المكرور .

٢٧٤٧٢ - مَكْرُوبُورِيوم ٥
Macrosporium (S).
جنس فطور مجهرية من عارة الزحاميات وفصيلة الطلعيات .
كانت اقوامه فيها مضى عديدة وبخلفة الاشكال فاق الملم
الحديث ضرورة احاطها بالاجناس والمهارات التي تشبهها
فلم يبق منها سوى النوع المعروف بمكروبوريوم الشام .

٢٧٤٧٣ - مَكْرُوبُورِيوم الشام ٥
Macrosporium cucumerinum (S).

فطر مجهرى يتطفل على اوراق وممار الشام والبطيخ .
مظهره الخارجى يقع صغيرة متراكبة سمراء اللون تملأ
الاوراق والتآثر وتغطيتها بجلات متناوبة مابقة اللون تسب
يباس التسج للشحارة ثم ذبول نصال الاوراق وتقريح
قشور الثآثر || يكالغ يتطهر البذار قبل زروقه وقد
يضمن نضج المبطعة عند ظهور الوسم . بأحد املاح النحاس
المركز او المخلو من ٥٠ الى ٧٠ ٪ .

٢٧٤٧٤ - مَكْرُوسَيْل
Macrostylis (S).
Macrostyle (F).
جنس شجيرات ونباتات برية وريينية من فصيلة السليانيات .
مشهورة بازهارها المستطيلة الالام الرقيقة السبات .

٢٧٤٧٥ - مَكْرُوبُورِيوم ٥
Macrophoma (S).
جنس فطور مجهرية من فصيلة الصنغيات . يتميز بكتائده
المستطيلة القائمة ضمن بكتيدات سميكة الجلود ، ضيقة المي
الصغير || اتواهم التي تم الاقتصاد الزراعي قليلة ، اعرفها :
٢٧٤٦٦ - مَكْرُوبُورِيوم الشاي ٥

٢٧٤٦٧ - مَكْرُوبُورِيوم الفاصوليا ٥
Macrophoma phaseoli, M. corchori, M. cajani, M.
sesami (S).
فطر مجهرى نام ، واسع الانتشار ، يوجد في جميع البلاد
الحارة . يركب جلود وسوق وممار عدة نباتات مختلفة
اخصها الفاصوليا والقطن والبطاطا الخلسة واخصيات
واين والكاكاو والبطاطا والسند || يصيب الفاصوليا
بجلودها وجنتها وساقها فيعفن الجلود والجنت ويمنطق
الساق بنشاد ليد اسمر اللون || وهو حل القطن عفن اسمر
يركب الجلود ويضع قرصية ايضا الى الجلود تملأ الساق
فوق التربة || وقتها يصيب البطاطا الخلفة بحول لياها
الى مادة اسفنجية سوداء اللون || وهو في اخصيات
عفن اسود يركب الجلود ووصم على بلحاء السوق فيصيب
جفانها وانعدامها وروث صبارة صمغية تفقد الشجرة بعض
حيويتها وتقويعها نحو القمامة || يكالغ باستعمال احد
الفولطير الفعالة غير المركزة على النحاس .



مكروبوريوم الشام



مكروفيوم الموز



مكان



مكشطة



مكانة غزالية



مكرد



مكود

٢٧٤٩٣ - مَكَبَة الاسْتِرْدَاك ، حَيْثَر الاسْتِرْدَاك
Faculté de rachat
هو حق ارتجاع المبيع بموجب شرط الفداء .

٢٧٤٩٤ - مَكَنَس ، كِنَاس
Ratrait (F).
Ratring (E).
مولج الرشح من اللثاء ويكثر تستكن فيه من الحر .

٢٧٤٩٥ - مَكِنَس
Sorgho à balais (F).
نبات زراعي مشهور باسم ذرة المكاس .

٢٧٤٩٦ - مَكَنَسَة الْأَنْدَر
Molène blanche (F).
هي البوصير الأبيض ، اطلبه .

٢٧٤٩٧ - مَكَنَسَة الْجَنَّة
Kochia (F).
هي الهيشم ، نبات زراعي جميل القالب والخضار .

٢٧٤٩٨ - مَكَنَسَة السَّاحِرَة
Balais de sorcière (F). Broom of the sorceress (E).
تعريف وصفي يطلق على اثنان مشابهة مريضة تكون
في بعض الانجبار الثمرة والخريصة سببا فطور مجهرية
مختلفة .

٢٧٤٩٩ - مَكَنَسَة
Mécanisation (F).
Méchanization (E).

٢٧٥٠٠ - مَكُون
Potentiel (F). Potential (E).
صفة القوة الكامنة .

٢٧٥٠١ - مَكُو
Terrier du lièvre (F).
Hole of the hare (E).
جحر القرواع اي الارنب الوشي .

٢٧٥٠٢ - مَكُونَة *
Manucodia (S).
Manucodia (F). Manucodia (E).
جنس طير من الجواثم وفصيلة التروذورويات . انواعه
المعروفة نحو ١٥ جميعها من طيور استوائية والجزر
المجاورة . ملجتها الحياتي بجاعي . جعلتها متوسطة البدن .
تألف القنابات . قوتها الحشرات والثمار والبلور || اجسامها
ربعة تطول من ٢٥ الى ٢٦ سم . اذواها تراوح بين
الازرق والاخضر والاسود جميعها سفاه المراج . رؤوسها
مكحلة برش ناعم صغري لونه يختلف عن لون الرأس .
والرءاء . اجنتها معتدلة الحجم . اذناها مستديرة الاطراف .
انثاها تتسل بنفس الاقواب || تدفن اعشاشها في الانجبار
قرمية . الاناث تحضن بمناوبة الذكور من ٤ الى ٦
بضاضات . الترخيم يستمر نحو ١٥ يوما .

٢٧٥٠٣ - مَكُونَة *
Limacoda (S).
Limacode (F). Limacode (E).

حشرة من فصيلة المكوديات وربة عرشفات الاجنحة .
اصطادها بعض مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . تألف
المراج التي تكثر فيها الانجبار الابيدة الدواك || جسمها
صغري اللد ، كثيف الخمل الناعم . يسقط نحو ٢١ سم .
رأسها شبه موزائي الشكل . صيها صغريتان . عظمها
ثديده القصر . ملجسها قديقان ، مستطيلان . زباناها
عيطيان . كوسلها متكاثف الخمل . يلقبها متراكب
السيف والخمل || سرقها قريبة الشبه بالخلزوين وتنقل
ببطء مثله . وهي غاصلة تعيش على اوراق السنديان وغيره
من الانجبار الابيدة .

٢٧٤٨٠ - مَكَب
Cube (F). Cube, Cubic (E).

٢٧٤٨١ - مَكَبِيَّة
Cuboïde (F). Cuboid (E).

٢٧٤٨٢ - مَكْفَهَر
Cumulo-nimbus
هو الزكام ، نوع من الغيوم ، اطلبه .

٢٧٤٨٣ - مَكَلَاوِس
Calimètre (F). Calcimeter (E).
هو مقياس الكلس ، جهاز يبين مقدار كربونات الكلس
في التراب .

٢٧٤٨٤ - مَكَلَف ، مَعَهْدُ لِه
Grevé (F).
Burdened, Encumbered (E).

٢٧٤٨٥ - مَكَلُورَة
Maclure (F).
هي القانة ، شجرة فراء من القراصات .

٢٧٤٨٦ - مَكْنَاة
Truffière (F).
Truffe-ground (E).
ارض تبت الكرم وستنبث الكرم .

٢٧٤٨٧ - مَكْنَة ، مَخْتَالِه
Butteaus, Buttoir (F).
Riding-plough (E).

محرث خاص يستعمل لكي افي تخنيق المزروعات التي
تتطلب هذه الحالة .

٢٧٤٨٨ - مَكْن
Œufs d'insectes (F).
Eggs of the insects (E).
المكن هو بيض الحشرات . الواسدة مكنة .

٢٧٤٨٩ - مَكْنَان *
Oryssac
جراب المكن في بعض الحشرات وقد يكون في الباطن
أو شربي الانكاز .

٢٧٤٩٠ - مَكْنَاة ، مَدْرَة
Galaga (S).
Galaga, Lavanèse (F). Goat's rue (E). Geiss-raute (D). Galaga, Lavanese (I).
جنس نباتات عشبية برة حولية ومعمرة من فصيلة القرنبات
الفراشية . انواعها عديدة جميعها طليقة تنشط الدر . اوراقها
متعاقبة ، مركبة ، ريشية ، وربة . ازهارها عتقودية التجميع ،
ابلية الارتكاز ، زرقاء اللون او بنفسجية || اشهر
انواعها ما يلي .

٢٧٤٩١ - مَكْنَاة شَرْيَّة
Galaga orientalis (S).
Galaga oriental (F).
نوع من المكناة وهي عشبة معمرة مبلولة تطول من ٦٠
الى ١٢٠ سم . ارضها ممدادة . ساقها فراء خلية . اوراقها
تعد من ١١ الى ١٧ وريقة . وريقاتها بيضيه مديبة تطول
من ٣ الى ٥ سم . صلها خلي البشرة في صفحته . ازهارها
بنفسجية اللون . ازهارها يستمر من حزيران الى آب .
يقال انها تحمل غواص المكناة الحزنية ولكنها دونها منفة .

٢٧٤٩٢ - مَكْنَاة مَحْزَنْيَّة * ، مَدَابِ المَاهِز
Galaga officinalis (S). Galaga officinal, Rue des chèvres (F).

نوع من المكناة وهي عشبة مبلولة معمرة تطول من ١٠٠
الى ١٥٠ سم . ساقها فراء . اوراقها تعد من ٩ الى ١٣
وريقة ، وريقاتها سانية تطول من ٢ الى ٤ سم . نسلها
مالس الصفعة مهذب الصفعة . ازهارها زرقاء اللون .
ازهارها يستمر من حزيران الى آب . وهي صباغية وتعتبر
من النباتات الطبية المنيعة تدخل في عدة علاجات اخصها
علاج السلس .

٢٧٥١٢ - مَلَاخ

بقلة طيبة رخصة تسمى كشمخة (السان). الواحدة ملاخة.

Resumurie (S).

Résumure, Résumurie (F).

جنس نباتات مجلية وجنية من فصيلة الالديات. انواعها المدرفة سبعة منها في بعض مناطق حوض البحر الابيض المتوسط والشرق الاوسط || سوقها منتصب رفيعة فراء لعلو من ١٢٠ الى ٢٠٠ سم. اوراقها متعاقبة، متقاربة الاوتكاز، غطية النصال الصغيرة القد البحرية اللون. ازهارها فردية التجميع، ابضية وطرية الاوتكاز، خاصة التركيب، يكثر فيها اللون الابيض. ثمارها الملاح الفلق. تنموها صيني || اعرف انواعها واشهرها الملاح اللودي المدروف بمحشية الحصف.

٢٧٥١٤ - مَلَاخ دُرِّي

Résumurie vermiculées (F).

نبات بري طبي مشهور باسم حشيشة الحصف، اطلها.

Saline (F).

Salt-marsh, S.-mine, S.-pit (E).

المكان المد لاصطناع الملح ونسجم الملح.

٢٧٥١٥ - مَلَاخَة

٢٧٥١٦ - مَلَاة

مزروع اللوز وكل ارض تكثر فيها اشجار اللوز.

Malles (S).

Marteau (F). Malieus (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم، عادات المشاب وبضلة الاطريات. ازهارها المدرفة عديدة منتشرة في بعض بحار البلاد الحارة اغصها المحيط الهندي || اصداقها لانظامية، متباينة الاشكال، لاقية المصارع، بعضها قريب الشبه بالمطاس. مفصلاتها عادمة التسنين || تعيش لاصقة بصخور المجاح على اعماق تراوح من ١٥ م.

Crenatula (S).

Crenatula (F). Crenatula (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم عادات المشاب وبضلة الاطريات. ازهارها المدرفة ثمانية جميعها من عظم البحر الاحمر والمحيط الهندي || اصداقها شبه مروحية الشكل، رفيعة القدم، رقيقة المصارع للاعتمادية، تحلة التضدية للؤلؤة الداخل || تعيش لاصقة بالاسفنج.

٢٧٥١٩ - مَلَاة، مِلَاة، مَلَق، مِلَاة

Rouleau (F). Roll, Roller (E).

معدلة اسطوانية تستعمل في حمل أو حذل التربة الزراعية. اشكالها واحجامها عديدة تختلف باختلاف الغاية من استعمالها. اهمها:

Rouleau plombeur (F).

ملاسة واحدة

Rouleau ondulé (F).

ملاسة متواجة

Rouleau à bécettes (F).

ملاسة خطاطية

Rouleau marqueur (F).

ملاسة غططية

Rouleau brise-mottes (F).

ملاسة مفتحة المدور

Limacodidae,

Cochlididae (S). Limacodidae, Cochlididae (F).

Limacodidae, Cochlididae (E).

فصيلة حشرات من رتبة حرشفيات الاجنحة. اجناسها وانواعها المدرفة نحو ١٠٠٠ منتشرة في جميع اصقاع العالم اغصها المناطق الحساسة والاستوائية || اجسامها صلبة. بسطها تراوح من ٢٠ الى ٢٥ سم. رؤوسها معتدلة الجرم. عيونها صغيرة. اغصها شديدة القصر. ملاسها مستطيلة، تحلة. قرونها الاستشارية غطية. بطونها متراكبة السنف التقيق والحمل الناعم. اجنحتها مستعرضة، عادمة التبدب || تسرح في الليل. اسارها شبه بيضبة الشوزن، قصيرة الجرامز الصدرية، تحلة الجرامز البطنية. جميعها غاصلة || اشهر اجناسها المكودة.

٢٧٥٠٥ - مَكِينَال، قَدَاة

Module, Mesure de capacité (F). Modul, Dry measure (E).

اسم شامل يطلق على كل وحدة كيلية من اي حجم كانت أو سمة.

٢٧٥٠٦ - مَكِير هو المكير، اطله.

٢٧٥٠٧ - مَلَاب مَلَاب : كل عطر مائع.

٢٧٥٠٨ - مَلَاب *، مَلْبِيغِيَا

Malpighia (S). Malpighie, Malpighier (F). Barbados cherry (E). Barbadoskirschen (D). Malpighia (I).

جنس نباتات شجرية من فصيلة المليات، منها البلاد الاستوائية. انواعها نحو ٢٠، اوراقها متعاقبة معتقة اهليبية. نصلها خلي البشرة سنن الحافة الشائكة. ازهارها عتقودية أو نورية التجميع منها الاحمر والوردي والابيض. اعرف انواعها واشهرها:

ملاط حريف. Malpighie brillante, Bois capitaine (F).
شجرة امريكية المنبت، قشورها حامزة كاوية طيبة وصناعية.

Malpighie glabre,

Céristier des Antilles, Moureiller, Xocot (F).

شجرة تكثر في المكسيك، ثمارها كرزية مأكولة لا تحلو من الحوصلة وقد تزوج للزبون.

Epinard de Malabar (F).

٢٧٥٠٩ - مَلَابِيَر

بقلة زراعية تسمى بازلية بيضاء، اوراقها تستعمل استعمال الاسبانج.

Malpighiaceae (S).

Malpighiacées (F). Malpighiaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين مستقلة الفعالات. اجناسها ٥٠ وانواعها ٦٠٠ معظمها من نباتات المناطق الاستوائية الاسريكية. جميعها اشجار وشجيرات وجنية. اوراقها متعاقبة معتقة بسيلة أو مركبة. ازهارها خماسية التماثلات والبتلات، عتقودية التجميع، صفراء اللون أو بيضاء أو حمراء. ثمارها جراء مكبرة عديدة البزور.

٢٧٥١١ - مَلَاخ، مَلَاخ، مَلَاخِي

Gelde, Givre (F).

Frost, Jelly, Rime (E).

هو جرد نطق الماء على سطح التربة والنبات من جلود درجة الحرارة الى ما دون الصفر.



مَلَاب



مَلَاة

Féculerie (F).

٢٧٥٣٢ - ملحبة °

Manufacture of fécule (E).

الملبية أو مصنع اللبوب أو منشأة البطاطا هي المصنع المخصص باستخراج اللبوب.

Laiterie (F).

٢٧٥٣٣ - ملحبة °

Dairy-farm (E).

المسل الذي يمالج فيه الحليب رتباً يباع .

٢٧٥٣٤ - ملحبيًا °

في الملب ، الملب ، الملب .

Malt

٢٧٥٣٥ - ملح

في الحبوب الناشئة صناعات لا سيما حبوب الشعير التي تستعمل في صناعة البيرة .

Maltage (F).

٢٧٥٣٦ - ملحج

الملتاج أي صنع الملت ، هو عمل استمالة الشعير وطيره من الحبوب الى ملت أي حبوب ناشئة .

Maltese

٢٧٥٣٧ - ملحز

خبرة قابلة للولان تحول الملحوز الى ملحوز قابل الاختيار .

Manducable (F).

٢٧٥٣٨ - ملحالة

Verdoyant (F).

٢٧٥٣٩ - ملحج

النبت الأرض اجتمع فيها وكثر . والأرض الملتجة : الكثيرة الخضرة .

Conjonctives (F).

٢٧٥٤٠ - ملحمة

Conjunctiva (E).

ملتحة العين ، غشاء يلمس صفحة المقلة الخارجية وصفحة الاغنان الداخلية .

٢٧٥٤١ - ملحقم °

هو المقول ، الملب .

٢٧٥٤٢ - ملحقات الأصابع ، ملحقات

Syndactyles (F).

Syndactyls (E).

أحد قسمي الطيور الجوارح ، يشمل فصلي الخفاشيات والقرليات .

Volubile (F).

٢٧٥٤٣ - ملحفت

Volubile, Volubile, Twining (E).

صفة النباتات الماروش الذي يتعلق بأي جسم كان فيسلكه ويلتص حوله حلزونيًا .

Circinal

٢٧٥٤٤ - ملحفت °

لمت تعريفي يطلق ، في علم النبات ، على كل عضو ، ان ورقة أو غيرها دائرية الالتفاف .

Convergent

٢٧٥٤٥ - ملحقر

Plain (F).

٢٧٥٤٦ - ملحقة

الملتك والمصمت : ما لا جوف له .

Maltose

٢٧٥٤٧ - ملحوز

نوع من السكر القابل للاختيار ، يحصل من تكسير النشا بالملت .

Contiguité (F).

Contiguity (E).

٢٧٥٢١ - ملات

٢٧٥٢٢ - ملاصق فله

اسم يطلق على طائر ين صلتين هما الرفراف والقرنل الشائع ، اطلبها .

Platalea (S).

٢٧٥٢٣ - ملاعقي °

Spatule (F).

Spout-bill (E).

جلس طيور مائية من طوال الساق القواطع . أنواعه المعروفة ٨ ، تتميز بمناقيرها الكبيرة الملمعة الشكل ، بسوقها الغضائفة اللدبة ، بأرأسها المستطيلة وبشعرها المفرغة . تعيش قرب الماء . قربها السك والهدان والخفشات والرخويات . تنش أوكها في الاجنار وبين القصب . انائها تقع من بيضتين الى أربع بيضات مستطيلة تحفها ثلاثة اسابيع || أشهر أنواعه ما يلي .

٢٧٥٢٤ - ملاعقي أبيض ، أبيض ملحمة ، دواس

Platalea leucorodia (S).

Spatule blanche (F).

نوع من الملاعقي وهو طائر كبير الجثة طوله نحو ٧٠ سم . ثوبه الى الأبيض الناصع باستثناء مناقير وريشه السد ، ونحوه وزفده وطرف مناقير الصفرة . أرياش رأسه مستطيلة مهدلة . يعيش مجامعات كبيرة تنش في مكان واحد . يحوي البلاد في طلب المصيف والمشي . يكثر على شواطئ الخليج الفارسي والبحر الاسود ومل ضفاف الباناب وفي هولندا .

٢٧٥٢٥ - ملاعقي زرد ، أبو مسوط ، عيد دواس

Platalea ajaja (S).

Spatule rose (F).

نوع من الملاعقي طوله نحو ٦٠ سم . ثوبه وردي اللون . أحواله شطوط وضفاف الشرق وغربية الشرقية . مجامعات متوسطة الحجم ، عدد أفرادها يراوح من ٦ الى ٢٤ ، وهي تنش في مكان واحد .

٢٧٥٢٦ - ملاعقي

Cattloys (F).

نبات محلي من الجليليات يدعى قتلقة ، اطلبها .

٢٧٥٢٧ - ملكة

Terrien (F).

Landed, Proprietor (E).

هو صاحب الاملاك أي الاراضي الزراعية والحرجية .

٢٧٥٢٨ - ملكة البحر

Ange de mer (F).

سمكة بحرية ولدت مفترسة مشهورة باسم سقطين ، اطلبها .

٢٧٥٢٩ - ملاصق

Palpes (F).

Palps, Feelers (E).

زوائد مفصلي فكية تلمس الحشرات بواسطة مآكلها وربما مبادها .

٢٧٥٣٠ - ملحاب °

Féculomètre (F).

Fæculometer (E).

جهاز يستعمل في تحليل حمى اللبوب الناشئ المرجوح في مادة معينة .

٢٧٥٣١ - ملحان °

Galactomètre (F).

Galactometer (E).

جهاز تقاس بواسطة المواد السكرية والسمنية والجنية والجلالة الموجودة في الحليب .



ملاعي

٢٧٥٥٨ - مُتَجَنِّ ٥ Régime (F).
هو مجموعة الموائل والانفعالات الطبيعية التي تسبب الشيء.
المشي . كقولك ملحن الاطوار وملحن الرياح الخ .
ج ملحن .

٢٧٥٥٩ - مُتَجَّ الملح : ورم في قلوب الفرس دون الجرد فاذا اشتد فهو الجرد .

٢٧٥٦٠ - مُتَجَّ Sol (F). Salt (E).
الاسلاح ، كياويا ، مواد ناتجة من احلال مدن محل
الهيدروجين في حامض . فاذا اضيف مثلاً الحامض الكبريتي
المخفف الى الزنك يتصاعد غاز الهيدروجين ويختفي المذن
ويتكون ملح كبريتات الزنك .

٢٧٥٦١ - مُتَجَّ البَارُود ، تَطْرُون ، بَوَرَقْ اُرْمَنِي Nitre, Salpêtre (F). Nitre, Salpêtre (E).
هو كياويا نيترات البوتاس، يحصل ويتجمع طبيعياً على
الصخور الكلسية وعلى جدران الاقبية الرطبة ويستعمل
في صنع البارود .

٢٧٥٦٢ - مُتَجَّ الطَعَام Sel de cuisine, Chlorure de sodium (F). Kitchen salt (E).
تريفه الكياوي كلوريد الصوديوم . يستخرج بأكثرية
من مياه البحر بعد ترقيدها وتبينها في الملاحات ثم معالجة
بلوراتها ضمن مجاف خاصة .

٢٧٥٦٣ - مُتَحَان Janvier (F). January (E).
هو شهر كانون الثاني .

٢٧٥٦٤ - مُتَحَان Halimodendron (S). Halimodendro (F).
جنس نباتات برية وتزيينية من فصيلة التريبات . انواعه
المعروفة قليلة العدد ، جميعها اسوية المهد ، تبت في رمال
الشواطى البحرية . معظمها جنبي وبضها مشجر . اوراقها
مركبة عابلة . ثمارها قرنية ، بزورها مفلطحة ، اشهر
انواعه التريينية الملحان القضي .

٢٧٥٦٥ - مُتَحَان فِيْ Halimodendron argenteum (S). Halimodendro argente (F).
نوع من الملحان يعيش في الاربة الرملية الماخة . جنينه
شائكة فارشة تملو نحو ٢٠٠ سم . اوراقها عابلة ، مركبة ،
شعيرة . وريقاتها رباعية العدد ، اهليلجية الشكل ،
مغطوة النصل البحري اللون القضي المواج ، ازهارها كبيرة
القد ، منها الثنائية التجميع ومنها الثلاثية ، معاليها مسطحة
متدلية . لبها الى الحرة البفسجية المواج || تنوره يستمر
من ايار الى حزيران .

٢٧٥٦٦ - مُتَحَاوَات ، لَقِيْطَة Feuillus (F). Leavy (E).
هي الاشجار الحرجية والتريينية التي يسقط ورقها في الشتاء .
تفيضها العروات والايادة اي الدائمة الخضرة التي لا يسقط
ورقها . واحدتها ملحاه .

٢٧٥٦٧ - مُتَحَي Annexe (F). Annexed, Appended (E).
هو كل تابع خلق بأصل .

٢٧٥٤٨ - مُتَوَرِّيات الأَجْنِحَة ٥ ، مُتَعَفِّيات الأَجْنِحَة ٥ Stropsiptères, Rhiptiptères (F). Stropsiptera, Rhiptiptera (E).
رتبة حشرات من طيقة غشائيات الاجنح . اجناسها وانواعها
المروعة قليلة العدد تجسمها فصيلة الحَشَفِيَّات .

٢٧٥٤٩ - مُتَوَرِّية Latanier (F).
هي الحشف ، اطلبه .

٢٧٥٥٠ - مُتَوَرِّين ٥ ، مُتَوَرِّين Maltine, Maisine (F).
المُتَوَرِّين اي كسب اللدة الصفراء هو الفضل الناتج عن
صناعة تطهير اللدة ، ويستخدم من اعلاف الماشية .

٢٧٥٥١ - مُتَوَرِّد ، لَقِيْد Synanthérique (F). Synanthéric (E).
المُتَوَرِّد واللقيد من الازهار ما كانت اسديتها ملتحمة المآثر .

٢٧٥٥٢ - مُتَجَّ هو نوى المقل . ج املاج .

٢٧٥٥٣ - مُتَجَّا Abri (F). Refuge, Shelter (E).

٢٧٥٥٤ - مُتَجَّدَة Mulgedium (S). Mulgédie (F).
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة المركبات . انواعها
المعروفة عديدة . اطعانها بعض مناطق الشرق الاوسط
واروبية || سوقها فراء تملو من ٥٠ الى ٢٠٠ سم .
اوراقها كبيرة مفروعة لامتناهية التفرع . ازهارها عشكوي
التجميع . ازهارها متباينة الالوان يكثر فيها الازرق ||
اعرف انواعها واشهرها الثلاثة التالية .

٢٧٥٥٥ - مُتَجَّدَة قَرْنِيَة Mulgedium tataricum (S). Mulgédie de Tartarie (F).
نوع من الملحدة التريينية . مهدها بلاد التتر . ساقها قليلة
الفروع تملو من ٨٠ الى ١٢٠ سم . اوراقها حاضنة
بحرية اللون . ازهارها عذقي التجميع . ازهارها الى الزرق
الساجينية || تنويرها يستمر من حزيران الى آب .

٢٧٥٥٦ - مُتَجَّدَة جَبَلِيَة Mulgedium alpinum (S). Mulgédie alpine (F).
نوع من الملحدة التريينية السبروتية تعيش في جميع الاثربة
ومختلف الموامق . مهدها جبال الشرق الادنى وبعض جبال
اروبية . ساقها فراء تملو نحو ٢٠٠ سم . اوراقها حاضنة
كبيرة النصال المرطاه . ازهارها عشكوي التجميع ، ممثل
الكثافة . ازهارها الى الزرق الباهة || تنويرها يستمر
من تموز الى ايلول .

٢٧٥٥٧ - مُتَجَّدَة كَبِيْرَة الزَوَق Mulgedium macrophyllum (S). Mulgédie à grandes feuilles (F).
نوع من الملحدة التريينية . مهدها بعض المناطق التركية
والقوقاز . ساقها فراء ، خلية المهاد ، تملو من ١٠٠
الى ١٥٠ سم . اوراقها كبيرة القد ، قليلة النصال ،
مالسة المسطحات العليا ، مزقة السفلى . ازهارها عشكوي
التجميع ، كبير القد . ازهارها الى الزرق الزاهية ||
تنويرها يستمر من تموز الى ايلول .

٢٧٥٦٨ - ملحق التامين

Avenant (F).

Modification (E).

عقد كتابي يضاف الى وثيقة التأمين الدلالة هل تعديل وقع في بعض شرائطها .

٢٧٥٦٩ - ملحق الرصية

Codicille (F).

Codicil (E).

هو الملحق الذي يجرده الموصي بعد تحرير وصيته إما لاتمامها او لتعديلها او لافعالها .

٢٧٥٧٠ - ملحوظة ، ملحوظة

Prévisible (F).

Foreseeable (E).

٢٧٥٧١ - ملحوبات الفلك

Plectognathes (F).

رتبة من الاسماك الضفاريات .

٢٧٥٧٢ - ملحق

Dragon (F). Sucker (E).

الملق والعلقان : قضيبي ينمو من برصعة مرضية نشأت على جذور نبات مقوق .

٢٧٥٧٣ - ملحيات ٥

Malachitidae (S).

Malachitidae (F). Malachitidae (E).

فصيلة حشرات وائمة وقائمة من رتبة غمديات الجنان || اجناسها وأنواعها المعروفة عديدة معظمها من حشرات البلاد الحارة وبعضها يألف مناطق البلاد المعتدلة الحرارة مرتبها النباتات المثبثة والادغال ترتكض رقيق الازهار وتقترب الحشرات الدنيا التي تقترب منها . وبعض اجناسها يتميز بجهاز خاص يمكنه من دفع حويصلات جانبية حراء اللون تطلق منها رائحة اثيرة تجذب الاصاصاب ، قليلة الاثى || اجسامها صغيرة القد ، مستطيلة الشكل ، مستعرضة الرؤوس . مستقلة الزباني المستطيلة المركبة من ١١ فصلة . ارساغها خماسية المقل || يرقاتها تعيش تحت الماء وفي الاخشاب المتفورة ساعية وراء اساريع الحشرات الخالصة لاقتناسها || اشهر اجناسها الملحية والمداشفاة والوسعة .

٢٧٥٧٤ - ملحية نكالية البثور ٥

Malachius bipustulatus (S).

Malachius bipustulatus (F).

حشرة وائمة جاذبة قانصة من فصيلة الملحيات ورتبة غمديات الاجنحة . تألف الحقل المزروعة والمزاري . غنائلها ترتكض رقيق الازهار وتقترب الحشرات الدنيا . عند الحاجة ، فيلور احر اللون يفرز مادة اثيرة نافذة تجذب الاصاصاب تكفي للقتل مقابو الفرم . يرقاتها تعيش على جذور النجيليات وعلى ما تقتربه من اساريع الحشرات التاربة ولدائمة || جسمها صغير اللد يطول نحو ٦ م . رأسها مستعرض الجرم ، قصير الخطم ، اخضر اللون . صينها كيرتتان . زباناها غطياني . فكها صليمان . كولها شبة مربع الشكل ، اخضر اللون . ظهرها الى الخضار الالمنس اما الاطراف الخلفية فال احمر . غداها خفيفتا التحيز من الميم المخطوط . ارساغها خماسية المقل || لها جليل واحد في الحقل . تظهر الحشرة الجملانة في ايار وتعيش حتى ابد . انماها تهريق للكن قرب سوق نبات وتحت الارراق التي تلامس التربة || البرقة عند الادراك التام تطول نحو ٩ م . جسمها شبة اسطواني الشكل ، سداسي الرواجب القصيرة ، حنكي اللون ، اسمر الملاج ،

اسفني الرأس الاسود ، مستند للزعر والسكة الشرجية || طور الاكمال الذي يستمر نحو ٣٠ يوماً ينتهي في التربة ضمن جلاب من الطين والبراز ينطلق عند انطلاق الحشرة .

٢٧٥٧٥ - ملحية حمراء ٥

Malachius rufus (S).

Malachie rouge (F). Malachius rufus (E).

حشرة وائمة قانصة من فصيلة الملحيات ورتبة غمديات الاجنحة . تألف البراري والمزاري والاحراج الغنية غنائلها ترتكض رقيق الازهار وتقترب الحشرات الدنيا . تتميز بجهازها الحويصلي القاسح الاثري الرائحة التي تجذب الاصاصاب . يرقاتها تعيش تحت لحاء الاشجار وفي الاخشاب النخرة قربها اساريع الحشرات الخالصة || جسمها صغير القد يطول من ٦ الى ٧ م . رأسها مستطيل الجرم اسمر اللون . زباناها مستطيلان مستقان . صينها كيرتتان . فكها صليمان . كولها صناعي اللون تتصلبه بقية غضار . ظهرها مستطير الطرف اللصق ، احر اللون . ارساغها خماسية المقل || لها جليل واحد في الحقل . تظهر الحشرة الجملانة في اوائل نيسان وتعيش حتى اواخر حزيران . تسرح في النهار . تسلف بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع . تنجح المكن تحت لحاء الاشجار وتحت الانقاض || البرقة عند بلوغها الادراك التام تطول من ١٠ الى ١٢ م . جسمها شبة اسطواني الشكل مستطيل الرأس ، مستند الطرف ، سداسي الرواجب القصيرة ، اسمر اللون ، اصفر الملاج || طور الاكمال الذي يستمر نحو ٣٠ يوماً ينتهي في اخر سرداب دخلته البرقة .

٢٧٥٧٦ - ملدكان ٥

Flectométre (F).

Flectometer (E).

جهاز يستعمل في قياس لدانة الماد تحت ضغط معين .

٢٧٥٧٧ - ملدن ٥

صفحة او عصاية سليلوزية رقيقة منسوبة السطح تستعمل في غش الصناعات اخصها صناعة الافلام السينمائية حيث تطل على اسطح جهتها بمادة جيلاتينية حساسة يؤر لها النور .

٢٧٥٧٨ - ملدون

Pelliculé (F).

منشى بالملدن .

٢٧٥٧٩ - ملز

Mélèze (F).

شجرة حرجية تسمى لاويس ، اطلها .

٢٧٥٨٠ - ملز كاذب

Faux-mélèze (F).

شجرة حرجية وتزيينية تسمى لاويس كاذب ، اطلها .

٢٧٥٨١ - ملزكان

Gonocytisus (S). Gonocytis (F).

جنس نباتات ثيمية ، متوسطة الارتفاع ، برية ، مبررة ، من فصيلة القرنيات الفرائسية . انواعه المعروفة قليلة العدد ، منتبها بعض مناطق حوض البحر الابيض المتوسط ، اخصها تهايم لبنان والمنطقة العلوية السورية || سوقها متصبية ، فرعاء ، حاملة الشوك . اوراقها مركبة ، وثيرة المدد ، وريقاتها شبة بيضية النصال المستطيلة . ازهارها اجلية الانتشاب ، مستطيلة الزناد ، صفراء اللون ، مستعينة العرف ، يجرسها النحل .



ملحية ثنائية البثور



ملحية حمراء

Lin commun (F).

٢٧٥٩٢ - مَكْسَج

هو الكتان الشائع ، اطليه .

Melasma (S).

٢٧٥٩٣ - مَكْسَسِيَه

جنس فطور مجهرية من فصيلة الهذكيات . انواعه قليلة عادمة القيمة الاقتصادية . بكتنداته ديمية التركيب ، فضمية اللون ، ترتكز حل ونية فارشة فرجية الانفلاق . بويضاته مخروطية منتفخة ، شفافة ، وسيدة الخلية .

٢٧٥٩٤ - مِلْسِين * (F). Mylesinus (S), Mylésine

الواحدة ملسينة ، جنس اسماك نهريه من مفصوات المثانة وفصيلة القرصانيات . انواعه المعروفة ثلاثة موطنها انهر البرازيل والغويان || اجسامها بيضيه الشوزن ، مسطلة الجرم ، صغيرة القد ، تطول من ١٦ الى ٢٠ سم . زعانفها الظهرية والشرجية كبيرة متقابلة . اما الذيلية فهلالية الشكل . اذوارها الى الخفسار المتلغلت الماهبات || حيوها مأكولة ، متوسطة الصنف .

٢٧٥٩٥ - مِلْسِيَت السَكْم

هي زخعة السكج ، اطليا .

٢٧٥٩٦ - مِلْسِيَت المَكْفُوف

هي زخعة المكفوف ، اطليا .

Fluoroscope (F).

٢٧٥٩٧ - مِلْصَاف

جهاز يستعمل في تشعيع اللاصف اي الفلورور الموحيه في المواد المنلنية .

Dugong (F).

٢٧٥٩٨ - مَلْصَه

هي الاطوم ، حيوان بحري غليظ الجلد ، اطليه .

٢٧٥٩٩ - مِلْطَاس (F). Compresseur à pistolet

جهاز آلي يستعمل في تقطيع المواد الصلبه كالصخور وغيرها .

٢٧٦٠٠ - مَلْطُوسِيَه * (F). Malthusianisme

الملطوسية مذهب اقتصادي اجتماعي نادى به الاقتصادي الانكليزي «ملطوس» لمخضه ضرورة كبح الانجاب لان التكاثر البشري يزداد والمواد الغذائية الصرورية تنضب .

Tissu sous-cutané (F).

٢٧٦٠١ - مِلْطَى

قشرة رقيقة بين العظم والدم .

٢٧٦٠٢ - مِلْطَقِي (F). Cochleaire, Cochléiforme

ما كان شكله شكل الملقطة .

٢٧٦٠٣ - مِلْطَقِيَه (F). Cochleária official

هي حشيشة الملاحق ، من النباتات الطبية ، اطليا .

٢٧٦٠٤ - مَلْعُوبَات (F). Clematidae (S).

جمعيه نباتية من فصيلة الشقيقيات . اعطائها البلاد الحارة والمتندلة . انواعها كثيرة المدد معظمها مداد مارش . سوطها ليفية . اوراقها متقابلة طويلة الربيول ، مصارتها سامة محرقة . اذوارها عادمة التلات كبيرة الغصل الملوته .

Malsherbia (S).

٢٧٥٨٢ - مَلْزُوبَة *

Malsherbie (F).

جنس نباتات عاوية ، معمرة ، برية وتربيتية من فصيلة الملزوبيات . انواعها المعروفة خمسة . منبتها الطوي بعض مناطق الشيل والبيرو || تزدهج القرزين في المراكب وفي المواع التي لا تخفى الصقع في الشتاء .

٢٧٥٨٣ - مَلْزُوبَات (F). Malesherbiaceae (S).

Malesherbiaceae (F).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة القمالات . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة المدد . منبتها الطوي بعض اصعاع امريكا الجنوبية || نباتاتها معمرة ، عاوية ، قريبة الشبه بالالاميات . اوراقها متعاقبة . اذوارها خشوية ، كبيرة القند ، جميلة الالوان ، سننية الارتكاز . تتميز باستطالة انبوب الكرم وباسديتها المدرجة في قاعدة الزويز || اشهر اجناسها الملزوبة .

٢٧٥٨٤ - مَلْزُوم لِطَرَكَيْن (F). Synallagmatic

Synallagmatic, Reciprocal (E).

هو المقد الذي يلتزم فيه كل فريق من المتماثلين نحو الفريق الآخر .

٢٧٥٨٥ - مَلْزُوم مع غَيْرِه

هو الشريك في الالتزام .

٢٧٥٨٦ - مَلْزُوي (F). Amygdalaire

Amygdaloid (E).

نعت تعريفي يطلق على كل منجز يحوي بعض الحجات المتحجرة او بعض الحشويات .

٢٧٥٨٧ - مَلْس (F). Châtrer

To castrate, To geld (E).

ملس التخصية : استلها بمروقها . ولس الكيش : سل خصيتيه بمروقها فهو ملس والكيش ملوس .

٢٧٥٨٨ - مِلْسَان (F). Glossomètre

Glossometer (E).

هو مقياس اللسان ، جهاز تقاس به غراميم التحصيل لحرقة الاتراع الاصاح من فيرها في جرس رحيق الاظهار .

٢٧٥٨٩ - مَلْسَاوَات (F). Anacanthinians

رئية من الاسماك الطغيات .

٢٧٥٩٠ - مَلْسُوسِيَه * (F). سَلْجَ هِنْدِي

Melastoma (S). Mélastome (F). American gooseberry (E). Schwarzmund (D). Melastoma (I).

جنس مجمرات وجنات برية وزراعية من فصيلة الملسوسيات . مهدا المناطق الاستوائية . انواعها عديدة . اوراقها منتفخة ، متعاقبة سنانية التصل . اذوارها محورية الارتكاز او هامية . ثمارها لوبرية مسنجة العرف والطعم ، صعيها اسود اللون يدبغ اللسان والقم .

٢٧٥٩١ - مَلْسُوسِيَات (F). Melastomaceae (S).

Mélastomacées (F). Melastomaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين ، مستقلة القمالات ، منخفضات المبيض . اجناسها وانواعها زهاء ١٨٠٠ ، جميعها من نباتات المناطق الاستوائية . اوراقها كاملة متعاقبة . اذوارها خاسية التركيب .



ملسومة



ملسين



ملئى ارجوانية



ملئى جبالية



ملئى زرقاء



ملئى سامة



ملئى صفراء

٢٧٦١٢ - ملئى شرقية *Clematis orientalis (S)*.
Clématite d'Orient (F).
جنية عارضة عديدة الفصوص لطول من ٣ الى ٦ امتار.
اصطفاها الشرق من شط بحر قزوين الى منشوريا. واورقتها
مركبة، ثلاثية الفصوص القلبية الشكل، المسنة الحافة.
تصلها بحري اللين. ازهارها رباعية الفصول، قطرها نحو
٣ سم. || ازهارها يستمر من حزيران الى تشرين الاول.

* ملئى صفراء *

٢٧٦١٣ - ملئى صفراء *Clematis ochroleuca (S)*.
Clématite jaune (F).
بجلة فراء منتصبه تملو نحو ٦٠ سم. مهبها البلاد الامريكية.
اورقتها بسيطة لاطقة متعابلة، تصلها بيضى الشكل مالى
الصفحة. ازهارها حامية الارزكاز، فردية، صفراء اللون،
زيتية اللون، اجابية الشكل، متعابلة || ازهارها يستمر
من ايار الى حزيران.

* ملئى قلبية الورق، وطين

٢٧٦١٤ - ملئى قلبية الورق، وطين *Clematis angustifolia (S)*.
Clématite à feuilles étroites (F).
جنية دخلة مثبوتة تملو نحو ١٠٠ سم. ساقها منتصبه.
اورقتها مركبة. وريقاتها خضراء بسيطة او ثلاثية التفريغ،
مصنارة سامة. ازهارها كثيفة التجميع، خافتة الورد،
بيضاء اللون. تكثر في بعض الاسراج الربطية. تجملها
للمنازل ولا تنضرو منها.

* ملئى عنكبوتية

٢٧٦١٥ - ملئى عنكبوتية *Clematis paniculata (S)*.
Clématite à panicules (F).
جنية سرىوتية عارضة تملو نحو ٤ امتار. مهبها اليابان
وكوريا. واورقتها مركبة. وريقاتها خضراء او صباوية
الازواج، ريشية التركيب. تصلها بطول من ٥ الى ٨ سم.
ويمرض من ٢ الى ٤. ازهارها حثولكية التجميع، رباعية
الفصول القليلة، قطرها نحو ٣ سم. || ازهارها يستمر
ملول شهر ايلول.

٢٧٦١٦ - ملئى عتمى، مزهان، حبل مسكى *Clematis cirrosa (S)*.
Clématite à vrilles, C. tou-jours verte (F).
جنية عارضة برية وريبتية تملو من ٣ الى ٥ امتار.
حراقتها مركبة ثلاثية. واورقتها ابيدة بسيطة لا قياسية
الشكل. ازهارها قمية رباعية الفصول الخلية البشرة
لونها الى البياض الاخير تملو مائة وريبتية || مصارة
اورقتها قليلة المادة القلوية السامة لكنها حريفة تحرق
الجله || ازهارها يستمر من اذار الى كانون.

* ملئى قلبية الورق

٢٧٦١٧ - ملئى قلبية الورق *Clematis cordata (S)*.
Clématite à feuilles en coeur (F).
جنية عارضة تملو نحو ٦ امتار. واورقتها مركبة مشطية.
وريقاتها تده من ٥ الى ٧ ازواج، تصلها قلبي الشكل
مسن الحافة. ازهارها خلية الفصول البياض || ازهارها
يستمر من حزيران الى تشرين الاول.

* ملئى قلبية الورق

٢٧٦١٨ - ملئى قلبية الورق *Clematis apifolia (S)*.
Clématite à feuilles d'ache (F).
جنية سرىوتية عارضة تملو نحو ٣ امتار. اصطفاها الصين
واليابان. واورقتها مركبة كرسية الشكل. تصلها اخضر
اللون مسن الحافة. ازهارها عتقودية التجميع، صنية
الند، رباعية الفصول، بيضاء اللون، قطرها نحو ١٠ سم.
ازهارها يستمر من تموز الى تشرين الاول.

٢٧٦١٥ - ملئى *Clematis (S)*.
Clématite, Clématide (F). *Clematis (E)*. *Waldrebe (D)*. *Clématide (I)*.
جنس نباتات معمرة عارضة من المعلومات. انواعها عديدة.
اورقتها لا نظامية تكثر فيها الاشكال المركبة الريشية.
ازهارها عارضة البتلات تستعفى عنها بالفصل الملون المختلفة
الاجسام والاشكال || اعرف انواعها واشهرها ما يلي.

* ملئى ارجوانية *

٢٧٦١٦ - ملئى ارجوانية *Clematis coccinea (S)*.
Clématite écarlate (F).
جنية فراء منتصبه تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. فروها
جوية اللون. واورقتها متعابلة، لاطقة، بسيطة. تصلها
سائي الشكل، بارز العروق، خلى البشرة. ازهارها
ارجوانية اللون، اجابية الشكل تطلو نحو ٤ سم.
ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول.

* ملئى بحريرة

٢٧٦١٧ - ملئى بحريرة *Clematis maritima (S)*.
Clématite maritime (F).
جنية فراء منتصبه تملو نحو ١٢٠ سم. منبها الشطوط
البحرية. واورقتها مركبة، وريقاتها قديمة التفريغ
بحرية اللون. ازهارها صنية للند تبينة البياض || ازهارها
يستمر من ايار الى تموز.

* ملئى جبالية *

٢٧٦١٨ - ملئى جبالية *Clematis montana (S)*.
Clématite montagnarde (F).
جنية سرىوتية عارضة تملو من ٤ الى ٦ امتار. ساقها
وفروها جوية اللون. واورقتها مركبة مشطية. وريقاتها
الاجلية الشكل، عاقبة الخضار. ازهارها بيضاء اللون،
اجلية الارزكاز، مستطيلة المالحاق، كبيرة الند، قطرها
يراجح من ٥ الى ٩ سم. || ازهارها يستمر من ايار
الى حزيران.

* ملئى جرسية

٢٧٦١٩ - ملئى جرسية *Clematis campaniflora (S)*.
Clématite en cloche (F).
جنية سرىوتية عارضة تملو من ٣ الى ٤ امتار. واورقتها
مركبة ثلاثية. تصلها اخضر اللون عامد التستين. ازهارها
جرسية الشكل، رباعية الفصول الزرق، مستطيلة للمالحاق،
متعابلة || ازهارها يستمر من حزيران الى تموز.

* ملئى زرقاء *

٢٧٦٢٠ - ملئى زرقاء *Clematis viticella (S)*.
Clématite bleue (F).
جنية سرىوتية عارضة تملو من ٤ الى ٦ امتار. واورقتها
مركبة ثلاثية التثلث، وريقاتها صنية عامدة التستين.
ازهارها كبيرة الند، زرقاء اللون، قمية الشكل، رباعية
الفصول، قطرها يراجح من ٥ الى ١٢ سم. || ازهارها
يستمر من حزيران الى ايلول.

* ملئى سامة، و فراج

٢٧٦٢١ - ملئى سامة، و فراج *Clematis viticella (S)*.
Clématite des haies, C. br-lante, Herbe aux yeux, Berceau de la Vierge, Vigne blanche (F).
جنية مبولة عارضة تملو من ١٠ الى ٢٠ م. واورقتها
مركبة مشطية. وريقاتها تده من ٥ الى ٧ ازواج، تصلها
حبل الخضار الزاوي. ازهارها رباعية الفصول الخلية
البياض اللون، قطرها نحو ٣ سم. اسديتها وريقاتها بيض.
ازهارها يستمر من حزيران الى تموز. وهي تكثر في المالحاق
الربطية احصها السباحات. مصارتها غزيرة المادة السامة
النيشيط.

٢٧١٦٨ - مَلْثُفُون * Sicana odorifera (S).

Melocoton (F).

نبات زراعي حولي وحيد الجنس والنوع من فصيلة القرعيات. مهدد بعض مناطق أمريكا الجنوبية. يستعمل كجيش أنواع القرع في الطبخ ويستعمل أيضاً في تغذية الماشل وإثاقات الباعة لانه فواح العرف المستحب || ساقه عارضة تعلو نحو عشرة أمتار . حوائقها مجهزة بحمايس تمكئها من الالتصاق بأي سطح كان . أزواكه معتقة كلبية ، خاسية البتلات . ثماره قرعية الشكل تعلو من ٢٥ الى ٣٥ سم. لونها ، عند الإدراك ، الى الحمرة البرتقالية || تتركب الثمار مطبوخة قبل دعوها في طور الإدراك لان لبابها يتصلب عند الإدراك ويفوح منه اريج عطر ثابت يستقر بعض الوقت .

٢٧١٦٩ - مَلْثُوكَة Embryon (F). Embryo (E).

المادة الخلة المكثفة الناشئة التي يستمر بها الحيوان والنبات. وهي في الانسان مضخة وفي الحيوان نعمة وفي النبات نثيب.

٢٧١٧٠ - مَلِكُ الْعُقْبَان Aigle impérial (F).

هو العقاب القيصري ، اطلبها .

٢٧١٧١ - مَلِكَةُ النَحْل Reine des abeilles (F).

Queen-bee (E). هي النحلة الانثى البيض واسيرة ثول النحل والخلية والتغير .

٢٧١٧٢ - مَلْكَوَلِيَّة Malacologie (F).

Malacology (E). فرع من الزولوجية يبحث في شعبة اللينويات .

٢٧١٧٣ - مَلْكَوَك * Melicoccus (S).

Mélicou (F). Melicoccus (E). جنس اشجار وشجيرات برية عروق من فصيلة السابنديات . انواعها المعروفة قليلة العدد موطنها بعض المناطق الاستوائية من البلاد الامريكية ، اغصانها جويكة || سيقانها منتصبه كثيرة الفروع تعلو من ٣ الى ١٠ أمتار اوراقها ابيدة ، مركبة ، متعاقبة . وريقاتها شغمية العدد ، ثنائية او ثلاثية الازواج . نصلها جامدة الول ، يضيء الشكل . ازهارها حثكولي التجميع ، طرفي الازواك . ازهارها صغيرة يبيض اللون او وردية ، عطرية العرف . ثمارها نوية مأكولة اللباب والمصبات .

٢٧١٧٤ - مَلِكِيَّة Propriété (F).

Property, Ownership (E). هي حق الاستعمال والاستمتاع والتصرف في الشيء اطلاقاً في نطاق القانون .

٢٧١٧٥ - مَلِكِيَّة مُشْتَرَكَة Copropriété (F).

Joint property (E). هي حق ملكية مال منقول او ثابت موزع على افراد متعددين . وقد تكون الملكية المشتركة شاملة او غير شاملة .

٢٧١٧٦ - مَلِكِسُ رُومِي Dracodéphale moldavique (F).

هو رأس التين اللطاني ، اطلبها .

٢٧١٧٧ - مَلْثُوس * Melampus (S).

Mélampe (F). Melampus (E). جنس حيوانات بحرية من الرخويات مدميات الأرجل وفصيلة الحفصيات . انواعه المعاصرة المعروفة نحو ١٠٠

٢٧١٧٨ - مَلْثَى لَهَب ، مَلْثَى عَطِرَة ، قَمِيص

بنث الملك ، عَنَصَرَة

Clematis flammula (S). Clématite odorante, C. flammula (F).

جنية مبلولة عارضة تعلو نحو ٤ أمتار . اصطنها حوض البحر المتوسط . اوراقها مركبة شطية . وريقاتها ضيقة كثيرة العدد . نصلها لا قباسي الشكل . صهارته سامة حريفة كارية تحرق الجلد . ازهارها صغيرة القد غبراء اللون || ازهارها يستمر من حزيران الى تشرين الاول .

٢٧١٧٩ - مَلْثَى مُنْقَصِيَّة * Clematis recta (S).

Clématite dressée, Téverin (F). جنية خصاصه دقلة مبلولة تعلو من ٦٠ الى ١٢٠ سم . ساقها منتصبه جبهة . اوراقها مركبة ثنائية او ثلاثية الازواج . وريقاتها يضيء النصل ، بحرية اللون . صهارتها لا تكوي . ازهارها مكسبة ، عطرية ، يبيض اللون . ازهارها يستمر من ايار الى تموز

٢٧١٨٠ - مَلْثَم Péristome (F). Peristome (E).

ما يكتنف القم في الحيوانات الدنيا وما يحوق ثغرة الفطور ج ملائم .

٢٧١٨١ - مَلْثَاف ، حَنَرِيَّة Trouil (F).

Windless, Hand-winch (E). آلة بسيطة تستعمل لرفع بعض الاثقال .

٢٧١٨٢ - مَلْثُوف * ، كُرْثَب ، لَحْنَة Brassica oleracea capitata (S).

Chou, Chou cabus, Chou potager (F). Cabbage, Drum head cabbage (E). Kraut, Kopfkohl (D). Cavolo, Cavolo cappucco (I). بقلة زراعية من فصيلة الصليبيات . ضرورها واسرارها كثيرة العدد . جميعها ملطحة الاوراق المأكولة اثنية بعض الفيتامينات الصحية . تحليلها الرسمي يطلي :

٣٧.٠ ٪ من المواد الازوتية

٥.٠ ٪ من المواد العننية

٢٥.٠ ٪ من المواد الهيدروكربونية

٢٧١٨٣ - مَلْثُوفُ بَرُوكْسِل * Brassica oleracea gemmifera (S).

Chou de Bruxelles (F). Brussels sprouts (E). Brüsselar kohl, Rosenkohl (D). Cavolo di Brussella (I).

نوع من الملقوف الزراعي المأكول . تشابهه ضمية الشكل ، صغيرة القد ، تعد من ٦ الى ٢٠ أدرائها تدريجي يتتبع من الاسفل .

٢٧١٨٤ - مَلْثَاح * Gravid (F).

Gravid, Pregnant (E). الملقاح الحامل من الاناث او من كانت طالتها تمكئها من ذلك .

٢٧١٨٥ - مَلْثَاح * Malachra (S).

Malachra (F). Wild ochra (E). Malachra, Weichmalve (D). Gombo salvatico (I). جنس نباتات عشبية برية من فصيلة الملبازيات . انواعه المعروفة خمسة ، جميعها مرورية ، اصطنها البلاد الامريكية . اوراقها متعاقبة لا قياسية الشكل والتفصيص . ازهارها رويسية منها الالبيض والليلكي والوردي والاحمر .

٢٧١٨٦ - مَلْثَاط Pointe du bec (F).

Point (of the beak) (E). هو طرف منقار كل طائر إلا الكاسر .



ملثى منتصب



ملثوف



ملثوف بروكسل



ملثفون



ملثوك

Salinité, Salure (F).
Salinity, Saltiness (E).

٢٧٦٥٠ - **مُلَوَّحَة**

Corchorus olitorius (S).
Corète potagère, Corette potagère, Guimaube potagère, Mauve des Juffs, Mélochie (F). Jew's-mallow, Nalta jute (E). Judenmalve, Meluchie (D). Corcoro ortense, Malva del giardino (I).
ونهم من قال « ملوكة » ثبات حشبي بقلي حولي من لفصيلة الزرقونيات . يزرع لأوراقه الطويلة الناعمة التي تقيد المعدة والأمعاء . متطلبات زراعته ربة مروية غزارة خصبة يكثر فيها عنصر الأزوت العضوي أو المعدني .

منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة || اصداها شبه غروطية الشكل ، طرفية القولية المنسوبة الخطوط . فوجاتها مستطيلة مسنة الحفلات .

٢٧٦٣٨ - **مُلَمَّح**
مظهر الشئ الجانبي .

٢٧٦٣٩ - **مُلَمَّس**

٢٧٦٤٠ - **مُلَمَّس شُكْرِيّ**

٢٧٦٤١ - **مُلَمَّس لُحْي**

٢٧٦٤٢ - **مُلَمَّسِيّ**

ثمت تمرغبي يطلق على كل عضو حشري أو لثاني يحمل ملساً أو يقوم بوظيفة اللمس أو يشبه اللمس .

٢٧٦٤٣ - **مُلَمَّح**

ملح الطائر جناحه . ويقال لجناحي الطائر ملسماء .

٢٧٦٤٤ - **مُلَمَّكَة**

في غرطوم الفيل يتلصق به اللسان وإلما ويستعمله في الدفاع عن النفس وفي نقل الأثقال .

٢٧٦٤٥ - **مُلَمَّسِيَّوم**
Mélancé (F). Melanthium, Bunch flower (E). Braunblümchen (D). Melanthio (I).

جنس نباتات عشوية معمرة من الوردجيات . أزهاره للمروة ثلاثة ترعج في المواق الأرضية اللطيفة . سوطها نخيلة تطل من ٢٠ إلى ٦٠ سم . تنتهي بالحنافذ الزهرية التي يراوح ارتفاعها من ٥ إلى ١٠ سم . أوراقها قديمة ، غصية ، كثيرة العدد تطول من ٢٠ إلى ٣٠ سم . وتعرض ٦ إلى ١٨ م . أزهارها إلى البياض الاخضر المالح || أنزاعها يستمر من أيار إلى تموز . وصغير صقلها مع مطلق المواد السكرية . يقتل الذباب .

٢٧٦٤٦ - **مُلَمَّكُونِيَّس**

جنس فطور مجهرية من الرغيات ، راجع رفة .

٢٧٦٤٧ - **مُلَهَّاب** ، **أُلَهَّوب**

Lance-flammes (F). Flame thrower (E).
آلة تصدر اللهب وتلقده وهي تستعمل خاصة في مكافحة الجراد .

٢٧٦٤٨ - **مُلَهَّاب**

Pyrocaphalus (S).
Pyrocéphale (F).
جنس ملير من الجوارث سنيات المنقار وفصيلة القصبويات . أزهاره المروعة نحو ٦٠ أصطها تمتد من الحكيك إلى البرازيل إلى اجسامها صغيرة . رؤوسها متوجسة بطوار تشرف على التفتن . ألوانها متراكبة الألوان الزاهية الجسيلة يكثر فيها الأحمر الصانق الشبيه بلهب النار || قوتها الحشرات الصغيرة والذباب والحوام .

٢٧٦٤٩ - **مُلَوَّان**

Colorimètre (F).
Colorimeter (E).
هو مقياس اللون ، جهاز تقاس به ألوان السوائل لا سيما الحمر اذ يمتزجها نور النهار .



ملوس



ملب



ملوكة



ملورون



ملوك

٢٧٦٥٢ - **مِلَوْد**

Meloe (S). Mélod (F).
Oil beetles (E). Mäurwürmer, Ölkäfer (D).
جنس حشرات من الملويدات . أزهاره المروعة ١٢ أصطها المناطق المعتدلة الحارة من العالم القديم . اجسامها تطول من ١٠ إلى ٤٠ م . ذكورها أصفر قداماً من انثائها . أثوابها تراوح من الزرقة إلى السواد اللحي . يكثر وجودها في المراعي على الاعشاب البرية من نيسان إلى حزيران .

٢٧٦٥٣ - **مِلَوْد مِلَوَّن**

Meloe variegatus (S).
Mélod variable (F).
نوع من الملويد ، ثوبه إلى الزرقة الخضراء المالح ، حمار رأسه وكعوله وسر يمتد إلى الحفرة السفلى الذكر طويل نحو ١٢ م . والأنثى نحو ٣ م . || يكثر وجوده في نيسان وأيار . مسرعه الاعشاب والمراعي والأزهار البرية .

٢٧٦٥٤ - **مِلَوْدِيَّات**

Meloidae (S). Méloïdés (F).
Meloidae, Blister beetles (E). Blasenkäfer, Pflanzterkäfer (D).
فصيلة حشرات من مخفيات الاجنحة . اجسامها وانواعها عديدة ، جميعها ملوطة صغيرة اللثة أو متوسطة ، بعضها طبي . مرتعها الأشجار والأزهار والاعشاب . تفرز ، عند لمسها ، مادة صفراء اللون كريهة الرائحة . شواربها وبهجتها اللدوي يحويان مادة نافذة تنجج الجلد وتثير الاله || غروبها الاستشرابية صوبانية ، مركبة من ٩ إلى ١١ فاصلة . ارساخها خمسة التركيب باستثناء الحلقية فانها رباعية المفصل .

٢٧٦٥٥ - **مِلَوْر** ، **مِلَوْر** ، **مِلَوْر**

Mahurus (S).
Meure, Méron (F). Mahurus (E).
جنس ملير من الجوارث سنيات المنقار . أزهاره المروعة نحو ١٥ أصطها بلاد استرالية . ملجتها الحياتي جامعي . جامعاتها قليلة العدد . جميعها من الأرباب تألف الأبراج الميمرة الأشجار والبراري النملة . قوتها الحشرات اصمها الحمنية والتمل واللدنان وبعض الثآليل البرية || اجسامها صغيرة تطول من ١٢ إلى ١٦ م . تتميز باستعانة أذنانها وبكثافة سبالها . أثوابها متباينة الألوان فيها الاسود والاعضر والامس والاعضر الزهري والجلوي والكتشي والاشهب والاطمل والاشمع . أثواب الاناث لا تختلف في الثواب الذكور لكنها أقل زهاء ولعة || تدفن اعشاشها في الأدغال . انثاتها تحفن نحو ٦ بيضات على مرتين في الحول . الذكور تتارب الاناث في الحفن .

٢٧٦٥٦ - **مِلَوَّك**

Chêne égllops (F).
هو السيفيان الرومي ، اطلبه .

اصلها بحيرات وانهار الهند الصينية وقد انتشرت تربيتها في الاكوادوريم نظراً لجعلها وصفر قدما لانها لا تطول اكثر من ١٠ سم. ثوبها زبرجدي اللون مجلج بالاصفر والاخر. الذكر يجمع سره الانثى تحت قبة عاتمة يصلتها من النسالة واللعاب ويحافظ عليه دون انقطاع حتى التفت والانسلخ.

٢٧٦٦٩ - ميكيل Régulus (F). Regulus (E). الملك نجر ثير من كوكبة الاسد الاصفر. يبعد عن الارض نحو ٦٥ سنة ضوئية.

٢٧٦٧٠ - ميكيككة ، جمل Abellie mère, Ab. femelle, Reine (F). Queen bee (E). الملكة او الجمل الانثى الكاملة الشوار الشقي من النسل. تتميز بجسمها الاخير المستطيل. وظيفتها منح المازن للمحافظة عل استمرار النسل والتكاثر النومي || تساهل مرة واحدة في حياتها وتموت نحو خمس سنوات تمتع بتخلها ملايين المازن.

٢٧٦٧١ - ميليتر Millimètre (F). Millimetre (E). جزء من ألف من المتر.

٢٧٦٧٢ - ميليكرين Millimicron هو جزء من اصل مليون جزء قسم اليها المليمتر الواحد.

٢٧٦٧٣ - مكين Malléine (F). سائل يستخرج من تكثير قصيات الرمام ويستعمل في تشخيص هذا المرض في الخيل.

٢٧٦٧٤ - ملين Laxatif (F). Laxative, Opening (E). مسهل خفيف.

٢٧٦٧٥ - مكينكة Málnet (F). هي البرتة، عشبة مثمرة طيبة، اطلها.

٢٧٦٧٦ - مكيولا Meliola (S). جنس فطور مجهرية من فصيلة الوثنيات. انواعه عديدة معظمها من فطور المناطق الاستوائية. مشيها غليظ الشكل اسمر اللون دقيق الاهداب المشلولة الاطراف يذب حل بشرة الافناد والافنان والاورق ويشترك بمراشف ينقلها في النسيج. اصنامه الخارجية مكررة الشكل تلحف ازقاتاً عديدة تحضن البويضات. يوفاته، عند الادراك، سمراء اللون اهليجية الشكل لا قياسية الانقسام الجوي المحترق.

٢٧٦٧٧ - مكيون Million المليون : ألف ألف.

٢٧٦٧٨ - مكيون مفر Mégamètre (F). Mégaméter (E).

٢٧٦٧٩ - ممانكة ، شوككة Mimésisme (F). Mimesis, Mimicry (E). راجع شوكلة.

٢٧٦٨٠ - مماليل Identique (F). Identical (E).

٢٧٦٨١ - مُماد الماء : المروي من النبات.

٢٧٦٥٧ - ميلاكاف Filandreux (F). Fibrous, Stringy, Thready (E).

لمت تعري يطلق عل ما كان كثير الالياف من الثار والنسوم وغيرها.

٢٧٦٥٨ - ميلييب Maaliben (S). Málibe (F). Maaliben (E).

جنس دوبيات بحرية من الرغويات مديات الدوجل وفصيلة التبيدييات. انواعه الماصرة المعروفة قليلة العدد اعطائها معطر بحار البلاد الحارة || اجسامها هرياطة مستطيلة مبطلة، تطول من ٢٠ الى ٣٠ سم. رؤوسها كبيرة محزمة الشكل يملوها في ثقبها من منتصف الرأس الى طرف الجسم بعض الحليقات للنفقة || لونها الى الشبهة السمراء. حليقاتها شديدة السمره. اربطها صغيرة، قليلة المرض، مستديرة الاطراف.

٢٧٦٥٩ - ميليت سف نجر المرخ.

٢٧٦٦٠ - ميليت Meleeta (S). Meleeta (F). Melet (E).

جنس اسماك بحرية من مفتوحات المثانة وفصيلة الصابونيات. انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم بحار العالم || اجسامها صغيرة، شبه وشية الشكل، تطول من ١٠ الى ١٨ سم. رؤوسها معتدلة الجرم، صغيرة الاضطام والاشداق. زعانفها الظهرية فردية تتوسط الظهر. الخرسية شديدة الصغر تقابل الظهرية. اما الذيلية فضاقة. انواعها تراوح من الريدة النضية المواج الى الشبهة الرصاصية اشهر انواعها الثلاثة التالية :

٢٧٦٦١ - ميليت المتوسط Meleeta phalerica (S). Meleeta de la méditerranée (F).

نوع من المليات. يكثر وجودها في البحر الابيض المتوسط.

٢٧٦٦٢ - ميليت متدولة Meleeta sprattus (S). Meleeta commune (F).

نوع من المليات. يكثر وجودها في المحيط الاطلسي. تستعمل استهلاك البردين والبل.

٢٧٦٦٣ - ميليت سامة Meleeta venenosa (S). Meleeta vénéuse (F).

نوع من المليات. يكثر وجودها في المحيط الهندي. لحمها ذاصف السم ميت.

٢٧٦٦٤ - مليمج الجدي الرضيع. ج. ملج.

٢٧٦٦٥ - مليعكة Blongios nain (F).

هي الرواق الصغير، اطلها.

٢٧٦٦٦ - ميليغرام Milligramme (F). Milligram (E).

٢٧٦٦٧ - ميكياف Poisson-cheville (F).

المليفا سمكة بحرية تدعى سفرله، اطلها.

٢٧٦٦٨ - ميكيعة Macropodus (S).

٢٧٦٦٩ - ميكيعة Macropode, Poisson de paradis (F). Paradis fish (E).

سمكة نهريه وصيدة الجنس والنوع من كثيرات الزعانف.



مليت



مليكة



مليولا



مِسَاح



مَعْدَة



مِطَار

Retenus (F). Reserved (E). **مَمْسُك** ٢٧٧٠٠
حاجز طبيعي أو اصطناعي قليل الارتفاع يترسب مجرى
سبح الماء . ج ماسك .

Cocher (F). Auriga (E). **مَمْسُك الأُعْيَة** ٢٧٧٠١
مسك الاعة كوكبة نجوم خالية للمخ تسمى أيضاً ذو
الاعة ، اطلها . ونهم من مَمَّاء الناز .

Râteau (F). Rake (E). **مِمْسَاط** ٢٧٧٠٢
أداة يدوية تستعمل في تحطيط التربة قبل سفلها .

Telleuse, Tillouse (F). **مِمْسُكَة** ٢٧٧٠٣
Scutcher, Scutching-machine (E).
آلة تقشر سوق القنب والكتان تفصل عنها المشاق .

Pholadidae (S). **مِمْسُكَات ٥** ٢٧٧٠٤
Pholadidés (F). Pholadidae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرغويات صفيحيات الخياشيم .
اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد موطنها جمع بحار
العالم . اصلها صغرة لاقائية الشكل يكثر فيها اللون
الابيض والافقر والبني . اجسامها مجهزة بمصمات
اسطوانية الشكل . تعيش لاصقة بالاعشاب والصخور ||
أعرف أنواعها وأشهرها المِسَمَة .

Pholas (S). **مِمْسَمَة ٥** ٢٧٧٠٥
Pholade (F). Pholas (E).
جنس حيوانات بحرية من الرغويات صفيحيات الخياشيم ،
وفصيلة المصمات . انواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة
في منط بحار العالم . تعيش على الصخور والاعشاب
المعمورة ومن مميزات انها مجهزة بشفة تسفودية تمكها من
الاشعاع || لحومها مأكولة جيدة الصنف وقد تكون شاذية .

Siphonae (S). **مِمْسُكِيَات** ٢٧٧٠٦
Siphonées (F). Siphonae (E).
هي للصفيات ، فصيلة من الخفيات المنفر .

٢٧٧٠٧ **مِمْسَطَر * ، مِمْسَطَر ، مِمْسَرَان المطر ،**
Pluviomètre (F). **مِقْبَاس المطر**
Pluviometer (E).
جهاز يستعمل لقياس ارتفاع المطر الساقط في مكان ما .

Ductilité (F). Ductility (E). **مِمْسَطَرِيَّة** ٢٧٧٠٨
قابلية المثل .

Irrigué (F). Irrigase (E). **مِمْسُون** ٢٧٧٠٩
يقى بلقاء الجاري . يقال شجر ميمون وزراعة معمونة .

٢٧٧١٠ **مِمْسَكِر** للغة الحمراء الثمر .

Bifère (F). Biferous (E). **مِمْسِيل ٥** ٢٧٧١١
نمت ثمريني يطلق على كل نبات يزهر ويثمر في عام
واحد مرتين .

Salaisons (F). **مِمْسَلَات** ٢٧٧١٢
Salt provisions (E).
المأكولات التي تحفظ بطريقة التسلح .

Rouleau (F). **مِمْسَلَة ، مِمْسَلَة** ٢٧٧١٣
المسلة والمعلقة هما للامة ، اطلها .

Croisement (F). Crossing (E). **مِمْسَاكَة** ٢٧٧١٢
هي التصالب والكونة ، راجعها .

Tangente (F). Tangent (E). **مِمْسَان** ٢٧٧١٣

٢٧٧١٤ **مِمْسَان المَمَام ، تَطِير المَمَام**
Cotangente (F). Cotangent (E).

Tangential (F). Tangencial (E). **مِمْسَانِي** ٢٧٧١٥

Gradient **مِمَال** ٢٧٧١٦
هو فرق الضغط ابهرى الحاصل بين نقطة ما معينة وبين
محور الامصار . ج مالات || الممال الصميف يسيب
الزوايح .

Dédifférenciation (F). **مِمَالِيَّة ٥** ٢٧٧١٧
هي المفاضلة ، اطلها .

٢٧٧١٨ **مِمْسَخَاف ، مِمْسَخَف ، مِمْسَخَفَة**
Délaiteuse, Baratte (F). Churn (E).
آلة نابذة لفصل الكماء من الحيفض . راجع ابريج .

Bâtard (F). Bastard (E). **مِمْسَكِر** ٢٧٧١٩
كل حيوان يتصلب بخلق أو صفات نوحية دون خلق أو
صفات اباله وأجداده .

Paracel (F). Paracel (E). **مِمَسَر** ٢٧٧٢٠
فلج رجب بين الحشاف البحرية متدل القود أو يميده
يسمع بمرود البواخر والسفن .

Hâfil (F). Forward (E). **مِمَسَاح** ٢٧٧٢١
هي صفة التربة التي تسوق النبات ليسرع في ادراكه .

Coulard (F). **مِمَسَرَاط** ٢٧٧٢٢
المراط والصمطاء والمثاق هو كل نبات معرض لسقوط
الزهر أو املاص الثمر بعد الملقه .

٢٧٧٢٣ **مِمَسَرَاك** راجع خصب .

Grande chéldoine (F). **مِمَسَرَان** ٢٧٧٢٤
هو عروق الصباغين ، اطلها .

Macinteur (F). **مِمَسَرْت ، مِمَسَرَس** ٢٧٧٢٥
Macerator (E).
آلة الثمر تستعمل في معاليل الشا والسكر والتفطير .

Souille (F). **مِمَسَرَح ٥ ، مِمَسَرَح ٥** ٢٧٧٢٦
Wallowing-place (E).
كل مكان مستنقع تتصرف فيه الابل والقطا والخنازير .

٢٧٧٢٧ **مِمَسَرَفَة**
الممرقة هي المي الاعور ، اطلها أعور .

Brasserie (F). Brew house (E). **مِمَسَرَرَة** ٢٧٧٢٨
هي المعمل الذي تصنع فيه البيرا .

Graphomètre (F). **مِمَسَرَاك ٥** ٢٧٧٢٩
Graphometer (E).
مقياس المساحة ، جهاز يمكن من قياس الزوايا والمساحة .

27714 - مَنَازَة - مَنَازَة
Manne (F). Manna (E).
مادة سكرية أو بالاحرى مزيج من السكر والمنسبت
والسكرين تفرزه بعض النباتات اما طويلاً او بواسطة
حز اللحاء او بتأثير وخر بعض الحشرات كقرمزية المن
وزيز المران وغيرها || والمن يقع على اشكال عديدة
تختلف باختلاف مصادر وطرق جمعها . اما النباتات
التي تفرز للمن فكثيرة العدد اشهرها الاثل النيلي والحوير
والشيخ والمقول والمران التي .

27715 - مَنَازَة - مَنَازَة
Puceron (F).
هو الأرق ، اطلبه .

27716 - مَنَازَة - مَنَازَة
Aphis lanigera, Eriosoma lanigerum, Myzoxylus
mali, Schizonura lanigera, S. americana, S. crataegi
(S). Puceron lanigère (F). Woolly aphid (E). Blus-
laus (D).
حشرة صغيرة القد من الرقيات ، تركب التفاح من براعم
الى جلوره . تمسح ضمن نطاق من النوازل الشمعي المتراكب
الذي يشبه ندف القطن || اغاروه وبخية العاقية . يكافح
عند ظهوره باستعمال احد الحواشير الفعالة نفساً على
الاشجار ويجعلها لتسكين وصول السائل الغدا الى منش
الجلور .

27717 - مَنَازَة - مَنَازَة
Spalacidés (F). Spalacidae (E).
هي فصيلة الخلدات من رتبة القوامس .

27718 - مَنَازَة - مَنَازَة
Climat (F). Climate (E).
هو مجموعة العوامل الجوية المميزة . راجع اقليم .

27719 - مَنَازَة - مَنَازَة
Climatérique (F). Climatic (E).
كل ما له صلة بالمناخ .

27720 - مَنَازَة - مَنَازَة
Borne (F).
Landmark, Milestone (E).
ما يوضع لاشهار حدود المقار او الملك . وما يوضع على
الطرقات العامة للارشاد واستدلال المسافة .

27721 - مَنَازَة - مَنَازَة
Pupidae (S).
Pupides (F). Pupidae (E).
فصيلة من الرغويات مغذيات الاربيل رزوية . اجناسها
وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم البلاد المعتدلة
الحارة من السواحل الى الجبال والجرود ، ترطب في المواقع
الرطبة ولا تخشى الصقيع || اصنافها شبه اسطوانية الشوزن
متفاوتة الاحجام تبدو كالأبراج او المنارات || احراف
اجناسها واشهرها الخانة والشلوط .

27722 - مَنَازَة - مَنَازَة
Rorqual commun (F).
هي الحركول المعروف ، اطلبه .

27723 - مَنَازَة - مَنَازَة
Pupa (S).
Pupe, Mallot (F). Pupa (E).
جنس حيوانات برية من الرغويات مغذيات الاربيل وفصيلة
المنارات . انواعها المعاصرة المعروفة عديدة منتشرة في معظم
اصقاف البلاد المعتدلة الحارة ، ترطب في المواقع الرطبة
ولا تخرج من مكانها الا بعد اول بحماية مطر || اصنافها
شبه اسطوانية الشوزن تقضي مع الاقتراب من المقب .
جميعها بحارزة وبعضها او مسج او ماس . اجسامها
قصة احسام الخلا : .

27714 - مملكة - مَنَازَة
Règne (F).
Kingdom (E).
اول قسم في تصنيف الاحياء والجماد . يقال مملكة او عالم
الحيوان ومملكة او عالم النبات ومملكة الجماد .

27715 - مملكة - مَنَازَة
Règne minéral (F).
Mineral kingdom (E).
هي مملكة الكائنات الطبيعية الخارجة عن نطاق الحيوان
والنبات ، التي لا تتناسل ولا تتحرك .

27716 - مملكة - مَنَازَة
Règne animal (F).
Animal kingdom (E).
المملكة الحيوانية قسم من الكائنات الحية تتغذى بالنبات
والحيوان وتتكاثر وخص وتتحرك وتتغذى . اسماها عديدة
تتضمن بوسيدات الحية وتنتهي بالحيوان الناطق .

27717 - مملكة - مَنَازَة
Règne végétal (F).
Vegetable kingdom (E).
المملكة النباتية قسم من الكائنات الحية . تحلها العامة :
تتناسل من بعضها لكنها لا تحس ولا تستطيع الانتقال
من مكان الى آخر . هي تمتد ملايين الانواع تجمعها اربعة
اقسام رئيسية || اولها كثرية ، اي اسفلها دجبة ،
المشريات وهي عادمة البذور والسوق والاوراق كالحفريات
والفطريات || ثانياً الطحليات وهي تشمل الطحالب
والكبديات || ثالثاً مستويات ترزهر الزوائية وهي تشمل
السرغاس والامروسيات والخلدريات || رابعاً البوريات وهي
تشمل مريانات البور وبعائيات البور . من مريانات
البور الهروطيات والسكاسيات . ومن وعائيات البور
ريجات الفلقة وشائيات الفلقة || الرسم البياني تتابع
« نجمة الانساب النباتية » يميز الاقسام وقروها ويصنف
درجات سلم الانزقاء النباتي من البدييات ذوات الحلية
الواحدة الى البعائيات ذوات ملايين الخلايا .

27718 - مملكة - مَنَازَة
Eclat (F).
Fragment (E).
كل قبيلة نباتية يرز لها جلور تمكها من الحياة
المستقلة نيا او فصلت وزرعت رسماً .

27719 - مملكة - مَنَازَة
Terre noire fertile (F).
المسنة : الارض السوداء الخصب .

27720 - مملكة - مَنَازَة
Nectrioidaceae (S).
Nectrioidacées (F). Nectrioidaceae (E).
فصيلة تطور مجهرية من رتبة الزوويات . اجناسها وانواعها
عديدة لا مؤذية . تتميز بوظيفتها الجملية التركيب المحصورة
في الانسجة النضلية التي تمسحها عند انتشارها . نيسا
يصرح من الاسفر الى الاحمر القرميدي . بكتيداتها
صغيرة . بويقاتها شفافة ومستطيلة .

27721 - مملكة - مَنَازَة
Mammée (F).
هي الجباس ، اطلبه .

27722 - مملكة - مَنَازَة
Mammée d'Amérique
هي جباس امريكة ، اطلبه .

27723 - مملكة - مَنَازَة
Glacière (F).
هو الماشيا ، اطلبه .



من قطن



منارة

٢٧٧٤٦ - مَنَازِلُ (F). Nucleole (F). Nucleolus (E).

النواة اللدنية الرئيسية. وضو التناسل في الخليات.

٢٧٧٤٧ - مَنَازِلُ (F). Monine, Guanon (F).

She-monkey (E).

لفظ أثنى القرد. ومن اسمائها القردة والدحية والالفة.

٢٧٧٤٨ - مَنَازِلُ (F). Munna (E). Munna (S).

جنس دويبات بحرية من القشريات العليا متساويات الارجل وبصيلية النوبريات. انواعها المرفوعة قليلة العدد منتشرة في البحار الشتالية || اجسامها صغيرة مبططة، مستعرضة الرؤوس، كبيرة العين الجاحضة. قوائمها متساوية الشكل والظرف باستثناء الزوج الامامي الاول التحول الى ملاحظ فكية.

٢٧٧٤٩ - مَنَازِلُ (F). Pâturage (F).

هو الملتصق، اي المرعى الطبيعي.

٢٧٧٥٠ - مَنَازِلُ (F). Pore de la peau (F).

Pore of skin (E).

ج منافع. والمناخ هي المناظف المهيمنة الطبيعية الموجودة في بشرة الجلد عند الانسان والحويوان.

٢٧٧٥١ - مَنَازِلُ (F). Gerموir (F). Hot-bed (E).

اذاة ومائية توضع فيها البزور المطلوب انتاشها.

٢٧٧٥٢ - مَنَازِلُ (F). Usufruitier (F).

Usufructuary (E).

هو الذي يملك حق الانتفاع.

٢٧٧٥٣ - مَنَازِلُ (F). Falsances (F).

Dues (E).

ما يزداد من المنافع على حصة صاحب الارض.

٢٧٧٥٤ - مَنَازِلُ (F). Chenopodium vulvaria (S).

Vulvaire, Anserine fetide, Arrache puante (F). Stinking goose-foot, Dog's orache (E). Stinkender Gäusefuss (D). Chenopodium fectio, Atriplice puzzolana (I).

نبات كره الرائحة من فصيلة السرمقيات. اوراقه متعاقبة متعككة كاملة طلعها اللون. ازهاره عنقودية التجميع تحوي مع اوراقه بعض المواد الصمغية والانسار الفعالة ككربونات الامونيوك ونترات البوتاس التي تلغض منها الرائحة الكريهة.

٢٧٧٥٥ - مَنَازِلُ (F). Prégermée (F).

صفة البزور التي دخلت في طور التصلع او البروز قبل وضعها في التربة.

٢٧٧٥٦ - مَنَازِلُ (F). Coulard (F).

هو المرطاب، راجع.

٢٧٧٥٧ - مَنَازِلُ (F). Chelranthus (S).

Giroflée (F). Gilliflowers (E).

الاسم العلمي من العربي. والحويري جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة الصليبيات. انواعها ١٢ منها الحولية والحرولة والمعمرة. سوقها عشية خشبية. اوراقها متعاقبة بسيطة سنائية. ازهارها عنقودية التجميع صفراء اللون او حمراء || والمنتشر اسم شامل يطلق ايضاً على اللتيلا الشجيرة به.

٢٧٧٤٥ - مَنَازِلُ الْقَمَرِ (F). Etapes de la lune (F). Stage of the moon (E).

منازل القمر ثمانية وعشرون. ينزل القمر كل ليلة بواحد منها من مستطلة الى ثمانية وعشرين ليلة من الشهر. ثم يكون الحاق. فان كان الشهر تسعاً وعشرين يوماً استمر ليلة ثمان وعشرين وان كان ثلاثين استمر ليلة تسع وعشرين. والرب تقسم هذه المنازل الى قسمين وتسمى اريمة سفر منها شامية واريمة عشر مجانية. فالشامية، بترتيب قولها، تجتدي بالشرطين ثم البطين والثرى والذبران والمهقة والهمنة والذراع والثرثرة والظرف والجبنة والزبرة والصرة والمواد والباك || اما الجانية فلها الفجر ثم الزبانا والاكليل والقلب والثرثرة والنام والبلدة وسعد الاابع وسعد بلع وسعد السعد وسعد الاشعية والفروع الاول والفروع الثاني وتنتهي ببطن الحوت المعروف ايضاً بالرشاء.

٢٧٧٤٥ - مَنَازِلُ (F). Organes reproducteurs (F).

Reproductive organs, Sire organs (E).

هي الاعضاء التناسلية في الحيوان عامة.

٢٧٧٤٦ - مَنَازِلُ (F). Immunité (F). Immunity (E).

سلامة الجسم من الامراض وقوته الفعالية. والمناعة قد تكون طبيعية او اكتسابية. راجع حصانة.

٢٧٧٤٧ - مَنَازِلُ (F). Résistance (F).

Resistance (E).

٢٧٧٤٨ - مَنَازِلُ (F). Adjudication au rabais (F).

راجع مزاد الناقصة.

٢٧٧٤٩ - مَنَازِلُ (F). Restrictive allocation (E).

Adjudication restrictive (F). Restrictive allocation (E). نوع من المناقصات لا يكون باب التنافس فيها مفتوحاً لكل راضٍ بل يقتصر فيها على بعض المتنافسين عن تشجيع الادارة بعد استبعاد الآخرين.

٢٧٧٤٠ - مَنَازِلُ (F). Hélophyte (F). Helophyte (E).

نمت لمرعي يطلق على كل نبات يعيش وينمو في اوسال المستنقعات غير الماطة.

٢٧٧٤١ - مَنَازِلُ (F). Rémiges secondaires, Favillons (F).

Wing secondaries (E).

من ريش جناح الطائر ما يتبع صف القوام ويتقدم الخواوي. الواحد منكب.

٢٧٧٤٢ - مَنَازِلُ (F). Praticabilité (F).

Praticability (E).

هي التيسير في النج والعمل تهيئاً للامانة.

٢٧٧٤٣ - مَنَازِلُ (F). Manœuvres dolosives (F).

Swindling (E). اعمال خارجية مادية يخدع بها فاعلها شخصاً آخر. وهي من طرق النش والخداع التي ينص عليها القانون.

٢٧٧٤٤ - مَنَازِلُ (F). Habitat (F).

المكان الذي يقيم فيه هذا النبات فيعيش فيه طويلاً او طويلاً.

٢٧٧٤٥ - مَنَازِلُ (F). Source (F). Spring (E).

المكان الذي ينبع منه الشيء كالماء والنفط الخ...



منَة

27768 - مِينْجَل
Faucille (F).
Sickle, Reaping-hook (E). أداة يدوية تستعمل للحش .

27769 - مِينْجَل مَائِي
Faucard (F).
Long-handed scythe (E). منجل خاص مستعمل المقيض يستعمل في حش النباتات المائية .

27770 - مِينْجَلِي
Falciforme (F).
Falcate, Falciform (E). نمت وصني يطلق عل ما كان شكله شكل المنجل .

27771 - مِينْجَم
Gisement, Mine (F).
Lie, Loyer, Mine (E). مقيع المدن في جوف الارض .

27772 - مِينْجَلَكَة
Rucher (F).
Stand or shed for bees (E). المنحلة والعسيرة والنحيتة هي مجموعة القفران أو الحلايا التي يتجمعها النحال .

27773 - مِينْجَنَم ، أَوُور
Courbe (F).
Graph, Graphic curve (E).

27774 - مِينْجَنِي الْأَصْلَاع
Curviligne (F).
Curvilinear (E).

27775 - مِينْجَنِيَات الْإِرْتِفَاع
Courbes de niveau (F). Contour lines (E). هي خطوط الرهاء ، راجعها .

27776 - مِينْجَاب *
Calibreur (F). Jiggerer (E). آلة تخبب الخبار أي تفرقها وتوزعها بحسب أبعادها .

27777 - مِينْجَر
Naseau (F). Nostril (E).

27778 - مِينْجَرِيَات
Foraminifères (F).
Foraminifera (E). رتبة حيوانات دنيا من الجدریات .

27779 - مِينْجَس
Aiguillon (F). Goad, Sting (E). عصا طويلة منسارية الطرف ينخس بها بقر الحراثة .

27780 - مِينْجَسِيَات
Porte-aiguillons (F). هي الحيوانات ، راجعها .

27781 - مِينْجَسِيَةِ الْمَيْض
Inférovariés (F).
Inferovariés (E).

لعت تعريفي توصف به ازهار النبات المنخفضة المبيض من فئة المصنعات التعاللات .

27782 - مِينْجَل ، مَقْطَف
Blutoir (F).
Bolter (E).

27783 - مِينْجَدَاة *
Vaporisateur (F).
Vaporizer, Sprayer (E). جهاز يستعمل لنفخ السوائل وذررها كالندى .

27784 - مِينْجَدَال *
Conocéphalus mandibularis (S). Conocéphale (F). حشرة من الجنادب وفصيلة القبطيات . ثوبها ثنائي اللون ، اعصر الكوسل والبطن والبقران ، اسم الرأس والفرج والسيقان . جسمها صغير اللد يطول من ١٩ الى ٢٢ م . جناسها بلحمان الجسم والسررك والفرج . ساقها تطلون من ١٦ الى ٢٠ م . مرزها وسرركها مستطيلان جالسان

27785 - مَشُور أَصْفَر * ، عَيْرِي أَصْفَر
Cheiranthus cheiri (S). Giroflée commune, G. jaune, G. de muraille, Carafée, Violier jaune, Ravenelle (F). Bleedingheart, Wall-flower, Yellow gillflower (E). Goldlack, Letucoe (D). Violacciocco giallo, Bastone d'oro, Ramo d'oro (I).

نوع من المشور الأترشي . يملكه سر رتيبة و عمرة ، فرهاد ، تملو من ٣٠ الى ٥٠ سم . اوراقها كاملة منقطة ، نصلها بحري اللون ، سناني الشكل ، خلي البشرة حل صفحتيه . ازهاره عبقريه التجميع ، تاجي الاينكاز . ازهاره عطرية العرف ، صفراء اللون || ازهاره يستمر طوال الربيع والصيف .

27786 - مَشُور بَرِّي * ، شِمَشْم ، عَيْمِغِم
Matthiola livida (S). Matthiola livide, Giroflée livide (F). Gillflower (E). Levkoje (D). Violacciocco (I). نوع من المتيولا البرية الملبلة يملو من ٢٠ الى ٣٠ سم . ازهاره عبقريه ، طرفية ، منفرقة ، قليلة العدد ، لونها الى الصفرة الزيتية اللامعة يملوها تزييح ضيق اسم || ازهاره يستمر طوال الربيع .

27787 - مَشُور شَقْوِي *
Cheiranthus incanus, Matthiola incana (S). Giroflée quarantaine, G. d'hiver, Cocardeau, Violier (F). Gillflower, Queen's stock, Stock (E). Gemelne Gartenlevkoje, Winterlevkoje (D). Viola, Flor barco, Flor bono (I).

نوع من المشور الحولي والحويل وهو بالحقيقة نوع من المتيولا . سرويه واصرامه كثيرة العدد . نباتاته تملو من ٣٠ الى ٨٠ سم . سوقها غشيشة فرهاد . اوراقها منقطة احليجية الشكل . نصلها بحري اللون ، الحبل المزلج ، خلي البشرة حل صفحتيه . ازهارها عبقريه التجميع يكثر فيها المكبس وفي صارية العرف مختلفة الالوان منها الاحمر والبنفسجي والودي والابيض والاصفر والمزق والموشح . ازهاره يستمر من اذار الى تموز .

27788 - مَشُور تِيكِي
Giroflée des jardins (F). هو المتيولا المكسبة ، اطلبها .

27789 - مَشْج
منج : المنج : الماش الاخضر .

27790 - مَشْجَا ، مَشْجَر ، مَشْجُو ، مَشْجَا
Manglier (F). Mango tree (E). هي شجرة الانج ، اطلبها .

27791 - مَشْجَاة * ، مَشْجَاكِيَة ، مَشْجَاكِيَة
Mangue (F). Mango (E). هي ثمرة الانج ، تكثر من افيد ثمار البلاد الحارة ويقال انها تلطش الدم وتفيد الامعاء .

27792 - مَشْجِي
Mangabey (F). هو الحويل ، من القردة البالغة ، اطلبها .

27793 - مَشْجَعَرَات
Orycteropidae (S). Orycteropidae (F). هي فصيلة الحافرات من رتبة الورد .

27794 - مَشْجَع
Pâturage (F).
Pasture, Grazing (E). هو المتج ، مرج طبيعي اقل حشبا من المرعى .



مشور اصفر



مشور بري



مشور شوي



* منجاة



مثال



مَنَدُوسَة البازِلَا



مَنَدُوسَة لِيَقِيَّة



مَنَدُوسَة العَدَس



مَنَدُوسَة الفُول



مَنَدُوسَة اللُّوبِيَاء

* مَنَدُوسَة البَيْكِيَّة * ٢٧٧٩٧

Bruchus brachialis (S). Bruche de la visco (F).
Vetch weevil (E). Zottelwickenkäfer (D).

حشرة وأشة خاضعة حابية من فصيلة المنوسيات ورتبة مغلقات الاجنحة. موطنها يشمل معظم اقاليم حوض البحر الابيض المتوسط ويمتد الى داخل الشرق الاقصى واوروبية. تألف زبانات البَيْكِيَّة اُليًا كانت والبراري التي تنبت فيها الانواع البرية. غلافها قميش على طلع الازهار وبتلها. يرقاتها تعيش على الحبوب فتتغذى || جسمها صغير القد بطول من ٢ الى ٤ سم. ثوبها الى الرعدة السوداء يملؤها في كوسها بقبحة يفسدها تمام الجفانة وبقبة اخرى صغيرة في المقدم. رأسها صغير الجرم. عينها كبيرتان. زباناها صريحايتان. منكبها مستطيل الشكل، مزق الطرف. ظهرها لا يلحف كامل البطن. غلهاها تساعيتان الصغيز القلطب. ظنايبها مجهزة بمناخس حادة || لها جيل واحد في الحول. تخرج الحشرة الجملانة من بيئاتها الشتوي في اواخر ايار. تساقد بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع. ويبيض اللون بعد متعه بنحو خمسة ايام || البرقة عند تمام ادراكها، اي بعد التقف بنحو ثلاثة اسابيع، تطول نحو ٧ سم. ثوبها الى الخشنى الاخير. رأسها اسمر. سكتها الشريعية بمجزة يسركين دقيقين || طور الاكمال يستمر نحو ستة ايام ويتقضي في الحبة حيث كانت البرقة. ثم تخرج الحشرة الجملانة من الحبة وتتوجه الى حيث تختبئ لتقضاء بيئات الشتوي.

* مَنَدُوسَة العَدَس * ٢٧٧٩٨

Bruchus lentis, B. pallidicornis (S). Bruche des lentilles (F). Lentil weevil (E). Linsenkäfer (D).

حشرة من المنوسيات. طولها نحو ٣ سم. ثوبها الى السمرة تملوها زغبة بنية ويقع غبار، اللون قالبة الانقسام || جيلها الحولي واحد. تركيب الطمس فتتخر الحبة وتقيم فيها.

* مَنَدُوسَة الفُول * مَنَدُوسَة الفاصوليا * ٢٧٧٩٩

Bruchus rufimanus (S). Bruche de la fève (F). Bean beetle (E). Speisebohnenkäfer (D).

حشرة من المنوسيات طولها يراوح من ٤ الى ٥ سم. ثوبها اسود اللون يملوه زغب غلي اطحل اللواج || جيلها الحولي واحد. تركيب القول فتتخر الحبة وتقيم فيها مع يرقاتها.

* مَنَدُوسَة اللُّوبِيَاء * ٢٧٨٠٠

Acanthoscelides obsoletus (S). Bruche du haricot (F). Common bean weevil (E). Speisebohnenkäfer (D).

حشرة من المنوسيات طولها يراوح من ٣ الى ٤ سم. ثوبها الى الخشنى، زغبها اطحل اللون. زباناها مشارية الشكل. جيلها الحولي واحد. تركيب اللوياء فتتغذى وتقيم فيها مع يرقاتها.

* مَنَدُوسَة التفل * ٢٧٨٠١

Bruchidius trifolii (S). Bruche des tréfoles (F).

حشرة من المنوسيات طولها ٢ سم. ثوبها اسود اللون، ظهرها غشط بالابخر. قوائمها وزباناها سود || جيلها الحولي واحد، تركيب مع يرقاتها يلدو التفل على انواعه.

* مَنَدُوسَة صِينِيَّة * ٢٧٨٠٢

Callosobruchus sinensis (S). Bruche chinoise (F). Cowpea weevil (E). Chinesischer Bohnenkäfer, Kundkäfer (D).

حشرة من المنوسيات طولها يراوح من ٢ الى ٣ سم. ثوبها

لما البرك فسن الحافة الداخلية || وهو من الجنادب التي تألف المراعي والاماكن المشبة. قوته المواد النباتية اخصها المصف والاوراق.

Appontement (F).

Flying-bridge (E).

مقالة بحرية تقوم على الركائز تستعمل لشد السفن، بقلوسها، اليها منه الشحن او التفريغ. ج. منادح.

Menodora scabra (S). مَنَدُورَة خَشِيَّة * ٢٧٧٨١

Ménodore scabra (F).

جنية سمرة وحيدة الجلس والنوع من فصيلة الزبقيات. مدها المكسك والمناطق المجاورة من الولايات المتحدة الامريكية تزروع لتزين || ساقها قصيرة تملو من ٢ الى ٤ سم. فروعها مزواية اوراقها صغيرة خيشية النصل طولها نحو ٢٠ سم. وضرعها ٣ سم. لونها الى الخضار الاصفر اعجازها وبقيّة صفراء اللون طعنها نحو ٢ سم. || تنمو في يستمر طولها فصل الصيف.

Mandariner (F).

Mandarin orange tree, Tangerine orange tree (E). هي شجرة الليمون الاندي اي اليوني، اطلها.

Mandarine (F).

Mandarin, Tangerine (E).

ثمرة المنترين اي اليوني او الليمون الاندي.

Adné (F). Adnate (E).

* مَنَدَحِيم * ٢٧٧٩٩

Zygomorpha (F).

Zygomorphous (E).

لعت تعريفي يوصف به كل نبات زوائده الزغرية متشابهة متحدة.

Protractile (F). Protractor (E). مَنَدَح * ٢٧٧٩١

Amaranta tricolora (F).

هو الطليقة الثلاثية الالوان، اطلها.

Mendélien (F). Mendellen (E). مَنَدَلِي * ٢٧٧٩٢

لعت تعريفي يطلق على كل قاعدة او عملية بنيفقة من ملهب مندال الوراثي.

Mendélieme (F). Mendellern (E). مَنَدَلِيَّة * ٢٧٧٩٤

هي ملهب متدل في الوراثة، مخلصه ان النبات يتوارث صفات معينة دون غيرها وذلك ينسب بمحدودة مضبوط لا شذوذ بها.

Monodora (F).

* مَنَدُورَة * ٢٧٧٩٥

شجرة تسمى حيدلان، اطلها.

* مَنَدُوسَة البازِلَا * ٢٧٧٩٦

Bruchus pisorum (S). Bruche du pois (F). Pes beetle (E). Erbsenkäfer (D).

حشرة من المنوسيات. طولها يراوح من ٤ الى ٥ سم. ثوبها الى السمرة، ظهرها مبيط بالابخر، زغبها حشطي. جيلها الحولي واحد. تركيب البازِلَا دون سواها فتتخر الحبة وتقيم فيها ولا يوبد في الحبة الواحدة سوى حشرة او رقعة.

٢٧٨٢٢ - منسل ، غُدَّة منسليَّة

Gonade (F). Gonad (E).

هي الغدة التي تنتج البويضات وتفرز الهرمونات. لذلك فانخصية هي المنسل الذكري والمبيض هو المنسل الانثوي ج منسل.

٢٧٨٢١ - منسل

Narins de poisson (F).

Nostril of the fish (E).

المنسل ج مناس. هو منخر الاسماك خاصة.

٢٧٨٢٥ - منسل

Aspidium lonchitis (S).

Aspidia (F). Holly fern, Shield fern (E). Schilfarn (D). Capulvenara doppio (I).

نوع من السراخس البسيجات المصورة. ضروره مدينة منها البرية والثرينينة. يرغب في الارربة الرملية وفي المواقع الرطبة. ابروته مدادة. اوراقه منتصبه، مراحه مثله الزوايا ، زركامه حامدة للفناء، لونه الى الخضار الاصفر. يزرع في المراكب فيجيده.

٢٧٨٢٦ - منسليَّة

Mancenillier (F).

هي الصابة ، اطبا.

٢٧٨٢٧ - منسوب

Homogène (F).

Homogenous (E).

٢٧٨٢٨ - منسوبيَّة

Relativisme (F).

Relativism (E).

المنسوبية مذهب فلسفي يقول بنسبية المعرفة حتى في الزمان والمكان.

٢٧٨٢٩ - منسوح

Lazardé (F). Cracked (F).

ما كان النسيج ميه.

٢٧٨٣٠ - منسوي

Méristématique (F).

Meristematic (E).

منطقة الكائنات الخليوي حيث التنج الانشائية.

٢٧٨٣١ - منسكة

Trucherau (F).

هي الميفاريقون المعروف ، اطليه.

٢٧٨٣٢ - منسأ

Origine, Source (F).

Origin, Spring (E).

هو مصدر الشيء او منبئه.

٢٧٨٣٣ - منسأ

Amidonnerie (F).

Starch-works (E).

هي العمل الذي يصنع فيه النشا.

٢٧٨٣٤ - منسأ

Plastotype

نعت تعريفي يطلق على كل جزء التي يتأثر بالهضم فيتنطور.

٢٧٨٣٥ - منشار

Scie (F).

سمكة بحرية من الاثلاق ، مشهورة باسم ابو منشار.

٢٧٨٣٦ - منشار

Scie (F). Saw (E).

اداة يدوية أو آلية تعمل في نشر الاعشاب والمواد والحجارة الخ.

٢٧٨٣٧ - منشاري

Serriforme, Serrulé (F).

Serriform (E).

نعت تعريفي رمي يطلق على كل ما كان تفريص حالته يشبه استنار المنشار.

٢٧٨٣٨ - منشاريات

Pristidae (S).

Pristidae (F). Pristidae (E).

فصيلة اسماء من رتبة الاثلاق.

٢٧٨٣٩ - منشاريات

Tenthréinidae (S).

Tenthréinidae (F). Tenthréinidae, Sawflies (E).

Blattwespen, Sägewespen (D).

فصيلة حشرات من رتبة غشائيات الاجنحة. اجناسها وانواعها كثيرة العدد ، جميعها صغيرة لثقل طولها يراوح من ٣ الى ١٥ سم. ارجلها مختلفة الألوان. قربها الاستشارية خيطية || ريقاتها دودية عديدة الارباع تحمل عادة دون الثانية أو أكثر من ١٦ وهي باكرتها خائبة ومنها الرائحة والكافرة.

٢٧٨٤٠ - منشاريَّة ، دُباب منشاري

Tentredo (S). Tenthrède, Mouche à scie (F).

جنس حشرات من فصيلة المنشاريات ، انواعه نحو ٢٠٠ اكثرها من الحشرات الضارة ، شذام مرزا منسل كالنمل عتق أصلب اللحاء. ريقها ناعمة لا تنف من شيء. أشهر انواعه المؤذية ما يتبع :

٢٧٨٤١ - منشاريَّة السوسن

Rhadinoceraea micans (S). Tenthrède des iris (F).

نوع من المنشارية ، لها جيلان في الحول ، طولها يراوح من ٧ الى ٩ سم. ثوبها الى السواد اللامع. زباناها قصيرتان. تظهر في اوائل حزيران || ريقها اسطوانية الجسم المائل الاشهب الزيتي. ولها مستير الشكل جوزي اللون. تركب اوراق السوسن فتفذيها اشد الاذى.

٢٧٨٤٢ - منشاريَّة الكشمش

Pteronidea ribesii (S). Tenthrède du groseillier (F).

Imported currantworm (E). Gelbe Stachelbeerblattwespe (D).

نوع من المنشارية ، اجيالها الحولية ثلاثة. طولها يراوح من ٦ الى ٨ سم. ذكورها سود الاطواب انثاها صفر. ريقاتها غضر الاطواب المنسفة بنكت سود. تركب الكشمش فتلهم كامل نصل الورقة وقد لا تنف من العروق.

٢٧٨٤٣ - منشاريَّة اللث

Athalis colibri (S). Tenthrède de la rava (F).

Turnip sawfly (E). Kohlrübenblattwespe, Rübenblattwespe (D).

نوع من المنشارية ، اجيالها الحولية ثلاثة. طولها يراوح من ٧ الى ٨ سم. ثوبها الى الصفرة. رأسها والقمم الخلفي من جوشها الى السودة. ريقها سمرا. اللون غيرة المروج تحمل ١٦ زوجاً من الارباع. تركب غثف اوراق الصليبيات اخضاها اللث.

٢٧٨٤٤ - منشاريَّة الورد

Arge rosae, Hylatomia rosae (S). Tenthrède du rosier (F). Arge rosae (E). Rosenbüschthorn-

wespe (D).

نوع من المنشارية ، لها جيلان في الحول. طولها يراوح من ٧ الى ١٠ سم. رأسها وزباناها سود. جوشها اسود وأصفر ، يبطها وابجها صفر. اجنتها شفافة ودوية المروج. ريقها الى الحفرة الزاوية. تركب اوراق الورد فتفقي عليها.



منسل



منشارية السوسن



منشارية الكشمش



منشارية اللث



منشارية الورد

Clivé (F). Cleavat (E). - ٧٧٨٥٥ - **مُنْطَلِيز**

Phénomène (F). - ٧٧٨٥٦ - **مُنْطَح**
Phenomenon (E). هو الظاهرة . ج مناح .

Phénoménisme (F). - ٧٧٨٥٧ - **مُنْطَحِيَّة**
المنشعية ملعب فلسفي يدعى أيضاً الظاهرية والحوالية .
اطلب ظاهرة .

Narine d'oiseau (F). - ٧٧٨٥٨ - **مُنْطَق**
Nostril of the bird (E). هو المنخر عامة ومنخر الطير خاصة وهما منشقان .

Bisectrice (F). Bisecting (E). - ٧٧٨٥٩ - **مُنْطَفِيف**

Germandrée sauvage (F). - ٧٧٨٦٠ - **مُنْطَهَار**
هو الاسقوديون البري ، اظليه .

- ٧٧٨٦١ - **مُنْطَفِئَة ، مُنْطَفِئَة**
Pulvérisateur (F). Pulverisator, Vaporizer (E). آلة تستعمل لتفخخ الادوية السائلة حل النبات . وللمناضغ مختلفة الاشكال والاحجام والتصاصم وقد تكون آلية أو يدوية .

Schiste (F). Schist, Slaty rock (E). - ٧٧٨٦٢ - **مُنْطَشِد**
هو حجر الشيست . راجع شيست .

Coercible - ٧٧٨٦٣ - **مُنْطَضِط**
ما كان قابلاً لضغط كالخيار وغيره .

Megaderma (S). - ٧٧٨٦٤ - **مُنْطَاب**
Mégaderme (F). جنس حيوان من فصيلة الجوريات . انواعه اربعة تميز بفراطيسها الطويلة اللاذقة ، وزوائدها المنخرية الشارفة ، باستعانة وروحية بساطها الانشائي ويحتلها من الذئب الظاهر . كما انها عادمة التنايا العلوية ، أما لتواجدها ففخس . اجسامها صغيرة القند طولها يراوح من ٨ الى ١١ سم . وبعطها من ٣٥ الى ٤٥ سم . اذواها رادية اللون يعلوها موطع اصفر يمتد مع اقترابه من ثوب الظهور الى موطعها الزرقية الشرقية وسرديب والحد . تألف الكهوف والملاور والبيوت الحرية . تعيش جهامات قليلة العدد . قوتها الحشرات والديدانيات والصفادون والاسماك الصغيرة .

Polyplodie (F). Polyplod (E). - ٧٧٨٦٥ - **مُنْطَاش**
كل خلية تتألف بمجموعة تشبه المتشابهة من عدة مناشط .

Aérostatique (F). - ٧٧٨٦٦ - **مُنْطَاقَة**
Aerostatics (E). هي علم توازن الهواء .

Gamme - ٧٧٨٦٧ - **مُنْطَاس**
هو سلم سياق الانغام المتتابعة المتناسقة ان صادرة او هابطة . وهو مدرج تتابع الالوان والمذاقات الخ ..

Génome, Haplome (F). - ٧٧٨٦٨ - **مُنْطَاش**
مجموعة نطاش او نسب العامة الواحدة .

Zone - ٧٧٨٦٩ - **مُنْطَاقَة**
مساحات من الارضين تخضع لنظام طبيعي واحد وموحد جوية واحدة .

- ٧٧٨٦٥ - **مُنْشَارِيَّة بَرَاقَة**

Caliroa limacina (S). Tenthrède limace (F).
Pear slug, Cherry slug (E). Schwarze Kirschtblattwespe (D).

نوع من المنشارية ، طولها نحو ٥ سم . ثوبها الى السمرة السوداء ، اجنحتها شفافة . مرزها مستطيل الشدلم . اناثها اكثر حداً من ذكورها تمتد مكها في بشرة النصل فينتفج من ريقاتها تشبه الزباق ، لوها الى الخضرة السمراء . تركيب اوراق معظم الاجنحار المشرة قمرى النصل وتنف من الروع .

- ٧٧٨٦٦ - **مُنْشَارِيَّة ذَمِيمَة**

Tenthrède difformis (S). Tenthrède difforme (F).
نوع من المنشارية ، متوسطة القند ، طولها نحو ٦ سم . ثوبها الى السمرة . اجيالها الحولية يراوح من ٦ الى ٧ سم . ثوبها الى السمرة . اجيالها الحولية ثلاثة . ريقاتها مؤذية تقضم اوراق الورديات والصليبيات .

- ٧٧٨٦٧ - **مُنْشَارِيَّة سَوْدَاة**

Tenthrède aethiops (S). Tenthrède noire (F).
نوع من المنشارية ، صغيرة القند ، طولها يراوح من ٥ الى ٦ سم . ثوبها الى السمرة السوداء . اجيالها الحولية ثلاثة . ريقاتها مؤذية تقضم غصيب النصل حل صفحتها العليا . والبرقة تبهر صفراء اللون خضراء الملوحة ثم تتصرف رويداً رويداً الى السمرة اخضبة فالداكنة .

- ٧٧٨٦٨ - **مُنْشَارِيَّة مُزَرَّة**

Emphytus cinctus (S). Tenthrède à ceinture (F).
نوع من المنشارية ، متوسطة القند ، طولها نحو ٨ سم . ثوبها الى السمرة المزرة بالاسود . اجيالها الحولية تراوح من ٢ الى ٣ سم . ريقاتها سمراء اللون تمس في الانابيب المكسية تنسلها من مواضع القش حل اثر الاشليم والتقليم .

- ٧٧٨٦٩ - **مُنْشَارِيَّة مُنْطَفِئَة**

Tenthrède zonata (S). Tenthrède zonée (F).
نوع من المنشارية ، صغيرة القند ، طولها نحو ٥ سم . ثوبها الى السمرة الفاتحة المخططة بالاسود . ريقاتها مؤذية تقضم اوراق نباتات التفصيلة الوردية اغصنها الورد .

- ٧٧٨٥٠ - **مُنْطَاط** ، **مُنْطَاس الكَوَّة**

Dynamomètre (F). Dynamometer (E).
جهاز تقاس به قوة الانسان والحيوان والآلات الميكانيكية .

- ٧٧٨٥١ - **مُنْطَاط كَهْرَبَائِي**

Electrodynamomètre (F). Electrodynamometer (E).
جهاز يقيس حل ما يمارسه المغنطة من تأثير في التيار الثابت والمتحرك .

- ٧٧٨٥٢ - **مُنْطَاح**

Dosser (F). Dosimeter (E).
جهاز يستعمل في التفتيح او التكرير .

- ٧٧٨٥٣ - **مُنْشَر**

Séchoir (F). Drying-sun (E).
المكان الكلد للشر وتجفيف اوراق التبغ في الشمس وهو يعني أيضاً الاجهزة المختلفة التي تشر عليها مشاكيل التبغ الاخضر ريباً تجف الاوراق اغصنها المناسر الطليقة والمحبوبة والتغالة .

- ٧٧٨٥٤ - **مُنْشَرَة**

Sclerie (F). Saw-mill (E).
هي معمل نشر الخشب وصناعتها .



منشارية بَرَاقَة



منشارية سَوْدَاة



منشارية مُزَرَّة



منشارية مِنطَقَة



منشفة يدوية



منشفة آلية



منطاب

Manguier (F).

٢٧٨٨٤ - منقأ

هي شجرة الانج ، اطلبها .

Manganese

٢٧٨٨٥ - منقاعات ، منقعات

للمنقات في اصلاح الحامض المننيكي .

٢٧٨٨٦ - منقيدلا ، منقيديس ، منقيديز

Manganèse (F). Manganese (E).

معدن اشهب اللون شديد الصلابة وللمعة قابل الصقل.
وزنه (Mn) وزنه الانج ٥٤,٩٣ غ. قلته الانج ٧,٢
يحلل الماء في ١٠٠ سم. يصهر في ١٢٢٥ سم. ويحلل
في ١٩٠٠ سم. وهو يوسد في الطبيعة على هيئة مركبات
كبريتية اخصها الاوكسيدات والكربونات ، ويوسد أيضاً
في معادن السجسج النباتية ولكن بمقادير ضئيلة كما يوسد في
جميع الارربة. يذلت السبب الضئيلة || يستعمل ويستعمل
صناعياً في عدة تراكيب اخصها الصلب .

٢٧٨٨٧ - منقو هو الانج ، اطلبه .

Mangifera (S).

٢٧٨٨٨ - منقيبات

Mangifera (F). Mangifera (E).

سبط من البطليات ويهم من جعلها فضيلة مستقلة .

Soufflet (F). Bellows (E).

٢٧٨٨٩ - منقفاخ *

اداة يدوية تستعمل في ذر المساحيق الزراعية .

Soufreuse (F).

٢٧٨٩٠ - منقفاخ كبريت *

Sulphurateur (E).

اداة تستعمل في ذر مساحيق الكبريت .

Callotte (F).

٢٧٨٩١ - منقعة ، منون

Rennet (E).

جزء من معدة الخبثات .

Préure (F). Rennet (E).

٢٧٨٩٢ - منقعة

هي المسوة ، خيرة قابلة للذوبان ، تستخرج من منقعة الجدي
الرضيع ، تستعمل في تجبن الحليب .

Exécuteur (F). Executor (E).

٢٧٨٩٣ - منقعد

هو من قام بالتنفيذ .

Exécuteur testamentaire (F). Executor (E).

٢٧٨٩٤ - منقعد الوصية

هو الذي يمينه الوصي في الوصية ليعمل ما جاء فيها .

Dédactyles (F).

٢٧٨٩٥ - منقصلات الاصابع

احد قسم الطيور الجوارح ، يشل عدة ريشات والمعدي
من القنصال والجناس والافواخ .

٢٧٨٩٦ - منقش

نعت تعريفي توصف به اللباجة التي كتبت على البيض .

Egrenouse, Egre noir (F).

٢٧٨٩٧ - منقش

آلة تفصل حب الذرة وبزور مختلف نباتات الكلا من
مطرها وهرانيسها وسابها وسفها .

Déhiscant (F). Dehiscant (E).

٢٧٨٩٨ - منقش

نعت تعريفي توصف به الاغصاء النباتية التي يتفكك درزها
عند الادراك .

Bec (F). Beak, Bill (E).

٢٧٨٩٩ - منقار ، منقاد

الجزء القرني الامامي البارز من رؤس الطير .

Ressort (F).

٢٧٨٩٠ - منطقة الإخصاص

Province (E).

هي المنطقة التي يشغلها اخصاص احدى الحاكم وهي
ايضاً تعين درجة الاختصاص .

٢٧٨٩١ - منطقة الجوزاء

Baudrier d'Orion (F).

Orion's belt (E).

ثلاثة نجوم مستقيمة الصف مركزها في وسط كوكبة الجبار
أي الجوزاء . وتسمى ايضاً النطاق ويطلق الجوزاء وفنار
الجوزاء ويد الجوزاء .

Zone franche (F).

٢٧٨٩٢ - منطقة حرة

Franked zone (E).

منطقة اقليمية معينة لا تخضع لرسوم الجمركية .

٢٧٨٩٣ - منطقة عقارية

Circonscription foncière (F). Ground circumscription (E).

٢٧٨٩٤ - منقليات

Cetodes (F). Cetoda (E).

صف من الديد الريشات .

Mniotiltidae (S).

٢٧٨٩٥ - منطيليات

Mniotiltidae (F). Mniotiltidae (E).

فصيلة طير من الجوارح سيات المناخير . اجناسها وانواعها
عديدة اعطتها نعت من الهند الى امريكا الجنوبية والشيالة ||
اجسامها صغيرة قريبة الشبه بالقرقف . ارجلها ملونة
تكثر فيها الطحلة والياض || ملجها الجاني زويجي في
زمن التأسف والحضن ثم جامي || قريا الحشرات ويكثها
ويرقها والثار البانعة والبلور || تدفن في تجاويها الانجار
من مريث الى ثلاث مرات في الحول . حفنتها اربع
بيضات .

٢٧٨٩٦ - منظام

Isotherme (F). Isotherm (E).

منظام او ايزوترم . ج منظم : خطوط الحرارة الاقليمية
او البالية المتساوية التوزيع .

٢٧٨٩٧ - منظف

Détargent, Désertif (F).

Detergent, Deterative (E).

٢٧٨٩٨ - منظمة

Organisation (F).

Organization (E).

٢٧٨٩٩ - منظور عظمي

Perspective linéaire (F). Linear perspective (E).

٢٧٩٠٠ - منق

Crabe (F). Crab (E).

حيوان مائي من القشريات يعرف بالسرطان .

٢٧٩٠١ - منق مصوف

Crabe à laine (F).

هو الخيول دويبة بحرية من القشريات ، اطلبه .

٢٧٩٠٢ - منقعت التهر

منقط التهر ثلاثة انجم ثيرة متتالية من كوكبة التهر
المعروفة ايضاً بكوكبة اربدانوس . موقعها في المنقط
الذي ظهر .

٢٧٩٠٣ - منقعات الاجنحة

راجع ملتويات الاجنحة .



منقفاخ



منقفاخ كبريت



منورينة

Manorins (S). * **مَنُورِينَة** ٢٧٩٣٣
Manorins (F). Manorina (E).
جنس طير من فصيلة المغرقات . أنواعه المعروفة خمسة
موطنها أستراليا وأجزاء القارية منها . ملجئها الحياتي
جاني قوتها رقيق الاثمار والثمار البائنة والحوام || اجسامها
صغيرة . اذنانها مستطيلة ، مستديرة الاطراف . مناقبها
غروبية . السنتها عظيمة منقطة . تجبرس الزهر كالنمل .
اثوابها متراكبة الاألوان الزاهية || تدفن في الاذغال القليلة
الارتفاع . اناتها تقص من ٤ الى ٦ بيضات تحضنها بتناوبة
الذكور نحو ١٢ يوما .

Manrose * **مَنُورُ** ٢٧٩٣٤
سكر غلوكوزي ، بلوري التركيب ، سريع الذوبان في
الماء ، ينتج خميرة البيرة ، ويستخدم في بعض النباتات اخضها
تأمر الخروب وقشور البرتقال .

Monsul (F). * **مَنُول** ٢٧٩٣٥
هو الحنظل اليابس ، اطبخه .

Narcotique (F). * **مَنُوم** ، **مُحَدَّر** ٢٧٩٣٦
Narcotic (E).
نمت تعريفي يطلق على المواد شبه قلوية الحذرة الموسومة
في بعض النباتات ، وقد يطلق تسمية على كل نبات
يسوي هذه المادة او المواد .

Sperme (F). Sperm (E). * **مَنُوي** ٢٧٩٣٧
مادة مركبة مائنة لزجة تتوزع سيالة الحورن المنوي تفرزها
خصيتا الذكر وتخزنها الحويصلات المنوية عند وجودها
ويذنها التفتيب عند الاندفاع .

Aphididae (S). * **مَنُويات** ٢٧٩٣٨
Aphididae (F). Aphididae (E).
هي فصيلة الاقيات ، اطبخها .

Sarcelle marbrée (F). * **مَنُويَّة** ٢٧٩٣٩
هي الحلف الجليلي ، اطبخه .

Spermastome (F). * **مَنُويَّة** ٢٧٩٤٠
Spermatem (E).
المنية ملهبة اللين يمتصرون ان مني الذكر يحوي جميع
اجزاء الملقحة ، وان ما تقدمه الاثنى منوط بالنشوي والنوية
فقط .

Manis maura (S). * **مَنُويَّة مَوْرَا** ٢٧٩٤١
Manis maura (F). Manis maura (E).
حشرة من فصيلة النسيات ورتبة حشرقيات الاجنحة .
موطنها يمتد من الشرق الادنى الى اوروبا وافريقية الشمالية .
فراشها جارية قوتها رقيق الاثمار . سرتها تيش على
اوراق النباتات المرورية والخلوية والهولة || جسمها
كبير القد يطوي نحو ٢٣ سم . يسطها نحو ٦٢ سم . واسها
صغير الحجم حنطي اللون . عيناها كبيرتان . زياناها
عظيمان . جوشنها ويطها الى الحنطي الكسني الملوخ ||
رواشنها عند الشقن الى الحنطي الاسمر الملوخ تملو في
الزوج الامامي زردكة كستنية ومشج وتضع يرادح
من الجرؤة الى السمرة الكستنية . وتلوي في الزوج الخلفي
مشحان مبرغشتان لونها الى السمرة الكستنية . حنارها



منية مورا

منقطة ، مستطيلة الزناد ، خلية العمل الانقباضي التضيي
خلة البشرة على صفحتها || ازغارها فردية ، عوربة
الارتكاز ، مستطيلة المالحق ، صغيرة الحجم ، ليلكية
الون || ثمارها عنية ، جعالية المادة ، تدور خضراء
وتنتهي ، عند النضج ، بالبنيجي المالحق .

Hache fourrage (F). * **مَنَكَّة** ٢٧٩٤٠
Fodder-cutter (E).
آلة تستعمل في فرم ورق التوت والكلكا وما الشبه .

Décalifé (F). * **مَنَكِيس** ٢٧٩٤١
Dacalifed (E).
فقد كله .

Serfouette (F). Small hoe (E). * **مَنَكِيفَة** ٢٧٩٤٢
أداة تستعمل في حرق تربة حدائق الزهور والمباثل .

Masticable (F). * **مَنَكِيع** ٢٧٩٤٣

Fourmillière (F). * **مَنَكِية** ٢٧٩٤٤
Ant-hill, Ant's nest (E).
هي قرية النمل .

Butyromètre (F). * **مَنَكِية** ٢٧٩٤٥
Butyrometer (E).
هو ميزان الحليب ، جهاز يستعمل لعمرة مقدار السن
في الحليب .

Méthode (F). * **مَنَكِيج** ، **مَنَكِيج** ٢٧٩٤٦
Method (E).
هو الاسلوب المتبع ، راجع طريقة .

Allergique (F). Allergic (E). * **مَنَكِيف** ٢٧٩٤٧
الهدف من كان جهازه العضوي عرضة للاندفاع .

Ebauche (F). Rough Shape (E). * **مَنَكِير** ٢٧٩٤٨
الرمس الابجائي للشي وبداية تكوين الشيء . ج مناهر .

Shénique (F). Schenic (E). * **مَنَكِيش** ٢٧٩٤٩
نمت تعريفي يطلق على كل مادة من عقاقير وغيرها تقشط
فاعلية الاعضاء .

Menhir (F). Menhir (E). * **مَنَكِير** ٢٧٩٥٠
المنير حجر فخم مستطيل منتصب يمد الى عصور
ما قبل التاريخ . يقال انه كان يرمز الى الفلوس المعبد
كسائر الاصنام . ويقال انه كان بمثابة تمثال || المناهر
كثيرة العدد ، متفارقة الحجم والطول ، اطولها يبلغ
نحو ٢١ متراً ويزن نحو ٣٤٧٥٠٠ كيلوغرام .

* **مَنُورُ** ، **مَنُورَة** ٢٧٩٥١
Jour de souffrance, jour de tolérance
مطل يبيحه القانون لدخول النور فقط . ويجب ان تغفل
الكرة بالزجاج والحديد تكون على ارتفاع قانوني لا يقل
عن ٢٦٠ سم . من ارض القرية .

Scaphyte (F). * **مَنُورِيَّة** ٢٧٩٥٢
نمت تعريفي يطلق على كل نبات لا يستطيع النوية في
الفسح المادي بل ينمو في ظل غيره .

بعد التقع والغل في الماء ، لاثنا غنية بالعناصر المرة السامة ، ليوب نشوي غذائي شائع الاستعمال يدهى تيبوكا او قساوا . ولبوها هذا يحوي ما قدره نحو :

٣,٦٨ ٪ من المواد الازوتية

١,٩٨ ٪ من المواد الدهنية

٩١,٤٤ ٪ من المواد النشوية

وهو كالمشيت الحلو يرغب في الاربة الخفيفة البهالية الغنية المروية ، يتكاثر بالقلع .

٢٧٩٤٩ - مَنِيَّت
Tannerie (F).
هي الهندية ، اطلبا .

٢٧٩٥٠ - مَهَا * ، مَهَا
Addax nasomaculata (S). Addax, Antelope de Nubie, A. de Mendès (F). Addax (E).

الجمل مَهَا . والمهاة بقرة وحشية قوية جامدة ريفة الحاروك وصيدة الجنس والنوع . نوبها الى البياس الاغبر . رأسها حاقق اللون مستطيل الشكل يحمل قرنين كبيرين لوليين ، راوح طولها من ٥٠ الى ٧٠ سم . صياها كبرتان مكحلان . عنقها اخضر من فوق الظلياء . طول جثتها نحو ٢١٠ سم . وارتفاعها ٩٠ سم . اناتها رباعية الاعلاخ || تدش اذوات متوسطة المدد ، موطنها الصحاري والغنياني توجد في الجزيرة وسورية واليوبيا وتونس وجزائر ومراكش .

٢٧٩٥١ - مَهَا سِيكا
Antelope saiga (F).
نوع من الظباء يدعى سِيكا ، اطلبا .

٢٧٩٥٢ - مَهَبَاب * ، مَهَبَاب *
Atomiseur (F).
آلة خاصة بالمساحيق والسوائل تذرهما كالنفاث .

٢٧٩٥٣ - مَهَبَط
Cathode (F).
٢٧٩٥٤ - مَهَبَط الطير
Remise (F).
Lighting-place (E).
المكان الذي يأوى اليه الطير عند الجفوم او الاستراحة .

٢٧٩٥٥ - مَهَبِل
Vagin (F). Vagina (E).
من اعضاء التناسل في الحيوان وهو القناة التي تصل الشفر بمقت الرسم .

٢٧٩٥٦ - مَهَبِلِي
Vaginal

٢٧٩٥٧ - مَهَبَان *
Potomètre (F) Potometer (E).
المهتان جهاز يستعمل في قياس ما يمتصه النبات من ماء .

٢٧٩٥٨ - مَهَبَزَات
Turbellariés (F).
Turbellaria (E).
صف من البود المريف .

٢٧٩٥٩ - مَهَبَجَة *
Tératologie (F).
Teratology (E).
علم غرائب الخلقة والتماحيب .

٢٧٩٦٠ - مَهَبَجِي *
Tératologique (F).
Teratologic (E).

٢٧٩٦١ - مَهَد
Habitat (F).
هي البلاد التي يعيش فيها الحيوان الممين منذ الاعتدال اليه .

الخارجي مذهب الاطراف || لها جيل واحد في الحلو . تظهر الفراشة في حزيران وتبقى حتى آب . تسرح في الليل . تماثل بعد ظهورها بنمو خمسة اسابيع وتحت الممكن لطفاً مستطيلة على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرعة عند بلوغها الكمال تطول نحو ٤٥ سم . جسمها شبه اسطواني الشكل مستقيم المقدم والمؤخر . نوبها الى الخضار الاليس تعلو خطوط جانبية متعرجة يضاء اللون وسط تجبي اسيد طاب . مدنها ورواجها الى السرة || طول الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقضي في التربة حيث تنفسن السرعة متلصقة بجلباب من العين .

٢٧٩٤٢ - مَنِيَّت
Mannite (F).
مادة سكرية قابلة للتبلور لتستخرج من بعض النباتات والفطور .

٢٧٩٤٣ - مَنِيْرَا
Magnésio (F).
هي المنيْرا اي اكسيد المنيْريوم .

٢٧٩٤٤ - مَنِيْع
Résistant (F). Unyielding (E).

٢٧٩٤٥ - مَنِين
Spermine (F). Spermin (E).
شبه قلوي غير سام يكثر في الحني ويرسد في البصاقل .

٢٧٩٤٦ - مَنِيْهَوْت
Manihot (S).

Manihot, Manioc, Magnoc (F). Mandioc plant, Cassava plant (E). Bittere Manioka, Kassava-wurzel (D). Manioc, Mandiocca, Jatropha officinale (J). من نباتات معمرة من فصيلة القرينيات . انواعها نحو ٤٠ جميعها جنبية منها البيرة والزراعية الغذائية . اصلاتها البلاد الاستوائية . سوقها تملو من ٢٠٠ الى ٥٠٠ سم . اوراقها متعاقبة ، معتقة ، اذنية ، كفية التنصل ، خاسية او سباعية المنصوص . انوعها فستقية اللون ، صغيرة القند ، عشودية التجميع ، محورية وطرفية الارتكاز . ثمارها جراد ثلاثية الاغنية تنقل من ٦ مصاريم || تُرَدع من اجل جلورها المستقرية الغليظة المسطلة التي يستخرج منها ليوب نشوي غذائي يدعى تيبوكا || اشهر انواعه الزراعية ما يلي .

٢٧٩٤٧ - مَنِيْهَوْت حَلو *

Manihot dulcis, M. alpi, M. palmata (S). Manioc doux, Cagmagoc, Cassava (F).
نوع من المنهوت الزراعي ، ضروب كثيرة المدد . جلوره قليلة المواد المرة السامة . سوقه متصبة عادمة التضلع ، اوراقه مستطيلة الاذنيات والامناق اخضر ، معترضة القصوص . جرادها عادمة الجناح . جلوره نشوية غذائية تحوي ما قدره نحو :

٣,٢٥ ٪ من المواد الازوتية

١,٥٦ ٪ من المواد الدهنية

٨٨,١٢ ٪ من المواد النشوية

يرغب في الاربة الخفيفة المروية ويتكاثر بالتعقل .

٢٧٩٤٨ - مَنِيْهَوْت مَر *

Manihot utilisima (S).
Manioc amer, Cassava amère (F).
نوع من المنهوت الزراعي ، ضروب كثيرة المدد . جنباته كبيرة القند تملو من ٣ الى ٤ امتار . سوقها ضلعة . اوراقها مفعصة قصيرة الاعناق الجلوية اللون ، اذنياتها جددة . قصور نصلها مستطيلة ضيقة . جرادها مجنحة || حقاقلها غليظة كبيرة تستعمل في صناعة الكحول ويستخرج منها



منهوت حلو



منهوت مر



مهة

ازهارها تقوية مغلفة الكأس تيلو كالثالب المتدبسة الاطراف .

٢٧٩٧٦ - مَهْمَزِيَّة *

Dicentra, Dielytra, Bicuella (S). Diélytra, Diélytra, Dicentra, Bicuclée (F). Seal flower, Bleeding heart, Locket flower (E). Flammendes, Fliegendes Harz, Tränendoppelsporn (D). Dialitra (I).

جس نباتات معمرة من فصيلة الحشائشيات . ازهارها المعروفة ١٢ معلما بري وبضها طلي ينسل في حلاجات السلس وبضها تريسي . اوراقها متعاقبة ، متفكة ، مفروضة . ازهارها جميلة الشكل مَهْمَزِيَّة ٥ أشهر انواعها واعرفها سالي .

Dicentra eximilis (S). مَهْمَزِيَّة اُنَيْكَة ٢٧٩٧٧
Diélytra d'élite, D. distingué (F).

بجلة تريبيته مثبوتة معمرة تملو من ٢٥ الى ٣٥ سم . اوراقها بحرية اللون . عناقيدها الزهرية هوية الشكل متعقبة . ازهارها حراء اللون قصيرة المهايز ٥ ازهارها يستمر من اواسط الربيع الى اواخر الصيف .

٢٧٩٧٨ - مَهْمَزِيَّة جَمِيلَة

Dicentra formosa (S). Diélytra gracloux, D. à belles fleurs (F).

بجلة معمرة طيبة مثبوتة تملو من ٢٥ الى ٣٥ سم . اوراقها جميلة الخضار الزاهي . نصلها قدّي التتريم . عناقيدها الزهرية مخروطية الشكل . ازهارها وردية اللون ، قصيرة المهايز ٥ جلودها غنية بمادة الكوروندين الشائعة الاستعمال الطبي ٥ ازهارها يستمر من ايار الى اواسط الخريف .

٢٧٩٧٩ - مَهْمَزِيَّة ذَهَبِيَّة

Dicentra chrysantha (S). Diélytra jaune d'or (F).

بجلة تريبيته معمرة تملو من ٦٥ الى ١٠٠ سم . ساقها فرعاء موزقة . اوراقها كثيفة التجميع شبيطة التتريم . عناقيدها الزهرية متعقبة . ازهارها صغيرة القند والمهايز ، ذهبية اللون ٥ ازهارها يستمر طولا فصل الخريف .

٢٧٩٨٠ - مَهْمَزِيَّة رَاحِيَة

Dicentra spectabilis (S). Diélytra remarquable, Cœur du Maria, Cœur de Jeannette (F).

بجلة تريبيته معمرة تملو من ٩٠ الى ٩٥ سم . ساقها فرعاء موزقة . عناقيدها الزهرية كبيرة القند متدلية . ازهارها قلبية الشكل ، مستطيلة المهايز ، قرمزية اللون ٥ ازهارها يستمر من ايار الى تموز .

٢٧٩٨١ - مَهْمَزِيَّة عَاشِرَة

Dicentra torulosa (S). Diélytra grimant (F).

جنية تريبيته عارشة تملو من ٣ الى ٥ امتار . ساقها وفروها نحيلة . حوائقها بسيطة . اوراقها قدية التتريم . عناقيدها الزهرية كبيرة القند متدلية . ازهارها قرنية الشكل ، صفراء اللون ، حلقة ٥ ازهارها يستمر طولا فصل الخريف .

Aristoloché (F). مَهْمَتُون ٢٧٩٨٢
هو الزراوند ، من النباتات الطبية ، اظلمه .

Subdésertique (F). مَهْمِي * ٢٧٩٨٣
Subdesertic (E).
هو البلقعي ، نمت تمرني وسمي للاقليم شبه صحراوي .

٢٧٩٦٢ - مَهْدَد
Aplanir (F).
To level, To smooth (E).

اصلم ويسط اللشز من الارض او ما انخفض منها في سهولة واستواء . ويقال مهد الارض وقدن القربة .

٢٧٩٦٣ - مَهْدَاج
Vent précurseur de pluie (F).
الريح الخنون تستبق المطر .

٢٧٩٦٤ - مَهْدَدَب
Cénoïde (F). Ctenoid (E).
نمت تمرني يطلق عل الحرافش الابرية او المسنة الحمار الطليق . راجع مبراش .

٢٧٩٦٥ - مَهْر، فُلُو، فِلُو
Poulain (F).
Fosl, Yearling (E).
ولد الفرس قبل بروز ثنيته الثابتين . ج مهاز وامهاز ومهارة وفلاء واللاء .

٢٧٩٦٦ - مَهْرَاجِيَّة
Iris orateur (F).
حشرة من السرعويات تدمي قسطية ، اظلمه .

٢٧٩٦٧ - مَهْرَة ، فِلُوَّة ، فِلُوَّة
Poulche (F).
Filly (E).
هي انثى اللبل والمهر .

٢٧٩٦٨ - مَهْرَسَ الْعَب *
Fouloir (F).
Beater (E).
مهريس العنب او الماصرة ، آلة يسحق فيها العنب لاستخراج عصارتها .

٢٧٩٦٩ - مَهْرَمَة
Hachoir (F).
هي الخفخة ، اظلمه .

٢٧٩٧٠ - مَهْرِي
Méhari (F). Hairi (E).
سلالة من الابل الركائب السريعة منسوبة الى مهران سيدان . يقال ابل مهريه .

٢٧٩٧١ - مَهْمَشَرَة
Trayeuse mécanique (F).
Milkng machine (E).
هي الماهرة ، جهاز آلي يستخرج الحليب من الفصح .

٢٧٩٧٢ - مَهْمَلَس
Arracheuse (F).
Drawer, Spud (E).

٢٧٩٧٣ - مَهْمَلَس *
Todiramphus (S). Todiramphus
جنس طير من المازوريات . انواحه قليلة المده . موطنه البلاد الاسيوية ، يألف مجاري الماء والشلوط والنباتات اجسام هذه الطيور متوسطة القند تملو نحو ٢٧ سم . لوانها مزاجية الالوان لها الابيض والاحمر والازرق والجلوي والاسمر والاسود ٥ قوتها الاسماك الصغيرة والحشرات . انها تبقي من ٣ الى ٤ بيضات تحضنها بمناوبة الذكور نحو اسبوعين . (راجع مازوريات) .

٢٧٩٧٤ - مَهْمَلَز
Dauphine des jardins (F).
نبات تريبي يعرف بمائق الحدائق ، اظلمه .

٢٧٩٧٥ - مَهْمَلَزَات
Dicranaceae (S).
Dicranacées (F). Dicranaceae (E).
سبط من فصيلة الحليبيات ، اجناسه وانواعه نحو ١٠٠ منها النباتات الظليلة . جلودها نحيلة قليلة العدد والانتداد . سوطها مستنقة . اوراقها شبيطة كثيفة تكسو كامل الساق .



مهريس العنب



مهلبل



مهزاية

٢٧٩٩٩ - مَوَادٌ زَيْتِيَّةٌ (F).
Matières huileuses (F).
توجد في المادّن كالنظف مثلاً .
Oily material (E).

٢٨٠٠٠ - مَوَادٌ شَحْنِيَّةٌ (F).
Matières grasses (F).
توجد في الحيوان .
Greasy material (E).

٢٨٠٠١ - مَوَادٌ عَازِلَةٌ (F).
Matières enrobantes (F).
Wrapping material (E).

٢٨٠٠٢ - مَوَادٌ عَصَوِيَّةٌ (F).
Matières organiques (F).
Organic material (E).
هي المواد البسيطة الممتزجة التي ترتكب منها نسيج الحيوان والنبات .

٢٨٠٠٣ - مَوَادٌ غِذَايَّةٌ (F).
Matières alimentaires (F).
Alimentary material (E).
هي جميع المواد الصالحة لغذاء الحيوان . وقد وضعت في ذلك جنساً عظيماً من «كلّ» ذكّر فيه تركيب الإغلاف الوسطى ومعالجها من المواد الخام والمنهضعة مع قسمها النهائي بالنسبة إلى النشا . اطبل علف .

٢٨٠٠٤ - مَوَادٌ صَاحِيَّةٌ (F).
Substances hygroscopiques (F).
Hygroscopic substances (E).
هي المواد التي تمتص الرطوبة كالنترات الذي يمتص رطوبة الهواء ولديها الذي يمتص رطوبة التربة .

٢٨٠٠٥ - مَوَادٌ مُدْعَوَرَةٌ ، مَوَادٌ إِحْصِيَّاتِيَّةٌ (F).
Matières de réserve (F).
Reservation material (E).
مواد غذائية يَحْتَرِها النبات كالإدام في النباتات الزيتية ، والسكر في القشور واللصان ، والنشا في البطاطا .

٢٨٠٠٦ - مَوَادٌ مَعْدَنِيَّةٌ (F).
Matières minérales (F).
Mineral material (E).
هي الاجسام غير المتفتحة كالآزوت والاكسجين والفوسفور والكلس والحديد والبرنات والصوديوم الخ .

٢٨٠٠٧ - مَوَادٌ مُغَذِّيَّةٌ (F).
Matières nutritives (F).
Nutritive material (E).
هي جميع المواد الصالحة لتغذية النبات .

٢٨٠٠٨ - مَوَادٌ لَشْوِيَّةٌ (F).
Matières amylacées (F).
Amylaceous material (E).
اصول مركبة ، اسامها النشا ، توجد في اعضاء بعض النباتات .

٢٨٠٠٩ - مَوَادٌ هَيْدُرُوكَرْبُونِيَّةٌ ، هَيْدِرَاتٌ (F).
Matières hydrocarbonées ، الكربون
Substances hydrocarbonées ، Hydrates de carbone (F).
Hydrocarbons material (E).
مركبات عضوية من الكربون والاكسجين والهيدروجين منها المخلصات اللازوتية كالنشا والسكر والصمغ ... ومنها المواد المعدنية ومنها الخليلوص اي السليلوز .

٢٨٠١٠ - مَوَازٍ (F).
Tropomètre (F).
Tropometer (E).
المواز ميقت شديد الاقنات والذقة يستعمل في تحديد دائرة الطول في البحر .

٢٨٠١١ - مَوَازٍ ، مُتَوَازٍ (F).
Parallèle (F).
Parallel (E).

٢٧٩٩٤ - مَهْرٌ ، تَارَهْنَدِي ، تَارَهْمَكْ (S).
Mésuz, Bois de fer (F).
Iron wood, Indian rose chestnut (E).
Eisenbaum, Kastanien Rose (D).
Albero della ferro (I).

الواحدة مهرة . جنس اشجار حرجية وزراعية من فصيلة الكلوذيات ، مهدا الهند . اوراقها كاملة متقابلة متفتحة مستطيلة النصل . ازهارها نورية التجميع او فردية . ابطية الارتكاز او تاجية وفي ذكوة العرف المستحب . ثمارها جراء تطفل زرة ، كبيرة القدة تشبه الكستناء طيبة الرائحة ، مأكولة اللباب ، لغشها شديدة الصلابة مرغوب فيها .

٢٧٩٩٥ - مَهْوَيٌّ (F).
Périgée (F).
Parigee (E).
اكثر على لسان في الارض .

٢٧٩٩٦ - مَهْيَاتٌ (F).
Multiforme (F).
Multiform (E).
كثير الهيئات والاشكال .

٢٧٩٩٧ - مَهْيَكَةٌ ، كَنْدُرِيُوم (F).
Chondrioma (F).

٢٧٩٩٨ - مَهْيَدَةٌ ، مَهْيَدَةٌ (F).
Plonnière (F).
Pioneer (E).

هو النبات الطبي الذي يكتسح التربة الخديئة الاستصلاح وهو أيضاً كل نبات يزر او غرس لتهيئة الظروف المناسبة لنبات لاحق .

٢٧٩٩٩ - مَهْيَقٌ ، هو سلاح الطير . ج مهايص .

٢٧٩٩٠ - مَهْيَكٌ (F).
هو الفسل الذي اذا ضرب لم يلقح .

٢٧٩٩١ - مَهْيِمٌ (F).
Assouff (F).
Thirsting (E).
نمت تمرير يوصف به من كان شديد العطش .

٢٧٩٩٢ - مَوْ (F).
Aneth sauvage (F).
هو الثيث البري ، اطلبه .

٢٧٩٩٣ - مَوَاءٌ (F).
Mialement (F).
Mewing (E).
صوت الحمر .

٢٧٩٩٤ - مَوَادٌ اَحْيَاءٌ ، مَوَادٌ اَلْبُيُوتِيَّةٌ (F).
Albuminoides, Substances protéiques (F).
Albuminoid, Proteinic substances (E).
مواد تركيبها يتوصفها تركيب ونسبها بياض البياض .

٢٧٩٩٥ - مَوَادٌ اِسْتِخْرَاجِيَّةٌ ، مَوَادٌ اِسْتِخْلَاصِيَّةٌ (F).
Matières extractives (F).
Extractive material (E).

هي ما يمكن ان يبقى من مواد بعد تبخير سائلها .

٢٧٩٩٦ - مَوَادٌ ثَلَاثِيَّةٌ (F).
Substances ternaires (F).
Ternary substances (E).
مواد غذائية مركبة من ثلاثة عناصر وهي الاكسجين والهيدروجين والكربون .

٢٧٩٩٧ - مَوَادٌ دُهْنِيَّةٌ (F).
Matières sébécées (F).
Sebaceous material (E).

٢٧٩٩٨ - مَوَادٌ رُبَاعِيَّةٌ (F).
Matières quaternaires (F).
Quaternary material (E).
مواد عضوية مركبة من اربعة عناصر وهي الكربون والهيدروجين والاكسجين والازوت كالأحج مثلاً .

28020 - مَوَالِقَة * Musophaga (S).

28021 - مَوَالِقَة * Musophaga (F). Musophaga (E).

28022 - مَوَاقٍ * Grallaria (S).

Grallaria (F). Grallaria (E).

جنس طير من الجواثم سيات النائير فصيلة الجليثيات .
انواع المبروة نحو ٣٠ جميعها من طيور امريكا
الجنوبية . تألف الرياش واللهايات الرطبة . ملجبا الحياتي
جاعي . جماعاتها قليلة العدد . قوتها الحشرات وأصغرها
التدال السيار الذي تكثر قوافله الجمرارة في معظم تلك
الاصقاع || اجسامها صغيرة تقطو من ١٢ الى ١٨ سم .
اثنائها مختلفة الانوان تكثر فيها الشقعة والشفية . تحورها
وصورها وبطنها صفراء اللون او براء تملحها رقة
سمراد او بياض وتنبج حنلي . رؤوسها ونائيرها واجنحتها
ممتدة الاحجام . اذنانها قصيرة مخروطية الشكل . قوائمها
رفيعة تمكنها من العدو بسرعة || تدثن اعشاشها في الادغال
حل ارتفاع قليل لا يتجاوز ثلاثة امتار . الاثان تحفن
بمناوبة الذكر من ٤ الى ٥ بياضات على مرتين في الحبل .



مَوَاقٍ



موسطة

28023 - مَوَاقِر * Métayer (F). Farmer (E).

28024 - مَوَاقِرَة * Métayer, Colonge (F).

28025 - مَوَالِسَة * Connivence (F).

Connivence (E).

28026 - مَوَالِيْد * Naturaliste (F).

Naturalist (E).

28027 - مَوَاتَن ، وَمَا حَيَوَاتِي * Ephzoote (F).

Murrain, Epizooty (E).

28028 - مَوَلَرَكَة * Raidisseur (F). Wire-strainer (E).

اداة تستعمل لتوتر الاسلاك .

28029 - مَوَلَمَر * Congrès (F). Congress (E).

28030 - مَوَيْل * Mutila (S).

Mutille (F). Mutille (E).

جنس حشرات من غشائيات الاجنحة المقصورة وفصيلة
المويليات . انواعها المبروة كثيرة العدد ، نحو ١٦٠٠
منتشرة في معظم اقطار العالم . تألف اليرير والمناطق
الجرداء . تصقل في طورها البري حل جميع انواع غشائيات
الاجنحة المشاهدة || اجسامها صغيرة او متوسطة القد .
اثنائها ميلة . اثنائها زاهية ، سقاء المراج || ذكورها
مجسمة . اناثها عادمة الاجنح ، مسطحة الجناح الدوبة .



مَوَيْل

28031 - مَوَيْلَات * Mutilidae (S).

Mutilidae (F). Mutilidae (E).

فصيلة حشرات من غشائيات الاجنحة المقصورة ونفة
الحويوات . اجناسها وانواعها المبروة كثيرة العدد ،
منتشرة في معظم اقطار العالم || جمع اجناسها طفيلية في

28012 - مَوَازٍ * Musophaga (S).

Musophaga (F). Musophaga (E).

جنس طير من فصيلة الموزيات . اصطناعه البلاد الافريقية
انحصار افريقية الشمالية || انواعه المبروة قليلة العدد
تتميز باستطالة الجسم وبكبر الذنب الاطليحي الشكل .
منافيدها مخروطية ، قوية ، مستنة الطفاف ، صفراء
اللون . جاعها ملحوفة بصميفة قرنية المادة ، صفراء
لبس كأنها امتداد المخاد نحو الرأس || طيراتها خفيف
الحركة سريع . تدثن في تجاويف الاشجار القديمة العهد .
اعرف انواعه واشهرها المواز البنفسجي .

28013 - مَوَازٍ بَنَفْسَجِي * Musophaga violacea (S).

Musophaga violet (F).

نوع من المواز . اصطناعه تمتد من تونس والغرب الى اطراف
ثنية الجنوبية . تألف الحراج ويقرب من المزارع والبساتين
انحصار بساتين الموز || جسمه يطول نحو ٥٥ سم . قوته
الى السواد البنفسجي تملو ماجة ارجوانية || قوته الثار
على اختلاف انواعها واصغرها الموز الذي يفضل على كل
شيء || الاثني تحفن بمناوبة الذكر من ٥ الى ٦ بياضات
الزخم ينشمر نحو ١٥ يوما .

28014 - مَوَازَكَة * Parallélisme (F). Parallelism (E).

هي توازي الخطوط او السطوح .

28015 - مَوَازَكَة * Balance (F).

28016 - مَوَازَكَة حِسَاب * Balance d'un compte (F). Balance of an account (E).

28017 - مَوَازِيَات * Musophagidae (S).

Musophagidés (F). Musophagidae (E).

فصيلة طير من الجواثم سيات النائير . اجناسها وانواعها
المبروة قليلة العدد ، جميعها افريقية العهد || تتميز
باستطالة الجسم ، بقصر العنق ، باختلال الاجنحة
وبااستطالة الذنب . منافيدها مخروطية الشكل ، مستعرة
الاشداد . اثنائها جبيلة الانوان المتراكبة القاعة || ملجبا
الحياتي جاعي . سرها لا يقل عن ٥٥ زوبا . تألف
جماري اثناء والمواقع الرطبة . قوتها جميع المواد النباتية من
البراعم والتواقي الى الثمار والحبوب || اعرف اجناسها
المواز والطورق .

28018 - مَوَاسِطَة * Gymnastiscus (S).

Gymnastiste (F). Gymnastiste (E).

بعض صيادي سمك طرابلس يسما بلشفيك وأير شوكة .
جنس اسماك بحرية يبروز من شاكات الزعانف وفصيلة
الغواصيات || انواعها المبروة قليلة العدد منتشرة في معظم
بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || جميعها صغيرة الحجم ،
شاككة الزعانف الظهرية السامة المؤذية || اثنائها تختلف
مع الانواع منها الاسمر والاطلس واللوردي والآخر المتالي
القدر بالاسود || حولها كامة الصفن قل من يرشب
نفا .

28019 - مَوَاعِيَكَة * Consanguinité (F).

Consanguinity (E).

الموصول من الدواب الذي لم يتر حل امه غير ابيه . والمواصلة
هي اشتراك اواصر القرابة اي الصلة الدموية بين الارواد
والابناء والاولاد . الناية منها استمرار تحسين النسل .

مزقية. اوراقها مفصصة، نصلها رمل النسيج، خلى البشرة، مسن الحافة. ازهارها حمراء اللون متدلية مستطيلة. ازهارها يستمر من حزيران الى تشرين الاول.

٢٨٠٤٧ - موريتية متوركة

Maurandia semperflorens (S). *Maurandie toujours fleurie* (F).

جنية تريبتية عارشة تطول نحو ثلاثة امتار. فروجها واسرارها عديدة. اوراقها قليلة مزوانية، نصلها مالى البشرة متصبع الصفحة. ازهارها كبيرة القذ قطرها يراوح من ٣ الى ٥ سم. لونها مختلف باختلاف ظروفها، اشجعها الابيض والقرط والبفسجي || ازهارها يستمر من ايار الى تشرين.

٢٨٠٤٨ - موريتية مكسيكية، موريتية كبيرة الزهر

Maurandia grandiflora (S). *Maurandie du Mexique* (F).

جنية تريبتية عارشة تطول من ٣ الى ٤ امتار. جلورها وساقها ليفية. اوراقها شبه قلبية. نصلها مالى الصفحة. ازهارها كبيرة القذ قطرها نحو ٥ سم. لونها الى الازرقوانى يطول موج بنفسجي || ازهارها يستمر من ايار الى ايلول.

٢٨٠٤٩ - موريسية

Mauritia (S). *Mauricie, Mauritie, Palmier blche* (F). *Mauritia, Moriche palm, Carana palm* (E). *Mauritia-Palme, Moritz-Palme* (D). *Palma mirici, Palma ita* (I).

جنس اشجار نخيلة، اعطائها المناطق الاستوائية الامريكية. انواعها ثمانية، جلورها متصبة مستقيمة تمل من سبة الى ثمانية امتار. يستخرج من بعض انواعها لوبو نشوية غذائية ومن البعض الآخر عصارة مكوية قابلة للتخثير تستعمل في صناعة الخمر والكحول.

٢٨٠٥٠ - موريكالديه

Moricandie (F).

نبات يدهى الخمر، اطله.

٢٨٠٥١ - مورين

Morine (F).

اطلب مريته، نبات تريبتى من الابداسيات.

٢٨٠٥٢ - موريتية، عقاب البحر

Myliobatis (S). *Myliobata, Mourine, Aigle de mer* (F).

جنس اسماك مذنية بحرية من فصيلة الشفنيات. انواعها المعروفة ٧ جميعها كبيرة القذ مبطلة مستعرضة تشبه العقاب الباسلة جناحها. اذناها مستطيلة كالسياط تحمها عند قواحتها مناس مستنة سادة. قوتها الاسماك. تألف المياه الاقليمية الضيقة للدور || اشهر انواعها وارفعها ما على.

٢٨٠٥٣ - موريتية جودرية، عقاب البحر

Myliobatis bovina (S). *الغيمرك*

Myliobate vachetta, Mourine vachetta (F).

نوع من الموريتية متوسطة القذ والتبطيط، ثوبها اخضر اللون اشهل الموج. اعطائها البحر المتوسط والاسود والاحمر. وهي اقل مسطوة من الجفاعة.

طورها البري. ذكرها بمنحة. اناثها عادمة الجناح مجهزة بحصى ذرية شياية الاطوال || اشهر اجناسها الموقيل.

٢٨٠٣٢ - موتة

Prostate

جسم خدي التركيب يلف عند الذكور فحج الثلاثة وجزء من الحالب.

٢٨٠٣٣ - موتوچ

Tissu lche (F). *Loose tissu* (E).

٢٨٠٣٤ - مؤجر

Bailleur (F). *Lessor* (E).

٢٨٠٣٥ - مؤجل

Différé (F). *Deferred* (E).

٢٨٠٣٦ - مؤجن

Urngère (F).

نعت ترميى يطلق، في علم النبات، على الطحالب المزهرة باجنيات اي اجرية لحفظ البويضات.

٢٨٠٣٧ - مؤجور

Cuniculé (F). *Cuniculiste* (E).

الموجور ما حوى حفرة مستطيلة بعيدة الفور.

٢٨٠٣٨ - مؤخر اجنوف

Post-abdomen (F). *Postabdomen* (E).

مؤخر الجوف عند الحشرات هو الخس حلقات الاخرة من بطن الحشرة اي جوفها || وهو زوولوجياً ذنب القشريات ومؤخر جسم التريلوبيت.

٢٨٠٣٩ - مؤدكة

طورية صغيرة قصيرة المتى نحو القرة (السان).

٢٨٠٤٠ - مؤوة

Mora (F).

مكة بحرية تدعى جسة المتوسط، اطلها.

٢٨٠٤١ - مؤوت

De cujus

هو الذي مات من مال يورث من يمنه.

٢٨٠٤٢ - مؤودة

Roseraie (F). *Rosery, Rose garden* (E).

حديقة الورد وزراعتها الاستارية.

٢٨٠٤٣ - مؤوق

Frondifère (F). *Frondiferous* (E).

المروق ماكان يحمل ورقاً.

٢٨٠٤٤ - مؤوقية

Lapinière (F). *Hutch* (E).

هي الهرة، اطلها.

٢٨٠٤٥ - موريتية

Maurandia (S).

Maurandie (F).

جنس نباتات عارشة مصرية من فصيلة الخنازريات. انواعها المعروفة ١٢. سيقانها متسلقة. اوراقها قليلة النصل. ازهارها كبيرة القذ بحورية الارنكاز. ترميها انبوي الشكل، خاسي الفصوص الاششوية || اشهر انواعها ما على.

٢٨٠٤٦ - موريتية حمراء

Maurandia erubescens (S). *Maurandie rougeâtre* (F).

جنية تريبتية عارشة تطول نحو ٤ امتار. ساقها وفروجها



موريتية



موريسية

كباسة عجنمة متدلية. ثمارها صغيرة ناشقة لا تكلل ، يزودها كروية كاملة صالحة لتفككتار || وهو يزرع من أجل لباب ساقه الذي يستعمل استعمال البتق . زراعته تقوم ٤ سنوات تنتهي بكبح الساق لاستفراخ لبابها وقد يجري ذلك قبل تبشير الانزراع بتس ٥ أسابيع .

٢٨٠٥٩ - موز السعد *Musa religiosa* (S).

Bananier fétiche (F). نوع من الموز البري الافريقي، مهدده المناطق الاستوائية. ارويته مقلد . ساقه تملو ١٠ امتار . اوراقها كبيرة القند متدلية الاطراف ، نصلها جامد الصفحة المائلة ، يجري الخضار . كباسة كبيرة القند ، نارية القنابات ، ارجوانية الطرطب . ثماره دقيقة ، مستطيلة ، ناشقة لا تكلل .

٢٨٠٦٠ - موز الصين *Musa sinensis* (S).

Bananier de Chine (F). ويصلى موز الهند ، ثماره مأكولة . شروبه الزراعية المشهورة خسة . ارويته مقلد . ساقه تملو من ٤ الى ٨ امتار . اوراقه اعليجية الشكل ، متوسطة القند ، منفردة الانتساب . نصلها فارش الصفحة المنبسطة المتبادلة المتراصة ، لونه الى الخضار الباهت . كباسة متدلية عديدة الاشطاء . ثماره ضخمة قصيرة مأكولة متوسطة الصنف .

٢٨٠٦١ - موز اليابان *Musa japonica*, *M. Basjoo* (S). **Bananier japonais** (F).

نوع من الموز الزراعي المأكول البار . مهدده اليابان وقد انتشرت زراعته في معظم المناطق الحارة نظرا لقلة متطلباته المناخية وضالة ما يلزمه من سرعات حرارية يستهلكها نمو ويتفصيص اذراك ثماره || ارويته مقلد . ساقه خرا اللين تملو من ٢٠٠ الى ٤٠٠ سم . اوراقه تطلو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم . وترعرع من ٦٠ الى ٨٠ سم . نصلها جامد الصفحة الناعمة ، حابب الخضار . كباسة منقطة متدلية عديدة الاشطاء . قناباته ارجوانية . طرطبه غروطي الشكل بنفسي اللين . ثماره مأكولة مستحبة الطعم متدلة الغلاظة والعلول .

٢٨٠٦٢ - موز لينتي *Bananier textile*, *B. d'Amboine*

هو الأبيض ، الطيب .

٢٨٠٦٣ - موز مبدولة * *Mosa sapientum* (S). **Bananier commun**, *B. des sages* (F).

نوع من الموز الزراعي المأكول البار . شروبه المعروفة زهاء ٨٠٠ منتشرة في جميع الاسواق الحارة . ارويته مقلد . ساقه تملو من ٢٠٠ الى ٤٠٠ سم . اوراقه كبيرة القند . نصلها جامد الصفحة الزاوية الخضار . كباسة مستطيلة متدلية كثيرة الاشطاء التي يراوح جدها من ٩ الى ٢٥ سم . ثماره مستطيلة ، مضطمة ، سكرية الطعم ، مستحبة اللذاق والبرف .

٢٨٠٦٤ - موزة *Banane*, *Figue-banane* (F).

Banans (E).

ثمره الموز المأكولة وهي تحوي العناصر التالية :
نحو ٧٢,٤٠ ٪ من الماء
١,٤٤ ٪ من المواد الاوتوية
٠,٠٩ ٪ من المواد المعدنية
٢٣,٩٣ ٪ من المواد الهيدروكربونية

٢٨٠٥٤ - مورينه مبدولة * *Mytilobactis aquila* (S).

الجفاسكة *Mytilobate commune*, *Mourine commune*, *Mourine glorieuse* (F).

نوع من المورينه كبيرة الجفة توها الى البني الاسود المروج . اصطناعا جميع بحار البلاد الحارة والمعتدلة . وهي شربة بطاشة شديدة الطرط .

٢٨٠٥٥ - مورينيات *Mytilobactis* (S).

Mytilobactis (F). *Mytilobactis* (E).

فصيلة اسمك بحرية من السنفقيات ورتبة الاشلاق . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد . اصطناعا بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحارة . قوتها الاسماك والمارح || اجناسها مغلظمة ، مضطمة ، ملتحمة الزعانف الصدرية الكبيرة المستعرضة تشبه الغقاب الباسطة جناحها . رؤوسها مخروطية شارة . اشداقها متوسطة الانفراج اسنانها مسطحة ، سباعية الصنفوف . مورينا جانبيصة الاركاناز . اذنانها مستطيلة كالسياط عقيها ، عند ثمارها عناقس كبيرة مسنة حادة || اشهر اجناسها واعرفها المورينه .

٢٨٠٥٦ - موز *Musa* (S). **Bananier** (F).

Banana-tree (E). **Echte Banane** (D). **Banano** (I).

جنس نباتات عشبية ليفة من فصيلة الموزيات . انواعها عديدة ، اصطناعا البلاد الحارة والاستوائية . جميعها مادمة البروق الخفية . ارويها ممرمة مقلد . جلورها ليفة افقية الانبساط . سوقها مجعومة من الاتحاد الليفية للفتة المتراكبة القرمزية الانتساب . تنتهي بنصال فارقة اعليجية الشكل جامدة الصفحة المائلة الجيلة الخضار . انزراعها سنبل التجميع ، هامى الاركاناز ، كبير القند . ثمارها لينة ، مستطيلة ، كثيرة العدد ، تتولف كباسة مركبة من عدة اشطاء متناقية || والموزة اي ساق الموزة تشر مر واحدة وتوت ، اما الاربعة التي تحفظ التسل فهي ممرمة وتكتار بالفاسل حل مر الاحوام || والموز يجود في جميع الاراضي المعتدلة الانبساط الغنية بالمواد الغذائية والناصر الغذائية وهو من النباتات المروية التي تستلزم الاسقاء المنتظم || اما الازهار المشهورة فهي ما يتبع .

٢٨٠٥٧ - موز الجنة * *Musa paradisiaca* (S).

Bananier du Paradis, **Figuler d'Adam**, **Bananier légume** (F).

نوع من الموز الزراعي . شروبه المشهورة نحو ٥٠٠ ، اصطناعا البلاد الاستوائية . ارويها مقلد . سوقها اسطوانية الشكل خضراء اللون تملو من ٣ الى ٥ امتار . اوراقها كبيرة القند جامدة الصفحة . كباساتها متدلية عديدة الاشطاء . ثمارها مستطيلة ، خفيفة ، عجنمة الاطراف . لبابها غزير المادة اللشوية الغذائية يصنع منه يمد التحليل والسيق دقيق شائع الاستعمال يمدى دقيق الموز .

٢٨٠٥٨ - موز الحبشة *Musa ensata* (S).

Bananier d'Abyssinie (F).

نوع من الموز ، يتكاثر بالبذر ، مهدده الحبشة . ارويته لا تنق ، ساقه تملو من ٣ الى ٧ امتار وهي ضخمة الجذع حل حدود زانها الاول . اوراقه اعليجية الشكل تطلو من ٤ الى ٦ امتار وترعرع من ٨٠ الى ١٢٠ سم . نصلها ناعمة جامدة جيلة الخضار ، ضلوحها غليظة جلوية اللون . انزراعها سنبل التجميع . انزاعه بنفسجية كبيرة القند ،



مورينه مبدولة



موز الجنة



موز مبدولة

Canthus ٢٨٠٨٠ - **مُوق**
هو ملتقى الجفتين وما اثنان: الموق الاكبر والموق الاصغر. فالأكبر ما كان من جهة الانثى والاصغر من جهة الذن.

Réchaud (F), Chafing-dish (E). ٢٨٠٨١ - **مُوقِد**

Apogée (F), Apogee (E). ٢٨٠٨٢ - **مُوقِل**
البعد الأقصى لنجم عن الارض.

Mandant (F), Employer (E). ٢٨٠٨٣ - **مُوسِكِل**
هو الذي يصدر منه التوكيل الى شخص يدهي وكيله.

Eleveuse (F), Raiser (E). ٢٨٠٨٤ - **مُوسِكِن**
دنية اصطفاة تستعمل لحسن القوب.

Mull ٢٨٠٨٥ - **مُوَل**
ساف من الطبقة الدنياية يرتكز على التربة المدنية، يشتر بحبيباته الرملية ويكثر ذيدانه وحشراته وبخاصيته النسيية وبوفرة مواده الغذائية.

Financer (F), To finance (E). ٢٨٠٨٦ - **مُوَل**

Araignée (F), Spider (E). ٢٨٠٨٧ - **مُوَلَة**
المول اسم للمكبت. الواحدة مولة.

Zeus (S). ٢٨٠٨٨ - **مُوَلَك**
Zée, Dorée, Poisson de St Pierre (F).

سمكة بحرية وحيدة الجنس والنوع من شالكاات الزعانف وفصيلة المولكات. اصطناعها البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي || جسمها شبه بيضي الشوزن يطول من ٤٠ الى ٥٠ سم. رأسها مستطيل الجرم، كبير الفمق الرب. عيناها ماحتان. زعنفتها الظهرية كبيرة مسطيلة، منحنية القسم الامامي، سرعة الخلفي. ويدلوا في القسم الامامي نحو ١٢ حكة مستطيلة دقيقة غسروية التركيب. زعنفتها الخرجية ثلاثية المناص الحادة. الذيلية شبه مربعة مقطوعة. ثوبا الى الصغار المذهب. يدلوا في اعلى خيشها نقطة سوداء مستديرة || لها مأكول متوسط الصنف.

Zeldas (S). ٢٨٠٨٩ - **مُوَلَكِيَّات**
Zeldés (F), Zeldae (E).

فصيلة اسماك بحرية من شالكاات الزعانف. اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد، اعطاتها بحار العالم || اجسامها متباينة القد، منها الصغيرة والوسطى والكبيرة. جميعها بيضية الشوزن او اهليلية. رؤوسها مستقيمة. زعانفها الظهرية كبيرة مزينة || لحومها مأكولة لكنها من الاصناف المبهلة.

Molennidas (S). ٢٨٠٩٠ - **مُوَلَنِّيَّات**
Molennidae (F), Molannidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة جلوليات الاجنحة. اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض جبال البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها متوسطة القد، عمراء البرن. يسطة اجنتها تراوح من ١٨ الى ٢٨ م. اجنتها مستطيلة الشكل، ضيقة. الامامية منها كثيفة الخمل، الخلفية شفاقة || تألف الجيبرات والمنساق والفردان. اساريها تعيش في المياه الراكدة ضمن جلايب ريلة

١٠٢٢ ٪ من السليلوز
٠٩٢ ٪ رماد

Mouzaubi (F). ٢٨٠٩٥ - **مُوزَمْبِي**
هو التليكة من النباتات البقية، اطليا.

Equilibré (F), Balanced (E). ٢٨٠٩٦ - **مُوزُون**
نمت تعريفي يطلق على كل تبغ متدل الطعم لا يتحور نفس.

Musaceae (S). ٢٨٠٩٧ - **مُوزَنِيَّات**
Muscées (F), Musaceae (E).

فصيلة نباتية من وسيدات الفلفة. انواعها عديدة تجسمها ثلاثة اجناس: اللوز والجل والوشيج. اصطناعها اليسلاد الاستوائية والحرارة. نباتاتها عشبية حادة الجلمع المشية. سوقها انحاء ليفية، مراكية، فرصة الانتشاب، ترتكز على اروية.

Muscardino (F). ٢٨٠٩٨ - **مُوسَكِرْدِين**
Silkworm disease (E).
مرض يصيب دود القز يدهي الشلل الوردي، اطليا.

Thérrophyte (F). ٢٨٠٩٩ - **مُوسَمِي**
Therophyte (E).
كل نبات يزري للنشأ دورته الحياتية تطول موسمًا واحدًا لا يتعدى الخيل.

Prisme (F), Prism (E). ٢٨٠٩٠ - **مُوسُور**
جسم متوازي الحروف الجانية المتساوية السوية على كل من قاعدتيه || والمشور قد يكون قائمًا ومزودبًا وثلاثيًا ورباعيًا وخماسيًا الخ... || يستخدم المشور الزجاجي الثلاثي السطوح في علم الضوء وهو يتكون من وسط شفاف محصور بين سطعين مائلين تحدهما زاوية تدعى زاوية الانكسار.

Prismatique (F). ٢٨٠٩١ - **مُوسُورِي**
Prismatic (E).
نمت تعريفي يطلق على ما كان شكله كاللمشور.

Paille (F), Straw (E). ٢٨٠٩٢ - **مُوس، قش**

Commissure ٢٨٠٩٣ - **مُوسِل**
موضع اتصال بعض اجزاء الجسم.

Efférent (F), Efferent (E). ٢٨٠٩٤ - **مُوسِل**

Inducteur (F). ٢٨٠٩٥ - **مُوسِل كَهْرَبَائِي**
Inductor, Field-magnet (E).

Légataire (F), Legatee (E). ٢٨٠٩٦ - **مُوسِي له**
هو الذي يستحق له الموصى به.

Hétérozygote (F). ٢٨٠٩٧ - **مُوسُوت**
Heterozygote (E).
هو الاشيب، راجمه.

Mahogon (F). ٢٨٠٩٨ - **مُوسُوت**
هو الخلف، راجها.

Fourmis ailées (F). ٢٨٠٩٩ - **مُوقِي**
Winged ants (E).
هو النمل الجتح.



مُوسِكِن

شبه غروبية الشكل يطؤها مجر رقيق قلبى الشكل ، من التركيب ذاته يمينها على الانتقال . اشهر اجناسها :

Molania (S).

المولنة

٢٨٠٩١ - مُولَات ٥ Laemobothronidae (S).

Laemobothronidae (F). Laemobothronidae (E).

فصيلة حشرات جلدية من رتبة القلديات وطبقة القمليات . انواعها عديدة يجمعها جنس واحد . جميعها صغيرة القد ملتصقة بالجسم المستطيل ، ملوطة بأرجح من ١٠ الى ١٠٠ م . الزواجا الى الكهبة البهراء يملونها بغطيتهم اسمر . وفي تميش على الطيور الكركاس فضفيهما . واحدتها مولة والجمع مول .

٢٨٠٩٢ - مُولَات قَرْكَاة Molyta (F).

في حنفساء اجزر ، راجعها .

٢٨٠٩٣ - مُولِيرَة Mulleria (S).

Mulleria (F). Mulleria (E).

جنس حورانات مائية من الرخويات مصفيات الشياثم وفصيلة النبادات . انواعها المعاصرة المروفة قليلة العدد اعطائها ابنر ومناع وغدران امريكة الاسواتية || اسدانها لانظامية الاشكال والاحجام ، لامتناهية الصارم ، ملحوفة بادمة سميكة باحة الحفار || تميش منتفحة في الاحمال . لحومها كاتعة الصنف .

٢٨٠٩٤ - مُولِيرِيَّة Molinie (F).

في الخوطاية الزرقاء ، اطلبها .

٢٨٠٩٥ - مُموم Heum (F).

هو الشيث البري ، اطلبه .

٢٨٠٩٦ - مُمَزْرَة Bananeraie (F).

Banana-plantation (E).

في بستان الموز .

٢٨٠٩٧ - مُمَزْرَة ٥ مُسْتَبِين Monarda (S).

Monarde (F). Bee-balm (E). Etagenblume (D).

Monarda, Menta americana (I).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الشفويات . انواعها سبعة . سيقانها فروع قصيرة . اوراقها كاملة مسننة متعاقبة . ازهارها غنية التجميع ، انبيلة الارتفاع او طرفية . اوراقها وازهارها غنية بمادة التيبول || اشهر انواعها شاي بلسانغاني وتعتبر الخليل والانسورية والمرقطة .

٢٨٠٩٨ - مُمَزْرَة مُرَقَّطَة Monarda punctata (S).

Monarda punctata (F). Monarda punctata (E).

نوع من الموزدة وهي بجلة تربيينة معمرة تملو من ٤٠ الى ٦٠ سم . ساقها فروع . اوراقها سنائية . نصلها خلى البشرة مسنن الحلقه . ازهارها الى الصفرة المرقطة بالحمرة . ازهارها يستمر من حزيران الى تشرين الاول .

٢٨٠٩٩ - مُمَزْرَة نَاصُورِيَّة ٥ بَرَقَمَت بَرِّي Monarda fistulosa (S).

Monarda fistulosa (F). Monarda fistulosa (E).

نوع من الموزدة وهي بجلة تربيينة معمرة تملو من ٦٠ الى ١٢٠ سم . ساقها سقة فروع . اوراقها بيضيه ذرية . نصلها خلى الصفرة مسنن الحلقه . لون ازهارها يختلف

باختلاف الفروبي . منها الابيض والبني والاصفر والوردي والاحمر || ازهارها يستمر من حزيران الى آب . اوراقها عطرية فواحة المرق تستعمل في صناعة الملوحة ويستخرج منها زيت الازهار ، بالتقطير ، زيت طيار له رائحة الكافور وهو سميح ، طارد للرياح ، مضاد للنتن ، مفيد للاعصاب خافض الحرارة . اوراقها الحارقة تستعمل استهلاك الشاي .

٢٨١٠٠ - مُلَات Acuminé (F). Acuminata (E).

نمت وصني يطلق على الورقة او الشرة المدببة الطرف .

٢٨١٠١ - مُونِيلِيَّة ٥ Monilla (S).

جنس فطور مجهرية من الثويات وفصيلة الفوطيات . جربها الكنديدية واضحة الهيئة . كتالها لبنيوية الشكل ، سبيحية التجميع || انواعها عديدة معظمها طفيلي يشكل الطور الكندي في اللبن || اعرف انواعها وانهرها الثلاثة التالية .

٢٨١٠٢ - مُونِيلِيَّة بَيْضَاء Monilla candida (S).

ظفر من المونيلية يركب القش والاغصان الخشنة والساورة الى الاعلال والبار السكرية المخموفة والمصير والخلاد... . كتالها سبيحية التجميع . قياس الكنديدية ١٠×٧ م .

٢٨١٠٣ - مُونِيلِيَّة ذَهَبِيَّة Monilla aurea (S).

ظفر من المونيلية يركب لادن الجذوع والاصصان اليابسة . يبدو كالريادة . كتالها لبنيوية الشكل صفراء اللون مقلعة المواج قياسها ١١×٢٠ م .

٢٨١٠٤ - مُونِيلِيَّة مَهْمَاء Monilla fimicola (S).

نوع من المونيلية فطرها يركب عرم المفاطر فينتطها ويضعها بمشجيه الاميق اللون ، اللبد التجميع ، الذي يقضي على الفطور المرئية الناشئة || يكافئ بنسخ المرية الحاصبة بالمخاض الخلي عيار ٣٣٪ للركر ١ على ٧ اي جزء واحد من المخاض في سبعة اجزاء ماء .

٢٨١٠٥ - مُونِيلوبسيس ٥ Monillopsis (S).

جنس فطور مجهرية من الونيات . مشجيه قدي الشكل ، لبد التجميع ، يسرح على الاعضاء النباتية عند سطح التربة . هيئة اسطوانتي الشكل ، دقيق الجليل ، كبير الفروع ، تراكب القواصل || انواعها قليلة المدد والاذى اعرفها سالي .

٢٨١٠٦ - مُونِيلوبسيس اُدُرْهُولدي ٥ Monillopsis adarholdi (S).

ظفر من المونيلوبسيس يركب سوق واوراق الارلسية والعلقية والكرزيت ومخدر مرمج والسراخس... . اشهره في الاوراق عادية لا تستعجب المكافسة . اما اذا تمكن من السوق فانه يقضي على اللحاء عند سطح التربة . لذلك تحسن المكافسة .

٢٨١٠٧ - مُونِيلوبسيس قَاضِي ٥ Monillopsis fagi (S).

نوع من المونيلوبسيس فطره يركب اوراق الزان فيقضيها لانه يسبب يباس النسيج .

٢٨١٠٨ - مُونِيلوبسيس فُولِكُولا ٥ Monillopsis follicola (S).

نوع من المونيلوبسيس فطره يركب اوراق الاكينيبيسا . والبثق والاجاس فيشجها يفسق الشيء دون ان يؤذيها .



موزدة ناسورية



مونيلية



مير للك



ميشة الرنسن



ميشة مقنسة



ميشة نقية



ميشة وردية



مِثَع

٢٨١٣٣ - مِثَعَان ، مِثَان Methane (F).
غاز ملتهب عديم اللون .

٢٨١٣٤ - مِثَوَكُونَدِرِي Mitochondrie
رأبج كونهريوزوم .

٢٨١٣٥ - مِثَعَنَة Mycena (S).
Mycène (F). Mycena (E).

جنس فطور من فصيلة الفاريقونيات . أنواعه المعروفة قليلة العدد أعطاها غابات مناطق البلاد المعتدلة الحرارة . تتميز بنسكها الصغيرة وبأطراسها الحادة الأطراف الملوثة . بعض أنواعها جيدة الصنف مأكول والبعض الآخر كاعن الصنف غير مرغوب فيه || أعرف أنواعها وأشهرها الأربعة التالية .

٢٨١٣٦ - مِثَعَنَة السَّرْمَسَن Mycena epipterygia (S). Mycène des fougères (F).

توجد في المواقف الرطبة بين السرخس . ساقها دقيقة ، رفيعة ، لزجة . نكتها قمية الشكل . صغرة اللد ، قطرها نحو ١ سم . لونها أل الصفار الميوني || لحيتها كاعن الصنف ، غير مرغوب فيها .

٢٨١٣٧ - مِثَعَنَة مَقْنَسَة Mycena galericulata (S). Mycène à bonnet (F).

توجد في الغابات على الجذوع النخرة القريبة من التربة . ساقها دقيقة ، متدلة الانحناء ، تينة اللون . نكتها قلنسوية الشكل ، قطرها نحو ٥ سم . لونها إلى الكعبة الصفراء . أطراسها وردية اللون || لحيتها مأكولة ، لذينة الطعم ، مرغوب فيها .

٢٨١٣٨ - مِثَعَنَة نَقِيَّة Mycena pura (S).
Mycène pur (F).

توجد في المواقف الرطبة . تعيش على اللبالب . رانحتها صافية القليل . ساقها متدلة الانحناء والمتلافة . نكتها صافية الشكل ، صفراء اللون يعلوها موج ليليكي عابن . أطراسها وردية اللون || لحيتها كاعن الصنف ، غير مرغوب فيها .

٢٨١٣٩ - مِثَعَنَة وَرْدِيَّة Mycena rosella (S).
Mycène rosé (F).

توجد في المواقف الرطبة بين الصغبر . ساقها رفيعة ، دقيقة ، وردية اللون . أوسرتها صافية الشكل ، صغيرة اللد ، قطرها نحو ١ سم . لونها إلى الوردية العابق || لحيتها كاعن الصنف ، غير مرغوب فيها .

٢٨١٤٠ - مِثَعَج Dactylopterus volitans (S).
Dactyloptère, Grondin rouge (F). Flying-fish (E).

جنس اسماك بحرية طيارة زاحية الألوان من فصيلة الميجيات . وديتها شاكات الزائفة الاصعبية . أنواعه قليلة العدد ، أشهرها مِثَعَج المتوسط الذي يبلغ طول نحو ٥٠ سم . له زعنفتان مجنحتان طول الواحدة نحو ٣٠ سم . يمكنه من الارتفاع والسير فوق الماء فيطير نحو نصف دقيقة على ارتفاع متر .

٢٨١٤١ - مِثَعَج مِثُول ، مِثَعَج المِثُول Dactylopterus volitans communis (S).

Dactyloptère pirapède, D. commun, D. de la Méditerranée (F). Swallow-fish, Kite-fish, Common Flying-fish (E).

نوع من المِثَع . سمكة بحرية يروض من فصيلة الميجيات

٢٨١٤٥ - مِثَاع Fluidista (F). Fluidista (E).
النوع من شايح النظرية القائلة بأن الغناطيس الحيواني يمد إلى جاذبية خاصة .

٢٨١٤٦ - مِثَاكَة ، كَلَاكِيَّة Collecta (S).
Collectie, Mayaca (F). Mayaka (E).

مِثَاكَة هو الاسم الشلي . جنس نباتات برية معمرة ، طيبة من فصيلة النقيات . أنواعها المعروفة نحو ٢٠ منها بعض مناطق أمريكا الجنوبية اعصها الشلي والبيرو . جميع أنواعها شجيرات وريجات فرعاء . بعضها شالك الانقار والافقان . أوراقها متعاقبة ، متعقة ، اهليلجية الاتصال الصغيرة . أزهارها فردية ، اهليلجة الانزكار ، عطرية العرف ، يكثر لها اللون الالبفس . ثمارها تنابية الشكل واللذ ، مأكولة لكنها تسهل المدة .

٢٨١٤٧ - مِثَاكَة رَاكِدَة ، مِثَاكَة آسَنَة Eaux stagnantes (F). Stagnant water (E).

٢٨١٤٨ - مِثَاكَة Hydrométrie (F).
Hydrometry (E).
علم كل ما هو عنص بالماء كالكثافة والضغط والسرعة الخ .

٢٨١٤٩ - مِثَبَة Jus de coing (F).
Juice of the quince (E).
صغير السفرجل .

٢٨١٥٠ - مِثَبِير المِثَسَك * Bledius littoralis (S).
Blédie armé, Blédie du littoral (F).
Bledius littoralis (E).

حشرة جاسة رائجة من فصيلة الدنليات وديتها غدديات الاجنحة . موطنها حوض البحر الابيض المتوسط . تألف المواقف الرطبة واعصها البساتين . خنافسها ويرقاتها تعيش على المواد العضوية وكل ما تستطيع افتراسه من الحشرات الدنيا || جسمها صغير اللد ، نحيل ، يطول من ٦ إلى ٧ سم . ثوبها ثنائي اللون ، اسود الجسم ، جؤوي القمدين والجرايز . رأسه صغير الحجم قصير الخطم ينتهي بفكين ضليعين . ورأس الذكر مسلح بقرفين ذريين . زبانه مرفقتان

مِثَاكَة صغيرتان . ظهرانه عادم الترسيز يلسف نحو خني البطن || يدعي مير المِثَسَك نسبة إلى ما تفرزه سكته البطنية الثامنة من مادة عطرية قريبة الشبه بعرف المِثَسَك || الذكر اميز قدام من الانثى وأبع ثوباً منها واطول زبناً وراق بطناً || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اوائل الربيع وتعيش حتى اواخر الصيف . تسرح في الليل وتبيت في النهار || البرقة بطيئة النمو لا تتدلك الكمال الجسدي قبل اواسط شباط . جسمها يطول من ١٢ إلى ١٥ سم . وهو مستطيل المقدم والرأس ، مستدق الطرف امير اللون ، امير الرأس والشعر ، منقط الجانبين الابيين والاسير بملون سود متوسط السمك || طور الاكمال يستمر من اواسط شباط إلى اواخر آذار .

٢٨١٤١ - مِثَبَة Guenon (F). She-monkey (E).
المبة القردة الفنية وتدعي قِشَة . اما التي بلغت الفسبة فتدعي زَنَامَة .

٢٨١٤٢ - مِثَاكِيكِيك ، مِثَاكِيكِيك Métaphysique (F). Metaphysic (E).

علم كل ما وراء المادة أو الطبيعة من المعتقدات .



مَيْجَة



مَيْجَل



مَيْجَة البَطَا



مَيْجَة النَّارِيْقُون



مَيْجَة خَيْبِيَّة



مَيْدَاس



مَيْدَع

شائكات الزعانف الاصبعية || اسطائها بحار البلاد الحارة وبها المتوسط . يكثر وجودها في المياه التوتسية والبيئية ويقف في المياه العذبة || جسمها شبه وشي الشكل يطول من ٤٠ الى ٦٠ سم . رأسها مستدلل الحجب ، غروي الشكل . فكها الاعلى يتقدم الاسفل قليلا . عيناها كبيرتان ، مستديرتان ، فاصتان ، رفيتان الارتيكاز . ثوبها يراوح بين الاحمر والوردي الزاهي يملو موج اصفر وبمجيبي || زعانفها متباينة الاشكال والاحجام . الظهرية مستطيلة الصدرية كبيرة جناحية الشكل يطولها عند قاعدتها شعاع مقوس الطرف || زعنفتها الصدرية الصدرية جعنتان تمكناها من الارتفاع فوق سطح الماء والطيران نحو نصف دقيقة واكثر || لحمها متوسط الصنف ، مأكل .

٢٨١٢٢ - مَيْجَة * (E). *Majsa, Mafo* (F). Spider crab. عيش منع من القشريات المعروفة بمتاع البحر . انواها عديدة ، اسطائها بحار البلاد الحارة . يكثر وجودها بين الخش ومن الصغور || اشهر انواها المأكولة الميحية الميولة التي يراوح طولها من ١٨ الى ٢٢ سم .

٢٨١٤٣ - مَيْجَل * (E). *Amelva* (F). *Amelva* (E). جنس حيوانات زحافة من الطاء وفصيلة التديتات . انواها المعروفة نحو ٢٠ موطنها امريكة الوسطى والاكوادور . تألف البراري والقياني الرملية . قوتها الحشرات واسارها والديدان || اجسامها تطول من ٢٥ الى ٣٧ سم . اثولها تختلف مع الانواع تكثر فيها الركة السراء .

٢٨١٤٤ - مَيْجِيَّات (S). *Dactylopteridae* (F). *Dactylopteridae* (E). فصيلة اسماك بحرية بيروية من رتبة السطيات شائكات الزعانف الاصبعية || اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد . معظمها من اسماك المحيط الهادي والهندي والبحر الاحمر || اجسامها وشية الشكل تطول من ١٥ الى ٧٠ سم . رؤسها كبيرة . عظامها قصيرة . زعانفها الصدرية مستطيلة ، جناحية الشكل ، تمكنها من الطيران فوق سطح الماء || اشهر انواعها واعرفها الميج الميحل .

٢٨١٤٥ - مَيْج : الميج : مهي البطة . ماحت تيج .

٢٨١٤٦ - مَيْجَكَة * (E). *Isolde* (F). *Isolde* (E). الشجرة او الاكلة المنفردة البائنة عن اسرارها . ج . مواسيد .

٢٨١٤٧ - مَيْجَة * (S). *Hypomyces* (S). جنس فطور مجهرية من السانغيات فصيلة السطيات . انواعها عديدة معظمها من الفطور التي تنقل على خبثا من الزرقات والذعنات وبعضها يعيش على النباتات العليا . اصناسها وتكاثرها دقيقة ، نكاحها اروسية الشكل متراكبة . بوطها متابع الخلايا وردي اللون || انواعها اللؤبية ثلاثة وهي :

٢٨١٤٨ - مَيْجَة البَطَا * (E). *Hypomyces haematococcus, Nectria citri, Fusarium solani esmarili* (S). فطر مجهرية يصيب عدة نباتات انحصا البطاطا والخضضيات والبن والكاكاو الخ ... || يركب بطور البطاطا ودوناتها . مظهره الخارجى يقع سمع لا قياسية تنفى البشرة والللب فتسبب ضففا دون ان تؤذي الجيون || ويركب سق

الاشجار من الخضضيات وغيرها فيسبب قروحا لونها الى السرة تبهو كالحلوش المنسجة ثم تنتشر لتسبب السواء والشكر والخشب وتقود الجلع الى الصرم || يكافح بالزركيزون المحلول ١٠ ٪ الى ١٥ ٪ من امداد التطهير مرة ثانية بعد الاول بادبعة او خمسة ايام .

٢٨١٤٩ - مَيْجَة النَّارِيْقُون * (S). *Hypomyces rosellus, Dactylum dendroides* (S). فطر مجهرية يتطفل على الناريقون اللؤبية . مظهره الخارجى يقع خلية ، لونها الى البياض الاخضر ، قشرها يراوح من ١٠ الى ٣٠ سم . تملو المفطرة حشا وعتاك ثم يركب الناريقون وقد تصيب نكمتة قسطها وتضرها بعد ان تمطتها بمسح خاص ، نواها كنفد القطن لونه الى الخضرة الزرقاء || يكافح باستعمال الليزول المحلول ٢ ٪ او الفورمول التجاري المحلول ايضا ٢ ٪ .

٢٨١٥٠ - مَيْجَة خَيْبِيَّة * (S). *Hypomyces perniciosus, Mycogone perniciosus, Verticillium, Cephalosporium* (S). *Môle du champignon de couche* (F). فطر مجهرية يتطفل على بعض انواع الفطور المأكولة واخصه الناريقون المرئ || مظهره الخارجى يقع خلية لونها الى الرماد تملو سطح المفطرة ثم تمتد الى الفطور قسطها وتضرها || يكافح باستعمال الليزول المحلول من ٢ الى ٢٥ ٪ .

٢٨١٥١ - مَيْجَعِيَّة * (F). *Unioitn* (F). نمت تعريفي يطلق على كل حشرة تبيض موسما وحادا متتابعا لاستطفا في دورتها الحياتية الحولية .

٢٨١٥٢ - مَيْجَعَاء * (F). *Style* (F). يقال بنوا يجم على مياه واحد اي على طريقة واحدة .

٢٨١٥٣ - مَيْدَاس * (S). *Midas* (S). *Tamarin* جنس قرود امريكية من فصيلة القرود الدبية . انواها ٢١ . موطنها كستاركا وباناما وكوليبيا والبيرو والبرازيل والفوايا || اجسامها صغيرة القد ، حيلة الشكل ، مستطيلة للشر الناعم اللوثر . رؤسها مستديرة ، اذانها عادمة الورر . اذانها مستطيلة حيلة . اثولها سوية الالوان المتباينة الموج || تعيش بين الاغلال وفي الدروع القريبة من الثبات . قوتها الحشرات والطاء والسفادع والعصافير وبعض الثار والحويو .

٢٨١٥٤ - مَيْدَاس ، مَيْدَاس * (F). *Hippodrome, Champ de courses* (F). *Hippodrome, Race-course, Race-ground* (E). مكان سباق الخيل .

٢٨١٥٥ - مَيْدَاس * (E). *Fluviographe, Fluviomètre* (F). *Fluviometer* (E). جهاز يستعمل في قياس مياه الانهار ونسبة انحدارها .

٢٨١٥٦ - مَيْدَع * (F). *Pentapus* (S). *Pentapode* (F). جنس اسماك بحرية من فصيلة القرشيات . انواعها المعروفة قليلة ، جميعها من اسماك بحار البلاد الحارة والمستديرة . اجسامها اليلبية الشكل متوسطة القد . زعانفها الظهرية مستطيلة شائكة . زعانفها التخرجية فارة . اثولها فضية اللون يملو تحطيط مذهب قاطب .



ميدوس



ميدوس



ميدوس



ميدوس



ميدوس



ميدوس

٢٨١٦٣ - مِيرُوس ، مِسْقَرَةُ الْإِرْتِفَاعِ

Mire (F). Sighting (E).

مسقرة مرقعة تستعمل لمعرفة الارتفاعات في مسح الأرض .

Mira (F). Mira (E).

ميرا نجم ثير من كوكبة قيطس مشهور باسم أصبوية ، أطلقها .

٢٨١٦٥ - مِيرَاتُ

Héritage, Hoirie, Succession (F). Heritage, Inheritance, Succession (E).

هو التركة ، أطلقها .

Mira (S). Mira (F).

جنس حشرات ناعمة من فصيلة الحشرانيات ورتبة غشائيات الاجنحة المخفضة . أنواعها عديدة موطنها بعض مناطق البلاد المعتدلة الحارة . جميعها تتطفل على الحشرات الصارقة من الحشرشيات وذوات الجناحين || أجسامها صفيرة القند تطول نحو ١ سم . رؤوسها نصف دائرية الشكل . قرونها الاستقامارية مرفوعة ، صمغية ، كبيرة . جوارثها مستطيلة . بطونها قصيرة يرمية الشكل . مراتها قصيرة . اجنتها بملع عند الشقين . أنثاها تزاوج من الوردي إلى الصنابي الاصفر المالح .

٢٨١٦٧ - مِيرُوسِين * ، قَتَم

Myrsina (S).

Myrsine (F). Myrsine (E). Trugmyrte (D). Mirsine (I).

جنس نباتات جنينية مسرة من فصيلة البرمديات . أنواعه عديدة ، أعطائها البلاد الحارة النضرة نحو الاستوائية . جميعها تشبه الآس ، بعضها زراعي ثماره نوية صفيرة القند مأكولة .

٢٨١٦٨ - مِيرُوسِينِيَّات ، قَتَمِيَّات ، جَنَاحِيَّات

Myrsinaceae (S). Myrsinacées (F). Myrsinaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين . اجناسها واولاها مع ٥٥٠ معظما من نباتات المناطق الاستوائية ، فيها الاشجار والشجيرات والجنابات . اوراقها متعاقبة . ازهارها صغيرة القند ، منها الخشوية ومنها وصيدة السكن . ثمارها نوية مأكولة في بعض الانواع .

٢٨١٦٩ - مِيرُوق *

Myagre perlolié (F).

نبات عشبي بري حولي من فصيلة البيلبديات . منتهه البلاد المعتدلة الحارة من الشرق الاوسط واروپة . ساقه فروع . اوراقه متعاقبة ، رقيقة النصل ، بحرية اللون . ازهارها ناجي الارتكاز عشقوي التجميع . ازهارها صفيرة القند صفراء اللون دقيقة المالحق . ينبت بين الزروع ، كثرته مؤذية .

٢٨١٧٠ - مِيرُوس *

Myrus (S).

Myra (F). Myrus (E).

جنس اسماك بحرية من مفتوحات الحائنة وفصيلة الشبقيات . منتهه انواعها المروقة اثنا عشر ، واحد منها الميروس الملبل يعيش في البحر الابيض المتوسط والثاني من اسماك بحار الصين واليابان || جسمه مستطيل الشكل كاللاكليس ، طوله يراوح من ٦٠ الى ١٢٠ سم . جلده امرب عادم المرافش . رأسه مخروطي ، ذائق الخطم ، واسع الصدق . عيناه صغيرتان صامتحتان . زعنفته الظهرية قاطبة ، ضيقة تقابلها الشرجية التي تحت من اواسط البطن الى طرف الذيل . ثوبه الى

٢٨١٧٠ - مِيدَاقُ مَشْبَر

Pentapus vittatus (S).

Pentapode ray (F). Sea rough (E).

سمكة بحرية بيوض من فصيلة القرعيات ورتبة شاككات الزعانف . أعطائها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحارة ومنها البحر الابيض المتوسط . تعتبر من اسماك الثغاف المتوسطة الغور || جسمها اهليجي الشكل ، يطول من ١٥ الى ٢٥ سم . ثوبها الى الزرقاء الفضية المالحق يبق عند الرأس والظهر ويدير ويبيض عند البطن ويملوها في جانبها ستة خطوط ذهبية قاطبة . زعانفها زرقاء اللون ، الصدرية والحوضية والشرجية والذيلية حر القواعد . رأسها مخروطي الشكل ، ذائق الخطم . شفتها معتدل الانفرج . اسنانيا صغيرة ذرية . عيناه كبيرتان ، ناشزتان ، صليتان . زعنفتها الظهرية واحدة مستطيلة . زعنفتها الذيلية فارقة || لحمها جيد الصنف ، مرفوف فيه .

٢٨١٥٨ - مِيدَاقُ *

Parefeu (F). Firebreak (E).

حاجز طبيعي او صناعي جردت منه جميع المواد القابلة للاشتعال منعا لامتداد الحريق في الغابات والاحراج .

٢٨١٥٩ - مِيدُوس *

Mydaus (S).

Mydaus (F). Mydaus (E).

حيوان لبون مفترس من فصيلة السوريات . موطنه الهند الصينية ونيوزيا || جسمه قريب الشبه بحم الغرير . رأسه مخروطي الشكل ، ذائق الخطم . قوائمه قصيرة . اظافيره مستطيلة ، شديدة الصلابة . عليه عشش . ثوبه الى السمرة الكستانية يعلوه خط ابيض يمتد من القطن الى مفترز الذنب . ذنبه جعدة كستانية اللون يضاء الطرف || من ميزاته انه يبري عدوه بسائل كاسر كرهه الرائحة تفرزه اللغد الشرجية ويسدده بفضففيه على ايمد من متر .

٢٨١٦١ - مِيدِيَّات *

Mytilidae (S).

Mytilids (F). Mytilidae (E).

فصيلة من الرغويات صفحيات الخياشيم . اجناسها وانواعها عديدة منتشرة في جميع بحار العالم . اشهرها الميدي .

٢٨١٦١ - مِيدِيَّة * ، بَلَحُ الْبَحْرِ

Mytilus (S). Moule (F). Mussel (E).

جنس بحار من فصيلة الميديات . انواعها المروقة نحو ٧٠ معظما مأكول مستحب اللحم . يعيش على الصخور التي يغمرها المادوقه ير في احواس بحرية خاصة صار تجهيزها في هذا السيل .

٢٨١٦٢ - مِيدَل *

Hemicentetes (S).

Hémicentète, Hémitanrec (F).

جنس حيوانات لبرنة حارشة من فصيلة المالحات . انواعها المروقة قليلة القند موطنها الساحل الشرقي من جزيرة مدغشقر . تألف السباب والاماكن التي يكثر فيها الاعشاب البرية . مسرعا دجوي . قوئها الحشرات والديدان || أجسامها صغيرة مكرومة تطول من ٢٠ الى ٢٥ سم . أعطائها مستطيلة . عليها معتدل الشخانة تتخلله سال متباينة الطول تكثر في ثوب الظهر . اولها الى القدر السوداء يعلوها تسنج قابل اصفر . وثبا نوح اسود الرأس || انثاها ثورقة تضع في كل رمص من ١٠ الى ١٢ جروا || يابثا الشوي يستمر نحو اربعة اشهر .

٢٨٣٠٠ - نارجيس * ، نَعْرُوس

Tragelaphus spekel (S). Tragélaphe de Speke (F). Nakong (E).

نوع من الجبل، قدره قدر القنمار، له قرنان جالسان ثوبه الى السرة يملوه بجلع ابيض. اطلانه اواسط افريقية. يأنف الحصاب والفياي ويرتاد المناقع وضفاف مجاري الماء. قوته الاشباب. اجله يد من ٥ الى ٢٠ نفراً.

Méua (F).

٢٨٣٠١ - نَارِ هِنْدِيّ

هو المهر، اطلبه.

Naranio (S).

٢٨٣٠٢ - نَارَاوِي

Naranio (F). Naranio (E).

نارايو هو الاسم الهندي. جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحات الخياشيم وفصيلة النقيبات. انواعها المعروفة قليلة العدد بعضها هندي والأخر استرالي || اجسامها صغيرة. مناهبا بارزة و طليقة. اصداؤها صيوانية الشكل || تميش في انفاق تنقبها في الصخور المغسورة بالماء قرب مصبات الانهر || ليفها غزير المادة، جيد الصنف.

Cocos (S).

٢٨٣٠٣ - نَارَجِيل

Cocotier (F). Cocoa-nut palm (E).

جنس اشجار ليفية الجذع من فصيلة النخلات. انواره المعروفة ٣٠ ، اطلانها المناطق الاستوائية والحارة. مظهرها بري وزينبي وبعضها زراعي صناعي. اشهر انواره النارجيل المعروف (الطلة). أما الانواع التزيينية التي تميش في بعض الموانع الخادرة من الاقاليم المعتدلة فهي :

Cocos erythrosapatha

Cocos eriosapatha

Cocos australis

Cocos lapidea

Cocos leiosapatha

Cocos datil

Cocos coronata

Cocos campestris

Cocos elegantissima

Cocos romanzoffiana

Cocos plumosa

Cocos flexuosa

Cocos capitata

Cocos weddelliana

Cocos ysay

Jubée (F).

٢٨٣٠٥ - نَارَجِيل شِيلِيّ

هو الجوهه ، اطلها .

٢٨٣٠٦ - نَارَجِيل مَعْرُوف * ، جَوْزُ الهِنْدِ

رَاجِيّ، شَعْمُور، حَشْرَج

Cocos nuffera (S). Cocotier commun (F). Cocoa-nut palm (E). Kokospalme, Indischer Nussbaum (D). Cocco, Albero del cocco, Noce d'India (I).

نوع من النارجيل الزراعي. ساقه امطوانية متعصبة تملو نحو ٢٥ م. اطلانه بعض المناطق الاستوائية. يعيش قرب الماء ويجود على الشواطئ البحرية. ثماره بيضية الشكل طولها من ١٦ الى ٢٢ سم. قشورها غشية تغلفها الااليان. لبها جامد الحمر، حامي اللين، مستحب الطعم، شائع الاستهلاك الغذائي والصناعي.

٢٨٣٠٧ - نَارَجِيلَة * ، جَوْزَةُ الهِنْدِ ، جَوْزَةُ

النَارَجِيل

Coco, Noix de coco (F).

Coco-nut (E).

ثمرة النارجيل، لبها يتبع من البلمغ والسوداء وضعت الكبد والكل والمثانة وقروح الباطن. ويزيل اوجاع الظهر واليدان والراسير ويهيج لقوة الجفنة ويمنع تقطير البول. صصاره مع السكر تخلص الدم وتقوي الزهرة. وماد قشوره يطهر الانسان ويزيل الكلف والتمش والحكة ويشد الشعر اذا استعمل مع الحناء.

٢٨٣٠٨ - نَارْدِيْن * ، سُبُّل

Valeriana (S). Valériane (F). Valerian (E). Baldrian (D). Valeriana (I).

جنس نباتات طيبة برية وزراعية من فصيلة الناردنيات. انواعه زهاء ١٥٠ جميعها اشباب حولية او معمرة. اوراقها متعاقبة مركبة ريشية. ازهارها نوري او متكونة التجميع، ابطي وتلبي الاركانز. انهارها غشوية جيلة الشكل يكثر فيها الابيض والوردي || اشهر انواعه الطيبة والزراعية والبرية ما يتبع .

٢٨٣٠٩ - نَارْدِيْن اَزْرَق * ، سُبُّل اَزْرَق

Valeriana wallichii (S). Valériane indienne, Nard indien (F). Indian valerian (E). Indische Narde (D). Spiganardi (I).

نوع من الناردين البري والزراعي. جذاميره ملفطة. ساقه غنضة. اوراقه عاقبة الخضر. ازهاره كثيفة التجميع، زرقاء اللون، مستحبة العرف. جذاميره طيبة و اذا استعمل مسحوقها مع الاستنقيد والستندل ينشر صاحبه بضع من شدة تقويته المدة. وينظر اللون برز زيل البرقان والكدب والحصى. واذا طلى بالخل قطع العرق وطيب رائحة البدن وان طيخ بالفسر حتى يتقزم وظل به الشعر سود وظله .

٢٨٣١٠ - نَارْدِيْن اِلِيْطِيّ * ، سُبُّل رُوْمِيّ، عَطَلَرْد

Valeriana celtica (S). Valériane celtique, Nard celtique, Spic celtique (F). Celtic valerian, Celtic spikenard (E). Alpenbaldrian, Nardenbaldrian (D). Nardo celtico, Spalica, Spiga celtica (I).

نوع من الناردين البري الطيب المسر. ينبت في الاربة الرملية الجبلية. جذاميره مستقيمة مستطيلة لينة العرف. ساقه نحيلة تملو من ١٠ الى ٢٠ سم. اوراقها السفلى كاملة اطيالية. اوراقها الوسطى والعليا مركبة. ازهاره عتقودية التجميع بيضاء اللون. ثماره بيضية الشكل، صغيرة القد



نارجيل ميشل



نارجيل معروف



نارجيلة



ناردین أزرق



ناردین اقلبي

٢٨٣٢٩ - نَارِيَّة الصَّمَار المُجَعَّفَة

هي نَمَاسَةُ النَّبْعِ ، أَعْلَبُهَا .



نَارَة

٢٨٣٣٠ - نَارِيَّة الحَنْطَلَة * ، هُفَّ الشَّعِير

Plodia interpunctella (S). Teigne orientale des dattes (F). Indian meal moth, Meal worm moth (E). *Dörobrosmote* (D).

حشرة من الناريات، صغيرة القد . رواشتها مرقطة . ناريات الإبيض والحطبي والاسمر الاسفع المراج . رتبها دقيقة نحيلة تركيب الجيوب الحزونة على اختلاف أنوعها كالحنطة والشعير والذرة والشفاغان والسلت ...



نَارِيَّة الْبَرْتَقَال

٢٨٣٣١ - نَارِيَّة الْخَرْبُوب *

Myelos ceratonie (S). *Pyrale des caroubes*, *Teigne des caroubes et des figues* (F). *Myelos ceratonie* (E).

حشرة صغيرة من فصيلة الناريات وربة حشرقيات الاجنحة . موطنها معظم اصقاع حوض البحر الابيض المتوسط . فراشتها جارية قوتها وسبق الازمار . سرقها ثائرة قوتها لباب قرون الخروب وثمار اللين || جسمها نحيل اهيف بطول نحو ٨ م . يسقطها نحو ٢١ م . رأسها معتدل الجرم . عيناها صيرتآن . زباناها خيطيان . شرفها معتدل الطول . جوشنها ويطنها الى الشفة || رواشتها الاساميان الى الشفة الحديدية يملونها بتقيج ابيض وصف من النقط البيض يستبق الحمار الخاريجي . وروشتها الخلفيان الى الشفة السمر . احداها الى الشفة خضراء || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في الصيف || تسرح في النهار . تعاطل يمد ظهورها ينسو ثلاثة اسابيع ورز للمكن مبيحاً في قرون الخروب || السرة عند بلوغها الكمال تطول نحو ٩ م . جسمها اسطواني الشكل . رأسها شديد السرة . ثوبها الى الابيض اللين تملوها ماجة وردية . رواجها الى السرة || طور الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع يتقضي ضمن صلجة تحببها السرة تحت القشور او بين شقوق السماء .



نَارِيَّة الحَنْطَلَة



نَارِيَّة الْخَرْبُوب

٢٨٣٣٢ - نَارِيَّة الدَّقِيق *

Asopia farinella (S). *Asopie*, *Teigne des farines* (F). *Meal snout moth* (E). *Mehlzünsler* (D).

فراشة صغيرة القند من فصيلة الناريات ، فوجها الى الصبوة الصنابية . رواشتها مزركشة . زباناها غليظة مستطيلة . تطير من ايار الى تشرين ، تألف البيوت والمطابخ والافران . ابيها الحولية ثلاثة . رتبها تسمى دودة الدقيق تعيش على الدقيق والكسب والذرة والذرة الجافة الخ...



نَارِيَّة الدَّقِيق

٢٨٣٣٣ - نَارِيَّة الدَّقِيق الْغَرَاء

هي نَمَاسَةُ الدَّقِيقِ ، أَعْلَبُهَا .

Pyrausta nubilalis (S). *Pyrale du maïs* (F). *Corn moth* (E). *Malszünzler*, *Hirsezünzler* (D).

حشرة من الناريات ، رتبها غليظة الشكل تطول نحو ٢٥ م . ظهورها اسمر اللون يملو خطيط قزقزق . مدنها الى السرة الحنطية || تحمل من جانبيها نقط سمر داكنة يملوها حلب مستطيل || تركيب سوق الدرة خشنورها وتسبب قصصها .



نَارِيَّة الدَّرَّة

وهو يقيد الحنط والمضغ || تصوب الناريات تستعمل كعلم تختلط أنواع الحفصيات وذلك لانها قوية المناحة الجنية ولا تخشى الاثرية المتدنية التي تنفر منها انواع الليمون المزدرة .

٢٨٣٣٣ - نَارَنْج مَرْمِيسِي

Oranger à feuilles de myrte (F).

هو الليمون المرمسي ، أَعْلَبُهَا .

٢٨٣٣٤ - نَارِيَّة *

Acanthoscyos horrida (S).

Nara (F).

اسما الاثري نارا وهي جنين من فصيلة القرصيات منبها صمري افريقية الشالية . ساقها ليلية فرعا تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . فرونها اقية الانتشاب ، منبسطة ، متدلية ، تطول نحو ٤ اتر وهي عادمة الورق كثيرة الشوك . جلونها تدور في الرمال من ٢٠ الى ٤٠ م . انزعها كبيرة القند . ثمارها برتقالية الحجم واللون ، قشورها خشكرة ، هريفة التعل . لها مسحب العلم ما كمل وهو ادمس وأسل وألد من البليغ . بزورها مأكولة طازجة ومطبوخة . لها مومسان في العام الواحد . وهي من النباتات الزريرة الكثيرة النفع .

٢٨٣٣٥ - نَارِيَّات *

Pyralidae, *Pyralididae* (S). *Pyralidae*, *Pyralin moths*, *Snout moths* (E). *Zünsler* (D).

فصيلة حشرات من ربة حشرقيات الاجنحة . ابيها ١١١ اجناسها وانواعها زمام ١٠٠٠٠ جميعها فراشات ليلية صغيرة القند ، دقيقة الاجسام ، اثرية الاصطام ، واضحة التأثير . رواشتها صفيقة ، مهدبة الاطراف ، متداخلة الاالوان . ابيها الحولية لاقياسة . رقباتها ملونة . غادراتها تلحف بأغشية حريرية التماس .

٢٨٣٣٦ - نَارِيَّة الْبَاذَنْجَان

هي يَنْقَرَةُ الْبَاذَنْجَانِ ، أَعْلَبُهَا .

٢٨٣٣٧ - نَارِيَّة الْبَرْتَقَال *

Prays ceteri (S).

Teigne des fleurs d'oranger (F).

حشرة من الناريات ، صغيرة القند ، نحيلة الجسم ، قريبة اليه من قومة الزيتين . يسقطها تراوح من ٩ الى ١٠ م . رواشتها الاساميان الى الكمية النفسية المراج تملوها رشفة رمداء لا مسماوية الشتر . رواشتها الخلفيان الى القردة الزامية السوية يحرفها اطار من الهبط الكثيف المستعرض . ابيها الحولية تراوح من ٣ الى ٥ . تمتع الاثني مكها على الازمار والذرة الفضية ينقش من رقات دقيقة تراوح طولا عند اكتمال نموها ، من ٥ الى ٦ م . فوجها الى الكمية الزامية يملوها ثلاثة خطوط قاطبة واحد يكتشف الظهور من الرأس الى الفرج واثنان جانبيان . رأسها الى السرة الباقية . مدنها الى السرة الحنطية رنكتر على خمسة ازواج من الجرايز السمر || اصطنها اللين البرتقال الذي عند من الهندن الى كمال حوض البحر المتوسط || اضرارها قد تكون مادية فنيا لو كثر عددها ذلك لانها تقضم بتلات الازمار واسديتها واقلام مدققاته وقه تعطب في ظروف خاصة تقشور الثمار التي تقضم وتسردب لابلها || تكافح بالوروتين الذي يقضي عليها .

٢٨٣٣٨ - نَارِيَّة الشَّعِير ، نَارِيَّة الْبَلَح

هي نَمَاسَةُ الْبَسْرِ ، أَعْلَبُهَا .

Stalactite ٢٨٣٤٦ - نارية ٥
نازلة ج نازل : واسب كلسية متحمجرة في سقف
الغاور الرطبة .

٢٨٣٤٧ - نازون قصير الزبان ٥

Nasonia brevicornis (S). Nasonia brevicorne (F).
حشرة نازغة من فصيلة الطليطيات ورتبة غشائيات الاجنحة
الضفيرة . موطنها بعض مناطق البلاد الحارة المنحرفة نحو
المتلة . تتطفل عل ذوات الجناحين اخصها الذباب ||
جسمها صغير القد بطول نحو ١ سم . واربية غلوط .
رأسها مستعرض الشكل . زباناها صولجانيان صغيران .
جوشها ضيق المخرز بطعنا شبه بيضي الشكل . مرتتها
قصيرة مستقيمة . اجنحتها وردية اللون . ثوبها الى الخضار
الاليس .

Fistula (F). Fistula (E). ٢٨٣٤٨ - ناسور

٢٨٣٤٩ - ناسير هو الصل المصري ، اطليه .

Diffuseur (F). Diffuser, ٢٨٣٥٠ - ناسيرة
Mixing cone (E).

اداة الانتشار ، تستعمل في عدة صناعات اخصها صناعة
السكر ، راجع انتشار .

Lymexylon (S). ٢٨٣٥١ - ناسيرة الخشب

Lymexylon, Lime-bois (F).
جنس حشرات غاشية من فئدة الاجنحة . انواعها
ثلاثة ، جميعها صغيرة القد ، مستطيلة الشكل ، ريشة الجسم .
يرقاتها تنكث باخشاب الاشجار القائمة والمقطوعة تقتردها
وتتغلبها .

Exsert ٢٨٣٥٢ - ناسير
نمت تعريفي يوصف به الشيء المرتفع عن سطح محيطه .

Assez fort (F). ٢٨٣٥٣ - ناسط
نمت تعريفي يطلق عل التبرغ التي تتحلل بسورة ناشطة
مركزها التنسيغي دون المانعة وفوق المعتدلة .

Oryx de Nubie (F). ٢٨٣٥٤ - ناسط
هو الارخ السوداني ، اطليه .

٢٨٣٥٥ - ناسفة
هي جمرى السيل آل الوادي . ج نواشع .

٢٨٣٥٦ - ناصيات ، زقنبرليات ٥ ، ناليات

Buprestidae (S). Buprestidae, البقير
Richards (F). Buprestidae, Flatheaded beetles (E).
Prachtkäfer (D).

فصيلة حشرات من رتبة رديميات الاجنحة . اجناسها وانواعها
كثيرة العدد . معظمها من حشرات المناطق المعتدلة والحارة .
اشكالها مانوسة ، الوانها عابقة زاهية ، ولوسها قصيرة ،
قرونها الاستشعارية مركبة من ١١ فاعلة ، ارساغها
خامسة ، احمادها مستطيلة . جميعها تسرح في التار وهي
سريعة الحركة والطيران . || يرقاتها خاضعة تعيش عل
جلود وسيق واوراق مختلف النباتات . كثرها عل بعض
اعشاب المراعي تسبب الحياط اي التلف في الايقار التي
تتغلبها مع الشب .

٢٨٣٥٥ - نارية السمين
Antigra caalaunalis (S). Antigrae du
Sésame (F).

حشرة من الناريات . يرقها صغيرة القد تطول نحو ١٢ سم .
لونها الى الخضرة اليرداء المواجه تملوها ريشة سوداء || تركب
السم من ساقه الى ازهاره وثماره .

٢٨٣٦٦ - نارية الشمع الصغيرة

Alveicole, Teigne de la cire (F).
هي محل النحل الصغير ، اطليه .

٢٨٣٣٧ - نارية الشمع الكبيرة

Gallérie de la cire (F). اطليه .

Pionex forticalis (S). ٢٨٣٣٨ - نارية الصليبيات
Pyrale des crucifères (F).

حشرة من الناريات ، يرقها صغيرة ، دقيقة ، حمراء اللون ،
سريعة الحركة . تركب اوراق الصليبيات عل صفحاتها
السفل .

Mecyna gilvata (S). ٢٨٣٣٩ - نارية الصبان

Pyrale des cannes à sucre (F).
حشرة من الناريات متوسطة القد غبراء اللون مزركشة
الرواشن . يرقها تطول نحو ٢٢ سم . لونها الى الحمرة تحمل
عل ظهرها وجانبيها خمسة غلوط ارجوانية || تركب
الصبان فتتخر الساق وتذهب فيه صمدا حتى القسة .
وتركب اللز تقفل فيها ذات الشيء وتركب الارز فتتلف
السوق والنسائل .

٢٨٣٤٠ - نارية اللوبياء

Etiella zinckenella (S). Etielle du haricot, Pyrale
des haricots (F). Lima bean pod borer (E).

حشرة من الناريات ، يرقها تطول نحو ٢٥ سم . وهي
ارجوانية الظهر غبراء المذب || تركب ازهار وثمار
اللوبيب اللوبياء فتتغلبها .

٢٨٣٤١ - نارية الوريح

Myelois cribrella (S).
Myelois des fleurs (F).

حشرة من الناريات ، يرقها دقيقة نحيلة تحطية اللون
تميش داخل وزم وسوق نباتات التفصيلة المركبة .

٢٨٣٤٢ - نارية الباسمين

Glyphodes unionalis (S). Pyrale du jasmin (F).

حشرة من الناريات ، حنطية اللون سوداء الزواكش . يرقها
صغيرة القد مستطيلة الجسم ، غبراء اللون ، حمراء الملوچ .
تركب برام وازهار الباسمين وسناهل الازريقن .

٢٨٣٤٣ - نارية البخضور

Pachyzancla licarescals (S). Pyrale des gazons (F).

حشرة من الناريات ، يرقها مسطحة تطول نحو ٢٥ سم .
لونها الى السرة يملوها نقط اوسد منظم الترتيب وحيد
الهبة المستطيلة || تركب تخلف اوراق الاعشاب الفتية
اخصها النجيلية فتتغلبها .

٢٨٣٤٤ - نارية دمية

Pyrausta surata (S).
Pyrale dorée (F).

حشرة من الناريات ، رواشها ذهبية اللون . يرقها صغيرة
القد غبراء اللون . تركب برام وازهار النباتات السطرية
اخصها الننع .

٢٨٣٤٥ - نارية شهباء

Pyrale grise (F).
فراشة موزية تسمى طينية الشنان ، اطلبها .



نارية السمين



نارية الصبان



نارية اللوبياء



نارية الباسمين



نارية البخضور



نازون قصير الزبان



نارية الخشب

Maille (F). Slitch (E). **نَاطِيْبَة** ٢٨٣٦٨ - **نَاطِيْب** ٢٨٣٦٨
ج. ناطيب. والناطيب هي غرور المصفاة.

٢٨٣٦٩ - نَاطِيْب

الناطيب نجم نير من كوكبة برج الثور ويسمى قرن الثور الشبالي.



ناصة الخوخ

Eprouvette graduée (F). **نَاطِيْل** ٢٨٣٧٠ -
Test-tube (E). عنبار مدرج تكلل به السوائل.

٢٨٣٧١ - نَاطُور المَاء

Aiguardier (F). **نَاطُور المَاء** ٢٨٣٧١ -
Freshwater guardian (E). هو الشاري الذي يحافظ على مياه الري ويؤنصها على مستعقبها بالقلع.



ناصة الدراق المزاد

Tarbophis **نَاطِر * و كَبِيْب** ٢٨٣٧٢ -
جنس حيات سامة من فصيلة الحشيشات. انواعه عديدة. اعطائها البلاد الحارة الافريقية والاسيوية. شكلها كالخنافس، مستطيلة الجسم، دقيقة النعق، سريعة الحركة. اقواها الى السمرة الثنراء الموقوفة.

٢٨٣٧٣ - نَاطِر مَآكِر ، و كَبِيْب خَدْعَان

Tarbophis fallax (S). **نَاطِر مَآكِر ، و كَبِيْب خَدْعَان** ٢٨٣٧٣ -
Tarbophis trompeur, Serpent chat (F). حية بيوض من البواغيات وفصيلة الحشيشات غليقات الاغنادي || جسمها مستدل الفخانة بطول نحو ١٠٠ سم. ثوبا الى السمرة الخطية الموجع طولها يتبعج ثلاثي الالوان لاقباسي الزاويقي، يكثر فيه الرمادي والجويوي والاصفر، عمدت من الرأس الى الذنب. ولها بيض الشوزن. عتقا متوصلة الطول. عينها كيرتان. عدد اسناتها ٥٤ منها ٣٠ في الفك الاسفل ٢٤ في الفك الاعلى من اصلها اربعة عتقات مكددة، ثابته، شطعية الارتنكاز تبغ السم في كل عضو تصببه عتقا يرق حتى مستواها الصاعلي || تألف البراري والاطلال. قويا كل ما دب وطار. تنقش على فريستها انقضاض السنور على المفارة || تسرح في النهار وفي اوائل الليل. بياتها الشوي يستمر نحو خمسة اشهر. تبلغ كامل نموها بعمر ١٥ سنة وتعيش نحو ١٢٠ سنة || الانثى تسافد بعمر خمس سنوات وتبيض من ١٦ الى ٣٢ بيضة مجموعة في سحبتين تطيرهما في الرمل || تعتبر من التمايين المؤدية.



ناصة الورد

Palonnier (F). Swing-bar, Pole (E). **نَاطِيْم** ٢٨٣٧٤ -
هو المزان، قطعة من خشب أو من حديد مركبها مقدمة آلة الحرت أو البرية، تعلق بها السيور لجر.

Culcivore (F). Culicivorous (E). **نَاصِر** ٢٨٣٧٥ -
الناهر من الطير والحيوان من كان قوته الشعر وما اشبه.

Aphrodiseque (F). **نَاصِل** ٢٨٣٧٦ -
Aphrodisiac (E).

٢٨٣٧٧ - نَاصِقَان

الناصقان كوكبان من كواكب الجوزاء اي الجبار يتقدمان الرجل.

٢٨٣٧٨ - **نَاصِيْة** هي القروية، اطلاب.

Bupreste (F) Buprestis (E). **نَاصِيْة** ٢٨٣٥٧ -
هي الرقبتين، اطلاب.

Bupreste du chêne (F). **نَاصِيْة البُتْرُوط** ٢٨٣٥٨ -
اطلب رقبتين النديان.

٢٨٣٥٩ - **نَاصِيْة الخُفُوْخ *** ، **رَقَبْتِيْنُ الخُفُوْخ** ٢٨٣٥٩ -
Ptosima undecimmaculata (S). Bupreste du prunier (F). حشرة من الناصحات، طولها نحو ١٠ سم. لوها الى السواد الاسمع، عمداءها رباعية الخطوط المنترسة النارية اللون. رقبها شديدة الانثى تسردب سوق معظم اشجار الفصيلة الوردية اخصها المورخ والمشمش.

٢٨٣٦٠ - **نَاصِيْة الدَّرَاكِيْن السَّوْدَاء *** ، **رَقَبْتِيْنُ الدَّرَاكِيْن** ٢٨٣٦٠ -
Capnodis tenebrionis (S). Bupreste noir du pêcher (F). Pesch capnodis (E). Capnodis tenebrionis (D). حشرة من الناصحات، طولها نحو ١٨ سم. لوها الى السواد الفضي تعلو ماجة غبراء. رقبها تسردب سوق الخوزيات اخصها الدراقان تصطبها وتضع بها اشد الانثى.

٢٨٣٦١ - **نَاصِيْة الصَّنَوِيْر** ٢٨٣٦١ -
Bupreste des pins (F). اطلب رقبتين الصنوبر.

٢٨٣٦٢ - **نَاصِيْة الوَرْد *** ، **رَقَبْتِيْنُ الوَرْد** ٢٨٣٦٢ -
Coraeus rubi (S). Bupreste du rosier (F). حشرة من الناصحات، طولها نحو ١٠ سم. لوها الى السواد الازرق الموجع. عمداءها مجععتان بخطوط غبراء معتزسة. رقبها تنخر سوق الورد واخصانه.

٢٨٣٦٣ - **نَاصِيْة خَضِرَاء** ٢٨٣٦٣ -
Bupreste vert (F). اطلب رقبتين اخضر.

٢٨٣٦٤ - **نَاصُورَة** ٢٨٣٦٤ -
Spondylocladium (S). جنس فطور مجهرية من الريدانيات وفصيلة الطحيات، جريه الكنيديية حنطية، غصية التجميع. كئانه هليية انشكل، مستندقة الاطراف، ومنها حلزونية. || انواعه قليلة اعرفها ناصورة البطاطا.

٢٨٣٦٥ - **نَاصُورَة البَطَاطَا** ، **جَرَب فِصِي** ٢٨٣٦٥ -
Spondylocladium atrovirens (S). Gale argentée de la pomme de terre (F). فطر مجهرية يتطفل على البطاطا في طور نموها الاخير، قرب ادراك الثمر. || مظهره الخارجي بقع مستديرة، غبراء اللون، غصية الموجع، تتصلبها بنور ثلثولية صغرة مصدوعة الثلاث الاسود الشق، تركب الثمرة تصطب البشرة مع قليل من الالباب || يكائن يتطهر البذار قبل الزرع ويذق بنقع الشفط مدة ٢٠ دقيقة باحدى املاح الزئبق المحلولة ٥ ٪.

٢٨٣٦٦ - **نَاصِيْة** ٢٨٣٦٦ -
Toupet (F). Forestop (E). غصلة الشعر المذلية على جبهة الفرس.

٢٨٣٦٧ - **نَاصِيْج** ٢٨٣٦٧ -
Trop mûr (F). Overmature (E). نعت ثمرين توصف به جميع المحاصيل الزراعية بعد اجيائها دور الانبعاث ودخولها في دور التفسخ.



ناظر

Vertex ٢٨٣٩١ - نَاعُورٌ (F).
نَاعُورٌ هو قبة الرأس في تشريح الحشرات .

Chamele (F). She-camel (E). ٢٨٣٩٢ - نَاعُورٌ
الناقة هي الاثني من الابل . ج نوق . كنيها ام بغ وام
حائل وام حوار وام السبق وام مسعود || يحملها يستقيم
سنة واملاج حوارها يستمر سنة .

Dugong (F). ٢٨٣٩٣ - نَاعُورٌ البَحر
هي الاطوم ، راجعه .

Acidiphila (F). ٢٨٣٩٤ - نَاعُورٌ
لمت تعريفني توصف به النباتات التي ترطب في الازربة
الحضوية التي يراوح دالها من ٦٥ الى ٦٥ هـ .

Afférent (F). ٢٨٣٩٥ - نَاعُورٌ ، مُرْسِل
Afférent (E).

Contage (F). ٢٨٣٩٦ - نَاعُورٌ العَدَوِي
Contagium (E). مادة تنقل ميكروب المرض المعدي .

Conductibilité (F). ٢٨٣٩٧ - نَاعُورٌ
هي الايسالية ، اطلها .

Pic (F). ٢٨٣٩٨ - نَاعُورٌ
هي النكار ، اطلها .

Regressif (F). ٢٨٣٩٩ - نَاعُورٌ
النكصي من ارتد الى ما كان عليه . راجع اشيم .

Atropis ٢٨٤٠٠ - نَاعُورٌ الكُتْب * ، قُملُ الكُتْب
حشرة من فصيلة النامسيات ، طولها نحو ٢ م . قوتها الى
النيرة . اطلها العالم . قوتها المواد السيلوزية ، تفرس اوراق
الكتب فتمطها .

Atropidae (S). ٢٨٤٠١ - نَاعُورِيَّات *
Atropidés (F). Atropidae (E).
فصيلة حشرات من رتبة القهلبات ، انواعها عديدة ، جميعها
صغيرة القد ، طول اجسامها يراوح من ١ الى ٣ م .
اثوابها الى الصفرة البدراء . قوتها المواد الصخرية والشمعية .
نوع منها يدعى ناس الكتب يمتري اوراق الكتب
والقراطين فيخربها ويمطها .

Formicivore (F). ٢٨٤٠٢ - نَاعُورٌ
Formicivorous (E).
لمت تعريفني يطلق على كل حيوان او طائر قوته النمل .

Myrmecophagidae (S). ٢٨٤٠٣ - نَاعُورَات *
Myrmecophagidae (F). Myrmecophagidae (E).
فصيلة حيوانات من رتبة الدرد الحشرات . قوتها النمل .
راجع آكلات النمل .

Culcín (F). ٢٨٤٠٤ - نَاعُورٌ
هو البومض ، اطلها .

Formicide ٢٨٤٠٥ - نَاعُورٌ
لمت تعريفني يطلق على جميع الادوية الموضوعة للقضاء
على النمل .

Roue hydraulique (F). ٢٨٣٩٧ - نَاعُورٌ ، نَاعُورَةٌ (F).
Water-wheel (E).
دولاب مائي مركب من قواديس تحركه سرعة جري الماء
فيخرج ما غرقته القواديس في جدول يأخذ الماء الى حيث
الحاجة .

٢٨٣٨٠ - نَاعُورٌ هَوَالِي ، نَاعُورَةٌ هَوَالِيَّة
Eolienne (F). Aeolian (E).

آلة لرفع الماء تحركها الريح . وتسمى ايضا دولاب هوا .

Galliard (F). ٢٨٣٨١ - نَاعُورَةٌ
هي البديدا ، اطلها .

Noria (F). ٢٨٣٨٢ - نَاعُورَةٌ ، سَالِيَّة
Noria, Chain-pump (E).
آلة رافعة الماء تدور بوسطة الدواب او الحركات .

Nagana ٢٨٣٨٣ - نَاعُورَةٌ
وصم يصيب الحيوانات الداجنة سببه شقبيبة تنقلها الشاة
اللازمة .

Naja indien (F). ٢٨٣٨٤ - نَاعُورَان
Indian cobra (E).
هو الصل الهندي ويدعى ايضا افسى هندية وناسر هندي .

Vessie du musc (F). ٢٨٣٨٥ - نَاعُورَةٌ
Musk-bladder (E).
جراب المسك في الحيوانات التي تفرز هذه المادة .

٢٨٣٨٦ - نَاعُورَةٌ البَقَر * ، أَعْرِبِلُ الوَزَال
Agrilus cinctus (S). Agrile des genêts, Bupreste
vert (F).
حشرة من النامصات ، طولها نحو ٨ م . لونها الى الخضار
الاسقم المواج . تعيش على رسيق ازهار التفصيلة القرنية .
تمتج كبتها على جذوع الوزال فينتفج من رقات غاضلة
تقضي على التقصيان والافتان . || اما تسميتها بنامضة
البقر فذلك لانها عندما تكثر في بطون البقر من جراء
ابتلاعها مع العشب ، تسبب الحباط وهو نفخة في الخویش
قد تكون مؤذية .

٢٨٣٨٧ - نَاعُورٌ المَحْمُول ، تَنَقِيْدِي
Exécutoire (F). Executory (E).
ما كان يحمل الصيغة التنفيذية من اسكمام او اوامر او
مقدود .

Caducue, Caducifolié (F). ٢٨٣٨٨ - نَاعُورٌ
Deciduous (E).
اسم حال يوصف به النبات الذي ينفض ورقه كل سنة .
راجع عايل .

Vésicants (F). Vésicants (E). ٢٨٣٨٩ - نَاعُورَات
فئة حشرات من مميزات الاجنحة تشتمل النواظف والذواربع
والزوريات .

٢٨٣٩٠ - نَاعُورَةٌ
Mylabris (S). Mylabre (F).
جنس حشرات من النواظف المسمدة الاجنحة . انواعها
زهاء ٣٠٠ تعيش في المناطق الحارة والمعتدلة . جميعها من
الحشرات النافعة ، تمتج مكبتها في مغارز الجراد واشباهه
فينتفج من رقات همة تلهم السوء .



نَاعُورَةُ البَقَر



نَاسِ الكُتْب

٧٨٤١٧ - **تَبَات** ، **تَبَت** (F). **Végétal** (F). **Plant** (E).
كلمة شاملة تعني العشب والنباتية والشجرة . الواحدة نبتة
والجمع نباتات وأنبئة || والنبات هو احدى المملكين
التي تنقسم اليها الكائنات الحية وهما الحيوان والنبات .
ويقسم النبات الى وسيدات الخلية وهي كائنات دنا
ترتكز حل خلية واحدة تقوم بجميع الوظائف الحياتية .
والى عديدات الخلايا وهي كائنات راقية تتكون من بنفوس
وسوق وأوراق خضر وأزهار وثمار وبنفوس .

٧٨٤١٣ - **تَبَاتُ الْفُ الْمَلْح** (F). **Plante salicole** (F).
Salt-producing plant (E).
كل نبات يعيش في الأترية المالحة .

٧٨٤١٤ - **تَبَاتُ النَّار** (F). **تَبَاتُ النَّار** هو القراس الكري؛ اطليه .

٧٨٤١٥ - **تَبَاتُ بَرِّي** (F). **Plant** (E).
Uncultivated plant (E).

كل نبات تنبته الطبيعة في الاراضي غير المزروعة .

٧٨٤١٦ - **تَبَاتُ جَبِّي** ، **تَبَاتُ جَرْدِي** (F). **Alpine plant** (E).

كل نبات يعيش طويلاً في الجبال العالية .

٧٨٤١٧ - **تَبَاتُ رُحَافِي** ، **تَبَاتُ رَحِيْفِي** ، **تَبَاتُ**

مِعْشَرِي (F). **Plant** (E).
nectarifère (F). **Melliferous plant** (E).

النبات الرحافي كل نبات يفرز الرقيق من ازهاره او
ينضح المنفوس من مسام اورلقه فيجرسه النحل ويحوه الى
عسل || اشهر النباتات الرحاقية ما جاء في الجدلالتابع .

٧٨٤١٦ - **تَابِيكَة** (F). **Dragoon, jet** (F).

Sucker, Shoot (E).
شط او قضيب في ريان نشأ على جدوالنبات.

٧٨٤١٧ - **تَاهَة** (F). **To vegetate** (E).
تاه النبات نما واربلع .

٧٨٤١٨ - **تَاهِر** (F). **Raisin blanc** (F). **White grapes** (E).

لمت تعريفي يطلق على كل صنب ابيض من اي ضرب
كان .

٧٨٤١٩ - **تَاهِيص** (F). **Sommet de l'omoplate** (F).

Extremity of shoulder-blade (E).
رأس المنكب في الحيوان وهما نافضان . ج نولمض .

٧٨٤٢٠ - **تَاهِيص** (F). **Polyphage** (F). **Polyphagous** (E).

نمت توصف به كل حشرة تتلوي بمواد شديدة
الاختلاف .

٧٨٤٢١ - **تَاهُور** (S). **Ovibus nahoor** (S).

Moufflon bharal (F). **Bharal** (E).
نوع من الاراري موطنه جبال التيب وهضابها . يألف
المراعي المكشوفة البعيدة الاطراف . وهو ربع الجفة ،
كبير القرن غليظه عند الذكور ، دقيقه عند الاناث .
ثوبه ال الرابدة الشهداء يمين عند ثوبج الظهر ويبيض عند
البطن . اجله يراوح من ٧ الى ١٠ انفار يقوده نيزب
مائع .

جدول النباتات الرحاقية

اسم النبات	بالانكليزي	بالفرنسي
بَرْبَرِي ، بَرْبَرِي ، عُوْد الرنح	Barberry, Pipperidge	Berberis, Epine vinette
بَجَاص ، كُمَرِي	Pear tree	Poirier
أَعْدَرِيَة	Evening primrose	Aenothère, Enothère
أَحْبُون	Viper's bugloss	Vipérine
أَذْرِيُون المَاء ، سُرْمُوس	Water butter-cup	Populage, Calthe
أَرَلِيَة	Angelica tree	Angélique sauvage
أَرْطَلِيُون	Burdock	Bardane
أَرْسِيْمُون	Erysimum	Erysimum, Vêlar
أَسْطَر ، نَجِيَّة	Starwort	Aster
أَقَاصِي ، دُنْدُرَان	Tufted vetch	Vesce craque
أَيْبَغُطَس	Epipactis	Epipactis, Héliéborine
أَكُونِيْت ، يَش ، أَشَلَه	Aconite	Aconit
أَكُونِيْت ، مُشَلَلَه بَاكَايَة	Japan medlar	Néflier du Japon, Bibacrer
أَكِيلَاجَا ، كُولَمِين	Columbine	Ancolie, Colombine
أَبْرُوس ، كُرُورَلَه	Coronilla	Coronille
أَنْشُورَة	Bugloss	Buglosse
بَاقِيَة ، يَغَّة	Common vetch, Lints	Vesce, Pasquier
بُرُلَا ، سُنْدَر	Birch	Bouleau

اسم النبات	بالانكليزي	بالفرنسي
بَرْيَلَا ، بَرْوَة	Common pea	Petit pois, Pois vert
بَسَلَة بَرْوَة	Wild pea	Pois sauvage
بَسَل	Onion	Oignon
بَطْبَاط - حَنْجَر - شَيْطَ الْعُور	Knot-grass	Renouée des oiseaux
بَطِيخ - خَس	Water-melon	Pastèque
بَقَس - شَشَاد	Box tree	Buis
بُنْدُق ، بُولُور	Hazel-tree, Filbert	Noisetier, Coudrier
بُورْقِيصَا ، دَوْدَار ، غَرْغَاء	Elm-tree	Orme
بُرْمُس	Lupine	Lupin
بُرْمُحَان - حَشِيصَة النَّحْل	Bee-balm	Mélisse
بُرْمُشَا ، بُرْمُشَان	Blue-bottle, Bachelor button	Bleuet, Aubifoin
بُقَاح	Apple-tree	Pommier
بُتُوب	Fir-tree, Silver fir	Sapin
بُرْمُجِير ، رُمَّة ، بُهَان	Rocket	Roquette
بُرْمُجِير بُرِي ، بُهَان	Wild rocket	Roquette sauvage
بُجْلَان	Vetch	Gesse
بُجْل ، حَشِيصَة الْفِينَار	Hop, Bine	Houblon
بُجُولَانَا	Gilliflower	Julienne
بُجُولَانِيم ، غُرْنُوق	Geranium, Shepherd's needle	Geranium, Gêranier
بُحُوفِ الْمَاء	Buck's horn	Sénébière
بُحَشِيصَة الرِّقَّة	Lung-wort	Pulmonaire
بُحَشِيصَة السَّعَال ، دُوسَة الْحِمَار ، فَرْقَارَة	Cough-wort	Tussilage
بُحَشِيصَة الْمَلَاك	Angelica	Angélique
بُحَا الْبَان ، أَكْلِيل الْجَبَل ، نَدَى الْبَحْر	Common rosemary, Oldman	Romarin, Encensier
بُحَضَض ، غُرْمَد ، أَطَد	Boxthorn	Lycet
بُحَلَّاب	Hare's-ear	Buplèvre
بُحِجِم	Borage	Bourrache
بُحِص	Chuck-pea, Gram	Cicérole, Pois chiche
بُحِيل ، قَاضُولِيَاء	Kidney-bean	Haricot
بُحِقُوق	Sweet-clover	Méhilot
بُحِد (جميع الأنواع)	Poplar	Peuplier
بُحِي الْمَاء ، حِيل ، وَدَّة	Orpine, Stonecrop.	Orpin, Sedum
بُحَايِي ، بُحَايَة	Mallow	Mauve
بُحَرَن	Hellebore	Hellébore, Ellébore
بُحَرْدَل	Mustard	Moutarde, Sénévé
بُحَرَام	Reseda	Réséda
بُحَرَامِي ، لَأُونْدَة	Lavander	Lavande
بُحَلَّج ، شَنْطَلَف	Heath, Heather	Bruyère
بُحُلُود ، عَوِير	Jupiter's beard	Joubarbe
بُحَايَزِيرِيَّة	Figwort	Scrofulaire
بُحُورَج	Prune tree, Plum tree	Prunier
بُحِيَار ، قَدَد	Cucumber	Concombre
بُحِيرِي ، بُتُور	Stock, Gilliflower	Groffée
بُحَاب ، نَمْع الْحَقْل	Pudding grass	Pouliot
بُحِج	Scorzonera	Scorzonère

اسم النبات	بالانكليزي	بالفرنسي
دُحْرَج	Spurred vetch	Vesce éperonnée
دُرَّالين، دُرَّاق، دُرَّامِك	Peach tree	Pêcher
دَقَّة حُود القار	Spurge laurel, Dwarf bay	Daphné lauréele
دِيحِيتان، زَهْر الكَثَّائين، مُعْجِيَة	Finger flower	Digitale, Gautelet
رَأْس دَبْن، طَبَّاق، طَبُون	Rock flea-bane	Inule conyze
رَبِيَّاتان، رَجُل المَعْفُور	Bird's-foot	Ornithope
رَغْرَاع	Common flea-bane	Pulicaire
رَبْعِي الحَنَام	Vervain	Verveine
رَبِيَّية شَبِيَّة، سَطَّ كَاذِب	Locust acacia, False acacia	Robinier faux-acacia
زَبَاد، زَبَاوِي، سَحَاة	Starwort	Pallénis, Petit mugue
زَفْرِين	Alaternus	Alaterne
زَوْفَا، جَسِي، حَسَل، زَرْفُون	Common Hystop	Husope officinale
	Linden	Tilleul
بَيْت الحُصْن، بَلَادُون	Dwale, Banewort	Atrope, Belladone
سَرْتَه، (إسان الضُّفُور)	Hony wort	Cérinthe, Mélinet
سُرُو	Cypress tree	Cyprès
سَعْلَاقِس، سَعْلَاقِس	Stachys	Epiaire
سَقَرَجَل	Quince tree	Cognassier
سَقَدَر لَاصِع	Knee holly	Fragon piquant
سَلْسِيل	Salsify	Salsifis
سَمَّارَة، تَوْدُوج، فِجَل الجِمال	Hodge mustard	Sisymbre
سَمِيم	Common ling	Callune vulgaire
سِيدِيَان	Oak tree	Chêne
سَطَّ	Acacia	Acacia
سَقَسَاوُون	Skirret	Chervis
سَمِيم	Snapdragon	Muflier
سَيْت، سَيْت	Anet, Dill-seed	Aneth, Fenouil bâtard
سَكَاغِي، أَفْسُون	Scotch thistle	Onoporde
سَمَار، سَمَرَة، سَمَار	Fennel	Fenouil
سَمَام	Melon	Melon
سِنْدَاب	Eryngo	Panicaut, Erynge
سُوك، سَهَبَاء	Thistle	Chardon
سُوك الجِمال	Globe thistle	Cardère
سُونِير، سُونِير	Black cumin	Nigelle
سَرِيمة الجَدَوِي	Caprifoly	Chèvrefeuille
سَقَر، سَقَر (جميع الأنواع)	Thyme & Marjoram	Thym et Origan
سَقَسَاوُون، سَقَر	Willow	Saule
سَقَرَاء	Sophora	Sophora
سَقْلَاب	Silk cotton	Asclépiade
سَنُونِير	Pine-tree	Pin
سَمَة	Echinops	Echinopse
سَمِيرَان، نَعْنَع الماء	Water mint	Menthe aquatique
سَقَسَقُون، سِنْدَاب	Blow-ball	Pissenlit officinal
سَقَسَقُون	Germander	Germandrée
سَقَطَان، كَرَات البَر	Crow garlic	Porette

اسم النبات	بالانكليزي	بالفرنسي
طَيم ، بَهْمِيَّة الدِّينِي	Holly, Christmas	Houx commun
طَفْرَاء ، نَمْنَع بَرِّي	Wild mint	Menthe sauvage
عَالِق	Delphinium	Dauphinelle
عَرَاوَة	Spiraea	Spirée
عَرَن ، سَكُون ، سَلَّة زِدَائِيَّة	Holy clover	Sainfoin, Esparcette
عَسَلِيَّة ، زَهْرَةُ السَّل	Honey flower	Mélanthe
عَشَقَّة	Ivy	Lierre
عَصَا الرَّاغِي ، قَرْدَب	Persicaria	Persicaire
عِنَّاژ	Lily grass	Butome
عَوَسَج	Bramble	Ronce
عَشِيرَاء ، صَرْبَة	Service tree	Sorbier
عَقَت	Eupatorium	Eupatoire
عَاشِرَا ، قَاشِر ، فُس	Bryony	Bryone
قَرَابِيُون ، بَاذَلَوْرَد	Horehound	Marrube
قَرَبِيُون ، يَتَوَع ، عُنْجَد	Spurge	Euphorbe
قِصَّة ، قِصَصَة ، قَصَب	Lucern	Luzerne
قِصَّة مَنِيْرِيَّة	Silver tree	Protée mellifère
قُوْدَنِج	Wild marjoram	Fausse marjolaine
قُول ، بَاقْلِي ، جُمِي	Broad bean	Fève
قِيْتَمَة ، قُوْتَمَا	Rampion	Reipoince
قِيْرُونِيكَا	Veronica	Veronique
قَتَا ، قِصَّة بَرِّيَّة	Sea hedgehog medick	Lazerne sauvage
قَرَطَم ، إِسْرِيض ، بَهْرَم ، مَرْمِي	Safflower	Carthame
قَرَع	Gourd	Courge
قَرَابُوس ، قَرَالِيَا	Cornel-tree	Cornouiller
قَسْرَوَان	Horse-thistle	Cirse
قَصَب اللَّذَب ، عَصَا اللَّذَب	Golden-rod	Solidage, Verge d'or
قَلَاخ	Self-heal	Brunelle
قَلِيْط ، قَرْتِيْط	Cauliflower	Chou-fleur
قَنْدَل	Horse-chestnut-tree	Marronnier
قَنْطَرِيُون ، قَنْطَارِيُون	Centaury	Centauree
قَنْطَرُون	Canavalia	Canavalia
قُوْبَسَة ، قُوْبَسَة ، نَاعِيَّة		Sauge
قَيْب ، اِسْتِنْدَان	Maple-tree	Erable
كَأَوَشِير ، كَرْد بَرِّي	Opopanax	Opopanax
كَرَاث مَعْرُوف	Lock	Poireau
كَرْد	Cherry tree	Cerisier
كَرْدِيَّة	Ers, Ervil	Ers, Ervillier
كَرْلِيْن	Carlina	Carline
كَرْب	Kohl-rabi	Chou-rave
كَحْمَلَة ، قَطْلَة ، شَاة بَلُوْط	Chestnut-tree	Châtaignier
كَشِيْش	Currant-bush	Groseillier
كَشِي	Bitter vetch	Orobe
كَحْمَلَة مَلْدَاة ، كِلَاب اَرِيْصِي	Ground ivy	Gléhome bédéracé
كَنْطَر	Gypsophile	Gypsophile

اسم النبات	بالانكليزي	بالفرنسي
كُوسَى	Vegetable marrow	Courgette
كُوسَى	Ploughman's spikenard	Conyza
لَارِيْس ، مَرَّ	Common larch	Larix
لُرَّان	Broom	Cytise
لِسَانُ الْكَلْب ، آذَانُ الْاَرْتَب	Gipsy flower	Cynoglosse
لِفَتْ	Rape	Rave, Navet
لُثَام ، نَتْعُ اخْضَر	Spearmint	Menthe verte
لُؤْيَاة	Black eyed delichos	Dolique
لُؤْز	Almond tree	Amandier
لُؤْلُؤِس ، لُؤْلُؤِس	Lotus	Lotier
لُيُون (جميع الانواع)	Citrus	Citrus
لِيْنَارِيَّة ، حَاجِب	Linaria	Linnaire
مَارْزُون ، اَتَم ، ذَقَّة سَائِدَة	Mezereon	Daphné mézérton
مَحَلْب	Parfumed cherry	Mahaleb
مَرْن ، لِسَانُ الْعُشْبُون	Ash-tree	Frêne
مُرْعَاوِيَّة ، رِجْمُ الْاَبَل	Echisops	Echinops
مُشَطُ الرَّاعِي ، شَوْكُ الدَّرَاج	Teazle	Cardère à foulon
مِشْشُوش	Apricot tree	Abricotier
مُشَمَّة	Medlar tree	Néflier, Merier
مِثْرِيَّة	Melick	Mélique
مُفْلُوف ، كُرْتَب ، لَحْتَة	Cabbage	Chou
نَارُون ، سِيل	Valerian	Valériane
نُون	Alder	Nerprun
نَد ، حَبِيرَة	Willow-herb	Epilobe
نَدَاق	Savory	Sarriette
نَمْع	Mint	Menthe
نَمْعُ الْبَر	Cat-mint	Calament
نَغَل	Clover	Trèfle
نَدَال	Common mistletoe	Gui
نِرْتَلِيَّة	Heracleum, Parsnip	Berce
نُيُون	Asparagus	Asperge
نُجْدِيَاء	Endive	Chicorée endive
نُورِيَّة	Phacelia	Phacélie
وَزَال ، جُنْدَس ، جُونُك	Furze	Ajone
وَسْمَةُ الصَّافِيْن	Wood	Guède, Pastel
وَسْمَةُ حَمْرَاء	Red spur-valerian	Centranthe rouge
وَسْم ، فُفْر ، وَنَاقِيَّة	Privet, Privy	Troène, Prune
يَنْبُسِيْد ، يَنْبُسِيْض	Lion's tooth	Léontodon, Dent de lion
يَنْبُسِيْن اَقْرَع ، قَاوُون المِير	Squash	Pâtisson

٢٨٤١٨ - نَبَاتَاتٌ طَبِيَّةٌ Plante médicinale (F).
 Medicinal plant (E).
 النباتات الطبية كل نبات حوى بعض العناصر الفعالة
 لاثابة الصالحة للتطبيق . النباتات الطبية كثيرة المدد ،
 معظمها مشهور وبعضها لا يزال في دور التطبيق
 الاختباري || اشهر هذه النباتات ما جاء في الجدول التالى .

جدول النباتات الطبية

النبات	التعليق
أبست، شبح رومي	عشبة معمرة فرعاء. اوراقها مركبة ريشية. ازهارها عطرية صفراء اللون
أبست بحري	عشبة معمرة متسلقة الساق. اوراقها مفصصة. ازهارها قليلة العرف باهتة الصفار
أخيليا أم ألف ورقة	عشبة معمرة فرعاء. اوراقها مركبة مشطية. ازهارها الى البياض الوردية
أدونيس ربيعي، حين الثور	عشبة معمرة فرعاء. جذرها عسقلي. ازهارها فردية كبيرة صفراء اللون
آذرين عذري	عشبة حولية فرعاء. اوراقها ريشية خصلية النصال. ازهارها صغيرة
إرث، سرساد	جنية معمرة فرعاء. اوراقها كفية النصال. ازهارها عطرية زرقاء. ثمارها صغيرة كالفلفل
أرضي شوكي، غرشف	عشبة معمرة، اوراقها كبيرة مفرصة ومشرمة، ازهارها رئيسية طرفية
أرطاة، ياسين اصفر	جنية معمرة متسلقة. اوراقها عروبة سنانية. ازهارها بوقية عطرية صفراء
أرطاسية جبليّة	عشبة معمرة غشوشية الساق. اوراقها سنانية. ازهارها رئيسية خضراء
أرقطلون	بجلة حولية. اوراقها كبيرة قلبية. ازهارها ارجوانية. تتميز بمشينا الغليظ
أرنكا جبليّة، زهرة الطاس	عشبة معمرة مستقلة الجذر. اوراقها سنانية. رؤسائها الزهرية الى الصفار البرتقالي
أروم، تريفاي ابيض	عشبة دوفضية. اوراقها قرصية الانتشاب سهمية كبيرة. غشباتها صفراء المواج
أروم ثلاثي الورق	عشبة دوفضية. اوراقها قرصية الانتشاب ثلاثية الوريقات. غشباتها موضحة
أسارون، تاردين بري	عشبة جذمورية معمرة. اوراقها لحمية كلوية الشكل. ازهارها صغيرة ارجوانية
اشنة بحرية	ضمة من الخيوط والحزم الفوقية سمراء اللون زيتية المواج
اطريفل نقل	عشبة جذمورية معمرة. اوراقها قرصية الانتشاب مركبة. ازهارها صغيرة بيضاء
أقنى متوقفة	جنية معمرة فرعاء غليظة الاموثة. اوراقها مركبة. ازهارها الى الخضار الباهت
أصفوان عثين	عشبة حولية. ساقها ضعيفة. اوراقها صغيرة مشرمة. رؤسائها الزهرية صفراء
إكليل الجبل، حصا لبان	جنية معمرة فرعاء. اوراقها صغيرة لسة. ازهارها زرقاء اللون
أتاروف، انجار	عشبة جذمورية معمرة. اوراقها قرصية الانتشاب. ازهارها صغيرة وردية
أثشوة عذرية	عشبة معمرة او حولية. اوراقها لسة مستخشنة. ازهارها الى الزرقا البنفسجية
أتيسون	عشبة حولية فرعاء. اوراقها مركبة. ازهارها بيضاء. ثمارها يزور عطرية خضراء اللون
أتيسون نحسي	شجيرة فرعاء. اوراقها ابيدة جامدة. ازهارها صفراء. ثمارها لوزية دهنية اللباب
أوكالبتوس عريض الورق	شجرة ضخمة باسقة. اوراقها سنانية جامدة، بحرية الخضار
إيبرغة	جنية معمرة فرعاء. اوراقها اهليجية. ازهارها بيضاء. ثمارها حنابل لثائية البلور
بايونج عطر	عشبة معمرة متسلقة فرعاء. اوراقها مركبة خيطية. ازهارها رئيسية صفراء
بايونج عطر	عشبة حولية صغيرة. اوراقها ثنائية التظليل الريشي. ازهارها رئيسية صفراء
بادوسه بوليتا	جنية معمرة فرعاء. اوراقها سنانية جامدة النصال. ازهارها بيضاء اللون
بياط زراعي، ديكاء الهند	شجرة عادمة الفروع. اوراقها قلبية كبيرة سباعية التفصيص. ثمارها قرعية
بتولا يبيضاء	شجرة فرعاء. اوراقها قلبية كبيرة. ازهارها خبار. ثمارها جوزية
بريريس، حود الريح	جنية معمرة فرعاء. اوراقها يبيضة جامدة. ازهارها صفراء. ثمارها صميجة
برقوق شالك	شجيرة شائكة فرعاء. اوراقها يبيضة مسننة. ازهارها بيضاء. ثمارها خوخية
برنق عسلي	جنية معمرة فرعاء. اوراقها يبيضة جامدة. ازهارها حمراء. ثمارها نووية جزئية
بزرقونه، عشبة اليراقث	عشبة صغيرة معمرة. اوراقها قرصية الانتشاب. ازهارها شراعية. ثمارها يزور صغيرة
بطباط، شيط الفول	عشبة حولية فرعاء. اوراقها صغيرة. ازهارها بيضاء او وردية ثمارها يزور صغيرة
بطونقا طيبة	عشبة معمرة. اوراقها سنانية مسننة. ازهارها عطرية حمراء اللون
بقدنوس	عشبة حولية. اوراقها مركبة. وريقاتها لثائية التفصيص. ازهارها خضراء اللون
بقس، شمشاد اخضر	جنية معمرة. اوراقها صغيرة ابيدة جامدة. ازهارها وردية. ثمارها صميجة
بقلة الاوجاج	عشبة جذمورية معمرة. اوراقها سنانية مزغبة ومسنة. ازهارها صغيرة ليلكية
بقلة التريس	عشبة جذمورية شراعية. اوراقها مركبة خماسية. ازهارها بيضاء. يزورها دقيقة
بلاذون، ست الحسن	جنية معمرة فرعاء. اوراقها كبيرة متمشجة. ازهارها وردية. ثمارها صميجة
بلاذر شرقي	شجرة معمرة للساق. اوراقها سنانية جامدة. ازهارها بيضاء. ثمارها قلبية لحمية مأكولة

الاجزاء الصالحة	المنافع والاستعمال
الأوراق والأزهار	مغلي الأوراق والأزهار ينشط الهضم والابلاع والطمث ويدفع الحشيات
الأوراق والأزهار	يستعمل مغلي الأوراق والأزهار كطارد للبلدان. وينشط الهضم
الأوراق والأزهار	مستحباً مغز، منبه، مضاد للتشنج، وفيه للمعدة والأعضاء
شعبية برنتها	تنظم التبرش، ترفع الضغط الدموي، تزيد ادرار البول
الشعبية برنتها	تقيحها يسكن آلام الحصى. مستحب الأزهار يفيد البثنة عند الذكور
الأزهار والثمار	الثمار عمدة للقوة الجنسية. الأزهار والثمار هاضمة، طاردة للغازات ويتر البول
الأوراق وسلوعها	عصيرها يفيد الحفر والاستسقاء واليرقان واحتقان الكبد ويتر البول
الأرومة والجذور	مخففة للضغط الشرياني، تدفع الحمى والأمراض المعوية. استعمالها خطر لأنها سامة
اليزور والشعبية برنتها	مقوية تبيد الصدر والمعدة. مدرة للحيض
البثث والأوراق النضجة	خارجياً تفيد الأمراض الجلدية والدمامل. داخلياً متعة ومقوية للدم
الأزهار والجذر	مضادة للالتهابات والربو. تشفي جروح الإعياء الدموية
الدرن والأوراق النضجة	عصيرها سهل، مفتت للحصى الكلوية. استعمالها خطر لأنها سامة
الدرن والأوراق النضجة	من الداخل تفيد الربو والتهابات الرئمة والتهال المعوية. من الخارج مضطة
الجذامير والأوراق	تقيحها اوسحقها سهل شديد الوقع. ويستعمل كمقيء
النبات برنتها	يستعمل كطارد للدرور خاصة عند الأطفال
الأوراق	مقوية. تبيد المعدة. تدفع الحمى. تدرك الطمث
الأرومة	مقوية للمعدة. تفيد الرقص الزنجي والروماتيزم المفصلي والتهقرس
الشعبية برنتها	مضادة للتشنج. مطهرة. دافعة للحيمات. طاردة للدرور
الأوراق البلب والأزهار	تقيح الأزهار ناعوظ. تقيح الأوراق يقضي على الصفراء. الأوراق والأزهار تشط الأعصاب والذاكرة
الأوراق والأزهار والجذامير	قائضة نشطة لا تضر الجهاز الهضمي
الشعبية برنتها	ممرقة ومنقية للدم. تفيد الأمراض المعدية والحلقية
اليزور	مغلي اليزور ينشط الهضم ويسكن الغص ويزيل الانتفاخ ويتر البول
الأوراق والثمار	تستعمل استعمال الانيسون
الأوراق	منظفها منش، ممرق، مضاد للحمى وفيه الطل الرئوية والسالك البولية
الأوراق والأزهار والثمار	مقوية للقلب، مسطحة، مشهية
الشعبية برنتها	تفيد المعدة وتطرد الغازات وتقوي الأعصاب. مضادة للتشنج
الأزهار	مضادة للتشنج. تدفع الحمى والريح. تقوي الأعصاب
الأوراق	مقوية. ناعضة، هاضمة. مدرة للبول
الثمار	عصارة الثمار قبل الادراك تخفف من سرعة خفقان القلب وفيه الهضم والمعدة
الأوراق	اوراقها من الخارج تفيد الروماتيزم المفصلي والمفصلي والتهقرس. عصيرها يفيد الكلى والكبد
الأوراق والثمار واللحاء	تفيد المعدة وأمراض الرئة واليرقان
الأزهار والثمار	مستحب الأزهار يفيد التهاب المثانة وصعوبة التبول. عصير الثمار يفيد الرعاف وفروح الدم
الثمار	مستحب الثمار طارد للدرور لاسيما الدودة الوحيدة
الأوراق والشجائخ واليزور	منظفها يقضي على الامساك
الشعبية برنتها	منظفها يقطع الاسهال وفيه الهضم والجهاز البولي. التبخيل باوراقها المهروسة يفيد القروح
الأوراق	دافعة للحمى وفيه ضعف الأعصاب والتهال والكبد
اليزور والجذور والأوراق	تقيح اليزور يقي الدم ويتر البول. الجذور منبهة. والأوراق منبهة
الأوراق واللحاء والجذور	ممرقة. دافعة للحمى، تفيد الطل المعوية
الجذامير والأوراق	مقوية للقلب والمعدة. مضادة للتشنج. ضاد اوراقها يزيل الاوجاع
الجذامير	منبهة، منشطة، هاضمة وفيه الربو
الأوراق والأزهار والجذور	مضادة للتشنج والافرازات. تمدد حقة العين - مسحوق او صبغة
الثمار القوية	تستعمل للتهور والقوية استعمالاً خارجياً

النبات	الصليبة
بلدس ، شجرة الكبد	شجرة صغيرة فرعاء. اوراقها بيضيه ابيدة جامدة. ثمارها كائزمرورسكية مأكولة
يلسم مكّة	جنية معمرة فرعاء. اوراقها مركبة وثريّة. ورقاقها صميكة. ازهارها خيراء اللون
بنج اسود	شجيرة فرعاء. اوراقها متقابلة ابيدة. ازهارها بيضاء عطرية. ثمارها نويوة ثنائية الحب
بندي هندي	شجيرة حويلية. اوراقها مفرّعة كرسية الرالحة. ازهارها كبيرة. يزورها مقلطحة
بنفسج عطر	جنية معمرة داسية. اوراقها مركبة شفعية. ازهارها بيضاء. ثمارها حنابل. يزورها كروية
بشية اللين، حود الخير	عشبة رملية معمرة. اوراقها قرصية الانتشاب معتقة. ازهارها بنفسجية عطرية
بشية الشاي	شجرة فرعاء. اوراقها جامدة ابيدة سننة شاككة. ازهارها صغيرة. ثمارها عنبية
برصير ابيض	شجرة كبيرة فرعاء. اوراقها بيضيه. ازهارها صفراء اللون. ثمارها الى الحمرة
بولوطاني مرّ، حشيشة البين المرة	عشبة ليفية حويلة. اوراقها بيضيه خصلية البشرة. ازهارها عطرية صفراء اللون
يش ، اكليت هرمي	عشبة حزمية معمرة. اوراقها صغيرة رهيبة. ازهارها جلجلية زرقاء اللون
يلسان اسود	عشبة معمرة. اوراقها ريشية شديدة الخضار. ازهارها الى الزرق العاقبة
تافنست ، ملكة الحشائش	شجيرة معمرة فرعاء. اوراقها مركبة خاسية. ازهارها صغيرة صفراء اللون
ترنجان	عشبة جلمونية معمرة. اوراقها مركبة خاسية. ازهارها صغيرة كبيرة يسهل اللون
ترنشا	بجلة معمرة. اوراقها بيضيه بارزة المروق. ازهارها بيضاء فواسية الصبر
توت اسود، توت شامي	عشبة حويلية. اوراقها ضيقة الاتصال لانظامية. رؤسائها الزهرية زرقاء اللون
لثان حلومرّ	شجرة دالحة. اوراقها قلبية خشنة طابلة. ثمارها حسله جليوية اللبيدة الطعم
ثوبلاء أكمله	جنية معمرة متسلقة. اوراقها معتقة شديدة الخضار. ازهارها بيضاء بنفسجية المواج
جرجير حقل	عشبة حويلية فرعاء. اوراقها قلبية بحرية اللون. رؤسائها وريدية
جروية ترسية	عشبة حويلية فرعاء. اوراقها شديدة التفريغ. ازهارها وريدية. ثمارها يزور تحيلة
جزر الرعاة، دوقس	شجرة دماعية جولاء الساق. اوراقها ترسية مفصصة. ازهارها حامية صفراء
جكرته بريوسيرا	عشبة معمرة جنيّة الجذر. اوراقها مركبة ريشية. ازهارها صغيرة خيراء اللون
جلاب	شجرة فرعاء. اوراقها مركبة ريشية. ازهارها كبيرة زرقاء اللون. ثمارها لحية مأكولة
جذليج صني	عشبة صفولية متسلقة معمرة. اوراقها قلبية. ازهارها كبيرة قرمزية.
جنبل شائع	عشبة حويلية مزغية فرعاء. اوراقها سنانية سننة. ازهارها بيضاء مستحبة العرف
جنس	عشبة معمرة عارشة. اوراقها مفصصة. ازهارها وحيدة للسكن
جوز عادي	جنية فرعاء مستغلطة الجذور. اوراقها مركبة حاسية. ازهارها وريدية اللون
جينكو	شجرة كبيرة دالحة. اوراقها مركبة وثريّة. ازهارها قلبية. ثمارها مأكولة الثياب
حب السلك	شجرة ضخمة دالحة. اوراقها مروحية مشقوقة. ثمارها لوزية لحية السودي جمالية
حب معروف	عشبة حويلية زياء. اوراقها خاسية اوساعية القصور. ازهارها كبريتية اللون. يزورها بلسية
حمرل	عشبة حويلية فرعاء. اوراقها لسة مائبة. ازهارها بيضاء. يزورها دقيقة كروية
حشيشة الحفر	بجلة معمرة مكادة. اوراقها مفرّعة ريشية التشمير. ازهارها بيضاء. يزورها صغيرة
حشيشة المطاف	عشبة معمرة فرعاء. اوراقها مستطيلة مفرّعة. ازهارها صفراء. يزورها دقيقة سمراء
حشيشة اللة المخزنية	عشبة معمرة درية الجذور. اوراقها قرصية مزراقية. ازهارها صفراء
حشيشة الثرجاج	عشبة معمرة لحية زياء. اوراقها رهيبة مزغية. ازهارها وريدية لم بنفسجية
حشيشة السحال ، فرارة	عشبة معمرة فرعاء. اوراقها لسة زياء. ازهارها خضره اللون
حشيشة الفزاز	عشبة حويلية فرعاء زياء. اوراقها بيضيه مزغية. ازهارها بيضاء اللون
حشيشة الملايح	عشبة حويلية صغيرة. اوراقها ملحية الشكل درماء الاتصال. ازهارها بيضاء
حشيشة الملاك	عشبة معمرة فرعاء. اوراقها مركبة وثريّة. ازهارها بيضاء اللون. يزورها منجحة
حشيشة مباركة	عشبة جلمونية معمرة. اوراقها القرصية ريشية اما العليا لفصصة. ازهارها برتقالية اللون
حلب روميه	عشبة حويلية. اوراقها مركبة ثلاثية الورقات. ثمارها حنابل. يزورها شبه كروية
حليب حويلي	عشبة حويلية صغيرة. اوراقها سنانية. ازهارها خضره اللون
حمحم عذري	عشبة حويلية زياء. اوراقها سنانية خشنة. ازهارها زرقاء اللون
حشيشة الحفل	عشبة معمرة فرعاء. اوراقها سنانية مستطيلة داكنة الخضار
حشيشة زراعي	عشبة معمرة فرعاء. اوراقها رهيبة قاعمة الخضار. ازهارها خضره اللون

الاجزاء الصالحة	المنافع والاستعمال
الأوراق	تستعمل في علاجات الكبد، مقوية، هاضمة
صمغ يستخرج بالحرق من الساق	يسكن السعال، يقوي المعدة
الحطب	مسحوق الحطب المحمص ومطليه ينضج الاعصاب
الأوراق واليزور	مسحوقها او صبتها ممتدة، مضادة للتشنج، تنيد للنفس الكلوي، تمدد حدة العين
الأوراق واليزور	مطليها مقو، مضاد لتهات الحصى المتقطعة
الازهار والأوراق والرواكب	نفع الازهار الجافة لمائي وينفع الصدر والسعال، الأوراق والرواكب مقوية
الأوراق	نفع الأوراق او مغليا يفيد الرشح المستعصي
الأوراق	مغلي الأوراق الجافة منضج وهاضم
الازهار	مستحلب الازهار يقطع السعال الجاف والتهاب الحنجرة، صحتها تنفع التهاب الجفون
الجذور والأوراق والازهار	مغليا ينشط ذو اللبن عند المرضع، مضادة للسعال، تنيد الحضم
الأوراق والازهار والجذور	العصبة والمستحلب المثير مسكن نشيط، يدر البول، مضاد للاحتقان
الأوراق واللحاء	مغليا يفيد التلات الصدرية والتهاب القلورزين والصداع
الجذور	مسحوقها منضج، معرق، يساعد الحضم، يرفع الريح ويدر البول
الأوراق	مغليا منبه، يفيد الآلام العصبية والصداع
الازهار	نقيها يقوي الميوز ويقضي على اليرم
اثمار	عصيرها قابض، يفيد المعدة والأمعاء
الفروع المحولة	مسحوقها الجاف يفيد الأمراض الرئوية والعصبية والقرص
الأوراق	عصيرها ينشط افراز الكلى ويقيد التلات ويساد الدم
الأوراق واليزور	عصير الأوراق منضج وضاد للحرق، مسحوق البذور ناطق وينشط الباه
الأوراق والجذور	مغليا يفيد الربو والاستقاء وامراض الكبد
الجذور واليزور	مغليا منضج نشيط، يفيد البثور
الأوراق واللحاء	اوراقها تنيد الأمراض الجلدية، اللحاء مرقه ومدره للبول
العصائل	مسحوق العصائل سهل فكال
العصبة برستها	مغليا يفيد التشنج الربوي ويقيد الربو والتهاب الحنجرة
للمخاطرات الاثوية	مغليا يسكن الاعصاب والاضطرابات، مضاد للحرق والامراض الجلدية
الجذور	مسحوقها منضج نشيط او شاي حسب الاستعمال، لا يسيء الى الجهاز العصبي.
الأوراق وقرفة اثمار الخضراء	مغلي الأوراق يفيد الآفات الجلدية، صبة قرفة اثمار منهضة
اليزور	طاردة للدود
اليزور	مستحلبها مضاد للتشنج
الأوراق والازهار	مغليا مقوي، مشه، هاضم، يزيل الصداع، مضاد للتشنج
اليزور	مسحوقها ومغليا يدر البلغم ويغضي، استعمالها خطر يوجب الحذر
الأوراق والازهار	مغليا دواء للحرق وضاد للسعال، نقيها يفيد البحة والتهاب الحنجرة
العصبة برستها مع الجذور	تستعمل في معالجة البواسير مزوجة ببض المساحيق او للرام
الساق والأوراق	مغليا يفيد الصدر والالتهابات الشعبية والرئوية
العصبة برستها	مغليا ملين ويدر البول
الأوراق والازهار	مستحلبها مضاد للسعال والتهاب الحنجرة
العصبة القسمة برستها	مستحلبها يفيد ضعف القلب ويقضي على التلات الصدرية الخفيفة
العصبة برستها	شرايبها او صبتها منقطعة، مخروسة، مضادة للحرق، منقبة للدم، تدر البول
الجذور	مغليا يفيد الجهاز التنفسي والمعدة ويقطع الحصى
الجذور	مغلي المسحوق يفيد القلب والدماع والذاكرة والاعضاء التناسلية
اليزور	مغليا يفيد الالتهابات الرئوية والاسماك والبواسير وينشط السنة
الأوراق	مغليا ملين وسهل
الأوراق والازهار	مغليا معرق، يدر البول، مضاد للسعال والامراض الصدرية والعصبية
الجذور والأوراق	مغليا مقو، يقي الدم، يفيد الأمراض الجلدية
الأوراق	عصاريتها منهضة، تنقي الدم، تقضي على الاساك

النبات	الوصف
حنطوق حقل	عشب حولي فراء. اوراقها مركبة ثلاثية. ازهارها صفراء اللون كثيرة العدد
حنظل	عشب حولي مدادة. اوراقها كبيرة خشنة مزغبة. ازهارها صفراء. ثمارها قرعوية
عنب الرمال	عشب جذموري معمر. اوراقها عصفية حشوية البشرة مهدبة الحار
خيارية برية	عشب ليفية حولي او محولة. اوراقها مفصصة. ازهارها بتنجسية كبيرة
خيزرة مخزنة	عشب ليفية معمرة. اوراقها ثلاثية او خنسية القصوص. ازهارها وردية
خلدوة، رجل الثلب	عشب معمر. اوراقها خيطية متراكبة. ازهارها خيما سنبله التجميع
خرن اسود	عشب صغيرة معمرة. اوراقها قرصية الانتشاب مركبة وثرة. ازهارها بوقية يضاء اللون
خروق ابيض	عشب جذموري معمر. اوراقها سنائية زياء. ازهارها يضاء بطوها موج اخضر
خردل اسود	عشب حولي فراء. اوراقها كبيرة زياء. ازهارها صغيرة صفراء. يزورها دقيقة
خز الصخور	من النباتات الدنيا. جامد البشرة. يعيش في المواد الضوية على الصخور الرطبة
خروب هندي	شجرة داحلة. اوراقها مركبة وثرة ايده. ازهارها خضراء اللون. ثمارها قرنية كثيرة البذور
خزامي مخزنة	عشب معمر فراء. اوراقها لينة خفيفة خيطية. ازهارها زرقاء اللون
خشخاش ابيض	عشب حولي عشوية الساق. اوراقها جلدية مقرضة. ازهارها كبيرة. ثمارها جراح
خشخاش اعلى	عشب حولي صغيرة حشفة. اوراقها مقرضة. ازهارها كبيرة حمراء. ثمارها جراح
خلة	عشب حولي فراء. اوراقها مركبة مقرضة. ازهارها عطرية يضاء اللون
خثود السطوح	عشب لحمية معمره عامدة الفروع. اوراقها لحمية قرصية الانتشاب. ازهارها الى الحمرة الوردية
خولحان عزلي	عشب جذموري معمر. اوراقها سنائية. ازهارها يضاء اللون
دازي رومي	عشب معمر. اوراقها اهلجية كثيرة الجيوب المعنفة. ازهارها صفراء. ثمارها جراح
دكمون ابيض	عشب معمر فراء. اوراقها مركبة وثرة. ازهارها يضاء مقلصة بالارجواني
دند اللوك	جنية معمر. اوراقها اصحية مقرضة. ازهارها خيما. يزورها شبيه يزور الخروع
ديجنال ارجواني	عشب حولي ليفية سرحة. اوراقها يضيئة. ازهارها قعبة ارجوانية
دش مشوك	شجرة صغيرة فراء. اوراقها مركبة وثرة عطرية. ازهارها خضراء اللون
ذرة صفراء	عشب حولي متصبية. اوراقها عصفية سنائية مستطيلة
ذقة، زين الوادي	عشب جذموري معمر. اوراقها سنائية. ازهارها جلجلة يضاء
راسن طهي	عشب معمر فراء. اوراقها قلبية كبيرة. رؤسها الزهرية صفراء اللون
راوند عزلي	عشب جذموري معمر. اوراقها كبيرة مفصصة. ازهارها كثيرة خضراء اللون
ريرق	جنية معمر. ساقها شائكة فراء. اوراقها كبيرة مفصصة. ازهارها بتنجسية او يضاء
رجل القط الشائع	عشب معمر جنتية الجلس. اوراقها ملوكة. ازهارها رؤسية
رصاصية اوروبية	بجلة فراء. اوراقها ملفقة سننة. ازهارها بوقية بتنجسية
رعي الحام الخزلي	عشب معمر فراء. اوراقها يضيئة مقرضة الحواشي. ازهارها عطرية وردية اللون
روكان	شجرة معمر فراء. اوراقها رحيمة. ازهارها ارجوانية. ثمارها كروية
زداع شاين	جنية معمر فراء. اوراقها جامدة. ازهارها يضاء. ثمارها حقة. يزورها مستطيلة
زراوند لباني	عشب عارضة معمر. اوراقها كبيرة رحيمة. ازهارها بوقية خيما اللون
زراوند غلياني	عشب معمر فراء. اوراقها ليلية. ازهارها قعبة صفراء. ثمارها كمامير
زربوك فيرجينية	شجيرة داحلة. اوراقها سنائية النصال الجامدة. ازهارها صفراء اللون عطرية
زعرور شالك	شجرة فراء شائكة. اوراقها مفصصة سننة. ازهارها يضاء. ثمارها كروية
زعفران عزلي	نبات دوفضي حولي. اوراقه خيطية ضمية. ازهاره عطرية
زعدة عزلي	عشب نجمية معمر. اوراقها سنائية قرصية الانتشاب. ازهارها جرسية. ثمارها حقة
زنجبيل مخزني	عشب جذموري عقده. اوراقها كبيرة سنائية. ازهارها صفراء برتقالية البتلات
زوظا	عشب معمر فراء. اوراقها عطرية سنائية. ازهارها عطرية عديدة الالوان
زيزوفون	شجرة كبيرة. اوراقها متقة قلبية. ازهارها عطرية تبنة اللون
ستريكوس ابناس	جنية عارضة معمر. اوراقها يضيئة. ازهارها يضاء. ثمارها كروية
سذاب مخزني	عشب معمر فراء. اوراقها مركبة مقرضة. ازهارها فستية اللون
سرخس ذكر	عشب جذموري معمر. اوراقها كبيرة مستطيلة. مرجحتها حرشية
سرفل بغلي	عشب حولي فراء. اوراقها مركبة شديدة التفريغ. ازهارها يضاء يزورها صغيرة

الاجزاء الصالحة	التلغيع والاستعمال
الأوراق العليا والأزهار	منغليا قابض، مضاد للسعال. مرهم الحنثية الغصّة يحمل الروم الجامد
لبّ الثمار	سهول شلبد الرّيح. لا يستعمل إلا بأمر الطبيب
الجذومور	منغلي مرقّ ويدّر البول ويغيد الروماتيزم
لساق والأوراق والأزهار	منغليا مضاد للسعال ويغيد التلذات الصدرية والتهاب اللوزتين
الأزهار والجذومور	منغليا مسكّن للسعال والأمراض الصدرية وسرقة البول. غرغرة في التهاب اللوزتين
الطلع	مضادّ لداء الفواصل والعصر والتفتحة. يغيد الإكزما الرطبة عند الاطفال
الجذور	منغليا سهول هيف، مطعش، طارد للدمود
العشبة برشتا	منغليا يغيد الثفوس ويسكّن الآلام العصبيّة
اليزور	منغليا حريف، ناطق، مرقّ، يهّء الحضم والقلب
الثبات برشته	مسحوقه ومنغلي مضاد لتقيّء، مقه، يغيد الصدر
لباب اليزور	تقيعها واستحليها ملين يناسب الاطفال
الأوراق والأزهار	منغليا يسكّن الأعصاب ويغيد اضطرابات للمعدة
مصارة الساق والجراه	منغليا يغلّث الأعصاب أو يسكّن
مصارة الساق	مسكّنة، مرقّعة، تقيد السعال الديكي. مژومة
اليزور	منغليا مقو، مضاد لداء الفواصل، يغيد الحضم ويدّر البول
عصير الأوراق	يغيد القروح واللسامير والتآليل والتهاب اللثدي
الجذومور	مسحوقه منقطع شايق اذا تقع في الحليب. منغلي يغيد للمعدة والمغضم ويطرد الغازات
الأوراق والأزهار	ثلم الجروح وتنقي الحروق وتوقف بصر الدم ويغيد العصر العصبي
الجذور	منغليا مضاد للصرع، مرقّ، طارد للدمود
لساق والأوراق واليزور	القليل منها منغلي ملين عمود
الأوراق	منغليا يقرّي القلب وينظم خفقانه. استعمالها خطر لأنها سامة
الثحاء والأوراق	مسحوقه ومنغليا منبه، منغلي، يغيد داء الفواصل ويوجع الانسان
شوشة الثمرنوس	منغليا يغيد التهابات الكلى والمبولة
الأزهار	منغليا ينشط القلب ويخفف سرعة النبض ويغيد الغدة الدرقية
الجذور	استحليها مقو، منبه، مرقّ. منغليا يشفي الجروح والقروح
الجذومور	الجرعة الصغيرة من التقيع تقوي المعدة ويغيد الحضم. الجرعة الكبيرة مسهلة
الأوراق	منغليا مسكّن وملين
الأزهار	منغليا مضادّ للسعال وملين
الجذومور	مسحوقه ومنغليا انتيبوتيك. يغيد وجع الانسان والجرب والقروح
الأوراق والأزهار	استحليها يغيد الرنم والصفص واحقان الكبد. منغليا يغيد التهاب اللوزتين
الأزهار ولحاء الجذومور	منغليا طارد للدمود. استعمالها حذر
الأوراق والأزهار	القليل مقو الكثير سهول. تستعمل منغليّة
الجذومور	مسحوقه واستحليها وتقيعها مقو، منغلي، مرقّ. ويغيد الربو
الجذومور	مسحوقه مطعش. تقيعها ومنغليا مقو، ويغيد القروح والقدمات
لحاء الجذومور والساق	منغليا يغيد الحرارة ويدّر الصفراء والبول
الأزهار والثمار ولحاء الساق	استحليها الأزهار وصيبتها مسكّنة للقلب ويخفف لضغط الدم
الأزهار والبصلة	منغليا يغيد المعدة، مطعش ومنبه نشيط
الأزهار والجذومور	منغليا مضاد للسعال والتشنج. يغيد الآلام العصبيّة
الجذومور	مسحوقه ومنغليا محرّض، منقطع، مقو، حاضم، طارد للغازات
الأوراق والأزهار	منغليا منمش، يغيد الصدر، يقطع السعال
الثمار واليزور	استحليها يغلّث الركام الحظن والتلذات الشبيّة والسعال
الأوراق	القليل القليل من مسحوقه منقطع ناهض. استعمالها خطر لأنها سامة
العشبة برشتا	تقيعها ومنغليا ناطق، خافض للحرارة. مضادّ للتشنج، يدّر الحظم
	منغليا يغيد آلام الظهر والاعلى العصبيّة والصداع وينقي عن الدودة الوحيدة
	منغليا حاضم، يقيّ الدم، يلين المعدة، يدّر البول

النبات	الصلبة
سرو شائع	شجرة معتدلة رطبة. اورالها نسيّة هابطة الخضار. ثمارها اكواز كروية
سمن البر	عشبة معمرة. اورالها اهليلجية خمليّة النصال. ازهارها وردية
سفندبل	عشبة دوفصية معمرة. اورالها قرصية الانتشاب عصفية. ازهارها ارجوانية
سفرجل	شجرة نازقة الاخضار. اورالها خمليّة النصال. ازهارها وردية. ثمارها كروية صفراء
سفندر لامع	جنية معمرة فرعاء. اورالها رقائق جلدية النصل. ازهارها خضراء. ثمارها عتيبة
سكب الغرب	عشبة جلوسورية معمرة. اورالها كفيّة مفصصة. ازهارها وردية
سكع	عشبة صغولية حصيبة معمرة. اورالها قرصية الانتشاب قلبية. ازهارها زائدية عطرية
سحوطان غزلي	بجلة معمرة فرعاء. اورالها ستانية خشنة. ازهارها انبوبية ملونة
سمسم	جنية معمرة. اورالها صغوية ابيدة. ازهارها ليلكية اللون
سنا سوري	جنية معمرة. اورالها مركبة شفعية ريشية. ازهارها صفراء. ثمارها سنن مبسطة
سنا مكسي	جنية معمرة. اورالها مركبة شفعية ريشية. ازهارها صفراء. ثمارها سنن مبسطة
سنديان مرند، دور	شجرة كبيرة هرمية الشكل. اورالها منقطة مفصصة. غرورها عذب الحراشف الصغيرة
سورليمان الخريف	عشبة دوفصية معمرة. اورالها قرصية الانتشاب ضيقة مستطيلة. ازهارها ليلكية كبيرة
سوس غزلي	جنية جلوسورية معمرة. اورالها مركبة وثرية. ازهارها زرقاء. يزورها مستديرة مفلطحة
سوس ابيض	عشبة ارمولية معمرة. اورالها مستطيلة منجلية. ازهارها كبيرة فيا الياض والازرق والاصفر
سولع غزلي، آوة	عشبة ارمولية لحمية معمرة. اورالها لحمية ليفية معتدلة مستديرة سننة المختار
شاهنرج غزلي	عشبة حولية نجيلة فرعاء. اورالها مركبة مفرشة. ازهارها عقودية وردية
شالوا، كسر	شجرة كبيرة. اورالها مركبة. ورقها ستانية. ازهارها صفراء اللون
شبت	عشبة حولية معتدلة. اورالها مركبة عيطية. ازهارها بيضاء. يزورها صغيرة محددة
شرعطل متقي	عشبة معمرة. اورالها مركبة مشرحة النصال. ازهارها بيضاء. يزورها دقيقة خضراء
شقيق النعمان اللبلول	عشبة صغيرة معمرة. اورالها مركبة عيطية. ازهارها كبيرة قرمزية. يزورها كروية
شيار حلو	عشبة معمرة فرعاء. اورالها مركبة ريشية. ازهارها صفراء. يزورها صغيرة
شجرة بحيرة	عشبة صغيرة معمرة. اورالها لحمية مركبة. ازهارها بيضاء ثمارها يفضية محددة
شمرضاض عارض	عشبة عارشة معمرة. اورالها منقطة اهليلجية. ازهارها ارجوانية اللون
شنتجار غزلي	عشبة مخشوشة معمرة. اورالها صغيرة ضيقة مزغبة. ازهارها بيضاء. يزورها كروية صلبة
شوكة مباركة	عشبة حولية فرعاء. اورالها كبيرة مضلعة حليّة الزغب. ازهارها صفراء
شوكران	عشبة حولية ليفية الساق. اورالها مركبة. ازهارها بيضاء. ثمارها كروية صغيرة
شولاه	عشبة مخشوشة معمرة. اورالها ثلاثية التفصيص. ازهارها عطرية صفراء
شيلك	عشبة راتبية معمرة. اورالها مركبة ثلاثية خشنة. ثمارها شمولية مأكولة
سبار معروف	نبات لحمي معتد. الساق وقروها الواح كبيرة يفضية. ازهارها كبيرة نازقة اللون
صنتر شائع	عشبة معمرة فرعاء. اورالها يفسية خمليّة النصال. ازهارها وردية
صفصاف ابيض	شجرة منبسطة الفروع. اورالها ستانية النصال. ازهارها شريفة صفراء
صنوبر بري، برز	شجرة كبيرة. اورالها هدية شفعية. اكوازها مردية. يزورها دقيقة مجنحة
طوفرون غزلي	عشبة معمرة ليفية. اورالها اهليلجية مستندة. ازهارها حمراء
طهيرة بلورية	عشبة لحمية حولية. اورالها لحمية كبيرة. ازهارها بيضاء. يزورها دقيقة موداة
عافر قرعا	عشبة حولية فرعاء اورالها ريشية ثنائية التقليل. ازهارها صفراء. يزورها مجنحة
مباد الشمس السنوي	عشبة حولية. اورالها منقطة قلبية خشنة. ازهارها كبيرة صفراء. يزورها وندية
مراوة ملكة المروج	جنية معمرة فرعاء. اورالها مركبة ستانية وثرية. ازهارها الى الخضار الباهت
مرمر شائع	جنية معمرة فرعاء. اورالها ابيدة هدية. ثمارها عتيبة حلوة اللذاق عطرية
مرمر كادي	شجيرة فرعاء. اورالها ابيدة هدية. ثمارها نوية حصيبة اللد والشكل
مرف الذهب المخزني	جنية حولية معمرة. جلوسورها عيطية. اورالها منقطة صغيرة. ازهارها فردية
مرف انجبار	عشبة مدادة معمرة. اورالها مركبة خماسية. ازهارها كبريتية اللون
مرفلون غزلي	عشبة حولية فرعاء. اورالها صغيرة منشارية الحافة. ازهارها وردية
مرفلون الصباغين	عشبة معمرة فرعاء. اورالها مركبة مفرشة. ازهارها صفراء اللون

الأجزاء الصالحة	المنافع والاستعمال
الأكراز والخشب	صحبته قابضة ، مضادة للتريف وتفيد البراسير
الأوراق والأزهار	ستحليها يقوي القلب والمعدة . مغليا يفيد السعال الديكي والزلة الوافدة
البزور	مسحقها مسهل خفيف ، معطس ، يدرّ اللعاب ، استعمالها خطر
ثمار	عصيرها مضادّ للاسهال
البزور والأوراق	مسحقها وتقيها هاضم ويترّ البول
الأوراق	ستحليها يفيد التهاب الورزتين غرغرة . ويشفي الجروح
الحصبة	صحبته تقيد طين الأذنين . مهروصها يقضي على الأورام والمعامل لصفًا
الايرومة والأوراق	مهوس الأوراق ليدًا يفيد التهاب الأعصاب وعرق النساء والدرالي . مسحوق الايرومة للتريف للمهبل
الزهار والأوراق	ستحليها يدرّ البول ويفيد التهابات الكلى والمجاري البولية
الأوراق	تقيها مسهل شائع الاستعمال
الأوراق	تقيها مسهل شائع الاستعمال
الدعاء	مغلي المسحوق أو تقيها قابض
الدوقصة والبزور	مستحضراتها تقيد داء النطفة وتقضي على التقرس
الجذور	تقيها مسهل خفيف . مغليا يفيد التهابات الكلى واللثانة والحنجرة
الايرومة	مغليا منقث ويفيد الملل الصدرية
الأوراق	القليل من عصيرها مسهل . الكثير منه ماسط
العشبة يرستها	مغليا مقو ويقي الدم ويفيد البرقان والأمراض الجلدية
الأزهار	مغليا طارد للديد من أي نوع كان
الأوراق واليذور	تقيها يفيد الملحة والأمعاء ويمنع الارق ويترّ البول
البذور	مغليا يفيد الأمراض الصدرية ويبلغ الحصى ويترّ البول ويسترّ الاصاب
العشبة يرستها	عصيرها أو مسحقها الجفاف مضاد للزلة . مسكّن ومطعم
الجذور والبذور والأوراق	مغلي الجذور والأوراق يدرّ البول . مغلي البزور منه ، يدرّ الحليب والطمث
الأوراق وثمار	عصارة الأوراق وتقيع ثمار طارد للديد
للحاء	مسحقها يفيد الملل الحسية ويسكّن ويقيد الملحة
البذور	مغليا يفيد علل السالك البولية وقد يلبب الحصى ويفيد في الزنطاري
الأوراق والأزهار	مغليا مقو ، دافع للحصى ، وضييقها دامل للجرح
الأوراق وثمار	تقيها مضادّ للتشنج ويفيد الزير والسعال الديكي . استعمالها خطر لانها سامة
الأوراق والأزهار والجذور	الأوراق والأزهار مطبوخة ، الجذور مضادة للتشنج والصرع والرقص الزنجبي
الايرومة والجذور	تقيها يدرّ البول وقابض ، مغليا يفيد التقرس ويذيب الرمل
الألواح	عصارتها مقوية للقلب . تقطع الزحار والاسهال
الأوراق والأزهار	مغليا يسكّن التشنجات الحسية . مسحوقها ينشط الشهية ويترّ البول
للحاء	مغليا مضاد للالتهاب والحصى ، يعرق ، يسكّن الآلام ، يدرّ البول
البياض	مغليا يدرّ البول ويفيد التزلات الشعبة
الأوراق والأزهار	مغليا مقو ، محرّض ، هاضم ، يفيد علل الطحال
الأوراق	مغليا يفيد حصر البول والسعال التشنجي . مهوسها يفيد الحروق والجروح
الجذور	مسحقها يدخل في عدة تركيب طبية اخضا معجونات الانسان
بتلات الأزهار	مغلي البتلات مضاد للحميات والملازيا . ولعابجة توشحات القصبة الهوائية
الجذور والأزهار	الجذور قابضة ، تدرّ البول ، تقطع التريف . تقح الأزهار يفيد الاستسقاء والالتهابات
ثمار	تقيها يقي الدم ، يدرّ البول ، يفيد الملل الكبدية والسالك البولية وتنشّاف الشرياني
الأوراق	تقيها مسهل وطارد للديد
الجذور	مسحقها مقو ، منقث ، مضاد للاسهال . استعمالها خطر يوجب الحذر الكلي
الجذور	التكيد بمحتله يقضي على الأكزما ، للضمضة تقيد تريف اللثة
العشبة يرستها	مسحقها يفيد الرشح والتزلات الشعبة ، ويقرّي العين ، يفيد الرمد
العشبة يرستها	عصارتها تقضي على التاول . خلاصتها المائمة تقيد المعدة والأمعاء وتهيأ للمرارة

النبات	الصلحية
صم سندي	جنية معمرة فرعاء. اورالها يفضية ازهارها وردية. يزورها دعينة
عشبة القوى القويّة	عشبة مدادة معمرة. اورالها مركبة ثنائية الصف. ازهارها كبريتية اللون
عُشْر جَبَّار	شجيرة متبادلة الفروع. اورالها ابيدة سنائية بارزة العروق. ازهارها وردية
عشفة مبهلولة	جنية متسلقة معمرة. اورالها ابيدة جلدية النصال. ازهارها يضاء. ثمارها نووتة
عُذْدْ مزدوج السنايل	جنية معمرة فرعاء. اورالها كالحراشف. ثمارها عنية
عنب الدب، عيران	جنية معمرة فرعاء. اورالها ابيدة صغيرة. ازهارها جلجلة وردية. ثمارها عنية
عود الانبياء	شجرة متوسطة الحجم. اورالها مركبة شفعية. ازهارها زرقاء. يزورها صفراء اللون
عود الوب	عشبة جلدمورية معمرة. اورالها عصفية قرصية الانتشاب. ازهارها صفراء اللون
عوصح شائع	جنية شائكة معمرة فرعاء. اورالها مركبة وثريّة. ازهارها وردية. ثمارها شاميل كروية
عينون حطر	بجلة ليفيّة معمرة. اورالها ابيدة ملحميّة جامدة. ازهارها عطرية زرقاء اللون
غافث خلواني	عشبة معمرة شائكة الساق. اورالها مركبة وثريّة. ازهارها عطرية صفراء اللون
غاليلون حقيقي	عشبة فرعاء مضلمة الساق. اورالها ضميّة صغيرة خضيلة. ازهارها الى الصفرة الزاهية
غاليلون صليبي	عشبة فرعاء مضلمة الساق والفروع. اورالها بيضاء ضميّة. ازهارها صفراء اللون
غيراء الحابلين	شجرة فرعاء. اورالها مركبة وثريّة. ازهارها بيضاء كبريتية الرائحة. ثمارها صغيرة كروية
غراسولة غزيرة	عشبة جلدمورية معمرة. اورالها ضميّة مسننة. ازهارها بيوتية وردية
غرندبيلة ضليحة	جنية معمرة فرعاء. اورالها سنائية جامدة. رؤسائها الزهرية صفراء اللون
غروق حطر	عشبة معمرة فرعاء. اورالها مفضصة مشرمة. ازهارها الى البياض الليلي المواج
غفت ابن سينا	عشبة ليفيّة معمرة. اورالها مركبة سنائية النصال. ازهارها وردية. يزورها دقيقة
غلقة	جنية معمرة مداعة. اورالها اهليلجية شديدة الخضار. ازهارها يضاء. ثمارها كعابر
فلاريا يضاء	جنية متسلقة معمرة. اورالها كلفة مفترضة. ثمارها عنية. ثمارها زيتية اللباب
قاعية الختان	بجلة معمرة فرعاء. اورالها ضميّة النصال. رؤسائها الزهرية يبيض اللسنيات
فجل حارّ	عشبة حوليّة غليظة الجذر. اورالها مستطيلة مفترضة ومسنة. يزورها كروية
فراسيون ابيض	عشبة معمرة فرعاء. اورالها يفضية خشنة مسنة ازهارها يضاء
فراسيون ازغب	عشبة عمولة زباء. اورالها خشنة مزجية ومسنة. ازهارها حمراء مرقوشة بالايض
فراسيون اسود	عشبة معمرة فرعاء. اورالها عمليّة النصال للسنّة. ازهارها جزوتية منفرة
فراسيواز، عوصج ابيد	جنية اوسولة معمرة فرعاء. اورالها مركبة مزجية مسنة. ثمارها شاميل مأكولة
فريون لسيرس	عشبة ليفيّة عمولة مداعة. اورالها متصالبة سنائية. ازهارها وردية
فريون مخزني	جنية معمرة فرعاء. اورالها اهليلجية جامدة النصال. ازهارها يضاء اللون
فشاغ مخزني	جنية ليفيّة معمرة. اورالها قلبية جامدة النصال. ازهارها صغيرة صيرانية
فلفل كباب	شجيرة سريعة الفروع. اورالها اهليلجية جامدة. ازهارها مرجانية. ثمارها كروية
فزة	عشبة جلدمورية معمرة. اورالها ضميّة متقابلة سنائية مزجية. ازهارها صفراء
فولس حويصلي	نبات مجري قلدي الجلود والسوق والاوراق. لونه الى الخضار الاحبس
فول	عشبة حوليّة جولاء الساق. اورالها شفعية. ازهارها يضاء حمرية.
فول كلابار	جنية عارشة معمرة. اورالها مركبة ثلاثية. ازهارها ارجوانية. ثمارها قرون تغلف الحبوب
قات	جنية معمرة فرعاء. اورالها ابيدة اهليلجية بارزة الضلع مسنة. ازهارها خضراء اللون
قبطيس تيت، عيط ذهبي	عشبة حوليّة صغيرة. اورالها صغيرة مفترضة. ازهارها فردية يضاء اللون
قنوايه	جنية معمرة فرعاء فناء. اورالها سنائية جامدة. ازهارها وردية مرقوشة
قنّاء بريّ	عشبة حوليّة مدادة. اورالها ممثقة كبيرة. ازهارها صفراء. ثمارها رنيّة صفراء
قراض يحرّق	عشبة حوليّة فرعاء زباء. اورالها ناشرة العروق مسنة كلفة الملب. ازهارها خضراء
قزة	عشبة مائية معمرة. اورالها مركبة ثلاثية. ازهارها برتقالية اللون
قرطم الصباغين	عشبة حوليّة سرحة. اورالها سنائية بارزة العروق. ازهارها برتقالية اللون
قرفة سرنديب	شجرة منتصبه فرعاء. اورالها ابيدة جامدة. ازهارها عطورية غيراء. ثمارها عنية
قرنغول	شجرة فرعاء فناء. اورالها ابيدة جامدة. ازهارها عطورية صغيرة حمراء. ثمارها نووتة
قسوّزة راحية	جنية عارشة. اروتها معمرة. ساقها حوليّة. اورالها كميّة خيامية التضصيص. ازهارها تبنية
قطرم الحرق، خشبة الحرق	عشبة معمرة فرعاء. اورالها سنائية مسنة. ازهارها عطرية يضاء

الاجزاء الصالحة	التألف والاستعمال
للحاء	مسحوقها يذيب الحصى الصفراوية
العشب برنتها	نقيها او مغليا يفيد جميع انواع التشنجات ويوقف النزيف
الجلود وللحاء	للحاء نقيد الاسهال والرتخاري. الجلود لمعالجة الامراض الجلدية. قليها مقو، كثيرا مقيء
الاوراق والثمار والحاء	الثمار سهلة عتية، الاوراق والحاء نقيد السفلس والقولاء
الانفاد المزهرة	مغليا يفيد داء الفواصل
الاوراق	مغليا قابض، يدر البول، يطهر الكلي ويفيد مجاري البول ويسهل الطاق
الخشب	صيته تليد اضطرابات الحيض والتقرص. مسحوقه يفيد السفلس
الجلودور	صيته او مغليا تقوي الجهاز العصبي وتساعد الحضم ويقيد التزلات الصدرية
الثمار والاوراق والجلودور	عصير الثمار منشط ومضاد للحصيات. مغلي الاوراق يفيد اللدة. مغلي الجلودور لربل الكلي
الاوراق والازهار	مغليا يفيد الحيات للطفلة والقيس للمستعصي. استعمالها حذر
الاوراق	مهلوسا او نقيها يفيد الامراض الجلدية وغشاة العين والتهاب الحجرة
العشب برنتها	مغليا قابض غثيف، مضاد للتشنجات والاسهال، مرقق
العشب برنتها	مغليا مقو يفيد للدة
الثمار	عصيرها او مستحليها مقو، منفض، مضاد للحرق والقرحار، يدر البول.
الجلودور	مسحوقها سهل حثيف، مقيء، يدر البول. استعمالها خطر يوجب شدة الحذر
الاوراق والازهار	مغليا منشط، يفيد الري وقطل الروية والسعال الديكي
العشب وازهارها	يستعمل مستحلب الاوراق والازهار ضد القضم. الوراق للهروسة تشفي القروح
الاوراق	مغليا يفيد الكبد والتهابات المرارة وقد يحلل الرمل
الجلودور	نقيها مقيء، مرقق، مؤوج ويذر البول
الجلودور	عصارتها سهل حثيف. استعمالها شديد الخطر. يقال انها تحرق الشعر
الاوراق والازهار	مغليا مضاد للتشنج، طارد للغازات، يدر الطمث والبول
الجلود	مستحلبه يدر الصفراء ويقيد احتقان الكبد والري والسعال
الاوراق	مغليا منفض، يفيد السعال، خافض للحرارة ويذر الطمث
الاوراق	مغليا يفيد الامراض العصبية والاستسقاء ويذر البول وينيب الحامض البولي
الاوراق والازهار	مغليا يفيد للنص والسعال الديكي، مضاد للتشنج
الثمار	عصيرها يدر البول، مرطب، ملين
الاوراق والجلودور	عصير الاوراق يحرق الشعر. الجلودور مفتة ومقيئة، استعمالها خطر
عصارة الساق	استعمالها خارجي ولا يجوز الا بمعرفة الطبيب
الجلودور	مغليا يفيد الرشوحات والامراض الجلدية
الثمار	زيتها يفيد المالك البولية والسيان والتهاب الحجرة والتزلات الشمية
الجلودور	مغليا يفيد الكساح، مقو، هاضم، يدر الحيض والصفراء. يفتت الحصاة الفوسفاتية
النباتات كما هو	مغليا يزيل السمعة وتضخم الغدة الدرقية ويفيد تصلب الشرايين
الازهار	مغليا يدر البول. يفيد الرشح والساالك البولية، يذيب الرمل
الحبيب	مستحضراتها عديدة توصف بأمر الطبيب
الاوراق	القليل من مغليا يقوي الدماغ. استعمالها خطر
الجلودور	مغليا مقو
الاوراق والحاء	خلاصتها السائلة تاعوظ مشهور. مضادة للسفلس وعشقة الفطخ
الثمار	عصارتها او مغليا سهل حثيف يستعمل في الاستسقاء والشلل واحتقان الملح
العشبة الزهرة برنتها	مستحليها ينقي الدم ويعتد الشباب. بلودها مثرة للرغبة الجنسية
الفروع والاوراق والازهار	عصيرها مضاد للحرق، يفيد الطل العصبي وداء الخنازير. منبت ويذر اللعاب
البزور	مغليا سهل ويفيد المال العصبي
للحاء	مسحوقها يبيد الاحصاب وينشطها، يقوي القلب، مضاد للتشنج
الازهار	صيتها ومغليا منفضة، محرقة، منفضة، طاردة للغازات
الجلودور	نقيها مقو نشيط ويفيد للدة
الازهار	نقيها يفيد للدة، طارد للريح، مطح

البيات	الوصف
قام آسي	جنية معمرة فرعاء فتاه. اورالها آسيه جامدة. ازهارها وردية. ثمارها عتيبة مأكولة
قنب	عشبة حولية. اورالها كفتية مركبة وثرية. ازهارها ثنائية للسكن. يزورها مكورة
قنة مهجونة	عشبة معمرة. اورالها مركبة قلبية الوريقات. ازهارها ثنائية
قتليل جدول	شجرة كبيرة لارضة. اورالها مركبة وثرية. ازهارها عتقونية. ثمارها كستنية الشكل والقد
قنصور شائع	جنية معمرة. اورالها مركبة وثرية. ازهارها برفالية اللون. ثمارها سنبلية
قنطريون صغير	عشبة معمرة فرعاء. اورالها رحيمة صغيرة. ازهارها وردية اللون
قوسه عذرية	عشبة معمرة زياه فرعاء. اورالها صغيرة عملية النصال كالفورية العرف. ازهارها عطرية بنفسجية
قيصوم، رمان الارض	جنية لينة فرعاء. اورالها بسيطة عطلية. ازهارها ذهبية اللون. ثمارها لينة كحب الآس
كافور	شجرة كبيرة دائمة. اورالها اهليلجية جامدة. ثمارها زيتونية نوية
كثان شائع	عشبة حولية صناعية. اورالها سنبلية. ازهارها زرقاء اللون. ثمارها جراه. يزورها زنبية
كراويا	عشبة عملة. اورالها ريشية مفلوكة. ازهارها صغيرة بيضاء. يزورها زنبية
كرفس	عشبة حولية ضخمة الجفت. اورالها قرصية الانتشاب مركبة. ازهارها بيضاء ممتحة بالاحضر
كرفس الماء	عشبة معمرة غليظة الجذر. اورالها مركبة وثرية. ازهارها بيضاء. ثمارها ككامير. يزورها دقيقة
كركم صباغي	عشبة صفولية معمرة. اورالها سنبلية مستطيلة. ازهارها سنبلية صفراء اللون
كروتن الثريت	جنية فرعاء. اورالها رحيمة جامدة. ازهارها جميلة. ثمارها حبوب شبيهة بالخروج
كررة البر	عشبة جنسورية معمرة. زناد اورالها ثنائي الانتشاب راعي القروح الموسحة صغير الوريقات
كررة مزروعة	عشبة حولية فرعاء. اورالها مركبة مقرضة مشترية. ازهارها وردية. ثمارها يزور دقيقة
كستة	شجرة ضخمة دائمة. اورالها ناشرة العروق منشارة الحافة. ثمارها مأكولة اللباب
كشمش أحمر	جنية فرعاء فتاه. اورالها عطية مفلقة ومسننة. ازهارها موشحة بالاحمر. ثمارها مأكولة
كشمش اسود	جنية فرعاء فتاه. اورالها عطية مفصصة ومسننة. ازهارها حمراء. ثمارها مأكولة
كشوث السعز	نبات طفلي عيطي ملتف. اوراقه حرشفية دقيقة. ازهاره وردية
كالبه المروج	عشبة معمرة فرعاء. اورالها عطية مقرضة ناشرة العروق. ازهارها صفراء اللون
كشون	عشبة حولية فرعاء. اورالها مهلكة. ازهارها بيضاء. ثمارها ككامير. يزورها صغيرة
كنكلييه، عسم ربيع	شجرة صلبة فرعاء. اورالها مائسة النصال عاتقة الخضار. ازهارها وردية. ثمارها يزور
كنكينيا	شجرة فرعاء حمراء اللحاء. اورالها كبيرة النصال. ازهارها خنوية. ثمارها جراه يزورها دقيقة
كهنة	شجيرة متسلقة فرعاء. اورالها جامدة النصال. ازهارها وردية. ثمارها لحسية عافصة
كوشاد اصفر	جنية سرحة مستغلطة الجذور. اورالها كبيرة. ازهارها صفراء اللون
كوكا	جنية معمرة فرعاء. اورالها اهليلجية ناشرة العروق. ازهارها صفراء. ثمارها نوية حمراء
كولا، كوله	شجرة قارضة. اورالها ابيدة جامدة. ثمارها قرون مبطلعة تلتف من لوزتين الى عشر لوزات
كبس فراعسي	عشبة حولية. اورالها لاياسية. ازهارها زرقاء اللون. ثمارها خربيات. يزورها خردلية
لاييون ايض	عشبة معمرة فرعاء. اورالها سنبلية منشارة الحافة. ازهارها عطرية بيضاء اللون
لئين شالكة	جنية معمرة شالكة. اورالها سنبلية مسننة. ازهارها وردية
لسان الحمل السنائي	عشبة معمرة مقررة. اورالها قرصية جامدة النصال. ازهارها ثنائية
لسان الحمل الكبير	عشبة مسمرة مقررة. اورالها قرصية ملطية جامدة النصال. ازهارها صفراء اللون
لسان الكلب المخزني	بلعة معمرة فرعاء. اورالها سنبلية عملية النصال. ازهارها حمراء اللون
لوشيا ناعمة، حشيشة الجرح	عشبة مستطيلة الساق. اورالها مركبة وثرية. ازهارها صفراء. يزورها صغيرة
مازريون، دفنة سامة	جنية صغيرة معمرة فرعاء. اورالها جلدية النصال. ازهارها انوية عطرية. ثمارها حنية
مشان، دفنة لاحقة	جنية معمرة فرعاء. اورالها عروسة مستطيلة. ازهارها عطرية بيضاء. ثمارها حنية
مرآن شامخ	شجيرة باسقة فرعاء. اورالها وثرية. ازهارها بيضاء خضراء المواج. ثمارها جناحية
مشتركة فيرجينية	جنية معمرة فرعاء. اورالها يصفية مسننة الحافة. ازهارها صفراء اللون
مضاهض أسود	شجيرة فرعاء. اورالها اهليلجية مسننة الحافة. ازهارها مجنونة. يزورها صغيرة
مئل	جنية فرعاء شالكة. اورالها مركبة ثلاثية. ازهارها قردية. ثمارها جراه
مكناة عذرية، مناب الماعز	بلعة معمرة فرعاء. اورالها مركبة وثرية. ازهارها الى الثرقة
منتنة، فساء الكلب	عشبة حولية فرعاء. اورالها اهليلجية مزغبة. ازهارها بيضاء كحب الراحلة

الأجزاء الصالحة	للتأثير والاستعمال
الثمار	عصيرها يشفي الأمراض الجلدية الرطبة. مغليها يقطع الإسهال
البزور	مغليها يسكن تشنجات الأطفال ويفيد الربو والسعال
عصارة الساق	عَرَضَة، مَطْوَرة، مَنِيَّة، مضادة للتشنج، منقعة وتدرّ الطمث
تشور الثمار	مغليها مضاد لتجلط الدم، يفيد في معالجة الدوالي والبروسير واحتقان الكبد
البزور	مغليها ملين أو مسهل
العشب باستثناء الجذور	تقيها أو مسحوقها يفيد ضعف المعدة وينشط الشهية ويفيد فقر الدم
الأوراق	مسحوقها يفرّي الأعصاب ويكالفح الغم عند النساء. يفيد السعال الناشئ والتزيف الرحمي
الأزهار والثمار	مغليها مقو، منبه، مضاد للحمّيات، يزيل الطغيع الحمر من الجلد
زيت الكافور	جاف ومضاد للتشنج
البزور	اللبنة الساخنة تسكن آلام المعدة ويفيد التهاب اللدند التكفيّة وللمفاوية
البزور	مسحوقها مقو، هاضم، يفتح الشهية، يدرّ الحالب، ينشط العصائر المعدية
الجفت والأوراق	تنفث الصدر وتحلّل الورم وتدفع الحصى وتفتح الشهية
الجذر والأوراق والبزور	الجذر والأوراق مضادة للحرق وتدرّ البول. البزور مهيجة للقوة الجنسية
المساقل	تقيها ومغليها منمش ويدرّ البول
المهرب	مسحوقها منقطع، مسهل شديد الريح. تستعمل بمعرفة الطبيب
العشب برئتها	مغليها مضاد للسعال
البزور	مسحوقها ومغليها عَرَض، هاضم، يفيد القلب والاضطع الحوي
الأوراق	مغليها مضاد للسعال التيكبي
الثمار	عصيرها يدرّ البول ويفيد من الملل المعصية والتقرس والشرور
الثمار والأوراق	عصيرها مرطب، هاضم، يفتح الشهية. مغلي الأوراق يفيد في التهاب المفاصل
النبات برئته	منليه يقضي على التقبض للصحى ويدرّ الصفراء
الأوراق	مغليها شاق ويوتر اغشية الكارة. يفيد الاقرازمات للهيلية وينظم الحيش
البزور	مسحوقها ناعظ اذا مزج مع الفلفل والمسل. منبه للاعماه، طارد للغازات
الأوراق	تقيها يذيب الحصى الصفراوية ويفيد في بعض الحيات
التشور	مسحوقها مقو، دافع للحمّيات
الأوراق والثمار	عصارتها مقوية
الجذور	عصيرها مثير للشهية، منمش، مقو، يحفض الحيات
الأوراق	تقيها ومغليها مقو، مضاد للابواع المعصية
الثلوزة	مأكولة منبهة مقوية، منشطة، تدرّ البول
العشب برئتها	مستحلب الأوراق والأزهار يفيد الاساك الزمن، مرقق، مضاد للسعال ويدرّ البول
الأزهار	مسحوقها ينظم الحيش ويمنع اضطرابه ويمنع السيلاان الأبيض
النبات برئتها	تقيها يفيد الأمراض الكلوية والعلل المعصية ويدرّ البول
الأوراق والأزهار	عصيرها دافع للحصى ومضاد لتجلط الدم والإسهال
العشب قبل التبدير	عصيرها دافع للحصى ومضاد لتجلط الدم والإسهال
الجذور	مغليها بخدر، مسكن، مضاد لبعث الدم وللإسهال
الأوراق والأزهار	مهورسها يطهر الجرح ويلمه ويقضي على الالتهاب
للحاء	تقيها او مغليها منقطع، مرقق، مهيج، يدرّ البول. الاستعمال عطر يوجب الحذر
للحاء	منقعة كآوبة
الأوراق وللحاء	للحاء دافعة للحمّيات. الأوراق ملينة، مرققة، مقوية، تدرّ البول
الأوراق وللحاء	مسحوقها ومغليها قابض، مضاد للتزيف. يفيد الملل الشرايكة والاحتقانات
للحاء	مسحوقها مسهل، يفرز الصفراء. يقيد الكبد والمرارة
عصارة الساق	منقعة، مقوية، مضادة للتشنج
الأزهار	تقيها يدرّ الحليب ويفيد السلس. خللاضتها او مغليها علاج للسكري
الأوراق والأزهار	تقيها ومغليها مضاد للتشنج ويدرّ الطمث

الاجزاء الصالحة	المنافع والاستعمال
الاوراق والازهار الثمار والجذور	مغليا يسكن الآلام العصبية والصداع ، ويقوّي القلب ، يدرّ البول . مضادّ للتشنج مسحوقها طاسث ، يهضم ، يقضي على الروماتيزم مسحوقها او نقيها او مغليا مضادّ للتشنج والصرع العصبي ودافع للحصى ويسكن وطارد للديدان
الحساء	مسحوقها ومغليا ملين وسهل
الثمار	عصيرها سهل
الجذور	مغلي مرطب ، يدرّ البول ، يفيد في الروماتيزم العضلي وداء الثفرس والتهاب المثانة
لبّ الثمار	منهش نشيط يقوّي مناعة الجسم . مسحوق الثبلات الجفّة يفيد التسلّحات
الاوراق	مغليا منهش عام . يفيد للعدّة . يسكن التشنجات ، يدرّ الصفراء
العشب برصّتها	مغليا يفيد التهاب الكلى ويدرّ البول
العشب برصّتها	مغليا مسكن للسعال الديكي ، مفيد لأمراض الصدرية اخضها سحقاً
الجذور والبزور	بزور مقوية ، هاضمة . ادهان البزور والجذور منقّية للقلب وقوّية الجنسية
الثبات برصّته	مغلي مخفّف للضغط الشرياني ، مضاد للتشنج ، يفيد الصرع واضطرابات الحصى
الثمار	مسحوقه ومنهش يفيد للسالك الشراية والبراسير والتزريف
الجذور	الناضجة ملينة . طبخة مسهلة ، طاردة للودود
	مغلي مقوٍّ ، يفيد انحطاط الاعضاء التناسلية ، يدرّ البول . يفيد سيلان الرحمي والحصى والاحتلام
الاوراق والجذور	مستحبها مقوٍّ ، ينقي الجسم ، يفيد الكبد ، يدرّ البول
الاوراق والجذور	عصيرها يفيد احتقان الكبد ويقضي على البراسير وينقي الجلد من الدمل
الجذر	عصيرها منهش قتال يفيد للعدّة ويدرّ البول . مضاد لداء الخفر
الاوراق والازهر	مغليا قابض مضاد للاسهال
الازهار	نقيج ازهارها الغضة يدرّ البول . ينهب الحصى الكلوية . يفيد للزلال والورم
الحساء	مسحوقها منقّظ . ويدرّ الحصى . ويكافح العدّة

نوع النبات	الاعضاء الجعالية	نوع النبات	الاعضاء الجعالية
جلسان	الاوراق والازهار	دفعه سامة ، مازورين	جميع الاعضاء
سربل	الاوراق والازهار	دليوث	الساق والاوراق والازهار
حشيشة الفقراء	جميع الاعضاء	دند	البزور والكعب
حشيشة القمل	جميع الاعضاء	دققة ، زوان مسكر	الحب
حليوب	الاوراق والازهار	دمجيثال ، زهر الكشتاتين	جميع الاعضاء
حمض النّم	الاوراق تؤذي الدواب	ذره صفراء	الازهار الاكبرية
حنظل	جميع الاعضاء اخضها الثّار	رازاياته	المجور والاوراق
حيدّان	جميع الاعضاء وتقتلها به	رشاخ	البزور
	التجفيف	رأس المنافع	المذاخير
حمّ العالم ، حيون	جميع الاعضاء	زراونه غلياني	الاوراق والثّار
خرشق	جميع الاعضاء	زئبق الوادي ، ذقّة	جميع الاعضاء
خرشق	جميع الاعضاء	سذاب	الاوراق والازهار
غرود حقل ، لسان	الاوراق به الازهار	سريره ، حمام	عصارة السوق
مخرم الحنطة	البزور	سقمونيا	عصارة السوق
مخروج	البزور والكعب	سكك ، بخود مرم ، عرطنيا	المساق
عشقاتش منوم	جميع الاعضاء اخضها الكعاب	سماق جمالي	الاوراق
غناز بريّة	جميع الاعضاء	ستليل ، سم السمك	لباب عجائه
عوشان ، قرقد	جميع الاعضاء	سورجان	جميع الاعضاء
داتورو	جميع الاعضاء	سون اصفر	جميع الاعضاء
داذي ، هيطاريقين	جميع الاعضاء	سون المنافع ، برييت	جميع الاعضاء
دقل ، حبن	جميع الاعضاء	شاي المروج ، قصيص	الاوراق والازهار

٢٨٤٢٧ - نباتات دهنية ، نباتات زيتية
Plantes oléagineuses (F). Oleaginous plants (E).
هي النباتات الممكن استعمال ثمارها او بنورها لاستخراج
الدهن او الزيت .

٢٨٤٢٨ - نباتات سكرية
Plantes saccharifères (F). Sacchariferous plants (E).
هي النباتات التي يستخرج منها السكر ، اشهرها قصب
السكر والشوندر .

٢٨٤٢٩ - نباتات صبغية
Plantes tinctoriales (F). Tinctorial plants (E).
هي النباتات التي يستخرج منها مواد صبغية .

٢٨٤٣٠ - نباتات صناعية
Plantes industrielles (F). Industrial plants (E).
هي النباتات التي تزرع لاستعمالها الصناعي كالتبغ والقنب
والكتان الخ ...

٢٨٤٣١ - نباتات ضارة
Plantes nuisibles (F). Hurtful plants (E).
هي النباتات الطوعية او الدخيلة التي تكثر بين الزروع
وفي الميائل والحدائق فتستنزف خصب التربة وتسيء الى
النباتات المزروعة || النباتات الضارة كثيرة العدد تقتصر ،
في الجدول التالي ، على ذكر اضرها واشهرها :


اسم النبات	اسم النباتات
سراخس	انجيليا ام الف ورقة
سمادي	اروم ، لوف ميق
سعد مستدير ، صلب الفجر	اريدارون ، شيخ الربيع
سورتيان الغريف ، قاتل الكلب	اسل
شقار	اكوتيت حرمي ، بيش
شقيق ، همي الدجاج	اسنوخ
شر الكلب	انجبار ، انارف
شوك	تفان
شوكران	قوم بري
طحالب	ثيل
عراة	جفيل ، حامول ، سيج
عشبة القوي	حردل
عرج ، علق	حشيشة القمل
غيطل	جليوب
فريون ، عنجد ، يتوع	حمض
قرطب	حمض المنافع
قصون	سوزان
قطريون	عرمطك فتوا
كرسة	عرم
كرنس بطني	خان
كشوت	دنفة
لسان ، عرول بري	دوسة الحار ، فرافة
لبلاب	دوسر
لنين	ديجيتال ، زهر الكشوتين
لسان الحمل	ذيل الثعلب
نجيل	رازيانة ، مشيل
هدال	ريخاخ
هيضان ، فجل الخيل	زوان مسكر

لوع النبات	الاعضاء الجعالية
شقار	جميع الاعضاء وتقدمها بعد التجفيف
شقيق ، همي الدجاج	جميع الاعضاء
شوكران	جميع الاعضاء
صريمة الجدي	الازهار والثمار
مقلاب سوري	مقلاب السوق
مقلوس ، ذرب	الاوراق
مننينة	عصارة السوق ولباب البزور
عائق	جميع الاعضاء اعصها البزور
مير	جميع الاعضاء
مرمر فيرجيليه	الاوراق
مروق الصباغين	جميع الاعضاء
مشقة	الثمار
مصل	الاوراق والازهار
عنب الثعلب ، فناء	جميع الاعضاء
مفرو	جميع الاعضاء
فاشرا	الجذور والنبوي والثمار
فاشرشين	الثمار
فريون ، عنجد ، يتوع	الاوراق والازهار والثمار
قناه بري	جميع الاعضاء اعصها لباب التمر
قرطب الزروع	البزور
قنة مقلولة ، كلف	الاوراق حتى الازهار
كرز غاري	الاوراق
كريدان ، مشان	جميع الاعضاء
كلاجة	اللحاء والتجيب
لين المروج ، زغيلة	جميع الاعضاء
لذاح ، يروح	جميع الاعضاء
لكية مشارية الاسدية	الاوراق تؤذي النواب
لويليه	عصارة السوق
لينتاويه ، حياجب	جميع الاعضاء
مايتا صفراء	الاوراق والازهار
مذي	عصارة السوق
مضاض	اللحاء والاوراق والثمار
ممزون	جميع الاعضاء
ملعى سامة	الاوراق بعد اكتمال نموها
لبق	الاوراق والثمار
هدال	الثمار
هورة	عصارة الساق والبزور
هيضان	الاوراق بعد ازهار النباتات
ينبوت تن	جميع الاعضاء


٢٨٤٢٤ - نباتات حولية
Plantes annuelles (F). Annual plants (E).
هي النباتات العشبية التي تعيش سنة او دون السنة .

٢٨٤٢٥ - نباتات عكلية
Thallophytes
صف نباتات نظرية الجرم خالية من الجذور والسوق والاوراق والازهار . اغلب مشريات .

٢٨٤٢٦ - نباتات دنيا
Végétaux inférieurs (F). Inferior plants (E).
هي النباتات السيدة الخلية .



مخطط تسلسل أنساب المملكة النابتية



٢٨٤٣٢ - نباتات طوعية

Plantes spontanées, Végétation spontanée (F).

Spontaneous plants (E).

هي النباتات التي تعيش وتكثر من تلقاء ذاتها .

٢٨٤٣٣ - نباتات عطرية ، رياحين

Plantes aromatiques (F). Aromatic plants (E).

هي التي يستخرج منها البطر .

٢٨٤٣٤ - نباتات علفية ، نباتات الكلاء

Plantes fourragères (F). Fodder plants (E).

هي التي تستعمل كعلف للحيوان .

٢٨٤٣٥ - نباتات علب ،

Végétaux supérieurs (F). Upper plants (E).

هي النباتات العديدة الخلايا الكاملة التركيب، فيها الجذور والسوق والاوراق والازهار .

٢٨٤٣٦ - نباتات لحمية

Thick-leaved plants, Succulent plants (E).

هي نباتات تحية الاوراق المكثفة بالماء .

٢٨٤٣٧ - نباتات معنولة

Plantes bisannuelles (F). Biennial plants (E).

هي التي تعيش نحو عامين .

٢٨٤٣٨ - نباتات مصلحة

Plantes améliorantes (F). Ameliorating-plants (E).

هي النباتات التي تفيد التربة وتصلحها ، اشهرها الباقية والترمس .

٢٨٤٣٩ - نباتات معزوفة

Plantes scarifiées (F). Weeding-plants (E).

هي النباتات التي تستوجب الزق .

٢٨٤٤٠ - نباتات معمرة

Plantes vivaces, P. pérennes (F). Perennial-plants (E).

هي النباتات التي تعيش أكثر من سنتين .

٢٨٤٤١ - نباتات مفترسة

Plantes carnivores (F). Carnivorous plants (E).

نباتات مختلفة الفصائل والاجناس يصمها قاص مشترك واحد انفراس الحشرات || الانفراس يتم بواسطة الاوراق التي تشبه كل حشرة تقرب منها ، اغصانها للذباب والبعوض والحمام || اشهر هذه النباتات المذكورة في موطنها ، هي :

Cépalote (F).

الاجنية

Sarracénie (F).

البوقية

Grassetto (F).

حشيفة الدهن

Dionée (F).

خائق الذباب

Népente (F).

القلص

Drosophylla (F).

السلوس

Drosère (F).

النيدمان

٢٨٤٤٢ - نباتات منهكة

Plantes épuisantes (F). Trying-plants (E).

هي النباتات التي تستنزف خواص التربة .

٢٨٤٤٣ - نباتات نسيجية

Textile-plants (E).

هي النباتات الصناعية للنسيجية ، اشهرها القطن والكتان .

٢٨٤٤٤ - نباتات وعائية

Plantes vasculaires (F). Vascular-plants (E).

هي النباتات التي يشمل نسيجها اوعية يجري فيها النسج .

٢٨٤٤٥ - نباتة

Plante (F). Plant (E).

هي النباتة واحدة النبات .

٢٨٤٤٦ - نباتي

Végétal (F). Vegetable (E).

نمت تعريف يطلق على كل ما له علاقة مباشرة بالنبات .

٢٨٤٤٧ - ثباح

Abollement (F). Barking (E).

هو صوت الكلب . وانبع الكلب واستنبح حله على الثباح .

قال الشاعر :

قوم اذا استنبح الاضراب كلهم

قالوا لأهم بولي هل النار

تصلك البيل بئلا أو تجود به

ويا تبول لم إلا بمقدار

٢٨٤٤٨ - ثباح

Guib

هو الجرح ، نوع من الجبل ، اطلبه .

٢٨٤٤٩ - ثباح *

Seslaire (F). Wentletrap (E).

جنس حيوانات بحرية مفترسة من الرضويات المندبات الاصيل . انواعه المرفوعة نحو ١٥٠ صنفها بيض صفار ، هياكلها غروية الشكل ، حلزونية ، نافذة التصديد المستطيل . يكثر وجودها في بحار البلاد الحارة .

٢٨٤٥٠ - ثباح *

Albugo, Cystopus (S).

Cystope (F).

جنس فطور مجهرية من عارة الثغيات وفصيلة الصنانيات . انواعه الخفية قليلة اشهرها الثباح الابيض الذي يذى الثبع والصليبات .

٢٨٤٥١ - ثباح الدبج الأبيض *

Albugo tragopogonis, Cystopus tragopogonis (S).

Rouille blanche des scoronères, Cystope blanc des scoronères (F). White rust of salsify (E). Weibler

rost der schwarzwurzel (D).

وصم يصيب الدبج وغيره من نباتات فصيلة المركبات . سببه فطر مجهرى من الثغيات ركب نسج الاوراق في طورها التثوي فيزول عملها التلافي والحياتي بما يسي الى نمو النبات واثابه || مظهره الخارجي يشور بيض

لا يباينة الترتيب والحجم تملو نصل الاوراق تقشورها وتمتعا من القيام بعملها الجسودى على الوجه الاكل . يكالغ باستعمال احد مركبات النحاس .

٢٨٤٥٢ - ثباح الصليبيات الأبيض *

Albugo candida, Cystopus candidus (S). Rouille

blanche des crucifères, Cystope blanc des crucifères (F). White blister of crucifers (E). Weibler Rost der

Krauszblütler (D).

وصم يصيب بعض نباتات الفصيلة الصليبية اغصانها التركيب واللفت والملفوف والتفاح والرشاد || سببه فطر التثوي . مظهره الخارجي يشور بيض تملو نسج السوق والاوراق والازهار والتفاح تقشورها وتمتعا || يكالغ ككثير الصنانيات باستعمال مركبات النحاس .

٢٨٤٥٣ - ثباح *

Epimedium (S). Epimède (F).

جنس نباتات عشبية جلدومية من فصيلة البرباريسيات .



ثباح



ثباح الدبج الابيض



ثباح الصليبيات الابيض



ثباحة

Remugle (F). ٢٨٤٦٣ - نبتة
Mustiness, Musty smell (E).
النبتة : الرائحة الكريهة التي تكتسبها الاشياء المخزونة في
اماكن لا تصلح .

Plante (F). Plant (E). ٢٨٤٦٤ - نبتة
واحدة النبات تطلق على المشبة والفرسة .

Nemopteridae (S). ٢٨٤٦٥ - نبتوريات
Nemopteridae (F). Nemopteridae (E).
فصيلة حشرات من رتبة شارقاوات الاجنحة . اجناسها
وانواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض اقطار البلاد
الحارة والمعتدلة الحرارة من العالم القديم || اجسامها صغيرة
مستطيلة الاعتدال . رؤوسها محرسة . عينها صغيرة ،
فاخرة . قرونها الاستشعارية غليظة ، قصيرة . ملاسها
الفكية مستطيلة ، منجلية الشكل . بطونها مستعرضة
محتلة التبطيط . اجنتها لاشاوية ، الزوج الامامي
صغير اللد ، الزوج الخلفي مستطيل ، مجذلي الشكل ،
يسطه تراوح من ٣٢ الى ٥٢ سم . تألف البراري والادغال .
يرقاتها مفترسة ، سريعة الحركة والانتفاخ في التربة ||
اشهر اجناسها النبتور .

٢٨٤٦٦ - نبتوس الزهبي
حشرة تدعى هبون المساحف . اطلسها .

Neptune (F). Neptune (E). ٢٨٤٦٧ - نبتون
كوكب سيار يقع النظام الشمسي . اكتشف عام ١٨٤٦ .
قطر دائرته يعادل ضعف قطر الارض وحمته يبلغ ١٦
مرة حجمها اما وزنه النسبي فثلاث مرات اقل من وزن
الارض . دورته حول الشمس تستمر نحو ١٦٤ سنة
٢٨٥٠ يوماً . سرعة انطلاقه في الفضاء نحو ١٩٥٤٨
كيلومتر بالساعة . يدور في فلكه قران : تريتون ونيريد .

Curage, Curement (F). ٢٨٤٦٨ - نبت
Cleansing, Water-pepper (E).
هو تنظيف المجاري والاقنية والانابيب ...

Platyodon (S). Platycondone (F). ٢٨٤٦٩ - نبتج
جلس نباتات عشية حولية برية وريضية من فصيلة
الجرسيات . انواعها المعروفة خمسة ، بعضها جامدة منتصبة
تعلو من ٣٥ الى ١٠٠ سم . اوراقها متقابلية او غمية ،
تصلها يبيض الشكل ، جامد الصلابة ، مسنن الحافة .
ازهارها فردية التنجيم ، اطية وطرفية الارتكاز ، عديدة
الالوان يكثر فيها الازرق والابيض || ازهارها يستمر
من تموز الى تشرين .

Haut perchis (F). ٢٨٤٧٠ - نبتجة
هي الاجة المستطيلة النبت العالمي ج نتاج .

Clavelés, Variole ovine (F). ٢٨٤٧١ - نبتج
Sheep-pox (E).
النبتج او جدري الضأن مرض معد يصيب الغنم .

Advection (F). Advection (E). ٢٨٤٧٢ - نبتد
النبتد حركة الريح الاقنية الانتشار .

انواعها وضروبها البرية والبرية عديدة . جذاميرها
مدادة ممررة . سطحها منتصبة حولية . اوراقها مركبة .
وريقاتها مسننة الحافة || اشهر انواعها ما يتبع .

Epimedium sinense (S). ٢٨٤٥٤ - نبتالة الصين
Epimède de Chine (F).
نوع من النبتاق الزرني . ساقها مورقة تعلو من ٣٥ الى
٤٥ سم . ازهارها عنقودي لبد التجميع . ازهارها صغيرة
القد يبيض اللون . تنورها يستمر من نيسان الى ايار .

Epimedium alpinum (S). ٢٨٤٥٥ - نبتالة جبليكية
Epimède alpin, Chapeau d'évêque (F).
نوع من النبتاق الزرني . ساقها مورقة تعلو من ١٥ الى
٣٥ سم . وريقاتها يريضية الشكل تعلو من ٤ الى ٦ سم .
وتعرض من ٢ الى ٤ سم . ازهارها عنقودي التجميع ،
هامي الارتكاز . ازهارها صغيرة اللد ، صفر البتلات ،
حر الفصل . تنورها يستمر من اذار الى ايار .

٢٨٤٥٦ - نبتالة ريشية الورق
Epimedium pinnatum (S). Epimède à feuilles pen-
nées (F).
نوع من النبتاق الزرني . ساقها عريضة تعلو من ٣٥
الى ٦٥ سم . اوراقها جبليكية الانتشاب ، ريشية الشكل ،
مستطيلة الاسنان الشائكة . ازهارها عنقودي ، رمل التجميع .
ازهارها صغيرة اللد صفراء اللون . تنورها يستمر من
نيسان الى ايار .

٢٨٤٥٧ - نبتالة كبيرة الزهر
Epimedium macranthum (S). Epimède à grandes
fleurs (F).
نوع من النبتاق الزرني . ساقها مورقة تعلو من ٢٥ الى
٥٥ سم . وريقاتها دوقية الشكل مستطيلة الزناد . تصلها
جلولي الصلابة ، ذلق الزام الاخير . ازهارها كبيرة
القد ، عديدة الالوان التي تختلف باختلاف الضرب ، منها
الابيض والاصفر والاحمر والبني . تنورها يستمر
من نيسان الى حزيران .

Enazon ٢٨٤٥٨ - نبتاكة
عائض يصيب اوراق النبات فيحجبها ويشوه نصلها
بتريدات وثنية تعلو الاضلاع والروق .

Toxotes (S). ٢٨٤٥٩ - نبتالة
Toxote, Archer (F). Archer, Dartar (E).
جنس اسماك بحرية من شائكات الزعانف وفصيلة السمكيات .
انواعها المعروفة ثلاثة موطنها المحيط الهندي والبحر الاحمر
والخليج || يدعونها نبتالة لانها تقلد الحشرات والطيوم
الحائمة فوق سطح الماء بنقله ماء من فيها يجمل الطريقة
تقلد توازيها وتسط في الماء تبتلعها النبتالة .

Végétal (F). ٢٨٤٦٠ - نبت
هو النبات ، اطلسها .

Sous-bois (F). ٢٨٤٦١ - نبت الحراج
Underwood (E).
كل نبات عشبي او بجلي او جنبي يعيش في ظل الاشجار
الحرجية .

٢٨٤٦٢ - نبتت
يقال لبث الشجر اذا غرسه ورياه . ونبت المحبوب اذا
بلدها للاستنبات .



نير الأبل

٢٨٤٧٩ - نير باسوري *
Gastrophilus haemorrhoidalis (S). *Cestre hémorroidal* (F).

نوع من النير، ذبابته تطول نحو ١٠ سم. ثوبها إلى السرة السوداء. صدرها إلى الكفة الصفراء غط متعرض أسود. بطنها أبيض المقدم، أسود الوسط، أشهب المؤخر. رواشها شفافة عادمة التشيع. ريقاتها حمراء اللون طولها يراوح من ١٣ إلى ١٦ سم. تمر بالمعدة وتقيم فيها بعض الوقت ويتهين بها اللطاف إلى السرم حيث تعلق بعض الوقت تقسب الحكاك وزحف الدم || تركب الفلارب على اختلاطها وانحاضها الخيل.

٢٨٤٨٠ - نيريات ، شعريات *
Cestridae (S). *Cestridae, Bot-flies* (E).

فصيلة حشرات من ذوات الجناحين . أجناسها وأنواعها كثيرة العدد جميعها متوسطة الحجم ، هليئة الجسم ، أثوابها إلى المعطي للزركش بالاسمر والأسود . عضلاتها قريب الشبه من عظم النمل . أشرتها فباسة لكنها خالية من جهاز الوخز والرز . ريقاتها طفولية . بعضها يتطفل على الدوابن وانحاضها المختبرات .

٢٨٤٨١ - نيرية *
Nebria (S).

نيرية (F). *Nébrie* (F). *Nébrie* (E).
جلس حشرات نافمة مقترنة من فصيلة النيريدات. أنواعها عديدة جميعها صغيرة القد ، طولها يراوح من ١٠ إلى ٢٠ م. ألوانها زاهية، انحدارها حشوية الملوغ . تعيش على الحياض البحرية تحت الحجاراة والانقاض والاشخاب . أشهر أنواعها :

Eurynebria complanata (S). نيرية الرمال
Nébrie des sables (F).
Nebria brevicollis (S). نيرية قصيرة العنق
Nébrie à cou court (F).

٢٨٤٨٢ - نيرية قصيرة العنق *

Nebria brevicollis (S). *Nébrie à cou court* (F).
Nebria brevicollis (E).

حشرة قانصة من فصيلة النيريدات ورتبة مضفات الاجنحة . تألفت الاراضي المزودة والبساتين والغابات . قوتها ما تيسر لها من الحشرات والديدان والحوام || جسمها متوسط القد بطول من ١٢ إلى ١٤ سم . ثوبها إلى السوداء الخديدي اللامع . رأسها مستعرض الجسم ، قصيرة العنق . فككها عظيمان . زباناها عظيمان . عينها صغيرتان . ظهورها قليل الاحدياب ، مستدير الطرف اللامع ، ثمانية التحزيز القدي النظامي الخطوط . ارساها خابية المقل || الاثني اصفر قدماً من الذكر وابنت ثوباً منه واقرع زبانا || لها جيل واحد في الحول . تنظر الحشرة الجسلانة في اواسط الربيع وتعيش حتى اواخر الخريف . تسرح في التبار . تساند في آب . تمتع الممكن تحت الحجاراة والابل البرقة عند بلوغها الكمال الجسمودي . طولها من ١٨ إلى ٢٠ م . جسمها اسطواني الشكل ، سداسي الاربواب ، احمر اللون ، اسود الرأس والشرج والاربواب || طور الاكمال الذي يستمر من ٥٠ إلى ٩٠ يوماً ينقضي في بيث صودي الفود تحتفزه البرقة على عمق ٥ أو ٦ سم .

٢٨٤٨٣ - نيريدات *
Nebriidae (S). *Nébridae* (F). *Nébridae* (E).
فصيلة حشرات نافمة مقترنة من رتبة عملية الاجنحة .

Centrifugation

٢٨٤٧٣ - تيد

هو الانياز ، اطباء .

Cestrus (S).

٢٨٤٧٤ - نير ، شعركة

Cestra (F). *Botfly, Gadfly* (E).
جلس حشرات من فصيلة النيريات . انزاعه قليلة العدد جميعها غليظة الشكل ، هليئة الجسم ، صفيرة الخلف ، دقيقة الذيل القصير ، مزركشة الثوب ، شفافة الجناح . انثاها تلتئ الممكن دون ان تمتص لانها عادمة المرازات النخزة || اضرارها يحصل من ريقاتها التي تدعى نفقا والتي تعيش في معدة الحيوان وتحت جلده . ج نبار وأنبار .

٢٨٤٧٥ - نير الأبل * ، شعركة النير

Cephalomyia maculata (S). *Céphalomylie du chameau* (F). *Botfly of the camel* (E).
نوع من النير . ركب الأبل والجمال . ذبابته تطول من ١٠ إلى ١٢ سم . ثوبها إلى الخفي يملو تجذيع اصفر . تهرق مكنها بين الوبر على ظهورها وياطل الأبل يفتنف من ريقات خيطية هليئة تنقلها الأبل بالنسبا من جلودها إلى حلوها فيطونها حيث تلسل وترقي حتى الفسح الجلدية تنفث الجله مع انهاء طورها البرقي وتستط على الارض وتصل إلى كزود ثم إلى حشرة تيد سيرتها الاولى .

٢٨٤٧٦ - نير البقر

Hypoderma bovis (S).
هو لقاعة البقر ، اطباء .

٢٨٤٧٧ - نير الضان * ، شعركة الضان

Cestrus ovis (S). *Cestra du mouton* (F). *Botfly of the sheep* (E).

نوع من النير يقضي القم ويهزها . ذبابته تطول ١٠ سم . ثوبها إلى الكفة الصفراء الملوغ . صدرها اسود النقيض ، بطنها اسود التيقج . رواشها شفافة يملو عند قواعدها ثلاث نقط سود . تظهر من ايار إلى ايلول . انثاها تفسر الممكن بين الحب الذي يحف بالأنف يفتنف عند وضعه أو يده بضع ساعات عن ريقات دقيقة تسمى إلى داخل الأنف فتصل في مجاريه وتجاوبه وتبقى حتى اكمال طورها البرقي الذي يدوم من ١٠ إلى ١١ شهراً . والبرقة عند نهاية تطورها تطول من ٢ إلى ٣ سم . وتعرض نحو ١٠ م . ثوبها إلى البياض الاصفر يملو حيد اسمر . يتكاثم بطني جباه الضان بزيت السمك الذي يمنع اقتراب النير .

٢٨٤٧٨ - نير الفرس * ، شعركة الفرس

Cestrus equi, *Gastrophilus equi* (S). *Cestra du cheval* (F). *Botfly of the horse* (E).

نوع من النير ، ذبابته تطول من ١٣ إلى ١٤ إلى الاثني اكبر قدماً من الذكر . ثوبها إلى الصفار الاغبر تملو مزركشة سمراء . رواشها شفافة . يتوسطها تديش اطبل . تظهر في اواخر الصيف ثم تلي مكنها على اجسام الخيل والابل والحمير . مكنها اسطواني الشكل ابيض اللون دابق الطرف يلسق بالسر إلى ان يفتنف من ريقات وشية الشكل هليئة اخيد غبراء اللون ، هليئة ينش في الجله فيهيجها ما يدعو الدابة إلى لحسه تعلق البرقة بالسان الذي ينقلها إلى الحلق ومنه تسير إلى المعدة حيث تستقر بين طياتها المخاطية إلى ان تم انسلانها التي تدوم نحو عشرة اشهر فتخرج مع الروث وتصل إلى كزود صليبة الفلال جميعا من ٣٠ إلى ٤٠ يوماً ثم تنشق الصليبة عن الحشرة الكاملة فتطير وتعيد سيرة حياتها المذكورة .



نير باسوري



نيرية قصيرة العنق

Faulbaum, Puiverfaulbaum, Schwarzholtz (D). Frangola, Ontano nero, Alno nero, Frangolo (I).

نوع من النبق، شجرته صغيرة القند تملو من ٣ الى ٧ امتار . فروعه سرسة لونها الى الاسود الازرق المواج تملو ريشة ريداء . براعمه خمرية . اوراقه متعاقبة عابلة ، تصلها سبامي او تسامي المروق البارزة . ازهاره خاسية الاجزاء ، ابيلة الاذنكاز ، لا قياسية التجميع ، ثماره طيبة . خشبو خفيف الوزن يستخرج منه بعد التجميم نوع من البارود شائع الاستعمال . ازهاره يستمر من نيسان الى تموز .

٧٨٤٩٤ - **نَبَق الصَّبَاغِين * ، شَرَكَة الصَّبَاغِين**
Rhamnus tinctoria, R. utilis (S). Nerprun tinctorial, N. des teinturiers (F). Dyer's buckthorn (E). Immergrün (D). Ramno dei tintori (I).

نوع من النبق وهو جنبة شالكة تملو نحو ثلاثة امتار . فروعه زينية اللون ، اغانها جذوية . اوراقها تطول من ١٢ الى ١٤ سم . وتعرض من ٤ الى ٥ ، تصل الى الخفصار الاصفر المواج . عرورها بارزة ملتفة قليلة العدد . ازهارها خشوية خاسية الاجزاء . ثمارها عنابية اللون يستخرج منها صباغ اصفر || ازهاره يستمر من نيسان الى ايار .

٧٨٤٩٥ - **نَبَق المَسِيح**
Nabka (F). هو السدر ، اطليه .

٧٨٤٩٦ - **نَبَق جَرْدِي**
Rhamnus alpina (S). Nerprun alpin (F).

نوع من النبق وهو جنبة كبيرة تملو من ١٥٠ الى ٣٥٠ سم . ساقه عرياء ، فروعه سرسة منتصبة . براعم حوشية الخمار . اوراقه عابلة ، تصلها سنن الحافة عروية بارزة عددها يراوح من ٩ الى ١٢ زوجاً . ازهاره خاسية الاجزاء . ثماره صغيرة القند يقال انها طيبة || ازهاره يستمر من ايار الى حزيران .

٧٨٤٩٧ - **نَبَق كَلِفُولِيَّة**
Rhamnus californica (S). Nerprun de Californie (F). نوع من النبق ، شجرته صغيرة القند تملو من مترين الى خمسة امتار . ساقه كهباء . فروعه خلية اللباد شالكة . اوراقه ابيدة ، تصلها جانبد الصلصة ، سنن الحافة قسبي اللون ، يارز المروق . ازهاره خلية الاجزاء الخارجية . ازهاره يستمر من ايار الى تموز .

٧٨٤٩٨ - **نَبَق لُبْنَانِي**
Nerprun du Liban (F). هو الزفرين اللبناني ، اطليه .

٧٨٤٩٩ - **نَبَق مَرَدَاف**
Alatern (F). هو الزفرين الجردى ، اطليه .

٧٨٥٠٠ - **نَبَق مَكْدُون**
Rhamnus pumila (S). Nerprun nain (F).

نوع من النبق وهو جملة صغيرة مثقلة تعيش بين الصخور تملو نحو ٢٥ سم . ساقها وفروعه متعقبة سرسة . اوراقها تطول من ٣ الى ٦ سم . تصلها سنن الحافة يارز المروق التي يراوح عددها من ٥ الى ٧ ازواج . ازهارها خشوية خاسية الاجزاء . ازهارها يستمر من ايار الى آب .

٧٨٥٠١ - **نَبَق مُسَهِّل * ، شَرَكَة الدُّمَكْن**

Rhamnus cathartica (S). Nerprun purgatif, Bourguépine, Noirprun, Epine de cerf (F). Common buckthorn, Purging buckthorn (E). Echter Kreuzdorn, Purgidorn (D). Ramno purgativo, Prognolino, Spina servina (I).

نوع من النبق وهو شجرة شالكة ، ترطب في الارثبة الجصية ،

اجناسها وازواعها عديدة ، جميعها صغيرة القند او متوسطة . قرونها الاستعمارية ثمانية الفواصل . اناؤها مختلفة وكثيرة . تعيش على السواحل قرب الشطوط البحرية . اشهر اجناسها النَبَرِيَّة .

٧٨٤٨٤ - **نَبَرِيْس ***
Nebris (F).

سمكة بحرية وحيدة الجنس والذرع من شالكات الزعانيف وعضلة البهراريات . اعطائها بحار بعض المناطق الحارة . بكثرت ويوجدوا قرب شواطئ افريان || جسمها اهليجي الشكل مشدول الحميم والتطيل يطول نحو ٣٥ سم . ثوباها الى الشبهة الفضية يمتد في الرأس والظهر . تتميز برحابة شفها وبصر عيناها || لحمها جيد الصنف ، مرغوب فيه .

٧٨٤٨٥ - **نَبِيْس**
هو شجر ورقه كدروق السنور ارزن من الانبوس خشبه احر تمل منه خماسر الجنايب . وهو اصفر من شجر السنور واثد اجنابها (اللسان) .

٧٨٤٨٦ - **نَبِيْس**
Pouls (F). Pulse (E).

هو الصوت الذي يحدثه اندفاع الدم من القلب الى الشرايين .

٧٨٤٨٧ - **نَبِيْلَة**
Extrapolar (F).

استخلص من سلسلة معلومات او وقائع مفروضة معلومات او وقائع جديدة تسمح باطالة السلسلة .

٧٨٤٨٨ - **نَبِيْط**
نبت الير : استخرج ماسها .

٧٨٤٨٩ - **نَبِيْع**
النبيع : شجر تتخذ منه القسي ومن اغصانه السهام ينبت في قلة الجبل والنايات منه في السفح الشرياني وفي الخفيض الشوط . قال مرة : النبيع شجر اصفر البود رزينة ثقله الى اليد واذا تقادم اجر - الواحدة ثيمة . وفي الحديث ذكر النبيع ، قيل : وكان شجراً يطول ويصلو فدعا عليه النبي صل الله عليه وسلم فقال لا اطالع الله من عند ظم يطل به (اللسان) .

٧٨٤٩٠ - **نَبِيْع ، قَطْع**
Polliniser (F). To polliniste (E).

نبيع وفتح وافر : نقل غبار الطلع من متك زهرة الى مياسمها او مياسم غيرها من الازهار .

٧٨٤٩١ - **نَبِيْعَات**
Albugées, Cystopées (F). عبارة لطور مجهرية من فصيلة الصناليات ، تتميز بمشج خليوي يبي جهاز بمراشف حوصلية . تكاثرها خيطي ، خارجي ، مستقيم الانشعاب ، سبجي الرصيف البويي . اناؤها قليلة العدد يجمعها جنس واحد يدعى النباغ .

٧٨٤٩٢ - **نَبَقِي**
Rhamnus (S). Nerprun (F). جنس اشجار وجنابات حرجية من فصيلة النبقيات . اناؤها نحو ٦٠ منظرها شالكة الاغصان والافنان . اوراقها متعاقبة ، منتفجة ، بسيطة . ازهارها خشوية او ثنائية المسكن . ثمارها كروية خشوية صغيرة القند || اشهر اناؤها ما يتبع .

٧٨٤٩٣ - **نَبَقِي اَسْوَد * ، جَلْهَم ، عَوْسَج اَسْوَد**
Rhamnus frangula (S). Bourdaine, Bourguène, Aune noir, Bois à poudre, Bois de zhen (F). Alder buckthorn, Black alder, Glossy buckthorn (E). Gemeiner



نبريس



نبق اسود



نبق الصباغين



نبق مسهل

٢٨٥١١ - نيسب

صوت التيس في زمن السغد . يقال ب' التيس .

٢٨٥١٢ - نيسكة

Plantula (F). Small plant (E).

هي البتة الصغيرة لا تزال في طور التثواء البدائي .

٢٨٥١٣ - نيسكة

Curure (F).

Dirt, Muck, Sewage (E).

هي الاشباش والاسمال والبالء والاصاخ التي تشترج من البئر والحوض والقتاة عند تنظيفها .

٢٨٥١٤ - نيسكة

Monodonta (S).

Monodonta, Labio (F). Monodonta (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مميزات الارجل وفصيلة المدييات . انواعها المروقة عديدة منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة || اصداؤها شبه قمية الشكل ، صغيرة القد ، بجلة الالوان الزاوية المرقشة او المنقطة بالاسود والابيض . فوطها نصف دائرية الانفراج ، حمزة الخار الداخلي ، مجزة بنتو صغير شبيه بالنس او بالنب || اجسامها حلزونة . رؤوسها صغيرة ثنائية اللوايس الغروية المعوية . ارجلها مهدبة الحمار . اسفلها قرنية المادة .

٢٨٥١٥ - نيسكة

Dothidella (S).

جنس فطور مجهرية من البياضات وفصيلة الشويات . اصنافها مهمة لا قياسية ، تكاثرها مركزة على سلة الرخوة الجلية الجبل ، بعضها يضيئ الشكل شفاف || اعرف انواعه الثلاثة التالية .

٢٨٥١٦ - نيسكة الكشمش

Dothidella ribesia, Plowrightia ribesia (S).

فطر مجهرى يركب سوق الكشمش فيسلفها ويسبب بياها . مظهره الخارجي فضي مستطيل حنطة اللون تلو حاله الفروع قسب تنفدها وتشقيها ثم بياها . || يكافح بقطع وحرق الفروع المروية وينفخ الاشجار بمائل بوردو الحليل ١٪ .

٢٨٥١٧ - نيسكة المطاط

Dothidella ulei, Scolotrichum hevae, Fusidium macrosporum, Passalora hevae (S).

فطر مجهرى يصيب المطاط ليفي اتاجه بد ان يؤذي جميع اصنافه المطاطية || مظهره الخارجي يقع زينة يتبدل صغيرة ثم تكبر وتصب يباس التسج المطرب فيبد للتصل كالنربال . وقد يركب الازهار والثار فيؤذيها ويكتنف الاضخان فيلطفها يقع قرصية سود || اضراره تمتد الى نسبة عشب الاوراق والاضخان لانها تتركز في اتاج المطاط . يكثر في الاراضي الرطبة الواقعة في الاقاليم الحارة . يكافح بتعفيض الآفة وباستعمال احد الفطريات القمادة .

٢٨٥١٨ - نيسكة النفل

Dothidella trifolii, Sphaeria trifolii, Polytetrinidium trifolii (S).

فطر مجهرى يصيب اوراق النفل ، حل اختلات انواعه ، فيسلفها ويسبب بياها || مظهره الخارجي لكت سود مستدرة الشكل قطرها نحو ١ م . تركب النفل على مسكت السفلى . تظهر وتكثر في الربيع قبل حلول الصيف . اضراره تمتد الى نسبة عشب الاوراق .

تلو من مزين الى سمة اثمار . فروصها وانفاتها شاذكة الاطراف . اوراقها وانفاتها متقابلة . نصال اوراقها فضية الشكل مقطوعة طولاً من ٥ الى ٩ سم . وتعرض من ٢ الى ٦ ، مرقها باردة ملتفة . اثمارها خشوية ، خاسية الاجزاء . ثمارها طيبة تستعمل في عدة علاجات بطرية وفي سوداء اللين ، بنسجسية اللباب الحوضي || اضراره يمتد من ايار الى حزيران .

٢٨٥١٢ - نيسكة

Rhamnaceae (S).

Rhamnacées (F). Rhamnaceae (E).

فصيلة نباتية من لوات الفلتين كثيرة . القمامات اجناسها وانواعها زهاء ٤٥٠ اعطائها جبال وهضاب البلاد المعتدلة الحارة والحارة . اشهر اجناسها اللبق والصاب . نباتات هجرات وبنينات . اوراقها لا قياسية التشكيل ، منسبة البسيطة والمركبة . انواعها ابطية خشوية او ثنائية السكن . ثمارها لحية منها المأكولة وبعضها طبي وصناعي .

٢٨٥١٣ - نيسكة

Souche (F). Stump (E).

النيسكة هي الجرثومة كقولك نيسكة الشجرة اي جرثومتها . ج نياك ونيوك .

٢٨٥١٤ - نيسكة

Nebalia (S).

Nébalie (F). Nebalia (E).

جنس دوبيات بحرية من الفشريات العليا وبقيات الصف . انواعها قليلة المدة تعيش في المواقع التي تكثر فيها الرخول البحرية والاسمال || اجسامها صغيرة قرنية الشبه بالقرع . ميرتها مزنة . قوامها الصدرية متساوية القد ، ثنائية الحادف .

٢٨٥١٥ - نيسكة

Sagitta (S).

Flèche (F). Sagitta (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مميزات الارجل وفصيلة الرخويات . انواعها المروقة قليلة المدة . جميعها بية . اعطائها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحارة . اسرارها متوسطة المدة . تظهر على سطح الماء بعد غروب الشمس || اجسامها عريانة مستطيلة شبه وشمية الشكل ، هلامية المادة ، شفافة . الفواها غطسية مهدبة الحافة . زعانفها مستطيلة الشكل ، الذيلية منها مفلوكة .

٢٨٥١٦ - نيسكة

Népanthe (F).

نبات يعرف بالوس ، اطلبه .

٢٨٥١٧ - نيسكة

Flore (F). Flora (E).

جاء النباتات في قطر او بلاد . يقال نيسكة لبنان ونيسكة الشرق الادنى ، الخ .

٢٨٥١٨ - نيسكة مائية

Flore aqueique (F).

Aquatic flora (E).

النباتات التي تعيش في الماء او في الخلف .

٢٨٥١٩ - نيسكة

Végétatif (F). Vegetative (E).

نعت تربوي يدل على المقدور الانباتي .

٢٨٥٢٠ - نيسكة

Forjet, Forjeture (F).

Projection (E).

النور تنو غير عمودي يحصل في البناء . او تنو غير مستقيم يحصل في التنظيل .



نبلة



نيسكة



نيسكة الكشمش



نيسكة النفل

Portée (F). Bearing (E).

٢٨٥٢٩ - نِتَاج

النِتَاج مجموع ما تنمعه اثنى الحيوان البون من جراء في ولادة واحدة . راجع بحبل .

Produit (F). Produce (E).

٢٨٥٣٠ - نِتَاج

اسم يشمل وضع جمع البهائم .

Exsudat (F).

٢٨٥٣١ - نِتَاج ، نُتُوح ، نَتِي

Exudate (E).

Vis-à-vis (F). Opposite (E).

٢٨٥٣٢ - نِتَاق ، حِيَال

بني داره نِتَاق داري أي قبالتها .

Apogamie (F).

٢٨٥٣٣ - نِتَالَد ، نَتَل

Apogamy (E).

مجموعة الوسائل التي يمكن بعض النباتات الدليا من الكثرة في حالة فقدانها الشقية .

Transpiration (F).

٢٨٥٣٤ - نِتَاح

Transpiring (E).

رشح الانفراوات المائية الزائدة عن حاجة اللسج الحيوانية والنباتية في بعض الظروف الخاصة .

Nitrification

٢٨٥٣٥ - نِتَاجَة

تفاعل جزيئي كيميائي يحول الازوت الضوي الى امونيا في فنيترتي فينتراتي ولا يتم الا عن طريق الجراثيم التي تغير الحالة . لذلك فجراثيم النتجة حل ثلاثة انواع لثلاث حالات .

Nectastoma (S).

٢٨٥٣٦ - نِتَسْتُوم

Nectastoma (F). Nectastoma (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة النبتيات مفتوحة الفم . انواعها المعروفة قليلة العدد . اصطناعها بعض بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها مستطيلة كاجسام الانقليس . رؤوسها واعناقها اسطوانية . غاطسها مستطيلة ، مقطوعة الاطراف الفصليسية الشكل . اشداقها كبيرة . زعانفها الظهرية والشرجية تقابل وتلتصم عند طرف الذنب . اعرف انواعها واشهرها نكتستوم المتوسط .

٢٨٥٣٧ - نِتَسْتُوم اُرْبَد ، رَصَاصِي ، * ، نِتَسْتُوم

Nectastoma melanura (S). النِتَسْتُوم

Nectastoma gris plomb, N. de la Méditerranée (F).

Nectastoma melanura (E).

سمكة بحرية بيضاء من النكتستوم . اعطائها البحر الابيض المتوسط . تعتبر من اسماك الجحار والنفث . مسرجها المادي في الطبقة التي يراوح عمقها من ١٠ الى ٣٠ متر || جسمها شبه انقليسي الشكل ، اسطوانية العنق والراس والخطم ، يطول نحو ٨٠ سم . مسكها حاد الحراشف تشبه مادة مخاطية لزجة || تؤهب الى اليردة الرضائية الفضية الموانج || زعنفتها الظهرية تلتصق بالشرجية عند طرف الذنب || لحمها متوسط الصنف ، اجدود من لحم الانقليس .

Radicle (F). Radicle (E).

٢٨٥٣٨ - نِتَش ، نِتَشِي

جذر البزرة الجنيني .

Perspiration (F). Perspiration (E).

٢٨٥٣٩ - نِتَاح

التصع صفود التصح من المسام الجلدية على شكل بخار لا يشاهد بالعين المجردة ولا ينفذ منه الجله كما في العرق .

٢٨٥١٩ - نِتِيدِيَات ، نِتِيدِيَات

Nabidae (S). Nabidae (F). Nabidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة مختلفات الاجنحة وطبقة نصفيات الجناح . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد ، منتشرة في جميع اصقاع البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة ، معتدلة البطيخ ، ملونة . رؤوسها صغيرة معتقة . اعطائها رباعية الاجزاء . عيناها جالبية الارتكاز . قرونها الاستشعارية مستطيلة ، رباعية الفصل . كواسلها يرمية الشوزن ، ترتكز على قواعد شبه مستديرة . حجابها صغيرة عرصة . حناجها متباينة الحجم ، يكثر فيها الصغر والقصير . رواشها لاحقة . قوائمها نشيطة || جمع انواعها غاشلة تعيش على اوراق النباتات البرية .

Vin (F). Wina (E).

٢٨٥٢٠ - نِتِيد ، عَصَر

شراب كحول يحصل من اختار عصير الثمار اخضها العنب .

٢٨٥٢١ - نِتِيد ، الإِجَاص ، نِتِيد الكُمُتَرِي

Poitré (F). Perry (E).

شراب يتخلص من عصير الاجاص .

٢٨٥٢٢ - نِتِيد العَصَل

شراب يتحصل عليه من تخمير العسل مع عصير العنب .

Fromage (F). Cheese (E).

٢٨٥٢٣ - نِتِير

هو الجبن ، تقبل اكلت التير .

٢٨٥٢٤ - نِتِير ، الخِتَاج

Nabis ericetorum (S). Nabis des bruyères (F).

حشرة غاشلة من فصيلة النبتيات . جسمها صغير القد ، يطول نحو ٨ م . رأسها صغير الجرم ، بني اللون ، احمر الموانج . خطمها معتدل الطول ، طليق . عيناها صغيرتان ، بارزتان . زباناها دقيقان معتدل الطول . كواسلها بني مزرکش بالاسود . حجبها صغيرة سوداء . ظهورها لاحف ، وردي اللون . ينطها احمر المذب . قوائمها مستطيلة || تألف الحراج . قوتها اوراق الخلتج والقطلب ...

٢٨٥٢٥ - نِتِير ، نِتِير

Nabis ferus (S).

Nabis sauvage (F).

حشرة غاشلة من فصيلة النبتيات . جسمها صغير القد ، يطول نحو ٩ م . رأسها صغير ، حطلي اللون ، احمر الموانج . خطمها طليق ، معتدل الطول . عيناها صغيرتان . زباناها مستطيل . كواسلها الى الحطلي الاسمر . حجبها صغيرة سوداء . ظهورها لاحف ، حطلي اللون ، وردي الموانج . اسود المرقق والاصحاب . ينطها احمر . كتيف الخمل والزبي . قوائمها مستطيلة ، حطلي || تألف البراري والمراعي . قوتها اوراق الاصحاب على اختلاف فصائلها .

٢٨٥٢٦ - نِتِيدَة

النبتية زيمة الكرك اذا عظمت . ج نباتي .

٢٨٥٢٧ - نِتِيدَة ، نِتِيدَة

هي الوبقة التي احترتها النبتاكة .

Ombon, Protuberance (F). نُتُو

Umbo, Protuberance (E).



نَسَم المتوسط

٢٨٥٥٣ - نَشْرَة

النشرة منزل من منازل القمر الشامية ، يقال لها أيضاً أنف الأسد . وهما كوكبان بينهما رقعة قدر شبر يملجا تلطوئح أكبر كأنه قطع بحباب || يقبب النشرة يدعى سعد النابيع .



نوم اشهب

٢٨٥٥٤ - نَقَطُ

Levée (F). Gathering (E). هو أول ظهور النبات بعدما يصعد القربة ويقل أن يملأها .

٢٨٥٥٥ - نَكُور

Prolifique, Multipars (F). Multiparous (E). صفة الحيوان الكثير التاج || أثني الحيوان تلد عدة أولاد معاً .

٢٨٥٥٦ - نَكِير

Ebrouement (F). Snorting (E). النكير هو طلس اللواب . تقول نكرت الدابة : عطست .

٢٨٥٥٧ - نَقِيط

Embryon (F). Embryo (E). هو الملقحة النباتية .

٢٨٥٥٨ - نَجَا

Naja (F). في السمل ، جنس حيات خبيثة من امميات الاخاذيد .



نجر

٢٨٥٥٩ - نَجَاب

Corticole (F). Bark miner (E). النجابة هي الحشرة التي تقضي التدوة البرقية من حياتها داخل لحاء الاشجار .

٢٨٥٦٠ - نَجَار

Lactarius lactarius (S). Lactaire, Lactaire pêche-lait (F). سمكة بحرية وحيدة الجنس والنوع من فصيلة الاسقمريات . موطنها البحر الاحمر والمحيط وبحار الهند . جسمها يطول من ٢٥ الى ٣٠ سم . رأسها مقطوم ، نصفها الشرجية فارقة . ثوبها الى الخضار القضي المايح . لحنها للذي الطعم جيد الصنف .

٢٨٥٦١ - نَجَالَة *

Pelamis (S). Pelamis (F). Pelamis (E). جنس حيات خبيثة سامة من امميات الاخاذيد وفصيلة الهيدروفيات . انواعها المعروفة قليلة المدد اعطائها بحار البلاد الحارة اعصها البحر الاحمر والمحيط الهندي وبعض مناطق المحيط الهادي || اجسامها مستطيلة شبه مزاوية الشكل . رؤوسها صلبة مخروطية الشوز . اذنانها باطلة حادقة . الثوب ثنائية اللون ، النصف العلوي عايد الخضار الاليس او الازرق الاسود والنصف السفلي الى الريدة . اذنانها مرقوشة .



نجانة

٢٨٥٦٢ - نَجَال

Dactyloctenium (S). Dactylocténion (F). جنس نباتات عشبية ، برية ، مدادة ، معمرة من فصيلة النجيليات . انواعها المعروفة سبعة . منها بعض اقاليب البلاد الحارة من الشرق الادلى واfrريقية الشرقية || جميع انواعها شظية . عصفها ضيق مستطيل ، يكثر فيه التسين الدقيق الحاد . ازهارها طرفي مكمل ، ليد الزغب .

٢٨٥٦٣ - نَجَالَة

Agrostologie (F). Agrostology (E). درس يبحث في نباتات الفصيلة النجيلية .

٢٨٥١٠ - نَتَل

النَتَل والنَتَلُّ يعنى النمام الفارغ .

٢٨٥٤١ - نَقْلَة

Bourse (F). Purse (E). هي الابنة النمرية استكملت جرمها المعيز .

٢٨٥٤٢ - نَتُوج

Pleine (F). Full part (E). النتوج : الحامل من اللواب وجميع الحافار .

٢٨٥٤٣ - نَتُوم

Neotoma (S). Néotome (F). Neotoma (E). جنس حيوانات لينة قاضية من فصيلة الفأريات . انواعه المعروفة قليلة المدد اعطائها بعض المناطق الامريكية . تألت المواع القريية من الماء . قوتها المواد النباتية والصفناود وبعض الثمرات اعصها السرطان || اجسامها ريمة مستوية القد تطول من ٣٠ الى ٣٥ سم . بما فيها الذنب . وهي شبيهة بالجرزون وبالقناد في آن واحد . اقوابها تختلف مع الانواع || تنقل اجسامها في الحوم وفي عذقة من اثناف مستطيلة وحجر وسطى فسيحة وتعرض الانفاق من البين واليسار عدة داليز تخزن فيها مؤنة الشتاء || الاثاف تضع من ٤ الى ٨ ادراع ترصعها نحو اربعة اسابيع || اعرف انواعه واشهرها :

٢٨٥٤٤ - نَتُوم أَشْهَب *

Neotoma cinerea (S). Néotome gris (F). طوله نحو ٣٠ سم . ثوبه الى الشبهة يسمر بعض الشيء في الرأس والظهر ويغير في البطن . وبره معتدل الطول . ذنبه جيشيل يشبه ذنب السنجاب الا انه أقصر منه .

٢٨٥٤٥ - نَتُوم لَثُورِيد *

Neotoma floridana (S). Néotome de la Floride (F). طوله نحو ٣٥ سم . ثوبه الى الريدة السوداء . بطنه الى الريدة البغراء . وبره نام قصير . ذنبه حرشفي القشار عادم الذوبر .

٢٨٥٤٦ - نَتِيجَة

Conclusion

٢٨٥٤٧ - نِجَاف

Onguent (F). Unguent (E). المرم ينش به الجرح .

٢٨٥٤٨ - نِجَار ، نَشْر

Fécondité (F). Fécondity (E). كثرة النتاج في البائم .

٢٨٥٤٩ - نَشَالَة

Déblai (F). Clearing, Cutting (E). نرشال الركية يستخرج منها وكل تراب يستخرج من حفرة او ردم .

٢٨٥٥٠ - نَقْد

Pointer (F). To point (E). نقد : يقال نقد القطر ونقدت الكمأة : خرجت من الارض .

٢٨٥٥١ - نَشْر

Epandre (F). To scatter, To screw (E). نرش الشيء : ذره بالساري .

٢٨٥٥٢ - نَشْر الأَسْمِدَة

Epandre des engrais (F). Scattering of fertilizer (E). هو ذر الاسمدة على التربة وقد تم اياها باليد او بواسطة آلات خاصة تقوم بهذا العمل .

Ecole poire (F). **٢٨٥٨٠ - نجمة القطب**
Pole-Star (E).
نجمة القطب أو القطب نجم نير بين الجدي والفردين
تنبى عليه القبلة .

Ostracnidae (S). **٢٨٥٨١ - نجميات**
Ostracnidae (E).
فصيلة امحاك بحرية من تبة ملحويات الفكوك اجناسها
وانواعها عديدة ، اشهرها ابو صندوق .

Aster (F). **٢٨٥٨٢ - نجمية**
هي الاسطر ، اطليه .

Nutrition (F). **٢٨٥٨٣ - نجوع**
راجع مادة اختداء .

Stelleridae (S). **٢٨٥٨٤ - نجميات**
Stelleridae (E).
شعبة حيوانات من صف الثوكيات يشمل نجوم البحر .

٢٨٥٨٥ - نجير * ، سيقون
Agropyrum junceum (S). Agropyra, Froment des
Jones (F). Sea wheat grass (E). Binsenquecke, Binsen-
weizen (D). Agropiro (I).
نبات عشبي بري مرعوي من الفتيات وفصيلة النجيليات.
يكثر بين الزروع وفي الاراضي الملساء وصل جوارب
الطرقات الريفية .

٢٨٥٨٦ - نجير زاحيف *
Agropyrum repens, Triticum repens (S). Agram,
Chlendent rampant (F). Couch grass, Quitch grass,
Twitch grass (E). Echte quecke, Grasquecken (D).
Gramigna, Caprinalla (I).
نبات عشبي بري معمر من فصيلة النجيليات . ساقه عقدية
مدادة نشطة كثيرة الانشعاب والاذى لانها تنب الثرة
وتتبق الاعمال الزراعية وتسي الى النباتات المزدرة ان لم
يقض عليها .

٢٨٥٨٧ - نجيرة
سقيفة من خشب ليس فيها قصب ولا غيره .

Agrostis (S). Agrostide (F). **٢٨٥٨٨ - نجيل**
جنس نباتات عشبية مرجية معمرة من فصيلة النجيليات .
بعضها يزرع في المروج . اكثرها ينبت عفواً ويسمى
الى الزروع وسائر النباتات || اشهر انواعه ما يلي .

٢٨٥٨٩ - نجيل ابيض * ، اوزا ابيض
Agrostis alba (S). Agrostide blanche, Florin, Tralne,
Pavine (F). White bent grass, Florin grass (E).
Velises Straussgras, Floringras (D). Agrostide
blanca, Pennacchini (I).
نوع من النجيل وهو نبات مرعوي بري معمر يملو من
٢٠ الى ٥٠ سم . صفه ضيق النصل جيل الخفسار .
سبيلاته صيطرة القد ، متبادعة النسيج ، يضاء اللون .

٢٨٥٩٠ - نجيل احمر * ، اوزا احمر
Agrostis rubra (S). Agrostide d'Amérique, Foin
rouge (F). Herd grass, Red top grass (E). Herden-
gras (D). Fieno rosso (I).
نوع من النجيل المرعي المرعوي المعمر يملو من ١٠ الى
٦٠ سم . صفه مستطيل النصل الجامد . اتحاد غليظة
جزوية اللون . سنباله مستطيلة ، سبيلاته متفرقة .

Liber **٢٨٥٦٤ - نجب**
الطبقة السفلى من اللحاء تكون بين القشرة والخشب في
سوق ويولد النباتات الرمالية .

٢٨٥٦٥ - نجبة
هي قرصة النمل اي حصن قريته المد حطس المازن .

Péricarde (F). **٢٨٥٦٦ - نجث ، نجث**
Pericardium (E).
هو الشف ، خلاف القلب .

Coteau, Pisteau (F). Slope (E). **٢٨٥٦٧ - نجد**
النجد ما اشر من الارض وارتفع . ج انجد وانجاد ونجاد
ونجد . والنجد المكان لا نجير فيه .

٢٨٥٦٨ - نجدة * ، زهرة النجد
Coleus (S). Coleus (F). French nettle (E). Buntlippe,
Buntblättrigenesell (D). Coleus (I).
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الشفويات . انواعه
المعروفة نحو ١٢ مظهرها بري طبي وبعضها زينة .
سوقها رفاه ، تملو من ٢٠ الى ١٠٠ سم . اورانها متقابلة
ممتدة كاملة ، فصالحا قليبة الشكل ، خلية البشرة ،
مسنة الحافة . ازهارها صيطرة القد ، خمبة النسيج ، عديدة
الالوان ، يكثر فيها الازرق .

Dolsage (F). Planing (E). **٢٨٥٦٩ - نجز**
نحت الخشب وفه وتركيبه .

Simulie (F). Simulium (E). **٢٨٥٧٠ - نجيرس ***
النجيرس والنيرس والقيرس : بوموس صغير اجزم الأنف
يشبه السكت ، لسه مؤلم .

Transhumance (F). **٢٨٥٧١ - نجعة**
طلب الكلا في موضعه ، راجع انتجاع .

Pastoral **٢٨٥٧٢ - نجني**
٢٨٥٧٣ - نجف
Déboisement (F).
Deforestation (E).
النجف هو قطع الاشجار من اصوفا وابادتها .

٢٨٥٧٤ - نجكة
القليل من الشيء .

Bloquer (F). **٢٨٥٧٥ - نجكل**
نجل الثرة : شفها لثرامة .

Etoile (F). Star (E). **٢٨٥٧٦ - نجم**
بوجه عام كل كوكب سماوي ثابت او سيار يدعى نجماً ،
ما عدا الشمس والقمر . وبوجه خاص كل كوكب
يتر يتلألأ في السماء ويبدو ثابتاً في مركزه الفضائي .

Acaule (F). **٢٨٥٧٧ - نجمة ، نجمة ، مكر**
Acaulous, Stemless (E).
اسم تعريبي وصي يطلق على كل نبات لا ساق له .

Ostracion cornu (F). **٢٨٥٧٨ - نجم اعظم**
سمكة بحرية مشهورة باسم ابوصندوق اعظم ، اطلبها .

Alétris (F). **٢٨٥٧٩ - نجم لامع**
هو عشبة الاخ ، اطلبها



نجد



نجرس



نجير



نجير زاحيف



نجيل ابيض



نجيل احمر

- Apis fasciata (S). نحلة مصرية
Abeille égyptienne (F).
Apis Indica, A. dorsata (S). نحلة هندية
Abeille indienne (F).
Apis cocopria (S). /
Abeille grecque (F). نحلة يونانية

٢٨٦١٠ - نحلة
Abeille (F). Apis (E).
النحلة كوكبية نجوم مخططها الجنوب مركزها تحت قلمي
قطر بين كوكبية الحباء وكوكبية الصليب . عدد
نجومها ١٣ منها نجم واحد من المرتبة الرابعة .

٢٨٦١١ - تحليات
Apidae (S).
Apidae (F). Apidae (E).
فصيلة النحل من رتبة غشائيات الاجنحة .

٢٨٦١٢ - نحور
Diverction
هو الاتحاد الانقباضي من الشكل الجسدي المعروف .
اسبابه كثيرة تعود الى عوامل شتى اخصها الاوصام وعلالية
الادوية وعلى تأثيرها في النسيج المنسي .

٢٨٦١٣ - نحوص
Anesse pleine (F).
النحوص هي الاثان الوشعية الحامل . ج تحص ونحاص .

٢٨٦١٤ - نحى ، شكوة ، سقاء
Baratte (F).
Churn (E).
وعاء تخفف فيه الكتلة لاستخراج الزيت .

٢٨٦١٥ - نحينة *
Cadre (aplc.) (F). Section (E).
لوح من الشمص المصنوع يحضه اطار من خشب يوضع
في القفيز فيقيد النحل عليه تخاريه ويمر اقراصه .
ج تحت .

٢٨٦١٦ - نحيرة
Substratum
ركيزة الصفات المميزة في الشيء .

٢٨٦١٧ - نحيش
Amorphe (F).
Amorphous (E).
عديم التيلور ، غير محدد الشكل .

٢٨٦١٨ - نحيلة
Abre petit (F).
هي الاروس النطر ، اطلبه .

٢٨٦١٩ - نحابة
Sélectivité (F). Selectivity (E).

٢٨٦٢٠ - نحاس ، جتال
Maugignon (F).
Horse-dealer, Horse-coper (E).
هو تاجر الخيل . وتجارة الخيل تدعى نحاسة وجنرة .

٢٨٦٢١ - نحاشيش
Oufes (des poissons). (F). Gillis (of fish) (E).
هي في الاسماك الخروق الفرجية التركيب القائمة عند مخرج
جانبي الرأس . وظايفها صرف الماء الذي ترشقه الاسماك
بمقاطعتها عند التنفس . الواحد نحاشيش .

٢٨٦٢٢ - نحاع ، نحاع
Moeffe (F). Marrow (E).
يقسم النحاع الى ثلاثة اقسام : النحاع النطفي او ريم
النظم والنحاع الشوكي او الحبل الشوكي والنحاع المنطويل .
فالنحاع النطفي نسخ دهي يحضه السمحاق الباطن ،
يريد في تجاريف العظام وفي ثياها الاستنجية وهو حل
نوتين ، ابيض اغبر مركزه في تجاريف العظام الطويلة واسمر
احمر اللواج مركزه في فجوات الثياها الاستنجية || اما

٩ الى ١٥ م . ظهراؤها شفاف يطول عند الذكر من ١٥
الى ١٥ م . وعند الانثى من ٩ الى ١١ م . زباناها خيطية
الشكل مجنحة الطرف . سيقانها الخلفية تطول من ٨ الى
٩ م . مراز الانثى جالس الانتساب يطول من ٦ الى ٨ م .
يظهر النحوص الشفاف عند اوائل الصيف . يافضالا ذاك
والاصحاب الرفيعة . اناله ترز السرة في سوق ووروع
النباتات المختلفة اخصها الاقوين والحرفش والشنداب
والبرراق والخيميات في اختلاف انواعها والقيغ وسوروع
الكركية || دباهه ونيفانهه وشرااته الكاملة تموش على
ارواق الثبات والموارد المضوية || مسرعه جديري يستمر
من الفربور الى الفجر .

٢٨٦٢٦ - نحص
Piedmont (F).
اصل الجبل وصفه .

٢٨٦٢٧ - نحض
Asepsia (F).
Aseptic methods, A. treatment (E).
مجموعة الطرائق العلاجية التي تستعمل الميكروبات دون
الاستعانة بالموامل المضادة لها .

٢٨٦٢٨ - نحطة
هي اللهجة ، اطلبها .

٢٨٦٢٩ - نحكل *
Apis (S). Abeilles (F). Bees (E).
جنس حشرات مفيدة من فصيلة التحليات ورتبة غشائيات
الاجنحة . انواعها المعروفة قليلة ، اصطناعها المال . قربها
الكبير ورسيق الاضرار . اجسامها اسطوانية الشكل .
عيونها مركبة ، اضلاعها قارضة لاصقة . صدورها نشطة
تعمل ثلاثة ازواج من الاجنحة الشفافة . بطونها مركبة
من عدة طبقات وبرجات تدثي بسلام لامع عند المعاملات .
والنحل يعيش عيشة اشترائية تعاونية في مستعمرات مستقلة
مكونة من ثول قوامه ملكة او اثني كاملة تعيش نحو ٥
سنوات وظيفها تنج السرة . جسمها مستطيل الشكل عديم
الخطم الاذن مما يمنحها من تناول الغذاء تلقائيا وما يدعو
وسيقاتها الى تزويجها للسعر . ثم اليمخور وهو الذكر
الذي يكوم الملكة مرة واحدة في حياتها يموت على اثرها .
والياخير لا يقل عددها في الثول الواحد من بضع مئات ،
وهي اكبر حجما واغلظ جسما من المعاملات وهي عادمة
الشام اللامع . حياتها تطول من ٨ الى ١٠ اسابيع وتعيش
ما تجنيه المعاملات . ثم المعاملة وهي اثني ناقصة التركيب ،
عادمة اللشور الجنسي ، وظيفها جي الرقيق واللعل ومنص
الدينج والشمص واللعل وسرارة الخلية وتدير شاتها وشان
الحضنة والسمي . وهي مجوزة بسلام لامع تستعمله للدفاع
من النفس . والمعاملات التي يبلغ عددها عدة آلاف تشكل
اكثر من ٩٩ ٪ من مجموع افراد الخلية او الثول . وهي
تموش من ٣ الى ٥ اسابيع باستثناء فصل الشتاء حيث
ما يلي :

- نحلة ايطالية
Apis ligustica (S).
Abeille italienne, A. ligurienne (F).
نحلة سوداء ، نحلة مدغسقر
Apis unicolor (S).
Abeille noire, A. de Madagascar (F).
نحلة سفيانية ، نحلة عربية
Apis arabica (S).
Abeille arabe (F).
نحلة شائعة
Apis mellifica (S).
Abeille commune (F).
نحلة صينية
Apis socialis (S).
Abeille de Chine (F).



نحوص شفاف



نحور

ملكة

عائلة



نحينة

وأوراقه حازمة مطعومة وباسطة عند الإكثار منها || تنورة يستمر طوال شهر تموز .

٢٨١٣٣ - نَخْرُط الصَّبَاغِين ، عَظْلِيم ، عَظْلِيم

Baptisia tinctoria (S). *Baptisia tinctoriale* (F).
نوع من النخرط الزراعي الصبائي . جلوده غليظة مستطيلة . ساقه منتصبة تملو نحو ١٠٠ سم . أوراقه ممتقة ، مركبة ، ثلاثية الوريقات . وريقاته بيضبة منتصبة مسوطة ؛ نصلها مائل البشرة ، عايق الحصار . أزهاره فردية التجميع ، محورية الإزكان ، متوسطة القد ، صفراء اللون || جلوده صباغية ، غصنها أزرق اللون كثائنية || تنورة يستمر من تموز إلى آب .



نخرط

٢٨١٣٤ - نَخْرُط مَقْشُوب (F). *Baptisia perfoliata* (S).

Baptisia perfoliata (F).
نوع من النخرط الزبني للمس . ساقه منتصبة تملو نحو ١٠٠ سم . أوراقه بسيطة ، مثقوبة ، مستديرة الشكل ، مائلة البشرة . أزهاره فردية التجميع ، محورية الإزكان ، صغيرة القد ، صفراء اللون . || تنورة يستمر طوال شهر آب .

٢٨١٣٥ - نُخْرُوب (F). *Alvéole, Cellule* (F).

Alveolus, Cell (E).
هو من الشهاد المسماة الاضلاع التي يصنها النحل ويضع فيها سره أو يضع فيها عسله . ج نخاروب .



نخرة الارز

٢٨١٣٦ - نَخْرِيَّات ° ، رُهْبُرِيَّات °

Tilletiaceae (S). *Tilletiáceas* (F). *Tilletiaceae* (E).
فصيلة فطور مجهرية من وقية الدعامات تتميز بظاهاها اللايتيمية التركيب والانتظام . علاماتها بسيطة لا يفرية ، بونياتها عديمة فردية التجميع أو مدقوبة || أشهر أجناسها : الاتوريز ، الاتيتايو ، التليقة ، الطاعول ، الميلايتوزيوم ، النخرية ، التيرنوسية .

٢٨١٣٧ - نَخْرِيَّة ° ، وَهْبُون ° *Tilletia* (S).

جنس فطور مجهرية من فصيلة النخريات يركب علة نباتات اخصها نباتات الفصيلة النجيلية . || جرمة وثقده يتميزان بدعيات قصيرة غليظة مدقوبة البويقات . بوه اصغر اللون كرهية الزائفة يدور مملكا لزجا ثم ينسل فيصبح كالهاب || أشهر أنواعه ما يلي .

٢٨١٣٨ - نَخْرِيَّة الأُرْذ ° ، رُهْبُون الأُرْذ °

Tilletia horrida (S). *Carle du riz* (F).
فطر مجهرية يصيب الارز فلهذه . اطاله فسيحة الاربعاء قصل البلاد الاسورية والاسريكية . || يركب بعض اثمار الشكول فيسولوا الى بؤرة بولية تنعبر من فبار لزج كثيف لونه الى السرة الضعيفة يتدل كالخيط المنقرقة من الزهرة الى الماء قبل ان يجف ويطار . اضراره زهيدة لا تستوجب الكمامة النباتية إنما يحسن مداركة البذر باحد العلاجات الوقائية كغسل القالب في بعض مركبات الزئبق أو الفرمول .



نخرية الحنطة

٢٨١٣٩ - نَخْرِيَّة الحِنَطَة ° ، رُهْبُون الحِنَطَة °

Tilletia tritici, *T. caries*, *Uredo caries*, *Lycoperdon tritici* (S). *Carie du blé*, *C. du froment* (F). *Stinking smut* (E). *Steinbrand des weizens*, *Steinbrand* (D).
فطر مجهرية يصيب الحنطة على اختلاف أنواعها . يكثر في البلاد المعتدلة المناخ والباردة . يركب الحب فيسول

النخاع الشوكي فهو جزء من الجهاز العصبي يمتد في القناة الفقرية من النخاع المستطيل الى الفقرة القطنية الأولى . وهو ضفيرة من الألياف العصبية وظيفته نقل الاحساسات بين اطراف الجسم والمراكز العليا منها والها || وأخيراً النخاع المستطيل الذي يقع بين مؤخر المخ والنخاع الشوكي فهو أحد أجزاء الدماغ الذي يمين على الجهاز العصبي ويسيطر على قنطل حركات القلب والتنفس والضغط الخ . وهو يشبه الحبل الشوكي من حيث تركيز المادة السمره في القسم الباطن وللمادة البيضاء في المحيط الخارج .

٢٨١٣٣ - نُخَالَة (F). *Son* (F). *Bran* (E).

هي الفضلات الخائية من نخل الحبوب بعد طحنها لا سياً الحنطية .

٢٨١٣٤ - نُخَالَة (F). *Pruine visqueuse* (F).

بادة عضوية طليسية التركيب لزجة تغطي بشرة سوق ولوراق بعض النباتات .

٢٨١٣٥ - نُخَالَة (F). *Select* (F). *Select* (E).

نخت الطائر الشرة : نخرها .

٢٨١٣٦ - نُخَالَة (F). *Picotee* (F). *Peck at* (E).

نخت الطائر الشرة : نخرها .

٢٨١٣٧ - نُخَالَة (F). *Bœufs de travail* (F). *Oxen* (E).

النخعة هي البقر الموامل دون تمييز .

٢٨١٣٨ - نُخَالَة ، دَهَب (E). *Nécrose* (F). *Canker* (E).

داء في نسج النبات سببه فطور طليسية مختلفة .

٢٨١٣٩ - نُخَالَة الحَبُوب (F). *Carie* (F).

مرض فطري يمتري الحبوب لا سياً الحنطة . سبه بعض الفطور النخرية المجرية . اطلب نخرية .

٢٨١٣٠ - نُخَالَة ° *Baptisia* (S). *Baptisie* (F).

False indigo (E). *Farfarhölz* (D). *Baptisia* (I).
جنس نباتات طيحية من الديداريات وفصيلة القنريجات الفراقية . أنواعه عديدة معظمها بري وبعضها صباغي أو طبي . أروابها مدادة . ساقها منتصبة . أوراقها لا قياسية الشكل منها المركبة والمتعقدة والمخاضنة . أزهارها لا نظامية التجميع . ثمارها حبات اهليلجية قصيرة القد . اعرف أنواعه وأشهرها ما يتبع .

٢٨١٣١ - نُخَالَة أبيض (F). *Baptisia alba* (S).

Baptisie blanche (F).
نوع من النخرط الزبني . ساقه منتصبة تملو من ٨٠ الى ١٢٠ سم . أوراقه مركبة ثلاثية . وريقاته اهليلجية الشكل مقطوعة الطرف . أزهاره فردية التجميع ، محورية الإزكان وابيطة ، كبيرة القد ، لونها الى البياض المالح . تنورة يستمر طوال شهر حزيران .

٢٨١٣٢ - نُخَالَة البَر ، فَيْلَكَة بَرِيَّة

Baptisia australis (S). *Baptisie australis* (F).

نوع من النخرط الطبي والزبني . جلوده غليظة . ساقه منتصبة تملو من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم . أوراقه مركبة ثلاثية الوريقات . وريقاته اهليلجية مقطوعة ، نصلها مائل البشرة ، جميل الحصار الزاهي . أزهاره عتقودي التجميع هامي الإزكان . أزهاره ضفيرة القد زرقاء اللون || جلوده

سولية أيضاً وثلاثية التنسين كما في الذكورية ، لكن توجيها ثلاثي البتلات المرسومة وأسدبها شقية حشرفية وبفاتها ثلاث وهي بنسية الشكل نجمة منفصلة وسامها لائفة وأثمارها وريدة الزهرة . || أشهر أنواعه على الإطلاق هو النخل المعروف أي النخيل .

٢٨٦٤٦ - نَخْل الدَّقِيق

Phoenix farinifera, Ph. puilla (S). Dattier à farine (F). نوع من النخل غليظ الجذع القصير . ساقه تملو نحو ٢٠٠ سم . بينما لا يقل قطرها عن ١٠٠ سم . سفعه كسفت النخيل وأشد أخضاراً . جريده يتحصن عند زامه الأخير . مهده منخفضة سهول الحدت الشرقية . يرغب في الأثرية الدبالية المرورية . ثماره صغيرة القذ صفراء اللون لا تتوكل يستخرج من جماره ساقه الصمغ لبوب نشوي المادة مأكول يقال أنه كثير الفوائد الصحية . || يزرع خارج مهده الآن فقط .

٢٨٦٤٧ - نَخْل الدُّهْن * ، نَخْلَةُ الزَّيْت ، إلويس
Elaeis guineensis (S). Eléide, Eléis, Avolra, Palmier à huile (F). Oil palm (E). Olpalma, Guineische Palme (D). Palma avoira, P. da olio, Aouara di Guinea (I).

نوع من النخل ، مهده بلاد إفريقية الاستوائية أحصها غليظاً ، ساقه حلقة الصام مرطاً ، سفعه ورشي التركيب . ثماره نورية الشكل ، جوزية الحجم ، صفراء اللون ، تحضن ثلاث حبات يستخرج من لها دهن أصفر طر يستعمل في صناعة الصابون . ويستخرج من صلام حباتها سمن نباتي أبيض اللون يستعمل للأكل .

٢٨٦٤٨ - نَخْل الشَّعْخ * ، سِيرُوكِيل

Ceroxylon (S). Céroxyle, Palmier à cire, Arbre à cire (F). Wax palm (E). Andenwachspalme (D). Palma della cera (I).

جنس نخل أمريكي . أنواعه المروقة قليلة . سوقها ريفية تملو ٤٠ إلى ٥٠ سم . سفعها يشبه سفع النخيل لكنه يطول نحو ٦ أمتار . يتكرر ويوجد في بلاد البربر عند جبال الأندلس مقربة من الثلج الدائم . ثمارها نورية ، كبيرة ، بنفسجية اللون ، سكرية الطعم . عصارتها شمية تستعمل في عدة صناعات .

٢٨٦٤٩ - نَخْل القَطَب * ، نَخْل نَاتَال

Phoenix natalensis (S). Dattier du Natal, D. du Cap (F).

نوع من النخل الصغير القذ . جذعه جالس مستقيم يملو نحو ٣ أمتار . ساقه غروطية الشكل غليظة القاعدة دقيقة القرس السطحي . جريده سفعه يطول نحو ٣ أمتار . خوصه بحري اللون تملو شمة خضراء || مهده بلاد رأس الرجاء الصالح والنتال . يزرع الآن في جزيرتي . يحصد في جميع الأثرية ويصنع حل مطبق شامول البحر المتوسط || ثماره حامزة صلبة صفراء اللون .

٢٨٦٥٠ - نَخْل النَّفَا *
Sagoutier (F). هو السافوتية ، أطباها .

٢٨٦٥١ - نَخْل بَرِّي
Phoenix sylvestris (S). Dattier sauvage (F). Wild palm (E). Wilder Dattelpalm, Tannenpalme (D). Palma salvatica (I). نوع من النخل الكبير القذ . جذعه يرتفع عن ١٠ إلى ١٢ م . سفعه كسفت النخيل ، يرم خوصه مستد الطرف طويل الهدبة ، لونه إلى الخضار الأزاعي . || مهده بلاد

كامل البر أو بعضه إلى كسفة من البرج || وهو لا يعلب السوق لكنه يسبب قصر السلايمان والثرائف ثم عقر القسم الأعل من السنايل . || أضراره قد تكون فادحة إذا لامته البومال الجوية وأحصها امتداد الحرارة أو تدنيا || يكافح باستعمال أبج الفواطير القمالة منها زديخات النحاس أو املاح الزئبق أو مركبات الفرمول .

٢٨٦٥٠ - نَخْرَجَةُ الشَّعِير * ، رُهْبُون الشَّعِير
Tilletia panicis (S). Cario de l'orge (F).

فطر مجهرى يركب جميع أنواع الشعير . يتكرر وجوده في أروبة الوسط . || طياسه مستدرة الشكل أو بيضية لوئها إلى البسة قطيها مشقة بنفسجية حابطة . أضراره محدودة لا تتجاوز ، في أشد الإصابة ، ثلاث حبات في النسبة الواحدة . || يكافح مكافحة سائر النخرجات .

٢٨٦٥١ - نَخْرَجَةُ الشَّيْم * ، رُهْبُون الشَّيْم

Tilletia secalis, Uredo secalis (S). Cario de seigle (F). فطر مجهرى يسبب الفيل فينبه . يتكرر وجوده في المناطق الباردة أحصها بلاد الاتحاد السوفياتي . وهو على السنايل الملوقة مشقة من إزقة البيرة بينا يكون البر أصفر قدماً من المعتاد وأغلظ قطراً . || طياسه كروية الشكل أو بيضية . بوه لبه الصبيب ، كرية الرائحة ، أسود اللون ، أزرق المولج ، دقيق القثيار . || أضراره فادحة تراوح بالنسبة إلى المواقع والموايل الجوية من ٢٠ إلى ٧٠ ٪ . || يكافح مكافحة نخرية الحطية ومن الأوجب اجتباب زرامة الشيلم في الأماكن الرطبة .

٢٨٦٥٢ - نَخْرَجَةُ مُتَشَبِّه * ، رُهْبُون مُتَشَبِّه

Tilletia foetida, T. levis, Ustilago foetida (S). Cario fécida (F). فطر مجهرى يركب بر الحطية في جميع المناطق الحارة والمستدرة المناخ . || طياسه كروية الشكل أو بيضية ، بقرها مائلة السطح موشجة بالأوس . بوهها كرية الرائحة . || أضراره شبة باضرار نخرية الحطية تزداد مع ازدياد وطفه الحر . || يكافح مكافحة نخرية الحطية .

٢٨٦٥٣ - نَخْرَجُ
Térébrer (F). To terebrate (E).

٢٨٦٥٤ - نَخْرَشُوش

Ouies des poissons (F). Gills of fish (E). نخرشوش ج نفاشوش . هي أداة الصنع عند الأسماك وهي تقرب فلبية متصلة بالغايشم من عن بين الرأس ويساره .

٢٨٦٥٥ - نَخْل

Phoenix (S). Dattier (F). Palm tree (E). جنس أشجار ليفة من فصيلة النخلات حديد الأنواع والفردوب جميعها من نباتات المناطق الحارة . || جذوعها متصببة ريفية أو نجية وإلحاح عند وجوده يكون أسطواني الشكل وسيد الساق المستقيمة الكعرة الكرنافية وغير المتفرمة . أو رافها سفية طولية الجريد غليظة الكرب وريشة الشكل . خوصها تجزل التركيب ، فتالي البزم الجليي التصل المستطيل المذهب الهدبة . || والنخل من النباتات الثنائية المسكن التي يتبين إزهارها بظلمة فناء وكافور بسيط . اما إزهارها فلامطة وقد يخلط تركيبها بالنسبة إلى كونها ذكورية أو أنثوية . فالإزهار الذكورية تتميز بكأس سولية الشكل ثلاثية التنسين مع توجع ثلاثي البتلات وأسدية شقية وبآبر خيطية متصببة . || اما الإزهار الأنثوية فكأسها



نخرة الشعير نخرة الشيلم



نخل الدقيق




نخل الدهن



نخل الشمع



نخل القطب



- 1 من - 2 لکک، خرم مروارید - 3 خرم مشک - 4 من خلیج - 5 لکک - 6 خیل - 7 من شمال، پرتکوب - 8 لکک، منکب بیری - 9 لکک - 10 کزک - 11 کزک - 12 کدک بیری - 13 زوزم - 14 ککس - 15 کزک - 16 من خلیج، من خلیج - 17 بالور - 18 بالور لکک - 19 من - 20 کزک، بید - 21 دشت - 22 منکب - 23 سرمان - 24 خسلک - 25 خسلک - 26 من خلیج - 27 سرجه البحر، منکب - 28 غرن غناب - 29 منکب - 30 منکب - 31 لکک - 32 منکب - 33 منکب - 34 منکب - 35 منکب - 36 منکب - 37 منکب - 38 منکب - 39 منکب - 40 منکب



1. نباتات حرجية ونباتات : 2. طيلة مرف الكوك - 3. بيا ، مصيدية - 4. كرميس - 5. عائلة قايمة - 6. عسكار - 7. عسلية شامية - 8. عسلية حيلة - 9. نيشان - 10. دينة -
 11. لب - 12. ليلاب فلي - 13. ستور شعري - 14. ستور اصغر ، خيري - 15. خيرة مر - 16. ليلية مر - 17. حبل لبي - 18. حبل المسك - 19. عنبية وديانة - 20. عنبية -
 21. فوسين - 22. زهر الكنتارين - 23. لسان الزوار - 24. دافور مصرية - 25. بنية - 26. صليت - 27. بندق - 28. نباتات وديانة - 29. نباتات وديانة - 30. نباتات وديانة -
 31. نرجس حمر - 32. نرجس حمر - 33. نرجس برقي ، سرجي - 34. نرجس زينة - 35. لدا - 36. نرجس - 37. نرجس - 38. نرجس - 39. نرجس - 40. نرجس - 41. نرجس - 42. نرجس - 43. نرجس - 44. نرجس - 45. نرجس - 46. نرجس - 47. نرجس - 48. نرجس -
 49. نرجس - 50. نرجس - 51. نرجس - 52. نرجس - 53. نرجس - 54. نرجس - 55. نرجس - 56. نرجس - 57. نرجس - 58. نرجس - 59. نرجس - 60. نرجس - 61. نرجس




لپاغت مسمرة: 1 ادرم، اریق - 2 حلیوژوب - 3 جریمة هریک - 4 جریمة کیرک - 5 تلکوس - 6 کرللی کاشمر - 7 ترللی افریکارین - 8 کرللی صینی - 9 اسطر صینی - 10 اسطر میلان -
 11 کرلیمت مینات - 12 کرلیمت لولی - 13 کرلیمت خلیفی - 14 کرلیمت مراب - 15 کرلیمت لطف - 16 کرلیمت مسلح لفر - 17 کرلیمت صبی - 18 کرلیمت کب - 19 منیر کنسیری،
 ناهور - 20 فرکان - 21 خردیپ وری - 22 فوکار الفس - 23 رسیه - 24 لطفلیپ جیری - 25 مواریه - 26 صیون کیر لفر - 27 صیون خشک - 28 صیون ریح - 29 صیون مشیق -
 30 قریمة - 31 چلیان خریض الیوق - 32 فالتة صلیب - 33 نردنیا - 34 یوکا - 35 خطی - 36 لویس اسفر - 37 لایافر - 38 غششانی تانی - 39 شریکا - 40 شریکا
 دروسه - 41 زلفه لیجیست - 42 زلفه اذان الب - 43 زلفه پایانی - 44 زلفه قنطرة - 45 رصاسیة - 46 اکلیچیا سدره - 47 اکلیچیا قدیة - 48 فنگر لپاغت - 49 روح صلیب لفر -
 50 روح صینی - 51 دهل - 52 سم، تم، لکسکة - 53 دلقور مشیتره - 54 بقم - 55 حلفا، کراة - 56 وری الحام




- ۱ کلبه - ۲ لکجه - ۳ اطروش لکلی - ۴ سریتة الهادی - ۵ دوربوة - ۶ پلشآن عربان قرمز - ۷ کرل - ۸ صسل - ۹ نرکان - ۱۰ بلنبه - ۱۱ دوربیه وردبیه - ۱۲ سدرله
 کبره قرمز - ۱۳ مشبیه بیه - ۱۴ خلی ملکی - ۱۵ خلی افری - ۱۶ لیلک - ۱۷ لیلک چین - ۱۸ سریتة - ۱۹ ملی - ۲۰ دوح جبری - ۲۱ کرز الزناری - ۲۲ کوز -
 ۲۳ شنبلیله بیه - ۲۴ ورد لیلی - ۲۵ ورد علی - ۲۶ ورد جا کبر - ۲۷ ورد المارشال لیل - ۲۸ ورد دیمون - ۲۹ ورد قرسی - ۳۰ ورد لیلون - ۳۱ ورد فستی - ۳۲ ورد کبیر قرمز - ۳۳ ورد
 سلونی - ۳۴ لعل - ۳۵ قیل - ۳۶ سنبیه - ۳۷ پلشآن خدی - ۳۸ رنگان - ۳۹ مهور - ۴۰ اریتریا - ۴۱ جیکوس - ۴۲ کالندوم - ۴۳ ورث بیه - ۴۴ لوشیا چین - ۴۵ لوشیا طلیقه -
 ۴۶ آلیک - ۴۷ اچلسیا بترله - ۴۸ ارضیا حکلوک - ۴۹ کامیلیا پانالیه - ۵۰ کامیلیا کبره قرمز - ۵۱ فیه - ۵۲ طرخون - ۵۳ ایلک - ۵۴ لکوس - ۵۵ سدره المرحبان




لیکات شخصی اورد : 1 لغیر الاشیاء - 2 ذوات جبرگ - 3 الذیوم شرذ - 4 الذیوم اولی - 5 یلاریه برولیا - 6 یلاریه سیر - 7 نیلاسا سلیط - 8 نیلاسا لید - 9 فریة بی - 10 احین - 11 خلیق - 12 عید - 13 استیغنا - 14 فلکزیة بی - 15 طلاق - 16 فزیط - 17 آتشد - 18 یلاریه - 19 یلاریه - 20 ابر نارت - 21 فریة - 22 یلاریه - 23 یلاریه - 24 یلاریه - 25 یلاریه - 26 یلاریه - 27 یلاریه - 28 یلاریه - 29 یلاریه - 30 یلاریه - 31 یلاریه - 32 یلاریه - 33 یلاریه - 34 یلاریه - 35 یلاریه - 36 یلاریه - 37 یلاریه - 38 یلاریه - 39 یلاریه - 40 یلاریه - 41 یلاریه - 42 یلاریه - 43 یلاریه - 44 یلاریه - 45 یلاریه - 46 یلاریه - 47 یلاریه - 48 یلاریه - 49 یلاریه - 50 یلاریه - 51 یلاریه - 52 یلاریه - 53 یلاریه - 54 یلاریه - 55 یلاریه - 56 یلاریه - 57 یلاریه - 58 یلاریه - 59 یلاریه - 60 یلاریه - 61 یلاریه - 62 یلاریه - 63 یلاریه - 64 یلاریه - 65 یلاریه - 66 یلاریه - 67 یلاریه - 68 یلاریه - 69 یلاریه - 70 یلاریه - 71 یلاریه - 72 یلاریه - 73 یلاریه - 74 یلاریه - 75 یلاریه - 76 یلاریه - 77 یلاریه - 78 یلاریه - 79 یلاریه - 80 یلاریه - 81 یلاریه - 82 یلاریه - 83 یلاریه - 84 یلاریه - 85 یلاریه - 86 یلاریه - 87 یلاریه - 88 یلاریه - 89 یلاریه - 90 یلاریه - 91 یلاریه - 92 یلاریه - 93 یلاریه - 94 یلاریه - 95 یلاریه - 96 یلاریه - 97 یلاریه - 98 یلاریه - 99 یلاریه - 100 یلاریه



1 كبريت طبيعي - 2 بيريت (كبريتور الحديد) غشبي ازديا - 3 بيريت (مكتنات راحة) - 4 بيريت (مكتن طليق) - 5 - 6 حمار بهن الذهب - 7 تير ذهب طبيعي - 8 تير بلاتين طبيعي - 9 نغمة بلونيه - 10 زرايع البيريت (ميتيكل) - 11 حديد اولمبيتي - 12 ساروز او حديد ماسيم - 13 نكيت ميكريت - 14 نكيت ماسيم - 15 رساس ميكريت - 16 لاصير ماسكند - 17 بيريت القشلي (كلكوبيريت) - 18 مغنيت - 19 نحاس طبيعي - 20 دمنج - 21 زئبقار - 22 لآزورد فتي - 23 حبر او كوبران اصفر - 24 اسرب ، غزالوت



1. مرود لشفاف - 2. تورمالين وردى - 3. كوردواين اسود - 4. من الحجر الاسود - 5. ماس اسود - 6. ماس ابيض - 7. ماس ازرق - 8. سفير - 9. زبرجد - 10. كبريت - 11. بافلوت احمر، لؤلؤ - 12. من الحجر - 13. زبرجد - 14. جصت ابر - 15. جصت قرني - 16. مرود جصني - 17. ياقوت - 18. ياقوت ، طليق ، اسطوخودوس - 19. شيشونيت - 20. شيشونيت - 21. صلبان - 22. صلبان - 23. دمية من الفايغيت - 24. صلبان قرني - 25. كلسيت لؤلؤ - 26. كلسيت سبيتي - 27. كلسيت سبيتي - 28. جص - 29. لافان بولسبي - 30. ملح لؤلؤ



1 أبو البحر - 2 عشاء البحر - 3 بردن بحري - 4 حبرية - 5 أم حوشة - 6 ظلم - 7 براني - 8 موطنة - 9 موطنة - 10 سيفاء - 11 صبرة - 12 خيعة البحر - 13 ترس البحر - 14 أبو جريون - 15 دسكس - 16 بناتاق - 17 نقة - 18 طمسرة - 19 قبة - 20 نيشان (في أبو حوشة) - 21 نيشان (في أبو حوشة) - 22 علية - 23 زب البحر الحولي - 24 زب البحر التلياني - 25 زب البحر النجيل - 26 دويلة - 27 دويلة الخ - 28 دويلة البحر الحمراء - 29 دويلة البحر المشبكة - 30 كوكبة - 31 نجمة الشاع - 32 بنتكرين - 33 كرمات مسيل - 34 عتوكب - 35 دويلة - 36 لصفة - 37 تقاء البحر - 38 عريان الرمل - 39 حلة - 40 أم كلاب - 41 انتارة - 42 فلفوس - 43 أبو سحر - 44 بطريل



نخل بوتان



نخل شائك



نخل كرنبي



نخل كنارية



نخل معروف

جارة قلبه المأكولة . ويزرع للزينة في المراكب وفي المواقع التي لا تحشى السقيح . ساقه قصيرة . كرهه عدم الدرك . سلفه مستطيل الخوص جميل الخضار .

٢٨٦٥٨ - نخل كنارية * ، نخل الجزر الحامض

Phoenix canariensis, *P. tinnis* (S). Dattier des Canaries (F).

نوع من النخل المتوسط القد . جلعه يملو من ٨ إلى ٨ أمتار . ساقه اسطوانية غليظة يبلغ قطرها نحو ١٠ سم . سلفه مستطيل القد ، كثيف الخوص ، متدلل الصنمين الذي يتوسط الزمان الثالث || مهده جزر كنارية ونهبا انتقل الى معظم مناطق حوض البحر المتوسط . ضروبه عديدة مظهرها ترابي سريع النمو يعيش في جميع الأترية وبعضها زراعي يفرس بلبي ثماره المأكولة الحمراء اللون .

٢٨٦٥٩ - نخل معروف * ، نخل

Phoenix dactylifera, *P. excelstor* (S). Dattier fruitier (F). Datt palm (E). Dattelpalme, Palmbaum (D). Palme, Dattaro, Palmzito (I).

نوع من النخل ، كبير القد ، كثير القد ، جلعه متصبية للسوق المستقيمة تملو من ١٢ إلى ٢٥ متراً . جريد سلفه يطول من ٣ إلى ٤ أمتار وهو شائك الكرب غليظ الكرات . غوصه مستطيل البزج المذهب الحديثة ، لونه الى الخضار الازيد || ازهاره عذكري التجميع عند الذكر والانثى عذكوها يضي افرىضا ، ينمو عند ظهوره محاماً بقاية كبيرة تدعى القنن . اما الشكل الانثوي الذي يعمل الثمر فيدهى حرجواً . || ثمره النخيل مستطيلة الشكل ، لينة السقوك ، سكرية الطعم ، مأكولة . نولها برة خشية قاسية يقطها شق طولي عميق يضي الثمر . ولله الثمرة اسماء تعريفية عديدة تختلف مع تطورات مراحلها الحياتية من الارام الى الانواع . فهي بعد الارام سبابة ثم خلالة فيلسة نجدالة فيسرة فربلة وانبراً ثمرة . || اصلاته فحوض البحر الاخر لصر فليسيا فالجازر فراكش . يعيش ايتاً زرع غير انه يفضل الأترية الربلية البدالية بالمواد المضوية والناصر الغذائية كما ازيد حل النخيل العميقة الفور المسجمة الربوية . وكلما ازيد غناء الأترية الحولي وانقطع عن المسانة . || اقليمه الافضل هو الاقليم الذي تشتد فيه الحرارة من اربائل ايار الى ابخر تشرين الاول حيث يبلغ مجموع الساعات الحرارية ، خلال هذه المدة ، نحو ٤٠٠٠ ساعة وكل ان يكون متوسط الربوية الجوية النسبية نحو ٤٠ ٪ || اشهر ضروبه وابجودها ما يقع .

- إيريجي - ثمرته تطول نحو ٥ سم . حراه اللون تشبلك جافة .
- أمهات - ثمرته تطول نحو ٣ سم . شديدة الحلاوة تؤكل ربلة وجافة .
- برقلمو - ثمرته تطول نحو ٤ سم . تشبلك ربلة وجافة .
- بنت عهده - ثمرته تطول نحو ٤ سم . تؤكل ربلة وجافة .
- لوي - ثمرته تطول نحو ٦ سم . قليلة الالياف تؤكل جافة .
- جندالا - ثمرته تطول نحو ٤ سم . تشبلك جافة .
- حلال - ثمرته تطول نحو ٤ سم . حنطية اللون تصعد بكثرة .
- حياي - ثمرته تطول نحو ٥ سم . تشبلك ربلة وجافة .

الهند الشرقية ونهبا انتشر في معظم بلدان حوض البحر المتوسط . يزرع للزينة . ثماره صفيرة حامضة .

٢٨٦٥٩ - نخل بوتان * ، نخل سيكيم ، نخل

المعنى

Phoenix rupicola (S).

Dattier des rochers (F).

نوع من النخل المتوسط القد ، يتشيز بجل حرجوبه من الكراتاف الثام بين الساق والكرب . جلعه يرتفع من ٧ أمتار . سلفه رشيق الشكل يطول نحو ٤ أمتار . غوصه مريض البزج المذهب الطوف || مهده مناطق بوتان وسيكيم من اصمال الهند . وهو من اجل انواع النخل شكراً وارقاً لذلك يزرع للزينة ويوجد منه حل بعض شواطي البحر المتوسط || ثماره حنطية اللون مأكولة يجمعها قدر كبير القد لا يقل طوله من ١٢٠ سم .

٢٨٦٥٩ - نخل زكوتينبار ، نخل مقوس

Phoenix reclinata (S). Dattier de Zanzibar (F).

نوع من النخل المتوسط القد . جلعه رشيق القوام يرتفع من ٤ الى ٦ أمتار وكثيراً ما يتقوس عند زانه الثالث . سلفه مستطيل القد حرجوبه الجريده . كرهه حاد الشوك . غوصه جميل الخضار اللامع || مهده زكوتينبار وما قاربها من القارة الافريقية . وهو من الانواع السريعة النمو يفضل الأترية الجصية ولا يتأذى من فيرها . يزرع للزينة . ثماره صفيرة القد . صفراء اللون لا تؤكل .

٢٨٦٥٩ - نخل سرديب ، نخل سيلان

Phoenix ceylanica (S). Dattier de Ceylan (F).

نوع من النخل المتوسط القد . جلعه يرتفع نحو ٥ أمتار . سلفه يطول نحو ٤ أمتار . كرهه شائك . غوصه مستطيل البزج المذهب ، لونه الى الخضار اللامع || مهده جزيرة سرديب يعيش في حصص ويروج هناك القاحلة . يزرع للزينة .

٢٨٦٥٥ - نخل سيكام

Phoenix siamensis (S).

Dattier de Siam (F).

نوع من النخل المقر العادم الساق . جريده سلفه يطول نحو ٣ أمتار . غوصه كثيف التجميع جميل الخضار الزاهي . يزعم مذهب المقصدة ، طويل الحديثة || مهده سهول سيام الربلية . متطلباته الزراعية قليلة لانه من نباتات العادة وقد رغب في الأترية الربلية التي لا تخلو من الدبال . ثماره اسطوانية اللون مأكولة .

٢٨٦٥٦ - نخل شائك

Phoenix spinosa, *P. leonensis*, *P. senegalensis* (S). Dattier épineux (F).

نوع من النخل المتوسط القد . جلعه متصب الساق يملو من ٤ الى ٦ أمتار . جريد سلفه يطول نحو ٣ أمتار . غوصه جميل الخضار الباق ، يزعم مذهب شائك . مهده افريقية الاسطوانية . رغب في الأترية البليطية الكنكية ولا يحشى الرياح البحرية . يعيش حل شواطي البحر المتوسط || ثماره متوسطة القد ، تحملة الجرم . سبها مرجاني اللون . رطبها احمر حجري . ثمارها سكتي اللون . سكرى الطعم مأكولة .

٢٨٦٥٧ - نخل كرتوبي

Oreodoxa oleacea (S). *Oreodoxa oleacea*, *Palmita franc*, *Chou-palmiste* (F). *Cabbage palm* (E). *Kohl-palme*, *Kohltragende*, *Arelapalme* (D). *Palmito*, *Palma cavolo* (I).

نوع من نخل البلاد الحارة الاسيوية والافريقية . يزرع لحي

royal, Palmier royal (F). Royal wine palm (E). Königspalme (D). Palma regis (I).

نوع من النخل الزراعي الذي يزرع في جلدته ربيع الساق المنتصبة. يهرته تاجية الشكل جميلة القالب. سفه متوسط الطول قليل التحسين. غوصه جميل الخضار الزاهي. طلعته كبيرة القذ فائضة. ثماره صغيرة الحجم. ارجوانية اللون، ناضجة السوق، لا تؤكل، جارة قلبه ما كولة مستسبة العلم.

Phoenix paludosa (S). نخيل متجمي Dattier des marécages (F).

نوع من النخل المتوسط القذ. جلدته سفاه الساق المنتصبة يعلو من ٨ إلى ١٠ أمتار. جريد سفه يعلو نحو ٣ أمتار وهو شائك الكرب عجين الزمام الأخير. غوصه جميل الخضار القسبي. يزرع مذهب الطرف || مهدد منافع المخذ الشرقية وقد يعيش في جميع الأتربة الدهبالية الرطبة. ثماره لا تخلو من الحلاوة لونها إلى الصفار القاتم.

Phoenix aculis (S). نخيل تجسي Dattier acule (F).

نوع من النخل العادم الساق. سفه كبير القذ ريشي الخوص. يزرع صلب النصل، مذهب الطرف، جميل الخضار الزاهي || مهدد مرتقات سهل المخذ شرقي بحر الكنج || ثماره خرية اللون حاضرة العلم لا تؤكل. يزرع للزينة وقد يعيش على الشواطئ اللبنانية ويعود في الأتربة الرملية القليلة الرطوبة.

Palmicole (F). نخلائي ٢٨٦٦٤

نمت تصريفي يطلق على كل ما يعيش على النخيل أو ينمو عليه.

٢٨٦٦٥ نخلة الجوز نخلة الكويته، اطلها.

٢٨٦٦٦ نخلة السكر * أرثما

Arenga saccharifera, Borassus gomutus (S). Areng. Palmier areng, P. à sucre (F). Gomuti palm (E). Gomutepalme, Zuckerpalme (D). Palma arenga, P. dello zucchero (I).

نوع من النخل الهندي المنبت، تكثر زراعته في المخذ والكوشين وباروا وبلقه حيث يستخرجون السكر من ثماره. ساقه منتصبة رفيعة تملو من ١٥ إلى ٢٠ م. سفه كبير القذ متعاهد الخوص. يزرع مقطوم الطرف، فصله عابق الخضار || ثماره لينة التجميع حلوة المذاق يستخرج منها حصاره سكرية شائعة الانتباه.

Palmaceae (S). نخليات ٢٨٦٦٧

Palmacées, Palmiers (F). Palmae, Palm-trees (E). فصيلة نباتية من وسيدات الفلقة. اجناسها وانواعها زهاء ١٠٠٠٠ اصنافها البلاد الحارة والاشواطية من المالحين القدم والجديد. جلوعها وسيدة السوق الريفية المنتصبة. اوراقها سفية التركيب حامية الاوتكار. ازهارها وسيدة او ثنائية المسكن. ثمارها لا تقياسية الشكل والحجم لينة السوق.

٢٨٦٦٨ نخيلين Palmatine (F). Palmitein (E). مادة بلورية توجد في الدهن ويكثر وجودها في حافض النخل وقد تستحضر بتألف الحامض النخل مع الفلوسرين.

٢٨٦٦٩ نخوس هو النخس، اطلها.

٢٨٦٧٠ نخيب Sélectif (F). Selective (E).

خداوي - ثمرته تطول نحو ٤ سم. صفراء اللون. جيدة الصنف.

خلاوي - ثمرته تطول نحو ٤ سم. تعتبر من اجود الاصناف وافضلها.

خاجانا - ثمرته تطول نحو ٤ سم. تسهل جافة.

خجلة اللور - ثمرته تطول نحو ٤ سم. تعتبر من اجود الاصناف وافضلها.

خاهدي - ثمرته خضية اللب متوسطة القذ جيدة الصنف.

خاطولي - ثمرته كبيرة القذ شديدة الحارة فائضة الصنف تؤكل رطبة.

خاطاني - ثمرته كبيرة القذ حنطية اللون فائضة الصنف تؤكل جافة.

خماي - ثمرته ريفية الشكل صفراء اللون تؤكل رطبة ورطب.

خهدي - ثمرته صغيرة القذ شديدة الحلاوة كثيرة الالياف.

خراسي - ثمرته صغيرة القذ تؤكل رطبة وجافة.

خريزي - ثمرته متوسطة القذ فائضة الصنف تؤكل رطبة.

خجلاني - ثمرته متوسطة القذ جيدة الصنف تسهل رطبة وجافة.

خجوي - ثمرته تطول نحو ٧ سم. جيدة الصنف تؤكل رطبة وتصدر.

خساطوي - ثمرته متوسطة القذ فائضة الصنف تؤكل رطبة.

كسي - ثمرته متوسطة القذ متخارة جيدة الصنف تؤكل رطبة وجافة.

خنجول - ثمرته كبيرة القذ فائضة الصنف تؤكل رطبة.

مقطوم - ثمرته متوسطة القذ متخارة جيدة الصنف تؤكل رطبة.

نرمياني - ثمرته كبيرة غليظة صفراء اللون جيدة الصنف رطب.

وتمر النخل ان رطبة او جافة، اي تمر، غنية بالاملاح المعدنية القلوية التي تعادل حموضة الحوم والبيض والخبز وهي غنية بالفيتامين (١) ومتوسطة البنى بالفيتامين (ب) و (د)، اما متوسط العناصر المختلفة الموجودة في ١٠٠ غ. من لب التمر فهو :

٣٠ ٪ من الماء

٩٥ ٪ من السكر

٣ ٪ من البروتين

١ ٪ من الحامض

هذا مع العلم ان القيمة الغذائية للمواد السكرية الموجودة في التمر توازي نصف قيمة السكر العادي.

٢٨٦٦٠ نخيل معلاقي

Phoenix pedunculata (S). Dattier pédonculé (F).

نوع من النخل الصغير القذ. جلدته اسطواني الساق يعلو نحو ١٠٠ سم. جريد سفه يعلو نحو اربعة أمتار. غوصه مستعرض كبير يعلو نحو ٣٠ سم. يزرع جميل الخضار الزاهي ينضبط عنه زامه الأخير. || مهدد بهبال المخذ الشرقية حتى ارتفاع ٢٠٠٠ م. يعيش في جميع مناطق ساحل البحر المتوسط. يزرع للزينة. ثماره صفراء اللون حنطية المواجه غير مأكولة.

٢٨٦٦١ نخيل ملكي

Oreodoxa regia, Roystonea regia (S). Oréodoxe



٢٨٦٧١ - نَخِيرَة

Branchiostome (F).

النخيرة فوعة مبيقة تمكن الحواشيم من الاتصال بالخارج .

٢٨٦٧٢ - نَخِيرَة * ، غُصْرِيَّة النَبِيح ، لَزِيْد رَمَه
Lasioderma serricorne (S). Lasioderma (F). Cigarette Beetle (D). Tabakkäfer (D).

سحرة من غديات الأجنبية وفضيلة الفطريات . جسمها اسطواني الشكل ، صغير القد ، يطول نحو ٣ سم . قوامها الى الهي الكتستاني المراج يطوى خل المحل . رتبته مضية الجسم ، فراء اللون ، ثنائية الرأس ، مهدبة الظهر والجلاب والاطراف ، تطول نحو ٤ سم || ابيها الحولية عديدة تراوح من ٣ الى ٦ ، جيلها يمر من ٤ الى ٧٢ يوما . الحشرة الكاملة تعيش من ٣ الى ٦ اسابيع تنجح مكثها افراديا على التئن فيقتف خلال مدة ادناها ٥ ايام واصفها ١٠ . اما البرقة تنهش من ٣٠ الى ٥٠ يوما ثم تتصلب بعد انسلخها الثاني الى عذراء ثم الى سحرة كاملة . وهي من سحرات البلاد الحارة والمعتدلة تسرح في الليل وتألف الالساكن الاكلة . رقاتها تركب التئن ولقائف التي فتقع بها الاضرار الجسيمة لانها تنخرها وتطحنها . تكاثرها بواسطة مصائد النور او المصائد الكهربائية .

٢٨٦٧٣ - نَخِيرَة

Beurre (F). Butter (E).

من اسماء الزبدة ولعلها الزبدة الرقيقة كالزبد .

٢٨٦٧٤ - نَخِيرِل

هو النخل المعروف ، اطلبه .

٢٨٦٧٥ - نَد * ، غُصْرَاء

Epilobium (S).

Epilobe (F). Willow-herb (E). Weidenröschen (D). Epilobio (I).

جنس نباتات عشبية خشبية معمرة من فصيلة الاخدريات . انواعها المعروفة نحو ٦٠ منظرها بري ومنها الطبي ويصنها تزيين . منها الاصقاع المنضدة في جميع البلاد . سوقها فراء ، اوراقها كاملة مستطيلة متعاقبة . ازهارها رباعية النصل والبتلات ، ثمانية الاسدية ، سنبلية التجميع ، عوربة الاذنكاز او حامية || اعرف انواعها واشهرها ما يلي .

٢٨٦٧٦ - نَد * وبُيَاعِيَّة الزَوَايَا ، اذُنَاب القطة

Epilobium tetragonum (S). Epilobe angulare (F).

نوع من التند البري الميزل . ساقه صلبة صغوية كثيرة الفروع مغلقة رباعية الزوايا . اوراقه متعاقبة ، رخيصة النصل ، منشارية الحافة ، ناضرة الروق . ازهارها سنبلية التجميع . ازهاره انبوبية اللون وريدة المراج . يوجد في الالساكن الرطبة من الساحل الى الجرد حتى ارتفاع ٢٠٠٠ م . || تنوره يستمر طوال فصل الصيف .

٢٨٦٧٧ - نَد سُبُلِي

Epilobium angustifolium, E. spatum (S). Epilobe en épi, Laurier de St. Antoine (F). Rose-bag willow-herb, Blood vine (E). Weidenröschen, Weidenrich, Antonskraut (D). Epilobie a apighe, Lauro roseo, L. di St. Antonio (I).

نوع من التند الزراعي التزييني الميزل . اربوبة مادة . ساقه فراء تملو من ٨٠ الى ١٢٥ سم . اوراقه متعاقبة متضادة ، نضار سنائي الشكل ناضر المروق على صفحاته السفلى . ازهارها سنبلية التجميع حامي الاذنكاز . ازهاره قزمية اللون قطرها نحو ٣ سم . ومنه صروب يبيض ازهارا وموحيمة || تنوره يستمر من تموز الى آب .

٢٨٦٧٨ - نَد صَغِير الزهر

Epilobium parviflorum (S). Epilobe à petites fleurs (F).

نوع من التند البري الطبي الميزل . ساقه فراء تملو من ٢٠ الى ٥٠ سم . اوراقه زينية متعاقبة ، نضار رخي الصفحة مسن الحافة . ازهارها سنبلية التجميع . ازهارها صغيرة القد وريدة اللون || تنوره يستمر طوال فصل الصيف .

٢٨٦٧٩ - نَد عِفَالِي ، نَد قُضْدِي ، عِفْص ، قُرْلُور

Epilobium hirsutum (S).

Epilobe hérissé, Nériette (F). Great willow-herb, Apple-ple (E). Zottig Weidenröschen (D). Epilobio appressicaulto, Peleso (I).

نوع من التند البري الطبي الميزل . ساقه فراء تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . اوراقه حاشية متعاقبة نضار كبير القد منشاري الحافة خالي البشرة على صفحاته . ازهارها سنبلية التجميع . ازهاره قزمية اللون قطرها نحو ٢ سم . || تنوره يستمر من تموز الى آب .

٢٨٦٨٠ - نَد قُسُومِي

Epilobium rosmarinifolium (S). Epilobe à feuilles de rosmarin (F).

نوع من التند الجلي الميزل . ساقه فراء تملو من ٤٠ الى ١٢٠ سم . اوراقه متعاقبة تشبه اوراق القسوس . نضار صيق الصفحة الجامدة المادية المروق الناشرة . ازهارها عنقودي التجميع ، تأتي الاذنكاز . ازهارها صغيرة القد حراء اللون || تنوره يستمر من حزيران الى آب .

٢٨٦٨١ - نَد مَسْجِي

Epilobium palustre (S). Epilobe des marais (F). Marsh epilobium, M. willow-herb (E). Sumpfweidenröschen (D). Epilobio palustre, Garolanini di padule (I).

نوع من التند البري الطبي يكثر في الملتق والبراق الرطبة . ساقه صغوية فراء تملو نحو ١٥٠ سم . اوراقه متعاقبة متعاقبة مستطيلة . نضار جامد الصفحة مسن الحافة . ازهارها سنبلية التجميع . ازهارها وريدة اللون صغيرة القد . تنوره يستمر من حزيران الى آب .

٢٨٦٨٢ - نَد لَسَنِي

Epilobium mentholides (S). Epilobe mentholide (F).

نوع من التند البري الطبي الميزل يكثر في بعض الجرد البنيانية . ساقه فراء تملو من ٢٠ الى ٤٠ سم . اوراقه نعنمية لائحة لقياسية الترتيب وبشكل مسن الحافة ناذرة المروق . ازهارها سنبلية التجميع . ازهارها صغيرة القد وريدة اللون يضاه المراج || تنوره يستمر طوال فصل الصيف .

٢٨٦٨٣ - نَدَاة

Couronne solaire (F).

Solar corona (E).

التدأه هي دائرة الشمس .

٢٨٦٨٤ - نَدَاخَة

Taxonomie, Taxinomie (F).

Taxonomy (E).

٢٨٦٨٥ - نَدَاخَة * ، عَدَاخَة الغاب

Luscinola melanopogon (S). Lusciniole à

moustaches (F). Moustaches Warbler (E).

عصفور من الموازج وفضيلة المغليات . موطنه يشعل معظم مناطق حوض البحر الأبيض المتوسط . اعطاه البنيانية تحت من السواحل الى الجرد والبراق || جسمه رشيق القوام يطول نحو ١٣ سم . وبسطه نحو ١٥ سم .



نخيرة (البرقة والاكثة)



نخيرة (الحشرة)



نَد



نَدَاخَة

والكوليت والنزك ... لان وجودها إلزامي ان من الوجهة الانشائية او من الوجهة الغذائية .

Bourrelet, Bourlet (F).

٢٨٦٩٢ - ندبة

Pad, Cushion (E).

اثر الجرح بعد التآلم في النسيج الحوياني والنباتية .

٢٨٦٩٣ - ندحة ٥ ، ندحة ٥

Barème, Barrème (F). Printed table, Schedule (E).

Barème des prix (F). ندحة الأسعار

Price table (E).

٢٨٦٩٥ - ندحة الجعائل

Barème des salaires (F). Wage table (E).

Apponter (F). To land (E). ندغ ٥

شد المركب بالصقالة المخصصة لربطه .

Aborder un rivage (F). ندغ ٥

Phototropisme (F). ندغ ٥

Phototropism (E).

الندد وتدعى جاذبية النور ، خاصة تتميز بها بعض اعضاء النبات في توجيه اطرافها نحو النور .

Satureia (S). Sarriette (F). ندغ ٥

جنس نباتات برية مخشوشة قابلة من فصيلة الشفويات . انواعه عديدة متفارقة الاشكال والاحجام منها المشية والبطية والنبية . اوراقها طرية لا تقياسية القد متعاقبة او ضعية . ازهارها ابطية الارتكاز او تاجية يكثر فيها اللون الابيض والبنفسجي والاحمر . بعضها متفرقة يجرها النحل . اعراف انواعه واشهرها ما يتبع .

٢٨٧٠٠ - ندغ اكرتيي * ، ندغ صغرتي

Satureia thymbra (S). Sarriette de Crète (F). Savory of Crete (E). Kretisches Bohnenkraut (D). Santoreggia verticillata, Tragorigano (I).

نوع من الندغ الطبي الممر . عشته نجمة صغيرة الحجم . اوراقه ضمية التجميع صغيرة القد ، نصلها سناني الشكل خلى البصرة الرضاء اللون . ازهاره ثلاثية التجميع بنفسجية اللون ودية الملوخ || ازهارها يستمر من تموز الى ايلول .

٢٨٧٠١ - ندغ الجبيل * ، زوباع البر ، صغتر الجبيل

Satureia montana (S).

Sarriette montagnarde (F).

نوع من الندغ الطبي الممر . مجلته تملر من ٤ الى ٨٠ سم . ساقه مخشوشة فراء . اوراقه سنانية مستطيلة مدهية المنصعة . نصلها جامد الصلابة اللامعة مذهب الحمار . ازهاره ودية اللون او بنفسجية || تنوره يستمر من تموز الى ايلول .

٢٨٧٠٢ - ندغ بُستاني * ، زوباع ، صغتر البر

Satureia hortensis (S). Sarriette des jardins (F). Summer savory (E). Gartenbohnenkraut (D). Santoreggia, Timbra, Cunlia (I).

نوع من الندغ اصيل المبرور يكثر من النباتات الطبية الجزيلة النفع العديدة الفوائد الصحية وهو من التوابل المستحبة العلم والرف . اوراقه سنانية النصل ، رطلة

ثوبه الى النبي الاصل . رأسه كسني اللون اسود المحلج . محسره الى الكسني يتوسخ خط ابيض يملو العين . رذائو وظهوره وجناحاه رميزو وذنبه الى النبي الاصل يملو شمشج عايق . زوره اخير ابيض . صدره الى الذبيرة البنية . حلقة حية بنية . سبكه واقر الحلب وهو ما دعى الى تلقيه و يائي شوارب || الاثنى اصغر قدماً من الذكر وابنت ثوباً منه || يأنف للمقاصب والمائل والإجام وضفاف مجاري الماء . تفرده صداح لطيف متباين الانغام القصيرة . يذئزئ عشه في الآجام المفضلة على ارتفاع من عن سطح المتسع او التربة || الاثنى تحضن ثلاث مرات في السنة . حضنتها من ٣ الى ٥ بيضات ترزفها بمناوية الذكر نحو ١٢ يوماً || قوته الحشرات المهنعة اضعفها الفراش والذباب والحلوم ثم الديدان والوزاق || يعتبر من الصنابير النافعة .

Photophile (F).

Photophilous (E).

نمت تفرقي يطلق على كل حيوان او نبات لا يعيش الا في النور .

٢٨٦٨٧ - نداسة البُسر * ، نارية البُسر

Ephestia calidella (S). Pyrale des dattes (F).

فراشة من التارويات صغيرة القد براءه اللون مجلحة بالاسود . ريقها دقيقة نحيلة ججوية اللوب تقرض البسر وتطبه .

٢٨٦٨٨ - نداسة الفيج * ، نارية الفيج

المجسكة

Ephestia elutella (S).

Pyrale des tabacs, Pyrale des fruits secs, Teigne du cacao (F). Tobacco moth, Cacao moth, Currant moth (E). Dürrobsteinsler, Kakaomotte, Henmotte (D).

فراشة صغيرة القد من فصيلة التارويات ، بسطها نحو ١٧ م . روشانها الاماميان الى الكهبة الزرقاء الملوخ ، روشانها الخلفيان الى الربعة . ريقها صغيرة دقيقة رضاء اللون تميش على غطت لئار المجففة والخبز والبسكوت واوراق التبغ الجافة المخزونة || احيائها الحولية وهي مرقطة بموالم المناع تراوح من ٣ الى ٥ .

٢٨٦٨٩ - نداسة الدقيق * ، نارية الدقيق

الفجرء

Ephestia kuehneliella (S).

Pyrale de la farine (F). Mediterranean flour moth (E). Mehimotte (D).

فراشة صغيرة القد من فصيلة التارويات . بسطها نحو ١ م . روشانها الاماميان الى السرة الخطية يعترضها تجديس وتيجي . روشانها الخلفيان مهديا الحمار ثوبها الى البياض الاغبر يملو شعاع اشقر . احيائها الحولية تنويها ، تكثر في الاماكن الحارة وتقتل في الباردة . ريقها دقيقة الجسم ، حنطية اللون سواد الرأس ، تميش على مختلف انواع الدقيق .

٢٨٦٩٠ - نداسكة ٥ ، قدفي ٥ ، كيميسيا حية

Biochimie (F). Biochemistry (E).

قسم من علم الكيمياء يبحث في تفاعلات المادة الحية .

Oligo-éléments (F).

Trace elements (E).


تدريج دائر . اسم يطلق على العناصر التي تدخل في المركبات العضوية والنباتية بكميات متناهية الصغر كما هي الحال في اليود واليوتان والزنك والنيكل والحديد



نداسة البسر



الفراشة



البقرة

نداسة الفيج



نداسة الدقيق



ندغ اكرتيي



ندغ الجبيل



ندغ بُستاني



ندوة



نداية سبدولة



نرتين



نرجس أخضر



نرجس اسلي



نرجس الشعراء

تطول من ٤ إلى ٧ م. أزهارها صفيرة لقد خضراء اللون تنمو خلال شهر حزيران. ثمارها عنبية قدراها قدر الحصة الصغيرة لوئها الى الحرة البرتقالية المواج .

٢٨٧١٤ - نَرْجِسِيَّة *
Neritina (S).
Nérítine (F), Neritina (E).

جنس حيوانات مائية من الرخويات مليات الاربل وفضاية الاقربيات . انواعها المعروفة نحو ١٥٠ منتشرة في معظم مناطق البلاد الحارة . منظرها بهري ومتين وبعضها بحري . جميعها مفترسة || اصداؤها شبيهة الاشكال ، يكثر فيها الشكل البرمي المنحرف القليل الحلزونية المحصورة في الاغاط . جميعها ملونة ، قل فيها اللون السري وكثر التضلع والتجديع والرسنجة والزرقعة .

٢٨٧١٥ - نَرْجِسِيَّة *
Nérítique (F).
نمت ثمريني يطلق على كل منطقة رسوبية تنمرها المياه ولا يتجاوز غورها ٢٠٠ م .

٢٨٧١٦ - نَرْجِس ، قَهْد *
Narciss (S).
Narcisse (F).

جنس نباتات بصلية حولية سمرقية من فصيلة النرجسيات . انواعها وضروبه واصرامه كثيرة العدد . ازهارها فواحة العرف لاقياسية للتجميع منها الفردية والثنائية والثلاثية والرباعية حتى العشارية . وفي تركت على شراخ اجوف يعلو شرافت قصير بسيط يحتمل توضع لاقياس الشكل منه القسعي والبرقي والجبري والفلولي . اوراقه قرصية الانتشاب ، قديمة التصل ، مستطيلة || يعيش ويوجد في جميع الارضية الزراعية ولا يخفى سوى فوط الانتماج وكثرة الرطوبة .

٢٨٧١٧ - نَرْجِس أَخْضَر *
Narcissus viridiflorus (S), Narcisse vert (F).

نوع من النرجس الجاح . اوراقه قرصية الانتشاب ، اسطوانية التصل الخلد . شراخه الزهري دقيق ونحيل . ازهاره عطرية الرائحة ، وحيه البتلات اللحية الخضراء اللون . وفي لاقياسية التجميع يراوح مدحها من ١ الى ٤ . توجعها دولابية الشكل || ينمو في تشرين الثاني .

٢٨٧١٨ - نَرْجِس اسْكِي * ، جنكوبل *
Narcissus jonquilla (S), Jonquille (F), Jonquil (E), Jonquille (D), Giunchiglia, Narciso d'Oriente (I).

نوع من النرجس السبروتي . ضروبه واصرامه كثيرة العدد . اوراقه قرصية الانتشاب نصلها اسطوانتي الشكل ، عند الصفحة ، يطول من ١٥ الى ٣٠ سم . شراخه الزهري دقيق القصبه يطول نحو ٣٠ سم . ينتهي بقصبة من الازهار يراوح مدحها من ٢ الى ٦ ، توجعها كروي الشكل ، رائحتها فواحة العرف البرتقالي ، لوئها الى الصغار الحادق . ينمو في نيسان .

٢٨٧١٩ - نَرْجِس الامازون *
نوع نضري الامازون ، اطليه .

٢٨٧٢٠ - نَرْجِس الشَّعْرَاء * ، عَقُور *
Narcissus poeticus (S), Narcisse des poëtes, Herbe à la vierge, Claudinette, Moulin à vent (F). Poet's daffodil (E), Dichter Narcisse (D), Narciso dei poeti, Fior maggi (I).

نوع من النرجس السبروتي . ضروبه كثيرة العدد . اوراقه

الصلمحة ، قاعمة الخضار . ازهارها صفيرة لقد يضاء اللون او وردية || تنموه يستمر من تموز الى تشرين الاول .

٢٨٧١٣ - نَدِيَّة *
هي البرويلم ، اطليه .

٢٨٧١٤ - نَدَوَّة *
Cressa (S), Cresse (F).

جنس نباتات عشبية برية معمرة من فصيلة السبقونيات . انواعها المعروفة ثمانية منها سواحل البلاد الحارة من الملين القديم والجديد . ازهارها حديدية الالوان عديمة العرف .

٢٨٧١٥ - نَدَوَّة زَرْعِيَّة *
Comice agricole (F).
Agricultural committee or show (E).

كل جمعية زراعية تعمل على انتشار الزراعة العملية الصمحة .

٢٨٧١٦ - نَدَوَّة عَسِكِيَّة *
هي الارق ، اطليه .

٢٨٧١٧ - نَدَوَّة *
Phototropique (F).
Phototropic (E).

ما هو منوط بالند .

٢٨٧١٨ - نَدِي *
Rosée (F), Dew (E).

واذ يتكاثف بسبب الرواء على النباتات والاشياء للموجودة في الغلا || وني التخصص يطلق الذي على ما سقط من بلل آخر الليل وما الذي يسقط اقل فهو السدى .

٢٨٧١٩ - نَدِي السَّحَر *
Romarin (F).

هو حصا ابله ، اطليه .

٢٨٧٢٠ - نَدِيَاة سَبْدُولَة * ، دَوْدَة السَّبْط *
Nadassa obsoleta (S).

فراشة من فصيلة الجفانيات ، صغيرة لقد طولها نحو ١٢ م . نوبها الى الخطي البني . اجنتها موشة بثلاثة خطوط متعرجة متعرجة لوئها الى السمرة الداكنة . زباناها مشطية الشكل . الانثى اكبر حجماً من الذكر وانقض لوئها . تمتع مكثها الاخضر اللون على فروع واغصان السبسط ينقث في رقات ثلثم الالوان وتعمل الاشجار ثم تلصق شرائق ، اسطوانية الشكل ، مستدرة القطعين ، دقيقة الوسط ، خطوط حمريري اسمر ، تبيت فيها وتتحول الى حذوة || اما الزقعة فسواء اللون ، هلبة القشار يقطبها غطان طليان لوئها الى البرتقالي وتحصل في كل من حلقاها الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والحادية عشرة غدة جرابية عسمة بالمحب الاسود المتيق تستعمله للدفاع عن النفس ليلهب جلد الجسم الذي يلقى به .

٢٨٧٢١ - نَدِيَان *
هو النيدمان ، اطليه .

٢٨٧٢٢ - نَدِيَّة *
Cicatricule (F).
Cicatrice, Tread (E).

النديبة علامة يضاء تشاهد على حريق البية ، اي صلاها . يتكون منها الجزء البروتوبلاستي حيث تشا الجرثومة الحية مزكوة كانت او غير مزكوة .

٢٨٧٢٣ - نَرْجِيَا *
Nertera (S), Nercara (F).

جنس نباتات عشبية معمرة وسولية من فصيلة الفويات . انواعها المعروفة قليلة . مهمها بلاد زيلندا الجديدة . سوقها مشوقة تملو من ٥ الى ١٠ سم . اوراقها يفيضة التصل

الصفار البرتقالي. شروبه وأصممه الزراعية عديدة
أوراقها استطالة الشراخ ولون الزهر .

٢٨٧٢٧ - نرجس نسيمي * هو الزئير ، اطلبه .

٢٨٧٢٨ - نرجس بّيغوب *

Sprekella formosissima (S). *Sprekella magnifiqua*,
Lis St. Jacques, *Amaryllis à fleur en croix* (F). *Jac-*
bean lily, *St. Jame's-cross lily* (E). *Echte Jakoballie*
(D). *Giglio di St. Giacomo*, *Croce di St. Giacomo* (I).
نبات يصل من فصيلة النرجسيات بذرع الزئين. أوراقه
مزوجة التصفيف ، قرصية الانتشاب ، عصفية الشكل
تظهر بعد الأزهار . أزهاره مركب من زهرة كبيرة واحدة
ترتكز على شراخ يعلو نحو ٦٠ سم. بتلاتها متدلية تطول
نحو ١٠ سم. لونها أبيض الأخرى القزمية العاقية. زراعتها
لا تتطلب حناية خاصة إنما يرغب في الأتربة القليلة
الانتماس .

٢٨٧٢٩ - نرجسيات * *Amaryllidaceae* (S).

Amaryllidacées (F). *Amaryllidaceae* (E).
فصيلة نباتية من وحدات الفلقة ، أجناسها وأنواعها كثيرة
العند منتشرة في جميع اصقاع العالم . أشهر أجناسها
النرجس والنرجوس والأماريلس والباهرة .

٢٨٧٣٠ - نرجسوس * *Hippeastrum* (S).

Hippeastrum (F).
جنس نباتات يصلية عشبية من فصيلة النرجسيات . أنواعه
وضروبه عديدة . أوراقها قرصية الانتشاب ، قدية الشكل.
شماريتها الزهرية مجوفة . أزهارها هامة وبحورية متدلية ،
قمية القالب ، سداسية البتلات ، عديدة الألوان المختلفة
التي تراوح من الأبيض إلى الأحمر القرمزي || أعرف
أنواعه وأشهرها ما يتبع .

٢٨٧٣١ - نرجسوس أرجواني * *Hippeastrum rutilum* (S). *Hippéastre écarlate* (F).

نوع من النرجسوس السروتي. يصلته ردية الجذور . أوراقه
مستعرضة جميلة الخضار الزاهي تطول نحو ٣٠ سم. شراخه
الزهرى يعلو من ٣٠ إلى ٦٠ سم. أزهاره ثنائية التجميع ،
مقاربة الانتكاز ، حاملة العرف ، أرجوانية اللون .
تنوره يستمر طوّل فصل الربيع .

٢٨٧٣٢ - نرجسوس أميرى * *Hippeastrum sulcum* (S). *Hippéastre princier* (F).

نوع من النرجسوس السروتي . هذه البرازيل . أوراقه
عديدة جميلة الخضار تطول نحو ٤٠ سم. شراخه الزهرى
يعلو نحو ٥٠ سم. ينتهي بزهتين كبيرتين لونياً إلى الآخر
المغلف بالجوي أما التويج فاخضر اللون ، مذهب التهديد .
تنوره يستمر طوّل شهر كانون .

٢٨٧٣٣ - نرجسوس الملكة كارولين * *Hippeastrum reginae* (S). *Hippéastre de la reine*

Caroline (F).
نوع من النرجسوس الجانح . أوراقه عديدة مستطيلة النصل
الضيق . شراخه الزهرى يعلو من ٥٠ إلى ٦٠ سم. أزهاره
وردية التجميع كبيرة اللد أرجوانية اللون يتوسط تويجها
بجود خضى || تنوره يستمر من أيار إلى تموز .

٢٨٧٣٤ - نرجسوس بّيغاني * *Hippeastrum psittacium* (S). *Hippéastre perro-*

quet (F).
نوع من النرجسوس السروتي الشائع الزراعة . أوراقه خضراء

قدية مستطيلة . شراخه الزهرى يعلو من ٣٠ إلى ٥٠ سم.
ينتهي بزهرة واحدة ، كبيرة اللد ، عطرية الرائحة ،
بيضاء اللون ، ترتكز على تويج أسفر القالب ، أحر الأطراف .
ينور في الربيع .

٢٨٧٣١ - نرجس برّي * ، نرجس بّيغاني ،

سيراس

Narcissus pseudonarcissus, *N. sylvestris* (S). *Nar-*
cisse sauvage, *N. trompette*, *N. des prés*, *Porlon*,
Clochette des bois, *Coucou*, *Jeannette* (F). *Wild*
narcissus, *Daffodil*, *Lent lily* (E). *Gemeine Narzisse*
(D). *Narciso del boschi*, *N. falso*, *Tromboncino* (I).
نوع من النرجس السروتي الملهول . أوراقه قرصية
الانتشاب ، خنسية أو سداسية المدد . نصلها منتصب
الصفيحة النسيطة . شراخه الزهرى يعلو نحو ٣٠ سم.
ينتهي بزهتين كبيرتين بويّة التويج لونياً إلى الصفار
الكبري || ينور في آذار . يعيش في جميع الموائل
والأتربة .

٢٨٧٣٢ - نرجس شرقي * ، مضطرب

Narcissus orientalis, *N. tazetta* (S). *Narcisse taz-*
zette, *N. à bouquet*, *N. de Constantinople* (F). *French*
daffodil, *Polyanthus narcissus* (E). *Tazetten-*
Narzisse (D). *Narciso a mazzetto*, *Tazzetta* (I).
نوع من النرجس السروتي الملهول . شروبه وأصممه
لا تقل من ١٢٠ سم. جميعها من نباتات حوض البحر المتوسط .
أوراقه قرصية الانتشاب قدية النصل البحري الخضار
الليلي التخفيف . شراخه الزهرى قوي القصبية يعلو
من ٣٠ إلى ٥٠ سم. ينتهي بضمة من الزهر . أزهاره مستطيلة
الان ، متدلية ، متوسطة الحجم ، لونياً إلى الأبيض الأصفر
الموابع ، عرقها ذكي الرائحة القليلة || ينور في الربيع .

٢٨٧٣٣ - نرجس عطر * ، جرناء

Narcissus odoratus (S). *Narcisse odorant*, *Camper-*
nelle, *jonquille campernelle* (F). *Campernelle jon-*
quil (E). *Wohriechende Narzisse* (D). *Girasopo*,
Gracoli (I).
نوع من النرجس السروتي الشائع الاستعمال الزواي .
أوراقه ميزانية الشكل ، جميلة الخضار الزاهي . أزهاره
ثنائية أو رباعية التجميع ، ذكية العرف ، صفراء اللون ، ترتكز
على تويج قسي الشكل يكمل حامة الشراخ الذي يعلو
نحو ٣٥ سم. || ينور من آذار إلى نيسان .

٢٨٧٣٤ - نرجس عتكيبي * *Pancratium* (F).
هي ألفتة ، من النرجسيات ، أطلبها .

٢٨٧٣٥ - نرجس مضطرب

Narcissus serotinus (S). *Narcisse tardif* (F).
نوع من النرجس الجانح المضطرب . أوراقه خيطية الشكل
راوح عددها من ١ إلى ٢ ، شراخه الزهرى دقيق ونحيل
يعلو من ١٠ إلى ٢٥ سم. ينتهي بزهرة وسيلة كبيرة
اللدة ، عطرية الرائحة ، بيضاء اللون ، صفراء التويج . ينور
في تشرين .

٢٨٧٣٦ - نرجس مدوسي *

Narcissus bulbocodium, *Corbularia bulbocodium* (F).
Narcisse bulbocode, *Trompette de méduse* (F).
نوع من النرجس السروتي . أوراقه قرصية الانتشاب
قدية النصل الضيق المستطيل . شراخه يعلو نحو ٣٠ سم.
ينتهي بزهتين كبيرتين . تويجها بوي الشكل لونياً إلى



نرجس برّي نرجس شرقي



نرجس عطر



نرجس مدوسي



نرجس مضطرب



نرجس

٢٨٧٤١ - نُزْرَاة

النزاء : داء يأخذ الدم فتزود منه حتى تموت .

٢٨٧٤٢ - نُزْرَاع ، نَزْرَاع (F). Conflit (E).

هو التماس بين مؤقنين . وهو في القانون الإداري خلاف بين محكمتين على اختصاصهما في النظر بدمي واحدة .



نَزَّاف مِهْلُوف

٢٨٧٤٣ - نُزْرَاك (F). Litige (E).

خاصية تلقني إلى رفع دعوى .

٢٨٧٤٤ - نُزْرَاف

Vampyrus (S).

Vampire (F). Vampire (E).

جنس خفافيش من فصيلة الوقيثات . أنواعه عديدة ، موطنها البلاد المتتلة المنسقة نحو الحارة ، تكثر في أمريكا الجنوبية ، أجسامها مستطلة القدة . رؤوسها ضخمة ، مستطيلة . فرائسها بارزة . زوالها المنقرية سنانية الشكل ، كبيرة ، ضيقة . أظفارها لا أثر لها . تألف الأجرار الكثيفة والأجارار القضة . تنوي مفردة . ذكورها تقرب أناثها عند الكرم فقط . مسرحها من السق إلى العنبر . قوتها الحشرات والآبار والدم تستنزف من مختلف الحيوانات انصمها الحيل والبقير * أرف أنولاه وأشهرها الزئاف المينول .

٢٨٧٤٥ - نُزْرَاف مِهْلُوف * ، نُزْرَاف شَجَبي

Vampyrus spectrum (S). Vampire spectrum, V. commun (F). Great vampire, False vampire (E).

نوع من الزئاف ، طول نحو ١٤ سم . وبسته ٣٥ سم . ثوبه خفي للملص كسني الرأس والظهر ، أشبه البطن والحواشي . موطنه فصح الأرياء يم أمريكا الجنوبية ، يكثر في الفريسان . يألف الأجرار الكثيفة . قوته الحشرات والآبار والدم .



نَزَّاق

٢٨٧٤٦ - نُزْرَاق * ، أُر عَصَن

Antidorcas onchore (S).

Gazelle à bourse, Sprinbok (F). Sprinbok (E).

نوع من الغزلان . حيوان لبن مجتر أجوف القرن ثنائي الاختلاف . موطنه إفريقية الجنوبية . تألف السباب . ملجأه الحيائي جامي . إجله بعد بعض المئات * جسمه ربع القامة ويثيق القوائم كسائر الغزلان . ثوبه إلى السمرة المحلطة . عتقه وصدره وبطنه قهقه إلى الأبيض اللبني المالح . قرنه متتابع الحيد ، ذرب الطرف المنصطف * يتميز بالطفة وبسرعة الدم وبتياع التفرز الجهد الهبال .



نَزَّاقَة

Pilea (S).

Pilée, Herbe au feu d'artifice (F).

جنس نباتات عشبية برية من فصيلة الأنجيرات . أنواعها المنقرية عديدة جميعها من نباتات المناطق الاستوائية والحارة . معظمها معمر وبشها حولي * سوقها قرءاء . أوراقها متطابقة ، منقطة ، سنانية الشكل ، مستطيلة التنبيب . قصاها كثيرة المروق والاعصاب ، خلية البشرة ، مسنة الحواشي . أزهارها وحيدة المسكن ، متفردية التجميع ، أبطية الارتكاز . مأبر أزهارها الذكورية تنضج عند ادراك الطلع وتقلد به بهيا * منها أنواع تزيينية لزروع في المصاري اعصها الزئاقه النخامية (Pilea mucosa) .

اللون طول نحو ٤٥ سم . شراخه الزهري يعلو من ٦٠ إلى ١٠٠ سم . أزهاره عوربة الارتكاز ومانية ، ثنائية التجميع ، لزها إلى الخصار المصلع والمخدع بالآخر الترمزي . لنوره يستمر من الربيع إلى الخريف .

٢٨٧٤٥ - نُزْرَجُوسُ جَرَل

Hippestrum bifidum (S). Hippéastre bifide (F).

نوع من النرجوس السبروي . أوراقه بحرية اللون طول نحو ٣٠ سم . شراخه الزهري يتقدم الأوراق ويعلو من ٢٥ إلى ٣٥ سم . ضمت الزهرية تجم من ٤ إلى ٦ أذهار . تزييها مهذب اختار ، أزهاره جزلة طول نحو ٥ سم . بلانها قرنية اللون يتوسطها خط اعصر لنوره يستمر من حزيران إلى ايلول .

٢٨٧٤٦ - نُزْرَجُوسُ قَهْدِي

Hippestrum pardinum (S). Hippéastre leopard (F).

نوع من النرجوس الجالح . أوراقه شديدة الخصار طول نحو ٦٠ سم . شراخه الزهري يعلو نحو ٥٠ سم . أزهاره كبيرة القدة ، حابية اللون ، مقلطة بالآخر الجوزي * لنوره يستمر طول شهر شباط .

٢٨٧٤٧ - نُزْرَجُوسُ مَوْشَح

Hippestrum vittatum (S). Hippéastre à bandes, Amaryllis à bandes, A. de Rouen (F). Banded amaryllis (E). Bandière Amaryllis (D). Amarillistricia (I).

نوع من النرجوس السبروي الشائع الزراعة . أوراقه حابقة الخصار طول من ٦٠ إلى ٧٠ سم . وتعرض نحو ٥ سم . شراخه الزهري غليظ القصة الثلثية يعلو من ٩٠ إلى ١٠٠ سم . أزهاره لا قياسية التجميع تراوح ضمتا من ٩ إلى ٩ أذهار ، تكثر في أوسط الشراخ وتقل مع اقترابها من الهامة . والزهرة كبيرة القدة مدبية البتلات المحبنة وهي مقلطة الرائحة حابية يعلو تزييح ودي كامل الخطوط . لنوره يستمر من حزيران إلى تموز .

٢٨٧٤٨ - نُزْرَجُوسُ ٥

Narcissus (S).

Narcine (F). Narcinus (E).

جنس امالك بحرية من السفقيات وفصيلة الرمادات . أنواعها المعروفة خمسة ، اعطائها عمار المناطق الاستوائية والحارة * أجسامها مستدلة الطول ، يرمية الشكل ، مبططة القدم ، مستطيلة الاذناب * من ميزاتها النخامة انطلاق سحاش الخيشومية من اربع فجوات مستطيلة مركزها في مقدم الرأس ، فمجان تحت كل عين * لحومها مأكولة ، مستدلة الصنف .

٢٨٧٤٩ - نُزْرَجُوسَة

Pollithyrus sinensis (S).

Pollithyrus de Chine (F).

خبيرة برية وتزيينية من فصيلة النصفيات . مهدا الصين . ساقتها منسبة لرهام تملو من ٣ إلى ٥ أمتار . فرووها جر الحاء . أوراقها عابلة منقطة متعاقبة . نصلها قلبى الشكل مالم الصفحة العليا خفي السفلى . أزهارها وحيدة المسكن ، عادمة التزييح ، صفيرة القدة ، يشبه اللون . أزهارها مشكولي التجميع ، طرفي الارتكاز . ثمارها حقية الشكل ، رباعية المصارع * تنورها يستمر طول شهر تموز .

٢٨٧٤٠ - نُزْرَاق ، نُزْرُو

Salitè, Monte, Coitè (F).

Covering, Sarving, Cation (E).

النزاء والنزو هو جاع الحيوان الجاهل كالحيل والبقير .

٢٨٧٦٢ - نَزُونِيَّة ° *Nasonia brevicornis* (S).

Nasonia brevicornis (F).
حشرة نافعة من الصفريات النشائية الاجنحة. تتطفل على معظم حشرات ذوات الجناحين اخصها الذباب المنزلي. طولها يراوح من ٢ الى ٣ سم. فويها الى الصغار الاسود الاسفح المواجه. زباناها قصيرة القذ صولجانية الشكل.

٢٨٧٦٤ - نَزِيرِب *Bramée, Bramelement* (F).
Belling (E).

صوت الايائل والظباء.

٢٨٧٦٥ - نَزِيرِف هو النَزَف ، اطلبه .**٢٨٧٦٦ - نَزِيرِيَّة °** *Amphipore* (F).
جنس ديدان خموصية مبهولة في معظم بحار العالم .**٢٨٧٦٧ - نَزِيك ° ، كَاكُر** *Nervalls* (S).
Nasique Kakau (F). *Nose-ape* (E).

قرد وحيد الجنس والنوع من فصيلة الهباريات . موطنه جزر التوايج . يألف الغابات القائمة على ضفاف المنابع ويجاري الماء . طوله نحو ٧٦ سم. وزنه ٧٠ سم. يتميز بأفقه المستطيل الارضية . ثوبه كثيف الشعر الناعم اللبس ، لونه الى الكهبة الصفراء يبق عند الظهر ويمر عند الصدر والبطن .

٢٨٧٦٨ - نَزِيُوس الشَرُونِيَّات ° *Nysius senecionis* (S). *Nysius des senacons* (F).

حشرة خاضعة من فصيلة الطيريات روية غطلفات الاجنحة. جسمها صغير القذ ، طوله نحو ٤ سم. رأسها شبه مربعاني الشوزن ، مذهب اللون . غطلمها صغير . عينها صغيرتان ، ناضرتان . زباناها مستطيلتان . كوشلها والصفحة العليا من بطنها الى الصغار المذهب . الصفحة السفلى الى السرة السوداء . حقيقتها صغيرة بحمرية ، قشراتها شفافة || مسرهما البراري . تركب نباتات فصيلة المركبات واعصها الشرونيات .

٢٨٧٦٩ - نَزُونِيَّة ° *Nisionades* (S).

حشرة من المسيريات . لراشها صغيرة القذ ، مردلية الجسم . حنطية الثوب ، طوله نحو ٢٦ سم. في الذكور والاناث . رواشها كسنتية اللون سغم المواجه ، حنطية التصديق والزركمة في الاناث ، بيض التنقيط في الذكور . يكثر وجودها من نيسان الى حزيران . رفاقها تركب معظم النباتات التريينية دون ان تقتربا شديد الاذى .

٢٨٧٧٠ - نَزُونِيَّة تاج ° *Nisionades tages* (S).

Nisionades tages, *Thanaos tages* (F).
Nisionades tages (E).

حشرة من فصيلة المسيريات روية حشرشقيات الاجنحة . موطنها معظم اصقاع البلاد المعتدلة الحرارة من الشرق الاقصى واروية . فراشها واثمة قوتها رقيق الاضرار . سرقتها تمش على اوراق الشندان والاروس واكثر نباتات القرنيات القراضية || جسمها متوسط القذ يطول نحو ١٢ سم. بسطها نحو ٢٧ سم. رأسها كسنتية اللون . عينها كبيرتان . زباناها صولجانية . جوشنها وبطنها الى الكسنتية الاسمر الاسفح المواجه || رواشن الذكر الى الكهبة الغبراء تملوها في الزوج الاسامي اربع جدات متقطعة كسنتية اللون ويملونها في الزوج الخلفي تحضيب كسنتي متفاوت السرة || رواشن

٢٨٧٤٨ - نَزْر

النزرد ودم في فصرع البقرة . يقال بقرة منزورة اي واردة الفصرع .

٢٨٧٤٩ - نَزْرِع البَرَام

Ebourgeonnage, Ebourgeonnement (F). *Nipping of buds, Dis budding* (E).

هو التثديف اي انتزاع البرام الزائدة أو القسرة لتحويل ما تستهلكه من نسج الى سائر ما تبقى من أعضاء النبات الهوائية .

٢٨٧٥٠ - نَزْرِع المُنَكِيَّة ، اِسْتِمْلَاك

Expropriation
هو سلب المالك ملكه قانونياً لنفع العام على أن يدفع عنه المقدم اليه .

٢٨٧٥١ - نَزْرِعَة ، نَزْرُوع

Atavisme (F).
Atavism (E).
هي البنج والبنوج اي زمة الاحياء في الرجوع الى الاصل الذي اجتمعت عنه اقسامها السابقة أو السالفة .

٢٨٧٥٢ - نَزْرِعَة

|| بقلة كالخضرة تكون بالمرض وليس لها زهر ولا ثمرة ، تأكلها الابل اذا لم يجد غيرها « (ابو حنيفة) .

٢٨٧٥٣ - نَزْرَف ، نَزْرِف *Hémorragie* (F).
Haemorrhage (E).

خروج الدم من مجاريه الطبيعية .

٢٨٧٥٤ - نَزْرَف الرَحِم *Métrorragie* (F).
Metrorrhagia (E).

نزف دمجي يحصل اثناء الحمل يؤدي الى الاجهاض .

٢٨٧٥٥ - نَزْرِكَة *Hemipenis* (F). *Hemipenis* (E).

النزركه تقصيب الذكر عند التزاوجات كالحيات والسلاحف والاعضاء . وهو يتميز بانزواجيته وباشكاله المختلفة وبتماليه للمدية الاطراف أو المسنة التي تمكنه عند انتشارها من الالتحام وعدم الانفلات .

٢٨٧٥٦ - نَزْرُك *Prodit* (F). *Produce* (E).

النزرك والنلة من محاصيل الارض الزراعية .

٢٨٧٥٧ - نَزْرُكَة *Catarrha* (F). *Catarrh* (E).

التهاب الغشاء المخاطي وسيلانه .

٢٨٧٥٨ - نَزْرُكَة والذَّكَة *Grippe* (F). *Influenza* (E).

هي الزؤفة والانفلونزا والنزركه الصدريه الوبائية، مرض مد يصيب الانسان والحيوان .

٢٨٧٥٩ - نَزْرُكَة وقَوِيَّة ، نَزْرُكَة عُدْرِيَّة

Broncho-pneumonie (F). *Broncho-pneumonia* (E).
مرض التهاب الشعب الرئوية يصيب الانسان والحيوان .

٢٨٧٦٠ - نَزْرُكَة شَحْبِيَّة ، بَرُونِيَّة *Bronchite* (F). *Bronchitis* (E).

مرض التهاب الشعب يصيب معظم الحيوانات الناجية لا سيما الخيل والضان .

٢٨٧٦١ - نَزْرُو هو النَزَاء ، اطلبه**٢٨٧٦٢ - نَزْرُوع** *Atavisme* (F). *Atavism* (E).

هي زمة الاحياء في الرجوع الى الاصل الذي اجتمعت عنه اقسامها السالفة . اطلب زمة .



نَزُولِيَّة



نَزِيك



نَزُون



نَزُون تاج

٢٨٧٨١ - نِسِيَّة
Proportionnalité (F).
Proportionality (E).
حالة الأعداد أو الأشياء المتناسبة فيما بينها .

٢٨٧٨٢ - نِسَّة * و نِسْ
Nyssa (S).
Nyssa, Tupéto (F). Tupéto tree (E). Tupelobaum (D). Nissa (I).
جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة النسيات . أنواعها المعروفة قليلة، جميعها أشجار و شجيرات عابلة . جلورها حشفة تستعمل استعمال الفلين . سوقها رقيقة منتصبة الأضراس . لشفاها لينة المادة يسهل اللون . أوراقها متعاقبة جامدة للتصل للاعص . أزهارها لا نظامية التركيب منها الحشوية الخمسة الأضراس ومنها الذكرية الشاذية الأضراس المتعددية التجميع ومنها اللاثوية الثلاثية التور . || ثمارها حبيبة النواة ، لبنة السويق || أحرف أنثواها وأشهرها ما يلي .



نِسَّة

٢٨٧٨٣ - نِسَّة بَيْضَاء
Nyssa candicans, N. ogeche (S). Tupéto blanchâtre (F).
نوع من النسة ، شجرتها متوسطة القد سرية لثنتو تملو من ٦ إلى ١٦ م . أوراقها قصيرة الإصااع تطول نحو ١٥ سم . نصلها أسفلي الشكل مائل الضمعة العليا على السفلى التي تبدو كأنها مغطاة بالرماد الأبيض || عناقيد أزهارها الذكرية صغيرة الحجم . أزهارها اللاثوية فردية التجميع مزخية الأضراس . ثمارها بيضبة الشكل حراء اللون تطول من ٣ إلى ٤ سم . سوقها حاضن اللحم . صمغها عميقة التخديد الطولي .

٢٨٧٨٤ - نِسَّة جَبَّارَة
Nyssa aquatica, N. uniflora (S). Grand tupéto (F).
نوع من النسة ، شجرتها كبيرة الحجم سرية للتو ترهب في المناطق والمواقع الرطبة . تملو نحو ٣٠ م . أوراقها كبيرة القد ، أهليلجية الشكل ، مدببة القمة ، مجعزة بثلاثة أسنان كبيرة القد مستقيمة الأطراف . نصلها مائل الضمعة العليا ، على الشكل . خلقه فني التجميع أخير اللون . أزهارها اللاثوية فردية التجميع . ثمارها بيضبة الشكل تطول نحو ٣ سم . لبها إلى الزرقعة المابقة .



نَسْر

٢٨٧٨٥ - نِسَّة جَبِيَّة
Nyssa sylvatica (S).
Tupéto de montagne (F).
نوع من النسة ، شجرتها كبيرة الحجم سرية للتو تملو من ١٢ إلى ٣٦ متراً . أوراقها مسطيلة الإصااع تطول نحو ١٢ سم . نصلها أهليلجي الشكل لامع البشرة على صمغته . عناقيد أزهارها الذكرية مسطيلة . أزهارها اللاثوية شفعية التجميع براوح مدعما من ٢ إلى ٨ . ثمارها حبيبة القد والشكل لونها إلى الزرقعة المابقة .

٢٨٧٨٦ - نَسْتَر *
Amorpha (S). Amorpha (F).
Amorpha blanchâtre (F).
جنس نباتات برية ورييانية من فصيلة القرنيات . أنواعها المعروفة قليلة جميعها جنات وشجيرات لاقياسية القالب والبرية . أوراقها ريشية ، وريية التركيب ، عابلة . أزهارها مستحبة الرائحة ، سفلية التجميع ، بنسجية اللون || أحرف أنثواها وأشهرها ما يلي .

٢٨٧٨٧ - نَسْتَر أَيْص
Amorpha canescens (S).
Amorpha blanchâtre (F).
نوع من النستر البوروني الرشي . جنسه صغيرة القد تملو نحو ٩٠ سم . أوراقها تطول نحو ١٠ سم . ورقها

الائى قريبة الشبه برواشن الذكر إلا أنها أجهت مابة || لها جيلان في الجيل . تظهر فراشة الجيل الأول في نيسان وتظهر فراشة الجيل الثاني في تموز . تسرح في القبار . تظل عند ظهورها بنسور أربعة أسابيع وتحتج الممكن مباحياً على الصفحات السفلى من نصال الأوراق || السرة عند بلوغها الكمال تطول نحو ٢٢ م . جسمها شبه اسطواني الشكل ، مستقيم الوسط ، مائل الششار ، أحمر اللون ، تملو مابة غصراء زرقاء ، رأسها أسود . مدنها ورواجها إلى السرة القائمة || طور الكمال الذي يستمر في الجيل الأول نحو ١٥ يوم ، يستمر في الجيل الثاني نحو ١٨ أسبوعاً وينتهي ضمن سلجة تحببها السرة بين الأوراق الأبيدة .

٢٨٧٧١ - نَسَاح * و نَسَح *
Lézarde (F).
Crack (E).
انصداع في جدار البناء سببه مرور الزمن أو عيب في البليان أو خلل في الهيكل نتج عن ظرف قاهر .

٢٨٧٧٢ - نَسَاس *
Délisquent (F).
Delisquent (E).
نمت تعريفي يطلق على الأجسام التي تتأخ من تسربها بطوية الهواء .

٢٨٧٧٣ - نَسَاسَة
Délisquance (F).
Delisquance (E).
صفة الأجسام التي تتأخ من الرطوبة التي تمتصها أو تكتسبها من الهواء .

٢٨٧٧٤ - نَسَاف *
طائر له مغار كبير (ابن سيده) .ج . نسايف .

٢٨٧٧٥ - نَسَاف و نَسَافَة
Tarare, Vanneuse (F). Winnowing-machine (E).
آلة تنظف الحبوب بواسطة تيار هواء يتسلط على غرابيلها المزانة .

٢٨٧٧٦ - نَسَاقَة *
Taxologie (F). Taxology (E).
النساق علم يبحث في تنسيق جميع معارف البشر .

٢٨٧٧٧ - نَسَاف و نَسَاف *
Lignage (F). Lineage (E).
هو القرابة في الآباء خاصة . وهو نومان نسب مستقيم وهو ما كان بين الآباء والأبناء . ونسب عرضي وهو ما كان بين الاخوة وبنى الاخوة وبنى الأخام . ج . أنساب

٢٨٧٧٨ - نَسَاف *
Généalogie (F). Genealogy (E).
هو سلسلة تتابع الإنسال في الأسرة الواحدة أو العرق الواحد .

٢٨٧٧٩ - نِسْبَة هَذِائِيَّة و نِسْبَة هَذِائِيَّة
Relation nutritive (F). Nutritive relation (E).
هي نسبة للمواد الأثوية إلى غيرها من المواد الغذائية القابلة الهضم في كل علف أو مخنة .

٢٨٧٨٠ - نِسْبِي و نِسْبِيَّة *
Proportional (F). Proportional (E).
نمت تعريفي توصف به مناسبات الأشياء المختلفة .

وهو من القواطع يحبب أجواء آسيا الوسطى وأفريقية الشرقية والهندية وأروبة الجنوبية . سربه يتألف من ثلاثة إلى ستة أزواج || قوته الجيف على اختلاف أنواعها وإذا جاع تملأ على اللحم والماعز والبطايا || الذكر لا يفارق أنثاه مدى الحياة . يلدن وكه بين فروع شجرة دامية على ارتفاع بضعة أقدام من الأرض || أثناء تبيض رقتين كبيرتين لونهما إلى الرماد الاطلح تملو رقة حمراء . اخضن يستمر نحو ستة أسابيع تقارب عليه الاثنى والذكر .

٢٨٧٩٤ - نَسْرٌ أَمْرِيكِيٌّ Condor (F).
هو الكنتور ، اطلبه .

٢٨٧٩٥ - نَسْرٌ طَائِرِ Altaïr (F). Altaïr (E).
النسر الطائر ويدهى الطير ، نجم نيز من كوكبة العقاب .
رأبع طير .

٢٨٧٩٦ - نَسْرٌ قَتَّاعٌ Condor (F).
هو الكنتور ويدهى النسر الامريكى ، اطلبه .

٢٨٧٩٧ - نَسْرٌ قُبْرَانِيٌّ * ، نَسْرُوسٌ Vultur occipitalis (S). Vautour huppé (F). White headed vulture (E).
نوع من النسر ، كبير الهامة قدرة قدر نسر الجواء . ثوبه الى البياض الاغبر ازراي المواج . قرص رأسه متربع بقشرة صغيرة زغبية الريش ناصعة البياض . عنقه اغفر الريش الاغبر ، راثله اصفر باهت || موطنه افريقية الوسطى . يألث الاحراج ويجاري الماء ، اخلاقه وطباعه لا تختلف عن اخلاق وطباع نسر الجواء .

٢٨٧٩٨ - نَسْرٌ وَاقِعٌ Vêga (F). Vega, Wega (E).
النسر الواقع نجم نيز لامع من كوكبة القيثارة . يعتبر من ألم نجوم السماء . يبدد عن الارض نحو ٢٦ سنة شمسية . يبدو ان النظام الشمسي بكامله يسير باتجاهه اي انه يجذبه نحوه .

٢٨٧٩٩ - نَسْرِيَّاتٌ Vulturidae (S). Vulturidés (F). Vulturidae (E).
فصيلة من لمة النسور وفئة كواسر النهار وربة الجوارح ، تشمل النسر والرخة والأتوق والقسام والبيات والنسل . جميعها كبيرة الجثة والسقف . رأسها اصلع او اغفر . راثلها كبيرة . عنقها اغفر الريش الناعم . ارسافها عارية بخلاف ارساف المتبان الكاسية السرولة . غالبا هارفة لذلك فهي لا تقوى على حمل فريستها كما تعمل العقاب وهذا مما يجعلها تقع على الجيف وقتها تصيد .

٢٨٨٠٠ - نَسْرِين * ، جَلْنَسْرِين ، وَرْدٌ بَرْي * وَرْدُ السِيَّاحِ

Rosa canina (S). Eglantier, Eglantine, Rose sauge, Ros des chiens (F). Canker flower, Dog-rose, Dog-briar, Haprosea (E). Hundrose, Hundrose (D). Rosa canina, R. delle siepi, Cinorrodo (I).
نوع من ورد البري . ساقه تملو من مَر الى ثلاثة أمتار . شوكه متتابع الدرز ، حاد الطرف المخبين . وريقاته وريفة الشجيع ، مستطيلة الاعناق ، ناشرة المروق والاعصاب . مستندة الحافة . ازهاره خرداء اللون ، ووردية المراج ، مستحبة العرف الذي الرائحة ، بتلاتها وحيدة الصف . حمراء نووية

كثيرة العدد البري الذي يراوح من ٢١ الى ٤٩ ، نصلها خلى البشرة على صفحته السفلى . سنابلها الزهرية مستطيلة . ازهاره يستمر طوال شهر تموز .

٢٨٧٩٨ - نَسْرٌ مُشَجَّرٌ Amorpha fruticosa (S). Amorpha arbuisil, indigo bistard, Faux indigo (F). Bastard indigo (E). Bastard-indigo, Strauchige Uniform (D). Amorfa, Indeco bastardo, Falso Indaco, Amorosa (I).
نوع من النسر البروي الشائع الزراعة . شجيرة كبيرة اللد تملو من ٣ الى ٤ أمتار . اوراقه مستطيلة الاعناق طولها نحو ٢٥ سم . وريقاتها تدم من ١١ الى ٢١ لصلها يبعثي الشكل يطلي من ٢ الى ٣ سم . سنابلها الزهرية طرية لمدة تطول نحو ٢٠ سم . || ازهاره يستمر طوال شهر حزيران .

٢٨٧٩٩ - نَسْرِيَّسٌ * Agonostoma (S). Nestis (F).
جنس اسماك نهريه من شالكاك الزعانيف وفصيلة البوريات . انواعه المعروفة نحو ١٥ اسماها انهر افريقية الاستوائية || اجسامها اهلالية الشكل ، مستعدة التبطيد ، تطول من ١٥ الى ٢٢ سم . رؤوسها صغيرة مغلطحة كركؤوس البري . زمانها الظهري ثنائية ، الخلفية منها تقابل الشريية . زمانها الذيلية كبيرة مقطوعة الاطراف او قليلة التقصير . اثوابها تراوح من الركة المتفاوتة السمة الى الشبهة . غصاب رؤوسها وظهورها اصق من غصاب بطونها الذي يفر عند بعض الانواع || عيوبها متوسطة الصف ، مأكولة .

٢٨٧٩٠ - نَسْرٌ عَظَمَ Epandré (F). To scatter (E).
نحس البعاد والقراب واللقش ... اذراها .

٢٨٧٩١ - نَسْرٌ Fourchette (F). Frog (E).
من اجزاء حافر الخيل وهو القسم البارز من باطن الحافر .

٢٨٧٩٢ - نَسْرٌ Vultur (S). Vautour (F). Vultura (E).
جنس طير من الكواسر ينتمي الى فصيلة النسريرات . انواعه قليلة العدد كبيرة الجثة الضخمة . رؤوسها صلغ غفر . مناسرها مستطيلة جالسة تنتهي بكرة منقطة حادة . اعناقها زغبية الريش الاغبر . قواعد اعناقها مطوقة ببرائل مهدلة الزغب . سوطها مستطيلة منفرجة . اذنانها قصيرة مستديرة . ارسافها قوية عارية || والنسر شره نهم زغب ، اذا وقع على شجرة وأتلا منها لم يستطع الطيران حتى يرب وثبات متالية يرتفع على اثرها شيئا فشيئا || ويقال للنسر عريف الطير . كنيسة ابو الازد وابو الاصم وابو مارك وابو المبال وابو يحيى . والاثى يقال لما تم قضم . ومنى لسرا لانه ينسر الشيء . ويستهله . جمه في القلة أنسر وفي الكثرة نسور || اعرف انواعه واشهرها نسر الجواء والنسر القنبراني .

٢٨٧٩٣ - نَسْرٌ الْجَوَّاءُ * Vultur monachus (S). Vautour moine, V. cendré, V. arrian, Grand vautour (F). Hooded vultura (E).
نوع من النسر ، طولها نحو ١٢٥ سم . وفتحة سفليها نحو ٢٥٠ سم . ثوبه الى السمة الخلفية البهراء . رأسه اصلع . عنقه اغفر الريش الاطلح . راثله سنطلي اللون . منسره كبير اللد ، حاد البكرة الزرقاء الشديدة الانعقاد .



نيس



نسر الجواء



نسر قنبراني



نسرين

٢٨٨١١ - **نِسْفَكَة ، نِسْفَكَة ، نِسْفَكَة ، نِسْفَكَة** ،

نَسِيفَكَة ، بَزَكَت (F). Basalte (F).

وقد ترد بالثنين بدلاً من النسيج، هي جدران الحفرة السوداء ذات التخاريف .

٢٨٨١٢ - **نِسْفَكَة** (F). Meulière (F).

مضرو صوانية نخرة تستعمل كأرضية .

٢٨٨١٣ - **نَسَق شَامِي**

النسق الشامي مجموعة كوابك مصطفة على رأس الحية في كوكبة حور وحية .

٢٨٨١٤ - **نَسَق يَمَانِي**

النسق اليماني مجموعة كوابك مصطفة تحت هتق الحية في كوكبة حور وحية .

٢٨٨١٥ - **نِسْك** (F). Cinnyrus alblventris (F).

هو النسر الأبيض البطن ، أظلم .

٢٨٨١٦ - **نِسْلَة** (F). Neslia (S).

جنس نباتات عشبية برية حولية من فصيلة الصليبيات . أنواعها المعروفة قليلة العدد منها بحث من الشرق الأوسط إلى أروبة || سقها متصبية فراءه . أوراقها كاملة . أزهارها عنقودي أو عتكوئي التجميع . أزهارها صغيرة يكثر فيها اللون الأصفر || أعرف أنواعها وأشهرها النسله العتكوئية .

٢٨٨١٧ - **نِسْلَة عَتَكُولِيَة**

Neslia paniculata (S). Neslie paniculée (F). نوع من النسله . عشبة برية ، حولية . منها بعض الاصقاع النباتية ، أحصها الجبلية || ساقها فراءه . أوراقها متناحية ، منقطة ، رقيقة المتشعبة . أزهارها عتكوئي التجميع . أزهارها صغيرة ، صفراء اللون || تنويرها ديبعي .

٢٨٨١٨ - **نِسْنَس** (F). Nisnas (F).

هو جرس القاب ، أظلم .

٢٨٨١٩ - **نِسْنَسَة** هي الطيور الإخضر ، أظلم .

٢٨٨٢٠ - **نِسْنُوس** هو القسر القتراني ، أظلم .

٢٨٨٢١ - **نِسْرَحَة** (F). Poliste (F).

هي الزنبور الصغير ، أظلم .

٢٨٨٢٢ - **نِسْصَات** (F). Nyssacées (F).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين . أجسامها وأوراقها قليلة العدد أشهرها النسفة .

٢٨٨٢٣ - **نَسِيج** (F). Tissu (F).

الانسجة هي الخامات التي تتكون منها أعضاء الاجسام الحية . وهي حديدية الانواع المختلفة التركيب والخصائص تتألف من خلايا مائلة شكلًا ورحبا . || أشهر أنواع النسيج ما يتبع .

٢٨٨٢٤ - **نَسِيج دُعَامِي** (F). Tissu palissadique (F).

Palissadic tissue (E).

اسم يطلق على النسيج الخلفي الغائم الخلايا المتكاثرة المشدودة كما هي الحال في نصال الأوراق .

جزوية اللد ، أروجانية اللون ، ناشفة ألب ، غنية بالخاصص الاستقربوطي الذي يستعمل ضد الحفر .

٢٨٨٠١ - **نِسْطَرَار**

سمكة تعرف بثلوث المتوسط ، أظلم .

٢٨٨٠٢ - **نِسْطُور** (S). Nestors (S).

Nestor (F). Nestor (E).

جنس طير من المتسلقات وفصيلة الببغاوات . أنواعه المعروفة أربعة منها زيلندة الجديدة وألجزر الجياورة . ملجتها الجياقي جامي . أفواجها قليلة العدد . تألفت النباتات والمواقع التي تكثر فيها الصغور المتراكبة لأنها قدن احتاشها في تخاليفها قوتها المواد النباتية وأخصها الثمار النتبية والعسائل والنواهي وبعض الحشرات وأساريها || أجسامها معتدلة اللد تطول من ٤٥ إلى ٥٠ سم . أذنانها متوسطة الحجم ، مستديرة الأطراف . ألوانها قائمة الألوان تكثر فيها الشبهة السمره والحمره الجؤوية || الأناث تضع أربع بيضات تحضنها نحو ١٩ يومًا بينا الذكر يظن لها الغذاء .

٢٨٨٠٣ - **نِسْطُوكَة** (F). Nostoc (F).

ألق مأكول يكثر وجوده في بعض مناطق الصين . يلقى رقة القسر .

٢٨٨٠٤ - **نِسْطُوم** (S). Neostoma (S).

Néostome (F). Neostoma (E).

جنس اسماك بحرية من مقنوسات المثانة ، عذبات السهف ، كيريات الشفق . أنواعه المعروفة قليلة العدد تعيش في المناطق الجبلية البعيدة النور ولا تشاهد إلا نادرا قرب الجبال والشطوط || أجسامها مستعرضة القدم ، مستطبة المؤخر ، تطول من ٢٠٠ إلى ٣٠٠ سم . أشداقها كبيرة غنية . جلودها عادمة السهف . لحومها مأكولة متوسطه الصفت .

٢٨٨٠٥ - **نِسْع** (F). Vent du Nord (F).

النسج اسم ريح الشمال . ويقال ريح نسمة أي شمالية .

٢٨٨٠٦ - **نِسْع** (F). Poignet (F).

النسج : المفصل بين الكف والساعد .

٢٨٨٠٧ - **نِسْع** (F). Sève (F).

سائل غذائي يؤين حاجية مختلف أعضاء ونسج النبات . وهو على نوعين : نسج باهل أو ساعد أو ناقص أو وريد ونسج كامل أو هابط وهو الصادر المغذي .

٢٨٨٠٨ - **نِسْع بَاهِل** ، **نِسْع نَاقِص** ، **نِسْع**

سَاعِد (F). Sève bruta (F).

هو ما يتحصه النبات من مواد قابلة للتشغيل فيوردها ال الاوراق لتضخيمها وتحريكها إلى غذاء .

٢٨٨٠٩ - **نِسْع كَامِل** ، **نِسْع هَابِط**

Sève élaborée (F). Elaborate sap (E).

هو ما حضره الاوراق من النسج الباهل فاصبح كاسا صالحا لتضخيمه الى الجلود التي توزعه على مختلف اجزاء النبات .

٢٨٨١٠ - **نِسْف** (F). Vannage (F).

نفس الحب ورفله باللسف .



نسطور

Crédit (F). **٢٨٨٤٠ - تسيقة ، إشمكان**
Crédit (E).
الزمام يقطعه مصرف أو شخص لمن يطلب منه أن يميز له استعمال مال معين نظراً للغة التي يشر بها نحو . وقد تطلق اللفظة أيضاً على المال نفسه .

Amidon (F). Starch (E). **٢٨٨٤١ - نُشْأ ، نُشْكَه**
النشا مادة عضوية لا متبلورة ، يضاف اللون ، مادة الطعم والرائحة ، ناعمة للمس ، تلويب في الماء الغالي . وهو يتسمي كبرياً إلى فئة مركبات هيدرات الكربون ويتكون مجهرياً من حبيبات ذرية يختلف شكلها وحجمها باختلاف مصدرها || يوجد النشا في معظم أجزاء النبات وأخصها الأوراق الخضر ويكثر في بعض الحبوب والفاصوليا كالخطة والارز والشعير والقرطم والحمص والفاصوليا والبطاطا والأتيام الخ ...

نخبة الخطة نحو ٧٠ ٪ من النشا
وحبة الارز نحو ٨٠ ٪ من النشا
ولبوب البطاطا نحو ٢٥ ٪ من النشا

Météorite (F). Meteorite (E). **٢٨٨٤٢ - نُشَاب**
شذرة معدنية التركيب مصدرها الاجرام السماوية . يقال انها من حطام النيازك التي تحترق الاجزاء الارضية . راجع نيزك .

Serpent volant (F). **٢٨٨٤٣ - نُشَاب**
نوع من الثعابين يدعى السف ، اطلبه .

٢٨٨٤٤ - نُشَادِر ، نُشَادِر
هو الامونياك ، اطلبه .

Vermoulure (F). Worm-hole (E). **٢٨٨٤٥ - نُشَارَا**
حريق الخشب الذي يخرج من الثقوب والانفاق التي تخلدها الحشرات في الاخشاب والاعشاب || وهي أيضاً سميت الخشب الناتج عن النشر .

Osyris blanc (F). **٢٨٨٤٦ - نُشَاس**
لبات زيبى يعرف بأبي ليله ، اطلبه .

Cirro-cumulus **٢٨٨٤٧ - نُشَاص ، نُشَرَا**
نوع من الغيوم البهية السالية ، مظهرها كتل صغيرة تشبه القطن المنثوق || يقال صحاب نشاص وغيوم نمر .

Dynamique (F). **٢٨٨٤٨ - نُشَاطَة ، دِيْنَمِيْكَ**
Dynamica (E).
هي علم القوى .

٢٨٨٤٩ - نُشَاتَان هو كركدن سويترا ، اطلبه .

Chromosome **٢٨٨٥٠ - نُشَبَة ، نُشَبَة**
مواد جبرية شكلية نووية معدودة تكون في الخلية اثناء انقسامها . اما عدد النش فهو نوعي لا يتغير .

٢٨٨٥١ - نُشَج النشج هو مجرى الماء الطبيعي .

Phototactisme (F). **٢٨٨٥٢ - نُشَج**
Phototactism (E).
النشج مدى تأثير النور باعضاء النبات .

Plasmon **٢٨٨٥٣ - نُشَجَة**
الآثرات الوراثي الخارج عن نطاق النشج .

Tissu adipeux (F). **٢٨٨٥٥ - نسيج شحمي**
Adipose tissue (E).
كل نسيج في الحيوان تحولت خلاياه وسحت نسيجاً من جراء اللتين .

Tissu conjonctif (F). **٢٨٨٥٦ - نسيج ضام**
Conjunctive tissue (E).
هو في النبات نسيج الزئ الذي يتكون من خلايا عادية التميز تصنف بمقدورها الانسيابي الذي يؤهلها الى الدخول في تركيب مختلف النشج .

Tissu nerveux (F). **٢٨٨٥٧ - نسيج عصبي**
Nervous tissue (E).

Tissu de soutien (F). **٢٨٨٥٨ - نسيج عقيدي**
Support tissue (E).
هو النسيج الدعامي الذي يمد النبات بالصلاية النوعية اللازمة .

Tissu musculaire (F). **٢٨٨٥٩ - نسيج عضلي**
Muscular tissue (E).

Tissu osseux (F). **٢٨٨٦٠ - نسيج عظامي**
Osseous tissue (E).

Tissu cartilagineux (F). **٢٨٨٦١ - نسيج غضروفي**
Cartilaginous tissue (E).

Tissu de revêtement (F). **٢٨٨٦٢ - نسيج كسائي**
Revetment tissue (E).
هو النسيج الذي يلف الاغشاء النباتية الهوائية فيجمعها من البلب والنشاف ويختلف المواضع الخارجية .

Tissu méristématique (F). **٢٨٨٦٣ - نسيج منسي**
Meristematic tissue (E).
كل نبات وهائي يحوي مجموعة من الخلايا غير الميزة تتكاثر في مناطق معينة ، توجه تخصيصها النسيجي ، تدعى المناطق المنسية . وهي تقسم الى قسمين قسم النشج المنسية الاولى او الهابية وقسم النشج المنسية الثانوية او القلبية .

Tissu conducteur (F). **٢٨٨٦٤ - نسيج موصل**
Conducting tissue (E).
هو النسيج الهوائي والانبوبي الذي يؤهل النقل السريع بين مختلف اعضاء الجسم النباتي .

Textile **٢٨٨٦٥ - نسيجي**
لمت تعريف توصف به كل مادة يمكن حلها الى خيوط صالحة للحياكة .

Humidité normale (F). **٢٨٨٦٦ - نيس**
Normal humidity (E).
الرطاب الطبيعي المألوف الذي يكون في سائر المواد الاستهلاكية وهو ما يبرهن عنه بالرطوبة النوعية .

Nucelle (F). **٢٨٨٦٧ - نُشَيْكَة**
هي نقرية اطلها .

٢٨٨٦٨ - نُشَيْكَة هي ازروان للمصر ، اطلبه .

٢٨٨٦٩ - نُشَيْم ، وَبْدَكَة
Breeze, Vent très faible (F). Breeze, Weak wind (E).
كل ريح ضعيفة لا تحرك مجراً ولا تعني أراً . ج. نسام .

٢٨٨٧٢ - نَضَائِجَات الزَّرْع *

Helminthosporium gramineum, Pleospora graminea, Pyrenophora graminea (S). Helminthosporiose des graminées, Maladie des stries de l'orge (F). Stripe disease of barley (E). Streifenkrankheit der gerste (D).

نظر مجهري يصيب النجيليات اغصانها الشيرة والحلقة والشليم والدخن والذرة || مظهره الخارجي يقع مستطيلة قديمة الشكل تملو نصف حديد عاينة اللون ثم شاحبة وتنتهي بالسرة || يركب الزرع بعد ابداهه بادية او خمسة اسابيع وينتقل من صفة الى اخرى اعمل منها حتى السيلة فيدتها من التلطيح او يسبب اغلاص مقعدا يكافح اما باستعمال بلار جديد خال من فطر المرش او بتطهير البلار الموجود بواسطة الاملاح النحاسية او مركبات الزئبق.

٢٨٨٧٣ - نَضَائِجَات الشَّعِير *

Helminthosporium teres, Pleospora teres, Pyrenophora teres (S). Helminthosporiose de l'orge (F). Net blotch of barley (E). Blattfleckenkrankheit der gerste (D).

نظر مجهري يركب القلت وجع انواع الشعير الزراعية والبرية. مظهره الخارجي، في اول هيد، يقع حائمة لا قياسية الشكل والحجم تملو نصل نصف وتستقر بين الاوصاب، لونها الى الحليطي الزيتونى اللامع، ثم تتسجم وتاغذ شكل المستطيلات || اضراره في القالب محدودة وقد تبلغ في بعض المواقع الرطبة والظروف الحارة نحو ٥٠ ٪. يكافح بتطهير البلار بالاملاح الزئبقية او غيرها.

٢٨٨٧٤ - نَضَائِجَات الشَّوْثَان *

Helminthosporium avenae, Pyrenophora avenae (S). Helminthosporiose de l'avoine (F).

نظر مجهري يصيب الشوثان فيطيه. مظهره الخارجي يقع صغيرة مستديرة شاحبة اللون ثم مستطيلة زاهية قضاينة يركب اواسط نصل النصف ثم تمه قسبب ذبوله ويهسه. اضراره في غالب الاحيان زغبية || يكافح بتطهير البلار كغيره من فطر الشيع.

٢٨٨٧٥ - نَضَائِجَات النَّصَب *

Plantation (F). Planting (E). النصب هو زرع الفراس في التربة. وقد يتم حل عدة اشكال اعماها الزدةقة والتخسيس.

٢٨٨٧٦ - نَضَائِجَات النَّصْبَة *

Plant (F). Young plant, Slip (E). النصبة والذرة والفروسة في كل نبات صغير نمتي تمته جلوه من استمداد الحيلة متروا.

٢٨٨٧٧ - نَضَائِجَات النَّصْب *

Chloroleucita, Chloroplaste, Chloroplastide جسم مشرب الخصب يوسد في وقت الخلية الفتائية. ج. صايع.

٢٨٨٧٨ - نَضَائِجَات النَّصْب *

Oiseau femelle (F). She-bird (E). النصبة هي المصفورة، انثى المصفور.

٢٨٨٧٩ - نَضَائِجَات الجَنَاح *

Hemiptera, Hemipteroides (S). Hémiptères (F). Hémiptères (E). طبقة حشرات من شعبة السليات، فصائلها واجناسها وانواعها كثيرة العدد تجتمع الى رتيبتين: متجانسة الاجنحة ومختلفة الاجنحة.

Slage (F). Sawing (E).

٢٨٨٥٤ - نَضَائِجَات النَّصْب *

هو قطع الخشب بالمشار.

Bulletin (F).

٢٨٨٥٥ - نَضَائِجَات النَّصْب *

٢٨٨٥٦ - نَضَائِجَات النَّصْب *

Bulletin météorologique (F). Weather forecast (E). ميزن الاحوال الجوية وعواملها التي حصلت في فترة معينة. وقد تبحت ايضا في الاحوال الجوية المرتقبة.

Doer (F). To proportion (E).

٢٨٨٥٧ - نَضَائِجَات النَّصْب *

نشر وركز وصار: حدد مقادير المواد المختلفة بالنسبة الى بعضها. او عين مقدار المادة الفعالة بالنسبة الى كمية محدودة من الماء او غيره.

Dose

٢٨٨٥٨ - نَضَائِجَات النَّصْب *

هي المقدار الكافي من المادة الفعالة.

Dose létale (F).

٢٨٨٥٩ - نَضَائِجَات النَّصْب *

Lethal dose (E). هي الكمية اللازمة من كل مادة جمالية او سامة لقضاء على كائن معين موصوف.

Déterrage (F).

٢٨٨٦٠ - نَضَائِجَات النَّصْب *

هو اخراج اغصان من التراب في آخر ابلت.

Micocoulier (F).

٢٨٨٦١ - نَضَائِجَات النَّصْب *

هو الميس، اطلبه.

Fabreoulier (F).

٢٨٨٦٢ - نَضَائِجَات النَّصْب *

هو ميس الجبل، اطلبه.

Micocoulier oriental (F).

٢٨٨٦٣ - نَضَائِجَات النَّصْب *

هو ميس الشرق، اطلبه.

Micocoulier de China (F).

٢٨٨٦٤ - نَضَائِجَات النَّصْب *

هو ميس الصين، اطلبه.

Anabae (F).

٢٨٨٦٥ - نَضَائِجَات النَّصْب *

هي الاناباز، اطلبه.

Affleurement (F).

٢٨٨٦٦ - نَضَائِجَات النَّصْب *

٢٨٨٦٧ - نَضَائِجَات النَّصْب *

٢٨٨٦٨ - نَضَائِجَات النَّصْب *

٢٨٨٦٩ - نَضَائِجَات النَّصْب *

٢٨٨٧٠ - نَضَائِجَات النَّصْب *

٢٨٨٧١ - نَضَائِجَات النَّصْب *

٢٨٨٧٢ - نَضَائِجَات النَّصْب *

٢٨٨٧٣ - نَضَائِجَات النَّصْب *

٢٨٨٧٤ - نَضَائِجَات النَّصْب *

٢٨٨٧٥ - نَضَائِجَات النَّصْب *

٢٨٨٧٦ - نَضَائِجَات النَّصْب *

٢٨٨٧٧ - نَضَائِجَات النَّصْب *

٢٨٨٧٨ - نَضَائِجَات النَّصْب *

٢٨٨٧٩ - نَضَائِجَات النَّصْب *


٢٨٨٨٠ - نَضَائِجَات النَّصْب *

٢٨٨٨١ - نَضَائِجَات النَّصْب *

٢٨٨٨٢ - نَضَائِجَات النَّصْب *

٢٨٨٨٣ - نَضَائِجَات النَّصْب *

٢٨٨٨٤ - نَضَائِجَات النَّصْب *



نضج الزرع



نضج الشوثان

٢٨٨٩١ - نَصَار ، كَامَلِينَة

Caméline (S).

Caméline (F).

جس نباتات عشبية حولية من فصيلة الصليبيات . أنواعه عديدة معظمها بري ، يكثر بين الزروع فيلذها || أشهر أنواعه النصار المزروع .

٢٨٨٩٢ - نَصَار مَزْرُوع * ، كَامَلِينَة مَزْرُوعَة

Caméline sativa, Myagrum sativum (S). Caméline cultivée, Sésame d'Allemagne (F). Caméline, Gold of pleasure (S). Echter Dotter, Leindotter (D). Caméline, Sésamo di Germania, Dardella (I).

نوع من النصار الاستاري زرع لبزوره الزيتية الشائعة الاستعمال الصناعي || عشبته فراء . أوراقه صغيرة القد ، سنانية النصل الأخضر . أزهاره عقودي التجميع . أزهاره صفراء ، صفراء اللون ، تنور في أوائل الصيف . ثماره غردلية ، بزورها دقيقة يضيء الشكل برتقالية اللون . تحوي نحو ٣٥ ٪ من الزيت الصناعي الذهبي اللون .

٢٨٨٩٣ - نَصَار

Requin-marteau (F).

هو مطراق البحر ، سمكة من القرشيات ، أطبله .

٢٨٨٩٤ - نَصَارِيَّات

Chrysomelidae (S).

Chrysomélidés (F). Chrysomelidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة عذيات الأجنحة . اجتماعها وأنواعها بضعة آلاف . معظمها حشرات صغيرة القد . اجسامها مائلة البشرة ، زاهية الألوان . قرونها الاستشعارية عديدة الاشكال فيها الخيطي والحلبي والصورياني والمشاري ، اوراقها خماسية التكوين ، رباعية المظهر الخارجي . مكثها ثني اللون ، تختلف الاشكال تكثر فيه الاستطالة ، تمتص النبات على التبات العائل او ثلثيه في التربة قرب العرائل || ريقاتها خاضعة ، سداسية الاربعة ، عديدة الألوان ، تركب النبات فتضم الأوراق وتغتر السوق عند جفاف التربة وبعضها يركب الجلود || سورياتها صغيرة القد تلصق بشرقة تصنعها من الطين والمواد العضوية .

٢٨٨٩٥ - نَصَارِيَّة الْحَمَاضِ *

Gastrophysa raphani (S). Chrysomée de l'oselle (F).

حشرة من النصاريات . طولها نحو ٥ سم . قروها الى الخضار الزرجدي الزاهي المالح . تظهر في أواخر الربيع وتنتج لطخ مكثها على الصفحات السفلى من اوراق الحماض لينتفخ خلال شهر ايار عن رقات سمراء اللون نمة تقضم الأوراق ويلقونها .

٢٨٨٩٦ - نَصَارِيَّة الْحَمَاضِ * ، لِينَا الْحَمَاضِ

Lina populi, Melasoma populi, Chrysomela populi (S). Lina du peuplier (F).

حشرة من النصاريات طولها نحو ١١ سم . رأسها ودقها الى الخضار الأزرق المالح . جمداهما الى الحشرة يملونها عند طريقتها بقيق اسود . اجسامها الخولية ثلاثة . صغيرة القد ، وردية الجسم ، سوداء الرأس ، تركب اوراق الحمور فتخط الخشب ولا تترك سوى الاغصان والكشرايين . وقد تصدى على النواحي وعلى البرام القليلة فتقضي عليها .

٢٨٨٩٧ - نَصَارِيَّة الزُّوَائِ

تعرف بأرما مرجناتا ، أطبلها .

٢٨٨٩٠ - نَصِيَّة الْأَجْنَحَةِ

Hémipère (F). نصية تعريظ يطلق على جميع الحشرات التي لتني الى بقية نصفيات الجناح .

٢٨٨٩١ - نَصَل ، حَافِيَة ، حَكْرَة ، حَكِيحَة

Limbe (F). Limb (E).

هو الجزء المنبسط المستطيل العريض من ورقة النبات .

٢٨٨٩٢ - نَصَلِي

Limbaire (F). Limbaire (E). نصلي تعريظي توصف به الاضواء التي تولد النصل كقولك خلايا نصلية .

٢٨٨٩٣ - نَصَلُ الْحَافِرِ

Avalure (F). Sloughing of the horny part of the hoof (E). عارض يصيب الحافر فيسبب جبهوه في الخيل .

٢٨٨٩٤ - نَصِي *

Sasa (S).

Bambou (F). Bambou (E).

جس نباتات قصية برية وزراعية من عائلة الخيزرايات ونصيلة التجليات . أنواعه عديدة ترطب في المواقع الرطبة والأثرية قليلة الاندماج الغنية بالمواد العضوية || أشهر أنواعه ما يتبع .

٢٨٨٩٥ - نَصِي أَلْبَق

Sasa variegata (S).

Bambou bandé (F).

نوع من النصي يعلو من ٥٠ الى ١٠٠ سم . أوراقه مزدوجة التصنيف ، نصلها مائل الصفحة العليا الخضراء اللون ، خلي السفل المبلقة بالابيض || يرغب في الأثرية الرطبة المتوسطة الاندماج .

٢٨٨٩٦ - نَصِي مَذْهَب

Sasa auricoma (S).

Bambou à chevelure dorée (F).

نوع من النصي يعلو من ٦٠ الى ١٠٠ سم . سلاياته بنفسجية اللون . أوراقه تطول من ١٢ الى ١٧ سم . نصلها خلي البشرة على صفحتيه ، يعلو توشيح ذهبي || يرغب في الأثرية الرملية الدالية الرطبة .

٢٨٨٩٧ - نَصِي مَزْدُوجُ التَّصْنِيفِ

Sasa disticha, Bambusa nana (S). Bambou distique (F).

نوع من النصي يعلو من ٣٠ الى ٩٠ سم . أوراقه خفيفة مستطيلة مزدوجة التصنيف تطول من ٤٥ الى ٦٠ سم . وترعى من ١٠ سم . نصلها أخضر الصفحة السفلى مخضب العليا ، خضبا أدجواني يهيك عند الأزراب . يرغب في الأثرية العميقة الرطبة المتوسطة الاندماج .

٢٨٨٩٨ - نَصِي يَابَانِي

Sasa japonica (S).

Bambou japonais (F).

نوع من النصي يعلو من المترين الى الخمسة امتار . سلاياته الى الخضار الأصفر . أوراقه تطول من ١٥ الى ٢٥ سم . وترعى من ٣ الى ٥ سم . نصلها سنن الحماة ، مائل الصفحة العليا الباقية الخضار . خلي السفل الزرقاء اللون . يرغب في الأثرية الخفيفة الغنية الرطبة .

٢٨٨٩٩ - نَصِيْب

Part, Quote-part (F).

Share, Part, Portion (E).

هو جزء من ذمة مالية يختص بها أحد المتقاسمين . وهو حصه المرء في شيء أو مال مشاع .

٢٨٨٩٠ - نَصْل ، وَشَل

Suint (F).

Grease of wool, Yolk (E).

هو نضيف الصوف اخضره صوف الكتم .



نصي



نصار مزروع



نصارية الحماض



نصارية الحمور

ثلاثة خطوط يمر تملحوا كشاش من الحلب الدقيق ||
طور الاكمال يستمر نحو اربعة اسابيع ويتقوى ضمن
جرباب في التربة .

٢٨٩٠٥ - نُضَارِيَّةٌ مُشَبَّحَةٌ

Chrysomela fastuosa (S). *Chrysomèle guindée* (F).
Chrysomela fastuosa (E).

حشرة خاضعة من فصيلة النضاريات ورقية معدنات
الاجنسة . تألف البراري التي تكثر فيها نباتات الفصيلة
الشفوية واعصها الصنوبر . خنافسها تعيش على الاثمار
والنولي . يرقاتها تركب الاوراق || جسمها صغير القد
يطول من ٦ الى ٧ م . ثوبها الى الخفسار الاسفع المواج
يعلو في الظهران تحشيش طولي ارجواني وازرق . رأسها
كبير الجرم . عينها صغيرتان بارزتان . زباناها غبيطيان ،
دقيقان . ظهرانها مستدير الزوايا والظفران اللاحش .
عندماها متشابهاة التنقيط الخفيف . ارسافها رباعية المقل
الظاهرة || الاثنى اميز قدما من الذكر وابنت ثوبها
واقصر زبانا || لها جيل واحد في الحبل . تظهر الحشرة
الجملانة في لواتل حزيران وتبقى حتى اواسط ايلول . تخرج
في النهار وتبيت في الليل || البرقة عند تمام نموا تطول
نحو ١٢ م . جسمها رمي الشكل ، قليل التقويس .
مستطلل المقدم ، مستدق المؤخر ، سداسي الروابج . ثوبها
الى الطلعة المحتلجة المواج . رأسها وشربها ودراجها الى
السرة || طور الاكمال الذي يستمر نحو اربعة اسابيع
يتقوى في القرية تحت الجملانة وتحت الحماجرة .



نضارية الصفات الخضراء



نضارية الصفات الزرقاء



نضارية القرية



نضارية القرية



نضارية انيقة

٢٨٨٩٨ - نُضَارِيَّةُ الصَّفَصَاتِ الْخَضِرَاءِ *

Phylloctecta vitellina (S). *Chrysomèle verte* de l'osier (F).

حشرة من النضاريات . طويلا براوح من ٤ الى ٥ م . ثوبها
الى الخفسار الزرجدي . تركب مع يرقاتها اوراق وبراوح
الصفصاف فتؤذيها اشد الاذى .

٢٨٨٩٩ - نُضَارِيَّةُ الصَّفَصَاتِ الزَّرْقَاءِ *

Phylloctecta vulgarissima (S). *Chrysomèle bleue* de l'osier (F).

حشرة من النضاريات ، طويلا نحو ٥ م . ثوبها الى الزرق
القائمة . تركب مع يرقاتها اوراق الصفصاف فتخروها
وتقضم النواهي وبراوحها فتؤذيها اشد الاذى .

٢٨٩٠٠ - نُضَارِيَّةُ الصَّنِيصِيَّاتِ

هي الخدوش ، اطليه .

٢٨٩٠١ - نُضَارِيَّةُ الْقَرَّةِ *

Phaedon cochleariae (S). *Chrysomèle du cresson* (F).

حشرة من النضاريات بيضبة الشكل عمودية ، طويلا نحو
٤ م . ثوبها الى الزرجدي يعلو مواج ازرق . زباناها
الى السوداء الفسفي . تركب مع يرقاتها اوراق القرقة فتجعلها
كالمسد وتسد على اوراق العجل واللفت والمفوف فتضل
فيها فعلها بالقرقة .

٢٨٩٠٢ - نُضَارِيَّةُ الْقَرَعِيَّاتِ * ، رَقِيصْد ،

عُثْرُوقِ الشَّمَامِ ، نُضَارِيَّةٌ قَرْمُوزِيَّةٌ

Raphide raphidipalpis foveicollis (S). *Raphide*, *Galérucque* du melon (F).

حشرة من النضاريات ، طويلا نحو ٧ م . ثوبها الى الحمرة
البرقانية . تعيش على اشباب الاراضي الطيبة والقمية
والبرسيم . انثاها تلقي مبيضها على التربة قرب موائلها ، انصها
القرصيات ، يتنفس المكان عن رقات صغيرة تبتلية اللون
تركب وتفسر سوق الشمام والطبخ والخيار والكوسى وسائر
نباتات الفصيلة القرعية .

٢٨٩٠٣ - نُضَارِيَّةُ الْكَرْمَةِ

هي رموس الجملنة ، اطليه .

٢٨٩٠٤ - نُضَارِيَّةٌ أَنْيَقَةٌ * *Chrysomela polita* (S).

Chrysomèle élégante (F). *Chrysomela polita* (E).

حشرة خاضعة من فصيلة النضاريات ورقية معدنات
الاجنسة . تألف المواق الرطبة وفضاف مجاري الماء .
خنافسها ويرقاتها تعيش على جميع انواع الصنع البري
والزراعي فتقضم الاوراق وتؤذيها || جسمها صغير القد
يطول من ٦ الى ٨ م . ثوبها متراكب الالوان كوسلها
الى الشقعة النحاسية الخفساء المواج ، ظهرانها الى الشقعة
الصنابية اللامعة المواج . رأسها معتدل الجرم . عينها
صغيرتان . زباناها غبيطيان دقيقان . ظهرانها معتدل
الاحاديذاب مستدير المؤخر اللاحش . عنداها معتدلتا
الصلاة ، نظاميتها التنقيط الخفيف . ارسافها رباعية
المقل الظاهرة || الاثنى اميز قدما من الذكر واكد قويا
منه واقصر زبانا || لها جيل واحد في الحبل . تظهر
الحشرة الجملانة في اواخر الربيع وتبقى حتى اواخر
الصيف . تخرج في النهار || والبرقة عند ادراكها للكمال
المجموعي تطول نحو ١٥ م . جسمها رمي الشكل ،
قليل التقويس ، احمل اللون . رأسها غليظ الجرم اسمر
اللون . رواجبها الى السرة . تمحل في ظهرها ويصانها

٢٨٩٠٦ - نُضَبْ

Tarir (F).
To drain, To exhaust (E).

نضب التبع : انقطع ماؤه . ونضب الماء : غار في الارض .

٢٨٩٠٧ - نُضُج

Pleine maturité (F).
Full maturity (E).

هو بلوغ الثمرة كالها الجسومي ويصورها آثر دور
من ادوار حياتها . والنضج يأتي بعد الادراك والابتاع .

٢٨٩٠٨ - نُفُج

Bassinage (F). *Sprinkling* (E).

هو الاسقاء بالرزاذ اي الاسقاء الخفيف .

٢٨٩٠٩ - نُفُج

Pulvérisation (F).
Pulverization (E).

هو رش الماء او اي سائل آخر بواسطة جهاز ضاغط خاص
يدفعه بمف .

٢٨٩١٠ - نُفُج

Stratifier (F). *To stratify* (E).

نضد البذور ، جعل بعضها فوق بعض صليبا متراصفا
متنايعة .

٢٨٩١١ - نُضَف

هو الصنوبر البري ، اطليه .

٢٨٩١٢ - نُضَفَكَة

Nauderus (S).
Nauderus, *Milan-hirondelle*, *Eparvier* *serpent* (F).

جنس طير من حمارة الحذاء وفضيلة القرقيات . انواعه
المعروفة قليلة العدد ، تتميز باجسامها الجاه . دروسها
صغيرة . اصنافها قصيرة . سواقلها مستطيلة ذلقة الاطراف .
اذنابها شديدة الطول فارقة . مناسرها قوية ، منقطة البهرة
الحلادة . ارسافها قصيرة ، مخالفا قوية ذبوة . || تألف
الحياة الجاهية سربا براوح من ١٥ الى ١٠٠ زوج .
قوتها الحشرات والوزغ والفضاء والحيات ، تفتن اركانها
في تفتن الاشجار اعصها السديان والصنوبر . انثاها تضع

وهو سريع النمو والادراك يحد في الاثرية الكلسية التي لا تصلح للزراعات الاخرى .

٢٨٩١٨ - نَشْتَاهُ * قُنْتُدُ التَّمَل

Echidna (S), Echidné (F), Echidna (E).

جنس حيوانات لبونة حاشرة جامة من وحيادات المسلك .
انواعه المعروفة قليلة ، اعطانها جبال استراليا وفيها الجديدة .
اجسامها مكوّنة بطول من ٣٠ الى ٣٥ سم . يغطيها شوك
دقيق كثيف ذرب الاطراف كشوك الكفتل . رؤوسها
صغيرة مخروطية الشكل تلتهى بخلع مستطيل كالنفاخ .
جرايمها مسطحة باظفار قوية سادة تمكّنها من الحفر .
السنّات مستطيلة دقيقة احاذية اندفاعية تمكّنها من ارضاف
الحشرات والتمل . تألف المواقف القليلة الادغال . تسرح
في الليل . حاجرها دحاليذ متنوعة عديدة التناوب وسيدة
المنفذ .

٢٨٩١٩ - نَشْوَرَة * Fer & cheval (F), Horseshoe (E).
سفينة تمثّل بها حوافر الدواب .

٢٨٩٢٠ - نَشِي * Verge des équidés (F).
Penis of the equidae (E).
النشي قضيب ذكور الخيل وحمى الوحش .

٢٨٩٢١ - نَشِيْد * Couche (F), Layer, Stratum (E).
كل صاف مرصوف من الشيء المنسود .

٢٨٩٢٢ - نَشِيْر * Eucharis
جنس نباتات بصلية من فصيلة النرجسيات منها المقدّر
بلاد امريكا الجنوبية . انواعه المعروفة قليلة ، مهيما بري
وبعضها ترابي . اوراقه قدية الشكل مخددة التصل .
ثماره بمققة تلتهى بفسمة من الازهار عطرية العرف
الفولج ، بحيلة الشكل ، مخطفة الالوان . || أشهر
انواعه التّربينة نصير الامازون .

٢٨٩٢٣ - نَشِيْرُ الْأَمَازُون * نَشِيْرُ الْأَمَازُون
Eucharis amazonica (S), Eucharis de l'Amazone (F).
Amazon lily (E), Amazonische Lilie (D), Eucaris (I).
نوع من النصير التّربيني السروني . اوراقه قرصية الانتشاف
مستطيلة التصل القدي الشكل المخددة الصّفنة . ثمرها
الزهري يحمل فسمه من الازهار الناجية العطرية العرف .
يحد في جميع المواقف والاربية ولا ينحس سوى الرطوبة
المستمكنة .

٢٨٩٢٤ - نَشَاة * Cupule
هي قمع الزهرة والثمرة . ج . أنطاه .

٢٨٩٢٥ - نَشَاة * Monacanthus (S), أبو حَرَبَة *
Monacantha (F), Monacanthus (E).

جنس اسماك بحرية من ملحوبات الفك ، قاسيات الجلد ،
تتمتع الى مجموعة النفاير اي عن الماء . انواعه المعروفة
خسة اعطانها بحار البلاد الحارة || اجسامها ربة بطول
نحو ٤٠ سم . رؤوسها كبيرة القدي ، مخروطية الشكل ،
متوجة بقرن كالخرية ينشرب في القدي . زفافها الصديرة
والبيضية والظهيرية شائكة . انوثها الى الطحلة السوداء
المبجبة والمؤنجة بالابيض والاصفر والافضر . زفافها
صقراء اللون || لحويها متنوعة الصنف ، مأكلية .

٢٨٩٢٦ - نَطَّار * Epouvantail (F), Scarecrow (E).
هو الجدار ، ينصب في الزرع والمباقل مزجرة لطير والوحش .

من رفثين الى اربع رفثات تحضنها بملاوة الذكور .
اصرف انواعها واشهرها ما يتبع .

٢٨٩١٣ - نَصْفَةُ افْرِيقِيَّة *

Nauclerus nauclore (S), Nauclère d'Afrique (F).

نوع من النصفه ، موطنها يشمل قطار افريقية الجنوبية
والشرقية والوسطى . جسمها يطول نحو ٥٥ سم . رأسها
ورثتها وصدرها وبطنها الى البياض الناجي . سقطاها
وطورها وذيها الى السواد اللامع تملوه ناجية غصراء .
ملسها اسود اللون . حقة فيها كاليقوت . ارساها
كاسية . || تألف الاسراج بجماري الماء . تجوب البلاد
في طلب الرزق . سرها يحد من ١٠ الى ٥٠ زوجاً .

٢٨٩١٤ - نَصْفَةُ امْرِيْكِيَّة *

Nauclerus furcatus (S), Nauclère-martinet, Nauclère d'Amérique (F).

نوع من النصفه ، موطنها فصح الارباب يشمل امريكة
الجنوبية والشمالية . جسمها يطول نحو ٥٧ سم . رأسها
ورثتها ورجسها وبطنها الى البياض الثلجي وما تبقى اسود
اللون ازرق المواج تملوه غصرة صفراء . مشرها عابق السرة .
حقة فيها جؤوية . ارساها الى الصفار الاخضر المواج .
تألف الاسراج . تجوب البلاد الامريكية في طلب الرزق
والصيف والمشي . سرها يحد من ٢٠ الى ١٠٠ زوج .

٢٨٩١٥ - نَقْم * سَرَّازَان * Fagopyrum (S), Sarrazin
جنس نباتات عشبية برية وزراعية من فصيلة البطيانيات .
سوقها تنصب قليلة الصلاية . اوراقها متناقية منقطة .
نصافها قليلة الشكل او سهية ، خماسية الروع ، عابقة
الغصن . ازهارها عتودي التجميع . ازهارها خشوية .
صغيرة القدي ، خماسية البتلات ، عادمة التويج . ثمارها
حقاق لا قياسية الشكل والحجم يكثر فيها المخروطي .
بفورها حبة المادة ، دقيقها غذائي شائع الاستعمال في صناعة
الماجين ولحم الدواجن . |. اصراف انواعها واشهرها
مايتبع .

٢٨٩١٦ - نَقْم شَالِح * سَرَّازَان شَالِح ، حَنْطَلَة سَوْدَاة ، قَمَح البَقَر

Fagopyrum esculentum, Polygonum fagopyrum (S).
Sarrazin commun, S. ménager, Blé noir, Bucal, Carabin (F), Buck wheat, Sarrazin corn (E), Buckenweide, Echter Buchweizen (D), Saraceno, Fagopiro, Grano nero, Frains (I).

نوع من النقم الزراعي ، ساقه متصبية فراء . اوراقه سهية
التصل ، مستطيلة المقي ، لائحة القدي . ازهاره بيضاء
اللون . حقاها مخروطية الشكل حادة الزوايا . بلوره سود .
وهو سريع النمو والادراك دورته الحياتية تستلزم من ١٨٠٠
الى ١٩٠٠ سرة تلتها ينحو ١٠٠ يوم . وهو يحد
في جميع الاثرية باستثناء القويصة الاندماج الرطبة .

٢٨٩١٧ - نَقْم هِنْدِي * سَرَّازَان تَقَرِي ، حَنْطَلَة تَقَرِيَّة ، قَمَح البَقَر الهِنْدِي

Fagopyrum tataricum (S), Sarrazin de Tartarie, S. de Sibérie, S. galeux, Blé de Tartarie (F), Indian wheat, Tatarian buckwheat (E), Grüner Buchweizen (D), Saraceno di Siberia (I).

نوع من النقم الزراعي العلفي . ساقه متصبية فراء .
اوراقه قليلة التصل ، امحاده بمنجسة لا حاضنة . ازهاره الى
الخضار الاصفر . حقاها رباعية الحروف مستطيلة الشكل .
بلوره صغيرة سرقة سرواء ملغية غزيرة المادة الغذائية .



نصفه افريقية نصفه امريكية



نقم شالح



نقم هندي



نصفان



نصير الامازون



نطاح

٢٨٩٢٧ - نَظَاشُ الكُورِيل °

Crotalaria segyptica (S). *Crotalaire d'Egypte* (F).
Rattle-box (E). *Klapperhölse* (D). *Nacchera* (I).

نوع من النطاش المعمّر. جنسه شجيرة القند، فروع الساق، صغيرة الأوراق السنانية البنية اللونية. أعطانها فسيحة الأرجاء تمتد من صمرها سينا إلى الصحاري المصرية.

Chromosome ٢٨٩٣٨ ° نَظَاشَة °

هي الشجيرة والكروموزوم.

٢٨٩٣٩ - نَظَاشُ ، طَعْمُ المُرْدَرَعِ °

Goût de terroir (F). *Native tang*, *Raciness* (E).

طعم خاص يطعم بعض المحاصيل الزراعية كالعنب والتينغ ليشيها بعض الشيء وهو يمدد إلى بعض عناصر التربة اللامتنجاسة الدائمة.

Vin de presse (F). ٢٨٩٤٠ ° نَظَاشُ °

ما يسيل من عصر العنب وقد تكون خمر إذا حسن صنعها فاعرة الصنف.

Nothura (S). ٢٨٩٤١ ° نَظُورَة ° ، نَظُور °

Nothure (F).

جنس طير من الدجاجيات وفصيلة الزرقويات. أنواعه المعروفة سبعة منتشرة في جميع بلاد أمريكا الجنوبية. شكلها قريب الشبه من الزفر. أجسامها مستوية القند. أذناها جدعة. ألوانها إلى الصبغة المشبعة والخضرة والأسود. أعطانها وصلوها ويطرها إلى الصبغة الصنائية الزاهية || قوتها الحشرات والبلود البرية. تألف حواشي الغابات. صيدها مرغوب فيه لأنها من الطرائق السميكة المستحبة الطعم.

Natica (S). ٢٨٩٤٢ ° نَظَاشَة °

Natic (F). *Natica* (E).

جنس حيوانات بحرية من الرضويات مغطيات الأرجل وفصيلة النطاشيات. أنواعها المعاصرة المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار العالم. جميعها مفترسة قوتها الرضويات والديدان || أصدافها مائسة، شبه كروية الشكل، صفيحة العقب المحزن اللدب. أجسامها بيضبة الشكل، مستعرة الإودية، عريضة القروص المبطلة، ثنائية الألواس المميقة، كبيرة الأرجل || تعيش في الأسماك وتعل رمال الشواطئ المغمورة بالماء.

Naticidae (S). ٢٨٩٤٣ ° نَظَاشِيَّات °

Naticidae (F). *Naticidae* (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرضويات مغطيات الأرجل وحيوانات الأجهزة. أجسامها وألوانها المعروفة عديدة بعضها من متحجرات الأراضي الطباشيرية والبحورية، وبعضها معاصر منتشر في معظم بحار العالم || أصدافها شبه كروية الشكل، صفيحة القبة، قصيرة القلوب، فسيحة الفروقة. أسطحها كبيرة، قرنية للمادة أو كلسية، توصد الفروقة عند الحاجة || جميع أنواعها مفترسة تقضي على الديدان والرضويات الصغيرة. أعرف أجسامها وأشهرها النطيشة.

Alintam ٢٨٩٤٤ ° نِظَام °

النظام نجم ثير من كوكبية قياس مركزه على أصل اللب.

Statut (F). *Status* (E). ٢٨٩٤٥ ° نِظَام ، قَائِن °

هو اتفاق أو قانون يضمن حسن انتظام العمل.

Lestoteuthis Kamtschatica (S).

Lestoteuthis de Kamtschat (F).

حيوان بحري مفترس يسجد الجنس والنوع من الرضويات وأسيات الأرجل، مزدوجيات الخياشيم، عشاريات الجرامز وفصيلة الطردسيات. أعطانها جزر الكوريل || جسمه مخروطي الشكل، كبير القبة، يطول نحو خمسة أمتار. زعنفته طرفيتان، كبيرتان، مزدوجتان. جرامزه مهيبة، طويلة، لامساوية الطول ونها زوج لثيف شديد الطول ينتهي برسي سنانية الشكل تملؤها حناجر وكلايب.

٢٨٩٢٨ - نَظَاشُ أَحْمَر °

هو القبط الأخضر، أطليه.

٢٨٩٢٩ - نَظَاشَات °

Elsteridae

فصيلة حشرات من عمديات الإجنحة تعرف بالساوليات، راجعها.

٢٨٩٣٠ - نِظَاق ، نِظَاقُ الجِزْوَء °

Baudrier d'Orion (F). *Ahliak* (E).

النطاق أو نطاق الجزواء ثلاثة أنجم مستعرة وباصة في وسط الجزواء تسبها العرب النظم وهي مثل في الانتظام والانتظام.

٢٨٩٣١ - نَظَح °

الطلع نجم ثير من كوكبة برج الحمل.

٢٨٩٣٢ - نَظَرَنُوس °

Nozornis (S).

Nozornis (F). *Nozornis* (E).

جنس طير من طرايق الساق وفصيلة النطاشيات. أنواعه المعروفة ستة انقرضت ختم منها وبقي نوع واحد يسير في طريق رفاته. موطنه غابات نيوزيلندا وأحواضها || جسمه يضاهي أجسام الحبشيات لكنه صغير الجناح، عادم الذنب، ضلع المنقاد القصير المخروطي الشكل || قوته الاعتشاب والبلود والحبوب البرية. مسرعة عند الصباح وتلب الغروب. يلدو بسرعة فائقة ولا يستطيع الطيران || لحمه جيد الصنف مرغوب فيه.

٢٨٩٣٣ - نَظَرُون °

Nitra (F).

هو ملح البارود، أطليه.

٢٨٩٣٤ - نَظَرُونِي °

Nitreux (F). *Nitrous* (E).

نعت تعريفي يدل على صبيغ النطرون، ككوك حامض نطروني وزراب نطروني.

٢٨٩٣٥ - نَظَاش °

Crotalaria (S). *Crotalaire* (F).

جنس نباتات حولية وصمرة من فصيلة القرليات الفرواشية. أنواعه زهاء ٢٠٠ جميعها جذبات وأعشاب برية. منها البلاء الحارة من الماين القدم والجديد. أوراقها وأغصانها مرصوة تتلفق للماشية. أزهارها مفترسة تجرورها النمل.

٢٨٩٣٦ - نَظَاشُ البَنَغال °

Crotalaria juncea (S).

Crotalaire du Bengale, *Chanvrier du Bengale* (F).

Bengal hemp plant, *Sunn hemp plant* (E). *Bengalischer Hanf* (D). *Nacchera del Bengala* (I).

نوع من النطاش يكثر في بعض مناطق الهند أخصها البنغال. ساقه أسلية الشكل يستعملون أليافها استعمال القنب.



نظروس



نطش



نظورة



نطيشة

Paranucléines (F). **نَظِيرَةُ النَّوَّالِيْن** ٢٨٩٦٢

Zygomycètes (F). **نَظِيرَات** ٢٨٩٦٣
مجموعة من رتبة الفطور البيضاء، أجناسها وأنواعها كثيرة
المدد تنقسم إلى فصيلتين: المصليات والمغليات.

Corbillat, Corbillot (F). **نَعَاب** ٢٨٩٦٤
Young raven (E). فرخ الغراب.

٢٨٩٦٥ - **نَعَار *** ، نَعَر سُوْرِي
Serinus syriacus (S). Serin de Syrie (F). Syrian
canary (E).

نوع من النعر حسن الصوت يكثر وجوده في البلاد القبلانية
السورية. طوله نحو ١٢ سم. ثوبه رنجي اللون يعلو في
ظهوره وجناحه شمشع اسمر. زوره وجمسته وبلته إلى
الصفار البرتقالي المواجه تلوو دقة مستطيلة سمراء. منقاره
وصدقه عينه وصدفاه سمير. || يألف الحدائق والجنائن
والنباتات القريبة من الممران. يأن عشه في الأشجار الضخمة.
اكتاه تقسم من ٤ إلى ٥ بيضات تحضنها وحدها نحو ١٣
يوماً.

Embryologia (F). **نَعَارَةٌ *** ٢٨٩٦٦
Embryologie (E).

٢٨٩٦٧ - **نَعَارَةٌ نَبَاتِيَّةٌ ***
Embryologie végétale (F).
Vegetable embryologie (E).

النعار النباتية علم يبحث في التكوين النباتي وفي المراحل
المتتابعة التي يمر بها كل نبات.

٢٨٩٦٨ - **نَعَامَةُ النِّعَم ***

Dicyphus minimus (S). Dicyphe minime, Punaise du
tabac (F). Suck-fly (E).

حشرة ثاقبة ماصة كرجية الرأعنة صغيرة القد مستطيلة الشكل
من فصيلة خاسيات الفواصل. طولها يراوح من ٨ إلى
١٠ سم. رأسها اسود اللون. زباناها خيطية مستطيلة
منتقفة إلى الدواء. ظهرها ملون وموشع بالخطوط والوردية
والاسمر والاخضر والاسود. يطها إلى السمرة المابقة.
اناثها تنجح الممكن أفرادياً في وزن التصل يفتقد بدنته
بنحو ٧ أيام عن عريقات دقيقة مراقبة تركيب التصل وتخص
خلايا نسيجها || الحشرة الكاملة تخصص عصاة قة الساق
وضلوع الارراق الحامية قتلها الذبون والالتواء نحو
الارض فتدبر كأنها عادمة الجبل لا تقوى على متابعة
شماخها ودورتها الحياتية || اغراضها قد تكون جسيمة اذا
اعترت الشغل في زمن الشاي. تكافح عند الحاجة باستعمال
احد الحوافير النافذة الذي يؤثر في اعصاب الحفم.

٢٨٩٦٩ - **نَعَامَةٌ** بقلة ناعمة كالناعمة. ج نعام.

٢٨٩٧٠ - **نَعَام ، نَعَام**

النعام أو النائم منزل من منازل القمر البائية. وهي ثمان
كواكب على اثر الشولة، اربعة منها في الهجرة وهي النعام
الواردة لانها شرعت في الهجرة كأنها تشرب. واربعة خارجة
عن الهجرة وهي النعام الصادرة كأنها شربت ثم صدرت ||
رقيب النعام يدعى الحنة.

٢٨٩٧١ - **نَعَامَات**

النعامات خمسة نجوم من كوكبية قيطس مركزها في اواسط
البدن.

٢٨٩٦٦ - **نِظَام ، أَسْئُوب**
Régime (F).
Rufes, Regulation (E). مجموعة القواعد المفروضة أو المنبئة.

٢٨٩٤٧ - **نِظَام**
Système (F). System (E). مجموعة مقالة أو مبادئ مرتبطة بشكل مذهب أو اتحاد
خاص.

٢٨٩٤٨ - **نِظَامِ الاسْتِغْلَال** ، **طَرِيقَةُ الاسْتِغْلَال**
Système de culture (F). Cuiévation system (E).
الطريقة التي يتبعها المزارع في استغلال ارضه.

٢٨٩٤٩ - **نِظَامِ الاسْتِغْرَاف**
Exploitation patronale (F). Sweating system (E).
هي المضاربة التي ترمي إلى خفض اجور العمال حتى الحد
الادنى.

٢٨٩٥٠ - **نِظَامِ الْأَمْلاكِ الْعَامَّةِ**
Domainalité publique (F). Public property (E).
نظام قضائي خاص من الاملاك العامة.

٢٨٩٥١ - **نِظَامِ الْحَصَر**

Régie (F). Stewardship (E).
ادارة الاموال وحصرها وتوجيهها توجيهاً اقتصادياً محمياً.

٢٨٩٥٢ - **نِظَامِ الْمَطَر ، مَنَاجِنُ الْأَمْطَار**
Régime des pluies (F). Rain regulations (E).
كيفية الاطوار المحلية وكيفية توزيعها على مختلف شهور
السنة.

٢٨٩٥٣ - **نِظَامِ النِّقَابَات**
Syndicalisme (F).
Syndicalism (E).

٢٨٩٥٤ - **نِظَامِ دَوْرِي**
Système circulaire (F).
Circulation systemic (E). نظام دورة الدم في المجموعة الوعائية الجسدية.

٢٨٩٥٥ - **نِظَامِ عَيْشِي**
Statut réel (F).
Real status (E). صيغة تقليدية تدل على القانون الذي يعالج موضوع الاموال
المنقولة منفردة.

٢٨٩٥٦ - **نِظَامِ وَرَقِي**
Foliation
النظام الورقي هو الشكل الترتيبي الذي يتخلله الورق
على الفصن. ويدعى الارياق.

٢٨٩٥٧ - **نَظَرِيَّة**
Théorie (F). Theory (E). مذهب علمي او علم نظري لا علمي.

٢٨٩٥٨ - **نَظَرِيَّة**
Théorème (F). Theorem (E). قضية يطلب برهانها.

٢٨٩٥٩ - **نَظَرِيَّةُ الطَّوَرِئ**
Théorie de l'imprévision (F).

٢٨٩٦٠ - **نَظْم**
النظم ثلاثة انجم من الجوزاء قديمي النطاق ، راجع نطاق.

٢٨٩٦١ - **نَظِير ، نَظِيرِ السَّمْت ، سَمْتُ الْقَدَم**
Nadir
نقطة السماء التي تحت قديمي الراصد وهي تقابل سمت الرأس.



نعار



ناعمة النبع



نعام



نميرك باشا



نمرة البقر



نمرة المائي



نمرة المزن



نمرة سوداء



نمرة مزججة

٢٨٩٧٩ - نعام * هودعة

Brebis (F). Ewe (E).

أنثى القسان منذ اجتيازها الشهر الخامس عشر من عمرها أي من وقت صلاحها للسداد .

Tabanus (S).

Taons (F). Gadflies (E).

جنس حشرات من النمرات. أنواعها عديدة، ذكورها تعيش على ريق الأزهار، أنثاها تعيش على ما تهمسه من دم وهي تلص الحيوان ولا تف من الإنسان، وبعضها ينقل مرض الدباب من الأيل إلى الخيل فينبسها. الواحدة منها تكفي نمره. أعرفها وأضرها ما يلي .

Embryon d'animal (F).

Animal embryo (E).

هي الملقحة الحيوانية .

Tabanus bovinus (S).

Taon des bœufs (F). Ox-fly (E).

ذبابة من النمرات، طولها يراوح من ١٨ إلى ٢٥ سم. ثوبها اللمسة. صدرها وسيقانها صفر. أرسافها سود. يكثر وجودها في فصل الصيف والخريف. أنثاها تكمن على البقر والخيول والحمار.

٢٨٩٨٣ - نمره المائي *

Chrysops caecutiens (S). Taon aveuglant (F). Horse-fly, Breeze fly (E).

ذبابة صغيرة من للنمرات، طولها يراوح من ٦ إلى ١٥ سم. خطها قصير القند. حورياتها خضر يطلها موج ذهبي لامع. أنثاها تكمن على الخيل والحمار والبقير ولا ترتد عن مائها .

٢٨٩٨٤ - نمره المزن *

Chrysosoma pluvialis (S). Taon pluvial (F). Cleg (E).

ذبابة صغيرة من النمرات، طولها يراوح من ٨ إلى ١٢ سم. حورياتها خضر النصف الاعل، ردة النصف الاسفل. يكثر وجودها من حزيران إلى أواخر أيلول. أنثاها تكمن على جميع الدواب وتقتحم الإنسان.

٢٨٩٨٥ - نمره سوداء *

Tabanus morio, Pangonius micans (S). Taon noir (F).

ذبابة من النمرات، طولها يراوح من ١٥ إلى ٢٥ سم. ثوبها أسود اللون، زباناها اللمسة، خطها مستطيل المنك. يكثر وجودها من حزيران إلى تموز.

٢٨٩٨٦ - نمره مزججة * نمره الربيع

Tabanus bromius (S). Taon bryant (F). Gadfly (E).

ذبابة من النمرات، طولها يراوح من ١١ إلى ١٥ سم. ثوبها اسمر اللون مبقع بالاسود. مقدمها اخضر. حورياتها اللمسة المشع بالاحمر. يكثر وجودها من أيار إلى حزيران. ذكورها لا تفرق الأزهار النجميات. أنثاها تقتحم جميع الحيوانات ولا تف من الإنسان.

Tabanidae (S).

Tabanidae (F). Tabanidae, Gadflies (E).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين. اجناسها وأنواعها كثيرة العدد معظمها من الدباب الكبير. أعطالها مستطيلة، انساها ثاقبة ماصة ولاعة. قرورها الاستعمارية ثلاثية الفواصل. حورياتها كبيرة القند، مصلة في الذكور، مفترقة متباعدة في الاناث. اجنسها غاشية التركيب شائعة. ذكورها تعيش على مشر الأزهار ودماعة الانجرار

Struthio camelus (S). Austruche (F). Ostrich (E).

طائر من البراري وحيد الجنس والنوع من فصيلة النمايات. اسم الجنس نعام والذكر ظلم والاني ريداء وقلوس والصغير رائل والجماعة بنات الحق ويودع. وكنيتها أم البش. صياح الظلم يدعي عرازا وصياح القلوس زبارا. || تعتبر النعام اكبر واضخم الطيور المعاصرة، تملو نحو ٢٦٥ سم. والذكر ارفع من الانثى. ريشها ناعم مبدل منسك. لونه يراوح من الاسود القاتم إلى الرمادي فالايس ثم البني. عفاها منتصب مستطيل، عادم الريش، كثيف الزغب الاقفر، يثني برأس صدر القند ويتقار مفلطح. ساقيها قويان رفيدان متباعدتا على المدد السريع. بيضاها كبير القند، حاجي اللون، اصفر المراج، رنة الواحدة ١٤٥٠ غ. قوتها الاغشاب والبقول والصبان والبلور والحبوب والبار والحشرات والعطاء الخ... || تدن في النصوص من ابرل تمزه ١٥٥ سم. ومقه ٣٥ تضع من ١٢ إلى ١٨ بيضة تحضنها بمناودة الذكر من ٤٢ إلى ٤٨ يوما.

Nandou (F).

هي الرساء، اطباها .

Vent du sud (F).

South wind (E).

النماي ديع الجنوب لانها ابل الرياح والبرها .

٢٨٩٩٥ - نعاميات

Struthionidae (S). Struthionidae (E).

فصيلة طير من رتبة البراري، اجناسها المعروفة ثلاثة النعام والبرها والامو. جميعها سريعة العدو، كبيرة القند، مستطيلة المنك الدقيق الاثني الريش. أرسافها رفيعة قوية تتهني باصمين او بقلادة اصابع. اجنسها صغيرة ضيقة لا تكمنها من الطيران. أرسافها رطلة متباعدة لا مياكة. تعيش من ٢٥ إلى ٣٥ سنة. موطنها المناطق الحارة من افريقية واريسا واستراليا.

٢٨٩٩٦ - نميرك

Spilornis (S). Buse huppée (F).

جنس طير من السقاوت وفصيلة الصقريات. أنواعها عديدة جميعها من اربايد المناطق الحارة. اجسامها ريمة، أرواها مختلفة الألوان التركية. تتميز برووها القوية بكشفة تقنية الارتكاز. || تعيش في الجبال الجرداء وفي القياقي المتساقطة. قوتها القوام والزسقات والافامي والحشرات. انسر أنواعها نميرك باشا.

٢٨٩٩٧ - نميرك باشا *

Spilornis bache (S). Buse huppée bache, Bache (F).

طائر من النميرك، طولها نحو ٦٥ سم. ويطه ١٥٥ سم. ثوبه اطمل اللون، حاجي الظهر والسط، اخضر البطن، يطو توشم ابيض مستدير. كشفه بيضاء الانتساب سوداء الطرف، صدقة عينه بطورية اللون. مثاله صفر، منسره أزرق اللون اخضر المراج || موطنه فصح الارباء بين من افريقية الجنوبية الى الشرقية فالحند والصين. يدن وكته في شخايف الصغور النائعة. انسا تقسم من رفنة الى ثلاث رفئات تحضنها وسدا نحو خمسة اشابيع.

٢٨٩٩٨ - نميرك

النميرك هو الذئب: الذكر من الصبيان .

٢٨٩٩٥ - نَمْلُول *Otiorynchus* (S).
Otiorynchus (F). Weevil, Broad-nosed weevil (E).
Schwarzer Rüsselkäfer, Dickmaulrüssler (D).

جنس حشرات رابطة من فصيلة السوسيات. أنواع عديدة، أعطاهما العالم أجسامها صغيرة القد، رؤوسها وأنتاجها مستطيلة. قرونها الاستشعارية مكبرة منفردة الزوايا تنقلب في مقدمة المنك، أحدها صلبة، سيقانها مسنة. أرسافها رباعية، أطواها تراوح من الحطلي إلى الأسود. قشورها دقيق السهف والحلب تملو أعاديدي وتراويز مختلفة. تسرح في الليل وترقد في النهار. ريقانها تعيش في التربة على الحواد الضعوية ونها تقضم الجلود كما هو الحال في نملول السكك. || أعراف أنولاه وأشهرها ما يلي .

٢٨٩٩٦ - نَمْلُول أَحْمَر السَّاق *Otiorynchus lugdunensis* (S). *Otiorynchus à pattes rouges* (F).
نوع من النملول، مرثمه الإبحار المشيرة ومشارها. يكثر في المناطق الجبلية. طوله يراوح من ١٥ إلى ١٤ سم، ثوبه إلى السوداء اللامع. سيقانه حمراء اللون. قشار ظهرانه عادم السهف، عشاري الأحاديدي. || يسرح في الليل. قوته الأوراق الفتية والبراعم.

٢٨٩٩٧ - نَمْلُول الزَيْتُون *Otiorynchus cribricollis* (S). *Otiorynchus de l'olivier* (F).
نوع من النملول، مرثمه الأول نجمة الزيتون ثم الدراق والوز. طوله يراوح من ٧ إلى ٨ سم، جسمه بيضي الشكل. ثوبه إلى السوداء، متك محروطي قصير. زبانه مستطيلان منفردا الزاوية. سكبته رافعة الطرف. مقدم جوشته بالغ التحصين. قشار ظهرانه عشاري التحديد. أحاديده مهدية الحروف، منتظمة التقطع. || يسرح في الليل. قوته الأوراق الفتية ولتيمها بشراة.

٢٨٩٩٨ - نَمْلُول السَّكَّ *Otiorynchus rugosostriatus* (S). *Otiorynchus des cyclamens* (F).
نوع من النملول. مرثمه الورد وبعض نباتات الزينة. طوله يراوح من ٦ إلى ٧ سم، ثوبه إلى السوداء. زبانه إلى الجفوة، متك يبدو كأنه استطالة الرأس. ظهرانه كثير التحديد الطولي، كثيف الركيات السفلية، صمير الحلب || يسرح في الليل. قوته الأوراق الفتية. إذاه الأكبر يأتي من ريقانه التي تعيش في التربة وتلتهم جلود السكك تقضي عليه.

٢٨٩٩٩ - نَمْلُول الكَاكش *Otiorynchus ligustici* (S). *Otiorynchus de la livèche* (F). *Lovage weevil* (E). *Liebstöckelrübier* (D).
نوع من النملول، مرثمه الكاكش والنفل ومعظم القرليات وبعض الإبحار المشيرة. طوله يراوح من ١٥ إلى ١٢ سم، ثوبه إلى السوداء الريداء. متك أسطواني الشكل. مقدم جوشته منتظم التحصين. ظهرانه سهي القشار، منقب الحطوط || يسرح في الليل. قوته الأوراق الفتية.

٢٩٠٠٠ - نَمْلُول الكَرْمَة *Otiorynchus sulcatus* (S). *Otiorynchus de la vigne* (F). *Vine weevil* (E). *Gefurchter Lappenrübier* (D).
نوع من النملول، مرثمه الكرم ولا ينف من الإبحار المشيرة والحرجية. طوله يراوح من ٨ إلى ١٠ سم، جسمه

الخشيشة والثار الناجية المطربة. أما أنثاها فقربها قوت الذكور يضاف إليه الدم الذي تنصه من الحيوان لأنها لا تستفي عنه في تكوين المنك. مكبسا وشي الشكل تنصه الإناث صلفا متتابعة متراصة فينتف بهد متصه بدة وجيزة تراوح من ٢٤ إلى ١٢٠ ساعة || ريقانها مدوية الشكل، غبراء اللون أو صفراء، يطعها تجنيم اسود رمي تميش في الماء والثريل والكسل والرمال الرطبة والأصابع الكيفية المنحلة.

٢٨٩٩٨ - نَمَصَّة *Fagne* (F). *Upland moss-hug* (E).
هي الأرض الرطبة كثر أعضائها الطوعية التي ترقادها الجهم.

٢٨٩٩٩ - نَمَصَّة *Fascourtia* (S). *Fascourtia* (F).
الواحدة نمصة. جنس إبحار ونجيرات برية وزراعية من فصيلة النصفيات. أنواعه المعروفة ١٢ مهدا الهند وسائر بلاد الشرق. جلوسها معتدلة السوق. أغصانها فارشة. أوقانها متعاقبة. أنهارها ثنائية المسكن. أنهارها سبيل التجميع، تاجي الانتكاز، ثمارها مأكولة، كرزية الشكل صغيرة القد، كثيرة العدد، تتحول نحو ثلاثة أشهر. أعراف أنولاه وأشهرها ما يلي.

٢٨٩٩٠ - نَمَصَّة سَرَحَة *Fascourtia inermis* (S). *Fascourtia inermis* (F). *Lovliovi* (E).
نوع من النمص، نجيرته تملو من ٤ إلى ٥ أمتار. ساقها أغصانها سرسة. ثمارها كرزية الشكل ولقد تتحول من ٨ إلى ٩ أشهر، لونها إلى الحمرة الزاهية. سيقانها قليل الحوصلة، غزير العصارة، يؤكل ويربب.

٢٨٩٩١ - نَمَصَّة مَدْعَسَكْر *Fascourtia ramontschii* (S). *Prunier de Madagascar*, *Ramontschii*, *Maroonne* (F). *Governor's plum*, *Madagascar plum* (E). *Achte Fascourtia* (D). *Pruno del Madagascar* (I).
نوع من النمص، جنبته تملو من ٢٠٠ إلى ٣٠٠ سم. ساقها سرسة. أغصانها فتاة قليلة الشوك. ثمارها كروية الشكل قشرها نحو ٣ سم. لونها إلى الجفوة اللامعة، سيقانها مصطب الحوصلة يكثر استهلاكها في المربيات. حلاء ساقها حولي القلادة. قلعة دباغي المادة شائع الاستعمال.

٢٨٩٩٢ - نَمَصَّة هِنْدِيَّة *Fascourtia estaphracts* (S). *Fascourtia de l'Inde*, *Prunier malgache*, *P. de l'Inde* (F). *Indian plum*, *Runeala plum* (E). *Fascourtia* (D). *Pruno d'Indie* (I).
نوع من النمص نجيرته تملو من ٦ إلى ٦ أمتار. ساقها أغصانها شائكة. أنهارها صغيرة القد تستقيف اللون. ثمارها غرضية الشكل، كشمشية القد، كرزية اللون، جامدة السوق، ظاهرة الحوصلة، تستعمل قريب. قلافة حلاء سيقانها وأغصانها دباغي المادة.

٢٨٩٩٣ - نَمَصِيَّات *Fascourtiaceae* (S). *Fascourtiacées* (F). *Fascourtiaceae* (E).
فصيلة نباتية من ثنائيات الفلقة مستقلة القملات. أجناسها وأنواعها عديدة، منها الإبحار والنجيرات، معظمها بري وبعضها زراعي مأكول الثمار. || أشهر أجناسها النمص والايبريه والطر والبرجانية والثرية.

٢٨٩٩٤ - نَمَصَّة *Fascourtiaceae* (S). *Fascourtiacées* (F). *Fascourtiaceae* (E).
فصيلة نباتية من ثنائيات الفلقة مستقلة القملات. أجناسها وأنواعها عديدة، منها الإبحار والنجيرات، معظمها بري وبعضها زراعي مأكول الثمار. || أشهر أجناسها النمص والايبريه والطر والبرجانية والثرية.

٢٨٩٩٤ - نَمَصَّة *Fascourtiaceae* (S). *Fascourtiacées* (F). *Fascourtiaceae* (E).
فصيلة نباتية من ثنائيات الفلقة مستقلة القملات. أجناسها وأنواعها عديدة، منها الإبحار والنجيرات، معظمها بري وبعضها زراعي مأكول الثمار. || أشهر أجناسها النمص والايبريه والطر والبرجانية والثرية.

٢٨٩٩٤ - نَمَصَّة *Fascourtiaceae* (S). *Fascourtiacées* (F). *Fascourtiaceae* (E).
هي النمصة القاسدة في الم.



نملول اجر الساق



نملول الزيتون



نملول السك



نملول الكاش



نملول الكرمة

منها يهبطية والوسطى قلبية والعليا رديحة مدببة او مقطوعة الطرف . نصلها نائض الاصاب ، قليل الخمل ، ازهاره سنبل التجميع ، طرفي الازهار . ازهاره متراكبة ، لينة ، حمراء اللون || اوراقه وازهاره ليمونيه اللون . نقيهما يطهر المعدة ويذهب بالمض || تنوره يستمر طوال فصل الصيف .

٢٩٠١٩ - نَعْنَعَ مُسْتَدِيرُ الْوَرَقِ

Mentha rotundifolia (S). *Mentha à feuilles rondes* (F).

نوع من النعنع البري المبلول . ساقه منتصبه زباد متقاربة الفروع تملو من ٣٠ الى ٦٠ سم . اوراقه شبه مستديرة . نصلها نائض الاصاب ، رافع التجميع المنصع ، خلي الصفحة السفلى || ازهاره سنبل التجميع ، طرفي الازهار . ازهاره كثيرة العدد غيراء اللون صفراء الموانج || تنوره يستمر من تموز الى ايلول .

٢٩٠٢٠ - نُعْنَعَة

Jabot (F).

النعنة هي الحوصلة ، اطلها .

٢٩٠٢١ - نَعُور

النور هي الريح التي تهاجلك ببرد وانث في حر او بحر وانث في برد .

Croassement (F).

Croaking, Cawing (E).

٢٩٠٢٢ - تَعِيبُ ، تَعِيقُ

هو صوت الغراب ويدهى ايضاً زبيب .

٢٩٠٢٣ - نَعِمْ

نعم وصليب الجنوب اسمان لكوكبية نجوم واحدة مركزها الجنوب . اطلب صليب الجنوب .

٢٩٠٢٤ - نَعِمْ

هو الاغبرانتوس ، اطله .

٢٩٠٢٥ - نَعِمْ

هي الساج ، اطله .

Pedionomus (S). *Pédionome* (F).

٢٩٠٢٦ - نَعَاشُ

طائر وسيد الجلس والنوع من فصيلة التنيويات . واحده نفاشة . وهي صغيرة الجثة طويلاً نحو ١٧ سم . ثوبها الى الصهبة يعلوها تأذي وتوشم اصفر واجر واسود . راسها مضط بالاجر || قربها الحبوب والحشرات . تألف الاماكن القليلة الاشجار ، الكثيرة الشب العالي || تنثر في الحوص قدرة بين الاشباب . تعيش من ٨ الى ١٠ في بيضات تحضنها وسدا نحو ثلاثة اسابيع .

٢٩٠٢٧ - نَعَاشُ *

Meconopsis (S). *Méconopside, Méconopsis* (F). *Flaming poppy, Wind poppy* (E). *Mohling, Mohngescht* (D). *Papavero cimbrico, Meconopsis* (I).

جنس نباتات عشبية من فصيلة الباذليانثيات . انواعه عديدة ، اصطلح العالم معظمها بري وبعضها تربي . سوقها منتصبه . اوراقها كاملة او مفرصة . ازهارها منتصبه . منها الاصفر والازرق والبيجسي . عصارها لينة دقة صفراء اللون جعالية المادة || احرف انواعه وازهارها ما يتبع .

Meconopsis grandis (S).

٢٩٠٢٨ - نَعَاشُ رَفِيع

Méconopside élevée (F).

نوع من النعناض المعمر . ساقه مزينة منتصبه تملو نحو ١٠٠ سم . اوراقه ضمية التجميع طرفية الازهار

٢٩٠١٣ - نَعْنَعَ بَرِّي * ، ظَهِيرَة ، ظَهْرَاء

Mentha sylvestris (S). *Mentha sauvage, M. sylvestre* (F). *Wild mint* (E). *Wilde Minze* (D). *Mentastro, Menta salvatica* (I).

نوع من النعنع البري الشائع الاستعمال الطبي . ساقه فروع تملو من ٢٥ الى ٥٠ سم . اوراقه اهليلجية ذرية نصلها نائض الاصاب مابق الخصار يطول من ٢ الى ٣ سم . ازهاره ضمية التجميع ابطية الازهار فواحة اللون الاخضر .

Mentha crispata (S).

٢٩٠١٤ - نَعْنَعَ جَعْدَرِي

Mentha crispata (F). *Curled mint* (E). *Krause Minze* (D). *Menta craspa, Mentone* (I).

نوع من النعنع البري المبلول . ساقه منتصبه متباعدة الفروع الزيادة تملو من ٤٠ الى ٨٠ سم . اوراقه اهليلجية الشكل ، نصلها نائض الاصاب متجعج الصفحة المشارة الحافة || ازهاره سنبل التجميع طرفي الازهار . ازهاره صغيرة ، دقيقة ، غيراء اللون يعلوها موانج ليكي || تنوره يستمر من تموز الى ايلول .

٢٩٠١٥ - نَعْنَعَ زُرْعَائِي ، نَعْنَعَ بُسْتَانِي

Mentha piperita (S). *Mentha polvra* (F). *Peppermint, White mint* (E). *Pfefferminze, Pfeffer-Wassermünze* (D). *Menta prima, M. peperina, M. pepe, M. piperita* (I).

نوع من النعنع الزراعي البقي الشائع الاستعمال . فروعها المشهورة ثلثة : الحزني والابيض والاسود . سوقها متصبه الانتصاب فروع تملو من ٣٠ الى ٩٠ سم . اوراقها معتقة . اذنية ، لاطلة الاذنيات . نصلها سنائية الشكل ، مدببة المقصبة ، نائضة الاصاب ، ميجرة الزيب ، حافة الخصار ، خشنة للمس . ازهارها سنبل التجميع طرفي الازهار . ازهارها وردية اللون او بيضاء || مداته القمالة تنه المدة وتقدر الاصاب وتتمع الانتفاخ وتفيد الصدر وتقضي على البلغم .

٢٩٠١٦ - نَعْنَعَ صَعْتَرِي ، نَعْنَعَ يَابَانِي

Mentha arvensis (S). *Mentha des champs, M. du Japon, Pouliot thym* (F). *Corn mint, Field mint* (E). *Feldminze* (D). *Menta campestris, M. coltivate* (I).

نوع من النعنع الزراعي المشهور هذه اليابان . ساقه منتصبه فروع تملو من ٦٠ الى ٩٠ سم . فروعها متراكبة جلفة . اوراقه اهليلجية الشكل تطول من ٤ الى ٦ سم . نصلها خلي الصفحة ، نائض الاصاب ، سنن الحافة . ازهارها وردية اللون ، ابطية الازهار ، ضمية التركيب ، صويانية الشكل || يزود لاستخدام المتول .

Mentha canadensis (S).

٢٩٠١٧ - نَعْنَعَ كَنَدِي

Mentha du Canada (F).

نوع من النعنع الصناعي يزود لاستقطار طهر . مده كندا وهو يزود في جميع الاقاليم المتعددة المنحرفة نحو الباردة . ساقه فروع تملو من ٢٥ الى ٧٥ سم . اوراقه معتقة سنائية الشكل . نصلها ازغب البشرة ، نائض الاصاب ، سنن الحافة ، يطول من ٥ الى ٨ سم . ويعرض من ١٢ الى ٢٥ سم . || ازهاره وردية اللون ، ضمية التجميع ، ابطية الازهار || يزود ويوجد في جميع الاربية الغنية الرطبة المتوسطة الانساج . يستقطر طهره من الازراق والازهار .

Mentha citrata (S).

٢٩٠١٨ - نَعْنَعَ لَيْمُونِي

Mentha citronnée (F).

نوع من النعنع التريبي . ساقه فروع متطيلة تطول من ٣٠ الى ٩٠ سم . اوراقه معتقة لا نظامية الشكل ، السفلى



نعنع بري



نعنع زراعي



نعناض

٢٩٠٣٥ - نفاض واليش (S). Meconopsis wallichii (F).

نوع من النفاض المحول . ساقه فروع متشعبة تملو من ٨٠ الى ١٨٠ سم . اوراقه ملتصقة ريشية غزيرة . ازهاره زرقاء اللون مثلية ، قطرها يراوح من ٣ الى ٥ سم . ثماره جراء مستطيلة رباعية الحروف النافرة الخدعة الجانب || ساقه وفروعها مزينة البهجة ، زفيها حلبي الشكل اسمر اللون ، عديم الصلابة || تنوره يستمر من حزيران الى تموز .

٢٩٠٣٦ - نفاضات (F). Amiboides (E).

رتبة كائنات حيوانية دينا من الجليات .

٢٩٠٣٧ - نفاض (F). Amibe

هي الايبه ، اطليه .

٢٩٠٣٨ - نفاض (F). Hypodermose

مرض يحدث نفث النبر في الخيل والبقر والافان .

٢٩٠٣٩ - نفاض * ، أم شيقوكة (F). Buphaga (S).

جنس طير من فصيلة الزروريوات ، انواحه قليلة . طوله يراوح من ٢٤ الى ٢٧ سم . راسه وعقه وسنوده وبنته وتظهر الى الجؤرة . سقاطه وذنبه الى السرة الباقية . نيكاه الى الصهبة . منقاره غليظ الشكل والقند ، اصفر القناعة والجسم ، احر الملقط . عيشه الى الحجرة الجؤرية ، رساه ونحاليه سمر || يعيش برفقة الحمر والحيتات من ابقار وابل ويترها يلتقط ما عليها من قراد وذباب ويستأصل من جلوجها النمر والثف ودا شبه .

٢٩٠٤٠ - نفاض (F). Turnix (S).

نفس الطائر : حسا من الماء ما يكفي .

٢٩٠٤١ - نقيول * (F). Turnix (S).

جنس طير من فصيلة النقيليات . انواعه قليلة العدد ، جميعا صغيرة لحد طويلا يراوح من ١٦ الى ١٨ سم . اولياها الى الصهبة الباقية الموشجة والمؤددة بالاصفر والاسود . رؤسها موشجة بثلاثة خطوط صفر || اناله تكد بين الاشجار والادغال ترصع اقليصها بالحبش . تبيض من ٦ الى ١٠ بيضات مخضها وسحها نحو ثلاثة اسابيع || قوته الحبوب والحشرات حل لاختلاف انواعها وانحسها النسل . يأنف الثياني والاراضي المسخاة || اعراف انواعه واشهرها النقيول الاقربى والنقيول القتال .

٢٩٠٤٢ - نقيليات (F). Turnicidae (E).

فصيلة طير من رتبة الدجاجيات . اجناسها خمسة . شكلها بين الحيل والحباري . تتميز بفتحة المنقار والسان . بمطاطة قزادم السقط وبقصر الانثى || اجناسها خمسة : النقيول والتكرو والحقم والشونس والنفاض .

٢٩٠٤٣ - نقيول (F). Trachycarpus (S).

جنس نباتات برية وزيينية من فصيلة النقيليات . انواعه المعروفة قليلة العدد ، جلوجها اسطوانية مستقيمة تملو من ٥٠ سم . الى عشرة امتار . اوراقها مستطيلة الزناد ذرية الشكل او موزية قطرها يراوح من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم . لونها الى الخضار الاملس الازرق المولج يملو تمصيح فضي .

يملوها ازهار مركب من ثلاثة ازهار جلوية اللون سباعية او تساعية البتلات قطرها يراوح من ٨ الى ١٠ سم . تنوره يستمر من تموز الى آب .

٢٩٠٤٤ - نفاض شايك (F). Méconopside à épineuse (F).

نوع من النفاض الممر . ساقه شائكة مستقيمة تملو نحو ٦٠ سم . شوكها هربي الشكل ذرب الحسة . اوراقه قليلة الشكل ، كبيرة اللد ، خاسية التفصيص . ازهاره ارجوانية اللون ، صفر الاسدية ، متوسطة اللد ، قطرها نحو ٥ سم . تنوره يستمر طوال فصل الصيف .

٢٩٠٤٥ - نفاض عشقودي (F). Méconopside à grappes (F).

نوع من النفاض الممر . ساقه شائكة مستقيمة تملو من ٣٠ الى ٧٠ سم . اوراقه كاملة عادمة للتشريح . تصلها الى الخضار الاصفر المولج . ازهاره عشقودي التجميع . ازهاره بنفسجية اللون قطرها يراوح من ٢ الى ٤ سم . بتلاتها لا نظامية التركيب واللد الذي يراوح من ٥ الى ٨ || تنوره يستمر من تموز الى آب .

٢٩٠٤٦ - نفاض كامل الورق (F). Méconopside à feuilles entières (F).

نوع من النفاض المحول . ساقه متشعبة تملو من ٥٠ الى ٩٠ سم . فروعها متبادلة لا منشعية . زفيها حلبي الشكل ، اسمر اللون ، متوسط الصلابة . اوراقه سنانة للتصل مستطيلة . ازهاره صفراء اللون ، مزدوجة البتلات ، كبيرة اللد ، قطرها يراوح من ٧ الى ١٥ سم || تنوره يستمر من تموز الى آب .

٢٩٠٤٧ - نفاض كميري (F). Méconopside de Cambrie (F).

نوع من النفاض الممر . ساقه فروع متشعبة تملو من ٢٠ الى ٥٠ سم . اوراقه ملتصقة ريشية غزيرة . ازهاره متوسطة اللد تعرض من ٣ الى ٤ سم . تيلو كبريتية الصفار ثم تنحرف نحو البرتقالي . ثماره حفية الشكل . سقاها صفة ، مستطيلة ، رباعية الحروف الحادة وبها سداسية . تنوره يستمر من حزيران الى آب .

٢٩٠٤٨ - نفاض مشعر (F). Méconopside sinuée (F).

نوع من النفاض الحولي . ساقه شائكة مستقيمة تملو من ٢٠ الى ٦٠ سم . فروعها متبادلة لا منشعية . اوراقه لا قياسية التفصيص والتشريح ، تصلها كبير اللد عايق الخضار . ازهاره عشقودي التجميع ، زرقاء اللون ، رباعية البتلات ، قطرها يراوح من ٥ الى ٧ سم || تنوره يستمر من تموز الى آب .

٢٩٠٤٩ - نفاض هاليك (F). Méconopside à feuilles variables (F).

نوع من النفاض الحولي . ساقه فروع متشعبة تملو من ٣٠ الى ٦٠ سم . اوراقه لا قياسية التشريح والتشريح . ازهاره حرار اللون ، قطرها يراوح من ٤ الى ٥ سم . ثماره جراء مستطيلة سداسية الحروف النافرة || تنوره يستمر طوال فصل الصيف .



نفاض



نقيول

قليلة المدد . جميعها وسيدة الجبل الحولي . تظهر في أوائل الربيع ثم تمتع مكانها الذي على نصال ومناطق بعض النباتات المرصوة فينتفج عن رقات تقضي على الأوراق . أشهرها نغريل الفصّة .

٢٩٠٥٣ - نَغْرِيلُ الْفَصَّة ٥

هو سويد الفصّة ، أطّله . (F). Négril de la luzerne

٢٩٠٥٤ - نَغْفِيَّات ٥
Gymnosaccae (S).
Gymnosaccae (F). Gymnosaccae (E).
مرتبطة فطور مجهرية من رتبة الزياتيات تتميز بأنواعها المرصاة . اجناسها وأنواعها كثيرة المدد تجمعها ثلاث فصائل : الخريجات والحيدبات والوقسيات .

٢٩٠٥٥ - نَعْفَكَة ٥
Veron (F). Bot, Bott (E).
برقة الثبر أي دعوصه . ج. لف . تنقف حل ظهور الخيل والأبال واليشر التي تلمسها وتنفلها بالسلها إلى الوفاها فحلوقها فاساها حيث تستقر بعض الوقت ثم ترق مع النسج إلى الجلد أو تمكث بين طبات لمدة أن يخرج مع الرؤوس .

٢٩٠٥٦ - نَعْل ٥
Hybride (F). Hybrid (E).
هو في الحيوان من كان أبوه من غير جنس أمه كالبغل الذي يتولد من الحمار والفرس .

٢٩٠٥٧ - نَعْنَع ٥
Crétillon (F). Comb (E).
سن عرف الديك .

٢٩٠٥٨ - نَعْبِيْظَةُ ٥ ، سَبْثُورِيَّة ٥
Septoria (S).
جنس فطور مجهرية من فصيلة النعبيات . يكتسبها كروية أو بيضية تكشأ محصورة في الطبقة الادمية . منها شارب الاذنكاز . جوبا مثل النسج قديمه . يورديتها مستطيلة أو عيطية . مستقيمة أو منقطة ، شفافة ، شفعية الانقسام المرضي . تحمله الزئفرة || أنواعه عديدة . قدرها نحو ٩٠٠ منها حبيوة لا ضرر فيها ومنها مؤذية وبعضها شديد الأذى . أشهرها ما يلي .

٢٩٠٥٩ - نَعْبِيْظَةُ الْأَزَالِيَّة ٥ ، نَعْبِيْظَةُ الْجَسْكَان ٥
Septoria azalae (S). Septoriose de l'azalée (F). Leaf scorch (E).
فطر مجهرى يركب الأوراق الفتية عند قاعدة عروقها الأول فيسبب احمرار النسج وإسمراره ثم ييبس ، وتفسد الأوراق ويخشو النبات . وقد يكون أذاء شديداً فيؤثر على النمو ويمنع الإزهار || يكافح عنه ظهوره بمركبات النحاس أو الزنك وبمخرق الأوراق السائلة لأنها تحافظ على بوح الفطر .

٢٩٠٦٠ - نَعْبِيْظَةُ الْأَنْحُونان ٥

Septoria callistephi (S).
فطر مجهرى يصيب أوراق سطر أنواع الاسفون الزراعي فيحطب النبات ويؤثر في نمو وإزهاره || مظهره الخارجي يقع لاهامة الشكل والحجم تركب نصل الأوراق بين الأعصاب والعروق . تبدو حنطية ، غبراء اللون ثم عميل نحو البسرة التي يعقبها الياس والاصحات . يكافح بقتلح النباتات الممرسية وبطحنه التربة بالكلس أو بسلقات النحاس .

٢٩٠٦١ - نَعْبِيْظَةُ الْبُرْتَقَال ٥
Septoria tibia (S).
فطر مجهرى حاد الأذى يركب البرتقال والخامض واليوسني

كرها شائك الحافة ، شوكه صلب النسج ، ساد الحمة . ثماره ملطية التجميع ، منية الشكل والقند ، ليلية القباب الناشف للأماكول || والنغريل يعيش أبنا زرع وفي أي ربة كانت شرط أن لا تنخفض الحرارة الدنيا عن ثلاث درجات مئوية . || أهرق أنواعه وأشهرها ما يتبع .

٢٩٠٤٤ - نَغْبُولُ أَزْعَب ٥
Trachycarpus nana (S).
Palmier à tige rudimentaire (F).

نوع من النغبول الزبني السبروتي الشائع الزراعة . ساقه اسطوانية قصيرة تملو من ٢٠ إلى ٥٠ سم . أوراقه دقيقة الشكل لامعة النصل الاخضر اللامس . ثماره جزوية اللون ، منية الشكل والقند || وهو يعطي النمو ، جميل الشكل ، يزرع في المراكب والحدائق .

٢٩٠٤٥ - نَغْبُولُ الْفَيْب ٥
Trachycarpus excelsa (S). Palmier à fibre, Palmier-chavvre (F). Fibre palm (E). Faserpalme (D). Palma de fibra (I).
نوع من النغبول السبروتي الصنابي الشائع الزراعة . ساقه اسطوانية رفيعة تملو نحو ١٠ أمتار تطوقها شباك من القيف مراكبة الحياك حنطية اللون . أوراقه مروحية الشكل قطرها يراوح من ٤٠ إلى ٦٠ سم . وزنادها يطول نحو ٥٠ سم . || ثماره منية الشكل والقند لونها إلى الزرققة المايقة || البافه مرغوب فيها تستعمل في صناعة الاكياس والحبال .

٢٩٠٤٦ - نَغْبُولُ خَرْزَيَان ٥
Trachycarpus khasiana, T. martiana (S). Palmier de Marcins (F).
نوع من النغبول السبروتي الزبني . ساقه ناشرة الخيد ، مسمرة الألياف الرطلة ، تملو من ٣ إلى ٥ أمتار . أوراقه مروحية الشكل قطرها يراوح من ٦٠ إلى ١٠٠ سم . وزنادها يطول من ٦٠ إلى ٧٠ سم . نصلها حائق الخضار اللامس يملو تمسح فضي . ثماره عنية الشكل والقند لونها إلى الصفار البرتقالي .

٢٩٠٤٧ - نَعْت ٥
Aune (F).
هو المثلث ، أطّله .

٢٩٠٤٨ - نَعْر ٥
Pycnonota (F).
هو الزبليل ، أطّله .

٢٩٠٤٩ - نَعْر ٥
Serinus (S). Serin (F). Canary (E).
نفرج . نهران . جنس عصافير خريسة من فصيلة الشرشوريات . أنواعه عديدة جميعها صغيرة القند . أنولها إلى الصفرة والصفرة الزرقية والرمشة . جميعها تألت القفص وتقتبس أدب التنريد || أشهر أنواعه النفر الكناري المعروف بالكناز .

٢٩٠٥٠ - نَعْر سُوْرِي ٥
Serin de Syrie (F).
هو النصار ونوع من النفر تنجي اللون حسن التنريد يألف البلاد الجبانية السورية .

٢٩٠٥١ - نَعْرَكَة ٥
Serine (F). She canary (E).
أنثى النفر . جسمها أصغر قدماً من جسم الذكر ورأسها أقل استدارة وثوبها أقل لمة ونحسبها .

٢٩٠٥٢ - نَغْرِيل ٥
Colaspidea (S).
Colaspidea, Négril (F).
جنس خنافس صغيرة القند من فصيلة النشاريات . أنواعه



نغريل



نبيظة البرتقال



نفل ابيض

ويعتبر النفل في الوقت الحاضر من أهم وسائل التويد التي تستخدم في تحريك الآليات المختلفة من النباتات والسفن إلى السيارات وأجهزة الصائم. || أهم البلاد المنتجة النفل هي الولايات المتحدة وروسيا وأمريكا الجنوبية والبلاد العربية وإيران.

٢٩١٠٣ - **نُفْطُور** ^٥

Micro-organisms (F).
Microorganism (E).
اسم يطلق على كل عضو مجهرى نباتي أو حيواني. ج. فطريات. ومنهم من قال فمضكري. ج. فمضكريات.

٢٩١٠٤ - **نُفْطِيَّة**

Utilitarisme (F).
Utilitarianism (E).
النفعية مذهب فلسفي يقول بأن المنفعة إن خاصة أو عامة هي سمة العمل البشري.

٢٩١٠٥ - **نُفْطَات**

Impenses (F). Expenses (E).
هو ما ينفقه المرء على حين ثابتة قابلة للاسترداد والنفقات قد تكون:

نفقات ترفيه

Impenses voluptuaires (F).
Voluntary expenses (E).

نفقات ضرورية

Impenses nécessaires (F).
Necessary expenses (E).

نفقات مفيدة

Impenses utiles (F).
Useful expenses (E).

٢٩١٠٦ - **نُفْطَاة ، مَعَاش**

Pension (F).
Pension, Allowance (E).
التفقة أو المعاش دين يؤتى بملصات دورية وقد تكون عمرية لقولم المعيشة أو التقاعد أو بسبب زمانة.

٢٩١٠٧ - **نُفْطَل ، شَبْدَر**

Trifolium (S).
Trèfle (F). Clover (E).
جنس نباتات عشبية من القرنيات القفرافية. أنواعه البرورة زباد ١٥٠ معظمها بري مرعوي وبعضها زراعي على ريشها الحولي وأخيل للممر. جلورها جنية تدور في الأرض. سوقها فراء. أوراقها مركبة ثلاثية الوريضات مستطيلة الزناد. أزهارها رؤيبي التجميع أو سنبل. أزهارها منثرية بخلفة الألوان. ثمارها سنبلية. بزورها كلوية الشكل، صغيرة القد، سمر اللون. || أعرف أنواعه وأشهرها ما يتبع.

٢٩١٠٨ - **نُفْطَل أبيض** ^{*}

Trifolium repens (S).
Trèfle blanc, T. rampant, T. d'agneau (F).
نوع من النفل المرعوي. تكثر زراعته في الأرض العربية. ساقه مفادة فراء. وريقاته بيضيه مستطيلة. أزهارها رؤيبي التجميع. أزهارها بيض. بذورها كلوية الشكل سنبلية. || يحرق في جميع الأرض أعصها للتدبج ولا ينشئ الكلسية. علفه جيد الصنف مرعوب فيه بكثر استعماله لبقير الحلوب.

٢٩١٠٩ - **نُفْطَل إسكندركاني** هو البرسيم، أطلبه.

٢٩١١٠ - **نُفْطَل البَرِّ** ^{*} **رجل الأرنب**

Trifolium arvense (S). Trèfle des champs, Pied de lièvre (F). Field clover, Hare's foot clover, Stone clover (E). Feldklee, Hasenpötschenklee (D). Mosconi maggiore, Erba lepre, Pìe di lepre (I).
نوع من النفل البري المرعوي للممر. ساقه وفروعه زباد

٢٩٠٩٢ - **نَفْث الدَّم**
هو يسق الدم، أطلبه.

٢٩٠٩٣ - **نَفْج**

Ecdosis (F). Hatching (E).
هو التفنن والتفقيص. تقول نفج القوب أو الصمصص أو الكتكتوت أي خرج من البيضة.

٢٩٠٩٤ - **نَفْجِيَّة** ^٥

Pneumatologie (F).
Pneumatology (E).
النفعية مذهب فلسفي لاهوتي يبحث في كل ما هو خاص أو منوط بالكمائنات الوسيطة بين البشر والآله أو الآلة.

٢٩٠٩٥ - **نَفْثَرُوب**

Néphrops (F).
دورية من القشريات تدمى برفوث البحر، أطلبه.

٢٩٠٩٦ - **نَفْثَرُود** ^٥

Nephrodium (S).
Néphrodie (F). Nephrodium (E).
جنس نباتات جذمورية مسرة من السراخس وعضلة البسباجيات. أنواعه المعروفة عديدة منتشرة في معظم أصقاع العالم || أوراقها مستطيلة، مركبة، وقرية التجميع، جميلة الخضار اللانس. مزاجها ريشية أو مفرشة. سداتها كلوية الشكل. زكاتها شبه ملصقة || بعض الأنواع التفرد بزروع في المراكز لتزيين.

٢٩٠٩٧ - **نَفْثَرِيد** ^٥

Néphridies (F).
نفرجيد نفايريد أعضاء الإفراز عند بعض الحيوانات الدنيا كاللوزارات وضفديات الأربيل والديدان. وهي عبارة عن أنابيب مسككة، مهدبة الجدران الداخلية تحترق الجسم وتنفتح إلى الخارج.

٢٩٠٩٨ - **نَفْض**

النفس: ما تساقط من الورق والثر.

٢٩٠٩٩ - **نَفْض**

Gaulge (F). Beating (E).
هو الفوط أو المبط أي جني الثار بواسطة الضرب بالحصا.

٢٩١٠٠ - **نَفْض**

Egronage (F). Picking (E).
فصل الحبوب أو البور من السنابل والمطر وما أشبه.

٢٩١٠١ - **نُفْطَظَة**

المطربة تصيب بقعة من الأرض وتغطي بقعة.

٢٩١٠٢ - **نُفْطَل ، نَفْطُول**

Pétrole, Naphte (F).
Pétroleum, Naphtha (E).
زيت معدني يوجد في جوف الأرض مركب من حمضي الكربون والهيدروجين الاصليين. أنواعه عديدة ومختلفة الأغراض من لين ورأحة وصفاء ولزوجة. ومنه ما يكون مصفراً قليل المتناثر الثانوية وهو أجوده ومنه ما يكون غمراً كذا ومنه ما يفرغ إلى الحرة أو السوداء ويكون بمهه شفافاً وبمسه الآخر كذا كثيراً. قلته النعني يراوح من ٧٨٠° إلى ٨٣٠° || يستخلص منه بالتقطير المواد التالية:

سحق ٧٠°

إير البترول

من ٧٠° إلى ١٢٠°

من ١٢٠° إلى ١٥٠°

من ١٥٠° إلى ٢٨٠°

من ٢٨٠° إلى ٤٠٠°

من ٤٠٠° وما فوق

البرافين والفازلين

وإخيراً المازوت الذي يعتبر رأسب التقطير



نفل البر

٢٩١١٦ - نفل بلفاني ، نفل دلماسي

Trifolium pannonicum (S). Tréfle pannonien, T. de Dalmatie (F).

نوع من النفل المرصوي الممر . ساقه زياء منتصبه قزواء تملو من ٤٠ الى ٦٠ سم . ازهاره وريسي التجميع غروي الشكل . ازهاره كبيرة القذ عاجية اللون يملوها ملو اجصر . وريقاته اعليجية تطلو من ٤ الى ٥ سم . تصلها ازغب البشرة باهت الخفسار || وهو من النباتات السبروتية التي تمشي حتى ارتقاع ١٨٠٠ م . ويجود في جميع الارربة العميقة الغور .

٢٩١١٧ - نفل ثرؤسي

Trifolium lupinaster (S). Tréfle à feuilles de lupin, T. faux-lupin (F).
نوع من النفل الزبي الممر . ساقه منتصبه قليلة الغروع تملو من ٣٠ الى ٥٠ سم . اوراقه خاسية او سباحية الورقيات ، نصلها ستانية ذرية تطلو نحو ٤ سم . ازهاره مستطيل الشكل . ازهاره ارجوانية اللون تطلو نحو ٢ سم . تنوره يستمر من حزيران الى آب .

٢٩١١٨ - نفل قريزي

Trifolium incarnatum (S). Tréfle incarnat, T. anglais, T. du Roussillon (F). Scarlet clover (E). Incarnat-Klee (D). Trifoglio incarnato (I).
نوع من النفل المرصوي الزراعي الممر : ساقه قزواء زياء تملو من ٥٠ الى ٦٠ سم . وريقاته ملوكة الشكل . ازهاره سبلي التجميع . ازهاره قريزية اللون . يزود الى الصفار الملعب الملو الج || يجود في جميع الارربة الصافة . يكثر استعماله كنبات حولي لانه سريع النمو وجيد الانتاج في اول عهده . ضروده المشهورة حسة فوارقها الصلوت بسرعة الادراك وصلها الى اربة معينة .

٢٩١١٩ - نفوح

صفة الصرع الذي لا يجس لبته . فتقول صرع نفوح . والبقرة النفوح تلك التي يخرج لبنها من غير حلب .

٢٩١٢٠ - نكيد ٥

Usable (F).
Liable to wear out (E).
صفة ما يمكن استنفاده او ما يمكن ان ينفى .

٢٩١٢١ - نكيدك *

Terebratula (S).
Térébratule (F). *Terebratula* (E).
جنس حيوانات من الرغويات عصفديات الارجل وفضية الفسفديات . انواعه المعروفة عديدة ، بعضها من متحجرات الطبقة البسفوية والبفس الاخضر ، اي الماصر ، منتشر في جميع بحار العالم || اصداها صغيرة القذ ، شبه غروية الشرنج ، لامتساوية المصاريع المائلة || تعيش لاصقة بالصخور المضمرة .

٢٩١٢٢ - نكيديات ٥

Terebratulidae (S).
Térébratulidés (F). *Terebratulidae* (E).
فصيلة من الرغويات المفصلي عصفديات الارجل . اجناسها وانواعها عديدة ، معظمها من احافير الاباج القدم والحبة البسفوية . اما اجناسها المعاصرة فنتشرة في معظم بحار العالم || اصداها صغيرة القذ ، متباينة الاشكال والاروان || اعراف اجناسها واشهرها النفيدة والتقيشة والماس والفسيث والدليمة .

٢٩١٢٣ - نغير

Stramoine (F).
هو الدائوره الشاذكة ، الحلبا .

تملو من ١٠ الى ٢٥ سم . وريقاته ثلاثية التركيب قلبية الشكل . ازهاره سبلي التجميع . ازهاره وريدية اللون .

٢٩١١١ - نفل الماء *

Menyanthes trifoliata (S). Ménélanthe, Ménéyanthe, Tréfle d'eau, T. des marais (F). Bog-bean, Buckbean, Marsh trefoil (D). Bockabohne Fleharklee, Sumpffleharklee (D). Scarfano, Trifoglio d'acqua, T. caprino (I).
نبات عشبي جلمودي متعقي معمور فصيله الجنطيانايت . اوراقه مركبة ثلاثية تشبه اوراق النفل وهي متعاقبة ، منقطة ، خاسية . ازهاره عشقودي التجميع . ازهاره صغيرة القذ بيضاء اللون موشحة بالوردي || اوراقه طيبة عديدة المتاعف الصحية وقد تستعمل استعمال الجنجل . راجس المطرفل .

٢٩١١٢ - نفل المروج * ، نفل بنفسجي ، برسيم احمر ، رطب

Trifolium pratense (S). Tréfle commun, T. des prés, T. violet, T. rouge, Tramène, Triolet, Lucotte (F). Red clover, Purple clover, Meadow clover (E). Klee, Rotarklee, Wiesenklee (D). Trifoglio rosso, T. dei prati, Moschino (I).
نوع من النفل المرصوي السبلي الممر الثاني الزراعة . ساقه منتصبه نزعاء جواء تملو من ٤٠ الى ٦٠ سم . اوراقه ثلاثية الورقيات البيضاء الشكل . تصلها مالم المستعصا يملو عند قاعدته تجتمع ابيض حل شكل ٨ . ازهاره وريسي التجميع . ازهاره بنفسجية اللون تملوها ماجة ارجوانية . يزود بنفسجية القطب الطليظ ، صفر القطب اللين || يجود في جميع الارربة الفائرة المواد الضوية اعصها المتدنية ، العميقة الغور ، الرطب || متطلباته الخاصة الكلس والبوتاس .

٢٩١١٣ - نفل أثيني

Trifolium elegans (S).
Tréfle élégant (F).
نوع من النفل المرصوي الممر . ساقه كثيرة الغروع ، متوسطة الطول ، زياء . وريقاته ملوكة النصل ، عاقبة الخفسار . وريقاته الزهرية متوسطة القذ ، كثيرة العدد . ازهاره الى الحفرة الوردية السوية || يجود في جميع الارربة ولا ينشئ القفيرة والخفينة والرملية .

٢٩١١٤ - نفل احجن *

Trifolium hybridum (S). Tréfle hybride, T. de Suède, T. d'Alsike, T. bizard (F).
نوع من النفل المرصوي الثاني الزراعة في المناطق الباردة الرطبة . ساقه دقيقة قزواء تملو من ٥٠ الى ٦٠ سم . وريقاته بيضية مستطيلة . وريقاته الزهرية كبيرة القذ . ازهاره وريدية اللون مخلفة الملو الج الذي يراو من الابيض الشاحب الى الاحمر الزاهي || حله جيد الصنن مطروب فيه .

٢٩١١٥ - نفل برتقالي

Trifolium aurantiacum (S). Tréfle orangé (F).
نوع من النفل الزبي الممر . ساقه قزواء مشبة تملو من ١٥ الى ٢٥ سم . وريقاته ستانية النصل المسن . ازهاره وريسي التجميع ، يضي الشكل ، يملو من ٥ الى ٧ سم . ازهاره صغيرة القذ برتقالية اللون || تنوره يستمر من تموز الى ايلول .



نفل الماء



نفل المروج



نفل احجن



نفل قريزي



نعيدة



نقطة الاجاص



نقطة الاراشيد



نقطة الاراز



نقطة البزيلة



نقطة البطيخ



نقطة التفاح

٢٩١٢٩ - نقيضة الأرز *^٥

Mycosphaerella oryzae (S).

نظر مجهرى ركب حصف الارز في شعري تموز وآب
يلوذه ويديه الى اسفله || مظهره الخاريجي يقع بمبشرة
لاقياسية الشكل والترتيب تملو نصال الصفب تسبب
ذويها وييساهم الباكر بما يؤدي الى سوء الاسبال وتدني
الانتاج || اعساله نودلية الشكل . بويغاته ثنائية الخلية
تطول من ١٤ الى ١٥ م. وتعرض نحو ٤ م. || افرازه
الحفقة حتى الآن لا تتسبب المكافئة لانها لم تتجاوز
٢٪ .

٢٩١٣٠ - نقيضة البزيلة *^٥

Mycosphaerella pinodes (F). Blight of peas, Leaf spot of peas (E). Brandfleckenkrankheit der bohnen und erbsen (D).

نظر مجهرى يمتري اوراق وصف البزيلة والبيقية والجلبان
والخمر والترمس || مظهره الخاريجي يقع لاقياسية الشكل
والترتيب لوها الى المصلحة يحيطها حصار اسمر . تركيب الوراق
والسنت والسوق فتشوها وقد تسبب ذبول القرون وييساهم
قبل اكتمال الحب || وهو من القنطور الفرية التي لا تتكاثر
الا في ظروف بيئية محدودة تساندتها حوامل مناعية خاصة
تولمها تدني الحرارة وثقل الضرع وكثرة الرطوبة الجوية
النسبية .

٢٩١٣١ - نقيضة البطيخ *^٥

Mycosphaerella citrullina, Dipodina citrullina, Ascochyta cucurbitis (S).

نظر مجهرى ركب البطيخ والتام والخيبار والكوس وغيرها
من القرعيات فيؤذيها اشد الاذى || مظهره الخاريجي يقع
سحر لاقياسية الحجم والترتيب تعيب نصل الوراق تسبب
يباس التفسخ ثم تصيب السوق فتسقطها يثور قرعية
تتحول دون وصول كامل التفسخ الى الفروع والاوراق
تتسبب اسودادها وييساهم || بكنيداته نودلية الشكل ،
حشيتة اللون ، مبيسة اللق ، تطول نحو ١٦٥ م. . بويغاته
شفافة ، ثنائية الخلية ، شبه اسطوانية الشكل تطول من
١٠ الى ١٨ م. . وتعرض من ٣ الى ٥ م. . يكافئ عنه
ظهوره باستعمال احد الادوية الفاملورية للتعامل تغيرا على
النبات والرتبة .

٢٩١٣٢ - نقيضة التفاح *^٥

Mycosphaerella pomorum, Cylindrosporium pomorum (S). Fruit spot, Brooks' fruit spot (E).

نظر مجهرى ركب ثمار التفاح . مظهره الخاريجي يقع
دقيقة قطرها نحو ٥ م. . تصيب بشرة الثمرة تبتو حشيتة
اللون او غصنار حافية او سمراء . ركب التفاح في آب
ويستمر في نشافة حتى الخزن بالبراد حيث يتوقف ويركن
الى قيات البليات || اعساله التي تمسح على الوراق الساقطة
والتي يراوح قطرها من ٧٠ الى ١٠٠ م. . تحسن بعض
الارتقاك التي لا يقل عددها من ٣ . بويغاته شبه اسطوانية
طولا ١٩ م. . وعرضها ٣ م. . اما بكنيداته التي
تركب للآثار فهي تغلف العديد من الكائنات الخيطية
المستقيمة او الموضوعة التي تطول من ٥ الى ٨ م. . وتعرض
البشرة لانها تقا تلعب السوق اذ لا تغفل فيه اكثر من
مليمتين || يكافئ مكانة التفاح .

٢٩١٢٤ - نقيض *^٥

Labile, Caduc (F). Deciduous (E).

قابل الاعبال أي السقوط .

٢٩١٢٥ - نقيضة *^٥

جنس فطور مجهرية من النخاميات ونصيلة المشطيات .
اصحابها بسيطة ، ككناها مديمة النكدة ، يوضع خفاف
او زيتوني اللون يحمل وثيرة متفرقة تقصصه الى خلتين
متماثلتين القدر . منها هامي الاكناز في التفاح شبه
تعلولي || انواعه الفارة عديدة اعزلها ما يتبع .

٢٩١٢٦ - نقيضة الاجاص *^٥

Mycosphaerella sentina, Sphaerella sentina, Sphaerella pyri, Septoria pyri, Septoria piricola, Septoria nigririma (S). Septoriosa du polier (F). Leaf spot of pears (E). Weibfleckenkrankheit der birne (D).

نظر مجهرى يمتري اوراق الاجاص وقد يصيب آثار .
مظهره الخاريجي يقع صغيرة مبشرة ، قطرها من ١ الى
٤ م. . لوها الى الخلي يحيطها اطار احمر اللون يتنصبي
المواج ، تركيب نصل الوراق فتؤذيها ومنعها من القيام
بوظيفها على الوجه الاكل || بكنيداته ناكثة نودلية تطول
من ١٥٠ الى ١٨٠ م. . بويغاته اسطوانية مقوسة شفافة
مستتة الاطراف ثنائية الانقسام ثلاثية الخلايا تطول من
٢٣ الى ٤٣ م. . وتعرض نحو ٣ م. . || تكاثره مشروط
بالموائل الجارية الموافقة || يكافئ كسائر فطور جنسه .

٢٩١٢٧ - نقيضة الاراشيد *^٥

Mycosphaerella arachidicola, Carcospora arachidicola, C. arachidis (S).

نظر مجهرى ركب اوراق النبات وسوقها . مظهره الخاريجي
يقع زبينية ثم حشيتة لجووية قطرها يراوح من ١ الى ١٠ م
تطو نصال الوراق على صفحاتها السفلى ثم تنتشر على
السوق والمخاليق فتؤذيها ومنعها عن القيام بوظيفها على الوجه
الاكل || كوانبه ربادية اللون ملتوية الاطراف . ككناها
صغيرة الشكل مستقيمة الجسم او مقوسة ، طولا يراوح
من ٣٧ الى ١٠٨ م. . وعرضها من ٣ الى ٥ م. . انقسامها
شديدة التباين يراوح من صغف الى ٣ اصغاف || يكافئ
باستعمال الادوية الفاملورية التي لا ينجح من تراكم
عناصرها المتعالة . ومن المستحسن تطهير البذار قبل
استعماله بمحلول سلفات النحاس المركز ٥ ٪ مدة ساعة
من الزمن .

٢٩١٢٨ - نقيضة الاراشيد المستديرة *^٥

Mycosphaerella berkeleyi, Carcospora personata, Cladosporium personatum, Septogloeum arachidis (S).

نظر مجهرى ركب سوق الاراشيد واوراته ليؤذيها وقد
يسبب ذويها وييساهم || مظهره الخاريجي يقع مستديرة
تلو حشيتة اللون ثم تسمر وتنتهي باليباس والانفجرات .
كوانبه نودلية الشكل لجووية اللون . ككناها اسطوانية
الجسم ، مستتة الاطراف ، حشيتة ، تطول من ١٨
الى ١٠ م. . وتعرض من ٥ الى ١١ م. . انقسامها شطرها
بنسبة ضغفن الى ٩ اصغاف . اصحابها وارتقاها برمية
الشكل . بويغاتها ثنائية الخلايا لا متساوية الشكل والحجم .
يكافئ مكانة نقيضة الاراشيد .

بقع حطئية تركب العصف فتسبب ذبوله ثم تسبب مصيفات الحب فتزهرها بنقطة سود. وقد تركب البرية في نطيلها فيلوس كنقطة سوداء داكنة || كوابنه بسيطة التركيب لاقياسية الجسم والاستطالة لزينا إلى السمرة. كتائله طرية الإبتكار. بويغاته بيضية الشكل، حطئية اللون، فردية أو ثنائية الخلية تطول من ١٨ إلى ٢٤ م. وتعرض من ٧ إلى ١٠ م. || أضراره قليلة لا تستوجب المكافحة المكلفة.

٢٩١٣٩ - نَيْطَلَةُ الزَّرْبَقُونِ

Mycosphaerella miliagrana, M. *microscora* (S). فطر مجهرى يصيب الزربون في أوراقه فيؤذيها وفي قضبانها الفتحة فيقرسها ويصلبها. || مظهره الخارجي بقع كثيرة حمراء اللون، مستديرة الشكل، قطرها يراوح من ٣ إلى ٤ م. تركب فصل الأوراق فتسبب يباس السجج والشفايف. وهو حل القضيبان بقع مستطيلة لا قياسية الشكل والحجم تركب بشرة السماء قرب أبط الورقة فتقرسها وتحرقها يطار رافق جوي أبيض. || كوابنه غسية التجميع متصية. كتائله سوطية صفراء اللون تطول من ٣٠ إلى ٤٦ م. وتعرض من ٣ إلى ٥ م. أصانته كروية الشكل قطرها يراوح من ٥٥ إلى ١٠٠ م. إزاقاته وشبه تحفن أربعة أزواج من البويغات الشفافة التي يراوح طولها من ١٦ إلى ٢٠ م. وعرضها من ٣ إلى ٤ م.

٢٩١٤٠ - نَيْطَلَةُ السُّوسَنِ

Mycosphaerella macrospora, *Didymella macrospora*, *Heterosporium gracile*, *Scolecotrichum cladosporioideum* (S). فطر مجهرى يصيب أوراق السوسن واللوبث فيؤذيها وي* إلى تحوها وأزهارها. || مظهره الخارجي بقع مستطيلة حطئية اللون جويية الخثار خضراء الامار الخارجي تطول من ٤ إلى ١٠ م. وتعرض من ٢ إلى ٥ م. تركب النصال على صفاتها العليا فتقرسها وتقرسها وتسبب اصفرارها وذبولها. || كوابنه اسطوانية الشكل ملتوية الاطراف تطول نحو ٢٠٠ م. وتعرض نحو ١٢ م. كتائله طرية الانتساب حلوظا يراوح من ٤٠ إلى ٨٠ م. وعرضها من ١٥ إلى ٢٠ م. وهي لا نظامية الاقسام الذي لا يقل من ضمطين ولا يفوق الخمسة. || يكافح قبل الانزعاج باستعمال سائل بوردو المركز ١ %.

٢٩١٤١ - نَيْطَلَةُ الشَّوْكَزْدَرِ

Mycosphaerella tabifica, *Sphaerella tabifica* (S). Pourriture du cœur de la betterave, Pied noir de la betterave (F). Dry heart rot of beets (E). Herzfleule der Runkelrübe (D). فطر مجهرى يصيب أوراق الشوكران ويجردو فيصلبها. مظهره الخارجي بقع مستديرة تبدو مخطاة اللون ثم حمراء تركب الاوراق في اواسط الصيف، حل صفحات نصالها العليا فتسبب اصفرارها وذبولها ثم تنتقل بواسطة الاوعية الشبكية إلى داخل الجذور فتصلبها وتوقع بها اشد الاذى || يكافح باستعمال محلول بوردو حل مرتين او ثلاث مرات ابتداء من اول تموز.

٢٩١٤٢ - نَيْطَلَةُ الشَّيْثَانِ

Mycosphaerella fragariae, *Sphaerella fragariae*, *Stigmatae fragariae*, *Septoria fragariae*, *Ascochyta fragariae*, *Cylindrosporium grevilleianum*, *Ramularia tulasnei* (S). Maladie des taches rouges du fraisier, Taches brunes des feuilles du fraisier (F). Leaf spot of strawberry (E). Weißfleckenkrankheit der Erdbeerblätter (D). فطر مجهرى يصيب الشيك باراوقه فيؤذيها. مظهره

٢٩١٣٢ - نَيْطَلَةُ الثَّوْتِ *

Mycosphaerella morifolia, *Cylindrosporium mori*, *Septoria mori*, *Septogloeum mori*, *Chelaria mori*, *Phloeospora mori* (S). Fausse-rouille du mûrier (F). فطر مجهرى تركب اوراق الثوت. مظهره الخارجي بقع مزوانية صفراء اللون، حمراء الاملاء، تستري نصل الاوراق وتسبب جفاف النسج || أضراره محصورة بمضى العطب الذي يحل بالنسج وقد يصل في بعض المراتق انتطيلة والظفر المتأخية للملاءة إلى نحو ٥ % من مساحة النصل. هذا مع العلم ان دود القتر يقرض اكل النسج الشالية. يكافح بنسج الاشجار قبل اوراقها باسد المركبات النحامية.

٢٩١٣٤ - نَيْطَلَةُ التَّيْنِ

Mycosphaerella bolleana (S). فطر مجهرى تركب التين في أوراقه فيؤذيها. مظهره الخارجي بقع مزوانية تملو النصل حل صفحته السفلى ضمن حدود العروق والأعصاب، تبدو مابقة اللون الى ان يكتسها الحمل الاصل فتتألفها اذ ذاك ملو الصفحة العليا بقع سر وازفة مقروسة || كتائله وشبه الشكل زيتونية اللون تطول من ٣٥ إلى ٤٥ م. وتعرض من ٧ إلى ٨ م. انتساشها يراوح من ضمطين ٦ اصماف. أضراره تأنه لا تستوجب المكافحة.

٢٩١٣٥ - نَيْطَلَةُ الثَّوْمِ

Mycosphaerella alliecia (D). فطر مجهرى تركب اوراق الثوم والكرات فيؤشوها وقد يؤذيها ويصيب يباسها || مظهره الخارجي بقع صغيرة كثيرة مبعثرة تبدو بيضاء اللون ثم يدهاء وتنتهي بالسمرة واليباس || أصانته تتكاثر حل صفحي للنصل. إزاقاته تطول من ٥٥ إلى ٦٠ م. وتعرض نحو ١٤ م. بويغاته ثنائية الخلية تطول من ١٦ إلى ٢٠ م. وتعرض نحو ٥ م. أضراره لا تصدى الاوراق.

٢٩١٣٦ - نَيْطَلَةُ الْحَمِصِ

Mycosphaerella rabiei, *Ascochyta rabiei*, *Phyllotricha rabiei* (S). Anthracnose du pois chiche (F). فطر مجهرى يصيب الحمص في جميع اعضاءه الهوائية. مظهره الخارجي بقع بيضية الشكل أو مستديرة تركب السوق والاوراق والسلف. تبدو حطئية اللون ثم تنحرف إلى البترة والنبات يحرقها اطار اخر. وعند اشتداد اذاها تفرح السوق وتذبل الاوراق وتسبب انحلاس السلف. بويغاته اسطوانية الشكل تطول من ١٢ إلى ١٤ م. وتعرض نحو ٤ م. || يكافح اما بتطهير الحمص قبل بلو ذلك ينقعه نحو خمس دقائق في محلول سائل النحاس المركز ٥ % او بنسج زراعته قواً بعد ازهارها بمحلول بوردو المركز ١ %.

٢٩١٣٧ - نَيْطَلَةُ الْحَبَّوْزِ

Mycosphaerella populiicola, M. *populorum* (S). فطر مجهرى تركب الحور في أوراقه فيؤشوها. مظهره الخارجي بقع مزوانية صغيرة اللد حطئية اللون تملو النصل فتقرسها || تشوبه لا يستوجب المكافحة.

٢٩١٣٨ - نَيْطَلَةُ الثَّوْرُوعِ

Mycosphaerella tulasnei, *Cladosporium herbarum*, *Hormodendron cladosporioides* (S). Noir des céréales, Mouchetage, Moucheture (F). Black point, Dark, Brown-tip (E). Schwarzen des Getreides (D). فطر مجهرى يقرض عصف الزرع ومصيفات السنايل في الخطة والشعير والشوفان والشيلم || مظهره الخارجي



نَيْطَلَةُ الثَّوْتِ



نَيْطَلَةُ الثَّوْرُوعِ



نَيْطَلَةُ السُّوسَنِ



نَيْطَلَةُ الشَّوْكَزْدَرِ



نَيْطَلَةُ الشَّيْثَانِ

مستطيلة لا قياسية الانقسام الذي يراوح من ٣ الى ١٢ .
بويضاته ثنائية الخلية . || اخراره زجيدة لا تستوجب
المكافحة .



نقطة القزقل

٢٩١١٧ - نَقِيطَةُ الْكُشْكَشَةِ *

Mycosphaerella maculiformis, *Phyllosticta maculiformis*, *Cylindrosporium castaneicolum* (S).

فطر مجهري يركب اوراق الكستنة والبنلق وبعض الانجبار
الحرجية كالاسفندان والثلث والبيلا والشرم والسندنيان .
مظهره الخارجي يقع صغرة مزوانية تصيب نصل اوراق
على صفحاتها السفلى فتبدو يضاء اللون ثم سمراء .
بكتيادته مدمجة التجميع لا قياسية الترتيب لونها الى السرة .
بوه اسطواني الشكل رباعي الانقسام او خماسي . بويضاته
تطول نحو ٥ مي . وتعرض نحو ١ مي . || اخراره تنحصر
بما يلبحه من اذى بالاوراق وما يسببه من نقص في الغذاء
يؤدى الى الاجبال الباكر .



نقطة التطن

٢٩١٤٨ - نَقِيطَةُ الْكُشْكَشِ *

Mycosphaerella ribis, *M. grossularia*, *Septoria ribis*, *Phyllosticta grossularis* (S), *Septoriosa du grossellieri* (F), *Septoria leaf spot* (E).

فطر مجهري يركب اوراق الكشكش . مظهره الخارجي
يقع فسجية مزوانية الشكل تظهر في نموز واثب لونها الى
الصعبة الحمراء للمواج ثم تيل الى القبرة وتستقر على الون
الاضمحل يعلو توتيم اسود . || بويضاته خيطية مستطيلة
شغافة لا قياسية الانقسام الذي يراوح من ٢ الى ٥ .
اخراره زجيدة . يكافح كسائر فطوره جنسه .



نقطة الكرز

٢٩١٤٩ - نَقِيطَةُ الْمُرَّانِ *

Mycosphaerella fraxini (S).

فطر مجهري يركب المران في اوراقه فيصيب بياضا .
شبيهه بتكار مستوى الخلد بين النسيج الحليكية والقجوية
مظهره الخارجي يقع مستدرة حطية اللون اسطوانية الختام .
كثافته خيطية الشكل ، مستقيمة او مقعرة الاطراف
تطول من ٣٠ الى ٤٠ مي . وتعرض من ١ الى ٢ مي .
اخراره لا تستوجب المكافحة .

٢٩١٥٠ - نَقِيطَةُ الْمُرَّانِ *

Mycosphaerella brassicicola, *Sphaeria brassicicola*,
Dothidea brassicae, *Phyllosticta brassicae*, *Ascom*



نقطة الكستنة

brassicae, *Phoma olivacea* (S). Ring-spot (E).
فطر مجهري يصيب الملفوف في اوراقه الخارجية فيطها
ويهي الى التلو فيضيره وقد يؤذي . مظهره الخارجي
يقع مستدرة رداء اللون سيد المحور ظهريا يراوح من ٥
الى ١٠ سم . تركب النصل تقديب اصفرار وذيوله .
اصانه وبكتيادته تراكب وتتشابك في البقعة الواحدة
فتصغروا الى بؤرة سوداء تتحاري من مقلها الون البورفات
التيقة الشغافة التي تطلو نحو ٥ مي . وتعرض نحو ١ مي .
اخراره التي تجين عليها حويل الرطرية تراوح من ١ الى
٢٥ % يكافح بتطهير البدار وتطهير تربة الماشاتل او
باصمالة مائل جديدة .

٢٩١٥١ - نَقِيطَةُ التَّنْبُوتِ *

Mycosphaerella manihoti, *Cercospora castvae*, *C. manihoti*, *C. henningsii*, *Septoglossum manihoti* (S).

فطر مجهري يصيب التنبوت في اوراقه فيضيهما ويؤذيها .
مظهره الخارجي يقع لا قياسية الشكل ، رداء اللون
تركب الوراق تقديب يباس النسيج وانفثاته .
كثافته تطلو من ٢٠ الى ٧٥ مي . وتعرض من ٥



نقطة الملفوف

الخارجي يقع صغرة لا قياسية الترتيب والشكل والحليم
تركب نصل الوراق على صفحاتها العليا ولا تمتع من
المعاليق . تبدو جؤوية اللون بتسجية المواج ثم تتعرف
الى السرة وتستقر على القبرة يحويها اطار اخر داكن .
كوابه فارشة ، كثافته مستقيمة او مقعرة وهي شغافة
اسطوانية مستدرة الاطراف . بويضاته لا قياسية الانقسام
تطول من ٢٥ الى ٥٥ مي . وتعرض من ٢ الى ٣ مي .
اخراره محصورة بحطب النسيج وحرمانه من التيام يسله
الجسموري على الوجه الاكل . || يكافح قبل الانثوار
وبعد الفلعا . وقد نسمحن تملطس جلود الشيك قبل زرعها
بمحلول الحامض الكبريتي المركز ٢ % الذي يقضي على
هذا الفطر وغيره من الفطوره الفسارة .

٢٩١٤٣ - نَقِيطَةُ الْعَلَقِيَّ *

Mycosphaerella rubi, *Septoria rubi* (S).

فطر مجهري يركب اوراق العليق والرميح البري والجلوي .
مظهره الخارجي يقع مزوانية صغرة اللث صفها يطلو من
٢ الى ٣ مي . لونها الى الحطلة تملوها شمة سمراء تركب
نصل الوراق منذ انشباب الفروق تسيب يباس النسيج
ثم انفثاته وسقوطه . || كثارته يحصل عادة بعد جني الثار
وهو اذا لامته العوامل الجؤوية يحمش الوراق الفنية
فيحسبها ويلدجا . || يكافح كسائر فطوره جنسه .

٢٩١٤٤ - نَقِيطَةُ الْقَرْقَلِ *

Mycosphaerella dianthi, *Didymella dianthi*, *Hecerosporium echinulatum*, *Helminthosporium echinulatum* (S).

فطر مجهري يصيب القزقل فيجميع اعضاءه الهوائية .
مظهره الخارجي يقع مستدرة الشكل او يفسية ، حطية
اللون ، مهدية بطار احمر او بتسجية تركب الوراق ثم
السرور وتعد الى تويج الزهرة وبتلها . || كوابه غسبة
التجميع ، موجية الغلام ملتوية . كثافته اسطوانية الشكل
لا قياسية الانقسام الذي يراوح من ضعف الى اربعة
اصناف . بويضاته تطلو من ٣٥ الى ٤٥ مي . وتعرض
من ١٢ الى ١٦ مي . || يكافح باصمالة سائل بودرو
المركز ١ % قبل الانثوار .

٢٩١٤٥ - نَقِيطَةُ الْقُطْنِ *

Mycosphaerella gossypina, *Cercospora gossypina* (S). *Cercosporiosa du cottonier* (F).

فطر مجهري يركب اوراق القطن فيؤذيها دون ان يهي
الى النسو والانتاج . || مظهره الخارجي يقع صغرة سمراء
اللون مهدية بالاحمر تلو اوراق القطن القريبة من التربة
التي لا تطلها اشعة الشمس . || كوابه هريبة الشكل
تعلو من ١٢٠ الى ١٥٠ مي . كثافته شغافة تطلو من
٧٠ الى ١٠٠ مي . وتعرض نحو ٣ مي . وهي سداسية او
سباعية الاجزاء . اصانه حطية الشكل ظهريا يراوح من
٦٠ الى ٩٠ مي . انثاقها اسطوانية تطلو من ٤٥ الى
٥٠ مي . وتعرض من ٨ الى ١٠ مي . بويضاتها وشية ،
ثنائية الخلية تطلو من ١٥ الى ١٨ مي . وتعرض من ٣
الى ٤ مي . || اذاه لا يستوجب المكافحة .

٢٩١٤٦ - نَقِيطَةُ الْكَرْزَةِ *

Mycosphaerella cerasella, *Cercospora cerasella* (S).

فطر مجهري يركب اوراق الكرز والهلج . مظهره الخارجي
يقع صغرة مستدرة حطية اللون مهدية بالاحمر تنصل
نصل الوراق ثم تقيس . وقد يفضها الرجح فيبدو النصل
كالفرلاك اللبؤر الثوروب . || كثافته صقية الشكل

والانثى تمتع المكن محبدياً في بطون الاثارة || البرقة عند بلوغها الادراك التام تقطع نحو ٦ م. ثوبها في اول مدها الى الجفوة ثم ينصرف الى البنفسجي الفاتح تملو خطوط قاطبة من النقط السود .

Humerus

٢٩١٥٦ - نَقَّاذ

النقا هو عظم العضد .

Puresé (F). Purité (E).

٢٩١٥٧ - نَقَاءٌ ، نُفَيْرٌ

هو غلر الثشي من العناصر الغريبة منه .

Picole tridactylus (S).

٢٩١٥٨ - نَقَّابٌ

Picole tridactyle (F).

طائر من فصيلة النقاريات ورتبة المشفقات ، موطنه يشمل المناطق الجبلية من الشرق الادلى واروية || جسمه معتدل القدر يطول نحو ٢٠ سم . يسقط نحو ٣٠ سم . ثوبه الى السواد الفضي الملبق بالابيض في الصق والاباحر . صدره ويظهر الى البياض المشير بالثني ، جبته وقلته وصغره الى السواد اللامع . قنة رأسه ذهبية اللون يطولها تشيز قصي . حذقة عينه زرقاء اللون . منقاده وساقه الى السمرة السوداء . ثوب الانثى لا يختلف من ثوب الذكر الا بمضاب الفتة اللغوي المشير بالاصفر || ويتميز النقباب بكونه ثلاثي الاصابع خسلوفاً لسائر اجناس النقاريات الرباعية الاصابع || قوته الحشرات واساريمها وبعض البذور البرية || يفتن عنه في تجاوبت الاشجار . الانثى تبيض من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها وحدها دون الذكر الذي يؤمن لها الغذاء .

Syndicat (F). Syndicate (E).

٢٩١٥٩ - نَقَابِيَّةٌ

هي جمعية اشخاص يتصلون الى مهنة واحدة او مهنة متشابهة للغرض المشروع من مصالحهم المهنية .

٢٩١٦٠ - نَقَابِيَّةٌ

Charrua défonceuse, Défonceuse (F). Trenching plough (E). سكة خضفة مقنطرة تستعمل لفلج التربة او سحرها وانتراع حمارتها على اعماق تراوح من ٦٠ الى ١٢٠ سم .

Coccothraustes (S).

٢٩١٦١ - نَقَّاذ ، نَقَّاذ

Gros-bec (F). Hawfinch (E).

جنس طير من فصيلة الشرشوريات . انواعه المعروفة ١٢ جميعها من صافير المناطق الحارة والمعتدلة . مسرهما العالم القديم والجلدية . تتميز بمنطقها الضخمة التي تمتلئها من كسر حبة الموز واللوح والكروك . قوتها النار والحروب والخرجات . تدن في الاجتار الغذاء انماها تنقع من ٣ الى ٥ بيضات تحضنها متواصلة الاكوار نحو ١٥ يوماً . اعرف انواعه واشهرها النقااذ المبدول .

٢٩١٦٢ - نَقَّاذ مَبْدُولٌ

Coccothraustes vulgaris (S). Gros-bec vulgaire, Gros-bec commun (F). Common hawfinch (E). طائر من النقااذ وهو اشيع انواع جنسه واكبرها واضخمها نقَّاذٌ ومنقَّاذٌ . طوله نحو ١٩ سم . رأسه كشي اللون ، قلته الى الصبغة الرمدا . زفاده وزروره سود . ظهره وصدره الى الصبغة الحمرة . بطنه ابيض . جناحه سود القاعدة ومظف الاطراف . يبيض الريس وبعض الاطراف . ذنبه اسود اللون ينهي بقمة بيضاء . منقاره الى الزرق العائقة . حذقة عينه وردية . ساقه الى الحمرة الطلحة . يألف

الى ٦ م . انقسامها لا نظالي الترتيب يراوح من ٢ الى ٩ . اصابتها سطحية الاوتكار . كروية الشكل ظهرا يراوح من ٩٠ الى ١١٠ م . انقلها رمية تحسن اربعة ازواج من البويضات الشفافة الثانية الخلية .

٢٩١٥٧ - نُفَيْطَةُ الْمَوْزِ *

Mycosphaerella musicola, Cercospora musae (S). Cercosporiose du bananier (F). Sigtekta disease (E). فطر مجهري يركب الموز في اوراقه فيقطعها ويسبب ذبولها ويهيء الى الفكاسات ان لم يندنها . || مظهره الخارجي نقاط دقيقة زيتية اللون تظهر في اوائل الصيف على الاوراق الجديدة ثم تقسم وتتسفر نهائياً على شكل مستطيلات يراوح طولها من ٣ الى ١٠ م . وقد تصل بعضها فتصبح بقعاً فسيحة مستطيلة لا تقاسية الخيم . اما لونها فيسقط على الصبغة الخلفية يحرقها اطراف اسير اللون ، اطول التهديد . كرابه ضمية التجميع . كتالده سوية الشكل تطول من ٢٠ الى ٨٠ م . وتعرض من ٢ الى ٦ م . انقسامها يراوح من ٣ الى ٧ اصناف . بويضاتها شفافة ثنائية الخلية تطول من ١٤ الى ١٨ م . وتعرض من ٣ الى ٤ م . اغراض منقولة بمدى انتشاره لانه يسبب يباس الاوراق وتذللن للكيلة او احداها وعدم تكوينها . يكالغ باستمال سائل يوروه المركز ٢ ٪ يضاف اليه ١ ٪ من الدبس و ٥ ٪ من الفلدا .

٢٩١٥٣ - نُفَيْقٌ

Canalicule (F). Canaliculus (E).

Nephila (S).

٢٩١٥٤ - نُفَيْلَةٌ *

Néphile (F). Nephila (E).

جنس ريلات من المناكب الكبيرة القد . انواعها المعروفة نحو ٦٠ منتشرة في معظم المناطق الحارة من العالم القديم والجلدية || ذكورها اصفر قدماً من انثيا . انواعها متراكبة الانوار يطلب فيها الاصفر والاحمر والاسود . جراحها سم الاطراف || يربونها في بعض البلاد الاسيرة والامريكية لاستخراج نواصها الحريري الاصفر اللون || اشهر انواعها الصالحة للربية :

N. chrysogaster (S).

نفيلة ذهبية اللون

N. clavipes (S).

نفيلة لوزياته

N. madagascariensis (S).

نفيلة مدغشكر

٢٩١٥٥ - نُفَيْسٌ كَرْدِيْنِيٌّ *

كَرْدِيْنِيَّةٌ *

Novius (Macronevius)

cardinalis, Vedula cardinalis (S).

Novius cardinal (F). Vedula cardinalis (E).

حشرة عاتلة من فصيلة الدعسوقيات ورتبة ممدات الاجنحة تألف بساتين الحشيشات والمياقل والحدائق . خنافسها ويرتلها تيش على الاثارة الذي يفتك بالخشيشات والورد والميموزا ... || جسمها صغير القدر يطول من ٣ الى ٤ م . ثوبها احمر يطول تقيج اسود . رأسها صغير الحجم . اسود . عيناها صغيرتان . زباناها صغريان . صغريان . لكاهها نيشان . ظهرها شديد الاحمضاد . مستدير المظهر اللامع . الاثاف . غداها كهيئة الحمل . ارسافها رباعية العقل || احيائها الحولية سة . تخرج الحشرة الجسلانة من بيئاتها الشتوي في اوائل الربيع . تسرح في النهار . جلها يستمر من ٣٥ الى ٤٠ يوماً باستثناء الجيل السادس ، الى الشتوي ، الذي يستمر نحو ٦٠ يوماً || تساقط بعد ظهورها باسبوع



نفيلة الموز (١) نفيلة الموز (٢)



نفيلة



نفيس كرتياني



نقَّاب



نقااذ مبدول



نقار احمر الرأس

٢٩١٦٩ - **نقار كبير** * ، **نقوبة الصنوبر**
Picus major (S). *Pic épéche* (F). Great spotted woodpecker (E).

نوع من النقار موطنه صفيح الارياب يمتد من اواسط الشرق الى اطراف اوروبا الغربية. || جسمه يطول نحو ٢٤ سم. ثوبه متباين الالوان الزاوية. ظهره واعالي جسمه الى السواد اللامع. عنقه وحنجرته وحنجاءه مبقعة بالابيض. رأسه اسود. قنقه ويؤخر بطنه الى الحمرة. صدره وبطنه الى البياض الاخير. حلقته عينه جردية اللون. منقده وربطه الى الكهية الرصاصية. انشاء سره التقف. يألف اشرار الصنوبريات ولا يقرب من الحقائق والجانين الا عند سوس الحاجة الى الطعام.



نقار اسود

٢٩١٧٠ - **نقاريات**
Picidae (S). *Picidae* (F). *Picidae* (E).

فصيلة طير من رتبة المقلقات اجناسها وانواعها عديدة تبسها ثلاث عائلات. اشهر طيورها النقار والواو.



نقار صير

٢٩١٧١ - **نقار** *
Penelope (S). *Pénélope* (F).

جنس طير من فصيلة الترناسيات. انواعه قليلة، جميعها مستطيلة الشكل الرشيق. قوة المنقار الاجسن. رؤسها قزمية الريش المستطيل انثام، عارضه ملط. اجنحتها مستديرة، اذياها طويلة. الواها الى السرعة الداكنة يطوها وتوشم وتوشح || تألف الاشرار. تمش اشرار كبيرة قوتها الثار والجوب والحشرات. تدش اعاشتها في الاشجار. اناتها تبش نحو ٤ يضاات تحبها وسدها اربعة اسابيع.



نقار كبير

٢٩١٧٢ - **نقاص** *
Drosophylla (S). *Drosophylla* (F).

ثبات معمر مقدس وسيد الجنس والوع من فصيلة البسمانيات. ساهه مقرة. اوراقه عصفية مستطيلة منصبة تحفة التمثل للفرور بازيب البايق الشكل الذي يشعر كل حشرة تقربه من يقضي طيا ويمصها. انزاعه صفراء اللون، حلقية التجميع، هابة الازكار، تقوم حل شراخ مودق قومي الانتشاب.

٢٩١٧٣ - **نقاص** ، **سحابة** ، **سحابة** *
Burretta (F). *Curet* (E).

٢٩١٧٤ - **نقاق**
Bombina, *Bombinator* (S). *Bombina*, *Bombinator* (F). *Bombinator* (E).

جنس صفاد من فصيلة الصفاجيات. انواعه المروعة قليلة العدد، مهدا البلاد المعتدة الحرارة من العالم القديم || اجسامها صغيرة القد. اولها تواوج من ه الى ٧ سم. جلدها مثاقلة تفرز عند المس رفوة يضاة تثير العطاس والتدعيم. الواها السطوية الى السرعة تملوها سرجة قائمة. الواها السفلية تواوج من الصفرة الباهة الى الحمرة تملوها رقة طحلاء زرقاء المواج || تعيش في المناقع ويجاري الماء تركها في الليل وتبعي لها عند الفجر || اجرية دملها وشية الشكل تحوي من ٢٠ الى ٤٠ دملة مبطلة تنفد بهد التشرة بنحو ثلاثة اسابيع || اشهر انواعه النقاق الاصفر البطن والنقاق لثاري البطن.



نقار

٢٩١٧٥ - **نقاق أصغر البطن**
Bombina *salva* (S). *Bombinator* *à ventre jaune* (F). *Bombinator* *à ventre*

نوع من الصفاد النقالة ينتمي الى فصيلة الصفاجيات. موطنه يمتد من الشرق الاطل الى اطراف اوروبا. يألف



نقاص

الاشراج والنباتات انحصها اشراج الصنوبر والسنوب ولا يقرب من الحقائق والجانين الا في فصل الشتاء وعند الحاجة القاهرة الى القوت.

٢٩١٦٣ - **نقار** ، **نقار** ، **نقار** *
Picus (S). *Pic* (F). *Woodpecker* (E).

جنس طير من فصيلة النقاريات. انواعه عديدة منتشرة في جميع اصقاع العالم باستثناء استراليا. جميعها مستطيلة تركب جذوع الاشجار فتقرصها ويترق قشورها وتقبب شكيرها لاستخراج ما فيها من اساريج وديدان. اجسامها متوسطة القد، الواها ملونة. منقارها قوية، مستطيلة، غمدة. اجنحتها منفرجة الاطراف. اذناها متوسطة الطول. ارباغها قصيرة. جزئية التسرل. قوتها الحشرات ورقاتها واسارياها وديانها من النسل الى المناكب والجنادب ولا تمت من الثار والجلوز والصنوبر عند الحاجة. || تدش في تجاويف الاشجار اناتها تدش من ٤ الى ٥ يضاات تحبها وسدها من ١٤ الى ١٧ يوما. تعتبر من الطيور النافذة التي تستحق الحماية. || اشهر انواعها واصرفها ما يتبع.

٢٩١٦٤ - **نقار أحمر الرأس** *
Picus medius (S). *Pic mar*, *Pic à tête rouge* (F). *Middle spotted woodpecker* (E). *Mittlerer Buntspecht* (D).

نوع من النقار. موطنه الشرق الاوسط واروبه. جسمه يطول نحو ١٨ سم. ثوبه لوب النقار الكبير الا انه احمر الرأس. || يألف اشرار السنديان دون سولها. انشاء تحبها بمناوبة الذكر من ٥ الى ٧ يضاات.

٢٩١٦٥ - **نقار أخضر**
Pivert (F). هو الشسة الخضراء، اطلها.

٢٩١٦٦ - **نقار أسود** * ، **نقار سوداء** ، **نقار**
Dryocopus martius (S). *Dryocope noir*, *Dryocope noir*, *Pic noir* (F). *Black woodpecker* (E). *Schwarzspecht* (D).

طائر من النقاريات. موطنه جبال الشرق واروبه. جسمه يطول نحو ١٧ سم. وبطنه ٧٧ سم. ثوبه الى السواد السوي القائم الداكن يستثنى منه قة الرأس القرمزية. جناحه متوسط القد، ذاق الطرف. حلقته عينه صفراء اللون. يألف النباتات والاشراج. قوته الحشرات والذناير والثار العنية ويض الجوب والصنوبر. || الاثي تحب من ٣ الى ٤ يضاات نحو ١٥ يوما.

٢٩١٦٧ - **نقار الفيلك** هو الحون، اطلها.

٢٩١٦٨ - **نقار صغير** * ، **نقوبة السنديان**
Picus minor (S). *Pic épéchetta* (F). *Lesser spotted woodpecker* (E).

نوع من النقار. موطنه يشمل الشرق الاوسط واروبه باستثناء المناطق النائية || جسمه يطول نحو ١٥ سم. ثوبه الى السواد الماين اللامع يطوه تجديع ابيض معوض ومستطيل. جبهته وحنجرته الى البياض الاخير. قة رأسه قزمية اللون. يتوسط صدره سيالة سوداء يمتد من قاعدة المنقار الى اواسط الجوش. حلقته عينه حمراء اللون. منقاه وربطه الى السرعة الرصاصية. انشاء لا حرة في رأسها. يألف الاشرار حل اختلاف انواع اعجابها اما يغفل اشرار السنديان والزان. || قوته الحشرات واسارياها ورقاتها ويكبها. انشاء تدش من ٥ الى ٧ يضاات تحبها بمناوبة الذكر ١٤ يوما.

ه يضاة لونها الى البياض الناصع تملوه رقشة جلوية .
أعرف أنواعه وأشهرها ما يلي :

نقشارة الحدائق Phyl. trochilus (S). Pouillot fits (F).
نقشارة الشمال Phyl. borealis (S). Pouillot boréal (F).
نقشارة زرقالة Phyl. sibilatrix (S). Pouillot siffleur (F).
نقشارة صناعية Phyl. rufa, Phyl. collybita (S).
Pouillot vélocé (F).

٢٩١٨٥ - نقص
Déficience (F).
Deficiency (E).
عطل بعض العناصر الغذائية أو صغر في عيها الأذى يؤدي إلى خلل ملموس .

٢٩١٨٦ - نقص القيمة
Moins-value (F).
Decrease in value (E).
نقص القيمة أو النقص هو انخفاض قيمة الشيء بين زمني .

٢٩١٨٧ - نقطة
Point
٢٩١٨٨ - نقطة الإرتكاز
Point d'appui (F).
Support-Point (E).

٢٩١٨٩ - نقطة الإستصْراد ، نقطة الجليد
Point de congélation (F). Congélation-Point (E).

٢٩١٩٠ - نقطة الإنصهار
Point de fusion (F).
Fusion-Point (E).

٢٩١٩١ - نقطة الإنطلاق
Point de départ (F).
Starting-Point (E).

٢٩١٩٢ - نقطة الإنقلاب
Point d'inflexion (F).
Inflexion-Point (E).

٢٩١٩٣ - نقطة البُخار
Point d'ébullition (F).
Boiling-Point (E).

٢٩١٩٤ - نقطة البروز
Point d'émergence (F).
Emergence-Point (E).

٢٩١٩٥ - نقطة الجُذْم ، نقطة التكاثع
Point de section (F). Section-Point (E).

٢٩١٩٦ - نَقَطُور
Necturus (S). Necture (F).
جنس حيوانات قازية من السرفويات وفصيلة القطرسيات .
أنواعه المعروفة قليلة العدد موطنها أمريكا الشمالية . تألف
المتاع وصفات مجاري الماء || أجسامها شبه أسطوانية
الشكل ، تطول من ٣٠ الى ٤٠ سم . رؤوسها شبه
عُرْطِيَّة الشكل . عيونها شديدة الصغر . قوائمها قصيرة ،
رباعية الأصابع || أوتارها الى السرة المرقشة بالأسود ||
قوتها الديدان والدويبات الصغيرة .

٢٩١٩٧ - نَقَطُول
Noctule (F).
نوع من الخفافيش المفيدة يدهى عُسُفَات السَّق ، اطلبه .

٢٩١٩٨ - نَقْص ، نَقْصِيص
Eclosion (F).
Hatching (E).
هو في الطير زمن انفلاق البيض عند اكتمال الخلقة وهو
نقب السك زمن إنتاج السرة اما في الحشرات فهو زمن
نقب المكن .

٢٩١٩٩ - نَقْلُ الْحَقِّ
Transfert (F).
Transfer, Conveyance (E).
هو ان ينقل المرء سقاً له الى غيره . وفي القانون التجاري

المتاع ومجاري الماء . مسرعه دعوي . يمشي نحو عشر
سنوات . قوته الحشرات الصغيرة والديدان والذباب || جسمه
صغير القد يطول نحو ٥ سم . عند الذكر ونحو ٦ سم .
عند الانثى . رأسه صغير الحجم : عيناه جاحظتان . حنكه
مستعرضة الشق ، سنن الفك العلوي . قاعته الامامية
قصيرات ، رباعية الاصابع الطليقة ، اما الخلفيات
فمستديرات ، خاصيتا الاصابع المقيدة بحجاب كامل .
جلده مغطى القشار يقرض عنه لحمه رغبة بيشاء نافذة
تثير العطاس والدعوى . ثوبه العلوي الى السرة الخطيطة
السفاه المواجه تملوها بقشة قائمة ومرتجة خضراء . بطنه
وسائر صفحته السفلى الى السرة القفاحة تملوها مشحة
صفراء ورقشة زرقاء خفيفة || بيائها الشثري يستمر نحو
اربعة اشهر . يتميز ببلته الصنوية الرائحة الجوزية
الشكل والقد . نقيقه قصير التنبه ، متتابع الارتفاع ،
شديد الانزعاج .

٢٩١٧٦ - نَقَّالَة
Brouette (F). Wheelbarrow (E).
عجلة يدوية بمجرة بدولاب واحد يستعملها الانسان لنقل
الايام الخفيفة .

٢٩١٧٧ - نَقْب
Défonçage, Défoncement (F).
Subsoil ploughing (E).
كري التربة الزراعية لقلبها وتفتيت مدرها وتنظيفها
واعدادها لزراعة القابلة .

٢٩١٧٨ - نَقَح
Silice pure (F). Pure flint (E).
أخلاص من الزبل .

٢٩١٧٩ - نَقْدًا ، عَدًا
Comptant (F).
Spot cash, Ready (E).
طريقة دفع ثمن مبيع عند تسلمه او اجرة عمل عند نهايته .

٢٩١٨٠ - نَقْدَة
هي النصفه ، اطلبها .

٢٩١٨١ - نَقْدَة
هي التكريرة (الانثري) والتكريرة (ابن الارابي) .

٢٩١٨٢ - نَقْرَة مَرَّة
Taches amères (F).
Bitter pit or stippen (E).

عارض يصيب ثمار التفاح المغرقة في البراد ، اسبابه المعروفة
حتى الآن تعود الى الشفرة في التخذية والري والى مناخ بعض
المناطق || مظهره الخارجى بقع مستديرة منخفضة السطح
قطرها من ٣ الى ٦ سم . وضعها الداخلي يغور من ٢ الى
١٠ سم . فيسبب تغير لون اللباب المطوب ويكسبه مرارة
المذاق .

٢٩١٨٣ - نَقْرِيص
Simulie (F).
هو النجس والقرس ، اطلبها .

٢٩١٨٤ - نَقْشَاكَة
Phyllopeuste, Phylloscopus (S). Pouillot (F). Wil-
low warbler (E).

جنس طير من فصيلة الدغليات . أنواعه المعروفة عديدة ،
أصغرها لمام القديم ، منها الارباب والقواطع التي تجوب الشجر
والقرب . جميعها صغيرة القد ، متراكبة الالوان بكث
فيها الاصفر والاشقر . قوتها الحشرات والحوام . تألف
الحادق والجثث القريبة من المزارع . تدن في الشجيرات
والاشجار المنخفضة . أعشاشها عُرْطِيَّة الشكل جانبية الداخل .
تحضن من مرتين الى ثلاث مرات في العام . مسكنتها نحو



نقشارة



نقوس

أرجح من ٨ إلى ١٢ م. ثوبها رصاصي اللون لامع المواجه. يكثر وجودها في الصيف. تمتص مكباتها على دود القطن فيشتف من يرقات ذرية دقيقة كدمل وتقتل على جسم المائل وتعيه.

٢٩٢١٠ - **نُقْرِيَّة فَصِيَّة** *
Gonia capitata (S).
ذبابة نافثة من التقريرات طويلة أرجح من ١١ إلى ١٣ م. رأسها فصي اللون. جسمها رصاصي اللون تملأه خلة لفسية مضطربة صمر. تمتص مكباتها على البودرة المتناثرة فيشتف من يرقات نمة تقتل على جسم المائل وتعيه.

٢٩٢١١ - **نُقْرِيَّة صَبْدَلِيَّة** *
Phryxe vulgaris (S).
Phryxe vulgaire (F).
حشرة ذبابة من ذوات الجناحين وفضيلة التقريرات. جسمها بطول من ٦ إلى ٩ م. قشورها متكاثف الخمل والحلب. ثوبها إلى الطحلة الموشجة بالأبيض. رأسها كبير، اطبل اللون. غطوها مستدل الطويل. زباناها صغيران، تحيلون. عيناها ناشزتان، أرجوانيتان. ورشها كيرتان، اصفر القواعد. قوائمها إلى السرة السوداء تظهر الحشرة الجملانة من نيسان إلى تشرين الثاني. وهي مبدولة في كل مكان تكثر فيه الأزهار || يرقاتها تتطفل على اساريع الحشرات من مختلف الفصائل.

٢٩٢١٢ - **نُقْرِيَّة مَدْمَلَك** *
Gymnosoma rotundatum (S). *Gymnosoma arrondit* (F).
حشرة ذبابة من ذوات الجناحين وفضيلة التقريرات. جسمها صغير القد، متكاثف الخمل، بطول من ٥ إلى ٧ م. رأسها كبير الجرم، اصفر اللون، ملعب المواجه. غطوها مستدل الطويل. زباناها دقيقتان، صغيران، عيناها كيرتان، أرجوانيتان، صدها إلى الصفار المذهب. بطنها شبه مكدور الشكل، اصفر اللون، صفاني المواجه تملوه، في قمه، ثلاث نقط سود. ورشها موشجان بالأصفر. قوائمها إلى السرة السوداء || تظهر الحشرة الجملانة من ايار إلى آب. سرسوها البراري حيث تكثر النباتات الصيوانية الانزهار || يرقاتها تتطفل على نصفيات الاجنحة.

٢٩٢١٣ - **نُقْرِيَّات** *
Tachinidae (S). *Tachinidae* (F).
فضيلة حشرات ذبابة نافثة من رتبة ذوات الجناحين. اجناسها وأنواعها كثيرة التمدد مختلفة الألوان الاحجام. تحمل على طويها بمستوى سطحها الطرية بعض الهلج الشاك القاسي. قوائمها إلى الانزهار والفرزات || يرقاتها طفيلية تركب أكثر الحشرات انحصا مستحيات الجناح ونصفيات الاجنحة والنشائيات والحرفقيات والمعدسات. وهي لا تفرق بين الحشرة والاسروع والمخادعة.

٢٩٢١٤ - **نُقْرِيَّات** *
Bothrioccephalidae (F).
فضيلة دود من المنطقيات الرغيفات تتميز بجلقاتها المسرقة العادة الحبيرات التناسلية.

٢٩٢١٥ - **نُقْرِيَّة** * ، **قَيْشِيَّة رَضْمَاء** *
Bothrioccephalus (S). *Bothrioccephale* (F). *Bothrioccephalus* (E).
جنس ديدان قدية مستطيلة من فضيلة التقريرات. أنواعها عديدة جميعها مؤذية تتطفل على الحيوانات الفقارية.

هو نقل ملكية السند الاسمي من اسم البائع الى اسم المشتري.

٢٩٢٠٠ - **نَقْلُ الْمَلِكِيَّة** *
Mutation (F). *Transfer* (E).
هو كل عمل قانوني ينقل من شخص الى آخر ديناً او حقاً صيباً.

٢٩٢٠١ - **نَقْم** *
Point de pivot
النقم هو وسط الشيء او النقطة المحورية التي ترتكز عليها قياسات المدار.

٢٩٢٠٢ - **نُقُوس** *
Copernicia (S).
Copernicia (F). *Wax palm* (E). *Carnaubapalma* (D). *Copernicia* (I).
شجرة من فصيلة النخلات، اعطانها الاقاليم الحارة الرطبة. جلدتها مالم السواد بطول نحو ٨ امتار. اوراقها مامية الاركانز مرمسية الشكل مستطيلة الزناد المدم الشوك. نصفاها جامد الصنفعة، مالم البشرة، جميل الخشار الزامي. نسيجه مضروب فيه يستعمل في صناعة القبايع ثماره زيتية المادة يستخرج منها دهن النقوس الشائع الاستعمال.

٢٩٢٠٣ - **نُقُوسِي** ، **عَصْبِدِي** *
Huméral (F).
Humeral (E).
نمت تعري في يطلق على كل ما له صلة بالنقا.

٢٩٢٠٤ - **نُقْبِيَّة** *
Lacunelle (F). *Lacunula* (E).
٢٩٢٠٥ - **نُقِير** *
هو الانقود، اخلبه.

٢٩٢٠٦ - **نُقِير** *
Auge (F). *Trough* (E).
جرن مستطيل يستعمل لاحكام الماشية او لاسقاتها.

٢٩٢٠٧ - **نُقِيرِ اصْفَقُ الْجَنَاح** *
Phsis crassipennis (S). *Phasie crassipenne* (F).
حشرة ذبابة من ذوات الجناحين وفضيلة التقريرات. جسمها متوسط القد، متكاثف الخمل والحلب القصير، بطول من ٨ إلى ١١ م. رأسها كبير، انفس، اصفر اللون. غطوها مستدل الطويل. زباناها تحيلون، صغيران، عيناها كيرتان، أرجوانيتان. صدها قسي الشكل، اصفر اللون، يتفصي الخمار والقاعدة والتطبيع. بطنها شبيه الشكل. اصفر اللون، تملوه بقعة بنفسية. ورشها كيرتان، منساكان، ايضان، اصفر الخمار الاسامي. قوائمها إلى الخنطي الصفاني. ارباعها سود || تظهر الحشرة الجملانة من حزيران إلى ايلول. سرسوها البراري وكل مكان تكثر فيه الانزهار || يرقاتها تتطفل على مستحيات الجناح ولا تصف عنه الحاجة من نصفيات الاجنحة.

٢٩٢٠٨ - **نُقِيرُ اَهْلَب** *
Mimtha lais (S).
ذبابة نافثة من التقريرات. طولها نحو ١٥ م. رأسها وصدها إلى الزرقعة الالامسة. بطنها اخر اللون يملوه حلب كتيب اسمر || يرقاتها تعيش على مكن غديات الاجنحة. ج. انقرع.

٢٩٢٠٩ - **نُقِيرُ رَضْمَايِي** *
Eutachinus larvarum (S).
ويدعى تاكنيا كبيرة. ذبابة نافثة من التقريرات. طولها



نقير اصفر اجناح



نقير اهل



نقير رصاصي



نقير نفسي



نقير ملول



نقير مدلك

انها تبيض من ٣ الى ٤ بيضات تحضنها بمناوبة الذكور من ١٧ الى ١٨ يوماً || احرف انواعها واشهرها النكات الاسود الذليل .

٢٩٢٢٥ - نَكَاتٌ اَسْوَدُ الدَّيْلِ *

Recurvirostra avocetta (S). *Récurvirostre avocette*, *Avocetta* (F). *Avocet* (E).
طائر من النكات طوله براوح من ٤٧ الى ٥٠ سم. قو به الى اليافس التاسع باستثناء منقار ورأسه وظهور وذنبه وكل جناحيه وابارهما السود || يحوي العالم القديم في طلب المصيف والمشي . يرتاد الشواطئ والاعوار والمناقع ويجاري الماء || يعيش اسراباً كبيرة براوح عددها من ٥٠ الى ٥٠٠ .

٢٩٢٢٦ - نَكَاتِيَّاتٌ

Récurvirostridae (F). *Recurvirostridae* (E).
عامة طير من فصيلة دجاجيات الارض وسيدة الجنس قليلة الانواع تتميز ببساطة ودقة منقبيها المدببة للملاط المتخففة الى اللامد . اجنحتها مستطيلة ذلقة تلتف القش . ارسافها رفيعة ، مستطيلة ، سرية البشرة . اصابعها كفية ، حشائها كامل موصل .

٢٩٢٢٧ - نَكَاسٌ

النكاس والآنكس نوع من السلك عظيم جداً (التاج) .

٢٩٢٢٨ - نَكَافٌ

Parotidite (F). *Parotitis* (E).
النكاف ويدهى الباب اللثة هو التهاب الغدة التكتفية .

٢٩٢٢٩ - نَكْبَاءٌ

هي الريح التي تلوو دون ان يتعين لها مهب .

٢٩٢٣٠ - نَكْبَيْبٌ جَبَّارٌ *

Nyctibius grandis (S). *Ibijau géant* (F).
طائر راس من فصيلة السديات . موطنه بعض مناطق امريكا الجنوبية . يألف الاجراع الكثيفة البعيدة عن كل عران . يسرح في الليل ويبعث طول النهار جاثماً على غصن شجرة لا يتحرك البتة || جسمه كبير القد يطول نحو ٥٥ سم. بسطه نحو ١٣٠ سم. ريشه شديد التنعيم متوسط اللون . قو به الى الطحلة الصفراء المزاج يعلوها تجعجع اسمر وتشيز اشجع ورقشة ربهاء . رأسه مستعرض الجرم . عيناه كبيرتان كمتنتان . رموش عينيه طويلة . سباله كثيف مستطيل . منقاده قليل الامتداد الخارجي . عنب العين البهرة ، عريض القاعدة ، عظيم الشدق . عنته بالغ القصر . جناحه رجب مستطيل . ذنبه مستدير الطرف . رشفاه قصيران . اصابعه مستطيلة قوية || طائرانه خفيف الحركة ، سريعة . سعيه على الارض احرق . قوته الحشرات من جميع الفصائل والرتب ومن جميع الاحجام . يلدن عشه في تجاريف الاشجار . الاثني تضع من بيضتين الى ثلاث بيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو ثلاثة اسابيع .

٢٩٢٣١ - نَكْبَيْبٌ

Noctilio (S). *Noctillon* (F).
نوع غفاقيش من حارة الرامسات يتميز ببساطة رأسه وفرويته . بانشرام شفته العليا المتصبة يطول جناحه . له نوعان موطنها جزر الاتيل || يعيش جماعات قليلة العدد . يسرح من الفسق الى القصر . قوته الحشرات على اختلافها والاسماك الصغيرة . يألف الماوار واقواب الصخور البحرية .

تميش حياتها البدائية في الماء حيث تتطفل على بعض الاسماك وتنتقل منها الى معدة الانسان || احرف انواعها واشهرها ما يتبع .

٢٩٢١٦ - نُفَرِيَّةٌ عَرَبِيَّةٌ

Bothriocephalus latus (S).
اكبر انواع الديدان النفرية القدية التي تتطفل على الانسان طولها نحو ١٠ امتار . رأسها ثنائي الوافس ، عادم الكلايب ، مغروطي الشكل ، مقطوع المقدم . جسمها عديد السكم المستعرضة الضيقة . يعتقد ان ملقوحاتها المهدية التي تميش في الماء وتتطفل على بعض الاسماك منها السلمون والرتوة ، تتطفل بذات الاسلوب على بعض الناس الذي يتسبحون في بعض المياه المذبة .

٢٩٢١٧ - نُفَيْشَةٌ * ، فَيْعَةُ الْأَمْرَاطُورِ

Spirifer (S). *Spirifera*, *Chapeau de l'Empereur* (F). *Spirifer* (E).
جنس حيوانات من الرغويات عضديات الارجل وفضيلة التفيديات . انواعها المعروفة عديدة مظهرها من متحجرات الطبقة القوية . انواعها المعاصرة منتشرة في معظم بحار البلاد المعتدلة الحارة || اصدافها صغيرة القد ، شوزنها قريب الشبه بالقيمة التي كان يرتديها الامبراطور نابوليون . جميعها نظائرية التركيب ، متساوية المصارع الا ان اليسارية منها أقل اصدافياً من اليمينية || تعيش لاصقة بالصخور المدفونة .

٢٩٢١٨ - نُفَيْسٌ

Imperfecti
نمت قمرية توصف به الفطور الناقصة التركيب او الشاذة الحرومة من بعض مراحل التطور .

٢٩٢١٩ - نُفَيْسِيَّاتٌ ، نُفَيْسِيَّاتٌ

Infusoria (F). *Infusoria* (E).
صنف حيوانات دنيا من الاولاي تشمل السوطيات والميديات وعدة رتب وفضائل .

٢٩٢٢٠ - نُفَيْسَةٌ

Néonate (F). *Neonate* (E).
نمت ترعفي يطلق على الحشرة المسجدة الثق .

٢٩٢٢١ - نُفَيْقٌ

Cossement (F).
صوت الصفدع . نق الصفدع : صات .

٢٩٢٢٢ - نُفَيْمٌ

Ligne médiane de la route (F).
خط وسط الطريق .

٢٩٢٢٣ - نُفَيْكَةٌ

Paraphysa (F).
أغلية المستطيلة في نكة الفطور الزقية والدعامية .

٢٩٢٢٤ - نَكَاتٌ

Recurvirostra (S). *Récurvirostra* (F).
جنس طير من النكاتيات . انواعها اربعة جميعها كبيرة القد طولها براوح من ٤٠ الى ٥٠ سم. مناقبها مستطيلة ، متخلفة الى اللامد ، قش السيف . ألوانها بلقاء اللون يكثر فيها الابيض || تجوب السبلاد الاسيوية والاروية والافريقية . ترتاد ضفاف الانهار وشواطئ البحار والمناقع والاعوار . قوتها القشريات والرغويات والديدان والدعاميس والحشرات . تنكت الحما والخز والربان في طلبها || تئد اعشائها في التراب افاحيها مستطيلة الشكل قليلة السمق.



نَفِيرَة



نَفِيرَة



نَكَاتٌ اَسْوَدُ الدَّيْلِ



نَكْبَيْبٌ جَبَّارٌ



نكروية

أوراقه كبيرة فارشة قطر تصلها براوح من ٣٠ الى ٦٠ سم. أزهارها صفراء اللون قطرها براوح من ١٠ الى ٢٥ سم. مائلتها تطلو من ١٠٠ الى ٢٥٠ سم. || جذاميره نشوية للمادة، سكرية الطعم، مأكولة. تنوره يشتر من حمز الى آب.

٢٩٢٤٦ - نَلْمَبُو الشَّرْقِي * ، نَلْمَبُو قُبْطِي
بَقْلِي قُبْطِي * ، جَمَاسَة

Nelumbo nucifera, Nelumbo speciosum (S). Nélombo d'Orient, Fève d'Egypte, Lis rose des Egyptiens, Rose du Nil (F). Nelumbo, Egyptian bean (E). Nelumbo, Nussmummel (D). Nelumbo (I).

نوع من النلبو البروتي الميزل. مهد مياه الهند وأفريقية الشرقية. يكثر في مياه النيل. أوراقه كبيرة اللد مستديرة التمثل قطرها براوح من ٣٠ الى ١٠٠ سم. اعتلها شاككة. أزهاره وريدية اللون أو عاجية، مستوية العرف الفلج، كبيرة اللد، قطرها براوح من ٣٥ الى ٣٥ سم. مائلتها تطلو من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم. || ثماره نشوية للمادة، مأكولة. تنوره يشتر طوال فصل الصيف.

٢٩٢٤٧ - نَلْمَبُو
Philoptère (F).
هو القردو جنس حشرات جلدية ذرية اللد من التمشيات. انواعه عديدة منها تم البط والجوام والمهام والزنج والنسور.

٢٩٢٤٨ - نَمَاشَة
Trichodectes (F).
هي النمة، من الحشرات الجلدية التي تركب الحشرات الناجية.

٢٩٢٤٩ - نَمَاسَة ٥
Platystoma (S).
Platystome (F). Platystoma (E).

جنس حشرات من فصيلة النماشيات ودية ذوات الجناحين. انواعها المعروفة متوسطة البدن منتشرة في بعض اقطار العالم اغصها البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة تطلو من ٥ الى ٨ سم. رؤوسها مستعرضة. عينها كبيرة، فارقة عند الشقين. قرونها الاستشعارية قصيرة، ثلاثية النصل، تنتهي بنسيلة دقيقة. اعطائها معتدلة الطول. ملاسها صغيرة. كواسلها شبه بيضيه الشكل. بطونها يرمية تنتهي بمزقات ذرية. رؤوسها مبيجة. قوائمها نشطة بطولها في اقتناذها حلب دقيق || جملها واسعة. تألف الحراج والقنايات وكل مكان تكثر فيه الاضرار. يرقاتها عازلة أو دامة.

٢٩٢٥٠ - نَمَاسِيَات ٥
Platystomidae (S).
Platystomidae (F). Platystomidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين. اجسامها وانواعها المعروفة متوسطة البدن منتشرة في معظم اصقاع العالم || اجسامها متفارقة اللد، تطلو من ٤ الى ١٢ سم. رؤوسها مستعرضة. عينها كبيرة، فارقة عند الشقين. قرونها الاستشعارية قصيرة، ثلاثية النصل. كواسلها شبه بيضيه الشكل. بطونها يرمية. رؤوسها مبيجة. قوائمها قياسية || الحشرة الجملانة واسعة اما البرقة فخاصة وبضها دامن وبها التي تميش على الجبل وفي قوهر الزنايق || اشهر اجناسها النماشة.

٢٩٢٥١ - نَمَاشَة
Odontoglossum (S).
Odontoglossum (F). Odontoglossum (E).

جنس نباتات اممية برمية ويزيانية من فصيلة السحليات. انواعها المعروفة تقارب السنين جميعها من نيوت جبال

٢٩٢٣٢ - نَكْدَة قلة عشب المرعى أو البرية.

٢٩٢٣٣ - نَكْرُوبَة *
Necrobia (S).
Nécrobie (F). Necrobia (E).

جنس حشرات خنفسية من فصيلة الزنجيات. ودية فحذيات الاجنحة. انواعها المعروفة قليلة البدن || اجسامها صغيرة اللد. أطولها تراوح من ٤ الى ٧ سم. أنثاها وحيدة اللون أو ثنائية. الريحدة اللون زرقاء. أما الثنائية فزرقاء زهرجاء || مسرجها جدوي. تميش على المواد العضوية والجلود الجافة والفراء.

٢٩٢٣٤ - نَكْرُور الشَّط *
حشرة تسمى دقة الشواطئ، اطلها.

٢٩٢٣٥ - نَكْش، نِكاش
Plochage (F).
Digging (E).
اصلاح التربة الزراعية واقتلاع اللد ملها أو اصلاح التربة الخروسة وتفتيت مدرها وتنظيفها من الاشباب.

٢٩٢٣٦ - نَكْمَة
Hyménium, Chapeau (F).
Hymenium, Pileus (E).
هي غلفة الفطر اي قبعته التي تحوي جهاز الانجاب والتكاثر.

٢٩٢٣٧ - نَكْمِي
Hyménial (F).
نمت تعريني يطلق على كل ما له صلة خاصة بالنكمة.

٢٩٢٣٨ - نَكْمَة
Parotide (F). Parotid gland (E).
هي اللدة النكفية اي بنت الأذن.

٢٩٢٣٩ - نَكْمُون ٥
Nucéon (F). Nucleon (E).
التكليون هامة تولى نولة اللديرة (يوجد نكلمونات اعجائية تدعى بروتون ونكلمونات حبيوة تدعى نكرون).

٢٩٢٤٠ - نَكْمُونِي ٥
Nucéonique (F).
Nucleonic (E).
نمت تعريفي يطلق على ما هو خاص بالنكليون.

٢٩٢٤١ - نَكْمِي ٥
Nécomien (F).
ساف حصيلي يعتبر قاعدة سافات الطبقة الطباقية السفلى.

٢٩٢٤٢ - نَكِيب
التكيب : دائرة الحافر والحف.

٢٩٢٤٣ - نَلْمَبُو
Aubépine azérolier (F).
هو الزعرور البادي، اطلها. الواحدة نلكة.

٢٩٢٤٤ - نَلْمَبُو
Nelumbo (S).
Nélombo (F). Nelumbo (E).
جنس نباتات عشبية جذمورية مائية من فصيلة النيلوفرديات. انواعها المعروفة قليلة البدن، اعطائها مياه البلاد الحارة. جذاميرها ممددة. اوراقها مستطيلة الاعتناق مستديرة التمثل. أزهارها كبيرة اللد. ثمارها كروية الشكل مفصية في طست مستعرض الاطار. بزورها نشوية للمادة للمأكولة || اشهر انواعها ما يتبع.

٢٩٢٤٥ - نَلْمَبُو أَصْفَر * ، نَلْمَبُو أَصْفَر
Nelumbo lutea (S). Nélombo jaune (F). Yellow nelumbo (E).
نوع من النلبو البروتي. مهد البلاد الامريكية.



نلبو اسفر



نلبو اشرق



نماشة كبيرة الزهر



نمت النمر



نمة البقر



نمة الخيل



نمة الضأن



نمة النمر



نمة الكلب

أمركة الاستوائية . بعضها جميل الزهور كبيرها شائع
الزراعة التريبتية المركبة في المصاري والمنازل || أوراقها
قرصية الانتصاب ، مستطيلة ، قليلة المدد . أزهارها
عقدية التجميع ، تتركز على شرايين ليفية مصمتة ||
أعرف أنواعها وأشهرها ما يلي :

٢٩٢٥٢ - نماشة كبيرة الزهر *

Odontoglossum grande (S).
Odontoglossum à grandes fleurs (F).
نوع من النفاشة . أوراقها سنائية النصل ، مستطيلة ،
قليلة المدد ، تطول من ١٥ إلى ٢٥ سم . شرايعها يحمل
من ٤ إلى ٩ أزهار ، قطر الزهرة يراوح من ١٠ إلى
١٨ سم . لونها إلى الصفرة البرتقالية يعلوها تمشيش جزوي .
شيفات لأزهار تبتية اللون صفر الحراج || تنويرها
يستمر طوال فصلي الخريف والشتاء .

٢٩٢٥٣ - نماشة مختنجة

Odontoglossum crispum (S).
Odontoglossum crispé (F).
نوع من النفاشة . أوراقها صفحية الشكل تطول نحو ٤٠ سم .
شرايعها يحمل من ١٥ إلى ٢٥ زهرة . قطر الزهرة يراوح
من ٨ إلى ١٢ سم . بتلاتها وفصلها متجاوئة النصال لونها
إلى البياض العاجي تعلو نمشة كستنية سفعاء لائظية
الترتيب . شيفات الأزهار صفراء اللون ، اهليجية
الشكل ، مدنية الأطراف || تنويرها يستمر من أوائل
شباط إلى أواخر نيسان .

Fil fin (F). *Fine thread* (E). **نماص** ٢٩٢٥٤
غيط الابرة من أي مادة كان .

Vertex ٢٩٢٥٥ **نماشة**
التأفة : أعل الرأس وتعرف بالنافوخ .

Myrmecophile (F). **نمالة** ٢٩٢٥٦
نمت تعريفي يطلق على النبت الذي يأوي النمل ويعوله .

Thym ghebre (F). **نمالم** ، **نمالم الملك** ٢٩٢٥٧
هو البستر الامير ، أطلبه .

Pigamon (F). **نمامة** ٢٩٢٥٨
هي التليب ، أطلبه .

Anabolisme (F). *Anabolism* (E). **نمائية** ٢٩٢٥٩
علم يبحث في دور شيوخ الكائنات الحية .

Hippocrepis (S). *Hippocrépis* (F). **نمشت** ٢٩٢٦٠
جلس نباتات برية من فصيلة التريبتات الفرائسية . الأنواع
المعروفة ١٢ منها الجنبات والجنبيات والاعشاب . أوراقها
مركبة شطية مستطيلة الأضلاع . أزهارها صفراء اللون ،
سيوانية التجميع طويلة المالحق . ثمارها قرين ملفطة
وريقة غمرمة الأطراف || أشهر أنواعها وأكثرها انتشاراً
نمت النمر .

٢٩٢٦١ - نمشت الغنم *

Hippocrepis cornosa (S). *Hippocrépis à toupet*,
Hippocrépis à toupet, *Fer à cheval* (F). *Tufted horse-*
shoe vetch (E). *Schopffueisenklee* (D). *Ferro di*
cavallo, *Mandorlo dei boschi* (I).
نوع من النمشت الطيبي البري المرصوف . تتغلفه النمر بشهوة

ويحمي عليه درعا . عشته مصرة فراء . أوراقه مركبة
وريشية وترية التجميع . وريقاته يضيبة النصل ، داكنة
الخضار . أزهاره طرفي ، سيوانية ، رباعي الترتيب أو
خاسية . ثمار قرين ملفطة ، مقبضة ، غمرمة الخار .
أوراقه وأزهاره وبلور طيبة ، مرة المذاق ، قابضة ، تفيد
المعدة وتقويها ، تمل الجراح وتقوي أثرها .

Trichodectes scalaris (S). **نيمشة البقر *** ٢٩٢٦٢
Trichodecte du boeuf, *Petit pou du boeuf* (F).
حشرة من النيمات . تركيب الأبقار وتعيش على فوف
وأوساخ جلودها . طولها يراوح من ١ إلى ٢ سم . لونها إلى
الصفرة وأصفرها وسدرها متساويا الغرض . تمحل في وسط
كل سكة من سكم بطنها نقطة سمراء بيضاء . تكثر على الظفر
والأظفار والصلد . تسبب تمليصا يقود إلى الحكاك .

Trichodectes variatus (S). *Trichodecte du cheval*,
Petit pou du cheval (F). **نيمشة الخيل *** ٢٩٢٦٣
حشرة من النيمات تركيب الخيل وسائر الدواب . طولها
نحو ٢ سم . فوفها إلى الصفرة أصفر مستعرض . تمحل
في أواسط السبع سكم الاول من بطنها يتجلىع متعرض أسمر .
تعيش على فوف الاكتاب والمعاير ففضائق الدواب وتمحلها
على الحكاك .

Trichodectes spherocephalus (S). *Trichodecte du*
mouton, *Pou du mouton* (F). **نيمشة الضأن *** ٢٩٢٦٤
حشرة من النيمات تركيب الأغنام فتؤذيها . طولها نحو
١ سم . وخمسة خطوط . لونها إلى البياض الاغمى يعلو موج
أسفر . تعيش على فوف الجلد وتقترض الصوف وتقلق راحة
الغنم وتزعجها .

Trichodectes climax (S). *Trichodecte de la chèvre*,
Pou de la chèvre (F). **نيمشة المعز *** ٢٩٢٦٥
حشرة من النيمات تركيب المعاز . طولها نحو ١ سم وأربعة
خطوط . لونها إلى الصفار . الخنطى يعلو تجليع أسود .
تعيش على فوف الجلد وتقترض الشعر فتؤذيها وتسبب سكاكا
مزعجا يبيح الجلد وقد يدميه .

Trichodectes latus, *T. canis* (S). *Trichodecte du*
chien, *Gros pou du chien* (F). **نيمشة الكلب *** ٢٩٢٦٦
حشرة من النيمات تركيب الكلاب الفتية والهرمة . طولها
يراوح من ١ إلى ٢ سم . لونها إلى الصفار الفاتح الباهت
يعلو توشيح أسمر . تعيش على الفوف وتقترض الوب . وتسبب
الحكاك الدامي .

Felis pardus (S). **نمير** ، **نمير** ٢٩٢٦٧
Panthère, *Léopard* (F). *Panther*, *Leopard* (E).
حيوان مفترس من فصيلة السنوريات وترية الاراس .
يقال انه وسيد التنوع حديد الضروب فوارق ضروره
تقوم على قدر الجسم ولون الثوب ورطنته || جسمه منسحب
الانطباع ، اهيف القد ، مستدير الرأس ، جميل الشكل ،
مرقط الثوب ، مالح اللمعة . يطول من ١٥٠ إلى ٢٤٥ سم .
يما في ذلك اللب الذي يراوح طوله من ٩٥ إلى ٩٠ سم .
مزاجه كراجل الأسد إلا انه أتمر واغيب واضف ، لا ترويه
سلطو اسد . رخم ضمت مزه وشديد حره || كنيته
أبو الاربد وأبو الاسود وأبو جددة وأبو جهل وأبو خطاف



نمر أسود



نمر الأطلس



نمر الحيشة



نمر الشرق



نمر الهند



نمر ملطخ



نمرود صومرا

٢٩٢٧٨ - **نَمْرُود** Cirro-cumulus
هي انقشاص ، نوع من النجوم العالية .

٢٩٢٧٩ - **نَمْرُود** Némorrhœus (S).
Némorrhœus (F). Némorrhœus (E).

جنس حيوانات لبونة عاشية مجترية من فصيلة الإيليات .
أنواعه المعروفة ستة موطنها يمتد من الهند إلى الصين وصومرا
واليابان . تألفت غابات المصاطب والجبال ، ملجأها الجباني
جامعي . جاعاتها إجمالاً قليلة البدن || أجسامها متوسطة
القد . قرونها صغيرة ، غروبية الشكل ، متشابكة الحبل ،
منقطعة إلى الأواء . ضرور أنثاها ثنائية الاختلاف .
يحمل الأنثى يولم نحو ستة أشهر تضع في تمامه ينفوراً
واحداً || أشهر أنوعه التالية :

٢٩٢٨٠ - **نَمْرُودُ حَمَلِيَّات** Némorrhœus bubalinus (S).
Némorrhœus bubalin, Chamois de l'Himalaya (F).

نوع من النمرود . موطنه يمتد من كشمير إلى حلايا
وشنجان . يسرح من ارتفاع ١٨٠٠ إلى ٣٦٠٠ م . عن
سطح البحر || جسمه ردية يطول نحو ١٦٠ سم . بما فيه
الذنب الذي يبلغ نحو ١٠ سم . ارتفاعه ٩٣ سم . وزنه
نحو ١٠٠ كيلو . قرنه يطول نحو ٢٣ سم . عند الذكر
وغو ١٧ سم . عند الأنثى . رأسه مستدل الجرم . عيناه
أزرقا كيرتان . قروعه شديدة اللشظ ، ثوبه إلى الكهبة
السراء رأسه وشيخ ظهره إلى السمره الباقية . عنقه وصدره
إلى الشققة . ذنقه ويطع إلى البياض الأغر || أجله
يبد سبعة أنفار ، ذكر مانع وثلاث وثلاثة شوائد .

٢٩٢٨١ - **نَمْرُودُ صُومَرَا** Némorrhœus sumatrensis (S).
Némorrhœus de Sumatra (F).

نوع من النمرود . موطنه يمتد من شرق حلايا إلى بيرمانيه
والسيام وصومرا . يسرح من ارتفاع ١٣٠٠ إلى ٣٠٠٠ م .
عن سطح البحر || جسمه ردية يطول نحو ١٥٠ سم . بما فيه
الذنب الذي يبلغ نحو ٨ سم . ارتفاعه ٨٥ سم . وزنه نحو
٨٥ كيلو . قرنه يطول نحو ٢٠ سم . عند الذكر ونحو
١٥ سم . عند الأنثى . رأسه مستدل الجرم . عيناه كيرتان
مكحللتان . أذناه مستطيلتان . ثوبه إلى الشققة السراء
يقب في الرأس والظهر ويغير في البطن || أجله يمد
سبعة أنفار .

٢٩٢٨٢ - **نَمْس** Rancissement (F). Rancidity (E).
نساذ في المواد اللعنية يمي إلى ملاقتها ورائحتها .

٢٩٢٨٣ - **نَمْس** Herpestes (S).
Mongoose (F). Mongoose (E).

جنس حيوانات لبونة لامة من فصيلة الزباديات . أنواعه
المعروفة ٢٠ جميعها مستطيلة الجسم والذنب ، قصيرة
الآذان ، حادة الأطراف . رؤوسها صغيرة مخروطية الشكل .
أذناها صغيرة مستديرة . عينها حر . أقربها إلى الكدرة .
موطنها يشمل العالم القديم . تألفت المناطق الحارة . تعيش
قرب مجاري الماء في المقاصب والآبار والنايات . قرونها
الإقاصي والجرفذان والمظاء وكل ما استطاعة إليه سبيلا من
الحيوان والطيور . تدجن بسهولة تربى لقتلها في أفار
والجرفذان والحليات || أنثاها تضع من جرورين إلى
أربعة جراء . جاعبرها أذناك منخفضة ، ضيقة ، مستطيلة ،
قروية النحالين || اعرف أنوعه وأشهرها ما يلي .

وأبو الصمب وأبو قنار وأبو سهل وأبو عمرو وأبو المزال.
والأنثى نمرمة وألجمع آثار ونغور ونغار || موطنه تسبح
الإرجاء يشمل معظم البلاد الآسيوية والأفريقية || يعيش
منفرداً إلا في زين النجوم وقد يستمر على اللغة الإثني
ما بعد وضعها بثلاثة أسابيع . يقال أن يحمل الأنثى لايقوق
٩٠ يوماً تضع عند تمامه ثلاثة جراء أو أربعة تبصر به
وضمها بأسبوعين وتعيش برقةً أمها نحو ٦ أشهر .
اعرف غروبها وأشهرها ما يتبع .

٢٩٢٦٨ - **نَمْرُ أَيْبَيْس** Irbis (F).
هو البر بيس ، أطبله .

٢٩٢٦٩ - **نَمْرُ أَسُودَ** Felis pardus melas (S).
Panthera noire (F). Black leopard (E).

ضرب من النمر ، متوسط الجثة أسود اللون كشي القرقة
الكاملة . يكثر في جنوب الهند وفي جزر الزانج .

٢٩٢٧٠ - **نَمْرُ الإِجْصَاصِ** Tigre du poirier (F).
حشرة مؤذية تدعى ببر الإجصاص ، أطبله .

٢٩٢٧١ - **نَمْرُ الْأَطْلَسِ** Felis panthera (S).
Panther de l'Algérie, Grande panthere (F).

ضرب من النمر ، يقال أنه أكبر النمرود شقة ، صمير
الرقطة ، كمال الحلفة التي تسع مع ابتعادها من ثيج النهر
واقترابها من البطن . موطنه يشمل كامل أفريقيا الشمالية
أخصها جبال الأطلس .

٢٩٢٧٢ - **نَمْرُ الْحَيْشَةِ** Felis pardus nimr (S).
Panther de l'Afrique (F).

ضرب من النمر ، كبير الجثة أسود الرقطة أنمر الحلفة
الثاقفة . موطنه الحيشة والصومال .

٢٩٢٧٣ - **نَمْرُ الشَّرْقِ** Felis pardus orientalis (S).
Panther de l'Amour (F).

ضرب من النمر ، كبير الجثة يؤوي الرقطة الصنائية المختار .
موطنه حوض نهر الأمور وجباله .

٢٩٢٧٤ - **نَمْرُ الصَّيْنِ** Felis pardus chinensis (S).
Panther de la Chine (F).

ضرب من النمر . متوسط الجثة أسود الرقطة الكبيرة
والمتقلعة . موطنه الصين والمندلن .

٢٩٢٧٥ - **نَمْرُ الْهِنْدِ** Felis pardus antiquorum (S).
Panther de l'Inde (F). Leopard (E).

ضرب من النمر ، كبير الجثة أنمر الرقطة الصغيرة اللقاصية
الشكل . موطن الهند .

٢٩٢٧٦ - **نَمْرُ سُورِيَّ** ، **نَمْرُ الْفُرْسِ** ، **بَمَلْتَكْ** ،
قَبْتَان Felis pardus taillans (S).

ضرب من النمر متوسط الجثة ، أسود الرقطة ، أصعب الحمار ،
متشقق الحلفات المفتوحة . موطنه يشمل الفرس وسوريا
وتركيا .

٢٩٢٧٧ - **نَمْرُ مَلَطُخَ** Felis nebulosa (S).
Panthera longibande, Diardi (F). Clouded leopard (E).

ضرب من النمر ، يتميز باستطالة رقطة وسلطاته اللقاصية
الحجم . موطنه جبال الهند وبرمانيا وقلعه وجزر الزانج .

٢٩٢٩١ - نمّشة الزيتون * *Aonideilla maleti* (S). *Cochanille vermillon de l'olivier* (F).

حشرة دسبوسية من القرمزيات تمرّي الزيتون في أرواحه قسوة إلى حله. موطنها بلاد المغرب. يكثر وجودها في مراکش والجزائر || جلبها الرّس من الأثني مستدير الشكل، قرمزي اللون، نودلي السرة المركزية النتم، ظهره براوح من ٢ م. ٢ إلى ٣ م. وثلاثة خطوط. وهو عند الذكر يضيء الشكل، قطبي السرة، قرمزي اللون، يطول نحو ١ م. وأربعة خطوط || لها جيلان في الحول. أنثاه تضع من ٤٠ إلى ٦٠ مكنة بطرف ثلاثة أسابيع. أضراسها لاقسيّة لأنها منطقة بكثرة وجودها عند الأوراق. وهي تركب النصل حل صفحتيه تنصص عصارة الخلايا وتسبب بالنتيجة نيباس الأوراق || تكافح باستعمال أسد الحواشير الفعالة مزوجاً بالزيت المعدني الأبيض أو بالزيت النباتي.

٢٩٢٩٢ - نمّشة الليمون الحامض * *Chrysomphalus dictyospermi* (S). *Pou rouge des oranges* (F).

حشرة ناعمة من القرمزيات، تركب الكثير من النباتات الشجرة والأزدينية أنصها الحشفيات || يقال أن موطنها الأصلي كان الشرق الأقصى وقد انتشرت في معظم أقطار العالم وأصبحت من آفات حوض البحر المتوسط وبلاد القرم بهد الصين واليابان وزيلندا الجديدة وأستراليا والانتيل وجاباكا والبرازيل والمكسيك والولايات المتحدة ... جلبها الرّس يضيء الشكل ثلاثي التّخدي نودلي الأطراف القطبي الأصغر لونه إلى الحمرة المفرّاة القائمة يحيطها أطراف اطول. الأثني تطول نحو ٢ م. والذكر ١ م. وثلاثة خطوط. والحشرة عند تجميدها عن رسها ذكرًا كانت أو أنثى تلبو برمية الشكل صفراء اللون خضراء المواج والاعم || أجسامها الحولية براوح من ٢ إلى ٤ م. وهي تتحمل الحرارة القصوى المطلقة حتى ٤٥ م.غ. والحرارة الدنيا المطلقة حتى ١٠ درجات تحت الصفر || أضراسها في الحشفيات شديدة الأثني لأنها تركب الأوراق والانتان الغنية فتتوصّل العصارة وتسبب الذبول وتركب الثّار فتفترق نموها وقد تنفص وتسيب بخصاف القلب وتقسّم الحصوص || تكافح باستعمال التبخير السيانيدريكي ومنهم من استعمل الزيت البيضاء عن أسد الحواشير الفعالة غير أن نتائج التبضخ لا تؤازر التبخير || وهناك عدة حشرات عائلة تقضي على هذه النمّشة أنصها من الصفرجات أي نبات النقا ومن الدسبقيات أي نبات العيد.

٢٩٢٩٣ - نمّشة فلوريدا *Chrysomphalus aonidum*, C. ficus, *Aspidiotus ficus* (S). *Pou de Floride* (F). *Black scale* (E).

حشرة ناعمة من القرمزيات تركب الكثير من النباتات أنصها الحشفيات والنخل والأهوكاتيه والذؤفا والخروع والذنا والنخل واللباب والمضاسف || يقال أن موطنها الأصلي كان فلوريدا وقد انتشرت في معظم مناطق القرم من اليابان إلى الصين وفروموزا والمند وبرندوب وإلى الانتل وكوبا والمكسيك والبرازيل وبلاد إفريقيه. وهي شديدة الأثني وسوريا || جلبها الرّس وهو عند الأنثا مستدير الشكل ظهره براوح من ٢ إلى ٤ م. لونه إلى السرة الصفحية المراج تتوصلة سرة مركزية جزوية اللون ثلاثية الخطوط الدائرية. وهو عند الذكور يضيء الشكل يطول من ١ م. وسطين إلى ١ م. وأربعة خطوط. والحشرة عند

٢٩٢٩٤ - نمّشة أشعل * *Herpestes albicaudus* (S). *Mangouste à queue blanche* (F).

نوع من النّس كبير القد طوله نحو ٥٠ سم. وذنبه ٤٥ سم وهو أبيض قائمة من المصري وأهل منه. ثوبه إلى العبرة يطولها نأذير حشلي. ذنبه أبيض اللون الأشمل، جلث الور. موله الحبشة والثانل وإثيا والسفناك.

٢٩٢٩٥ - نمّشة بني * *Herpestes fuscus* (S). *Mangouste brune* (F). *Brown mangouste* (E).

نوع من النّس متوسط القد والارتفاع طوله نحو ٤٢ سم. وذنبه ٤٥ سم. ثوبه إلى البني يطولها تجلج متعّس أسمر. رأسه حالك السرة. قوامه سيد.

٢٩٢٩٦ - نمّشة فارسي * *Herpestes auripunctatus*, H. persicus (S). *Mangouste à points dorés*, M. de Perse (F). *Persian mangouste* (E).

نوع من النّس صغير القد جليل الثوب المرقط بالابيض والأصفر الندي. موطنه العراق وبلاد فارس وبيرواها يكثر ويوجد في أحواش النخل وقرب ضفاف الأنهر.

٢٩٢٩٧ - نمّشة مصري * *Herpestes ichneumon* (S). *Mangouste ichneumon*, *ichneumon*, *Rat des Pharaons* (F). *Egyptian mangouste*, *Ichneumon* (E).

نوع من النّس موطنه حوض البحر المتوسط. يكثر في البلاد المصرية حيث كانوا يحولونه في زمن الفرعارة. جسمه مستطيل الشكل، قصير القوائم، طوله نحو ٥٥ سم. وذنبه ٤٠ سم. ثوبه إلى الصفار الأشهب يطولها توشم أحمل. رأسه وظهره أمين لوناً من سائر جسمه. قوامه سيد.

٢٩٢٩٨ - نمّشة هندي * *Herpestes griseus*, H. mongo (S). *Mangouste mongo* (F). *Indian mangouste* (E).

نوع من النّس متوسط القد والطول طوله نحو ٤٠ سم. وذنبه ٣٥ سم. ثوبه إلى الصفار الخشبي المواج يطولها توشم أحمل ونمّشة بيضاء. رأسه عايق اللون. قوامه إلى السرة. موطنه الهند والأفغان.

٢٩٢٩٩ - نمّشات *Ichneumonides* (S). *Ichneumonides* (E).

فصيلة حشرات من حشائيات الاجنحة المضمورة. اجناسها وإنزاعها زهاء ٣٠٠٠٠ جميعها مستقلة الأجسام. أطولها تراوح من ٥ إلى ٢٠ م. ألوانها عابقة يكثر فيها الأسود وبعضها عازز البلب بالأسود والأصفر || رقاتها طفيلية تعيش بأكثر أيتها حل عوائلها من حشفيات الاجنحة والندبات.

٢٩٢٩٠ - نمّشة * *Ichneumon* (S). *Mouche vibrante* (F).

جلث حشرات صغيرة من النّسبات أنولها المعروفة زهاء ٥٠٠ جميعها مستقلة الأجسام المستطيلة. أطولها تراوح من ١٥ إلى ١٦ م. ألوانها مختلفة الألوان يكثر فيها التحزير الأصفر والأسود. وأضراسها ثنائية الزوج شغافا تلوزها شمعة خفيفة من الألوان الزاهية || رقاتها تنطلق حل الكثير من الحشرات أنصها النامية إلى حشفيات الاجنحة ومنها الملوطف والكزنيه والانتونوم والأصل. الخ ...



نمّشة أشعل



نمّشة فارسي



نمّشة مصري



نمّشة هندي



نمّشة



نمّشة الزيتون

٢٩٢٩٩ - **نَمَص - نَمَص** (F). *Jonc des nattiers* (F).
هو الأسل العربي أين المود تصنع من الخياطين والغلف .

٢٩٣٠٠ - **نَمَصَة** (F). *Apex, Sommet* (F).

Apex, Summit (E).

النشة هي ذروة كل عضو من الأعضاء إن في الحيوان أو في النبات . وللذروة من كل شيء أعلاه .

٢٩٣٠١ - **نِمْفُولَةُ الْبَتِينِ ***

Nymphula nymphaesta (S).

Nymphule du nénuphar, Teigne du nénuphar (F).

Nymphula nymphaesta (E).

حشرة من فصيلة الناريات حرشفيات الاجنحة . موطنها معظم مناطق البلاد احرارة والمعتدلة الحرارة . فراشها واحة قوتها رحيق الازهار وظلها . رسلها خاصة تعيش على اوراق البتين وعرائس الماء وكلوات الماء || جسمها يطول نحو ١٢ م . بسطها تراوح من ٢٦ الى ٣٠ م . رأسها مستدل الجرم ، قصير الخطم . عينها صغيرتان . زباناها غليظتان . ملاسها قصيرة . رشفها مستدل الطويل . جوشها

وبطنها الى الشبهة || رواشها الى الكسكة العاجية الموجع يعولها في الزوج الامامي زراكل بنية وصنانية ويعولها في الزوج الخلفي تجلجع مغرض ويتقيج بني صناني . احداها قضبة || لها جيل واحد في الجيل . قطرها القرائنة

في ايار وتبقى حتى آب . تسرح في النهار . تماطل بعد ظهورها بنحو عشرة ايام وتتبع المكن مجاديا على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || الخور البرقي

يشتر نحو ٢٨ اسبوعا والسرعة عند ولوها الكمال الجسوري تطول نحو ١٥ م . جسمها شبه اسطواني الشكل ، واضح التقسيم السحكي ، مستند المقدم والمؤخر ، اسر اللون ، تنبي الموج ، تملو حمة خطوط خافتة من الملب القصير .

رأسها اسود اللون . مدها ورواجها الى الطحلة || طور الاكمال الذي يشتر نحو ثلاثة اسابيع يتفقي ضمن صلبة تسجها الرفة تحت الجفلة او بين شقوق لاه

الاجنار . تكافح مكافسة النشة الحمراء .

٢٩٣٠٢ - **نَمَل** (F). *Fourmis* (F). *Ants* (E).

جنس حشرات من فصيلة النمليات . انواعها عديدة منتشرة في اكثر اصقاع العالم . معظمها صغير القدد . تألف الحياة الاجتماعية ، مجوسها تسمى جالية ودية تقم في زبية او قرية مؤلفة من عدة سرابح وانفاق ودعايز وسجر ورياء . والنمل كالتنمل يقسم الى ثلاثة اقسام : الذكور والاناث والخنات . الذكور لاهل لما سوى كرم الاناث وهي تأكل ما تجنيه العاملات . والاناث بعد كويها وريوعها الى القرية تستقبلها العاملات بالترحاب فتخلصها من اجنحتها ثم تذلها وتقودها الى الخاضع تحت المائز . اما العاملات اي الخنات فهي التي تقوم بجميع الاعمال : تشيد القرية ويقي الطعام وربي الدبا والكلر وتسر على سلطة القرية تقودها فزيرة اقباء والحياة الاجتماعية المنتظمة في سبل مصلحة عامة لا تنصرف الى غيرها || ذكورها واناثها مجنسة بامرة . عاملاتها عادمة الجناح والسر تنصرف على نظراتها وصل الاشياء بواسطة قوتها الاستشعارية المرفوعة الاساس . ورونها مسلحة بفكين حادين قاضمين . قوائمها دقيقة رشيقة مستطيلة تمكها من السير السريع .

اعرف انواعها واشهرها ما يتبع .

٢٩٣٠٣ - **نَمَل أَحْمَر - سَمَسَة** ، **جَمَبِي**

Myrmica rubra (S). *Fourmi rouge* (F). *Red ant* (E).

يجريدها من ترسها ذكراً كانت او انثى تبلو صفراء اللون زاجية المالح . اما ذكورها المجنسة فيرتقاة اللون ، ثنائية الجناح الابيض || اجيالها الحولية تراوح من ٥ الى ٥٠ اناثها تبض نحو ٥٠ مكنة متسما يشتر نحو اسبوع . اضارها في الحشويات شديدة الوقع والاذى لانها تركب الارياق فتتمصص مصارة خلاياها وتسبب اصفرارها وذوبها وتركب الثار فضتها من النمو وقد تسبب جفاف اللحاء وتسمم خصوصها || تكافح بشق الحلوشر للذابة المعزوجة بالزيت البضاء وقد يحسن استعمال التبخير السيانيدريكي لانه اقل من التفسخ اذ يدخل في جميع غباها الاجنار .

٢٩٢٩٩ - **نَمَشَّة نَارِيَّة ، نَمَشَّة نَضْوِيَّة**

Chrysomphalus aurantii, Aspidiotus aurantii, Aonidiella aurantii, A. taxus (S). *Pou fer à cheval* (F). *Citrus yellow scale* (E).

حشرة ناعمة عارفة من القرميزات تركب الكثير من النباتات اخضها الحشويات وقد تغفل اليمين الحامض على البرتقال وتركب السط والخروب والياسمين والبرت والموذ والرزين والننسل والورد والصفصاف والال والخرور . موطنها قسح الاربعاء يشمل جميع اقالم اليمين الاسيوية والافريقية والامريكية والاروبية || جلبها البرسي عند الاثى مستدر الشكل قليل الاحتدباب مركزي السرة لونه الى السمرة النارية الباهة يحرقها اطار سبق اختار اكبه اللون قطر يراوح من ٢ م .

٢ م . وعطين . وهو عند الذكر يضي الشكل يطول نحو ١ م . وثلاثة خطوط . والحشرة عند تجريدها من ترسها ذكراً كانت او انثى تبلو نضوية الشكل حنطية اللون || اجيالها الحولية تراوح من ٢ الى ٥ . اناثها تبض نحو ٥٠ مكنة متسما بمدة تراوح من

شهر الى شهرين || اضارها شديدة الاذى لانها تركب كامل اعضاء النبات الحولية اخضها الاثان التي تجمها الارياق التي تذلها والثار التي تمطها وتصلب لبها .

تكافح مكافسة النشة الحمراء .

٢٩٢٩٥ - **نَمَشِيَّة ***

Sporozetichum (S).

جنس فطور مجهرية من الطليسات وفضيلة الزولحيات . انواعها قليلة العدد والاذى . هيبة مهاد زسغ على سطح العائل . جرابها الكتيدي بسيط التركيب قصير القدد . كنانده بيضية الشكل ترتكز على اطراف الشغيرات وهي شفاقة او ملونة ونها القرية للجميع والقضية || اعرف انواعها الثلاثة التالية :

٢٩٢٩٦ - **نَمَشِيَّة الشَّحَاح ***

Sporozetichum malorum (S).

فطر مجهرى يركب الثار اخضفة الموهنة او المبروسة ، فيغن البشرة دون ان يتسدى حدود اللب .

٢٩٢٩٧ - **نَمَشِيَّة الحُمَفِيَّات ***

Sporozetichum citri (S).

فطر مجهرى عادم الاذى يركب اوراق الحشويات على اختلاف اجنسها واوراها فيزها بفع خلية صغيرة لا قياسية الشكل لونها كالرصاص .

٢٩٢٩٨ - **نَمَشِيَّة الصُّوْقَان ***

Sporozetichum mycophilum (S).

فطر مجهرى يركب الصوقان فيمسقه بوشاح من الخمل القيد البرتقالي اللون يفتقي على نمو .



نَمَشِيَّة الحَشِيَّات



نَمَشِيَّة الْبَتِين



نَمَل

ومصباتها || كلالها قوية ، سوقها وأوراقها شبه مستديرة
علاصة المادة حمراء اللون .

٢٩٣١٨ - نَمَلُ الْبَطِّ *

Dacophorus icterodes (S). *Dacophore bilieux* (F).
حشرة جلدية من النمليات . طولها نحو ١ سم . ثوبها الى
الحمرة الجلوية . رأسها مثلث الزوايا . بطنها يضيئ الشكل
مبهض المقلب اللقيع القصير || تركيب البط . تكافح
بمستحضرات الفريدب .

٢٩٣١٩ - نَمَلُ التَّنَدُجِ *

Goniodes distimilis (S). *Goniodisemblable* (F).
حشرة جلدية من النمليات طولها يراوح من ٢
سم الى ٢ م . وخمسة خطوط . جسمها رمعي الشكل .
عرض رأسها يفوق طولها . عليها غصبي التجميع . ثوبها الى
البياض الاخير يملو بتيجع اصفر . || تركيب التندج
والحمل والدجاج . تكافح بالفريدب .

٢٩٣٢٠ - نَمَلُ الْحَمَامِ *

Gonlocotes compar (S). *Gonlocote compaignon* (F).
حشرة جلدية من النمليات طولها يراوح من مليمتر واحد
الى مليمتر وخمسة خطوط . ثوبها حطلي اللون اصفر المراح .
بطنها يضيئ الشكل مبهض المقلب اللقيع المستطيل .
تركيب الحمام فتضيمه . تكافح بمستحضرات الفريدب .

٢٩٣٢١ - نَمَلُ الدَّجَاجِ *

Gonlocotes gigas (S). *Gonlocote géant* (F).
حشرة جلدية من النمليات طولها يراوح من ٣ الى ٤ سم .
ثوبها الى الصفار الحطلي المراح . بطنها يضيئ الشكل
قصير المقلب القضي التجميع || تركيب الدجاج لتؤذيه .
تكافح بالفريدب .

٢٩٣٢٢ - نَمَلُ الْغُرَيْرِ *

Goniodes stylifer (S). *Goniod stylifère* (F).
حشرة جلدية من النمليات طولها يراوح من ٣ الى ٤ سم .
جسمها اجاصي الشكل . رأسها كالقبة الثانية القرون .
عليها كثيف التجميع . ثوبها الى السمرة السفاه || تركيب
الغريز والحشيش . تكافح بالفريدب .

٢٩٣٢٣ - نَمَلِيَّاتِ *

Phloopteridae (S). *Phloopteridés* (F). *Phloopteridae* (E).
فضيلة حشرات جلدية من رتبة القليلات . اجناسها وانواعها
عديدة جميعها صغيرة القد ، مفلطحة الجسم ، كثيرة
الحلب ، واخصه القرون الاستمرارية الحامية العقل . اصاغها
عاشدة ثنائية المقاطع . تعيش على اوضاع جلود الطير
وديشه . اشهر اجناسها النمام والقرود والقرودع .

Ride (F). *Ripple* (E).
هو الاثر الذي تنتجه الريح على التراب والماء .

٢٩٣٢٥ - نَمَلُوه *

هو الملقك ، اطليه .

٢٩٣٢٦ - نَمُور ، شَبَاح *

Accroissement, Végétation (F). *Increase, Vegetation* (E).
هو استمرار دور النشوء والنضارة وازدياد الجسم في النبات .

٢٩٣٢٧ - نَمُورَة *

Nemura (S). *Némura* (F). *Nemura* (E).
جنس طير من الجواثم سنياه المنابر وفصيلة الدغليات .

٢٩٣٠٤ - نَمَلُ اسنن *

Lasius niger (S). *Fourmi brune* (F). *Dun ant* (E).

٢٩٣٠٥ - نَمَلُ اكلف *

Formica rufa (S). *Fourmi fauve* (F). *Drab ant* (E).

٢٩٣٠٦ - نَمَلُ اسنن ، سَمَام *

Lasius flavus (S). *Fourmi rousse, F. jaune* (F). *Yellow ant* (E).

٢٩٣٠٧ - نَمَلُ جَسُور ، قَعَص *

Formica animosa (S). *Fourmi féroce* (F). *Bold ant* (E).

٢٩٣٠٨ - نَمَلُ حَسْبِي ، جَمَل ، دُعَاة ، دُعُوب *

Formica nigra (S). *Fourmi noire* (F). *Black ant* (E).

٢٩٣٠٩ - نَمَلُ حَمَاد ، جَمَلَة *

Atta structor (S). *Fourmi molssonneuse* (F).

٢٩٣١٠ - نَمَلُ سُلَيْبَان *

Fourmis de Salomon (F).
هو الحق ، نمل احمر صغير ، اطليه .

٢٩٣١١ - نَمَلُ فَاَرَمِي *

Formica flava (S). *Fourmi blonde* (F). *Golden ant* (E).

٢٩٣١٢ - نَمَلُ مَدَمِي ، جَمَلَة *

Formica sanguinea (S). *Fourmi sanguine* (F). *Robber ant* (E).

٢٩٣١٣ - نَمَلَة ، نَمَلَة *

Formica (S). *Formil* (F). *Ant* (E).
النملة واحدة النمل الذكر والانثى ج . نمل ونمل ونمل .
وارض نملة ذات نمل بطعام منبسط اذا اصابه النمل . ويضئ
النمل يضيئ مازنا ويضئ اوسفره يضيئ ذرا وكنتيه ايشوشول
وكنتيه النملة ام مازن وام فوية . وميت النملة نملة لتنتلها
وهو كثره سركبها وقلة قواشها || وين شر الامام تاج الدين
البيهي في منزل فيه نمل قوله :

مالي ادرى منزل المولى الاديب به
نمل تجميع في اربابله زمر
فقال لا تجميع من نمل منزلنا
فالنمل من شأنه ان تتبع الشرا

٢٩٣١٤ - نَمَلَة الْاَرَجِسْتِين *

Fourmi de l'Argentine (F).

هي النملقة ، نملة مهلهلا بلاد الارجنتين وقد انتشرت في
جميع انظار العالم .

٢٩٣١٥ - نَمَلَة فِرْعَوْن *

Fourmi de Pharaon (F).
نوع من النمل يضيئ سداك ، اطليه .

٢٩٣١٦ - نَمَلِيَّاتِ *

Formicidae (S). *Formicidés* (F). *Formicidae* (E).

فصيلة حشرات . من رتبة شفاقيات الاجنحة . انواعها
المعروفة زهاء ١٢٠٠ منتشرة في جميع اصقاع العالم .
اعداها واكبرها قد الانواع التي تعيش في المناطق الاستوائية .

٢٩٣١٧ - نَمَلِيُون *

Nemalion (S). *Némale, Némalion* (F). *Nemalion* (E).

جنس نباتات مائية من الخفيات الحمر . انواعه المعروفة
عديدة . يكثر وجودها عند شلالات الانهر ومداسق الاسداد



نمل جسر



نمل حصاد



نمل مدسي



نملين



نمام البط



نمام الحمام



نمام الدجاج

منها في أواسط البحر الباسي، وقد تطور القسم الآخر الذي اختلف، على ما يبدو، الإجناس المعاصرة.

٢٩٢٢٤ - نَمُوزِيَّات (S). Nummulitidae (F).

فصيلة حيوانات بحرية من المنغريات الجذريات. اجناسها وأنواعها المعروفة قليلة العدد، معظمها الساحق من متحجرات الحفنة الجيرية. أما المعاصر منها فيعيش في بحار البلاد الحارة. اعرف اجناسها النَمُوزَة.



نموزة

٢٩٢٢٥ - لَمِيزَات (S). Trichodectidae (F).

فصيلة حشرات جلدية من رتبة القمليات. اجناسها وأنواعها عديدة جميعها صغيرة القد، بيضية الشكل، مفلطحة البطن. كثيرة الحلب. قربها الاستشارية لثلاثة العقل. ارجاسها عادية، تركيب المقاطع. تركيب الحيوانات الجيزة كالحمل والبقير والسَمَز والقَم والكلاب والسرابيب والصاب والأيائل...



نَمُوزَة

٢٩٢٢٦ - لَمِيزَة (S). Oogone

علية نباتية تحفص ويربي الاجرام الانثوية. ج تخايا.

٢٩٢٢٧ - نَمِيزَة مَلَطَحَة (S). Venilia macularia, Pseudopanchera macularia (F).

حشرة من الارليات حشرغيات الاجنحة. موطنها الاصقاع المظلة الحارة من الشرق الاوسط الى ارضية. فراشها واثمة قوتها مغر الازهار. مرقها تمش على اوراق الشجريات وازهارها. اجسها قصف ابيض يطول نحو ٩ م. بسطها نحو ٣٠ م. رأسها اسمر. عيناها صغيرتان. زناها مشطيان عند الذكر، عظيمان عند الانثى. مرقها معتدل الجرم والطول. جشها وطولها الى السرة. يملعها ولج اكلف. رشناها الاماميان الى الصفار الباهت تملع ورقه كسكنية. رشناها الخلفيان الى الصفار الاكلف المالح تملع نمره كسكنية تمتد حتى المختار. اهداها الى الشقة. لها جيل واحد في الجيل. تظهر القراشة في ايار وتبقى حتى تموز. تفرح في الليل. تماثل بعض ظهورها بنموسه اسابع وتنتج المكن لطخا على لهاء البوق وتسال الاوراق. الكسفة عند بلوغها الكمال تطول نحو ٢١ م. جسمها اسطواني الشكل، دالس القشار، يملعوا ثلاثة ازواج من الفصول الصغيرة المتقابلة. قوتها يمان البيت التي تمش فيها لذلك فهو غالبا بلون الازراق. رأسها وثمها وشرجها الى الكسني. شرجها ينثني بزاويتين صغيرتين. طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوما ينثني ضمن صلبة تحميها الكسفة بين الاوراق التي تلتاس التربة.



نموش الصمغ

حشرة من الارليات حشرغيات الاجنحة. موطنها الاصقاع المظلة الحارة من الشرق الاوسط الى ارضية. فراشها واثمة قوتها مغر الازهار. مرقها تمش على اوراق الشجريات وازهارها. اجسها قصف ابيض يطول نحو ٩ م. بسطها نحو ٣٠ م. رأسها اسمر. عيناها صغيرتان. زناها مشطيان عند الذكر، عظيمان عند الانثى. مرقها معتدل الجرم والطول. جشها وطولها الى السرة. يملعها ولج اكلف. رشناها الاماميان الى الصفار الباهت تملع ورقه كسكنية. رشناها الخلفيان الى الصفار الاكلف المالح تملع نمره كسكنية تمتد حتى المختار. اهداها الى الشقة. لها جيل واحد في الجيل. تظهر القراشة في ايار وتبقى حتى تموز. تفرح في الليل. تماثل بعض ظهورها بنموسه اسابع وتنتج المكن لطخا على لهاء البوق وتسال الاوراق. الكسفة عند بلوغها الكمال تطول نحو ٢١ م. جسمها اسطواني الشكل، دالس القشار، يملعوا ثلاثة ازواج من الفصول الصغيرة المتقابلة. قوتها يمان البيت التي تمش فيها لذلك فهو غالبا بلون الازراق. رأسها وثمها وشرجها الى الكسني. شرجها ينثني بزاويتين صغيرتين. طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوما ينثني ضمن صلبة تحميها الكسفة بين الاوراق التي تلتاس التربة.

حشرة فراشية من فصيلة القمليات. جسمها يطول نحو ٢٢ م. ورائش ذكورها الى الزرق الرمادية المالح يطول نحو ٢٢ م. ورائش اطار ابيض اسمر تقطعه الاصاب السود. ورائش اناتها حطية اللون سم المالح يملعها تمش بنفسجي ويملعها اطار ابيض المذهب تترسه الاصاب السود. مرقاتها تركيب اوراق الصمغ تفضيها.

٢٩٢٣١ - نَمُوزِل (S). Nemesis (F).

بات يدمى لقة الحمل، اطلها.

٢٩٢٣٢ - نَمُوزِلَة (S). Nummulites (F).

جنس حيوانات بحرية من المنغريات الجذريات وفصيلة النَمُوزِيَّات. انواعها المعروفة عديدة معظمها من متحجرات الجيرية واللباشية. أما المعاصر منها فيعيش في بحار البلاد الحارة. اصدافها كبيرة، مستديرة، قرصية الشكل، عديدة الحجيرات الثلاثية او الثلاثية التجويل الانفي.

٢٩٢٣٣ - نَمُوزِيَّة (S). Nummulitica (F).

نمت ترميفي يطلق على الحفنة الاولى من الاباج الثاني المعروف ايضا بالاباج الحديث. وهو يشمل العصر الباليوسيني والمصر الاساني والمصر الاوليوساني. تتميز هذه الحفنة بويود الكثير من اسافير النَمُوزَة في جمراتها الرئيسية. ويظهر بعض الثدييات التي انقرضت قسم

انواعها المعروفة سبعة، ستة منها اسبوية وواحد افريقي. جميعها صافير صغيرة القد، ريشية الحركة، ثنائية العين. يكثر فيها الرءاء والاحمل والابيض التي المالح. قوتها الحشرات الصغيرة والذباب والحوام. تفتن في الادفال القلدة. حطتها من ٤ الى ٥ يضات يتناوب عليها الذكر والانثى نحو ١٣ يوما.

٢٩٢٣٨ - نَمُوزَة (S). Nemosis (F).

جنس طير من الجرام حشرغيات المنافير وفصيلة النَمُوزِيَّات. انواعها المعروفة نحو ١٠ موطنها المناطق الاستوائية الامريكية. تألف اللابات وصفات يجاري الماء. ملجها الحيائي جامي. جاماتها متوسطة العدد الذي يراوح من ٢٠ الى ٧٠ زوجا. قوتها الحشرات والبقير والثار المنعية البرية. اجسها صغيرة تطول من ١٢ الى ١٥ سم. متناورها غروية الشكل. الارباه شباينة الارباه جميعها زاهية الخصب عند الذكور باعثة عند الاناث. تفتن اعشاشها في الادفال. اناتها تحفص بمناوبة الذكور من ٣ الى ٥ يضات. الترميم يستمر نحو ١٣ يوما.

٢٩٢٣٩ - نَمُوس (S). Nomes (F).

جنس اسماك بحرية من شاكسكات الزعانف وفصيلة الاسقمريات. انواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها بحار البلاد الحارة. اجسامها احليلية الشكل تطول من ٢٠ الى ٣٠ سم. زعانفها الظهرية فارقة. زعانفها الصدرية تنتشر وتفتن، عند الانقضاء، في تجايف خاصة. الارباه الى الرتبة القفصية يملعها يتبع اسمر لاقياسي التوزيع انما يكثر ويقيم عند الرأس والظهر. ملحها متوسطة الصفت، مأكولة.

٢٩٢٤٠ - نَمُوش الصمغ (S). Turanana baton (F).

حشرة فراشية من فصيلة القمليات. جسمها يطول نحو ٢٢ م. ورائش ذكورها الى الزرق الرمادية المالح يطول نحو ٢٢ م. ورائش اطار ابيض اسمر تقطعه الاصاب السود. ورائش اناتها حطية اللون سم المالح يملعها تمش بنفسجي ويملعها اطار ابيض المذهب تترسه الاصاب السود. مرقاتها تركيب اوراق الصمغ تفضيها.

٢٩٢٣١ - نَمُوزِل (S). Nemesis (F).

بات يدمى لقة الحمل، اطلها.

٢٩٢٣٢ - نَمُوزِلَة (S). Nummulites (F).

جنس حيوانات بحرية من المنغريات الجذريات وفصيلة النَمُوزِيَّات. انواعها المعروفة عديدة معظمها من متحجرات الجيرية واللباشية. أما المعاصر منها فيعيش في بحار البلاد الحارة. اصدافها كبيرة، مستديرة، قرصية الشكل، عديدة الحجيرات الثلاثية او الثلاثية التجويل الانفي.

٢٩٢٣٣ - نَمُوزِيَّة (S). Nummulitica (F).

نمت ترميفي يطلق على الحفنة الاولى من الاباج الثاني المعروف ايضا بالاباج الحديث. وهو يشمل العصر الباليوسيني والمصر الاساني والمصر الاوليوساني. تتميز هذه الحفنة بويود الكثير من اسافير النَمُوزَة في جمراتها الرئيسية. ويظهر بعض الثدييات التي انقرضت قسم



نموزة ملطحة

٢٩٣٤٦ - تَمِيَّزَةُ عَصْفِيَّةِ الرَّقِّ

Moltkia graminifolia (S).

Moltkie à feuilles de graminées (F).

نوع من النَمِيَّزَةِ . ساقها زبابة تعلو من ٢٥ سم إلى ٤٠ سم . أوراقها متعاقبة عصفية اتصال المسنة الحافة . أزهارها عنقودي متبدل . أزهارها إلى الزرقاة البنفسجية || تنويرها يستمر من أيار إلى حزيران .

Nandou (F).

٢٩٣٤٧ - نَسْدُو

في الروساء ، أطبا .

Nandus (S).

٢٩٣٤٨ - نَسْدُوْس

Nandus (E).

جنس اسماك نهريّة من شائكات الزعانف . أنواعه المعروفة قليلة العدد ، جميعها من اسماك المناطق الاسيوية الحارة والاستوائية || اجسامها متوسطة القد . شكلها قريب الشبه بالفرخ . ظهورها محدودة . زعانفها الظهرية مستطيلة شائكة . زعانفها الشريانية مقطوعة || أوقاها إلى السمرة السفعاء المواج يملؤها تقيح اسود متباين الرخابة || لحمها متوسطة الصنف ، مأكولة .

Nandina (S). Nandine (F).

٢٩٣٤٩ - نَسْدِينَا

جنية مشرة معمرة ابيدة الاوراق من فصيلة البرابرسيات . مهدها الشرق الاقصى . تعيش وتكثر في الاقاليم المعتدلة المتحرقة نحو الحارة . جنبها قليلة الفروع تعلو من متر إلى مترين . أوراقها متعاقبة مركبة . وريقاتها احليجية النصل وريّة التجميع . أزهارها عنقودي التجميع طرقي الاوتكار . أزهارها عابية اللون فواحة العرف المطري . ثمارها عنبية حراء اللون مأكولة .

Paraffine (F). Paraffin (E).

٢٩٣٥٠ - نَهْهَاء

هو البرافين، نوع من الشمع الابيض الجاهد المكسرىستخرج من النفط . راجع نفط .

٢٩٣٥١ - نَهْهَاء نوع من الودع

Méthodologie (F).

٢٩٣٥٢ - نَهْهَاجَة

Methodologie (E).

النهابة قسم من علم المنطق يبحث في مقدمات ونتائج المناهج المختلفة .

Outardeau (F). Young bustard (E).

٢٩٣٥٣ - نَهْهَاك

فرخ الحبارى . قالت العرب احق من نهار . وقد اختلف اللغويين في النهار فقال قوم هو فرخ الغطاء وقال قوم انه ذكر البوم والاثنى صيف . وقيل انه ذكر الحبارى والاثنى ليل . ج . أنهرة وهر .

٢٩٣٥٤ - نَهْهَاري ، نَهْهَوي ، نَهْهَائي

Diurne (F). Diurnal (E).

لغت تعريفي يستعمل دلالة على الشيء الخاص بالنهار او الذي لا يحصل الا في الفياض اي النهار .

Rapaces diurnes , ٢٩٣٥٥ - نَهْهَاريَّة ، نَهْهَريَّة

Diurnes (F). Diurnal birds of prey (E).

اسد قسي . جوارح الطير المعروفة بجوارح او كواسر النهار يقابلها جوارح او كواسر الليل .

٢٩٣٤٩ - نَمِيَّزَةُ حَدِيدِيَّة (S).

Némésie gibbeuse (F).

نوع من النَمِيَّزَةِ . عشبة ترينينية حولية . ساقها خلية البعد تعلو من ٣٠ إلى ٦٠ سم . أوراقها احليجية مسطوية ، الجذعية منها لاطة ، منشورية الخشار . أزهارها حراء اللون ، منها عروب يضاء اللون وزرقاء ووردية || تنويرها يستمر من أيار إلى حزيران .

٢٩٣٥٠ - نَمِيَّزَةُ كَثِيرَةُ الزَهَر

Nemesia floribunda (S). Némésie floribonde (F).

نوع من النَمِيَّزَةِ . عشبة ترينينية حولية . ساقها تعلو من ٢٥ إلى ٣٥ سم . أوراقها الدليا لاطة ، سنانية . أوراقها السفلى منقطة ، بيضيه . أزهارها عابية اللون يملؤها مواج بنفسجي . عرفها عطر فواح || تنويرها يستمر من أيار إلى آب .

٢٩٣٥١ - نَمِيَّزَةُ قَانَمَة *

Nemesia suffisa (S). Némésie fumigée (F).

دوية من النماكب القانصة الساعية رباعية الروايا والمشائن تنتمي إلى فصيلة الخدقيات || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٤ سم . عند النماكب ونحو ١٨ سم . عند النماكة . صدورها اسكب اللون يملؤها تسنج وتزويق سود . عيناها زنجيتان . شيفها ضليمان . فكها منخفضة . جراسها شطية ، مستطيلة الزوج الخلفي . بطها احليجي الشكل ينتهي برؤسيتين تحمليتين ، ثوبه إلى الكهبة الخطية يملؤها خط قاطب اسود وسبه خطوط منقرضة || تألف البراري والمزارع . مسرحها دجوي . قوتها الحشرات واساربعها ويرقاتها || عكديتها ييش في التربة انبوي الشكل ، عمودي الفروع ، متوسطة القعر ، ورفي القعر ، تحفر تحت حجر كبير || ملجئها الخيالي كليلين سائر النماكب . تعيش نحو ثلاث سنوات . لسنتها مؤنثة وقد تكون بيته في بعض الظروف الخاصة || تعتبر من الدويبات المؤنثة الضارة .

٢٩٣٥٢ - نَمِيَّص نوع من النباتات .

٢٩٣٥٣ - نَمِيَّزَة

Moltkia (S). Moltkie (F).

جنس نباتات جينية معمرة من فصيلة الحسنيات . انواعها المعروفة قليلة العدد مهدها الشرق الاوسط || سوقها زبابة فروعها تعلو من ١٥ إلى ٦٠ سم . أوراقها متعاقبة عصفية الشكل أو ابرية . أزهارها عنقودي التجميع ابطي الاوتكار || احرف انواعها واشهرها الثلاثة التالية .

٢٩٣٥٤ - نَمِيَّزَةُ الصُّخُور *

Moltkia petraea (S). Moltkie des rochers (F).

نوع من النَمِيَّزَةِ . ساقها زبابة تعلو من ١٥ إلى ٣٠ سم . أوراقها ابرية الشكل تطول نحو ٤٠ سم . وتعرض نحو ٤ سم . أزهارها عنقودي منتصب . أزهارها ابريوانية اللون في أول مهدها ثم تنحرف إلى الزرقاة البنفسجية فالزرقاة الباهتة || تنويرها يستمر طوال شهر حزيران .

٢٩٣٥٥ - نَمِيَّزَةُ زَرْقَاء

Moltkia caerulea (S).

Moltkie bleue (F).

نوع من النَمِيَّزَةِ . ساقها زبابة قليلة الفروع تعلو من ٣٠ إلى ٦٠ سم . أوراقها متعاقبة سنانية اتصال الفتحة السنين . أزهارها عنقودي . أزهارها زرقاء اللون || تنويرها يستمر من نيسان إلى حزيران .



نَمِيَّة قَانَمَة



نَمِيَّة الصُّخُور

٢٩٣٥٦ - نَهَّاس

هو الاسد ، الطيه .

Lion (F).

٢٩٣٥٧ - نَهَام

Nyctala funerea (S).

Nyctale, Chouette pattue (F).

طائر من البوميات ورمزة الفداديات . جسمه صغير القد بطول نحو ٢٦ سم . رأسه مستدلل الحجم . صدره نازل القرس . منفره شديد الانحناء اسود اللون تعلوه مشحة صفراء . ذنبه مستطيل الريش تبرزه خمسة خطوط بيض . ارساغه كاسية لبداء || موطنه فسيح الارباح يشمل البلاد الاسيوية والارادية والامريكية . يألف اصراع الجوار والتنبو والمخلولا يقتر به اهداً من الاسماك الالهة . يلتصق قوته في الليل ، يصيد الجرذ والقصار والزباب والخشرات . يمشى عته في صدمع الانجار وبين فروعها . انقاء نغم من ٤ الى ٥ يعضات تحفها بمنامة الذكر من ١٧ الى ٢٠ يوماً .

٢٩٣٦٢ - نَهَر ، اُرِيدَانُوس

Eridan (F).

Eridani, Eridanus (E).

النهر او اريدانوس كوكبة نجوم جنوبية المقيم . مجريها اربعة وثلاثين . شكلها كالنهر ، يتبعه عته قدم الجزء فتر في المغرب على تربع الى قرب صدر قيطس ثم يمر في الجنوب على ثلاثة انجم ثم تنطف الى الشرق فتر على ثلاثة انجم ايضاً ثم تنطف الى الجنوب فالجنوب فتر على كوكبا مدينة وتنتهي بنجم نير يدمي آخر النهر || أشهر نجوم هذه الكوكبة : الثلاثة التي في المنطف الثاني وتسمى « منطف النهر » ، ودمي ايضاً في المنطف الرابع وتسمى « ادسي النعام » . والكوكبا التي حولها تسمى « البيض » ، ثم « نير الزروق » ، ثم « القربة » ثم « العلم » ، وهو اشهرها ، ودمي ايضاً « آخر النهر » . وبين هذا الظلم والظلم الذي حل في الحوت كوكب كثيرة تسمى « الرئال » .



نهام

٢٩٣٦٣ - نَهْرَة اَلْاَصْدَايَة

Conjonction économique (F).

Economic situation, Trend (E).

النَهْرَة اتفاق الظرف في وقت ما .

٢٩٣٦٤ - نَهَّس

Pie-grèlèche écorcheuse (F).

Red-backed shrike (E).

هو الصرد الأشر . ج . نَهَّان .

Enneoctonus (S).

Ennéoctone (F).

طائر من القرب يتنحى الى فصيلة الصرديات . يألف القابات والمروج والمرابي . قوته الحشرات والبوبيات والنظام والمغارب والمناكب ... || جسمه متوسط القد بطول نحو ٢٢ سم . رأسه مستعظم الجرم . منقاده غليظ وسيق . ثوبه الملوي الى الشقة السمر ويلها شمع اسود . جبهة وعمره الى البقرة . عيناه مكشكيتان بالاسود الذي يمتد حتى القفن . زوره وصدره وبلع الى الشبه الثراء . جناحا معتدلا الطول . ذنبه مستطيل الشكل مقطوع الطرف || يمشى عته في الانجار الرقبة . الاتي تحضن وسعها من ٤ الى ٥ يعضات بينا الذكر ياتن لها اللذان .



نبيح ناحس

٢٩٣٦٥ - نَهَّسور

Enneoctonus (S).

Ennéoctone (F).

طائر من القرب يتنحى الى فصيلة الصرديات . يألف القابات والمروج والمرابي . قوته الحشرات والبوبيات والنظام والمغارب والمناكب ... || جسمه متوسط القد بطول نحو ٢٢ سم . رأسه مستعظم الجرم . منقاده غليظ وسيق . ثوبه الملوي الى الشقة السمر ويلها شمع اسود . جبهة وعمره الى البقرة . عيناه مكشكيتان بالاسود الذي يمتد حتى القفن . زوره وصدره وبلع الى الشبه الثراء . جناحا معتدلا الطول . ذنبه مستطيل الشكل مقطوع الطرف || يمشى عته في الانجار الرقبة . الاتي تحضن وسعها من ٤ الى ٥ يعضات بينا الذكر ياتن لها اللذان .



نهر

٢٩٣٦٦ - نَهْن

Cathetus (S).

Cathetus, Taligalla, Dindon des buissons (F).

جنس طير من فصيلة الثقبانيات . انواعه قليلة العدد جميعها كبيرة القد طولا يراوح من ٧٥ الى ٩٠ سم . تتميز برووسها الصلحاء القليلة الزغب . متناظرة قوية حادة . اعناقها سرحة . هامة الريش . حواء الجلود المجددة المسترخية . اجنتها مستديرة ضيقة . اذنانها متوسطة القد . ارساغها قوية . غلظها كبيرة . اذنانها الى السرة ويلها مراح حشوي وتأذي نفسي . || تألف الاجراع . تبيض ذكراً وأني كالهام . سرها يد من ١٥ الى ٢٥ زوبيا . قوتها الحبوب والخشرات . انثاها لا تحضن البيض في قسمة في حاضن خاصة تشبهها بالتراب والقفيسات والانتان والقش والورق تجعلها هرية الشكل مستديرة القاعدة ظهرا يراوح من ٢٨٠ الى ٤٢٠ سم . وارتفاعها من ١٢ الى ٢٠ سم . || ولائيها تقع في مومها الحولي من ١٨ الى ٢٥ بيضة بين الواحدة والواحدة ١٢ او ١٤ يوماً . اما البيضة فتتفق بد وضعها باسويين من فرخ نفيش انقب الريش يدر امر نفسه بولن عناه .



نهن

٢٩٣٥٨ - نُهَبُور ، زَقْرَاق مَسَّح

Hoplopterus (S). Hoploptère (F).

Hoplopterus (E).

جنس طير من طول الساق وفصيلة الزرقايات . انواعه المعروفة ١٠ واحد . منها امريكي موطنه يمتد من الاربستين الى البرازيل وتسعة اسيوية وافريقية || جميعها قريبة الشبه من الزقراق الملقب . اجسامها صغيرة . اذنانها قصيرة . اجنتها سلسلة بمناعس قرنية المادة ، مديبة ، ناعسة . ارساغها دقيقة مستطيلة . اصابعها ثلاثة || قوتها الحشرات والديدان والحمار || انثاها تدر في افاحيص تحفها في رمال شفاف الانهر والبحيرات . وفي تحضن وسعها من ٣ الى ٤ يعضات || اعرف انواعه واشهرها التهبور الناعس .

٢٩٣٥٩ - نُهَبُور ناعس ، زَقْرَاق ناعس

Hoplopterus spinosus (S).

Hoploptère épineux, Vaneux à éperon (F).

Hoplopterus spinosus (E).

طائر من التهبور الضارب القواطع . اعطانه تمتد من الحيشة الى السودان وصغر والجزيرة العربية والفرانق وسائر اقطار الشرق الاوسط حتى تركيا واليونان يحوب بعض اصنافها كل عام في طلب الرزق والمصيف والمشق || جسمه متوسط القد . طوله نحو ٣٠ سم . ظهره وبناعه الى الصبغة السمر . رأسه وبيشته الى السواد الفضي . عمره ومنقده وكفاه وبلعنه وانفكه وارسط جناحيه الى البياض الناصع . اطراف قوادمه سود || يألف الانجار وصفات الانهر والبحيرات ، سره متوسط اللند . قوته الحشرات والديدان والحمار .

٢٩٣٦٠ - نَهْدَا ، نَهْدَا ، نَهْدَا

Beurre (F). Butter (E).

من اسماء الزبدة . وله تستعمل للدلالة على مقدار في الايلان بالزبد فتقول نهدة هذه الايلان ... نهدية هذا اللبن .

٢٩٣٦١ - نَهْر

Fleuve (F). River (E).

مجرى من المياه العذبة ينساب على الارض ويسب مياهه في بحر او بحيرة . يمتد النهر على التتابع والامطار والطقس الدالة وهو يتألف عادة من مجرى رئيسي تلتفه السواعد والفرور . وان صغر وكثرت مياهه فهو النهر (Rivière) ج اطباع وساعده يدمي جملرا ج . جداول . وان كبير فهو النهر وساعده يدمي رافدا ج . روافد .

٢٩٣٦٧ - نَهْمَكَة

Roquette sauvage (F).

نحو ١ م. ثوبها الى الخشنى الاسمر. رأسها اسود. نمداهما الى الصلبة الزاهية. || تميش تحت الحجارة والاشعاب في البراري وقرب البيوت وبينها. قوتها المواد العضوية ويرقات الحشرات وتلات الازهار.



نِهيك أنقب

٢٩٣٦٨ - نَهْمَكَة

النَهْمَكَة طائر طويل المنقار والرجلين والرقة ، اغبر اللون (السان).

٢٩٣٦٩ - نَهْمَكَة

Troque (F).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مشهورة باسم عنتيل، اطلية.



نِهيك الاخجار

٢٩٣٧٠ - نَهْمَكَات

Trochidae (S).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات تسمى ايضاً صتليات ، اطلية.

٢٩٣٧١ - نَهْمَكَة

Bralmont (F). Bray of an ass (E). نَهْمَكَة صوت الخيـر. والناق كلكـ.

٢٩٣٧٢ - نِهِيك ، نَاقِبِ الأذن ، أبو مقص

Forficula (S). Forficula, Perce-oreille, Pince-oreille (F). Ear wig (E). Ohrwurm (D).

جنس حشرات مباشرة صغيرة من فصيلة النيهيكيات. انواعه عديدة منتشرة في معظم اقطار العالم. اجسامها مفلطحة مستطيلة سداسية القوائم. قرونها الاستشعارية خطيلة الشكل لا قياسية الطول والتركيب يراوح عدد مقلها من ١٠ الى ٣٤. كواسلها مثلفة الزاويةا مهمة الحمار الخالوسي. اعماها قصيرة مقعولة. رواشها شبيهة الاشكال والاحجام. جالسة الاوتكاك. تحمل في مؤخر بطونها ملاحظ لا نظامية الشكل. مقوسة كلابية في الذكور، مستقيمة في الاناث. يزعم اهل القرب انها تغتلب الاذن وزعم غيرهم انها تمض اطر الرقيق وقوف الجوارى. || اعرف انواعه واشهرها ما يلي.



نِهيك الحقل الصغير

٢٩٣٧٣ - نِهِيك الأُغْب

Forficula pubescens (S). Forficula pubescens (F). نوع من النيهيك، حشرته دقيقة الجسم الازغب تطول من ٦ الى ١٢ م. قرونها الاستشعارية مركبة من ١٢ مقله.

ثوبها الى الخشنى الاسفر المولج. ملاحظ ذكورها كلابية الشكل دائرية التفوق. ملاحظ اناثا مستقيمة تميش على الاشعاب والجنات الصغيرة. قوتها مكن الحشرات ويرقاتها وسيق الازهار وتلاتها.



نِهيك الحقل الكبير

٢٩٣٧٤ - نِهِيك الأشجار

Forficula decipiens (S). Forficula des arbres (F). نوع من النيهيك ، حشرته تطول من ٧ الى ١٣ م. قرونها الاستشعارية مركبة من ١٣ مقله. كوسلها وعمداها الى الصفار الخشنى. ثوبها الى السمره الخشنة المولج. رأسها اصعب. ملاحظ ذكورها كلابية الشكل تطول نحو ٥ م. ملاحظ اناثا مستقيمة تطول نحو ٣ م. تميش على الاججار. قوتها مكن الحشرات وبرقاتها والاغارات النباتية السكرية.



نِهيك مبدول

٢٩٣٧٥ - نِهِيك الحقل الصغير

Labia minor (S). Labia (F). نوع من النيهيك ، حشرته تطول من ٦ الى ١٠ م. قرونها الاستشعارية دقيقة مركبة من ١٠ الى ١٢ مقله. نمداهما ورواشها مستطيلة. ملاحظ ذكورها كلابية الشكل قليلة التفوق، تطول نحو ٢ م. ملاحظ اناثا مستقيمة تطول نحو ١ م.



نؤ

٢٩٣٧٦ - نِهِيك الحقل الكبير *

Labidura riparia (S). Labidura (F). نوع من النيهيك الكبير القدد، حشرته تطول نحو ٢٥ م. زياناها مستطيلة محببة كثيرة القمل التي يراوح عددها من ٢٧ الى ٣٠ احمداها ذلقة. اجنتها بارزة. ملاحظ ذكورها منجلية الشكل متراكبة الاطراف تطول نحو ١٢ م. ملاحظ اناثا مستقيمة تطول نحو ١٠ م. || ثوبها الى الخشنى الاصعب المولج. تميش تحت الحجارة في الحقول وفي الرمال وقرب مجاري الماء. قوتها برقات الحشرات وبعض المواد النباتية || جسرهما نفق بحد الفور طوله يراوح من ٢٠ الى ٣٠ سم. وحده نحو ١٢ سم.

٢٩٣٧٧ - نِهِيك مبدول ، نَاقِبِ الأذُنْ

Forficula auricularia (S). Forficula commune (F). Common earwig (E). Gemeine Ohrwurm (D). نوع من النيهيك المبدول الشائع في معظم اقطار العالم. حشرته مستطيلة الجسم المبط. طوله تحت المجهر ١٠ الى ١٥ م. زياناها مركبة من ١٥ مقله. ظهورها قصيرة مقعولة سفدية التركيب. رواشها بارزة. ملاحظ ذكورها كلابية الشكل مسننة الاطراف تطول من ٣ الى ٥ م. ملاحظ اناثا شبه مستقيمة تطول من ٤ الى ٧ م. ثوبها كسني اللون اسفر المولج اصعب الطرف والجوانب. وهو يالغ الاماكن الآفلة. يعيش تحت الحجارة والاشعاب. يسرح في الليل ويبيت في النهار. انشاء قطع نحو ٦٠ مكنه تحتمها عند اوائل الربيع في قروموس مستطيل تدبره في القرب تحت الحجارة. مكنها يضي الشكل ايض اللون يطول نحو ١ م. ويتفقد بدم متحه بنحو ١٠ ايام عن رقات نهمه تلهم ما وصلت اليه من بوادر النباتات المشبية. اما الحشرة الكاملة فقوتها المواد العضوية والحيوانية والنباتية اغصها بوادر البلور الناتجة والثار السكرية. اغرارها زهيدة الا في بعض الظروف. كتحاف كثيرها من الحشرات اترية الدجوية المسرح.

٢٩٣٧٨ - نِهِيكيات ، نَاقِبَات الأذن

Forficulidae (S). Forficulidae (F). Forficulidae (E). فصيلة حشرات من رتبة جلدليات الاجنحة الرواكس. اجناسها وانواعها كثيرة العدد منتشرة في معظم اقطار العالم اغصها الاقطار الاستوائية. جميعها من حاملات الملاحظ الشريفة للشبابة الاشكال والاحجام || اشهر اجناسها النيهيك.

٢٩٣٧٩ - نَهْمِكَة

Barrisement (F). Trumpeting (E). نَهْمِكَة هو صوت الفيل في جميع ظروفه.

٢٩٣٨٠ - نؤ *

Connochaetes (S). Gnu (F). Gnu, Wildebeest (E). جنس حيوانات لبونة من بقرة الوحش ذوات الظلف. انواعه ثلاثة. اشكالها مزيج من مخلقة المياه والاشور والحسان. اجسامها كبيرة القدد شديدة النشط. سواركها رفيعة. رؤوسها مسطحة مستقيمة. عارضها مستقيمة السبيبة. اللب. يلددها رعية. اذنانها كاسية مستطيلة السبيبة. كا في الخيل. قرونها غليظة. مستعرضة القواعد، قوية التحبين. متشعبة الى اللداه || اناها قطع اريا واحدا

ترضعه نحو ٦ أشهر || موطنها فسح الارياء يشل كامل إفريقيا الشرقية والجنوبية وبعض البلاد الاسيوية .

٢٩٣٨١ - تَوَاشُلُ الدَّبَب

Connochaetes gnou (S). Gnou à queue blanche, Antilope gnou (F).

لوح من التلو كبير أجلة طوله نحو ٢٥٠ سم. وأرتفاعه ١٣٥ ثوبه الى السرة الكتستية . ذنبه ابيض اللون . الاثنى اصغر قدماً وقرناً من الذكر . أجله يد من ١٠ الى ٥٠ نفراً || موطنه يشمل ضفاف الارياء وسهوله .

٢٩٣٨٢ - تَوَاشُلُ الحَبِيبَةِ

Connochaetes albojubatus (S). Gnou à barbe blanche (F).

أكبر انواع التلو جثة وأقلها جلالة وأطولها عفرة ولحية . جسمه طويل نحو ٢٨٠ سم. ويرتفع نحو ١٤٠ . قرله أفي الالتشاب مدب الطرف الاحجج . ثوبه الى السرة الخطية الصهباء المواج . عفره شديدة السرة يتخللها صيب ابيض . طبعه يضاء اللون ومنه ضرب اسود الحية . أجله يد من ٨ الى ٤٠ نفراً . موطنه افرقية الشرقية حتى بحيرة فيكتوريا نيارزا .

٢٩٣٨٣ - تَوَاشُلُ مَسَلَح

Connochaetes taurinus, C. gorgon (S). Gnou taurin, G. rayé (F).

نوع من التلو كبير أجلة غليظا، طوله نحو ٢٢٠ سم. وأرتفاعه ١٢٠ . ثوبه الى السرة الخطية معلقا تسليج اشهب . أجله يد من ١٥ الى ٩٠ نفراً . يعيش برقعة النعام ويحير الزرد || موطنه يشمل معظم أقطار افرقية الجنوبية .

Noyau (F). Nucleus (E).

٢٩٣٨٤ - تَوَاقَة

هي عضو الاستمرار في الخلية تركب من شبكة مكونة من التلب الساعية في السائل النووي .

Noyau (F). Stone (E).

٢٩٣٨٥ - تَوَاقَة

هي الحجرة ، أطبقا .

٢٩٣٨٦ - تَوَاقَة الثِقَل

Barysphere (F). Barysphere (E).
نواة الثقل اسم يطلق عل كتلة الارض المركزية ذك لان جميع مركباتها من المعادن الثقيلة المائمة .

Nucléine (F). Nucléin (E).

٢٩٣٨٧ - تَوَاقِين

هي عناصر نوأة أخفيلة وقد تكون ازوتية ودهنية وسفورية وكبريتية ويصنف من دهاما نكليين .

٢٩٣٨٨ - تَوَاقِد

أقصى الاغراس وهي اربعة في أقصى الانسان بعد الاراء . وتسمى غرس الحلم لانه ينبت بعد البلوغ وكال الغل . وقيل النواجد التي تلي الاثياب . وقيل هي الاغراس كلها نواجد . قال الجوهري : وقد تكون النواجد الغرس . وهي الاثياب من الخف والسوالف من الظلف .

٢٩٣٨٩ - تَوَاقِيس

Eperon (F). Spurs (E).
حلب مؤلفة تملو سوك بعض الحشرات .

٢٩٣٩٠ - تَوَاق

نمت وصفي يطلق عل كل عضو نباتي يحلل زهرة او عدة زهور .

٢٩٣٩١ - تَوَاقِ أَيْسَين هو اليام ، أطبقا .

٢٩٣٩٢ - تَوَاقِ الثِقَل هو شب الليل ، أطبقا .

٢٩٣٩٣ - تَوَاقِ عَيْسِي ، كَيْرِيَة Carrière (S). Carrière (F).

شجرة برية وزينية من فصيلة النضيات . مهدا الصين . ساقها منتصبه فروعها تملو من ٥ الى ١٥ م . اثمارها وافانها حر الحاء . اوراقها عابلة متعاقبة . نصلها احليجي الشكل لام البشرة عل صفحتيه . ازهارها صندرة القد ، عادمة الصمالات ، خاسية الفصل البيض ، كثيرة الاسدية . ثمارها جردا وشمية الشكل ، ثلثية الصاربع || تنورها يستمر طوال شهر حزيران .

Eutoca (S).

٢٩٣٩٤ - تَوَاقَة

Eutoque (F). Eutoca (E).

جنس نباتات عشبية حولية وسمرة من فصيلة النضيات . انواعها المعروفة ١٢ جميعها امريكية الهيد ، بعضها شاع الاستعمال الزيني || سوقها غفائية . اوراقها صندرة متعاقبة زياء النصال . ازهارها جيلة ، خافتة السرف ، ملونة ، منها الازرق والاريجاني والايض || أشهر انواعها الزراعية الزينية نوأة يورجيليانا (Eutoca Wrangeliana)

Anthophora (S).

٢٩٣٩٥ - تَوَاقَة ٥

Anthophore (F). Anthophora (E).

جنس شحرات جارية لاقعة من غشائيات الاجنحة المحمويات وفصيلة التواريات . انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في جميع مناطق البلاد المحتلة الحارة والحارة . قوتها رحيق الازهار وظلها . ملجها الحياتي انتمالي || جسمها متوسط القد قريب الشبه بحجم ذكر النحل . تتميز بكتافة الزغب الذي يكتنفها من قة الرأس الى طرف البطن || عطلها غشاء تينبه بالعين في الموقع المهجورة اغصها الحيطان الحوية .

٢٩٣٩٦ - تَوَاقِيس هو اسطرغاليس ثوريس ، أطبقا .

٢٩٣٩٧ - تَوَاقِيَات ٥ Anthophoridae (S).

Anthophoridés (F). Anthophoridae (E).

فصيلة شحرات جارية لاقعة من غشائيات الاجنحة المحمويات . اجناسها وانواعها عديدة منتشرة في جميع اصقاع العالم باستثناء المناطق الباردة || ملاجئها الحياتية تختلف مع اختلاف الاجناس ، بعضها جامي والبيض الآخر انتمالي . وألجها منها قليل البنديد . الذكور والاثان تمل في سبيل الحياة والبقاء اذ لا يوليد عائلات كا في النحل || أشهر اجناسها التوارة والفتارة .

Ri d'araignée (F).

٢٩٣٩٨ - تَوَاقِيس

عيط المنكبوت ونسجه . وفي المثل اربي من نواس المنكبوت .

٢٩٣٩٩ - تَوَاقِيس جَوِيَة Perturbations atmosphériques (F).

هي التقلبات الجوية المازفة غير المألوفة . والنتيجة هي ازوتية من الرياح . ج نوح .

٢٩٤٠٠ - تَوَاقِيس مَسَلَح ٥

Neoborus ornatus (S). Néobore armé (F).

سمكة نهريه يبيض من مفتوحات المائنة . موطنها بحيرات ومنغصات نهر الكنفو . تعيش بين الاشجار المائنة



تَوَاقَة



تَوَاقِيس مَسَلَح

٢٩٤٠٦ - نُوتِيرِيَات * Noceridae (S).

Noceridae (F). Noceridae (E).

فصيلة حشرات مائية من غمديات الأجنحة. أجناسها وأنواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم اصقاع البلاد المعتدلة الحارة || أجناسها صغيرة ، أهليجية الشكل ، محدبة ، تطول من ٦ إلى ١٢ سم. رؤوسها قصيرة ، مستعرضة ، حينها صغيرة ، تأكلها وفكوكها قياسية. قرونها الاستشعارية شبه رشيعة الشكل ، مركبة من ١١ فصلة. كواسلها محدبة ، مستعرضة ، المحادها لاسفة ، حادة التعقيد. قوائمها نشطة ، الخلفية منها مجهزة للوم || جميعها مفترسة. تعيش في المياه الراكدة أو الجارية البطيئة الانسياب || أشهر أجناسها النوتيرة .

٢٩٤٠٧ - نُوتَد Calodon (S). Calodon (F).

جنس تطور من فصيلة الأبريات . أنواعه قليلة العدد اصطناعيا بعض اقاليم مناطق البلاد المعتدلة الحارة . جميع أنواعه كاعثة الصنف لاماكولة . تتميز ببوطها الشفوي التسجيع اللين ، وبسوطها القصيرة الضعيفة ، وينكأها الخلدوية الهضبة الشبه ليلية المادة || اُعرف أنواعه وأشهرها الاربعة التالية .

٢٩٤٠٨ - نُوتَد بُرْتَقَالِي اللون * Calodon suranticum (S). Calodon orangé (F).

نوع من النوتد . يعيش في ظلال الصنوبريات . ساقه غليظة ، قصيرة ، صفراء اللون ، بترقالية المواج . نكته غشوية الشكل ، كثيرة الحداب الاستشعارية ، قطرها نحو ٨ سم. سطحها خلي بترقالي اللون . لحمية كالفلين ، صفراء اللون ، كاعثة الصنف ، غير مرغوب فيها .

٢٩٤٠٩ - نُوتَد حَدِيدِي اللون * Calodon ferrugineum (S). Calodon ferrugineux (F).

نوع من النوتد . يعيش في ظلال الصنوبريات . ساقه قصيرة شبه غشوية الشكل ، لامتناهية السطح الخشن ، لونها إلى الكستني الاسمر . نكته ريمية الشكل قطرها نحو ٨ سم. سطحها خلي البشرة ، متتابع الحداب ، لونه إلى الشقعة السمره يعلوها تنقيط احمر يطقه الابيض || لحمية قاسية كالجلد ، كاعثة الصنف ، لا تؤكل .

٢٩٤١٠ - نُوتَد رَعَسِي * Calodon geogenium (S). Calodon terrestre (F).

نوع من النوتد . يسكن في الغابات . يعيش في المواقع الرطبة المشبعة بالطحالب . ساقه شديدة القصر تؤلف مع النكته شكلا شبيها بالقصع الثلاثي الاعنادي . قطر النكته نحو ٢ سم. لونها كالكاسق إلى الصفار الكبريتي || لحمية كاعثة الصنف ، لا تؤكل .

٢٩٤١١ - نُوتَد عَدَب * Calodon suaveolens (S). Calodon suave (F).

نوع من النوتد . يعيش في ظلال الصنوبريات . ساقه قصيرة ، غشوية الشكل ، رباعية الحداب المستطيلة ، لونها إلى الزرقعة السمره . نكته قمية الشكل ، كثيرة الحداب الجانبية والبطنية ، قطرها نحو ٤ سم. لونها إلى الصبغة يعلوها تمجج ازرق ومواج اسف || لحمية جلدية المادة ، كاعثة الصنف ، خزامية الرائحة العذبة ، لا تؤكل .

قوتها الاسماك والحيوانات والدماميس والديدان || جسمها مسطحة الجرم ، مستطيل الشكل ، يطول نحو ٣٥ سم. رأسها غشوي . عظمها مستطيل كالجلد . فكاهما مسلحان بسانن قوية ذرية . حينها صامتان . زعنفتها الظهرية الاولى كبيرة اللد شرعية الشكل . الثانية جدعة . زعنفتها الصدرية والخصوية والشرعية متصلة اللد . الذيلية كبيرة ، فارقة ، ثوبها إلى الشبهة البنيضية المواج . جانباها إلى الخصار الزئبق المشوح بالفضي . نكته إلى القبرة المناجية || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

٢٩٤١٢ - نُوتوسِيرَة Notoceros (S). Notocère (F).

جنس نباتات عشبية برية ، حولية ومحولة وبعمرة من فصيلة الصليبيات . أنواعها المعروفة عديدة اصطناعيا فسيحة الاربعاء تمتد من البلاد الحارة إلى الباردة || سرقها زهاب متعبية او مستطيلة ، غمره او قليلة الفروع . أوراقها كاملة ، متعاقبة ، سنانية الاتصال . ازهارها صغيرة يضاء اللون او تبيث او صفراء .

٢٩٤١٣ - نُوتِيلِيَات * Nautilidae (S).

Nautilidae (F). Nautilidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات وأسباب الازيل ورياحيات الخياشيم . أجناسها وأنواعها المنقرضة الغابرة كثيرة العدد ، أما المعاصر منها فجنس واحد موكك المحيط الهندي والبحار المحاورة . يدعى نوتيلة .

٢٩٤١٣ - نُوتِيلِيَة Nautilus (S).

Nautil (F). Nautilus (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات وأسباب الازيل ، ورياحيات الخياشيم وفصيلة النوتيلات || أنواعها المعاصرة المنقرضة ثلاثة اصطناعيا المحيط الهندي والبحر الاحمر || اصطناعيا كبيرة ، شبه قروية الشكل ، متتلة التعليط . اجسامها غشوية ، صغيرة الرءاء . رؤوسها صغيرة . عينها كبيرة جاسقة . لراسها عديدة ، فسيحة ، ونها اثنتان مجهزتان بما يشبه الحاجم . اصطناعيا نشطة وقوية || أشهر أنواعها وأكثرها انتشارا النوتيلة الجاعة .

٢٩٤١٤ - نُوتِيلِيَة لَمَاعَة * Nautilus pompilius (S). Nautil flamé (F).

نوع من النوتيلة يكثر وجودها في بحار الهند . اصطناعيا لامة ، لؤلؤية الصفحات الداخلية ، لونها إلى اليباض الهذم بالصنابي || لحمها مأكولة . اصطناعيا مرغوب فيها شائعة الاستعمال الصناعي .

٢٩٤١٥ - نُوتِيرَة * Nocer (S).

Notère (F). Nocer (E).

جنس حشرات مائية مفترسة من فصيلة النوتيريات ورتبة غمديات الأجنحة . أنواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة من اليابان إلى اوردية . تألف المناطق والياه الراكدة || اجسامها صغيرة ، أهليجية الشكل ، محدبة ، تطول من ٧ إلى ١٠ سم. رؤوسها مستعرضة ، قليلة النشور . حينها صغيرة بارزة . تأكلها وفكوكها وملاسها قياسية . قرونها الاستشعارية ورشيعة الشكل . كواسلها مستعرضة . المحادها لاسفة ، عديدة التعقيد . قوائمها نشطة ، الخلفية منها مجهزة للوم . ألوانها سوية الخصب الكستني أو الجوزي || الجملانة قانصة والبرقة ايضا .



نوتيرة لَمَاعَة



نوتد



نوتد بُرْتَقَالِي اللون



نوتد حَدِيدِي اللون



نوتد رَعَسِي



نوتد عَدَب



نودي



نوسة الاجامس



نوسة الاجامس



نوسة الحفصيات



نوسة

مظهره الخارجي يقع رادية اللون او يضاء لا قياسية الشكل والحجم تركيب نصل الاوراق وصفات الحياء الاديبة تصطبها بعد ان تقضي على النسيج والخلايا. وقد يركب كالأوراق الناعمة فينمو البقرة ببقعه أسمر دث أن يؤدي لياب السورق. يكالغ كثير من الفطور التي تصطب الكبريت والنحاس .

٢٩٤٢٣ - نَوْسَة الحفصيات *

Oospore citri-aurenti (S).
فطر مجهرى صمم الانتشار يركب ثمار الحفصيات المدركة والمحفوفة على اختلاف الانواع || يصيب القشور فيفسدها بعد ان يسطب النسيج والخلايا التي تشمل وتنفذ خاصة الآسك || يكالغ بتطهير الثمار الملمدة لحفظ او للتصدير وباجتناب الاماكن الحارة المشبعة الرطوبة .

٢٩٤٢٤ - نَوْسَة * *Nasiterna* (F). *Nasiterna* (S).

جنس طير من النسلقات وفضيلة البيضاوات . انواعها المروفة ١٢ صوبها غنية الجديدة ويبرز سلالة . تألف الثفبات الكثيفة الاشجار والمواقع القريبة من الماء . ملينها الحياني جماعي . قوتها الثمار واسارع الحشرات . تنسلق الاشجار الكانثار وتغير بشفة النوري || اجسامها صفراء ، ربة ، تطول من ٨ الى ١٢ سم . اجنتها لاسقة . اذنانها قصيرة مستنيرة الاطراف . الثوابها تختلف مع الانواع ، جميعها زائرة الالوان || اشهرها النوسة القنزعة .

٢٩٤٢٥ - نَوْسَة قنزعة * *Nasiterna pygmaea* (S).

Nasiterna pygmaea (F).
طائر من النوسة . جسمها صغير القد يطول نحو ٨ سم . ثوبها الى الخضار المتفاوت المجات . رأسها ومقنعا صفر . رقال ذنبها الجانيية الى السواد اللامع باستثناء الزام الاخير فانه اصفر ، اما الرقال الوسطى فزرقاء اللون .

٢٩٤٢٦ - نَوْسَل * *Métamère* (F). *Metamere* (E).

٢٩٤٢٧ - نَوْسَكَة * *Métamérie* (F). *Metamerism* (E).

Oosporées (F). *Oosporae* (E).
عارة فطور مجهرية من فصيلة الطحليات . اجناسها ستة : الازداداد والخليج والسداع والسيلندريوم والمغليبه والوسية .

٢٩٤٢٩ - نَوْسَادِر * هو الامويك ، اطلبه .

٢٩٤٣٠ - نَوْشَان * *Rhinocéros de Sumatra* (F).

هو كركدن سومترا ، اطلبه .

٢٩٤٣١ - نَوْس * النوس هو الحمار الوحشي .

٢٩٤٣٢ - نَوْس ، بَنَل * *Imbibet* (F).

ربط القتيه بالماء أو باي سائل آخر .
To imbibet (E).

٢٩٤٣٣ - نَوْسَرَة * *Diopsis* (S).

Diopsis (F). *Diopsis* (E).
جنس حشرات من فصيلة النضريرات ورتبة ذوات الجناحين انواعها المروفة ستة اصطنابا البلاد الحارة || اجسامها مضمورة ، خفافة ، تطول من ٥ الى ٨ سم . رؤوسها مكورة تملوها زوالك مغزفة الانشباب تحمل في اطرافها الزباني واللونين . صينها بارزة صغيرة . قرونها الاستشمارية صغيرة ، نحيلة ، تستيق الميون . احطلمها ولاسها صغيرة . كولسها

٢٩٤١٢ - نَوْجَل * *Heteropogon* (S).

Hétéropogon (F). *Heteropogon* (E).

جنس نباتات عشبية حولية زركوية من فصيلة النجيليات انواعها المروفة نحو ٢٥ اصطنابا البلاد الحارة والمتندة الحارة . سوقها جامدة نحيلة عادمة الفروع . اورثتها صصلية . انزهارها سنبل التجميع سنابلها فردية . بعضها ينبت طويلا في بعض موائل الساحل البنياني والريوط .

٢٩٤١٣ - نَوْغَة * *Ecade*

نتيجة البيئة الموسمية في التكيف او التبدل . كترك نوسة الظل والشمس والجفاف والرطوبة ...

٢٩٤١٤ - نَوْر * هو النور ، اطلبه .

٢٩٤١٥ - نَوْرَة * *Corymb* (F). *Corymb* (E).

النورة والمعدن ككل من اشكال الانزهار صيولا التركيب هديد الانزهار المتشابهة الجذع من المحور الرئيسي . يكثر في الفصيلة النورية || والنورة هي الزهرة .

٢٩٤١٦ - نَوْرَج * هو الجرجر والحلال ، اطلبها .

٢٩٤١٧ - نَوْرَس * *Mouetta* (F).

هو نرج الماء ، اطلبه .

٢٩٤١٨ - نَوْرَسِيَات * *Laridae* (S).

Laridés (F). *Laridae* (E).

فصيلة طير من كليات القدم ، طويلات الريش . اجناسها وانواعها المروفة عديدة || اجسامها متباينة الحجم . اجنتها مستطيلة ذقنة الاطراف . متاقدها عادمة الزند . اصابعها نصيلة الخطاب . قصاصها مجوزة بزويون من الفراض الجانيية ، زوج ابن وزوج ايسر || اشهر اجناسها النورس ونرج الماء والمجهوم .

٢٩٤١٩ - نَوْرِي * *Nurie* (S).

Nurie (F). *Nurie* (E).

سمكة نهريية وحيدة الجنس والنوع من فصيلة الشبليات . صوبتها انهر الهند || جسمها وشي الشكل يطول من ٤٥ الى ٥٥ سم . رأسها مشتل الجرم ، مقطوم الخلف . شفقها معتدل الانفراج ، وباهي الذبابت المستطيلة . صينها ماصحان . زعنفتها الظهرية غلفية الازنكار تقابل الشرية . الذليبية مقفرة الطرف . ثوبها الى الخضار البصري ينير وتعلو ساحة وردية في البطن ويسمر ويبقي في الظهر || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

٢٩٤٢٠ - نَوْرِيَكَة * *Péciale* (F). *Petal* (E).

هي بتلة الزهرة عامة وقد تستعمل تقصيصا للدلالة على البتلة المستقلة .

٢٩٤٢١ - نَوْسَة * *Oospore* (S).

جنس فطور مجهرية من النوسيات وفصيلة الطحليات كثير صميشها النحيل النراس المتشابهك التراكيب الذي يفسن النسخ المتشابهة ويتكاثر خارجيا . جرابها الكندي مثدالي الشكل . كتالده سببية التجميع || انواعها عديدة ، مظهرها دمي يعيش على المواد الدوائية المحفوفة على الاعشاب اليابسة وفي اثرية || احرف انواعها المؤذية ما يلي .

٢٩٤٢٢ - نَوْسَة الاجامس * *Oospore piricola* (S).

فطر مجهرى يتطفل على اوراق الاجامس وانفاده ومثاره .

٢٩٤٤٢ - نُؤُفَرِ اَزْعَب (S). *Nuphar pumilum* (S).
Nufar nain (F).
 نوع من النوفر المبلول . اعطاه مياه البلاد المحتلة الحارة .
 اوراقه تطلو من ٥ الى ١٥ سم . وتعرض من ٤ الى ١١ سم .
 ازهاره صفراء اللون صغيرة القد ، قطرها يراوح
 من ٢ الى ٣ سم . || تنوره يستمر من حزيران الى آب .

٢٩٤٤٣ - نُؤُفَرِ اصْفَر
Nuphar luteum (S). *Nufar jaune, Lis jaune des étangs, Plateau* (F). *Yellow water-lily, Brandy-bottle* (E). *Gelbe mummel, G. wasserrose* (D). *Ninfes gialla, Ercules gialla* (I).
 نوع من النوفر المبلول في مياه البلاد الحارة . اوراقه كبيرة
 متصل الاخضر الباهت ، تطلو من ١٥ الى ٣٠ سم .
 وتعرض من ١٠ الى ٢٠ سم . ازهاره صفراء اللون متراكبة
 البتلات المدينة الصفوف قطرها يراوح من ٥ الى ٧ سم .
 ثماره اجاصية الشكل . بلوره ويهديره مأكولة || ينور
 من حزيران الى ايلول .

٢٩٤٤٤ - نُؤُفَرِ سَهْمِي
Nuphar sagittaeifolium (S). *Nufar sagittal* (F).
 نوع من النوفر الامريكي ، اوراقه سهمية الشكل تطلو
 من ٢٠ الى ٤٠ سم . وتعرض من ٥ الى ٨ . ازهاره صفراء
 اللون متوسطة القد قطرها يراوح من ٤ الى ٦ سم . || تنوره
 يستمر من حزيران الى آب .

٢٩٤٤٥ - نُؤُفَرِ يَابَانِي
Nuphar japonicum (S). *Nufar japonais* (F).
 نوع من النوفر البروتي الوافر النشط والتمو . مهد
 اليابان ، اوراقه اهلجية الشكل . تصلها اخضر الصفحة
 العليا ، اخر السفلى يطول نحو ٣٠ سم . ازهاره كبيرة
 القد صفراء اللون تطلوها بشعة حراء . اسديها وبآرها
 ارجوانية || تنوره يستمر طوالم فصل الصيف .

٢٩٤٤٦ - نُؤُفَس
Bronza
 سبيكة ، متطابقة السب ، من النحاس والقصدير والزنك .

٢٩٤٤٧ - نُؤُفَمِيَّات
Dibamidae (S). *Dibamidés* (F). *Dibamidæ* (E).
 فصيلة حيوانات زساق من العفاليات قصيرات الالسة .
 انواعها المعروفة ثلاثة يصممها جلد واحد . اعطائها بعض
 اقالم افريقية الاستوائية || جميعها جاسة تسرح في الليل
 وببيت في النهار || اجسامها دريدية الشكل تطلو من ٢٠
 الى ٢٨ سم . وهي عادمة القوائم الامامية ، صامخة الخلفية .
 عينها طامسة تلحفها اغشية مدهشة .

٢٩٤٤٨ - نُؤُكَّة
Nucula (S). *Nucule* (F). *Nucula* (E).
 جنس حيوانات بحرية من الرغويات صفيحيات احيائهم
 وفسيلة التوكليات . انواعها المعاصرة المعروفة قليلة العدد
 منتشرة في معظم بحار البلاد المختلفة الحارة || اصدافها
 شبه مخروطية الشكل ، متساوية المصاريح ، لاشاوية
 الاصلع . الوانها عديدة ينفذ فيها الاغبر ثم انني الفاتح .
 اصفاها للؤلؤة الماددة من الداخل || تعيش منفصلة في
 الرمال المتوسطة الغور .

٢٩٤٤٩ - نُؤُكِّيَّات
Nuculidae (S). *Nuculidés* (F). *Nuculidæ* (E).
 فصيلة حيوانات بحرية من الرغويات صفيحيات احيائهم .

شبه اهلجية ، مجهزة باربعة منخاس ذرية . بطونها شبه
 مدقية الشكل . رواشتها شفاقة يطوها بعض البقع السمر .
 قوامها مستطيلة || المجلانة واشمة اما اليرقة فخاضعة
 ترعب في عصف النجيليات .

٢٩٤٤٤ - نُؤُصْرِيَّات
Diopsidae (S). *Diopsidés* (F). *Diopsidae* (E).
 فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها
 المعروفة نحو ٦٠ منتشرة في جميع مناطق البلاد الحارة ||
 اجسامها صغيرة تطلو من ٥ الى ٨ سم . زوردها مستدلة
 الجرم مجهزة بزوائد سنمية الارتكاز ، منفرجة ، مستطيلة ،
 تحمل الميون في اطرافها . عينها بارزة . قرونها الاستشعارية
 صغيرة تنشب في الزوائد قرب محيط العين . كراسلها شبه
 يضيئة . بطونها مستعرضة المؤخر . اجنحتها شفاقة يعلوها
 بعض البقع السمر . قوامها مستطيلة || يرقاتها خاضعة
 تركيب عصف النجيليات || اشهر اجناسها النوفرية .

٢٩٤٤٥ - نُؤُطَّة
Venericula succenturié (F).
 اسد اجزاء جهاز الهضم عند الطير . اوها الهوصلة ثم
 النطلة ثم القاذصة ثم الامعاء || فالهوصلة هي الجراب الاول
 الذي يلي المريء ، يجمع فيه الطعام بعض الوقت ثم ينتقل
 الى النطلة (البطن المصاري) وفي جراب مستطيل يفرز
 الصارة الهاضمة حل الاطعمة من حب وغيره التي صار
 تليينها بالهوصلة ثم ينتقل الطعام من النطلة الى القاذصة
 حيث يسحق مع الحصى والزلزل ويدخل في الامعاء حيث
 يتم الهضم والنفاد .

٢٩٤٤٦ - نُؤُطَر
Nothure (F).
 طائر يدعى نظوره ، اطلبه .

٢٩٤٤٧ - نُؤُع
Espèce (F). *Species* (E).
 النوع هو جماع الفروبو اي جملة الافراد المتشابهة التي
 تحدثت من اصل واحد او جديدا مشتركة .

٢٩٤٤٨ - نُؤُفَم *
Cystoseira (S). *Cystoseire* (F). *Cystoseiræ* (E).
 جنس نباتات بحرية من احيات السمر . انواعها المعروفة
 نحو ٣٠ اعطائها معظم بحار العالم || كلالها قصيرة .
 سويقها فراء . اوراقها خطيطة ، صغيرة . كثيرة العدد ،
 متراكبة . تنبذ مجموعها لثني يشبه يضيئة الشكل ،
 السبيعية التجميع .

٢٩٤٤٩ - نُؤُفِي
Spécifique (F). *Specific* (E).

٢٩٤٤٠ - نُؤُفَة
Cardiosperme (F).
 هي البكت ، اطلبه .

٢٩٤٤١ - نُؤُفَر *
Nuphar (S). *Nufar, Nuphar* (F).
 جنس نباتات عشبية جلمورية مائية من فصيلة النيفوريات .
 انواعها المعروفة ١٥ اعطائها مياه انهار واحوار وبعض
 بحيرات البلاد الحارة والمعتدلة . جلداهم مدادة . اوراقه
 مستطيلة الاعناق طافية . ازهاره عديدة البتلات المتطابقة
 الصفوف . ثماره جراء ريمية الشكل ، بزورها نشوية
 الماددة || اعرف انواعها واشهرها ما يلي .



نوع



نوفر



نوكلة

اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد. انواعها النادرة من متحجرات اقدم التكاوين الجيولوجية. اما الحاصرة فمتشرة في معظم بحار العالم || اصنافها شبه غروية الشكل، متساوية المصارع، لامساوية الاصلع. اصنافها خشفة ملوثة من الخارج، مائلة للزوجة من الداخل. حيواناتها مائعة المصاع، كبيرة الاصل الاصلح الاحليلية المسطلة || ارفع اجناسها المعاصرة واشهرها النوكلة.

٢٩٤٥٦ - نولييتا ٥

Nolina (S), Nolina (F).
جلس نباتات من فصيلة الزنبقيات مفردة التعريف على اسم البوتاني الفرنسي ولولان. انواعها المعروفة قليلة، مهدا بلاد المكسيك. سيقانها ليفية التركيب، لغتية الجذث والقاعدة، دقيقة الجلع. اوراقها خيشة لتصل، مستطيلة متعقبة. ازهارها جرسية الشكل، عقدية التجميع، هامة الانكاز || ترطب في الازرة الفنية المتوسطة الاندماج والمادة الكلوية. تحصى الموانع الباردة والرطوبة المستحكمة. اشهر انواعها الزنبقية ما يلي.

٢٩٤٥٧ - نولييتا مُعْتَبَرَة ٥

Nolina recurvata (S), Nolina arquéa (F).
نوع من النولان الزنبقية، ساقها تعلو من ٤ الى ٦ أمتار. اوراقها جميلة الخضار تعلو نحو ١٠٠ سم. وتعرض ٢ سم. ازهارها هامة بشكل الساق بمقتضى المنقلب الكبير الحجم. ازهارها بيضاء اللون. تنزرها يستمر طوال الصيف.

٢٩٤٥٨ - نولييتا مُسْتَعْيِلَة الورق ٥

Nolina longifolia (S), Noline à longues feuilles (F).
نوع من النولان الزنبقية، ساقها تعلو من ١٥٠ الى ٣٠٠ سم. اوراقها شديدة الخضار المايك تعلو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم. وتعرض نحو ٢ سم. ازهارها هامة الانكاز يتوج الساق بمقتضى المنقلب الكبير القد. ازهارها بيضاء اللون، غبراء الموانع. تنزرها يستمر طوال الصيف.

٢٩٤٥٩ - نومان، حقيفة الحثق

Herniaria (S), Herniaire (F).
جنس نباتات عشبية برية من فصيلة النوليات. انواعها المعروفة ثمانية تكثر في الاماكن الرملية الجافة. سيقانها فروع اوراقها متعاقبة لائفة صغيرة القد. ازهارها ابطية الانكاز او تاجية. ثمارها زور نشوية المادة || اشهر انواعها النولان الامرد.

٢٩٤٦٠ - نومان امرد، حقيفة الحثق

الزرداء، نبات الحثق
Herniaria glabra (S), Herniaire glabre, Herniole, Herbe au cancer, Turquoise (F), Rupture-wort, Turk's herb (E), Glatte bruchkraut (D), Ernialis, Erba turchetta, Erniola (I).
نوع من النومان المشي البري الطبي المعمر. ساقه فروع مراء، اوراقه صغيرة القد، متعاقبة، لائفة، بيضة النصل، مائلة البشرة. ازهار ابطية وتاجية الانكاز، نورية التجميع، صغيرة الحجم || كان شائع الاستعمال في علاج الحثق.

٢٩٤٦١ - نوميديات

Nilecebra (S), Nolecebra (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديمة القنات. اجناسها وانواعها كثيرة العدد. نباتاتها اشباب حوية وممرة تعيش في الماراض الحادة وفي الازرة القليلة الرطوبة. اوراقها كاملة. ازهارها غسية التجميع لا قياسية الانكاز. ثمارها بغور نشوية المادة. || اشهر اجناسها النومان والحريط والشعير ومشفة القنابيل.



نولان



نومان امرد

٢٩٤٥٠ - نولان ٥

Nolans (S), Nolane (F).
Nolans, Chilian bell-flower (E), Glockenwinde (D), Nolans (I).
جلس نباتات برية وزراعية زنبقية من فصيلة النوليات. انواعها عديدة منها المشي والجانيبي والحولي والحول والمعمر. سيقانها لا نظامية الجلوس منها المتصبية والمستطيلة والمادة. اوراقها كاملة متعقبة متعاقبة او توائية. ازهارها فردية التجميع، محورية الانكاز، جرسية الشكل، غارفة الاطراف كالبرق. ثمارها نورية لا قياسية الشكل والحجم. بلورها غشبية المادة. شديدة الصلابة || ارفع انواعها الزنبقية واشهرها ما يلي.

٢٩٤٥١ - نولان ميرمقي الورق

Nolana scripifolia (S), Nolane à feuilles d'arroeche (F).
نوع من النولان الزنبقية الحولي. موطن الاصل بلاد كولومبيا. ساقه مستطيلة مدادة زياء اللحاء. اوراقها الجلعية كبيرة القد ميرمقي الشكل. ازهارها زرق الابواب، صفر الانابيب والفجاج || تنزرها يستمر من حزيران الى تموز.

٢٩٤٥٢ - نولان سنائي الورق

Nolana lanceolata (S), Nolane lancéolée (F).
نوع من النولان الزنبقية الحولي. موطنه بلاد الشيلي. جلعه جني الجذر. ساقه مسطحة زياء. اوراقه لائفة، ساعدة، سنائية النصل، خلية البشرة، الجلعية منها ضمية التجميع والاخرى توائية. ازهارها كبيرة القد صانجولية الابواب، صفر الفجاج والانابيب المسننة بالنفجسي. تنزرها يستمر من حزيران الى ايلول.

٢٩٤٥٣ - نولان مُسْتَعْيِلَة

Nolana paradoxa (S), Nolane paradoxaie (F).
نوع من النولان الزنبقية الحولي السبروتي. موطنه الاصل بلاد البرازيل. ساقه متصبية فروع، زياء اللحاء، تعلو نحو ٣٥ سم. اوراقه توائية ساعدة، لصلها مسوية الشكل، خلي البشرة. ازهارها بنفسجية الابواب، صفر الانابيب، حمر الفجاج || تنزرها صيني يستمر نحو ٥٥ يوما.

٢٩٤٥٤ - نولان مُسْطَح

Nolana prostrata (S), Nolane couchée (F).
نوع من النولان الزنبقية الحولي السبروتي. موطنه الاصل بلاد البرو. ساقه مستطيلة مدادة. اوراقه متعقبة متعاقبة، نصلها اهليلجي الشكل، مائل الصفحة، جبل الخضار الزاهي. ازهارها زقاء اللون، مسننة بالنفجسي كورسيا هرمية الشكل، حاسبة الفصوص المتساوية الزحيجة الاطراف. تنزرها يستمر من حزيران الى تموز.

٢٩٤٥٥ - نوليديات

Nolanaceae (S), Nolanaceae (F), Nolanaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين. اجناسها قلية العدد.

٢٩٤٧٤ - نِيْسَالَة ٥ Orogenèse, Orogénie (F).

النياقة فرع من الجيولوجية والجغرافية الحكيمة يبحث في تكوين الجبال انطلاقاً من السدانة والكثافة .

٢٩٤٧٥ - نِيْسَاهِكَة ٥ Zoogenie (F), Zoogeny (E).

النياهة فرع من الزولوجية يبحث في نشوء الانواع الحيوانية وفي مدارج نموها .

٢٩٤٧٦ - نِيْسَة Animus (F).

هي الدافع الباطني الحقيقي للعمل .

٢٩٤٧٧ - نِيْسَة التَدَلِيْس ، نِيْسَة الغش ٥

Conallium fraudis (F).

هي قبة اجرامية يستدل عليها من معرفة المدين مدى الضرر الذي يلحق بذاثيته عند قيامه بعمل يجعله مفسراً او يزيه في افعاله .

٢٩٤٧٨ - نِيْسَة التَمَكُّث Animus domini (F).

هي ان تنصرف المرء في المال تنصرف المالك له سواء كانت ملكيته حسيمة ام غير حسيمة .

٢٩٤٧٩ - نِيْتَرَات Nitrate (F).

النيترات ، كبريتاً ، ملح يحصل من تآكسد الحامض النيتريكي مع اسد الاجسام . وهو من الاسمدة الازوتية المشهورة الشائعة الاستعمال نظراً لسرعة انفعاله في التربة وقرب تناوله من النبات الذي يمتلأ به دون جهد او عناء . النيتراتات او الاسمدة النيتريكية عديدة غلظة التراكيب والمصادر اعرفها واشبهها استعمالاً ما يتبع .

٢٩٤٨٠ - نِيْتَرَات الامُونِيَاك ، نِيْتَرَات التَشَادُور Nitrate d'ammoniaque (F).

احد اسمدة الازوتية التركيبية يستحضر من تفاعل الحامض النيتريكي مع الامونياك . يحوي نحو ٣٥٪ من الازوت الصافي منها ١٧.٥٪ ازوت نيتريكي و ١٧.٥٪ ازوت امونياكي . لذلك فهو يجمع بين سرعة انفعال وتحميل النيترات وبين بقاء انفعال وتحميل الازوت الذي يوافق القسم الاكبر من دورة النبات الشولية او الحولية .

٢٩٤٨١ - نِيْتَرَات البوتَاس Nitrate de potasse (F).

سماد ازوتي بوتاسي يستحضر من تكرير ملح البارود وتصنيعه مع البوتاس . يتميز بفسالة نسبة رطوبته اي لا تفوق ٤٪ وهو يحوي من ١٢ الى ١٤٪ من الازوت النيتريكي ومن ٤١ الى ٤٦٪ من البوتاس . || مظهره الخارجي ملح يتبلور ابيض اللون . ارتفاع نمته يجعل استعماله عسوراً بزيادة الانحاز .

٢٩٤٨٢ - نِيْتَرَات الجير ، نِيْتَرَات الكِلْس Nitrate de chaux (F).

سماد كبريتي مركب من تآكسد الحامض النيتريكي مع الكلس . وهذا الحامض النيتريكي يستحضر اما مباشرة بتسليط القوس الكهربائي على الازوت الجوي او باكسدت الغاز الامونياكي . يسهل استحصاله من ازوت الجو . وهو يحوي ١٥.٥٪ من الازوت النيتريكي ونحو ٢٨٪ من الكلس . تأكله مع الكلس يجعله اسرع الاسمدة انفعاله وتحميله واكثرها ملائمة لجميع الارابة . || اما محاذيره فهي سرعة تحمله وتقلصه من التربة ، انقلاص نسبة رطوبته التي تبلغ ٥٥٪ . علم قابليته المزج مع الاسمدة الاخرى

٢٩٤٧٢ - نُؤُون الكئين هو الحوت . ج نينان وأنيان .

٢٩٤٧٣ - نُؤُون بَحْرِيّ Anguille de mer (F).

سمكة بحرية تسمى زرقونية مبلولة ، اطلبها .

٢٩٤٧٤ - نُؤُونَة ٥ ، أَفِيَا Aphya pellucida (S).

Athérine naine, Nounat (F). Athérine (E).

سمكة وصيدة الجنس والنوع من فصيلة القويبيات . جسمها عادم السيف ، صغير القد ، دقيق الشكل ، يطول نحو ٥ سم . || يكثر وجودها في بعض الانواع قرب الشطوط البيئانية . وهي من الاسماك المأكولة المتوسطة الصنف .

٢٩٤٦٥ - نُؤُونَة ٥ Phytogénèse (F).

Phytogenasy (E).

النوعة نمو النبات وشماحه .

٢٩٤٦٦ - نُؤُونِيَات Piceoporaceae (S).

Piceoporaceae (E).

فصيلة الفطور الثورية من رتبة الزقيات .

٢٩٤٦٧ - نُؤُونِيّ Nudéaire, Nudéal (F).

٢٩٤٦٨ - نُؤُونِيّ Drupe (F), Any stone-fruit (E).

كل ثمرة لحية ذات نواة اي عجينة كالشمشة والقرزة يكون فيها السويق اي الجزء المتوسط الكائن بين القشرة والعجينة لحمي التركيب ، ويكون الجزء الداخلى الذي يحيط بالزيرة قاسياً صلباً كما في عصمة الزيتون والحوطة ...

٢٩٤٦٩ - نُؤُونِيّ ٥ Oospore (F), Oospore (E).

النوية بوفرة غقيات الوليج .

٢٩٤٧٠ - نُتِيم

هو الصبيح اي صوت اليوم . قال الاعشى يصف لالا :
« لا يسمع المرء فيها ما يؤنس »
بالل الّا نُتِيم اليوم والوضا »

٢٩٤٧١ - نُتِيَادَات ٥ Unionidae (S).

Unionides (F), Unionidae (E).

فصيلة حيوانات مائية من الرخويات صفحيات الخياشيم . اجناسها وانواعها المعروفة كثيرة العدد منتشرة في معظم بحيرات واهر العالم || اصداؤها نظامية ، متساوية المصارع ، لامتناهية الاصلع ، ملونة ، يمشاها ادمه غشراء . اجناسها مائحة الخياشيم ، مستطيلة الاربعيل الصفيحية الشكل || اعرف اجناسها واشهرها النيسادة والندرية والمريئة والمريئة والوثينة والمزودة .

٢٩٤٧٢ - نُتِيَادَة ٥ Unio (S).

Mulette (F), Unio (E).

جنس حيوانات مائية من الرخويات صفحيات الخياشيم وفصيلة النياتاد . انواعها المعروفة نحو ١٠٠٠ منتشرة في جميع انهر العالم وتبصراته || اصداؤها كبيرة القد او متوسطة ، بيضية الشكل ، متساوية المصارع ، يمشاها من الخارج ادمه يكثر فيها اللون الاخضر ويمشاها من الداخل طبقة صميكة لؤلؤية شائعة الاستعمال الصناعي || تعيش منتمة في الاسمال والارمال .

٢٩٤٧٣ - نُتِيَاط

التباط نجان نيران من كوكبة برج العقرب موضعها قدام القلب وعقله .



نِيَادَة

أصعبها السوروفوسفات ونترات الصودا وسلفات الامونيوك والاسمدة العضوية .

٢٩٤٩٣ - نِزَارَات الشَّيْبِي ، نِزَارَات الصُّودَا
Curure (F), Dirt, Muck (E).
وسل مستخرج من قنار أو خثاق .

٢٩٤٩٤ - نِزَارَات الشَّيْبِي ، نِزَارَات الصُّودَا
Phrynomeridae (S).
Phrynomeridae (F). Phrynomeridae (E).

نفسلة حيوانات ديداء قارئة شاذجة من لمة الخديجات وبرتية السفليات ورتية البتراناي أي عديمات اللبب || اجناسها وانواعها قليلة العدد مهدها بلاد افريقية الشرقية والجزيرية . جميعها من الصفاد الصغيرة القذرة . تتميز بمسارات سطح عضلي قويها الصدري في مركز تلافيها وتندد التنوات العظيمة الجانبية في فقرة العنبر . وروسيا صغيرة . فكوكها العليا مسنة . اصابع قوائمها الانامية والخلفية طويلة من كل صلاب تحمل في اطرافها طباط حبيبية تمكها من لسق السطح الملساء ، جلدها ملساء ، عادمة الشعر ولكنها تفرز من عند القنص عليها ، مادة كالوية تعمل في اليد ما يفسد نبات القراص الحرق || انجاسا مختلفة الالوان يكثر فيها الاسمر الداكن والرقشة الصفراء وبعض الخطوط القامطة || سطح انجاسها يبيض على النباتات والاشجار القريبة من الماء .



نِزَل

٢٩٤٩٥ - نِزَارَات الشَّيْبِي ، نِزَارَات الصُّودَا
Propagula (F).

النَّزَر جهاز التناسل عند العنكب . وهو مركب من عدة حجيرات زنبكية ، وشية الشكل ار عسكية . يسقط عند الادراك اتمام نيتش في التربة ويعد الدورة الحياتية .

٢٩٤٩٥ - نِزَارَات الشَّيْبِي ، نِزَارَات الصُّودَا
Melnargia galatza (S).
Mélargie galatze, Demi-douil (F).
Melnargia galatza (E).

حشرة من فصيلة الحياتيات ورتية حشرقيات الاجنحة . موطنها يحد من الشرق الاوسط الى معظم الاقطار الاروية . قوائمها واسعة قوتها مشر الاقدام . مرتبها تميش على صفت الذكيتل والرفول والعصوية والفت جسمها متوسط القند يطول نحو ١٨ سم . مسقطها نحو ٤٨ سم . راسها الى الربعة . حينها كبيرتان . زباناها صويلانان اسودان . جوشها الى الربعة السوداء . يغطيها الى الربعة || رواشها ، عند الشقين ، الى البياض الاخير يطول يتبعج وتزويق وتتميق اسود || لها جبل واحد في الخيل . تظهر القرفة في حزيران . تسرح من النفض الى قنصة اليل . تعاطل بعد ظهورها بنحو ثمة اسابيع وتنتع المكن لطف على الصفصيات السفلى من نصال الصيف || السورة عند بلوغها الكمال تطول نحو ٣٢ سم . جسمها اسطواني الشكل . قشورها ناعم الحمل القصير . ثوبها الى الربعة اخضرها يعلوها غطان جانبيين اصفران يشع بجسي اسود . راسها اسود . شرجها ينتهي بزايدة مغلقة . منها ودراجها الى السورة || طور الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع ينتهي في التربة ضمن غلاف عضوي المادة .



نِزْدَة

٢٩٤٩٦ - نِزَارَات الشَّيْبِي ، نِزَارَات الصُّودَا
Neda (S), Nédas (F), Neda (E).
جنس حيوالات بحرية من الرخويات مديات الاويل خلفيات الخياشيم وفصيلة الكتكتيات . انواعها المعروفة قليلة العدد اصطلها بعض مناطق البحر الابيض المتوسط . تعيش لاصقة بالصخور القريبة من الشواطئ || اصداها داخلية ، مستديرة ، رقيقة ، شديدة الصخر . اجسادها نحلة ، مستطيلة ، مدببة المقدم والمؤخر . اعطاشها

٢٩٤٩٣ - نِزَارَات الشَّيْبِي ، نِزَارَات الصُّودَا
Nitrato de soude de Chili,
Nitrato de soude naturel (F).
الطَّبِيْعِي

ماد ازوي يستخرج من كلش مناج الشيل بعد تقويته وتسيبه ويصير مائه . مظهره الخارجى ملح ابيض اللون يحوي من ١٥ الى ١٦ ٪ من الازوت النيتريكي وبعض القوي الزئبد من عناصر اليود والبروم واليورق والمينزا يضاف اليها بعض تولاه الاكثار الثانوية . || وهو سريع الانفعال في التربة قريب التمثل من النبات فير انه يملط تماسك ذرات التربة الذي يحد من رفايتها . لذلك ينصح باستعماله في التربة الخفيفة القليلة الانساج وبعد استعماله في التربة المنصبة او الحامضية الدالت لانه يحميد تفاعلها نتيجة تماسك ذراتها .

٢٩٤٩٤ - نِزَارَات الصُّودَا ، نِزَارَات الشَّيْبِي
Nitrato de soude synthétique (F).

ماد كيميائي ازوي سريع الانفعال والتشيل ، يستخرج من ازوت الجير ، يحوي من ١٥ الى ١٦ ٪ من الازوت النيتريكي . يقال فيه ما قيل بنترات الشيل من حيث نتائج الحكمة والكيمياء على ذرات التربة وانفعالاتها .

٢٩٤٩٥ - نِزَارَات الشَّيْبِي ، نِزَارَات الصُّودَا
Nitragine (F).
مستخرج ازوي سائل المادة ينتج من تكثير جرالم التربة صناعيا . || يستعمل حشا بالتربة لديها جرالم النيتروجين .

٢٩٤٩٦ - نِزَارَات الشَّيْبِي ، نِزَارَات الصُّودَا
Nitropotasse (F).
ماد كيميائي يستخرج من تفاعل الحامض النيتريكي مع البوتاس . تركيبة ٢٥ ٪ بوتاس و ١٦,٥ ٪ ازوت نصفه تماما نيتريكي والنصف الاخر امونياكي . يستعمل في الاسمدة الجلييلة للنبع والفاضة فير انه يشكو من ارتفاع نسبة رزفه التي تبلغ ٣٤ ٪ .

٢٩٤٩٧ - نِزَارَات الشَّيْبِي ، نِزَارَات الصُّودَا
Nitrogène (F).
Nitrogen (E).
هو الازوت . الحلي

٢٩٤٩٨ - نِزَارَات الشَّيْبِي ، نِزَارَات الصُّودَا
Nitrophosphate
ماد كيميائي يستخرج من تفاعل الحامض النيتريكي مع الفسفات المهدق . تركيبة ١٤ ٪ من الحامض الفسفوري الذي يلوي في الماء و ٧,٥ ٪ من الازوت النيتريكي السريع الانفعال . يستعمل في الاسمدة النشطة التي تحسن النبات على الازهار .

٢٩٤٩٩ - نِزَارَات الشَّيْبِي ، نِزَارَات الصُّودَا
Nitrophile (F).
نعت ترميني يطلق على كل نبات يرغب في التربة الننية بالنترات وقد يطلق على التربة ايضا قنطول تربة نيتروفيلية .

٢٩٤٩٠ - نِزَارَات الشَّيْبِي ، نِزَارَات الصُّودَا
Nitala (S), Nitala (F).
جنس حشرات نافعة من الصفريات الغشائية الاجنحة المتصورة . انواعها عديدة منتشرة في معظم اقطار العالم . جميعها صغيرة القند طولا يراوح من ٢ الى ٥ سم . انجاسها مختلفة الالوان يكثر فيها الاسود والاصفر والصفراء . قوتها الاستعمارية غيطة منفرجة الاطراف . مرزاتها شاذية الجسم الحادة . || قوتها التزويبات من اي نوع كانت تعطينا بشذاهما فتصدر اعصابها وتغلقها الى حيث تلتقيها .

غروبية متوسطة الطول . لولسها ثنائية ، انبوية مفلوجة السطوح الخارجية .

٢٩٥٠٤ - نيريمرجية الرأس

نير الرأس نجم نير من كوكبة المرأة المسلسلة .

٢٩٥٠٥ - نير الزورق

نير الزورق نجم نير من كوكبة النهر .

٢٩٥٠٦ - نير السرة

نير السرة نجم نير من كوكبة المرأة المسلسلة .

٢٩٥٠٧ - نير السرطان

نير السرطان نجم نير من كوكبة السرطان .

٢٩٥٠٨ - نير الفكة

نير الفكة نجم من كوكبة الاكليل الشمالي ، يوجد خلف الهالك الرابع ويدعونه قصعة المساكين .

٢٩٥٠٩ - نير القدم

نير القدم نجم نير من كوكبة المرأة المسلسلة .

٢٩٥١٠ - نير قنطورس

نير قنطورس نجم من كوكبة قنطورس يدعى حضار ، اطله .

٢٩٥١١ - نير نعيم

Alpha de la Croix du Sud (F). Crux (E). نير نعيم نجم نير من كوكبة صليب الجنوب المروفة أيضاً بنعيم . يبعد عن الارض نحو ١٥٠ سنة ضوئية .

٢٩٥١٢ - نير نيرا

Nerea (S). Nérée (F). Nerea (E). جنس حيوانات بحرية من الرخويات مديات الارجل خلفيات انباشم وفصيلة السليبات . انواعها المروفة قليلة العدد اطلقها نيمت من المحيط الهندي الى البحر الاحمر || اجسامها عريضة حلالية مستطيلة محدبة الظهور الثنائية الاخاذيد ، رباعية الزوائد الجناحية الشكل . رؤوسها صغيرة مكورة ، ثنائية القوائم الدوسية . عياشيمها انبوية الشكل تطلق الزوائد .

٢٩٥١٣ - نيرج

Sui generis لكل زهرة او ثمرة او مادة ضوية او جسم حيواني زائفة خاصة فارقة مميزة . فالنيرج هو تلك الزائفة الخاصة المميزة

٢٩٥١٤ - نيريمرجية

Nierembergia (S). Nierembergia (F). جنس نباتات عشبية مدادة مبرمة من فصيلة الباذنجانيات . صفوية التبريت على اسم العلامة "نيريمرج" . سورها تطلق من ٢٥ الى ٩٠ سم . اوراقها مختلفة الاشكال والاحجام . ازهارها بيضاء اللون او ليلية . انايبها مستطيلة . بتلاتها فارقة . منها بعض مناطق اريكة الجنوبية || انواعها المروفة ، متوسطة المدد اشهرها التالية .

٢٩٥١٥ - نيريمرجية كندية

Nierembergia frutescens (S). Nierembergia frutescens (E).

منها الشيل . ساقها كدنة خلية اللحاء تطلق من ٣٠ الى ٩٠ سم . اوراقها صغيرة مستطيلة العرض . نصالها خلية

٢٩٤٩٧ - نيريمرجية قشعرية

Neides tipularios (S). Néide tipulaire (F).

حشرة خالصة من فصيلة البرتوسيات ورتبة عضفلات الاجسنة . جسمها صغير القدي يطول نحو ١٠ م . شكلها وشركتها في اتفانها شبيهة بشكل القمص وحركاتها || توهبا الى الخطي الاسمر . رأسها مكور ، مستطيل الخط . ميتاها جانبيتان ، صغيرتان . زباناها دقيقان ، مستطيلان كوسلها شبه غروبي الشكل . حجبها ضيقة ، صغيرة . ظهورها ضيق لاحت . قوائمها مستطيلة . الصفحة السفلى من بطنها وصدرها الى السرة السوداء || تألف الجبراي والمواقع التي تكثر فيها الاعشاب اعصها الجراب . قوتها الارواق .

٢٩٤٩٨ - نيريمرجية ، نيريمرجية ، ورد الشمس

Drosara (S). Drosara, Rosée du soleil, Rosella (F). Sundew, Lustwort (E). Runder Sonnentau, Rosellkrut (D). Drosara, Rosolida, Erba da gotzai (I).

جنس نباتات عشبية مفترسة مبرمة من فصيلة النيدمانيات . انواعها المروفة زهاء ١٥٠ جميعها ميناغة تعيش في المنابع والمطارب والمواقع الرطبة . سورها مكرة . اوراقها قرصية الانتساب مستطيلة الاعناق . ازهارها خماسية الاجزاء تقوم على شاربغ دقيقة متصبية توسط الارواق . || اقتراشا الحشرات يم بواسطها اوراقها المستترة ، للتمرة التصل للوروز بالولاس الدافقة التي تقصر كل حشرة تقرب سها تم تقضي عليها وتمتصها بعد ان تفرز لولسها الصمارة الحامضية الحامضة اللازرة . وعند نهاية عملية الامتصاص يعود التصل الى ما كان عليه وتعود القواس الى الانتصاب وقرز المواد الدافقة بانتظار فريسة جديدة .

٢٩٤٩٩ - نيريمرجية

Drosaracae (S). Drosaracae (F). Drosaracae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين مستقلة القامات مرتفعات المبيض . انواعها المروفة عديدة تجتمع الى ستة اجناس اشهرها النيدمان والكنافش والديونه . جميعها اصحاب مكرة مدمرة ترطب في المنافع وفي الارربة الطرية الرطبة . اوراقها قرصية الانتساب . ازهارها خماسية الاجزاء . ثمارها جراد بيضية الشكل . بزورها آسية الاجسام . معظم انواعها من النباتات المفترسة التي تحول اجسام الحشرات الى مواد منبهة تمتصها بلولسها .

٢٩٥٠٠ - نير

Joug (F). Yoke (E). عشبة مختلفة الاشكال والاحجام توضع في حق الثور او على راسه يستطيع بواسطها من جر الاثقال والاهرات وما اشبه .

٢٩٥٠١ - نير

Lucicola (F). تمت تمرير يلقن على الحشرات التي تسمى في الفلام .

٢٩٥٠٢ - نير التواصين

Castor (F). Castor (E). نجم نير من برج الثورين . مركزه قبالة رأس الثور الماؤزر . يبعد عن الارض نحو ٢٨ سنة ضوئية .

٢٩٥٠٣ - نير الحماصة

نجم نير مزدوج من كوكبة الحماصة ، يدعى الفاعقة ، اطلها .



نيدمان

٢٩٥٢٤ - نيسان (F) April (E).

يعرف أيضاً بأبريل. الشهر الرابع من السنة الشمسية وهو من شهور الربيع التي تنتفح فيها بنشاط طاقة النشو الطبيعية. مدته ثلاثون يوماً.

تقوم به الزراعي : الاعمال الزراعية الواجب تنفيذها في هذا الشهر أو الممكن إنجازها فيه منوعة وعبدة انحصار.

في الزراعات العامة الموصية

— بلر القطن بعد تحضير التربة وتوزيع الاسمدة الكيماوية اللازمة لانه من النباتات المبكرة التي تستدعي غراس التربة والتي تتطلب الكثير من المواد الغذائية.

— متابعة تحضير التربة وتلر الاسمدة الكيماوية الحديثة لزراعة التبغ قبل انقضاء التوتيرة الاولى من هذا الشهر.

— متابعة الاعتناء بمشاكل التبغ وقلها من الحشرات والأمراض الفطرية.

— توزيع آخر وجبة من الاسمدة الازوتية النباتية على ذروع القمح المتناغرة.

— الأسراع في ذرع البصل المتأخر قبل حلول التوتيرة الثانية من الشهر.

— مباشرة زرع الشتول السكري بعد تحضير التربة ومدا بالاسمدة اللازمة مع العلم ان الشتول يرغب في التربة الغنية بالمواد العضوية.

في الاشجار المثمرة

— متابعة التطعيم في المناطق المتناغرة.

— السهر على حياة الاشجار المثمرة من صقع بعض الياالي الصافية الايام وقد يتم ذلك باستهلاك غيوم اصطناعية من النحاس الكثيف.

— متابعة جمع اعمال مكافحة الحشرات والاصنام النباتية.

— مباشرة مكافحة ديدان الثمر في التفاح والاباجاص والخوخ .. على اثر سقوط ثمرات الزهرية.

— الابتداء بحرق التربة او ركاها مع طمر الاشباب التي كانت فيها شرط ان يكون العقد قد جاوز حجم حبة الخمس.

في المحاصيل

— حرق تربة البساتين واقتلاع جميع الاشباب وطمرها.

— تشليب الاشجار واقتلاع الفروع الزائدة او الاستئناسة.

— متابعة توزيع الاسمدة الكيماوية اللازمة.

— حضن المطاطيم الجديدة عروقاً عليها من لحة الشمس.

— عدم تأخير تقاطف الاشجار التي بشرت بالانزهار.

— مباشرة مكافحة ذبابة البحر للنشوط.

في الموز

— اقتلاع جميع الشتول الغتية الضعيفة او الزائدة عن الحاجة.

— توزيع النشوب القريبة من الاكباس بقليل من الاسمدة السريعة التشتيل.

في الزيتون والكرية

— متابعة حراثة الزيتون وانجازها قبل ابتداء الثل.

— سرث الكبركة حفظاً على رطوبة تربها ولقصاء على الاغصان الضعيفة.

— تغيير اوراق الكبركة بالكبريت الميكروبي، على سبيل الحيلة، في المواعيد المعرضة للارصاد.

البشرة لونها الى الخضار الباهت. انجازها ليلكية الين قمرها نحو ٢٥ م. || تنويرها يستمر من الصيف الى الخريف.

٢٩٥١٦ - نيرمبرجيه نهريه

Nierembergia rivularis (S).

Nierembergia des ruissaux (F).

منبتها ضفاف نهر البلات. ساقها مسطحة تطل نحو ٤٠ سم. اوراقها مسطحة الشكل. فصاعداً عادةً أملح، مجلةً أخضر المايح، تطل نحو ٣ سم. انجازها عاجية الين، فواحة الثرف. تطرها نحو ٤ سم. طولها من ٣ الى ٥ سم. || تنويرها يستمر طول شهر تموز.

٢٩٥١٧ - نيرمبرجيه نهريه

Nierembergia gracilis (S).

Nierembergia grêle (F).

منبتها الاربعين. ساقها هزيلة مسطحة تطل نحو ٥٠ سم. اوراقها ضيقة، شبه خطية الشكل. ساقها واوراقها كثيفة الملمس والذنب. انجازها ليلكية الين يملوها مبالغ بنفسجي. تزيانها الى البياض الارزق المواج || تنويرها يستمر من حزيران الى آب.

Nérôl (F), Neroli (E).

٢٩٥١٨ - نيرولي

هو عطر القنداق أو دهن القنداق المستقطر من زهر النارجع المعروف بالقنداق.

٢٩٥١٩ - نيرون الزيتون *

Philcortribus olea (S). Néiroun, Rongeur de l'olivier, Scolyte de l'olivier (F). Philcortribus olea (E). Ölbaumborkenkäfer (D).

حشرة من الكرشيات البدديات الاجنحة. طولها نحو ٧ سم. قوفاها الى السواد اللامع يملطو تجلجخ خلي اخضر. زيانها دقيقة صفية الاطراف. || تركب الزيتون واليالك والمراش. انماها تنجح الممكن في العماء وقد تخلج الانثان عند اقتحاب السنايل الزهرية. ينشق الممكن عن مرقاق خائبة تخلج الشكير تنصلب. || يكافح باقتطاع وحرق الاجزاء الصافية في غضون شهر نيسان.

Nerinea (S).

Nérinée (F). Nerinea (E).

جلس حيوانات من الرضويات معديات الارجل وفضيلة اثرينيات. انزاهها المرفوقة قليلة العدد جميعها من متحجرات الاحقاب الثانوية || اصداها مردنية مستطيلة قريبة الشبه بالسرديات.

٢٩٥٢١ - نيرينيات

Neriniidae (S).

Neriniidae (F). Neriniidae (E).

فصيلة من الرضويات معديات الارجل. اجناسها وانواعها المرفوقة قليلة العدد جميعها من متحجرات الاحقاب الثانوية || اعرف اجناسها النيرينة.

٢٩٥٢٢ - نيريب

النيريب هو قصب ذكور الاغنام والظباء.

٢٩٥٢٣ - نيريك

جسم صلب اللد شارب في الغشاء يعبر الاجواء الارضية وقد يستقر على الارض.



نيرون الزيتون



نيرية

Désinsectisation (F). ٢٩٥٣٣ - نَيْسَبَة

Arête d'une montagne ٢٩٥٣٤ - نَيْسَب
Ridge, Crest (E).
أعلى نقطة أو مِيق في قمة جبل . ج. نَيْسَب وَأَيْسَب وَنَيْسُوق .

Patricola (S). ٢٩٥٣٥ - نَيْسَب *
Pétricola (F). Petricola (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم
وفصيلة النيكيات . أنواعه المعروفة قليلة العدد منتشرة في
معظم بحار البلاد المعتدلة الحارة || أجسامها صغيرة القد . تعيش
شعابها بارزة طليقة . أصدانها شبه مظلية الشكل . تعيش
في الانفاق تنقبها في الصخور المغسورة بالماء . لفيها غزير
المادة .

Patricollidae (S). ٢٩٥٣٦ - نَيْسَبِيَّات *
Pétricollidae (F). Petricollidae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم ،
تنتمي إلى مرتبة النوتيات . أجناسها وأنواعها الغالبة عديدة
أما الممارسة فقليلة جميعها مصفدة رباعية الأضواء
كانخياشيم ولثامها والأذنين . أعطانها معظم بحار العالم .
تعيش في انفاق تنقبها في الصخور المغسورة بالماء ||
أعرف أجناسها وأشهرها النيقب والثانارس .

Nika (S). Nika (F). ٢٩٥٣٧ - نَيْسَكَة *
جنس دوبيات بحرية من القشريات عشاريات الأرجل
وفصيلة النيكيات . أنواعها المعروفة عديدة منتشرة في
معظم بحار العالم || ملجئها الحيائي جماعي . تسرح قرب
الجبال والشطوط جميعها جيدة الصنف مأكولة كالعنبر .

Nickel ٢٩٥٣٨ - نَيْكِل
معدن أكهب ألون القاتم اللامع ، شديد الصلابة ولثامته ،
يزنه (في Ni) وزنه الذري ٥٨.٩٩ ، ثقله الذري ٩
ينصهر في ١٤٥٠ °س . وهو قليل التأثير بالهواء
الجوي ، قابل للتلفظ والطرق والسحب . يدخل في تركيب
أكثر السبائك لانه يكسبها من صلابته وبتأثيره ويزدها
من قابليته للسحب . وهو يستخدم أيضاً بكثرة في عملية
طلاء المادن .

Nicotine (F). ٢٩٥٣٩ - نَيْكُوتِين
ونهم من قائل تبين . مادة قلوية جسمية شديدة اللط
والفعالية تسخرج من التبغ . || وهي تستعمل تحت شكل
سلفات النيكوتين في القضاء على بعض الحشرات الزراعية

Nicotianées (F). ٢٩٥٤٠ - نَيْكُوتِيَّات
Nicotianae (E). هي النباتات ، راجعها .

Nikidae (S). ٢٩٥٤١ - نَيْكِيَّات *
Nikidae (F). Nikidae (E).
فصيلة دوبيات بحرية من القشريات عشاريات الأرجل ،
طويلا الذليل . أجناسها وأنواعها عديدة منتشرة في جميع
بحار العالم || أجسامها صغيرة قريبة الشكل بالشبه بالعنبر .
مناكمها قصيرة . الزوج الامامي من قوائمها مجهز بملاصق
صغيرة . الزوج الثاني مجهز بملاصق ذرية || ألوها حيلة
الألوان القسطنطينية الزاهية || أشهر أجناسها النيككة .

في الزهور

— بلر الأنواع المتخارة ونقل الثحول الصالحة إلى مستقراتها
— المحافظة على التباينات والورود من عبث الحشرات
المتطفلة والأوصام الفطرية .
— الاحتناء بالنسبد والتقليم .

في الدجاج والنحل

— متابعة حفن وترعيم البيض والعناية بالصيصان .
— تحضير القفران أو الخلايا اللازمة لتقبل الاثوال
الجديدة .
— البدء بنقل الناحل إلى الاماكن الموصوفة بمجدة مرثما
المغري .

٢٩٥٢٥ - نَيْسَب ، نَيْسَبَان
طريق النمل إلى زيتيه .



نيقب

٢٩٥٢٦ - نَيْسَم *
Event (F). Blow-hole (E).
مخرج بخار الماء من فتحة الحيطان وبعض الاصماك . ج. نياسم .

Nysson (S). ٢٩٥٢٧ - نَيْسُون *
Nysson (F). Nysson (E).
جنس حشرات قانصة مفترسة من غشائيات الاجنحة
الحمويات . وفصيلة النيسونيات . أنواعه المعروفة نحو ٩٠
منتشرة في جميع اقطار العالم القديم || أجسامها صغيرة
مخسورة . رؤوسها مستديرة . تذكورها نضيفة ، حادة .
عينها كبيرة ، نافذة . قرونها الاستشعارية عيطية ،
مستطلة . أجنحتها شبه شفافة . بطونها اهليلجية . أثوابها
إلى السرة المتفاوتة السود يعطيها في بطونها تجذيع طوي
يراح من التني إلى الاصفر النحبي .

Nyssonidae (S). ٢٩٥٢٨ - نَيْسُونِيَّات *
Nyssonidae (F). Nyssonidae (E).

فصيلة حشرات قانصة مفترسة من غشائيات الاجنحة
الحمويات . أجناسها وأنواعها المعروفة عديدة منتشرة في
جميع اقطار العالم || جميعها جهالة تقيم غشائياتها في التربة .
أجسامها صغيرة ، مخسورة ، ملونة . أجنحتها وقوائمها
نضيفة . قرونها الاستشعارية عيطية ، مستطلة ، متعقبة
الاطراف . تلصق طرائدها فتضغدها وتنقلها إلى غشائياتها ||
أشهر أجناسها النيسون والفوريتس .

Epi (F). Tufe (E). ٢٩٥٢٩ - نَيْسَان
هو الدائرة من الشعر .

Porc-épic commun (F). ٢٩٥٣٠ - نَيْس
هو الشيم الملبول ، اطله .

Chiloptomates, ٢٩٥٣١ - نَيْسَمِيَّات *
Chiloetomés (F).

رئيسية من الحيوانات الطليعية الفيكليات . فصائلها
وأجناسها عديدة ، بعضها من متحجرات الاحقاب الثالثة
والبعض الآخر مناصر . جميعها منزلة ضمن حبيرات
قرنية المادة أو كسبية تعلوها اسفاط نافذة كالثفاء تنقسم
وتنصل حسب الحاجة .

Relation nutritive (F). ٢٩٥٣٢ - نَيْسَطَة عَيْدِيَّة
Nutritive relation (E).

هي النسبة الغذائية أي نسبة المواد الازوتية إلى غيرها من
المواد الغذائية القابلة للانقسام في كل حلف .



نيكة



نيل

٢٩٥٤٩ - نيل هندي
Indigofera indica (S).
Indigotier hirsuta (F).
 نوع من النيل الأزرق، يجلبه تملو نحو ١٠٠ سم. ساقها فناء. أوراقها كبيرة عديدة الوريقات الانطوائية الترتيب التي يراوح عددها من ١١ إلى ٣٣، نصلها سناني الشكل، خلي البشرة، أصعب المواج. أزهارها عقودي التجميع كبير اللد محوري الارتكاز. أزهارها إلى الحفرة الزاوية البنفسجية المواج. انتاجه الخضابي وافر المادة متوسط الصنف.

٢٩٥٥٠ - نيلكة
Indigo
 خشاب أزرق يستخرج من ورق النيل وسوقه.

٢٩٥٥١ - نيلكة صينية
 هي البلباط النيل، أطبله.
٢٩٥٥٢ - نيلنج
 هو اليك، أطبله.

٢٩٥٥٣ - نيلكك *
Dryobalanops aromatica (S).
Dryobalanops aromatique (F).
 شجرة حرجية وصناعية وصيدة الجنس والنوع من فصيلة التيفليات. أصلها من الهند إلى الهند الصينية وجزر الأناضول. يجلبه تملو نحو ١٠٠ سم. ساقها فناء. أوراقها متعاقبة مستطلة. نصلها جامدة، سنانية الشكل، شديدة الخضار الزاهي. أزهارها عقودي التجميع. ثمارها تقية وفيه بطولها تفروق خالي القصل المستطيلة، الميتة. وصفا يبلغ هر الشجرة نحو ١٥ سنة تنشق ساقها طولا ويرشح منها دهن كالغوري فاجر الصنف، يدعى كافور بورنيو أو بورنيول.



نيلك

٢٩٥٥٤ - نيلن
 سد نسيجي تركيبى شائع الاستعمال.

٢٩٥٥٥ - نيلنج
 هو النيل، أطبله.

٢٩٥٥٦ - نيلوفر، نيلوفر، بنشين
Nymphaea (S). *Nénufar*, *Nénuphar* (F). *Water-lily* (E). *Seeros* (D). *Ninfea* (I).
 جنس نباتات عشبية جلمودية مائية من فصيلة النيلوفر. أنواع المعروفة ٢٥ أصلها مياه البلاد الحارة والمنتدلة. جلمودها مبددة. أوراقها وأزهارها مسطلة المعالين طافية. ثمارها جراء كروية الشكل. يزودها نشوية المادة. أفرط أنواعها وأشهرها ما يتبع.



نيلوفر ابيض

٢٩٥٥٧ - نيلوفر أبيض، بنشين أبيض، عرالس النيل، حفيضة السك

Nymphaea alba (S). *Nénufar blanc*, *Lis des étangs*, *Blanc d'eau*, *Lune d'eau*, *Volet* (F). *Flatter dock*, *White water-lily* (E). *Welsse Seeros* (D). *Ninfea blanca*, *Nensafar*, *Luna d'acqua*, *Regina dei laghi* (I).
 أشهر أنواع النيلوفر وأشبهها. جلمودها خلية مستعدة للقد. أوراقها كبيرة اللد تعرض من ١٠ إلى ٣٠ سم. نصلها أخضر البشرة مل صفحية. أزهارها يضاء اللون، عادمة الريف، تقريبا يراوح من ١٠ إلى ١٢ سم. ثماره وجلمودها مأكولة. تنوره يستمر من حزيران إلى الأيلول.



نيلوفر أزرق

٢٩٥٥٨ - نيلوفر أزرق، بنشين أزرق، كرتب الماء
Nymphaea coerulea (S).
Nénufar bleu, *Lotus bleu* (F). *Blue water-lily* (E). *Blaue Seeros* (D). *Ninfea caelesta d'Egitto* (I).
 نوع من النيلوفر البهري الشائع في مياه بحيرات وأنهار

٢٩٥٤٩ - نيلنج، حيلة

Indigofera (S). *Indigotier*, *Anil* (F). *Indigo plant* (E). *Indigopflanze*, *Anilpflanze* (D). *Indaco*, *Endeco* (I).
 جنس نباتات عشبية وجينية من فصيلة القرنيات القراضية. أنواعه زهاء ٢٠٠ منها الحولي والعلوي والمسر. سوقها فراء غشوشة. أوراقها متعاقبة مركبة زرية الترتيب. أزهارها لا قياسا التجميع بالأرتكاز. أزهارها صغيرة اللد تكثر فيها الااليان الوردية والحمراء. جميعها من نباتات المناطق الحارة. معظمها بري وبعضها صناعي يستخرج من أوراقه وسوقه صباغ نيل اللون. أشهر أنواعه الزراعية والنزيرية ما يلي.

٢٩٥٤٣ - نيل الصباغين
Indigofera tinctoria (S). *Indigotier des teinturiers* (F).
 نوع من النيل الأزرق المشهور. جنته تملو من ١٢٠ إلى ٢٠٠ سم. ساقه فراء. أوراقها صباغية أو تسماية الوريقات الرقيقة. أزهارها عقودي التجميع محوري الارتكاز. أزهاره وردية اللون يملوسا مواج أسفع. انتاجه الخضابي وافر المادة جيد الصنف.

٢٩٥٤٤ - نيل أنثي
Indigofera decora (S). *Indigotier élégant* (F).
 نوع من النيل الأبيض، يجلبه تملو نحو ١٠٠ سم. أوراقه لا قياسا التركيب منها الخامية الوريقات والصباغية والتسماية. وريقاته اهليجية النصل الامرد المالس. طولها يراوح من ٧ إلى ٩ سم. ورضها نحو ٣. أزهارها عقودي التجميع، محوري الارتكاز. أزهاره وردية اللون المايق. تنوره يستمر من ايار إلى آب.

٢٩٥٤٥ - نيل بحري
Indigofera glauca (S). *Indigotier glauque* (F).
 نوع من النيل الأزرق. جنته متوسطة اللد تملو نحو ١٥٠ سم. ساقه فراء. أوراقه مستطيلة، عديدة الوريقات البحرية اللون، الخلية البشرة. أزهارها متوكلي التجميع محوري الارتكاز. أزهاره إلى الحفرة القاعة. انتاجه الخضابي وافر المادة متوسط الصنف.

٢٩٥٤٦ - نيل عربي
Indigofera arabica, *I. anil* (S). *Indigotier anil* (F).
 نوع من النيل الأزرق. يجلبه تملو من ١٠٠ إلى ١٢٠ سم. ساقه فناء. أوراقه عديدة الوريقات البيضة النصل الصغيرة اللد. أزهارها متوكلي التجميع. أزهاره إلى الحفرة الزاوية. انتاجه الخضابي متوسط اللد والصنف.

٢٩٥٤٧ - نيل فيضي
Indigofera argentea (S). *Indigotier argenté* (F).
 نوع من النيل الصناعي والنزيري. يجلبه صيدرة اللد تملو من ٩٠ إلى ٩٠ سم. أوراقه ثلاثية أو خلية الوريقات. وريقاته خلية النصل اللغفي، بيضية الشكل، مطوية الطرف. أزهارها عقودي التجميع. أزهاره وردية اللون بنفسجية المواج. انتاجه الخضابي قليل المادة فاجر الصنف. تنوره يستمر من تموز إلى آب.

٢٩٥٤٨ - نيل قمريري
Indigofera atropurpurea (S). *Indigotier cramoisi* (F).
 نوع من النيل التريبي. يجلبه تملو نحو ١٢٠ سم. أوراقه مركبة من ١١ وريقة. وريقاته اهليجية الشكل، خلية النصل المتجمع الخمار. أزهارها عقودي التجميع. أزهاره قمرزية اللون المايق. تنوره يستمر من تموز إلى آب.



نيلوفر أصفر



نيلوفر الروس



نيلوفر عطر

البرقية الشرقية . أوراقها مستطيلة الاضلاع ، كبيرة النصل الفارض .
٢٥ سم . نصلها أخضر الصفحة العليا أحر السفلى .
أزهاره إلى الزرقاء يعلوها مروج وردي . ثماره وجذاميره
ماكولة . || تنوره يستمر من حزيران إلى أواخر آب .

٢٩٥٩ - نِيلُوفَرُ أَصْفَرٌ * Nymphaea flava (S). Néoufar jaune (F).

لوع من النيلوفر الأزرق . مهد أهورا فلوريدا ويجربها .
جذاميره نجيلية مستدقة . أوراقها مستطيلة القند تطول من ١٥
إلى ١٥ سم . وتقرض من ٩ إلى ١٢ سم . نصلها يحزز الحار ،
أخضر الصفحة العليا ، أصفر السفلى . أزهاره مستطيلة القند
لونها إلى الصفار الكبريتي . || تنوره يستمر طوال فصل
الصيف .

٢٩٦٠ - نِيلُوفَرُ الْعَرُوسِ * Nymphaea lotus (S). Lotus, Néoufar blanc d'E-

gypte, Lotier d'Egypte (F). Egyptian lotus, White
lotus, Sacred lotus (E). Agyptische Lotusblume,
Weisser Lotus (D). Loto, L. sacro, L. egiziano (I).
نوع من النيلوفر البرقي للبلبل في مياه البلاد الحارة .
مهد حوض النيل . أوراقه مستطيلة القند تعرض نحو ٢٠ سم
نصلها أخضر الصفحة العليا بحري السفلى . أزهاره كبيرة
الحجم ، بيضاء اللون . ثماره وجذاميره وأصناف أوراقه ماكولة .
تنوره يستمر طوال فصل الصيف .

٢٩٦١ - نِيلُوفَرُ عَطَر * Nymphaea odorata (S). Néoufar odorata (F).

نوع من النيلوفر الأزرق . أوراقه مستدقة كبيرة القند
قطرها يراوح من ١٢ إلى ٣٠ سم . نصلها أخضر الصفحة
العليا ، أحر السفلى . أزهاره عطرية العرف ، كبيرة القند ،
قطرها يراوح من ١٢ إلى ١٥ سم . لونها إلى البياض المالح .
تنوره يستمر طوال فصل الصيف .

٢٩٦٢ - نِيلُوفَرُ مَعْدُون * Nymphaea tuberosa (S). Néoufar tubéreux (F).

نوع من النيلوفر الأزرق . مهد البلاد الأمريكية . ضروبه
عديدة . جذاميره متقاربة القند الغنية الفرية الشكل .
أوراقه كبيرة مستدقة قطرها يراوح من ١٥ إلى ٣٠ سم .
نصلها يبدو أحر اللون ثم يتصرف شيئاً فشيئاً إلى أن يستقر
على الأخضر الباق . أزهاره كبيرة القند ، عديمة العرف ،
متباعدة الألوان ، منها الأبيض والوردي والاحمر والقرمزي .
تنوره يستمر طوال فصل الصيف .

٢٩٦٣ - نِيلُوفَرُ هِنْدِي * Nymphaea indica (S). Néoufar des Indes (F). Water-

lily, Water nymph (E). Nymphenblume, Seerosen
(D). Ninfes Indica (I).
نوع من النيلوفر البرقي للبلبل في معظم مياه أنهار الهند .
أوراقه كبيرة القند ثنائية الشكل ، نصلها أخضر الصفحة
العليا حطبي السفلى . أزهاره كبيرة الحجم ، عديمة العرف ،
تنبية اللون . ثماره وجذاميره ماكولة . || تنوره يستمر
طوال فصل الصيف .

٢٩٦٤ - نِيلُوفَرُ رِيَات * Nymphaea (S). Nymphaea (F). Nympha-

cea (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين مستقلة القامات .
اجناسها خمسة ، أنواعها عديدة . جميع نباتاتها جلدورية

٢٩٥٥ - نِيلُوفَرُ * Indigotina (F). Indigotin (E).

هي المادة الملونة في النيل وهي رباعية التركيب بيضاء اللون
تتأكسد في الهواء وتزرق . الصناعة الحديثة تستخرجها
من النفلتين .

٢٩٥٦ - نِيلُوفَرُ * Nematostylis (S). Nématostyle (F). Nématostylis (E).

جنس نباتات عشبية دوفسية سرورية من فصيلة السوسليات .
منبتها بعض مناطق أمريكا الشمالية . شاربها منتصب ،
معتدلة الارتفاع . أوراقها صغيرة ، ضيقة النصل .
أزهارها مستطيلة الاضلاع تنمو في اباط الشرايف ||
تزرع للزينة في الحدائق . تزهى في الاربعاء المتوسطة
الاندماج المنسوبة التركيب المتصنعي الزاخرة المواد الغذائية ||
انواعها المعروفة مستطيلة العدد ، أشهرها التالية .

٢٩٥٧ - نِيلُوفَرُ * Nematostylis purpurea (S). Nématostyle pourpre (F).

عشبة تزيينية دوفسية جادحة . منبتها التماسك ولوزيانا .
شراخها يرتفع نحو ٢٥ سم . أوراقها صغيرة القند ، ضيقة
النصل ، زرقية الخضار . أزهارها متدلية الحجم ،
أرجوانية اللون . أسديتها ملتحة القواعد . متأكها منتصب
الحيوط الجالسة || تنويرها يستمر من أيار إلى حزيران .

٢٩٥٨ - نِيلُوفَرُ * Nematostylis caelestina (S). Nématostyle céleste (F).

عشبة تزيينية دوفسية جادحة . شراخها يرتفع من ٥٠
إلى ٦٠ سم . أوراقها صغيرة ، ضيقة النصل ، زاهية
الخضار . أزهارها كبيرة زرقاء اللون . أسديتها ملتحة
القواعد . متأكها حلزونية الحيوط || تنويرها يستمر من
أيار إلى حزيران .

٢٩٥٩ - نِيلُوفَرُ * Nematostylis brunhea (S). Nématostyle brun (F).

عشبة تزيينية دوفسية سرورية . منبتها المكسيك . شراخها
يرتفع نحو ٣٠ سم . أوراقها صغيرة الحجم ، ضيقة النصل ،
خضراء الخضار الزاهي . أزهارها سماء اللون بنفسجية المواج .
تلاتها الداخلية موهجة بالأصفر . متأكها جالسة الحيوط ||
تنويرها يستمر طوال شهر حزيران .

٢٩٥٠ - نِيلُوفَرُ * Nemespora (S). Némespore (F).

جنس لطور مجهرية من فصيلة الرغيفيات . انواعه قليلة
العدد والاذى تتميز بسرطانها الزرقاء الملوثة الشج .
كتالها اسطوانية ، منقطة ، حلوية الاطراف .

٢٩٥١ - نِيمُوزُومَا مُسْتَيْطِلَةٌ * Nemosome elongé (F).

حشرة تدعى اسطوانية الماء ، اطليها .



ثِيُوت مَبْدُول

Néogène (F).

٢٩٥٧٣ - نِيُوجِين

نعت تعريفي يطلق على الحقبة الثانية من الاباج الثالث المعروف أيضاً بالاباج الحديث . وهو يشمل العصر المياني والعصر البليستي || تتميز هذه الحقبة بتطور الثبوت وابتقاء العلم ، بوجه عام ، إلى الحالة الحاضرة . كما وأنها تشهد ، في الزمن الأخير منها ، ظهور أول إنسان على الأرض أو أول شبه بالإنسان .

Neovoasia (S).

٢٩٥٧٤ - نِيُوفُوسِيَه

جلس فطور جمهورية من فصيلة التشريرات . بوله يحمل في اطرافه خيطوط مشجية شفافة . انتاش بوله يتميز بدعيات غروبية الشكل تحمل العديد من البويضات المحلية الضمنية الجميع || الزواحة المؤقتة قليلة الضرر لا تستجيب الناية

Néolithique(F), Neolithie(E).

٢٩٥٧٥ - نِيُولِيثِي

نيوليثي أو العصر النيوليثي هو زمن الحجر المصقول .

٢٩٥٧٢ - ثِيُوت مَبْدُول * ، مَبْدُول المَاء المَبْدُول ، مَبْدُول مَبْدُول ، مَبْدُول مَبْدُول

Molge vulgaris, Triturus vulgaris (S). Triton vulgaira, Triton punctué (F). Smoot Newt (E).

حيوان زحاف قاذب بويض من فصيلة السمندليات ورتبة السرفوقيات . موطنه يمتد من الشرق الأوسط إلى أوروبا || جسمه مستطيل الشكل بطول من ١٤ إلى ١٦ سم . الذكر اصفر من الالقي . رأسه غروبي الشكل . عيناه صغيرتان . حنكه كامل التسنين في الفكين . قاعته الإماميتان رباعيتا الأصابع أما الخلفيتان فخاسيتا . جلده مائل للشفار . ثوبه البلوي ، مديج ووزكش وصنيج بالاسمر والأخضر والاصفر والأسيد . مده إلى الكلبة الطحلاء تتوسطها جدة حراء تمتد من الزور إلى المزوق || يتميز بقلل الهمة . يألف التبايع والمناقع . قوته الحشرات والتشرييات والرخويات || يعتبر من القوازب المفيدة النافعة .



٢٩٥٨٣ - هاذة قلبية الورق

Ampelopsis cordata (S). Vigne vierge à feuilles en coeur (F).

نوع من الهاذ التريبي. جنته مدادة عارضة تطول من ١٠ الى ١٥ م. اوراقها قلبية الشكل، قليلة التفصيص تطول وتعرض من ٥ الى ١٢ سم. تصلها رقيق الصفة، انضغ القرن، عادم الخمل || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران.

٢٩٥٨٤ - هاذة كبيرة الورق

Ampelopsis megalophylla (S). Vigne vierge à grandes feuilles (F).

نوع من الهاذ التريبي. جنته دغلية الشكل تملو من ٣ الى ٤ امتار. اوراقها ريشية التركيب وريقاتها كبيرة القذ بيضية الشكل تطول من ٦ الى ١٠ سم. تصلها مالم الصفة اللبسا، خلي السفل، احمر المروق والاخصاب. ازهارها صيدانية التجميع. يزورها سود. ازهارها يستمر طول شهر تموز.

Ampelopsis arborea (S). هاذة مشجرة. *Vigne vierge arborescente* (F).

نوع من الهاذ التريبي. جنته متبعية تملو نحو ٥ امتار. اوراقها ريشية التفصيص، تصلها مالم الصفة العليا خلي السفل. ازهارها خماسة الاجزاء || ازهارها يستمر من حزيران الى تموز.

٢٩٥٨٦ - هاذة هاتكة

Ampelopsis heterophylla (S). Vigne vierge à feuilles variables (F).

نوع من الهاذ التريبي. جنته عارضة تطول من ٥ الى ٦ امتار. ساقها وفروها جزوية السماء. اوراقها هاتكة لاقياسة التفصيص الذي يراوح من ٣ الى ٥، تصلها مالم الصفة العليا، خلي السفل. بلورها الى الزرقه الزاهية. ازهارها يستمر من حزيران الى تموز.

٢٩٥٧٦ - هابط، وابط

Descendant (F). *Descending* (E).

هو نقيض الصاعد.

Hétérophylle (F).

Heterophyllous (E).

نمت تعريفي يوسف به كل نبات لانظامي الاوراق تركيباً وشكلاً وارتكازاً.

Grenouille female (F).

She-frog (E).

الصفدة الانثى. ج حاجات، تصغيرها حويجة وهيبة.

Méridien (F). *Meridian* (E).

النقط الزمضي الذي يرتكز عليه قياس درجات الطول.

٢٩٥٨٠ - هاجكة

الهاجكة هي النقلة تحمل صلبة.

Ampelopsis (S).

نوع من الجلفة الطراء. انواحه المعروفة ١٢ تتميز بمزلقها البسيطة الخالية من الاطياب المحصية وبمخاضن تبيض ازهارها القدسية الشكل. واسمته هاذة. || اشهر انواحه التريبية ما يتبع.

٢٩٥٨٢ - هاذة شرقية

Ampelopsis orientalis (S). *Vigne vierge du Proche-Orient* (F).

نوع من الهاذ التريبي. هذه الشرق الاوسط. جنته دغلية الشكل تملو من مترين الى ثلاثة امتار. اوراقها ريشية. وريقاتها تملو نحو ٧ سم. وتعرض نحو ٤. تصلها مالم البشرة على صفحية. ازهارها رباعية الاجزاء. ازهارها يستمر طول شهر آب.



هاذة كبيرة الورق

٢٩٥٩٥ - هَارِجَةُ الْمَاء *

Acrocephalus paludicola (S), *Phragmites aquatilis* (F),
Aquatic warbler (E).

طائر من الموزاج ، صغير اللد تطول نحو ١٤ سم . ظهوره
أخضر اللون يجلع بالأسمر . يطنه إلى البياض الخشن يعلو
تسليج اكعب || يألف ضفاف الأنهر والبحيرات
ويجوب البلاد في طلب المصيف والمشي .



هَارِجَةُ الْبَطْلَانِ

Geil de l'éléphant (E).

٢٩٥٩٦ - هَارِجَةُ

حي من الغزل .

Digestif (F).

٢٩٥٩٧ - هَارُوم ، هَضَام

Digestive (E).

هو ما له قوة الهضم التي تحول الاطعمة ويجعلها قابلة للتشبع
كالصناعات الهضامة ...

٢٩٥٩٨ - هَات - هَات ورق الشجر : سقط .



هَارِجَةُ الْقَصَب

٢٩٥٩٩ - هَاتِل * ٥

Alactaga (S), *Alactaga* (F).
جنس حيوانات ليلية قاضية من فصيلة البوميات . أنواعه
عديدة موطنها الشرق العربي ومصر والتركستان
والتيبت || شكله شكل الجرذ . طوله نحو ٢٠ سم . ذنبه
٢٧ . رأسه صغير اللد . عيناه كيرتان . اذناه مستطيلتان .

طول جوارحه الخلفية يبلغ أربعة أضعاف الامامية || قويه
الى الصفرة الرملية ويلبها موانج اصباح . يطنه الى البياض .
ذنبه سناني اللون اما الحلقه فبقا . يألف الاراضي
الطينية . جمره فسمه رحيه يمحها في عمق ٦٠ او ٧٠
سم . يغطي فيها بيانه الشوي : يمحها لفق طول منسرج
اما مخربها ففق مستقيم معتدل الانحدار || قوته المارد
التياتي على اختلاف أشكالها وانواعها || اناء تحمل
ثمانية اطباء ويقع من ٤ الى ٦ ادراس على ثلاث مرات
في السنة .



هَارِجَةُ الْمَاء

٢٩٦٠٠ - هَات ، هِيل ، هِيلُوا ، تَاتِلَة ،

شَوْشَمَة ، شَوْشَمِير

Anomum (S), *Cardamoms* (E).

جنس نباتات جلمودية طيبة عطرية برية وزراعية من
سبط الهاليات وفصيلة الزنجبيليات . انواعه عديدة جميعها
من نباتات المناطق الحارة || جذاميرها لبرية التركيب .
سوقها منتصبة عمادة الفروع . اوراقها لمدية
الانتساب متعاقبة . انهارها سليلية الجميع او حثولية .
ثمراها جراد ثلاثية الاضحية . بولورها كنعى حب الحال
يستخرج منها ادهان عطرية طيارة كانت في نفس
اشهر الطوبير المستصلحة في التحنيط || لبوب جذاميرها
وبلورها وادعائها هاضمة ومثبتة للقلب وبقرة الجسدية
مضادة للقتنج ، طاردة الرياح ، سكتة للمص وينارة
للغث .



هَاتِل

٢٩٦٠١ - هَال جَوَا ، قَاتِلَة مُجْتَمَعَة

Anomum maximum (S), *Cardamom allé de java* (F), *Java Cardamoms* (D), *Cardamom* (E).

نوع من الهال التايي الشائع الاستعمال . تكثر زراعتة في
بلاد جاوا . ساقه رقيقة ، اوراقه كبيرة اللد ، بولوره
جيدة الصنف وافرقة ادمان العطرية الطيارة .

٢٩٥٨٧ - هَادَّةٌ هَلَالِيَّةٌ الْوَرْق

Ampelopsis aconitifolia (S), *Vigne vierge à feuilles d'aconit* (F).

نوع من الهاذ الزنبقي . جنبته عارشة تطول من ٥ الى
١٠ امتار . فروصها دليقة ، جذوية السحاء في اول معدها .
اوراقها اصبيه الشكل لاقباسية التفريغ الذي يراوح
من ٣ الى ٥ ولا متساوية التسكم الذي يطول من ٥ الى
٨ سم . نصالحا ماله الصلصة ، عابقة الخضار : صنفه
الحالة . يزورها برفقالية اللون || انهارها يستمر طوال
شهر حزيران .

٢٩٥٨٨ - هَادَّةٌ يَابَانِيَّةٌ

Ampelopsis japonica (S), *Vigne vierge du Japon* (F).

نوع من الهاذ الزنبقي . جنبته عارشة تطول نحو ٧ امتار .
جلدها رافع السنع والاريدو . اوراقها كبيرة اللد ، لاقباسية
التفريغ السكي ، الذي يراوح من ٣ الى ٥ نصالحا حائق
الخضار اللامع || انهارها يستمر من ايار الى تموز .

٢٩٥٨٩ - هَارُوب

Déversoir (F), *Overflow* (E).

الفترة المدة لتصريف الفائض من المياه .

٢٩٥٩٠ - هَارَبَا ، هَارَبِي

Ashérine (F).

هو الحساس ، سمكة صغيرة اللد مأكولة ، اطله .

٢٩٥٩١ - هَارِجَةُ

Acrocephalus, Calamoherpe (S), *Rousserolle* (F),
Sedge warbler (E).

جنس طير من فصيلة اللخليات . انواعه المعروفة كثيرة
اتمد جميعها صغيرة اللد تتميز بانحنيتها المستطيلة الذرية
الاطراف . اذنانها رتاجية الريش غروبية الشكل .
مناقرها مستعرضة القاعدة ، مدببة اللادق || تألف
المنابع والضفاف والمقاصب والرياض . قوتها الحشرات
والحوام اصعبها الياسيب والتمر والبوس || اعرف انواعها
واشهرها ما يلي .

٢٩٥٩٢ - هَارِجَةُ الْبَطْلَانِ *

Acrocephalus palustris, Calamoherpe palustris (S),
Rousserolle verderolite, Verderolite (F), *Marsh warbler* (E).

نوع من الموزاج ، صغيرة اللد تطول نحو ١٤ سم . ظهورها
الى الطلعة الزرنيقية المبرج . بطنها الى الصفرة . زورها
الى البياض الاكدر . تألف الاماكن الرطبة والمخلة
وضفاف الماء . تدن في الخل وفي الشجيرات المتفرقة .
حسنتها يراوح من ٤ الى ٥ يضايت ترخها بمناورة الذكر
من ١٤ الى ١٥ يوما .

٢٩٥٩٣ - هَارِجَةُ السُّد

طائر من الموزاج يدهى ام لوح ، اطلها .

٢٩٥٩٤ - هَارِجَةُ الْقَصَب * ، حَتَفَج

Acrocephalus arundinaceus, Calamoherpe turdoides (S), *Rousserolle turdoides, Grive de rivière* (F),
Great reed warbler (E).

طائر من الموزاج . طوله يراوح من ١٩ الى ٢٠ سم .
ظهورها الى الصبغة الصفراء المبرج . بطنها الى البياض الاشعث .
زورها ابين اخضر . جوشها الى الكهبة المسنجة بالاسمر .
تجوب البلاد في طلب المصيف والمشي . تألف المقاصب
والاجام . تدن منها حل القصب . تبيض من ٤ الى ٥
بيضات تحضنها بمناورة الذكر نحو ١٥ يوما .

الفصيلة الباذنجانية، ساقه غليظة جارية اللون، ازهاره كبيرة القذ متراكبة اللون فيها الالوان البياض والاصفر والبرتقالي والاحمر والارزق. يزهر ذبذبة القذ مستديرة الشكل سنطية اللون تحتفظ بقوى انباتها نحو عشر سنوات.

٢٩٦١١ - **هالباي**، **هالباي** (E). **Amomum**
سبط من فصيلة الزنجبيليات، اشهر اجناسه الحار.

٢٩٦١٢ - **هالباي**، **هالباي** (E). **Haleisia**
Haleisia (S). Haldale, Haldale (F). Silver bell-tree, Snowdrop tree (E). Schneeglöckchenbaum (D). Aleisia (I).

جنس نباتات برية وتربيتين من فصيلة الاصطبركيات. انواعها ستة جميعها اشجار وغطيات متوسطة القذ. ساقها متعصبة متقاربة الفروع. اوراقها حاملة، مدققة، متعاقبة، تصلها يفيش الشكل مستن الحافة. ازهارها محورية الاركان، قمية التجميع، عديدة الاسدية، مستطيلة الزناد. ثمارها جراح مجتمعة || احرف انواعها واشهرها ما يلي.

٢٩٦١٣ - **هالباي**، **هالباي** (F). **Haleisia**
Haleisia diptera (S). Haldale à 2 ailes (F).
نوع من الهالباية التريبية. ثمرتها تملو نحو ١٠ سم. اوراقها بيضية الشكل تملو نحو ١٥ سم. وتعرض نحو ١٠ سم. نصلها جامد اللون، اخضر الصفحة العليا، خلى السفلى. ازهارها يضاء اللون تملو من ٢ الى ٣ سم. وتعرض من ٢ الى ٥ سم. ثمارها جراح ثنائية الجناح وشبه الشكل تملو من ٤ الى ٥ سم. || ازهارها يستمر من نيسان الى حزيران.

٢٩٦١٤ - **هالباي**، **هالباي** (F). **Haleisia**
Haleisia tetraptera (S). Haldale à 4 ailes (F).
نوع من الهالباية التريبية، ثمرتها تملو من ٥ الى ٩ امتار. اوراقها ايليبسية الشكل سنانة اقزام الاخير. نصلها جامد اللون، اخضر الصفحة العليا، خلى السفلى. ازهارها متدلية، ثلاثية التجميع، يضاء اللون، صغيرة القذ. ثمارها جراح رباعية الجناح مخروطية الشكل تملو من ٤ الى ٥ سم. || ازهارها يستمر من اذار الى ايار.

٢٩٦١٥ - **هالباي** (F). **Effraie commune**
هي البطة، اطلها ج. هام وعامات. قال ذو الرمة :
قد اصفت النازح المجهول مصفه
في ظل اخضر يدور حامة اليوم

٢٩٦١٦ - **هالباي**، **هالباي** (F). **Trayouse mécanique**
عدة مجهزة باريح شفافات تستخرج الحليب من صبرع البقرة وتقله الى رماء الحفظ الحكم البد.

٢٩٦١٧ - **هالباي** (F). **Marcascent**
Marcascent, Wichering (E).

نمت تعريفي يطلق حل كل نبات او جزء من النبات يكون في حالة الحن.

٢٩٦١٨ - **هالباي** (F). **Apical**
نمت تعريفي يوصف به كل عضو مركزة الذروة.

٢٩٦١٩ - **هالباي**، **هالباي** (F). **Hamelia**
Hamelia (S). Hamellia (F).
جنس نباتات برية وتربيتين من فصيلة الفويات. انواعها للمروعة ١٠، اصطناعا المناطق الاستوائية الامريكية. ساقها فروع. اوراقها متعاقبة، كاملة، سنانة النصل. ازهارها

٢٩٦٢٠ - **هال حبشي**، **هال حبشي** (S). **Amomum angustifolium**
(F). Madagascar cardamoms (E). Madagascar Cardamoms (D). Cardamomo maggiore, C. massimo (I).
نوع من الحار الزراعي الشائع الاستعمال في جزيرة مدغشقر. اوراقه مصفية النصل اللين. لبوب جذابه تابل مشهور. بلوره وافر المواد الدنية الطرية المتوسطة الصنف.

٢٩٦٢١ - **هال حبشي**، **هال حبشي** (S). **Amomum cardamomum**
(F). Cardamom (E). Cardamomen (D). Cardamome, Cardamomo, Amomo (I).

ويعرف ايضا بالمال المنقوي. نوع من الحار الجيد الصنف. تكثر زراحت في الهند الصينية. ازهاره عقودي التجميع. بلوره جيدة الصنف ثامنة الاستعمال وافر المواد الدنية الطرية.

٢٩٦٢٢ - **هال ذكر**، **هال ذكر** (S). **Amomum melegueta**
(S). Méleguette, Méliguette, Graines de paradis (F). Melegueta-pepper, Grain of paradise (E). Malagettapfeffer (D). Grana paradisi, Sami di paradiso (I).
نوع من الحار، تكثر زراحت في بعض مناطق افريقية الشرقية والوسطى. اوراقه مستطيلة النصل اللين. بلوره متوسطة الصنف والمواد الطرية.

٢٩٦٢٣ - **هال صغير**، **هال صغير** (F). **Eleteria cardamomum**
(S). Cardamomo petit (F). Bastard cardamon, Lesser cardamon (E). Kleine Kardamomen (D). Cardamomo minore (I).
نوع من الحار الجيد الصنف، تكثر زراحت في سريليب وميلبار. ساقه واوراقه صغيرة القذ. ازهاره سنبلي التجميع. بلوره وافر المواد الدنية الطرية الفاخرة الصنف.

٢٩٦٢٤ - **هال** (F). **Halo**
دائرة مضيئة تحيط بالقمر سببا انكسار النور الذي ينعكس بلورات الجليد المتصلة في اليوم النارية البعيدة. اما الدائرة التي تحيط بالشمس فتدعى طفاوة.

٢٩٦٢٥ - **هالوج**، **هالوج** (F). **Halogeton**
(S). Halogète, Halogeton (F). Salwort (E). Salzkraut (D). Alogeton (I).

جنس نباتات برية وزراعت من السرانيات واصله السريقات. انواعه ستة منها الاصباح والجنبايت. ساقها وفروها زياء الصاء. اوراقها لحمية متعاقبة. ازهارها فردية التجميع، محورية الاركان جميلة الشكل || اشهر انواعها الهالباية الزراعية المأكولة.

٢٩٦٢٦ - **هالوك**، **هالوك** (F). **Philipée d'Egypte**
(F). هو الطرثوث المصري، الحلب.

٢٩٦٢٧ - **هالوك**، **هالوك** (F). **Claudestine du Levant**
(F). هو الطرثوث الاحمر، الحلب.

٢٩٦٢٨ - **هالوك**، **هالوك** (F). **Orobancha caryophyllacea**
(S). Orobancha du guil-let (F). Clove scented broom-rape (E). Nelken-sommerwurz (D). Erba scalogna, Succiamela garofanato (I).
نوع من الجفيل يتطفل على الفالين وصل معظم نباتات



مال حبشي



مال حاما



مال ذكر



هالباي



هالباي



هبار انتلوس

- هبار اللم**
S. obscurus (S).
S. obscur (F).
هبار بودن
S. Budeng (S). *S. maure, Budeng* (F).
هبار جرماني
S. Gernani (S). *S. de Germani* (F).
هبار جونني
S. Johni (S). *S. des Nilagiris* (F).
هبار ديني
S. ursinus (S). *S. ourson* (F).
هبار شالب
S. saenx (S). *S. blanchêtre* (F).
هبار منقج
S. mitratus (S). *S. mitré* (F).
هبار ملايلوف
S. melalophus (S). *S. mélatophe* (F).

٢٩٦٢٥ - هَبَارَكَة
Scotocotrichum (S).
 جنس تطور بحيرية من همارة الزناشيات وفضيلة الضحيات.
 جره الكنيديئة اسطوانية قصيرة تعلوها كتلة صرطانية
 ضيقة الأسك ثنائية الخلية || أنزاع قليلة السدد
 ولاذني اعرفها هبارة التنبيليات .

٢٩٦٢٦ - هَبَارَة التنجيليات
Scotocotrichum graminis (S).

قطر مجهرى يركب بعض التنبيليات البرية والكلالية
 فيشوق الأوراق دون أن ينفذها || ظهوره الخاضعي يقع
 صغيرة تركب نصل الصف ثم تنقسم وتنتج فيبلغ طولها
 نحو ٣٠ م. تبدو شقراء اللون أو سمراء ثم تبيض بياضاً يبيض
 ستارها .

٢٩٦٢٧ - هَبَارِيَّات ، وَهَبِيَّات

Semnoptichidae (S). *Semnoptichidae* (F).
Semnoptichidae (E).
 فصيلة قريد من سفليات المنخرين تشمل أربعة أجناس :
 الهبار والحوبر والزيك والقطربوب .

٢٩٦٢٨ - هَبَالَش
Homola (S).
Homola (F). *Homola* (E).
 جنس حيوانات بحرية من القشريات عشاريات الأرجل
 قصيرات الذيل وفضيلة الهَبَالَشَات . أنواعها المعروفة عديدة
 منتشرة في جميع بحار العالم || أجسامها شبه مجنبة الشكل ،
 تطول من ٤ إلى ٨ سم. قوائمها مستطيلة ، قليلة التلافط
 باستثناء الزوج الأول للملفظي الأطراف ، الكثير التسنين
 أثنائك والزوج الأخير الذي يتمركز في كفتي الظهر
 والذي يتميز بالصغر واللقطة والشرائط الأطراف . ألوانها دائماً
 حراء اللون يعلوها مزيج براوح من الصباني إلى الجلودى ||
 لحومها مأكولة .



هَبَالَش

٢٩٦٢٩ - هَبَالَشِيَّات
Homolidae (S).
Homolidae (F). *Homolidae* (E).
 فصيلة حيرانات بحرية من القشريات عشاريات الأرجل
 قصيرات الذيل ، حاملات القوائم . أجناسها وأنواعها
 عديدة منتشرة في جميع بحار العالم || جميعها مستطيلة القد
 الذي براوح من ٤ إلى ٨ سم. تتميز بصر وصر الزوج
 الأخير من القوائم الذي يتمركز في كفتي الظهر || أشهر
 أجناسها وأهمها انتشاراً الهَبَالَش .



هَبَال

٢٩٦٣٠ - هَبَال ، وَهَبِيَّات ، مَرْمُوزَة
Hapale (S). *Oulstii*, *Marmoset* (F). *Marmoset*, *Oulstii* (E).
 جنس قريد أمريكية من فصيلة القريد اللدبية . أنواعها ٧
 موطنها حوض الأمازون والأندلس الجابرة || أجسامها
 صغيرة القد ، مجنبة الشكل ، مستطيلة الشعر الناعم

كبيرة القد ، مجنبة الشكل ، سنبلية التجميع ، تاجية
 الارتكاز . ثمارها نووية غير مأكولة || أشهر أنواعها
 الماليليا الزرقاء الورق ويسمونها قاتلة الجرذان ، أنزاعها
 حراء اللون ، ثمارها حسامية المادة تقضي على الجرذان .

٢٩٦٢٠ - هَبَار ، وَهَبِيَّات ، قَرْدُ مَلْدَس
Semnoptichus (S). *Semnoptichus* (F). *Solemn*
spes, *Simpal* (E).

جنس قريد من فصيلة الهباريات تدعى القريد المقدسة
 لأن الهندي لا يمسها وقد يعلونها || ألوانها كثيرة العدد .
 أجسامها رقيقة ، مجنبة ، متوسطة القد . أذنانها مستطيلة .
 أنوارها لامة الشعر . جباهها مكللة بمخار من الهلب الاسود .
 موطنها الهند وجوارها . أقلها يمتد من الشط إلى ارتفاع
 ٤٠٠٠ م. || تعيش على الأشجار . قوتها المواد النباتية
 من الثمار والبزور والجلود إلى البراعم والنباتات || ألتها
 تنصع من جرور إلى جرون || أشهر أنواعها ما يتبع .

٢٩٦٢١ - هَبَارِ أَنْتَلُوس ، قَرْدُ الْهِنْدِ الْمَلْدَس
Semnoptichus antelus (S). *Semnoptichus* *antelle*, *Entelle*, *Singe saint des Hindoux*, *Houlemar*,
Houlemar, *Mandi*, *Mabus* (F). *Manuman*, *Hoonu-*
man, *Entellus* (E).

نوع من الهبار ، جسمه يطول نحو ٦٥ سم. وذنبه ٩٦ سم.
 ثوبه أبيض اللون ، مستطيل الشعر . وجهه أسود البشرة .
 حنجر جهته أسود الهلب المنتصب || موطنه شمال الهند
 حتى حدود الهند والبنجاب . يعيش جماعات متوسطة العدد .
 يغفل النباتات والأعراج الظليلة على مجاري الماء .
 يقترب من الناس والحيوانات الأليفة || قوته الثمار والحبوب
 يأكلها أينما كانت .

٢٩٦٢٢ - هَبَار حَمَلَايَا
Semnoptichus schistaceus (S). *Semnoptichus* *de l'Himalaya*, *S. ardois* (F).

نوع من الهبار . جسمه يطول نحو ٦٥ سم. ثوبه إلى الرقبة .
 شعره كثيف وطويل . ظهره عايق اللون يعلو مزيج جلودى .
 وجهه أسود البشرة . حنجر جهته أسود الهلب المنتصب .
 أذناه صغيرتان . ذنبه يطول نحو ١٠٠ سم. وينتهي بقصبة
 شظية . موطنه حاليها وبلاذ الكشمير . أقلها يمتد من
 ارتفاع ٢٠٠٠ إلى ٢٩٠٠ م.

٢٩٦٢٣ - هَبَار دُوك ، هَبَار لَيْسَس ، دُوك
Semnoptichus nemaus (S). *Semnoptichus* *douc*,
Douc (F).

نوع من الهبار ، جسمه يطول نحو ٥٠ سم ، ثوبه متباين
 الألوان . رأسه وأطراف يديه ورجله سود . وجهه أصفر .
 عنقه وساعده وفخذه إلى الجفوة . ذقنه وصدره وذنبه يبيض .
 بطنه أبيض . ظهره إلى الرقبة || موطنه غابات الكوششين
 جماعاته كثيرة العدد ، مؤذية ، تتلف كل زراعة
 تصل إليها .

٢٩٦٢٤ - هَبَار فَيْرِي
Semnoptichus phayrei (S). *Semnoptichus* *de Phayre* (F).

نوع من الهبار ، جسمه يطول نحو ٨٠ سم. ثوبه رمادي
 اللون ، عايق الظهر . رأسه حري الشعر الأصفر . بطنه
 وبطن يديه ورجله إلى البياض الأخير . كفاه إلى
 اللقطة . ذنبه أبيض اللون ، أسمر الطرف . يطول نحو ٧٦
 سم || يألف النباتات الكثيفة الأشجار وأجام الخيزران .
 قوته الثمار والحبوب والبزور والجلود .
 من أنواع الهبار المعروفة تخص بالذكور :

يلوه يتقيج تبي وزركشة كستنية ورشة طحلاء. روشناها الخلفيان الى الخطي الاطحل. حناها الكلف. اعداها الى الشقة || لها جيل واحد في الحول. تظهر القروا في ايار ويقي حتى تموز. تسرح في الليل. تعاطل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتتمتع الممكن لطحا لانتالة الحمر على الصفحات السفلى من نعال الارواق || السرة عند بلوغها الكال تطول نحو ٢٧ سم. جسمها شبه اسطوانة الشكل مستطيل المقدم، مستدق المؤخر. ثوبها الى الطحلة السمره يعلوها تجاميع مغرغرة اخضر اللون عند حل الجانبين من السكة البطنية الثالثة الى التاسعة. رأسها شديده السمره ومدنها ورواجها || طول الاكامل الذي يستمر من ٣٠ الى ٣٢ اوجوا يتقضي ضمن غلاف رقيق شفاف في الجفالة او تحت الارواق الساقطة.

Hoplipteronus (S). هَبْرَس ٢٩٦٤١ -

Hoplipteron (F). Hoplipteronus (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات ممديات الارجل وفضيلة الاوليبيات. انواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها بحار الصين || اصداها صغيرة لناعمة، مردنية الشكل، مغلزنة، بمنجحة الغالب، زاهية الالوان الفاتحة.

Matthiola graeca (S). هَبَس ٢٩٦٤٢ -
Matthiola maritima (F).

نوع من المتطور البري، نبات عشبي بري معمر من فصيلة الصليبيات. منبتة تهاج حوض البحر الابيض المتوسط. من اليونان الى لبنان || ساقه منتصبه قروا تملو من ٣٠ الى ٧٥ سم. اوراقه متناقية، سنائية النصال الضيقة الزيادة. ازهاره عقودية التجميع، طرفي الارتكاز. ازهاره ذكية العرف عديدة الالوان منها الاحمر والبفسجي والوردي والابيض والاصفر || تنويره يستمر من اذار الى تموز

Hypsipetes (S). هَبَسِيَت ٢٩٦٤٣ -
Hypsipète (F). Hypsipates (E).

جنس طير من الجواثم سنيات المتابير وفصيلة الكيتيات. انواعها المعروفة نحو ٢٠ موطنها يمتد من الهند الى الصين وبعضها يعيش في الحيشة وندفسكر. ملجئها الحيائي جماعي. جماعتها قليلة العدد. تألف الغابات وفضاف بجاري الماء. قوتها الحشرات المختلفة والحوام || اجسامها صغيرة قريبة الشبه بالبلابل، اطوالها تتراوح من ١٧ الى ٢١ سم. رؤوسها معتدلة الحميم. متاقيرها مخززية ذرية. اجنتها ذلفة. اذناها مستطيلة، فاقرة الاطراف. اوزنها تختلف مع الانواع يكثر فيها الاسود الاسم الابيض والكسني الاشبح والرماذي الازرق المواج ... || تدلن اعاشاها في الاجمار الريفية القريبة من مجاري الماء. اناثها تحسن من ٤ الى ٦ بيضات حل مرئين في الحول. الذكر و تتناب مع الاناث في الحفن.

Ane noir (F). Black ass (E). هَبَج ٢٩٦٤٤ -
هو الخمار الاسود.

Strelitzia (S). Strelitzia (F). هَبَل ٢٩٦٤٥ -
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الموزيات. انواعها المعروفة ٦ جميعها من نباتات البلاد الحارة. سيقها ليفية متراكبة الانابيب. اوراقها معتقة، كبيرة القد، ثنائية التصفيف، متقابلة النصال. جرشها خشوية. تردد للزئين || اشهر انواعه ما يلي.

الريو. رؤوسها مستديرة. اذناها مروحية الور. اذناها مستطيلة جتلة || جميعها شامية تألف الغابات والاحراج البعيدة والقريبة من الممران. قوتها التار والحشرات. اعلاها هنية، رضية. تألف حياة الدجين وتتملق باصحابها.

هَبَال ٢٩٦٤٦ -
شمر تملل منه السهام. الواحدة هائلة.

Ecorces sèches (F). Dry peels (E). هَبَايَة ٢٩٦٤٧ -
حياة الشجر : قشرها الناشف.

Legs (F). Legacy, Bequest (E). هَبَا ٢٩٦٤٨ -
هو كل محبوب في وصية مكتوبة.

Broussin (F). هَبَج ٢٩٦٤٩ -
ردم يمتري طلاء سوق واغصان واغناد الشجر، سببه الصقح او يفسى الجرائم.

Graines de colocynthe (F). هَبِيد، هَبِيد ٢٩٦٥٠ -
Seeds of the colocynth (E).
هو حب الخنظل الواحدة هيبية.

Filasse (F). هَبَر ٢٩٦٥١ -
هو المشاقة، اطليبا.

Diacope rivulata (S). هَبَر ٢٩٦٥٢ -
سحكة من الشطف وفصيلة النرجسات. جسمها كبير القد مبطل الشكل. طولها يراوح من ١٠٠ الى ١٢٠ سم. وعرضها من ٤٠ الى ٤٨ سم. ثوبها الى الزرق البفسجية المواج. سطحها مسطح العلم مغرور فيه. اعلاها فسيحة الاجزاء تحت من البحر الاخر الى بحار استراليه.

Haberlea (S). هَبَرِيَة ٢٩٦٥٣ -
Haberlée (F). Haberlea (E).

عشبة صغيرة معمرة من فصيلة الجستريات. منبتها يمتد من الشرق الادنى الى اللقان. ترضب في المواقع الصخرية. ساقها جدعة. جمرعها الزهري يملو من ١٠ الى ١٥ سم. اوراقها اعليجية مقنطرة. نصالها جلدية مسننة المختار. ازهارها ليلكية تطول نحو ٥ سم. قطرها ٤ سم. بتلاتها خلية || تنويرها يستمر طول شهر حزيران.

Habrosta (S). Habroste (F). هَبَرَوِيَة ٢٩٦٥٤ -
جنس نباتات عشبية حولية برية من فصيلة النورانيات. انواعها المعروفة قليلة العدد منبتها بعض اصفاق حوض البحر الابيض المتوسط || سيقها نخلة قروا. اوراقها صغيرة، متعاقبة، شبه عرطية الشكل. ازهارها صغيرة وردية اللون. تنويرها رديي.

هَبَرَوِيَن اُسْبَد ٢٩٦٥٥ -

Habroayne derass (S). Habroayne rasé (F). Habroayne derass (E).

حشرة من فصيلة الشريقيات ورتبة حشرغيات الاجنسة. موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اروب. فراشها جارسه قريبا رقيق الازهار. سمرتها تعيش على اوراق النوج || جسمها وشي الشكل يطلو نحو ١٢ سم. بسطتها نحو ٣٨ سم. رأسها اسمر اللون. عينها كبريتان. زيانها عيطان. مشغها مسطيل ملتف. جرشها وبطنها الى الخطي الاسمر الى روشناها الاساميان الى الخطي الاسمر



هَبَايَة



هَبَر



هَبَس



هَبَل



هَيْبَل



هَيْبَل



هَيْبَل

وانواعها المرفقة عديدة منتشرة في معظم بحيرات ومناطق وأهوار البلاد المتعددة الحرارة || أجسامها صغيرة ، شبه بيضية الشكل ، مدببة الخصر ، طولها من ٢ الى ٥ سم . رؤوسها صغيرة ، مستعرضة ، هيونها ناشرة . قرونها الاستشعارية غشائية مركبة من حشر فصل . كواسلها عميقة ، مستعرضة . الحامدا لاسحة ، نحيلة التمديد . قوائمها نشطة || جميعها مفرقة وعشاقية . تعيش بين النباتات المائية قرب الشواطئ وعلى الصفات في فصل الصيف || أشهر أجناسها الهليل .

٢٩٦٥٣ - هَيْبَلِيَّة (Habenaria) (F). هَيْبَلِيَّة (Habenaria) (S).
جنس نباتات شدية معمرة من فصيلة السحليات . أزهاره نحو ٤٠٠ منظمها أمريكي المنبت . أقاليمها المناطق الحارة والمعتدلة . بعضها زراعي زينة . أشهرها الهيباترية الثنائية النصل .

٢٩٦٥٤ - هَيْبَلِيَّة ثنائية النصل ، وَكُونْدِي (Habenaria bifolia) (S). هَيْبَلِيَّة (Habenaria bifolia) (F). Butterflies orchids, Fringed orchids (E). Kleine Ständelwurz (D). Orchide bianca (I).
نبات عشبي زينة معمر . جلوهه ديدية شديدة الشكل . أزهاره قرصية متطابقة ثنائية النصل . أزهاره جميلة الشكل ، يبيض اللون ، متطابقة التجميع ، ترتكز على سراج قوسي الانتساب .

٢٩٦٥٥ - هَيْبَلِيَّة (Hypnum) (S). هَيْبَلِيَّة (Hypnum) (F). Feather moss (E). Astmoss (D). Ipne (I).
جنس نباتات طحلبية من العريشيات . أنواعها المرفقة نحو ٧٠٠ ، بعضها نحيلة مدادة متفرعة . أزهارها دقيقة متراصة متتابة تلحف السوق بكاملها || وهي تعيش وتتمدد في التراب وعلى الصخور وطولج الانجراس . تستعمل للزينة خاصة في سر الآلات الخفيفة والبلورية ولقائمتها من الكر .

٢٩٦٥٦ - هَيْبَلِيَّة (Hippomyx) (S). هَيْبَلِيَّة (Hippomyx) (F). Hippomyx (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات مدبات الاربل امايات الخياشيم وحيدات الاجهزة وفصيلة الهيباترية . انواعها المرفقة قليلة العدد اعطائها بعض مناطق المحيط الهادي . بعضها يعيش على الاصداف المهيضة والبعض الآخر على الصخور || اصداؤها غروطية وحيدة المصاريع قرينة الشبه بالقرن القصير المنحني للجب الطرف . اجسامها بيضية الشكل . رؤوسها مكورة . نواصها غروطية . هيونها كبيرة ترتكز على قواعد الارواس . خياشيمها نظامية . ارجلها وحيدة كبيرة محمية .

٢٩٦٥٧ - هَيْبَلِيَّات (Hippomyxidae) (S). هَيْبَلِيَّات (Hippomyxidae) (F). Hippomyxidae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات مدبات الاربل امايات الخياشيم وحيدات الاجهزة . اجناسها وانواعها المعاصرة المرفقة قليلة العدد . اعطائها بعض بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . تعيش قرب الشواطئ || اصداؤها قرينة الشبه بالحافر وبالقرن القصير . سقاط الصدفة يتطور مع العمر فيصبح كالنفساء || اعرف اجناسها واشهرها الهيباتية والحورلة .

٢٩٦٦٦ - هَيْبَلُ الْمَلَكَةِ (S). Seralitza regina (S). Seralitza de la reina (F).
نوع من الهبل الزينة ، يطو من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم . أزهاره مستطيلة الاذنق . نصلها جامد الصلبة المنتمية الاطراف ، لونه الى الخضار البحري . أزهاره كبيرة اللد ، ذمية الفصل ، مستقيمة البتلات .

٢٩٦٦٧ - هَيْبَلُ صَغِيرُ الْوَرَق (S). Seralitza parvifolia (S). Seralitza à petites feuilles (F).
نوع من الهبل الزينة ، يطو نحو ١٢٠ سم . أزهاره اسلية الشكل ، عادية الساق ، عابقة الخضار . أزهاره متصلة اللد ، ارجوانية الفصل ، بتفسجية البتلات .

٢٩٦٦٨ - هَيْبَلُ قِصْرِي (S). Seralitza augusta (S). Seralitza augusta (F).
نوع من الهبل الزينة ، يطو من ٣ الى ٦ امتار أزهاره كبيرة اللد معتدلة . اعطائها تطويل من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . ونصلها من ٦٠ الى ١٠٠ سم . وهي اعطالية الشكل ، قلبية القاعدة ، شديدة الخضار المايق . أزهاره كبيرة اللد ، يبيض اللون .

٢٩٦٦٩ - هَيْبَلُ (Lévrier) (E). Greyhound (E).
من للكلاب السلوي او السلاقي ، مستطيل الجسم الخفيف . يتميز بخصه وبسرعة عدوه . يستعمل في صيد النزال .

٢٩٦٧٠ - هَيْبَلُ (Hapaloderma) (S). هَيْبَلُ (Hapaloderma) (F).
طائر وحيد الجنس والنوع من المتسلقات وفصيلة الطيرغويات موطنه بعض مناطق افريقية الحارة . يأنف الغابات الرطبة . ملجته ارجالي زوجي . قوته الحشرات على اختلاف انواعها وبعض آثار الغنية || جسمه متوسط اللد ، يطو نحو ٣٢ سم . ثوبه الى الخضار اللهي المواج . زوره وبدي اللون . بطه الى الشهية . يتميز بكثافة سياه وبكر ذنبه الذي يشبه المروحة . جناحاه معتدل الطول ، ذلقا الاطراف || يدخن عشه في صدور الانجار الحرة . الاثنى تحضن نحو اربع بيضات على ثلاث مرات في الحول . الذكور يولن لها الغذاء .

٢٩٦٧١ - هَيْبَلِيَّة (Halipius) (S). هَيْبَلِيَّة (Halipius) (E).
جنس حشرات مائية مفرقة من فصيلة الهليلديات ورتبة غمديات الاجنحة . انواعها المرفقة نحو ٥٠ منتشرة في معظم مناطق البلاد المعتدلة الحارة والباردة || اجسامها صغيرة ، شبه اعطالية الشكل ، مدببة الخصر ، تطويل من ٣ الى ٥ سم . رؤوسها صغيرة ، مستعرضة . هيونها ناشرة . قرونها الاستشعارية غشائية . كواسلها مكورة ، لاسحة ، شبه مبنية الشكل ، نحيلة التمديد . قوائمها نشطة . اثارها مبنية || تألف المنافع والبيضات التي تكثر لها الاصاب المائي . قوتها كل ما تستطع تصه من دوبيات .

٢٩٦٧٢ - هَيْبَلِيَّة (Halipidae) (S). هَيْبَلِيَّة (Halipidae) (F). Halipidae (E).
فصيلة حشرات مائية من غمديات الاجنحة . اجناسها

Hétéroplode (F).
Heteroploid (E).

نمت تعريف يطلق على الاجهزة المضوية الانكسائية المنطش.

Antherozoides (F).
Antherozoides (E).

هي عنصر الاخصاب الذكري عند معظم النباتات. وهي التي بالتحامها مع العنصر الانثوي تكون البويضة المخصبة والاستمرار.

Rainette (F).

هي الشفدع، الحظية.

Cercopithecus (S).
Cercopithecus (F). Tailed ape, Leslopyge (E).

جلس قرود ذيلية من فصيلة المجربيات. أنواعه المعروفة ٤٤، موطنها اسراج وغابات القارة الافريقية. جميعها صغيرة القامة، ورشيقة القوام، مستطيلة الذناب، قصيرة الاربعة، وسيدة الاضواء. اثناها زاهية الالوان يكثر فيها التوضيح. تعيش على الاشجار، قوتها اثمار والحبوب والجلود. جماعاتها متوسطة العدد. اثناها تقنع جروا واحداً رضعه نحو ٦ شهور || اعرف انواعها واشهرها :

Cercopithecus patas, C. ruber (S). Cercopithecus patas, Singe rouge (F). Patas (E).

موطنه بعض اسراج وغابات افريقية الشمالية. ظهوره واطلاءه وضخاه وساعده وذنبه الى الصهوة الجلوية. يطنه وبوامن قوامه الى البياض الاطمل. وبجبه واذاؤه سود.

Cercopithecus callitrichus (S). Cercopithecus callitrichus, Singe vert (F). Green monkey (E).

موطنه ضفاف النيجر. جماعاته كثيرة العدد. ثوبه الى الخضار الزيتوني. يطنه الى البياض الاخضر. وجهه اسود اللون، حنجره بيضاء. ذنبه اصفر المذهب.

Cercopithecus pygerythrus (S). Cercopithecus ver-vet, Vervet (F). Vervet (E).

موطنه افريقية الجنوبية. جماعاته متوسطة العدد. ثوبه الى الخضار الاصفر يملوه موج اصفر. يطنه وحسار وجهه الى البياض الاصفر.

Cercopithecus cephus (S). Moustac

موطنه الغابات القائمة بين الدانوب والكنغو. ثوبه الى الصهوة، رأسه زيتوني اللون، وبجبه الى الزرقعة السوداء، حنجره ابيض. كفه اسود. ذنبه اربد اللون، اسر المذهب والظرف || اخلاقه رضية هنية. وهو سريع الالتفات والسيان.

Cercopithecus brazzae (S). Cercopithecus de Brazza (F). Brazza monkey (E).

موطنه مناطق بحيرات الكونغو. جسمه رشيق القوام يملو نحو ٧٠ سم. وذنبه ٧٥ سم. ثوبه الى الصهوة. حنجره تاجي الشكل سنانى المقدم، اسره المنحصر. يذاه ورجلاه سود. طرف فخذها الخارجي ابيض اللون. يذاه عند من حدود الساق الى الجمارة. ذنبه اسود لامع.

تخلدها على ضفاف مجاري الماء. قوتها المواد المضوية المنحلة والعيان وكل ما تستطيع قصه.

Abolboda (F).
هَتَلَى *

جلس نباتات جلومورية برية وزراعية ترابية. انواعها المعروفة قليلة، منها مناطق البلاد الحارة. اوراقها اسلية الشكل، جلدية الانتصاب. ازهارها غشائية ينتهي بزهرة خشوية، ثلاثية التويجات وبساتل. ميسها ثلاثي المسكن. عديد البويضات. بتلات ازهارها بيضاء اللون او وردية.

Hottonia (S). Hottonia (F).
هَتُولِيَّة *

جلس نباتات مائية من فصيلة الاريديات. انواعها قليلة. اوراقها مركبة ريشية مستطيلة الاعتناق توضع على صهوة الماء. ازهارها عتيقية التجميع طرفي الزنكاز. ازهارها خاسية التركيب || اشهر انواعها واعما زراعة المختبرية المنغمية.

Hottonia palustris (S). Hottonia des marais, Mil-lefeuilles aquatique, Plumeau, Giroflée d'eau (F). Featherfol, Water gillflower, Water violet (E). Wasserfeder, Feder-Garbe (D). Garofano d'acqua, Erba militare, Penne d'acqua (I).

نوع من المختبرية. يكثر ويبيدها في المنطق والماء الراكة. تزوح في اسواق الماء القزوين. ازهارها بحية الشكل. بتلاتها حر الصفة صفر القاعدة.

Houttuynia (S). Houttuynia (F).
هَتُولِيَّة *

جلس نباتات طرية جلومورية زخافة من فصيلة الصرويات. معقولة التعريف على اسم العلامة الدانوكي هوتون. انواعها المعروفة قليلة، منها بعض اصناف آسية الشرقية، تعيش على ضفاف مجاري الماء. سوقها تحميلة حولية تملو من ٢٠ الى ٥٠ سم. اوراقها معتقة متعاقبة، تصلا قلبية الشكل. منطب المصقة، بارز المروق، حشوي الصفة السفلى. ازهارها سبلي التجميع. ازهارها صغيرة القذ شراة اللون، عصاره جلومور سرفقة الطم. اوراقها مغطاة.

Sphenodon punctatus (S).
Sphenodon, Hatteria (F).

حيوان يروض وحيد النوع والافصيلة من رتبة مغطيات البروس. موطنه جزر زيلندا الجديدة || شكله شبيه بالظاء، اما الهانز النوزي والجمهوري يكتمان في التركيب وفي القذ. جسمه يطول نحو ٧٠ سم. جلده مغطى القليل ويملو في قذ رأسه وفي ثبع ظهوره وذنبه حروف فضروني التركيب سنان كالنشار. رأسه مكمل المنطقة الصدفية من الرأس مغطية التركيب. يطنه مغطى بالاضلع. مديه مغطى بزحف جلدي. ذنبه مستطيل، قابل التجديد عند الانفصال. قوامه نشيفة. خاسية الاصابع المقيدة بحظاظ قادمي. غلايه حادة الاطراف المصنة. اسنانه شارقة ومرتزة في الحافة الخارجية من الفك الاصل || الاثني اسن قدامي الفك واسمى بطنانه. ثلثي من ١٠ الى ١٢ شلقة في سفرة بين الصخور التي ترتادها برفقة طيور البحر. ينفق الشلق بعد وضعه بنحو ٤ اسبوعا || يسرح في الليل. انتقاله سريع الحركة في البر وفي الماء || قوته السطاع والقضاد والديدان والقواض الصغيرة.



هتل



هتونية



هتيرة



هيجرس احمر



هيجرس اخضر

٢٩٧٠١ - هجرس الغاب * تستنس

Cercopithecus pyrrhonotus (S). *Cercopithèque nisanis* (F).

موطنه افريقية الشرقية اصحابها الصموال وكردفان ودفور. ثوبه سوي اللون الاصهب الصنابي. حمار وجهه الى البياض الاخير || وهو من القرود الشديدة الحذر المكيدة، التي تقتبس العلم ببطء ولا تلسي .

٢٩٧٠٢ - هجرس ديانا *

Cercopithecus diana (S). *Cercopithèque Diane* (F). *Diane monkey* (E).

موطنه ليبريه والكنكو . ثوبه جميل الالوان . ظهره ارجواني. يملته الى البياض الاخير . ساعده وضداه سود الطاهر ، صفر البطن . اما الذكر فيتميز بجوارحه الاسود وبلحمته وسباله البهيش .

٢٩٧٠٣ - هجرس سبأ * ، شادي ، هيتنج ، طوت

Cercopithecus saabaus (S). *Cercopithèque de Saba, Grivet, Tota* (F). *Grivet* (E).

موطنه افريقية الشرقية يكثر في الحبيشة وسنار وكردفان . جسمه صغير القدر ريع انتفاطع . ثوبه الى الخضار الماين . قوائمهم وذنيه موشمة بالابيض . وجهه واذناه سود .

٢٩٧٠٤ - هجرس سكتسار ، سكتسار

Cercopithecus talapoin (S). *Talapoin, Mitopithèque* (F).

موطنه الغابون . ثوبه كثيف الشعر الناعم . ظهره الى الخضار الاصفر . يملته الى البياض الاخير . حمار وجهه تبري الشكل ، ابيض اللون || اخلاقه هتية رضية . يقتبس العلم بدهن نفور واخراج .

٢٩٧٠٥ - هجرسيات ، قورود ديبالة ، قورود

Cercopithecidae, *Lastopygidae* (S). *Cercopithecidae* (F). *Cercopithecidae, Lastopygidae* (E).

الهجرسيات والهجراين فصيلة قورود من سلالات المنخرين تشمل ستة اجناس الهجرس والحويد والمالك والشهم والقشة والقرود .

٢٩٧٠٦ - هجسين

Mécis (F). *Cross-bred* (E). هو في الحيوان تاج التجين اي الاسفاد بين سمولين من نوع واحد ولكن من سلالات مختلفين .

٢٩٧٠٧ - هجين

Hybride (F). *Hybrid* (E). هو في النبات نتيجة تلج زهرة بطلع زهرة اخرى من نوعها اما من غير سرها او سرها . وهو يدعى هجلاجا

٢٩٧٠٨ - هدياب *

Parnassius (S). جلس سفرات فراشية من حمارة اللثانيات . اكواوه عديدة جميعها متوسطة القدر ، بسطها تراوح من ٥٥ الى ٦٥ سم . اجسادها اسطوانية مهدبة . رواشها مستعرضة مستديرة ، لونها الى البياض الاخير يملؤها تمشيع ليكي وتتميز اطرافها بتمشيع اسود وافر || تظهر في اوائل الصيف تمتع مكثها على نباتات فصيلة الهلدات فينتفخ من رقات مغلفة خضرة جوزية اللون حلية الجسم مهدبة بالحلب القصير ومنطقة بالاحمر .

٢٩٧٠٩ - هدياب الجرود *

Parnassius montivagus (S). *Parnassien des montagnes* (F). *Mountain Butterfly* (E).

حشرة من فصيلة الفراشيات ورتبة حرشيات الاجنحة . موطنها بئس جبال الشرق الاذن . فراشها واثمة قوتها رقيق الازهار . سرها تمشيع على اوراق اشطريون والهلدات || جسمها متوسط القدر يطول نحو ١٧ سم . بسطها نحو ٥٥ سم . رأسها اكبه اللون . عينها نادراتان . زياتها صولجانيان . جوشها الى الشبهة السوداء اللوح . يملتها الى الشبهة الرصاصية القفصية الحراج || رواشها عند الشقين الى البياض الاخير يملؤها تمشيع اريد وليكي وتتميز اسر وتبيج اسود || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في اواخر الربيع تسرح في التبار . تماثل يده ظهورها بنحو اربعة اسابيع وتمتج المكن محاديا على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || الفترة عند بلوغها الكمال تطول نحو ٣٢ سم . جسمها مغلق الشكل . ثوبها الى السرة الجوزية تملؤها ثلاثة خطوط سود قاطبة وتنقبط جانبي احمر واصفر . قشورها كثيف الخمل والحلب القصير . رأسها اسود . فكانا نشطان . رواشها وبديها الى الربعة السوداء || طور الاكمال الذي يستمر من ٣٢ الى ٣٤ اسبوعا ينتفيش ضمن صلبة نبتة التنج .

٢٩٧١٠ - هدياب

Filaridae (F). *Filaridae* (E). ردف من كيدان السلكية الوليدة . تتميز باجسامها الدقيقة التحلية الحليطية الشكل . انواعها عديدة تعيش في الاجسام الحية فؤفؤها وقد تميتها . اغلب هدياب .

٢٩٧١١ - هدياب * ، فيلاريات ، عوركة

Filaria (S). *Filaira* (F). جنس ديدان سلكية من الهداب . انواعها كثيرة العدد تصيب الانسان والحيوان . جميعها دقيقة الجسم النحيل ، غشبية الشكل، مستطيلة، تعيش في الجهاز الدوري وفي التسج الضام تقبب اضطرابات حتلة واختلالات داخلية قد تكون سببا للموت || اعرف انواعها ما يتبع .

٢٩٧١٢ - هدياب الخيل

Filaria equina (S). *Filaire du cheval* (F). نوع من الهداب تطول من ٤ الى ١٢ سم . تصيب الخيل وانواعها والحير . تتركز في الغشية البطة . تسبب بعض الاضطرابات الداخلية فلما تكون وشية الماتية .

٢٩٧١٣ - هدياب الدبع

Filaria lacrymalis (S). *Filaire lacrymale* (F). نوع من الهداب تطول من ١٠ الى ٢٥ سم . تركب البقر وتعيش في مجاري خدد الدبع تسبب التهاب ملتصقة . يقضي عليها باستئصالها .

٢٩٧١٤ - هدياب الطيباء

Filaria cervina (S). *Filaire des cervidés* (F). نوع من الهداب تركب الطيباء والايالي في نسجها الضامة . طولها يراوح من ٣ الى ٥ سم .

٢٩٧١٥ - هدياب الكلب

Filaria immitis (S). *Filaire cruelle* (F). نوع من الهداب تطول من ٢٥ الى ٣٠ سم . تركب الكلب وتعيش في الجهاز الدوري وتنتشر في بطن القلب الايمن . يكثر وجودها في الصين واليابان وفي ايطاليا واليونان .



هجرس الغاب



هجرس ديانا



هجرس سبأ



هدياب



هدياب الجرود



هدياب

Cloporte commun (F). - **هَدَبِيَّة** - ٢٩٧٢٥

رايح حمار قيان .

Fulcre - **هَدَبِيَّة** - ٢٩٧٢٦

هي غويوط جهاز التناسل في فطر الازمديات .

٢٩٧٢٧ - **هَدَبِيَّة** طائر (السان) .

Tigre mâle (F). He-tiger (E). - **هَدَبِيَّة** - ٢٩٧٢٨

الهدبيس البر الذكور عنه بلوغه كامل النشاط .

Cillés (F). Cilla (E). - **هَدَبِيَّات** - ٢٩٧٢٩

شعبة من التقييمات من الحيوانات الدنيا الالوان .

Thysanoptéroïdes - **هَدَبِيَّات الجناح** - ٢٩٧٣٠

طبقة حشرات من شعبة المليئات تشمل رتبة واحدة تسمى هدية الاجنحة ، اجناسها وانواعها زهاء ١٠٠٠ تجسمها حدة فصائل .

Thysanoptères (F). - **هَدَبِيَّة الاجنحة** - ٢٩٧٣١

Thysanoptera (E).

رتبة حشرات من طبقة هديات الجناح . فصائلها واجناسها وانواعها كثيرة العدد . اجسامها صغيرة دقيقة يصعب تمييزها بالعين المجردة . اضطرابها غروية الشكل . امتلاكها ثمانية ماصة . قرونها الاستشعارية عديدة العقل التي تراوح من ٦ الى ٩ . اجنسها عند وجودها هدية التركيب مستطيلة . اولياها سوية الالوان منها الاسفر والاسمر والكتني والاسود || حشراتها الكاملة ورفقاتها تركيب العديد من النبات . قوتها الخفية والنفس وعصارة الحلايا || اشهر حشراتها الخريسي .

Thysanoures (F). - **هَدَبِيَّة الاذنان** - ٢٩٧٣٢

Thysanura, Bristle-tails (E). Borstenschwänze (D).

طائفة من الحشرات المذبة المدعمة الجناح . فصائلها واجناسها وانواعها كثيرة العدد تجتمع الى ربتين رتبة لاطئات المنك ورتبة ظاهرات المنك .

Hydrines (F). - **هَدَرَات** - ٢٩٧٣٣

هي الهدارات ، رتبة حيوانات مائية من المحفوفات .

Hydra (F). Hydra (E). - **هَدَرَة** - ٢٩٧٣٤

المهدة في المدار ، جلس حيوانات مائية من الهداريات .

Hydrogénation (F). - **هَدَرَجَة** - ٢٩٧٣٥

المزج بالهيدروجين .

Hydrostatique (F). - **هَدَرَسَة** - ٢٩٧٣٦

Hydrostatics (E). علم توازن السوائل وضغطها .

Hydrobia (S). - **هَدَرُوب** - ٢٩٧٣٧

Hydrobia (F). Hydrobia (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات مديات الارجل وفضيلة الهيدروبيات . انواعها المعروفة كثيرة العدد بعضها من متحجرات الاسحاق الثالثة والبعض الآخر منتشر في معظم بحار العالم . يكثر وجودها عند مصبات الانهر || اصنافها صغيرة ، مائنة ، مذبذبة الاسحاق ، قرنية الاسقاط .

Filaria caprae (S). - **هَدَبِيَّة الماعز** - ٢٩٧١٦

Filaire des caprins (F).

نوع من الديدان طويلة يراوح من ٢ الى ٥ سم . تركيب الماعز في نسجها الضامة فتفرح جلدها وتفسدها .

٢٩٧١٧ - **هَدَبِيَّة المدنيّة** ، عرق مدنيّ

Filaria medinensis (S). Filaire de Médine, Ver de Médine (F). Guinée-worm (E).

نوع من الديدان تكثر في البلاد الحارة . تفسد تحت الجلد في نسج الجسم الضامة عند البشر والخيول واليقر وناثر البهم . انشاما تطول من ٥٠ الى ٨٠ سم . وقد يصل طولها في بعض الاحيان الى ٤٠٠ سم . تستقر في اي مركز كان اما تغفل اسفل الساق فتسبب دملة تنتهي بمخرج مقروح . يقال ان كيشها يدخل المدة مع الماء . فاجتنابها يكون اما ببل الماء او بتقطيعه .

٢٩٧١٨ - **هَدَبِيَّة بآسوريّة**

Filaria haemorrhagica (S). Filaire des boutons hémorragiques (F).

نوع من الديدان تطول من ٣ الى ٧ سم . تركيب الخيل والبهال والخيول . تتركز في الساق والكفط والحاروك . تسبب دمل تنز القبح والدم .

٢٩٧١٩ - **هَدَبِيَّة الارجل**

Cirripèdes, Cirropodes (F). Cirropoda (E).

رتبة حيوانات دنيا من الفريات . فصائلها واجناسها كثيرة العدد صيرة القند تعيش طفيلية على الاسماك والحيات وكل شيء تستطيع الالتصاق به . قرونها الاستشعارية مجوفة بمحاجم تمكنها من الالتصاق .

٢٩٧٢٠ - **هَدَاكَة** - Frigidité (F). Frigidity (E).

حالة مقاومة سلبية او قنور في وظائف الاعضاء التناسلية تجعل المرأة تنفر من النكاح او لا تقتبط بمارسته لانها قلما تتحسس الجهور الجنسي .

٢٩٧٢١ - **هَدَاكَل** * - Viscum album (S).

Gui, Gui blanc, Morvé (F). Common mistletoe (E). Gemeine Mistel (D). Visco quercino, Vischio comune, Panis (I).

نبات طفيلي معمر من فصيلة المشيتات . يعيش على اخضار الاشجار القنطرة والحريجة اخضار الفتح . فيقاس هائله النسخ ويؤذي . برته تنشق في السطح الذي يلصقها بالنصن . تجوده تشب في لحاء الشائل . فروعه ثنائية التركيب . ازوائه متعاقبة جامدة النصل الاخضر الاس . نوريه الشكل ، يبيضه اللون ، دافئة للمادة . برورها دقيقة مغلطمة || ثمارها مأكولة من بعض انواع الطير اخضار الشبان التي تنقل البرور مع السمل الى اي شجرة كانت || والهدال يستعمل ضد الربو والشفاق ويستخرج منه نوع من الدقيق جيد الصف . الواحدة هدالة .

٢٩٧٢٢ - **هَدَاكَهْد** هو المحدث ، اطلبه .

٢٩٧٢٣ - **هَدَبِيَّة** - Cuellir (F). To gather (E).

هدب الشجرة : اجتماعه وهدب واحده ايضاً .

٢٩٧٢٤ - **هَدَبِيَّة** ، **هَدَبِيَّة** - Aiguille (F). Needle (E).

الحدة والمذبذبة . ج هذب وهذب وهذاب . كل ورقة ابرية الشكل لا غير لها ولا مرض كورن الصنوبر واللائل ...



هدال

الملمس ، سواءً اللون ، قسبة الملمح ، تعتبر من أخطر وأجمن القراء .

٢٩٧٢٨ - هيدروبيات * Hydroides (S).

Hydroides (F). Hydroides (E).

فصيلة حيوانات مجهرية من الرخويات مديات الاربل أمميات الهياشيم المشطية . اجناسها المعروفة ٢٢ وانواعها بعض المئات منتشرة في معظم بحار العالم وخاصة عند مصبات الأنهر لانها تترطب في الماء الاجاج || أعرف اجناسها وأشهرها الهدروب .

٢٩٧٢٩ - هيدروسيفات * Hydroscaaphides (S).

Hydroscaaphides (F). Hydroscaaphides (E).

فصيلة حشرات مائية من غديات الإجنة . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد . اصطنائها منافع وعيبرات البلاد المتلة الحارة || اجناسها شبه بيضية اللون ، مدقطة البيليط ، طول من ٨ الى ١٤ سم . رؤوسها مستعرضة ، مخروطية . ميرتها بارزة . تأثيرها وتكونها نظامية . - قرونها الاستشمارية سباعية الفصل . كواسلها شبه مربعة الشكل . اعحادها لاحقة || تعيش على القنابات المائية في البحيرات والمنافع || أشهر اجناسها الهدروس .

٢٩٧٤٠ - هيدريات Hydroids

هي المديريات من الهيفوات تشمل ثلاث رتب . المدريات والمدريات المرجانية والجلجليات .

٢٩٧٤١ - هيدريات مدوسية Hydroméduses (F).

صف حيوانات من الهيفوات يشمل المديريات والمدوسيات والمصليات .

٢٩٧٤٢ - هيدريات مرجانية Hydrocorallaires

رتبة حيوانات مائية من الهديريات .

٢٩٧٤٣ - هيدروخ Helderichia (S). Helderichia (F).

جنس نباتات عشبية ، معمرة ، برسية ، من فصيلة اللصليبيات . انواعها المعروفة قليلة العدد منتبها جبال بعض مناطق حوض البحر الابيض المتوسط || سيقانها زساعة فراء . اوراقها شاذية ، متضاربة لحمية النصال . ازهارها طرفي الارتكاز . ازهارها صغيرة ، بيضاء اللون . ثمارها غريقات وحيدة البزرة || أشهر انواعها الهديرخ الحلبياني الورق .

٢٩٧٤٤ - هيدروخ حبلاني الورق

Helderichia buplevifolia (S).

Helderichia à feuilles de buplèvre (F).

عشبة معمرة برية من فصيلة اللصليبيات . منتبها جرد لبنان . ساقها زساعة فراء . فرونها منتصب . اوراقها لحمية مليقة النصال . ازهارها طرفي الارتكاز . ازهارها صغيرة ، بيضاء اللون . ثمارها غريقات وحيدة البزرة المتضلفة الصغيرة . تنويرها في أواخر الصيف .

٢٩٧٤٥ - هيدريس * Enhydrys marina (S).

Enhydrys marina, Grande loutre de mer (F).

Kalan, Sea otter (E). Kalan, Grosser Seeotter (D).

حيوان بحري لبون وحيد المجلس والنوع من فصيلة البحرصويات . قوته الأسماك والقشريات . أطعانه مجاحب مضيق بجرين . طولها نحو ١٦٠ سم . يتنيز باستدارة رأسه ومغطب قائمته الخلفيتين الذي يكتنف كامل البراش دون الاظافر . فرتة قصيرة الورب الناعم الكثيف ، خلية

٢٩٧٤٦ - هيدريسة * Hydræna (S).

Hydræna (F). Hydræna (E).

جنس حشرات من فصيلة الهديريات ورتبة غديات الاجنحة . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار العالم || اجناسها صغيرة ، اطليجية ، هيفاء ، طول نحو ٣ سم . رؤوسها مستعرضة . ميرتها بارزة . قرونها الاستشمارية عيطية . تأثيرها قصيرة . ملاسها مستطيلة . منققة ، كواسلها شبه مكورة الشكل . اعحادها لاحقة . قواسلها مستطيلة . اثنائها سوية اللون تكثر فيها السمرة السوداء والحورة ثم البني والكنسني || تألف مجاري الماء . تعيش تحت الحجارة المغمورة .

٢٩٧٤٧ - هيدريديات Hydrænidæ (S).

Hydrænidæ (F). Hydrænidæ (E).

فصيلة حشرات مائية من غديات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار العالم || اجناسها صغيرة ، اطليجية الشكل ، متدة الاحديداب ، طول من ٣ الى ٥ سم . رؤوسها متدة الجرم . ميرتها بارزة . قرونها الاستشمارية عيطية ، سباعية الفصل . تتميز بامتطالة ملاسها الفكية المنققة . كواسلها نظامية . اعحادها لاحقة . قواسلها متطيلة || تعيش في المنافع والبحيرات ومجاري الماء تحت الحجارة المغمورة أو بين اوراق النبات . ومنها انواع تعيش تحت طباطب الصفقات . يرقاتها مغترسة || أشهر اجناسها الهديرية .

٢٩٧٤٨ - هديس Myrte (F).

هو الآس ، الطليه .

٢٩٧٤٩ - هديك ، هيدوك Frigide (F). Frigid (E).

الهدك والمهدك من تميز بهذاك .

٢٩٧٥٠ - هديكة ، ليشترومة * Leptostroma (S).

جنس فطور مجهرية من فصيلة الهديكات . انواعها عديدة جميعها روية لا مؤذية . بكنيداتها غارشة ، طبائية الشكل ، سوداء اللون ، قرسية الانفلاق . يودلتها بغيراء اللون غطلة الاشكال ، منها البيضية والمخروطية والمنققة .

٢٩٧٥١ - هديكات * Leptostromatæceæ (S).

Leptostromatæceæ (F). Leptostromatæceæ (E).

فصيلة فطور مجهرية من رتبة الزويات . اجناسها وانواعها كثيرة العدد ، بكنيداتها مجحة ، فحمة اللون ، شافية الارتكاز أو محضرة . يوبقها مختلفة الاشكال ، متباينة التركيب . || أعرف اجناسها التالية : انتسويورديم (خشام) ، يوفليه ، ديجوكزيه ، خلوس ليتيربيوم ، لريولا ، سلميه ، هديكة .

٢٩٧٥٢ - هيدلتي هو المنسل للملمس القواطب .

٢٩٧٥٣ - هيدن Fertilité (F). Fertilité (E).

الهدن هو التحبب في الانتاج .

٢٩٧٥٤ - هيدد ، هيدد Upupe (S).

Huppe (F). Hoopoe (E).

جنس طير من الهدهديات . انواعها المعروفة ستة ، جميعها



هديس



هديرة

٢٩٧٦٠ - هُدُودُ يَحْيِيَّات (F). Flagellés (F). Flagellates (E).
قطة من الاولاي ، غالباً مجهرية ، مجهزة بأهداب دقيقة قابلة الانحناء تدعى هديات تحمكها من اعموم والانتقال في الماء . بعضها فسفوري اما اكثرها تنبعث من الخشب . ومنها انواع طفيلية تعيش على الحيوانات .

٢٩٧٦١ - هُدُودُ يَف (F). Allergène (F).
نبت تمرطي يطلق على كل مادة قد تسبب الاندهاش .

٢٩٧٦٢ - هُدُودُ بَيْل (E). Pigeon milie (F). Dove male (E).
الهديل هو ذكر الحمام . قال فيه جرمان العبد .

كان الهديل الفاعل الرجل وسطها
من البهي شرب يفره مسنن
والهديل صوت الحمام من هدل . والهدل كما جاء في القدير
و فرخ كان على عهد لورح فصاده جارج من الطير فليس
من حامة الا وثبكي عليه الى يوم القيامة . قال نصيب :
فلقت اثبكي ذات طوق فلكرت
هدلاً وقد ادوى رسا كان تبع

٢٩٧٦٣ - هُدُودُ يَم : باقي نبات العام السابق .

٢٩٧٦٤ - هُدُودُ يَنَّةِ الْفَيْسَمِ * ، هُدُودُ يَنَّةِ الْفَيْسَمِ
Hadena scalis, Hadena didyma (S).
Hadenè du seigle, Noctuelle du seigle (F).
Hadena scalis (E).

حشرة مؤذية من فصيلة الفسقيات حشرقات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاقصى الى اوروبا و اريقية الشمالية . فراشتها جارية قوتها رقيق الازهار . سرقتها خاضعة تركيب التيجليات البرية والزراعية || جسمها مستطعم الجرم يطول نحو ١٣ م . بسطها تراوح من ٣ الى ٤ م . رأسها مستعرض الشكل . عيناها صفيرتان . زباناها عيطان . ملاصقا صلبة . مرشقا مستد الطول . جوفها وبعثها الى الخنثي || وراشتها الى الخنثي الاسمر تعلو في الزوج الامامي زراکش متعرجة وزخارف تراوح بين الكسني والجملوي . وتعلو في الزوج الخلفي ماجة قاعدية سمراء لا تتجاوز حدود الزايم الاول || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في اواسط تموز وتبقى حتى ايلول . تسرح في الليل . تماثل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتتمتع المكن في عطوط مستقيمة على عصف النبات العائل || الطور الاسروي الذي يستمر نحو ٤٠ اسبوعا ينقضي على النبات والسرقة عند بلوغها الادراك تغلظ من ٢٥ الى ٣٠ م . جسمها اسطواني الشكل ، باهت الغضار يعلو خطان تيجيان اممران يمتدان من الكويل الى الشرج . رأسها اسمر اللون ، مبهر الخلف النقيض . مدنها ورواجها الى الخنثي || طور الاكمال الذي يستمر من ٢١ الى ٢٨ يوماً ينقضي في التربة حيث تنمدن السرقة وتكتنق بلبلاب من الطين .

٢٩٧٦٥ - هُدُودُ يَنَّةِ مُشَبَّكَة *

Hadena reticulata (S). Hadenè reticulée (F).
Hadena reticulata (E).

حشرة من الفسقيات حشرقات الاجنحة . موطنها بعض اصقاع حوض البحر الابيض المتوسط . فراشتها جانبية قوتها رقيق الازهار . سرقتها تدبش على اوراق العلوك والقرنفل البري والزراعي وتقتب الكماير وتلتهم البور

من طور العالم القديم . اجسامها رقيقة ، رؤوسها متربة يتنازع مروحية الشكل . اثارها جيلة الانلون المتراكبة الزامية يعلوها تجميع وتسنج . || حكي القزوي ان الاهدود قال لسليان اريد ان تكون في سفاتي قال انا وسدي قال بل انت واهل عسكريك كذا في يوم كذا فحضر سليمان بمجنده فطار الاهدود فاصطاد جرادة فضغنها ورمى بها في البحر وقال كلوا يا بني الله من فاته الله ناله المرق ففسكح سليمان وبنوده من ذلك حولا كاملاً وفي ذلك قيل :

« جاءت سليمان يوم المرض هدهدة
اهدت له من جراد كان في فيها
وانشدت بلسان الحمال قائلته
ان الاهدابا على مقصدار مهديها
لو كان على الى الانسان قيمته
لكان على الى الدنيا وما فيها »
اعرف النواحه واشهرها الاهدود الشائع .

٢٩٧٥٥ - هُدُودُ شَائِع * ، دُودُكُ الْجَبَلِ

Upupe apops (S). Huppe commune, H. vulgaire (F). Common hoopoe (E).
نوع من الاهدود المملوك في لبنان وفي سائر الشرق الاوسط . كتيته ابو الاصهار وابو ثلمة وابو قلعة وابو الربيع وابو وروح وابو جهاد وابو حباد . ج هدهد وهدهدي . الواحدة هدهدة . || وهو طائر الفرج الثوب متوسط الجسم طوله يراوح من ٢٧ الى ٢٨ سم . منقاره دقيق مستطيل . قوته كبيرة لئلا يسود الاطراف . فوهه الى الصلبة الطلحة . جناحها وظهورها الى الصلبة الناعمة يعلوها تسنج اسود وايضاً يتخلله الاصفر . ذنبه مقعوم الطرف اسود اللون ابيض الجانبين والوسط . || تألف الاماكن الميسرة الازهار . قوته الحشرات والديدان . يدن حته في تجاويف الازهار . الاثنى تحسن وسعها من ٤ الى ٧ بيضات نحو ١٦ يوماً . الذكر يوزن لما الاكل . || يتجر من الطيور الناعمة الواجب حياتها .

٢٩٧٥٦ - هُدُودُ يَمَات (F). Upupidae (S). Hupupidae, Upupidae (F). Upupidae (E).

فصيلة طير من الجوارم الرقيقات المتأخر . انواعها عديدة تنجم الى جيلين الاهدود والهدير . اجسامها رقيقة . اجنحتها ذلقة . الشفا قصيرة . ارساها قوية . اثارها جيلة الانلون الزامية .

٢٩٧٥٧ - هُدُودُ يَمِيكة * . Hédobia (F). Hédobia (S).
جنس حشرات خاشبة من فصيلة الفغريات . انواعها المروقة ١٠ ، اعطائها البلاد الحارة والمعتدلة . جميعها صغيرة ، القدة مسطلة الشكل ، اثارها مزركمة مختلفة الانلون . يرقاتها تركب الاشجاء الميتة تنخرها وتعلها . اشهرها الهديبية الامبراطورية .

٢٩٧٥٨ - هُدُودُ يَمِيكة امبراطورية *

Hedobia imperialis (S). Hédobia impériale (F).
نوع من الهدوية طليط من ٤ الى ٥ م . فوهها مستطيل اللون اسمر اللون تعلو زراکش مخلفة خلية التركيب طلاء زاهية . || يرقاتها تركب احضان الاشجار الميتة من اي نوع كانت .

٢٩٧٥٩ - هُدُودُ يَمِيكة * . Flagello (F). Flagellum (E).



هدود شائع



هدوية امبراطورية



هدية اليل



هدية مشبكة

إذا ازدحت هوم الصدر قلنسا
عسى يبرأ يكون لها انفرج
ندمي هري وانيس نفسي
دفائر لي ومشتوي السراج

٢٩٧٧٢ - هَرَكُوس
Acacia blanc (F).
هو السط الابيض . الزائدة هرامة .

٢٩٧٧٣ - هَرَامِكَة
Astrologus (F). Astrologers (E).
الحراسة طلاء النجوم . النجمين والمتنجين .

٢٩٧٧٤ - هَرَب
الحرب . ثوب البطن .

٢٩٧٧٥ - هَرَبُود
Harpagodus (S).
Harpagode (F). Harpagodus (E).
جنس حيوانات بحرية من الرغويات بمدليات الابليل
وفصيلة الكيتيات . انواعه المرموقة قليلة المدد اعطائها
بعض مناطق المحيط الاطلسي للجارية لاربيكة التالية ||
اصداؤها متوسطة القد وشبيهة عازلة جزوية اللون . فوطها
متعددة الانفرج ثلاثية الفلق التي تسمى كريل البش شكلا
رحطابا .



مداب

٢٩٧٧٦ - هَرَبُوت
Harpactes (S). Harpactes.
Courouc flamboyant (F). Harpactes (E).
جنس طير من فصيلة الطرطريات . انواعه المرموقة نحو
١٠ موطنها يشغل معظم مناطق آسيا الشرقية والجنوبية
جميعها متوسطة القد . متناجها قوية بحبة الاطراف ،
مقمرة الحاطم العليا . اجنتها متوسطة الطول ، ذلقة
الاطراف ، رتاجية الريش . اذناها مسطيلة ، رتاجية
التركيب . اوقها جميلة الالوان المتشعبة || فوطها الحشرات
على اختلاف انواعها وبعض الهدويات || اعرف انواعه
واشهرها الحريق المطوق .

٢٩٧٧٧ - هَرَبُوتْ مَطُوق
Harpactes fasciatus (S).
Harpacta à bande, H. kondoa (F).

نوع من الحريق . اصطانه بلاد الهند وصوتها . يأتف
النابات الكثيفة || جسمه متوسط القد بطول نحو ٣٠ سم .
ثوبه جبل الالوان الصافية . رأسه وقلبه الى السواد القصبي
اللامع . صدره وقلبه الى الحمرة القرمزية الكثيفة اللمعان
وكذلك عصبه تطوق رأسه من اللون الى اللون . سوله عنده
واحارار صدره مقسولان بطوق ابيض كالساج . فوطه
وافتيحه وزلال ذنبه الى الجروة تغطيها حاشية سوداء
يلفها حشار مستعرض ابيض . جناحاه الى السواد المسج
بالابيض . متقاده ورسدا الى الزرقه || طرائه العادي
قصير الشوط يكثر فيه التصديق والتجسس . قوته الحشرات
والهدويات اعصها المتناكب || يذئن حده في صقوع
الاشجار المرموقة . الاثن تبيض من ٤ الى ٥ بيضات
تفصلها بمناوبة الذكر نحو ١٥ يوما .



مرين مطوق

٢٩٧٧٨ - هَرَبُوتُوس
Harpalus (S).
جنس حشرات من فصيلة المربليات . انواعه كثيرة
المدد جميعها صغيرة القد ، دجوية المسرح ، تعيش تحت
الحجارة والاعشاب والارواق اليابسة . قوتها البزود
والحيوب وبعض الثآير . ريقاتها غاشية تعيش على اوراق
النبات . اشهر انواعه الثلاثة التالية .

الفئة || جسمها متوسط القد بطول نحو ١٧ سم . بطنها
نحو ٤١ سم . رأسها الى الحطبي الاسمر اللامع . حينها
كبريتان . زياناها عيشيان . جوشها وقلبها الى الحطبي
الاسمر || روشنها الاماميان الى الحطبي الاشعث للمراج
تعلو شبكة من الخطوط الكستنية . روشنها الخلفيان
الى الحطبي التني المراج يسر عنده الاطراف الخارجية .
اهدابها الى الشقمة الصنابية || لها جبل واحد في الحول .
تظهر الفرائدة في اواسط ايار وتبقى حتى تموز . تسرح
في الليل ، تعاطل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتتمتع
المكن لطعا مرموقة على الصفحات السفلى من تصال
الارواق || السرعة عند بلوطها الكمال تطول نحو ٤٠ سم .
جسمها اسطواني الشكل ، مشدود القشار . قوتها الى
البركة تميل في الظهر وتبث في الجانبين ويملوها غطان
جانبيا احمران ونسمة خطوط ممتدة صفراء اللون . رأسها
الى الجفوة . مدنها الى الحطة الفراء . وواجبها الى السيرة ||
طرد الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع ينقضي في
التربة ضمن جلاب من العلين تلتصقه السرعة .

٢٩٧٧٦ - هَدْيُوتِس
Hedyotis (S).
Hedyotis, Hedyote, Hédotea, Hédoteide (F). Dog-
wood (E). Süsohr (D). Edoteide (I).
جنس نباتات برية وزراعية مسمرة من فصيلة الفويات .
انواعه قليلة منها الاششاب والجنيات . اوراقها متعاقبة .
ازهارها محورية الاكواز ارجية . ثمارها جردا ثنائية
اللقطة . || اعرف انواعه واشهرها ما يلي .

٢٩٧٧٧ - هَدْيُوتِس سَرَكْدِيْب
Hedyotis auricularia (F).
نوع من الهدويوتيس . اصطانه سرديب . جنته مسمرة .
اوراقها حاشنة ذكية الريف الطري . ازهارها تاجية
الاكواز عاقلة البرق . يستخرج من اوراقها بالتقطير
عطر الهدويوتيس .

٢٩٧٧٨ - هَدْيُوتِس هَشْدِي
Hedyotis à ombrelle (F).
نوع من الهدويوتيس . اصطانه الهند . حشيتة عملة . جلورها
صباغية يسمونها "وي" غصنها احمر اللون شائع الاستعمال

٢٩٧٧٩ - هَدْيُوتِس
Meites (S). Méitea (F).
واحدته هلاية . جنس طير من فصيلة الهذيات . انواعه
قليلة المدد . اجسامها متوسطة القد ، فوطها براوح من ٢٧
الى ٣٥ سم . جوارحها وراسها وغالبها مسطيلة . ازهارها
عريانة . جوارحها لامعة ذلقة . اذناها قصيرة غروبية .
اوقها الى الصفة المائقة يملوها توشج خفيف . جوارحها
يطوقها الى الصفة الموشة بالاسود . اصنافها ثقبية اللون .
قوتها البزود والحروب والحشرات على اختلاف انواعها .
تنش عشها في النصوص بين الادلغال والاششاب الرفيعة .
حفظتها من ١٢ الى ١٥ بيضة .

٢٩٧٨٠ - هَدْيُوتِسَات
Meistidae (S). Meistidae (F). Meistidae (E).
فصيلة طير وسيدة الجلس من رتبة الدجاجيات . انواعها
المروفة قليلة ، جميعها من طيور مدحسك . قوتها البزود
والحروب والحشرات .

٢٩٧٨١ - هَرَبُوس
Chat (F).
هو السنور . اطلبه . ج هرة والاثن هرة . قال احد بن
فارس صاحب الجبل في اللغة :

٢٩٧٨٧ - هَرَبُلُوسْ رَجِيعْ * Scutellaria altissima (S).

Toque élevée (F).
نوع من الهربون الأزرق الممر. ساقه منتصبة تملو من ١١ إلى ١٣ سم. ثوبه إلى الصلبة الخشبية الفاتحة. يألف الأرض الرطبة. قوة البرور والحروب وإثّار الجافة الساقطة. رقاثة خاضلة قليلة الأذى.
٢٩٧٨٠ - هَرَبُلُوسْ أَطْحَلْ الظَهْر *
Harpalus distinguendus (S).

٢٩٧٨٨ - هَرَبُلُوسْ كَبِيرْ الزَهْرْ Scutellaria macrantha (S). Toque à grandes fleurs (F).

نوع من الهربون الأزرق الممر. ساقه تملو من ٢٠ إلى ٣٠ سم. أوراقه لائفة، بيضبة الشكل، نصلها قليل الحمل، مسن الحافسة. أزهاره سلبية التجميع، متقابلة الإزكاك، تطول نحو الإزكاك تطول نحو ٣ سم. لوها إلى الزرة الزاهية || تنوره يشتد من تموز إلى أيلول.

٢٩٧٨٩ - هَرَبِيلْكَ نَهِيكْكَ * قَوْبِيَعَةْ الْخَسْبْ Harpella forficella (S). Harpelle perce-bois.

Taigne du bois mort (F). Harpella forficella (E).
حشرة من فصيلة القربويات مرشقيات الاجتمعة. موطنها يمتد من الشرق الأوسط إلى أوربة. فراشها جاربة قوتها رقيق الاثمار. سرقها خاشبة تمشي على جنود الاشجار اليابسة والاعصان والافناد || جسمها قصيف يطول نحو ٧ سم. يقطها تراو من ٢٢ إلى ٢٤ سم. رأسها مكور الشكل. عينها صغيرتان. زباناها غليظة. ملاسها دقيقة. مرشقا معتدل الطول. جوشها ويطها إلى النبي الصناعي المواج || روشنا الامانيان إلى الصغار القائم يملو تشيح بني. روشنا اخلفنا إلى الصلبة السراء المواج. اثمارها شعراء اللون || لها جيل واحد إلى الحمل. تظهر القراشة في اوائل حزيران تبقى حتى اواخر تموز. تسرح في النهار. تماثل بد ظهورها بنحو ستة أسابيع ويخرج المكن مبدأيا في شقوق الخشب ويخرج القشور اليابسة || السرعة عند بلوغها الادراك التام تطول نحو ١٦ سم. جسمها شبه اسطواني الشكل، مستقيم المقدم والمخبر، يمشر الحلب القصير. ثوبها إلى الخشن الاسمر. رأسها شديد السرة. مدنها ورواجها الصدرية والبطنية إلى الخشن الباهت || طود الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوما يتقضي خارج الفلق الخشبي ضمن صلجة تنسجها السرعة تحت القشور أو بين الشقوق.

٢٩٧٩٠ - هَرَبِيلْكَ حرمة: السود بين منخري الكلب وسائر الحيوانات من ذوات الفطسة.

٢٩٧٩١ - هَرَجْ Clitoria de Ternate (F).

هو المازريون الهندي، اطلبه.

٢٩٧٩٢ - هَرَجْكَ كَجْ Exotype

اسدى سلالات جبل النيب الهابط. يمر منها طميا بحر ٧ يتيمه رقم السلالة. فاذا اودت التير من السلالة الاولى كتبت ١٧ وللدلالة على السلالة الثالثة كتبت ٣٣ وعلى السلالة السابعة ٧٧ الخ ...

٢٩٧٩٣ - هَرَجْجْ Talin (F).

هو التالينوم، اطلبه.

٢٩٧٩٤ - هَرَبُلُوسْ أَصْهَبْ * Harpalus rufus (S).

نوع من الهربولوس. حشرته تطول من ١١ إلى ١٣ سم. ثوبه إلى الصلبة الخشبية الفاتحة. يألف الأرض الرطبة. قوة البرور والحروب وإثّار الجافة الساقطة. رقاثة خاضلة قليلة الأذى.

٢٩٧٨٠ - هَرَبُلُوسْ أَطْحَلْ الظَهْر * Harpalus distinguendus (S).

نوع من الهربولوس. حشرته تطول من ١٤ إلى ١٦ سم. ثوبه إلى السرة السفاه المليلج. ظهره اطحل اللون، اسمر التضطيط المستطيل. يركب شمائل القليلك لاثام بزورها الدبقية فيضب الشاميل ويشربها.

٢٩٧٨١ - هَرَبُلُوسْ مَلُونْ * Harpalus senex (S).

نوع من الهربولوس. حشرته تطول من ٧ إلى ١٠ سم. ثوبه إلى الأخضر الاصفر تملو مشمة جوية. زباناها وجرارها إلى الحمرة. يعيش تحت الحجارة والاشخاب. قوة البرور والحروب. رقاثة خاضلة قليلة الأذى.

٢٩٧٨٢ - هَرَبُلُوسِيَاتْ * Harpalidae

فصيلة حشرات من ثديات الاجتمعة. اجناسها وانواعها كثيرة للعدد. اصطلها العالم. مظهرها اويل وبعضها مقعر. رقاثها خاضلة ناهة ومنها المقعرة التي تنصب النديان القراشة || اشهر اجناسها الهربولوس والروس والياح والديموس.

٢٩٧٨٣ - هَرَبُلُوسْ * Pseudope

جنس عظم من فصيلة المنجويوات المادامات القوام. انواعه قليلة، اصطلها البلاد الحارة والمعتدلة. اجسامها اسطوانية تطول من ٤٠ إلى ١٠٠ سم. رؤوسها مقطعة. اذنانها دقيقة. سرافها مربعة متتابة. قوتها الحشرات تنمر من الزسافات الخفية.

٢٩٧٨٤ - هَرَبُلُوسْ * دَرَكْ Scutellaria (S).

Scutellaria, Toque (F).
الدرقة من الامير مصطى الشهابي المأما إلى صدر الاسم العلمي. جلس نباتات برية ويزينية من فصيلة الشفويات. انواعه عديدة. ينبتا الشرق الادنى وافريقية الشمالية. سوقها خشبية خجلة. اوراقها صغيرة للد لائفة أو معتقة. اثمارها سلبية التجميع، مختلفة الألوان. بزورها دقيقة حنطية اللون || احرف انواعه واشهرها ما يتبع.

٢٩٧٨٥ - هَرَبُلُوسْ أَبْيَضْ Scutellaria albidia (S).

Toque blanche (F).
نوع من الهربون الأزرق الممر. ساقه زياء اللحاء تملو من ٤٠ إلى ٨٠ سم. أوراقه منتنة اعليجية الشكل، نصلها جامد الصلصة، خلى البشرة، مسن الحافة، دبق المسام. اثماره سلبية التجميع تطول نحو ٢ سم. لوها إلى البياض العاجي || تنوره يستمر من حزيران إلى تموز.

٢٩٧٨٦ - هَرَبُلُوسْ أَبْيَضْ Scutellaria alpin (S).

Toque des Alpes (F).
نوع من الهربون الجبل البري الممر. ساقه تملو من ١٠ إلى ٣٠ سم. أوراقه لائفة بيضبة النصل تطول من ١ إلى ٢ سم. اثماره بيض الانابيب، زرق الاطراف، سلبية التجميع. تنوره يستمر من حزيران إلى آب.



هربولوس اصهب



هربولوس اطحل الظهر



هربولوس ملون



هربول



هربون



هربلة نيكة

٢٩٧٩٤ - هَرَجُود ٥

Heterogynis (S).

Hétérogynis (F). Heterogynis (E).

حشرة من فصيلة الهرجوديات ورتبة حرشفيات الاجنحة . اعطائها بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة . تألف البراري والمزارع المبعثرة الاشجار || جسمها صغير ، نحيل ، كثيف الخمل الناعم . مسطحة نحو ٢ م. رأسها صغير . عينها صغيرتان ، بارزتان . غطتها وبلاستها شديدة القصر . زباناها مشطيان ، مستطيلان . اجنتها كبيرة || الاثني مرقلة ومادة الخناج . السرة شبه اهليجية الشكل ، مسطحة ، غاشية ، تعيش على اوراق فصيلة القزريات الفرائشية ونسبا الزوا ، مرتها المفصل .

٢٩٧٩٥ - هَرَجُودِيَّات ٥

Heterogynidae,

Epinopterygidae (S). Hétérogynidés, Epinoptérygides (F). Heterogynidae, Epinopterygidae (E). فصيلة حشرات من رتبة حرشفيات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد ، جميعها شحالية الاصلان || اجسامها صغيرة ، نحيلة ، يلفها خمل ناعم . مسطحة تراوح من ١٨ الى ٢٢ م. رؤوسها صغيرة . هيبتها بارزة . اعطائها وبلاستها شديدة القصر . قرنوسا الاستعمارية مسطحة . اجنتها غشقة للاشتاب . مسطرة العروق . الزوايا الى السرة الخشبية المتفاوتة الماخجات | انثاها مزارق مرقلة . اساريها شبه اهليجية الشكل ، مسطحة || اشهر اجناسها الهرجود .

٢٩٧٩٦ - هَرَجُودُوم ٥

Damalisque du Sénégal (F).

Korrigum (E).

هو سلحوم السنغال، موطنه يمتد من السنغال الى افريقية الشرقية والغشية .

٢٩٧٩٧ - هَرْد ٥

Curcuma (F).

هو الزركم السباعي . اطبله .

٢٩٧٩٨ - هَرْدَاء ، هَرْدَاك ٥

Thamnocalamus (S).

Bambou (F). Bamboo (E).

جنس نباتات قصيرة برية وزراعية من حمارة الخيزرانيات وفصيلة النجيليات . انواعها قليلة العدد ترطب في الاربة الخفيفة العميقة القور الوافرة المواد المنصوية .

٢٩٧٩٩ - هَرْدَاء هِنْدُوسِيَّة ٥

Thamnocalamus hindel (S). Bambou de l'Inde (F).

نوع من الهرداء يطول من القرنين الى الخمسة امتار . سلباته شديدة الخضار . اوراقه تطول من ٢٠ الى ٣٠ سم . وتعرض نحو ١٥ م . نصلها جلدي السنج ، صفته المليا غفراء اللون طحلاء المواج ، صفته السفل يبيض اللون زياه . يربط في الاربة البدالية الرطبة .

٢٩٨٠٠ - هَرْدِيَّات ٥

Phalangides, Opilions,

Faucheurs (F). Phalangides, Opilions (E).

رتبة من صف التيكوتيات . اجناسها وانواعها عديدة تنقسم الى اربع فصائل منتشرة في معظم اقطار العالم || اجسامها صغيرة ، ملحونة الصدراس باطن ، عيشونية التنفس ، عادمة المشاق ، مسطحة الجرامز الدقيقة . اشهر فصائلها الكهوليات .

٢٩٨٠١ - هَرْدِي ٥

Hourdis (F).

الهردى او الهردى ، كلمة عربية اصيلة تنصل الآن للدلالة على المجارة الخفيفة من الباتون (اطلب هردى) .

٢٩٨٠٢ - هَرْدِيْب مُصَبَّج ٥

Chlorophorus varius (S). Chlorophore tachéé (F). Chlorophorus varius (E).

حشرة وائمة غاشية من فصيلة القزريات ورتبة مفدمات الاجنحة . تألف البراري القريبة من السران . خنافسها تعيش على ازهار الصيوانيات ولا تمت من الاوراق . يرقاتها تركب الجرجع والاصان والقشبان المقطوعة اليابسة وقد تسردب ساليك الكرمه ويزاوح الاجنحار الشمرة وسالسا || جسمها متوسط القد بطول من ١٥ الى ١٤ م. ثوبا الى الصغار الكبريتي تلوها بقع وتناويع سود . رأسها متدل الجرم . عينها كبيرتان نازرتان . زباناها غيطيان دقيقان . ظهرها مستطيل الشكل ، ضيق المؤخر المستدير الفارق . غدها متدلتا الصلاة ، متناهتتا التميزر النحيل القاطب . اسرافها خاسية النعل || الاثني ابرز قدأ من الذكر واكد ثوبا منه واكثر زبانا || جيلها ثنائي الخول . تظهر الحشرة الجملانة في اواخر ايار وتعيش حتى اواخر ايلول . تسرح في التبار وتبيت في الليل || البرقة عند تمام ادراكها تطول من ١٨ الى ٢٤ م. جسمها محذوب الظهر ، مسطح اللدب ، قصير الرواجب الخشوية الشكل . ثوبا الى الصفرة الزيتية يملوها تنقيط اسمر . رأسها احمر .

٢٩٨٠٣ - هَرْدِيْب مُصَصَّب ٥

Chlorophorus trifasciatus (S). Chlorophore trifascié (F). Chlorophorus trifasciatus (E).

حشرة وائمة غاشية من فصيلة القزريات ورتبة مفدمات الاجنحة . تألف المواقع التي تكثر فيها نباتات التفصيلة الصيوانية . خنافسها تعيش على الازهار . يرقاتها تركب اروسات النباتات الحولية والحولة وتسردب حماء جذوع الاشجار باستثناء الصنوبريات || جسمها صغير القد يطول من ٨ الى ١٥ م. ثوبا تمتد الاثنيان فيه الاسود والاحمر والاسمر الخشن والثنائي الاصفر المواج . رأسها صغير الجرم . عينها صغيرتان ، نازرتان . زباناها غيطيان ، دقيقان . ظهرها مستطيل الشكل ، مسطير الطرف الفارق ، اسود اللون كالطين . غدها متناهتتا التميزر الخفيف القاطب . اسرافها خاسية النعل || الاثني ابرز قدأ من الذكر واكثر زبانا منه واطول مرؤا || طأ جيل واحد في الخول . تظهر الحشرة الجملانة في اوائل حزيران وتبقى حتى اوائل آب . تسرح في التبار وتبيت في الليل || البرقة ، عند الادراك التام ، تطول من ١٦ الى ٢٠ م. جسمها محذوب الظهر ، مسطح اللدب ، نودلي الرواجب . ثوبا الى الصفرة الصنائية المواج يملوها تنقيط اخر . رأسها جلوي اللون .

٢٩٨٠٤ - هَرْدِيْل ٥

Haridelle (F). Seed, Nag (E).

الهرديل الصفائح اللصقة من السبور . الواحدة هرديلة .

٢٩٨٠٥ - هَرْدَاك ، هَرْدُون ٥

Autruche mâle (F).

هو الظلم ، اطبله .

٢٩٨٠٦ - هَرَشَان ٥

Caragana (S).

هرشان تعريب الاسم التتري . جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة القزريات الفرائشية . مهدها بعض بلاد الشرق الاقصى وبعض مناطق سيريير . انواعها عديدة . جميعها معمرة ، معظمها جنبي وبعضها جملي . اوراقها عالية مركبة ،



هرجود



هرجود مبيج



هرجود مصعب



هرشان

٢٩٨١٣ - هَرَشَانْ كَدَن ٥
Caragana frutex (S).
Caragana frutescent (F).
 نوع من الهرشان. جنيتها تملو نحو ٢٥٠ سم. أوراقها رباعية التركيب. ورققاتها لاقامية الشكل والحجم تملو من ١ إلى ٣ سم. وتعرض من ٤ إلى ١٢ سم. نصلها يضي الشكل، اذنياتها حادة شائكة. ازهارها كبيرة القد، فردية التجميع، لونها الى الصفار الزاهي || تنوره يستمر طول شهر ايار.

٢٩٨١٤ - هَرَص
Clous (F).
 بشور صغيرة جامدة تملو للسج النباتية.

٢٩٨١٥ - هَرَصَة
Ver (F). *Worm* (E).
 هي البودة. ج. هَرَص.

٢٩٨١٦ - هَرَصِي
Polymnatus (S).
 جنس حشرات فراشية من فصيلة المهرشات، انواعه عديدة، اصطلحوا بمطر اصفاق العالم. اجسامها صغيرة القد كثيفة المخرشات المستطبة الخملية الاطراف. اقواها ملونة. قربوا الاستعمارية مستطبة دبوسية الشكل || تسرح في النهار. قوتها طلع الازهار وريحها || رقاتها غاشلة وقامة تركب أوراق النبات وتمار || اعرف انواعه واشهرها ما يلي.

٢٩٨١٧ - هَرَصُ البَالِيَة ٥

Polymnatus amandus (S).
 فراشة من المهرص، جسمها احمر اللون رصاصي الملاج. طولها نحو ٣٥ سم. رواشن ذكورها الى الزرقعة البانجورية الزاهية يطوقها حنار اسود وامار ابيض المهب. رواشن انثاها حنطية اللون يملوها رقشة سمره وامار ابيض التهديب. رقاتها صغيرة القد، خضراء اللون، تركب البالية في اوراقها وقربوا.

٢٩٨١٨ - هَرَصُ البَقُول ٥، اَبُو دَقِيْقِي الْأَزْرَق
 اَبُو دَقِيْقِي البَقُول

Polymnatus baeticus (S).
 فراشة من المهرص، جسمها حنطي اللون احمر الملاج يطول نحو ٣٥ سم. رواشن ذكورها الى الزرقعة الجميلة الزاهية يطوقها اطار ابيض التهديب. رواشن انثاها خضراء اللون يملوها تنمش اسود. رقاتها خضراء اللون تقربها كدرة خضراء || تركب البقول وتقرض الحبوب قبل ادراكها اغصنها القبول واللوباء والترس.

٢٩٨١٩ - هَرَصُ الثَرُوس ٥

Polymnatus damon (S).
 فراشة من المهرص. جسمها يطول نحو ٣٥ سم. رواشن ذكورها الى الزرقعة الخضراء الملاج يطوقها اطار اسود وتهدب ابيض. رواشن انثاها حنطية يملوها تنقيط اسود ونقط اوسط ابيض وحنار اسود وامار مهدب ابيض. رقاتها تركب معظم النباتات القرنية اغصنها الترس.

٢٩٨٢٠ - هَرَصُ الرُّمَانْ، قَرْمَكْولا، دُودَة الرُّمَانْ
Virachola livia (S).

فراشة من المهرص. جسمها حنطي اللون اخضر الملاج يطول نحو ٣٥ سم. رواشن ذكورها برتقالية الصفحة العليا، ربادية السفلى، كستنية الطوق المهدب. رواشن انثاها بنسجية الصفحة العليا سمره السفلى، حنطية الطوق

ريشية، شعبة، متطابة، تنضي باذنية شائكة مكنوة من امتداد الضلع. ازهارها غصية التجميع او فردية يكثر فيها اللون الاسفر. ثمارها قرنية. بزورها بيضية الشكل. اعرف انواعه واشهرها ما يتبع.

٢٩٨٠٧ - هَرَشَانْ اُرْغَب ٥

Caragana pygmaea (S). *Caragana pygmée* (F).
 نوع من الهرشان. جنيتها تملو من ٥٠ الى ٦٠ سم. فروصها متدلية. اوراقها رباعية التركيب نصلها ضيق الصفحة السنائية الشكل يطول نحو ٢ سم. ويعرض نحو ٣ سم. ازهارها فردية، لونها الى الصفار الزاهي || تنوره يستمر من نيسان الى ايار.

٢٩٨٠٨ - هَرَشَانْ الصَّيْن ٥

Caragana chinensis (S). *Caragana de la Chine* (F).
 نوع من الهرشان جنيتها تملو نحو ١٥٠ سم. اوراقها رباعية التركيب. ورققاتها بيضية الشكل تملو من ١ الى ٣ سم. وتعرض من ٦ الى ١٥ سم. نصلها مائل البشيرة على صفحيه اذنياتها شائكة. ازهارها فردية التجميع، كبيرة القد، متدلية لونها الى الصفرة يملوها تنسج اريواني ازرق الملاج. تنوره يستمر طول شهر سزيان.

٢٩٨٠٩ - هَرَشَانْ صَغِير اَلْوَرَق ٥

Caragana altaiana, *C. microphylla* (S). *Caragana à petites feuilles*, *Acacia de Sibérie* (F).
 نوع من الهرشان. جنيتها تملو نحو ٢٥٠ سم. ورققاتها تمد من ١٨ الى ١٨ وهي بيضية الشكل مستديرة الطرف. نصلها يطول نحو ١٠ سم. وهو خالي البشيرة على صفحيه. ازهارها فردية او ثنائية التجميع، لونها الى الصفرة الجلييلة. تنوره يستمر من ايار الى سزيان.

٢٩٨١٠ - هَرَشَانْ بَرْتَقَالِي ٥

Caragana aurantiaca (S). *Caragana orangé* (F).
 نوع من الهرشان. جنيتها تملو نحو ١٥٠ سم. سالها فراء. فروصها متدلية. اوراقها رباعية التركيب خفيفة النصل الذي يطول نحو ١٥ سم. ويعرض نحو ٣. ازهارها فردية، برتقالية اللون || تنوره يستمر طول شهر سزيان.

٢٩٨١١ - هَرَشَانْ شَالِك ٥

Caragana spinosa (S). *Caragana épineux* (F).
 نوع من الهرشان. جنيتها تملو نحو ١٥٠ سم. سالها فراء، اوراقها لاقامية التركيب منها الرباعية الاصبعية الشكل ومنها السداسية والثمانية الورديات. نصلها يطول نحو ٢٥ سم. ويعرض نحو ٥ سم. صفحته العليا خضراء اللون، صفحته السفلى خالية البشيرة حملاء. راشات اوراقها شائكة تملو من ٣ الى ٤ سم. ازهارها الى الصفار الكبيرتي. تنوره يستمر من نيسان الى ايار.

٢٩٨١٢ - هَرَشَانْ كَبِير ٥، شَجَرَة اَلْحَمَص

Caragana arborescens (S). *Caragana arborescent*, *Arbre aux pois* (F).
 نوع من الهرشان. جنيتها تملو من مترين الى خمسة امتار. ورققاتها لاقامية العدد الذي يراوح من ٦ الى ١٢ نصلها تملو من ١٥ الى ٢٠ سم. وتعرض من ٢ الى ٥ سم. ازهارها ذهبية اللون، ثنائية التجميع او فردية. بزورها مأكولة وهي كالحصص شكلا وقدا وطعما || تنوره يستمر من ايار الى سزيان.



هرش البالية



هرش البقول



هرش الترس

هَرَضُ الشَّيْلَك - هِرْلَيْتَة



هرض الشيلك



هرض الصغر



هرض المرث



هرض النصف



هرض القطايات



هرضة الكوباي



هرغ

من نصال الازواق || السرة عند بلوغها الكمال تطول نحو ١٥ م. جسمها محبب الشكل ، مستنق القدم والمخسر . ثوبها الى الخضار الالاس تملوه ثلاثة خطوط صفر وخطان اسودان وتجميع سكي غير . رأسها اسود . منها وروايتها الى السرة الداكنة || طول الاكمال يستمر نحو ثلاثة اسابيع تقريبا الخادرة متدلية برجلها متفردة الحصىفة .

٢٩٨٢٦ - هَرْصِيَّات
Lycanides
فضيلة حشرات قرائية ترمف بالفتيات ، اطها .

٢٩٨٢٧ - هَرْط ، هَرْطَة
علم الحيوان المهزول انحصها لم النجبة الكبيرة المهزولة .

٢٩٨٢٨ - هَرْطَم ، غُودِيَا
Gaudinta (S).
Gaudinta (F). Gaudinta (E).

جنس نباتات معقودة التعريف على اسم الدلالة وفدين . وهي نباتات عشبية ، بيرة ، حولية ، من فصيلة التنبليات . انواعها المروقة قليلة العدد منها حوض البحر الابيض المتوسط || جميعها شتية ، سيقانها مائلة او خالية . عصفها سطح النصال الباحة الخضار . انغراسها سنبلي . ستيلاها متصبية .

٢٩٨٢٩ - هَرْطَمَان
هو الخراط البري ، الطبه .

٢٩٨٣٠ - هَرْطَة الكُوبَاي *
Gyropus ovalis (S).
حشرة جلدية دقيقة من فصيلة الحمرجات . طولها نحو ١ م. جسمها مبسط الشكل . زياتها وقاثيرها رباعية التركيب . مقاطعها عديدة الاطراف الحادة || تركب الكوباي وتؤديه .

٢٩٨٣١ - هَرْغِيَّات *
Gyropidae
فضيلة حشرات جلدية من رتبة القمليات . اجناسها وانواعها كثيرة البدن جميعها صغيرة القد مغلطة الجسم مقنعة الارصاد تنطقل على الحيوانات الجبونة من ذوات الور الجمل للثام .

٢٩٨٣٢ - هَرْغِس ، هَرْغِس *
Improllique (F).
الطم من النبات .

٢٩٨٣٣ - هَرْغ *
Nyctes nivea (S).

Harfang des neiges (F).
طائر من البويات وحارة اللذذيات . موطنه جيم الاصفاق الشمالية الباردة . طوله نحو ٧٠ سم . ويسكن لا نقل من ١٥٤ سم . لونه الى البياض الناصع في الطائر البالغ وهو متمش ويمش بالسرعة في الطائر الفرخ . رأسه صغير القد . عنقه محمر فاقر القرقص . ملهرو اسود الجسم والجرة . عيناه الى الحمرة الصنائية . ذنبه مسطيل الريش . ارساه وغالبه قصيرة القد كاسية . || يشق منه في تخاليف الصغور . انشاء تصع من ه الى ١٠ يضايت تحضها بتلوابة الذكر . قوته الجرد والفار والدين والمروم والسلك .

٢٩٨٣٤ - هَرْكَلِيَّة *
Heracleum (S). Berce (F).
جنس نباتات عشبية كبيرة القد من فصيلة الحميات . انواعها المروقة قليلة لا تتعدى الثانية . مهدا جبال اخيشة والهند والشرق الاوسط وارودة الفرية وامريكية الشمالية . منها النباتات المعمرة والمحولة . ابروتها ريشية مغلقة او كفية النصل . يستخرج من سيقانها واروقها وزادها

المهدب || ريقها صغيرة القد سوداء الرأس قبلو في ازل مهدا خضراء الجسم كيفية الحلب الاسود ثم ينفذ عليها ويحصل لونها الى الحمرة ويبلغ طولها نحو ١٢ م . تركب ثمار الزمان والدولة وقد تدمر في البحر .

٢٩٨٢١ - هَرْضُ الشَّيْلَك *

Polyommatus icarus (S).
فراشة من الهرض . جسمها اسطواني الشكل مخضور الوسط اطبل الثوب بطول نحو ٣٢ م . رواشن ذكورها الى الزرقاة البنفسجية يعطونها حنار اسود واطار من المهدب الابيض . رواشن انثاهن حنطية اللون صفراء المواج يعطونها تمشيش اسود وايض واجر ، اطارها ابيض المهدب || ريقها تركب اوراق مختلف النباتات انحصها الثقيل .

٢٩٨٢٢ - هَرْضُ الصَّعْتَر *
Polyommatus meleager (S).

فراشة من الهرض ، طولها نحو ٣٦ م . رواشن ذكورها الى الزرقاة البوارية الالامعة يعطونها حنار اسود وتهدب ابيض . رواشن انثاهن الى الطحلة الصفراء المواج يعطونها تنقيط اسود وتسنج اسمر . قواصها ذرق الانتشاب اطولها غير المهدب || ريقانها ناهمة تركب الصعتر وسائر النباتات البرية .

٢٩٨٢٣ - هَرْضُ العَرْن *

Polyommatus dolus (S).
فراشة من الهرض . جسمها بطول نحو ٤٥ م . رواشن ذكورها الى الزرقاة البوار المواج يعطونها حنار اسمر واطار من المهدب الابيض . رواشن انثاهن الى المخطي الاصهب المواج يعطونها تنقيط دقيق اسود ويعطونها حنار مهدب اغير . || ريقانها تركب اوراق وسنن المرث والنمص .

٢٩٨٢٤ - هَرْضُ الصَّعْصَة *
Polyommatus eros (S).

فراشة من الهرض . جسمها بطول نحو ٣٠ م . رواشن ذكورها الى الزرقاة النضوية المواج يعطونها حنار اسمر يتخلله بعض النقط اسود واطار مهدب ابيض . رواشن انثاهن حنطية اللون زرقاء المواج يعطونها تمشيش وتنقيط وتسنج واطار من المهدب الابيض . || ريقانها تركب معظم نباتات المراعي انحصها النمص .

٢٩٨٢٥ - هَرْضُ القَطَايَات *

Polyommatus coridon (S). Polyommatus coridon (E).
P. des légumineuses (F). Polyommatus coridon (E).
حشرة من فصيلة القنليات ورتبة حشرجات الاجنسة . موطنها يشمل معظم اقطار البلاد المحتلة الحارة من العالم القديم . فراشها جارية قوتها رقيق الازهار . سرقها تمشيش على اوراق القطايات وجوبها قيل ان تبلغ الادراك للثام || جسمها متوسط القد بطول نحو ١٣ م . بسطها نحو ٣٤ م . رأسها مبتدل الجرم . عيناه كيرتان . زياتها صرغياتان . جوشها ازرق اللون عند الذكر ، كستنية عند الانثى . بطنها كستني اللون عند الشقين || رواشن الذكر الى الزرقاة يعطونها مواج لفي وبنع كستنية وخطوط سود . رواشن الانثى الى السرة الكستنية يعطونها في الزوج الامامي تهديب ابيض تترفعه خطوط حنطية ، ويكتنفها الزوج الخلفي حزام نصفي اللون من النقط الحمر يتوسطها الاسود || لها جبل واحد في الحلق . تظهر الفراشة في حزيران . تسرح في الثمار : تماطل بد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتضع المكن ميعاديا على الصفحات السفل

ثوبه الى الزرقاء السمره المراج، يطنه اقل سمره واكثر ييانسا. يتميز بفكيه المستطيلين وزعانفه الصدرية المستعرة. قوته الاسماك والقشريات. || موطنه جنوب المحيط الاطلسي بين امريكة وافريقية.

٢٩٨٤١ - هرقلية القطب

Balaenoptera borealis (S). *Rorqual boréal* (F). نوع من المراكلة. طوله نحو ١٥ م. يتميز بصغر زعانفه الظهرية والصدرية. يعيش اسرابا كبيرة العدد. قوته السلك والقشريات والرخويات والحث. || موطنه القطب الشمالي وقد يقترب، في بعض فصول السنة، من شطوط ايسلندا والنرويج.

٢٩٨٤٢ - هرقلية حيرزوي

Balaenoptera rostrata (S). *Rorqual à rostre* (F). اصغر انواع المراكلة. طوله يراوح من ٧ الى ١٠ متر. اشتهر الى الكهنة السمره المراج. يطنه الى اليابس الكندر. زعانفه الصدرية سمر القواعد والاطراف بيض القسم الاوسط. قوته الاسماك دون سواها. || موطنه شمالي المحيط الاطلسي وبحار التروج وقد شوهد في المتوسط.

٢٩٨٤٣ - هرقلية معروف * و متاركة

Balaenoptera musculus (S). *Rorqual commun* (F). *Finback*, *Finner* (E). نوع من المراكلة. طوله يراوح من ١٨ الى ٢٠ م. ظهره احمر الى الاصفر الملاج. يطنه الى اليابس الكندر. موطنه المحيط الاطلسي وقد شوهد في المتوسط. يعيش جماعات. سره يحد من ١٥ الى ٢٠ نفرا. قوته السلك والقشريات يرافق اسراب الزنكة حيث تتجه.

٢٩٨٤٤ - هرقلوليات *

Balaenopteridae (S). *Balaenopteridés* (F). فصيلة حيوانات بحرية لبونة من مرتبة صفيحيات الاذنك ورتبة الحويثات || انواعها المعروفة عشرة، جميعها كبيرة الجرم ضخمة. اشتهرها الهركل الازرق والهركل الحزوي وهركل القطب والهركل المعروف الذي يدعى متارة وكبة الجنوب وكبة الخليج وكبة القطب المعروفة بجمل البحر.

٢٩٨٤٥ - هر

الهرم : ضرب من الحفش فيه ملحونه وهو اذله واشده اتبساطا على الارض واستطاحا. ا. م.

٢٩٨٤٦ - هرملية

Truite (F). هي التروته، من اسماك المياه العذبة. اطلها.

٢٩٨٤٧ - هرغوس *

Hemipteratus (S). *Hémiptérate* (F). جنس اسماك بحرية من شاكيات الزعانف وفصيلة القديتات. انواعها المعروفة قليلة العدد اعطتها بعض مناطق المحيط الاطلسي والبحر الابيض المتوسط || اجسامها وشعيرة الشكل، مستعجة، تقطع من ٤ الى ٦ سم. رؤوسها كبيرة، مستعجة طولها زعانف واطراف متباينة الاشكال عديدة. اشكالها كبيرة. زعانفها الظهرية والصدرية والقشرية كبيرة، كثير المناسخ الحادة. زعانفها الخلفية صغيرة، والذيلية مقبولة. انواعها الى الربعة الرصاصية المراج يملونها في ظهورها تتجبع اسمر. رؤوسها حمرها اللون فضلة والحطني الاسمر || حومها كاعنة الصنف.

نوع من الكحول جيد الصنف. وقد تستعمل اوراقها في صناعة مشروب خاص قريب الشبه من الجعة || اشتهر انواعها ما يلي.

٢٩٨٤٥ - هرقلية إيرانية *

Heracleum persicum (S). *Berce de Persé* (F). نوع من الهرقلية المعمرة القواعد العرف المستحب. مهدا بلاد ايران. يجلتها تملن من مترين الى ٣ متر. اوراقها مركبة، فصوصها ذرية. نصلها حلق الحصار الالسي. ازهارها كبيرة القد، يضاء اللون. اوراقها وعماها صنعية يستعمل منها صغر فاخر الصنف ويستخرج منها مشروب شائع الاستعمال. || تنورها يستمر من حزيران الى آب.

٢٩٨٣٦ - هرقلية زغبية، هرقلية صمغية

Heracleum pubescens, *H. gummiferum*, *H. speciosum* (S). *Berce duvetée*, *B. pubescente* (F). *Downy cow-parsnip* (E). *Flaumiges Herkuleskraut* (D). *Panace* (I). نوع من الهرقلية المعمرة القواعد العرف. مهدا بلاد القفقاز. يجلتها تملن من ١٢٥ الى ٢٥٠ سم. ساقها زغبية البهاء. اوراقها مركبة. وريقاتها كبيرة القد. نصلها شائك الحافة، اخضر الصغمة العليا، حلى السفل. ازهارها الى اليباس الكندر. || سويقها تنضج عند سحرها او لقلها مادة سكرية مأكولة يقال انها جزية الشف. ويستخرج منها ومن اوراقها مادة كحولية شائعة الاستعمال. تنورها يستمر من حزيران الى آب.

٢٩٨٣٧ - هرقلية صويغة

Heracleum lanatum (S). *Berce laineuse* (F). نوع من الهرقلية المعمرة. مهدا امريكة الشمالية. يجلتها تملن من ١٥٠ الى ٢٥٠ سم. ساقها وفروعها زغبية البهاء. اوراقها قلبية الفصوص المسننة الحافة. نصلها اخضر الصغمة العليا، ازغب السفل. ثمارها صغيرة القد. تنورها يستمر من حزيران الى تموز.

٢٩٨٣٨ - هرقلية نافعة *، سكتة لثيون، غيطل

Heracleum sphondylium (S). *Berce branche-urine*, *Patte d'ole* (F). *Meadow parsnip*, *Cow-parsnip*, *Hogweed* (E). *Heilkraut*, *Weissenherkuleskraut* (D). *Spondillio*, *Panace erculeo*, *Zampa d'oca* (I). اشتهر انواع الهرقلية واكثرها انتشارا. تتميز من النباتات الفسارة لان عناصرها القلبية حساسية تؤذي المواشي التي تاكل اوراقها. ومع ذلك فزراعها شائعة ويستخرج منها كحول جيدة الصنف ويصنع من اوراقها مشروب مستحب الطعم قريب الشبه من الجعة.

٢٩٨٣٩ - هرقلية

Balaenoptera (S). *Balaenoptère*, *Rorqual* (F). *Rorqual*, *Fin whale* (E). جنس حيوانات بحرية لبونة من الحويثات. انواعها المعروفة اربعة ومنهم من قال ١٢. جميعها كبيرة القد وشعيرة الشكل، ضخمة الرأس الذي لا يقل طوله عن الزنم الاول من الجسم. اعناقها مستطيلة التعدي. زعانفها الظهرية محببة الى الزرد. زعانفها الصدرية ذرية الاطراف. موطنها جميع البحار تجوبها في طلب الحصيد والحش.

٢٩٨٤٠ - هرقلية اذوق

Balaenoptera sibbaldi (S). *Baleine bleue*, *Rorqual de Sibbald* (F). اكبر انواع المراكلة واخصها جنة. طوله نحو ٢٦ م.



هرقلية إيرانية



هرقلية نافعة



هركل معروف



هروس



هرنة الشروش



هرندي



هرنوع اسفغ



هرنوع يرتقالي



هرنوع جامد



هرنوع غيث

٢٩٨٦٠ - هرنوع نبات

Hermandiaceae (S). Hermandiaceae (F). Hermandiaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين كثيرة المراتل منخفضة المبيض. اجناسها وانواعها قليلة العدد، اعطائها بعض المناطق الاستوائية من المالحين القديم والجديد || نباتاتها اشجار كبيرة، فراء. اوراقها مضقة، متعاقبة، جامدة، النصال القلبية الشكل او البيضاوي، ازهارها متكررة، تتجمع، طرفي الارتكاز. ازهارها صغيرة صفراء اللون او زينة. ثمارها مسهلة، اغشائها صناعية.

٢٩٨٦١ - هرنوع، هرنوع، بوليطس

Boletus (S). Bolet (F). Boletus (E).

جنس فطور من فصيلة السيات الشثلية. انواعه كبيرة العدد تألف الفنايات والاحراج القليلة انحصار حراج الستيدان. بعضها مأكول مستحب الطعم وبعضها جعلي هار او كثير الاذى. اشكالها واجناسها واولاها مختلفة، جميعها قطنوية المسائل الجلمدة الملمدة || اعرف انواعها وأشهرها ما يتبع.

٢٩٨٦٢ - هرنوع اسفغ

Boletus aereus (S).

Bolet bronzé (F).

نوع من الهرنوع المأكول. يعيش ويتكاثر في التربة. ساقه غليظة اللد، وريدة اللون. صفاته كبير اللد، فارش القطنوة، كسني اللون، اسفغ المالح. مكسره ابيض اللون ينحرف الى الوردي عند تأكله من الهواء.

٢٩٨٦٣ - هرنوع البقر

Boletus bovinus (S). Bolet des boeufs, Albarelle (F). Boletus bovinus (E).

نوع من الهرنوع ينتمي الى فصيلة السيات الشثلية. ينتشر من الفطور المأكولة. يعيش على اشجار الخور والكتنة || جلعه اسطوانية الساق المنصبة. صفاته كبير، فارش، جامد اللحية، حنلي اللون، اصفر المالح. مكسره الى البياض الشبي ينحرف الى الوردي عند تأكله من الهواء.

٢٩٨٦٤ - هرنوع برتقالي

Boletus aurantiacus (S). Bolet orangé (F).

نوع من الهرنوع المأكول السحب الطعم. يعيش على جذور الستيدان. ساقه غليظة. صفاته كبير. اللد، يرتقالي اللون، وزن من ٦٠٠ الى ١٠٠٠ غرام. مكسره ابيض اللون ينحرف الى الوردي عند تأكله من الهواء.

٢٩٨٦٥ - هرنوع جامد

Boletus scaber (S). Bolet rude, Roussille (F).

نوع من الهرنوع المأكول السحب الطعم. يعيش على جذور الستيدان. جلعه يشي الشكل، صفاته كبير اللد، جامد اللحية، حنلي اللون، اطبل المالح. مكسره ابيض اللون يبقى على حاله او ينحرف قليلا الى الوردي عند تأكله من الهواء.

٢٩٨٦٦ - هرنوع غيث

Boletus luridus (S). Bolet pernicieux, B. bième (F).

نوع من الهرنوع الجسام الملمدة، صريف الطعم، مر اللذان. ساقه غليظة حراء البشرة. صفاته كبير القطنوة القارضة، حنلي اللون، اسفغ المالح. مكسره ابيض اللون ينحرف الى الزرقه عند تأكله من الهواء.

Pyramidal (F).

نمت وسمي يطلق على ما كان شكله يشبه الهرم.

٢٩٨٤٩ - هرنوع

هو الكركدن الابيض، اعطيه.

٢٩٨٥٠ - هرنوع

٢٩٨٥١ - هرنوع

جنس فطور مجهرية من الدغيات وعسيلة الطحيسات. جميعها مفطور التركيب. جبرها الكنديسية سيمية الانظام، متعققة الاطراف، ملونة الملمدة. || انواعه قليلة العدد تعيش على المواد العضوية والنباتية السائرة الى الانحلال.

٢٩٨٥٢ - هرنوع

Hermella (S). Hermella (F). Hermella (E).

جنس يدان حلقية فصائية من فصيلة الهرمليات انواعها المعروفة عديدة تعيش في رمال الشواطئ التي لا تنقطع منها المياه، ضمن انايب هريوية الارتكاز تضم فروعها بملاسها الرامية الكثيفة المسد.

٢٩٨٥٣ - هرنوع

Hermellidae (S). Hermellidae (F). Hermellidae (E).

فصيلة من الديدان الحلقية النقصية. اجناسها المعروفة قليلة العدد موطنها رمال الشواطئ البحرية في الاقاليم الجبلية والمعتدلة الحرارة || اشهر اجناسها الهرمية.

٢٩٨٥٤ - هرنوع

هو القاقم، حيوان من السرايب.

٢٩٨٥٥ - هرنوع

٢٩٨٥٦ - هرنوع

الواحدة هرنوع. جنس حشرات جلدية من فصيلة الهرمليات. انواعها عديدة تركب الطيور الجوارح. جميعها ذرية اللد، مستطيلة الجسم والرأس، دقيقة الانساج، متباعدة الحلب النظامي الارتكاز. || اعرف انواعها هرنوع الشروش.

٢٩٨٥٧ - هرنوع الشروش

Ricinus (S). حشرة جلدية من الهرم. طرفا نحو ٣ م. رأسها مبط المقدم، تأكلها قوية، زياناها جمدة. بطها بيض الشكل. || تركب الشراشير والمصانير الفريدة فتؤذيها وقد تقتضيها.

٢٩٨٥٨ - هرنوع

Ricnidae فصيلة حشرات جلدية من رتبة القلذيات. انواعها عديدة. اجسامها دقيقة، مستطيلة الشكل، مفلطحة، طولها ٣ الى ٣ م. تعثر الطيور الجوارح انحصار الشروش والمصانير الفريدة || اشهر اجناسها الهرم.

٢٩٨٥٩ - هرنوع

Hernandia (S). Hernandia (F).

جنس نباتات مجهرية من فصيلة الهرندييات. النوع المعروفة سبعة جميعها من اشجار المناطق الاستوائية. اوراقها متعاقبة، متعققة، قليلة النصل الجلمدة المصنعة. ازهارها متكررة تتجمع، طرفية الارتكاز. ثمارها مسهلة اغشائها صناعية. تقع اوراقها منشط شايق يستعمل حقنًا بالسرم.

٢٩٨٧٤ - هَرْتِيَات ، قِيدِيَات (F). Amentacées (F).

Amentaceous plants (E). هي النباتات التي تكون أزهارها الذكرية على شكل حريرة أو قدة لذلك فالجوزيات والبقصيات والسنديانات إلى آخره جميعها من هَرْتِيَات .

٢٩٨٧٥ - هَرْتِيَاع (F). Feuilles mortes (F). Dead leaves (E).

الورق تنفضه الريح فيتناثر على الأرض .

٢٩٨٧٦ - هَرْتِيَرَة ، قِيدَة (F). Chaton (F). Setting of a gem (E).

نظام هجرة قوائم سنبلة مركبة من أزهار وسيدة الشق .

٢٩٨٧٧ - هَرْتِيَصَة (F). Mare d'eau stagnante (F). Pool (E).

مستنقع الماء الساكن .

٢٩٨٧٨ - هَرْتِيَمَة (F). Pelcaria (S). Peltaire (F).

جنس نباتات برية حولية أو معمرة من فصيلة البليبيات . أنوارها المعروفة أربعة أعطانها الشرق الأوسط وأروبة الشرقية . أوزانها متعاقبة . أزهارها عنقودية التجميع ، طرفية الأذنكاز . ثمارها غريدلية مبطنة || أشهر أنواعها هريمة الثوم .

٢٩٨٧٩ - هَرْتِيَمَة الثُوم * (F). Pelcaria alliacea (S).

Peltaire alliaria (F). Shiefdwort (E). Knoblauchscheidenkraut (D). Peltaria (I).

نوع من الهريمة المبولة المسومة . أوزانها متعاقبة يغبية الشكل حاضنة ، فصلها حايق الخضار البحري ، ناشر الاصباح . أزهارها يضاء اللون || أوزانها ثوبية الرائحة عند المس . يقال أنها طيبة تغيد المعدة وتظهر الأسماء .

٢٩٨٨٠ - هَرَاو (F). Luscinia, Philomela (S).

Rossignol (F). Nightingale (E). جلس طير من فصيلة الشغليات . أنواره ثلاثة الهزار الأشرق والتندليب والزقة . أجسامها صغيرة القد مستطيلة الشكل . مناقبها دقيقة مدنية الملاحظ . أجنتها وأذنانها متوسطة الحجم . أرساغها طويلة . أصابعها بخلة . أطافرها ضيقة . ألوانها جميلة الألوان المتعددة التماكية || جميعها فريدة تألف المواقع الربطية . تجوب البلاد في طلب الحضيف وللش . تنش في الإذفال وقد تركر شعبها على الحضيفين بين الشب . قوتها الحشرات .

٢٩٨٨١ - هَرَاو أَشْرَق * (F). Philomela major, Luscinia luscinia (S).

Rossignol (F). Nightingale (E). Progné (F). Sprosser, Thrush nightingale (E).

نوع من الهزار . تفرقة قريبة لشبه من زققة التندليب إلا أنها لا تقاها بالرقعة ويحسن الإلحان وقدمادها || طوله نحو ١٨ سم . ثوبه إلى الخلفي الأصهب المواج . صدره وبطه إلى البياض الأكلر . أجنته منمشة بالاسمر . مناقره حنتلي الملقط الأعل . اصفر الأسفل . ساقه وأصابعه إلى الصفرة الخفيفة || قوته الحشرات . ينش في الإذفال . انشاء تقع من ٤ إلى ٥ يبيضات تحضنها بمناوبة الذكر .

٢٩٨٨٢ - هَرَاو غَرِيد (F). Luscinia luscinia (S).

٢٩٨٨٣ - هَرَاو جَسَان (F). Luscinia luscinia (S).

٢٩٨٦٧ - هَرْتُون لَئِيد * ، بِلِيَطَس كَمَة (F). Boletus edulis (S).

Bolet. comestibilis, Cèpe, Ceps (F). Esculent boletus, Polish mushroom (E). Edelhöhrling (D). Boletus comestibilis (I).

أشهر أنواع الهرنون للأكل . لذيد الطعم ، مستحب المذاق يعيش ويتكاثر على التربة في ظل الأشجار الحرجية اغصبا السديان . صفاته قلنصري الشكل ، كبير القد ، جامد الصلبة ، لونه إلى البياض الأكلر الأصفر المولج . مكسره أبيض اللون ينصرف إلى الوردي عند تأكله من الهواء .

٢٩٨٦٨ - هَرْتُون نِيلِي * (F). Boletus cyanascens (S).

Bolet. indigotier, B. bleusant (F).

نوع من الهرنون الجمال المؤذي المر المذاق . ساقه خفيفة حمراء اللون . صفاته كبير القد قريب الشبه من صفات الهرنون الأسفع . مكسره أبيض اللون ينصرف إلى الزرق النيلة عند تأكله من الهواء .

٢٩٨٦٩ - هَرْتُونِي * ، هَرْتُونَة (F). Apera spica-venti (S).

Agrostide des champs, Jouet du vent, Epi du vent (F). Corn grass, Silky bent grass. Wind grass (E). Windhalm, Echter Windhalm (D). Spica venti (I).

نبات عشبي بري مرعوي معمر من فصيلة النجيليات . يكثر بين الزروع وفي الأراضي البرية المنساعة .

٢٩٨٧٠ - هَرْتِينِس * (F). Heliornis fulica (S).

Héliorne (F). Heliornis (E).

طائر وسيد الجنس والنوع من فصيلة التفلقيات . قريب الشبه بالنعاس والفرقة . يألف المستنقعات والبحيرات وصفات الانهر . قوته الحشرات والنباتات المائية || جسمه متوسط القد ، يطول نحو ٣٠ سم . يتميز بطول عنقه ويقصر ذنبه المستدير . رأسه مثقل الجرم . متقاده ضليع مدبب الطرف . جناحا فارشان . لاسفان . ساقه قصيرتان . أصابعه مستطيلة مخبئة تمكنه من السير على الأعشاب المائية . ثوبه العلوي متداخل الاسود والاسمر . ثوبه السفلي إلى البياض الأصفر . رأسه وعنقه بلون الصفر تملوها جذة سواد أول تمتد من قاعدة التقاد إلى الرءاء . وجدته ثانية تمتد من طرف العين إلى الظهر || يندش عشه على ضفاف الماء بين القصب والاسل . الانثى تحضن وعددها نحو ١٢ بيضة يتينا الذكر يزين لها الغذاء . الترخيم يستمر نحو ثلاثة أسابيع .

٢٩٨٧١ - هَرْتَرَة (F). Bèlement (F). Bëasting (E).

صوت الشان .

٢٩٨٧٢ - هَرْتِير (F). Pemphéride (F).

جنس اسماك بحرية من شائكات الزعانف . ألوانها المعروفة قليلة العدد ، أعطانها بمجاو البلاد الحارة . أجسامها صغيرة القد مضطمة . ميرتها مستديرة كبيرة ، أثولها إلى السرة . ظهورها ينسجية المواج . بطونها فضية . لحويها مأكولة تعتبر من الاصناف المادية .

٢٩٨٧٣ - هَرْتِي (F). Granier (F).

Granary, Corn-loft (E).

هو الابار ، مستودع رحب الجوانب تجمع فيه الحبوب . ج . أمراء .



هَرُون لَئِيد



هَرُون نِيلِي



هَرُونِي



هَرِينِس



هَرِيمَة الثُوم



هَرَاو أَشْرَق



هَزَان



هَسَس جِل



هَسِيرُ الْهَزَايَاتِ



هَسِيرُ الشَّيْكَ



هَسِيرُ الْعَرَسِجِ



هَسِيرُ الْفَرَايِسِ



هَسِيرُ الْقَرْطُمِ

٢٩٨٩٠ - هَسِيرُ ٥

Hesperia (S).
جنس حشرات من فصيلة الهسيريوات. أنواعه المروفة كثيرة العدد اما الصادرة قليلة. فرائدها صغيرة القند طولها ٢٣ الى ٢٣ م. اجسامها مودية الشكل. اوتارها الى السمرة. دراهبا موزكة ومبقجة. مكها كروي الشكل تنحصر على صفحات الاوراق السفلى. اشهر انواعها واشهرها ما يليق.

٢٩٨٩١ - هَسِيرُ انْخِيزَانِيَاتِ ٥

Hesperia mahve (S). Plain-chant (F).
حشرة من الهسير. فرائدها صغيرة القند طول نحو ٢٣ م. ثوبها الى السمرة السوداء تملوها مابة نغية. دراهش ذكورها واناثها قريبة الشبه لا يفرقها سوى الساع التيقيق الابيض في الذكور. يكثر وجودها في نيسان وايار وفي تموز وآب. يرقاتها مؤذية تركب الخيازيات والنباتات والشجك والبرسيم.

٢٩٨٩٢ - هَسِيرُ الشَّيْكَ ٥

Hesperia serrata (S).
حشرة من الهسير. فرائدها تطول نحو ٢٢ م. ثوبها الى السمرة الخلفية. دراهش ذكورها الى العلطة الخلفية يتخللها وتيقيق اخضر. دراهش اناثها كستية اللون يتخللها تجلجج وتيقيق ابيض. يكثر وجودها من تموز الى آب. يرقاتها مؤذية تركب اوراق الشجك.

٢٩٨٩٣ - هَسِيرُ الْعَرَسِجِ ٥

Hesperie des ronces (F). *Hesperia sao* (E).
حشرة من فصيلة الهسيريوات وربة حشرقيات الاجنحة. موطنها بعض اصقاع البلاد المعتدلة الحارة من العالم القديم. فرائدها واسعة قوتها رقيق الانوار. سربها تعيش على اوراق البرسيم والبلان. جسمها صغير القند يطول نحو ١٠ م. بسلها نحو ٢٣ م. راسها كستي اللون. عيناها كبرتان. زياتها صانديليان. جوتها ويلها الى الكستي القاتم. دراهش الذكر الى السمرة الكستية تملوها رشفة بيضاء. دراهش الانثى اقل لمة وتوريقا. ما جيلان في الخريف. تظهر فراشة الجيل الاول في نيسان وتظهر فراشة الجيل الثاني في تموز. تخرج في التبار. تماثل بده ظهورها بنحو اربعة اسابيع وتفتح المكن مبعادي على امان الاوراق ونصالحا. رائحة منه بلوطها الكمال تطول نحو ٢٠ م. جسمها اسطواني الشكل. مائل القشار. اطول اللون، اصفر اللوح، جوي الرأس، اسمر اللبد والرواسب. طوره الاكمال الذي يستمر في الابل الاول نحو ١٥ يوما، يستمر في الجيل الثاني نحو ١٨ اسبوعا وينتضي ضمن صلجة تحميها السرعة بين الاوراق.

٢٩٨٩٤ - هَسِيرُ الْفَرَايِسِ ٥

Hesperia proto (S).
حشرة من الهسير. فرائدها تطول نحو ٣٠ م. ذكورها واناثها متساويان في القند. ثوبها اسمر كستي الخواج. دراهشها موزكة ومبقجة وهي في الذكور زاهية الالوان المركزة على الخلفي الاخير. يكثر وجودها من حزيران الى تموز. يرقاتها تركب الفراسين وشار النباتات الخيانية.

٢٩٨٩٥ - هَسِيرُ الْقَرْطُمِ ٥

Hesperia carthami (S).
حشرة من الهسير. فرائدها تطول نحو ٣٠ م. ثوبها الى

٢٩٨٩٤ - هَزَان * *Ophthocomys* (S). Hoazin (F).

جنس طير من فصيلة الراسيات. انواعه قليلة تتميز بارتفاعها المسجونة التي تشبه راحة الكتيس. جميعها مستطيلة القند الرقيق، قوية الخنثار، قزمية الرأس، نحيلة المنق، مستدرة الاجنحة، مستطيلة الذيل، اوتارها الى السمرة السوداء يملوها تأثير ابيض وتوشج وتوشج. عنقا وجوتها الى الفياض النقي. تالفت الاحراج. تعيش اسراب كبيرة. قوتها النار. تشرب عشا. في الاغصان والاشجار المنقمة، فوق الماء. اناثها تبيض نحو ٤ بيضات تحضنها وسدها اربعة اسابيع.

٢٩٨٩٥ - هَزِيرُ ٥

من اسماء الاسد المشهورة.

٢٩٨٩٦ - هَزْرُوجُ ٥

Pied du champignon (F).
هو ساق الفطر.

٢٩٨٩٧ - هَسَّاسُ ٥

Pelidna (S). *Pelidna* (E).

جنس طير من دجاجيات الارض. انواعه المروفة قليلة العدد. جميعها من القواطع. اجسامها صغيرة القند، قريبة الشبه من الجهلول. اوتارها الى الربة الخلفية، تيقق وتريقش بالاسمر في الظهر والجناب، تفرز وتيقض في المنق والجوش والابطل والبطن. مناقيلها مستطيلة، دقيقة. اذنانها قصيرة. اجنتها لاسفة. قوتها الحشرات والديدان والحزوز والرعويات. اعرف انواعه واشهرها الحساس الجبلي.

٢٩٨٩٨ - هَسَّاسُ جَبَلِيٌّ * *Jehel el shari*

Pelidna alpina, *Tringa subarctica* (S).

Pelidne alpina, *Bécaisse cocoril* (F).

Curlew-Sandpiper (E).

طائر من الحساس. اصطناعه قسيمة الاربعاء تحت من اليابان الى اوردية. يصيفه جبال البلاد المعتدلة الحارة. مشتاة ساحل البحر الابيض المتوسط والبحر الاحمر ويصر والسودان والحبشة. جسمه صغير القند. طوله نحو ١٦ سم. ثوبه الى الربة الخلفية. ظهره عايق اللون يملوه تيقيق اسمر واخضر. عنقه وجوتته ويطنه الى الفياض الاخير يقيم بين التني في المصدر. متقاده اسمر اللون، رصاصي الخواج. عيناها الى السمرة الكستية. يذثن في افحوص قليل المنق، صاخي الشكل، يبطه بانم الحاشاش. حشسته من ٣ الى ٤ بيضات تورخها الانثى دون الذكر نحو ١٧ يوما.

٢٩٨٩٩ - هَسِيبَةُ ٥

Hipse (S).

Hipse (F). *Hipse* (E).

جنس حشرات خافضة من حشريات الاجنحة وفضيلة الضاربات. انواعها المروفة نحو ٢٠٠ منتشرة في معظم مناطق البلاد الاسرائيلية والحارة والمعتدلة الحارة من العالم القديم. اجسامها صغيرة القند طول من ٧ الى ١٠ م. دروسها صغيرة. ميزتها بارزة. قوتها الاستشعارية عجيبة منتصبة. كراسلها وامدادها وحواشي بطرها مدرزة بالشوك اللدني الحاد. امدادها شبه جنية الشكل مستديرة الخواش الاثف. اوتارها متباينة الالوان والمخاطبات، يكثر فيها الاسود وشفتها ثم الجوي ثم الكستي والقي.

(١٦٩٥-١٧٣٣) أنواعها عديدة تنتمي الى فصيلة القنويات. اصطلحاً البلاد الامريكية. جميعها اصاب سبروتية ممرة، اوراقها متقابلة. ازهارها قلبية الشكل، مستطيلة المالحق || اشهر انواعها ما يتبع.

٢٩٩٠٣ - هسپيرتنة أرجوانية

Houstonia purpurea (S). *Houstonie purpurea* (F).
نوع من المستوية. ساقها خضراء تملو من ٢٠ الى ٤٠ سم. اوراقها بيضوية النصل، صغيرة القد، ثلاثية او خماسية الفلوع. ازهارها ارشوانية اللون، هامة الارتفاع. تنورها يستمر من ايار الى ايلول.

٢٩٩٠٤ - هسپيرتنة تركشاهية

Houstonia corulea (S). *Houstonie-bleue* (F).
نوع من المستوية. ساقها خضراء تملو نحو ٢٠ سم. اوراقها بيضوية او احليمية النصل، صغيرة القد، فردية الفلوع. ازهارها الى الزرقاء البنفسجية الملاج. ازهارها يستمر من نيسان الى تموز.

٢٩٩٠٥ - هسپيرتنة صخرية الورق

Houstonia serpyllifolia (S). *Houstonie à feuilles de serpolet* (F).
نوع من المستوية. ساقها خضراء تحيلة تملو من ٨ الى ١٥ سم. اوراقها كاريك الصخر البري شكل وقد ولوا. ازهارها زرقاء اللون، فردية التجميع. تنورها يستمر من ايار الى آب.

٢٩٩٠٦ - هسپيرتنة

Hister (S).
جلس حشرات مفترسة من فصيلة الحسريات. انواعها عديدة، جميعها صغيرة القد طويلاً يراوح من ١٥ الى ٢٠ سم. انواها الى السواد اللامع يملو تنقيط وتبييض اخر || رقاها قانصة مفترسة لا تمت من كل حشرة تستطيع اليها سيلاً. اشهر انواعها :

- هسپيرتنة احمر الفعد *Hister purpurascens* (S).
- هسپيرتنة احمر النقطة *Hister uncinatus* (S).
- هسپيرتنة دهاقي النقط *Hister quadrimaculatus* (S).
- هسپيرتنة لا متساوي الفك *Hister inaequalis* (S).

٢٩٩٠٧ - هسپيرتنة أحمر الغمد

Hister purpurascens (S). *Hister pourpré* (F).
Hister purpurascens (E).
حشرة نائلة جامة من فصيلة الحسريات وريقة غدييات الاجنحة. تألف المراعي وحقول الطرقات والمراعي القريبة من العمران وكل مكان يجتر فيه البروت والزبل والقمامة || جسمها صغير القد يطل نحو ٥ سم. ثوباها الى السواد المالحق غمداء الى الحمرة الارشوانية، رأسها صغير الحجم. عينها صغيرتان. زباناها صلبتان، ظهرها سداسي التخديع الدودي، يلحف ثلاثة ارباع البطن. ارساها خماسية النعل || لها جيل واحد في الحول. تظهر الحشرة الجبلانة في اوائل الربيع وتعيش حتى اواخر الصيف. تسافد في اوائل آب وتضع المكن في اكرام الزبل ... || البرقة عند كمال نموا تقطو نحو ١٢ سم. جسمها شبه اسطواني الشكل، اغير اللون، كسني الرأس والشرج والرواجب، مشلل الجانبين، مهذب النعل.

السمة السوداء الملاج. رواشن ذكرها جرداء اللون، خضر الزراكش والنايبيج والتجاذيع. رواشن اناتها الى السمة يملوها تبييض ابيض. يكثر وجودها من ايار الى آب. رقاها تركيب القرمط وسائر الحيازات.

٢٩٩٠٦ - هسپيرتنة، زهرة الخبث

Hesperantha (S). *Hespéránthe* (F).
Hesperantha (E).
جنس نباتات عشبية دوفسية من فصيلة السوسنيات. منتبها بعض مناطق افريقية الجنوبية. اوراقها ثنائية الصف، ضيقة النصل، ازهارها سنبل التجميع. ازهارها صغيرة القد، قزاحة البرق المطري تفتتح عند غروب الشمس || انواعها المعروفة قليلة العدد، اشهرها التالية :

٢٩٩٠٧ - هسپيرتنة زبابة

Hesperantha pilosa (S). *Hespéránthe velue* (F).
نوع من الحسپيرتنة. ساقها شرابية ترتفع من ١٥ الى ٣٠ سم. اوراقها خلية وزقية، ازهارها سنبل التجميع. ازهارها صغيرة القد، يضاء اللون من الخارج والداخل || تنورها يستمر من نيسان الى ايار.

٢٩٩٠٨ - هسپيرتنة قرفلية العرف

Hesperantha cinamomea (S).
Hespéránthe à odeur de cannelle (F).
نوع من الحسپيرتنة. ساقها شرابية ترتفع من ١٥ الى ٢٠ سم. اوراقها جرداء خضراء السطح. ازهارها سنبل التجميع. ازهارها صغيرة القد، قرفلية البرق. يتلاتها الحارضية الى الحمرة الحمرة. يتلاتها الداخلية يضاء اللون || تنورها يستمر من نيسان الى ايار.

٢٩٩٠٩ - هسپيرتنة محجنكة

Hesperantha recurvata (S).
Hespéránthe recourbée (F).
نوع من الحسپيرتنة. ساقها شرابية شيطعة ترتفع من ٣٠ الى ٥٠ سم. اوراقها مقعرة السطح، جرداء النصل. ازهارها سنبل التجميع. ازهارها كبيرة القد محجنكة الاناييب، الى التلات الحارضية، يبيض الداخلية || تنورها يستمر من ايار الى حزيران.

٢٩٩٠٠ - هسپيرتات

Hesperilidae (S).
Hespérilés, Hespérilées (F). *Hesperilidae, Common Skippers* (E). *Dickcopfalter* (D).
فصيلة حشرات من حشرليات الاجنحة. اجناسها وانواعها كثيرة العدد. جميعها صغيرة القد. رؤوسها خليقة. قربها الاستشادية دقيقة منفرجة. ارجلها الامامية تامة النمو. بطونها كبيرة. مكها قلنسوي الشكل. رقاها حارية او مبشرة الحلب، مستدة الاطراف، خضراء السط. خادراتها تلتصق بفلاف يقيق الصلصة متين الحياك يشبه الشرفة تسجبه بين الاوراق المتشابكة || اشهر انواعها واصرها بالانقصاد الزراعي الحسپير والثرزين والياوروز واليانوف والكركرود.

٢٩٩٠١ - هسپتة

Funkle (F).
هي الفسكة، نبات من الزنبقيات. اطباها.

٢٩٩٠٢ - هسپيرتنة

Houstonia (S).
Houstonie (F).
جلس نباتات معقودة التعريف على اسم العلامة حسن



هسپتنة



هسپير



هسپير احمر الغمد



هليونير

الاسفر . ثماره جزئية اللون . اغاليجه مستطيلة ، قليلة
التخانة ، ذكية الطعم ، قاهرة الصنت .

٣٠٠٠٧ - هليون عكاش

Asparagus scandens (S). *Asperge grimpante* (F).
نوع من الهليون التريبي السرح . ساقه متسلقة . فروعه
تحمل اقية الالتشاب مثدية . ردياته ثلاثية التجميع ،
تصلها ميطة الصفصه يطول من ٦ الى ١٣ سم . ازهاره
الى الخضار المايق . ثماره حراء اللون وسيدة البرزة .

٣٠٠٠٨ - هليون معروف * هليونيس * هليونيس

Asparagus officinalis (S). *Asperge commune* (F).
Common asparagus, *Sparrow-grass* (E). *Echter*
Spargel, *Asparagus* (D). *Asparago comune*, *Sparago*
cultivato, *Asparago* (I).

هو الهليون البقل المشهور . ضرره واساره الزراعة
عديدة . جميعها مأكولة الاغاليج . اربوته قهيرة . اغاليجه
غلظة . ساقها سرعة فراء تطول من ٦٥ الى ١٥٠ سم .
ردياته حزنية التجميع تدم من ٣ الى ٦ . تصلها خيل
الشكل يطول من ٦ الى ١٥ سم . ازهاره خضراء اللون .
ثماره الى الحمرة المايقة .

٣٠٠٠٩ - هليونيات ، هليونيات

Asparagus سيط من فصيلة الزنبقيات ، اشهر اجناسه الهليون .

٣٠٠١٠ - هليونين ، آسفرجين ، آسفرجين

Asparagine (F). *Asparagin* (E).
مادة حيوية قابلة التبلور عادمة المرف تاقية اللحم لاتلوب
في الكحول ، تلويب في الماء ، قتالي وفي الحواضس والقتل .
توجد في صارة معظم النباتات تكثر نسبيا في اغاليج
الهليون . تستعمل لدر البيل .

٣٠٠١١ - هلياشة

Platyzepe (S). *Platyzepe* (F). *Platyzepe* (E).

جنس حشرات من فصيلة الهاشيات رتبة ذوات الجناحين .
انواعها المروفة نحو ٥٠ منتشرة في معظم اقطار البلاد
المتحدة الحرارة || اجسامها صغيرة تطول من ٣ الى ٥ سم .
رؤوسها مستضخمة . عينها متلاصقة عند الشقين . قرونها
الاستفهامية قصيرة ، ثلاثية الفصل ، لتتهي بنسيلة
دقيقة . اعظامها قصيرة . ملاصقا وسيدة العقلة . كولسلها
شبه مبرقة ، شبه الملب . بطونها بارزة الحرد ، مبرقة
الملب . رواشها كبيرة ، قسطانية التخفيف ، قراشها
فسيطة || تألف المواقع الدفلة والحراج المبرقة الانجاب .
يرقاتها عاردة تعيش على الفطور .

٣٠٠١٢ - هليشيات

Platyzepeidae (S). *Platyzepeidae* (F). *Platyzepeidae* (E).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وازواعها
المروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم اصقاع البلاد المتحدة
الحرارة . تألف المراعي والمروج والنباتات || اجسامها
صغيرة تطول من ٢ الى ٥ سم . رؤوسها مستضخمة . عينها
متلاصقة عند الشقين . قرونها الاستفهامية قصيرة ، ثلاثية
الفصل . ملاصقا وسيدة العقلة . اعظامها قصيرة .
شفاها السفلى لاقعة او ثاقبة ، كولسلها شبه مبرقة
الشكل ، مبرقة الملب اللقي . رواشها كبيرة ، شفاها
بطونها مردنية ، خلية القشار . قواشها قياسية || يرقاتها
ميطة تعيش على بعض انواع الفطور وعلى المواد النباتية
الجزئية الاغوال || اشهر اجناسها الهاشة .



هليون معروف

اوراقها صفصية . يكثر وجودها في المناطق وفي الموانع
الرطبة .

٣٠٠٠٠ - هليونير

Héliomètre (F). *Heliometer* (E).
هو المبرام ، جهاز يستخدم في قياس قطر دائرة الاجرام
الماوية .

٣٠٠٠١ - هليونين ، هليونين

Asparagus (S). *Asperge* (F). *Asparagus* (E).
جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة الزنبقيات . انواعه
المروفة نحو ٥٠ جميعها احشاش قهيرة ممررة . معظمها
بري وبعضها زراعي وتريبي . ساقها مستقيمة وعارضة
ومتدلية . ازهارها رديية . ازهارها تحمل خضراء اللون ،
ثمارها عنية || اعرف انواعها واشهرها ما يتبع .

٣٠٠٠٢ - هليون اجعد

Asparagus crispus, *A. decumbens* (S). *Asperge cré-*
pue (F).
نوع من الهليون التريبي . ساقه دقيقة متسلقة حترجة كثيرة
الفرع المتوسطة المتدلية العادة الشوك . ردياته ثنائية
او ثلاثية التجميع ، تصلها جامد الصفصه يطول من ٤ الى
٧ سم . ثماره حراء اللون مداسية البزور .

٣٠٠٠٣ - هليون بري ، هليون شالك

Asparagus acutifolius (S). *Asperge piquante*, *A. sau-*
vage (F). *Wild asparagus* (E). *Strauchspargel* (D).
Asparago salvatico, *Sparagio agreste*, *Corruda* (I).
نوع من الهليون البري يكثر في المناطق الجبلية . ساقه
تحمل مستطيلة متساوية . فروعه قليلة متعاعدة . ردياته
ضمية التجميع ، حزنيها تدم من ٤ الى ١٢ . تصلها جامد
الصفصه ، شالك العضة ، يطول من ٥ الى ٦ سم . ازهاره
مطرية المرف . ثماره سواء اللون . اغاليجه صغيرة القد
تحمل القدر مأكولة .

٣٠٠٠٤ - هليون ريشي

Asparagus plumosus (S). *Asperge plumosae*, *A. plu-*
mée (F). *Asparagus fern*, *Feather asparagus* (E).
Zierapargel (D). *Asparago filiforme*, *A. plumoso* (I).
نوع من الهليون التريبي الدائم الاخضرار . ساقه فراء
شائكة ، فروعه ريشية التركيب غزوية الشكل ، ردياته
حشرقية دقيقة شائكة تطول من ٣ الى ٦ سم . حزنيها تدم
من ٦ الى ١٢ || ضرره واساره عديدة جميعها تريبية
تزرع في المرائن .

٣٠٠٠٥ - هليون سرخسي

Asparagus filicinus (S). *Asperge fougère* (F).
نوع من الهليون التريبي السرح . ساقه متضخمة تطول نحو
١٥٠ سم . فروعه اقية الالتشاب والمجلوس شكلها
كالسرخس . ردياته عجنبة لاقسية الطول حزنيها تدم
من ٣ الى ٥ . ازهاره الى الخضار الاسفر . ثماره رديية
اللون .

٣٠٠٠٦ - هليون ضمي

Asparagus verticillatus (S). *Asperge verticillée* (F).
نوع من الهليون البقل . مهده التفتاز . اقليمه البلاد
الباردة . ساقه لينة غشوية تطول نحو ٢٥٠ سم . ردياته
ضمية التجميع حزنيها تدم من ٣٠ الى ٤٠ . تصلها جامد
الصفصه يطول من ١٢ الى ٢٥ سم . ازهاره الى الخضار

٣٠١١٣ - هَمَاق مَرَقُوش *

Cinclosoma punctatum (S).
Cinclosoma punctu (F).



هَمَاق مَرَقُوش

طائر من الجوارح سنيات المناسير ينتمي الى فصيلة
الشحروبديات بأفئ الغابات والاشراج القريبة من الحدائق
والخنادق . قوته الحشرات الصغيرة وتأثر على اختلاف
اجناسها باستثناء الموز والبرتقال || جسمه متوسط القد
يطول نحو ٢٤ سم . ثوبه الى الطحلة يعلوها موج اشجع
ورقشة سوداء . راسه مبعاج بالابيض . عسراء الى البياض
الناجي . زوره الى الجؤرة . بطنه الى القيرة المنسمة
بالصبغة . ذفيه محتدل الطول ، ضيق الطرف . قائمته
رديحتان دقيقتان ، لونها الى السمرة الزرقية || يدقن حشه
في الاجار الزينة الورلة الطل . الاثنى تحضن وحدها من
٣ الى ٥ بيضات بينا الذكر يقين لها الغذاء .

٣٠١١٤ - هَمَامِيلِس
Hamamelis (F).
هو المشتركة ، الحليها .

٣٠١١٥ - هَمَمِيتِيس *
Hématis (F). Hématis (E).
مبدن حديدي ادبس اللون يعرف كياريا باسم اكسيد
الحديد الطبي . انواعه عديدة شهرا وأكثرها انتشاراً
اليوميت . راجع سجر الدم .

٣٠١١٦ - هَمَمِيتِيس أُسْمَر *
Hématis bruna (F).
هو اليوميت ، اطله .

٣٠١١٧ - هَمَمِيتِيس *
Drosophila (S). Drosophila (F).
جنس حشرات من فصيلة المهبجات . انواعها المعروفة
عديدة جميعها صغيرة القد ، سوية الثوب ، شفافة الجناح
التائر الاصصاب || رقاتها مضيائة ، نيرة ، هواكة ،
ناثلة ، تعيش على جميع المواد المختصرة او السائرة نحو
الاغيار والاخلال .



هَمَمِيتِيس الاجمات

٣٠١١٨ - هَمَمِيتِيس الْاَبْحَاث *
Drosophila melanogaster (S). Moucheron des
caves (F). Common fruit fly, Pomace fly (E).
Tauffiege, Essigfliege (F).

نوع من الهَمَمِيتِيس . طوله نحو ٢ مم . ثوبها الى الصفرة
البرتقالية . تركيب جميع انواع البار الساقة المطوية
وتجلبب بنشاي مختلف الاختبارات الكحولية والمضوية .
تمنع سكانها او تلقى حيث تعيش يتفقد عن رقات دقيقة
طوله نحو ٦ مم . ثوبها الى القيرة || كزودها كستنية
البن ، قصيرة القد ، غليظة الشكل ، تقضي طورها البدري
في نفس المحيط || وهذه الهَمَمِيتِيس هي التي يستخدمها علماء
الوراثة والوث في اجابهم الحياتية والتناسلية .

٣٠١١٩ - هَمَمِيتِيس
Drosophilidae
فصيلة حشرات من ربة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها
زهاء ١٠٠ جميعها صغيرة القد بطيئة الطيران تعيش على المواد
النباتية المختصرة || رقاتها نيرة هواكة وناثلة تعيش ايضاً
على مختلف المصارات والانتاجات النباتية .

٣٠١٢٠ - هَمَمِدَاو *
Haemodorum (S).
Hémodore (F).
جنس نباتات جلمورية معمرة من فصيلة الهمداريات .
انواعه عديدة جميعها ترابية . ازهارها هامة الالوان الزاكية .
عشوية التجميع او سنيلية ، جميلة الاشكال والالوان الزاكية .



هَمَمِدَاو الْوَزَال

٣٠١٢١ - هَمَمِدَاوِيَات *
Haemodoraceae (S).
Hémodoracées (F). Haemodoraceae (E).
فصيلة نباتية من وحدات اللقطة . اجناسها ٢٠ انواعها
زهاء ١٠٠٠ معظمها جلموري معمرة وبعضها عشوية .
اوراقها باغليتها مزججة التصبغ . ازهارها نطانية .
اسديتها ثلاث او ست . عقداتها لا قياسية الارتفاع لذلك
لستوى سطحها قد يكون انبع او اسفل من مستوى الاسدية .
اشهر اجناسها الهمدار .

٣٠١٢٢ - هَمَمِدَاوِيَات *
Apoplexie de la vigne, Folletage
وصم فبائي شديد الوقع مجهول الاسباب يصيب الكرمة
فيذبل اوراقها ويسم سرعها التي تجف في بضع ساعات .

٣٠١٢٣ - هَمَمِرُوبِيلِيَّة الْوَزَال *
Hemerophila abruptaria (S).
Hémérophile à ailes denticelées, Phalène des
genêts (F). Hemerophila abruptaria (E).

حشرة من فصيلة الايفات ردية سرشقيات الاجنحة .
موطنها معظم مناطق حوض البحر الابيض المتوسط والاقليم
الداخلية المتاخمة . فراشتها جابسة قوتها رقيق الازهار .
سرقتها تعيش على اوراق الوزال والزنان ... || جسمها
ابيض الشكل يطول نحو ١٢ مم . بسطتها نحو ٣٨ مم .
راسها كبير الجرم . عينها كيرتان . زباناها مشطيان
عند الذكر ، عيطيان عند الانثى . جوشها وبطنها الى
الخطي الكلف المواج || روشانها الاماميان الى الخطي
الاكلف تملو سرجة معتزفة سمراء وزراكن وتزاورق
كستنية . روشانها الخلفيان الى الخطي الاشجع يعلو
تشيط ابرسرورجة كستنية . كستنيها الحاشي القروض اسر
الختار . اهدابها الى القصعة || لها جيلان في ابرسر
تظهر فراشة الجيل الاول في اواخر آذار وتظهر فراشة
الجيل الثاني في اواسط تموز . تسرح في الليل . تماطل
بند ظهورها بنحو اربعة اسابيع وتمتع الممكن مسحايا على
الصفحات السفلى من نصال الأوراق || السرعة عند بلوغها
الكامل تطول نحو ٤٠ مم . جسمها شبه وشي الشكل .
ثوبها الى الشبهة الخنطية المواج يعلوها في كل سكة ابتداء
من الرابعة زوج من النقط جانبية الازرناك ، سمراء اللون .
راسها شديد السمرة . رواجها البطنية الوسطى ماصة بما
يحملها تقطوس منه الانتفاخ || طور الاكمال الذي يستمر
نحو ١٥ يوماً ينقضي ضمن صلجة تحبكهما السرعة في كل
مكان باستثناء التربة .

٣٠١٢٤ - هَمَمِيع
الصغير من النباء .

٣٠١٢٥ - هَمَمِيق
Herbes tendres (F).
الكلاء الحش الين .

٣٠١٢٦ - هَمَمِيق
Boeava (S). Bordave (F).
نبات عشبي حولي يري وحيد الجنس والنوع من فصيلة
الصليبيات . منته بعض اصقاع الشرق الأدنى || ساقه
ماسة فرعاء منتصبة تملو نحو ٦٠ سم . اوراقه متعاقبة ،
شبه قلبية النصال المستطيلة الأطراف الحادة . ازهاره
طري ، ازهاره صغيرة ، لونها الى الصفار الباهت .
تنويره ويبي .

٣٠١٢٧ - هَمَمَقِي
Hammatoleobium (S).
Hammatoleobion (F).
جنس نباتات عشبية برية معمرة من فصيلة القرنيات .

٣٠٠٣٦ - هَمْشَقُ الصُّخُورِ

Haemanthus rupestris (S). *Haemanthe des rochers* (F).

نوع من الحمّنتس. دوفسته ثنائية الساق القطبية الانتشاب: ساق قصيرة تحمل من ورتين إلى أربع ورتات وساق شمرانية تحمل الأزهار. أوراقها أطيحية جميلة الخضار. نصلها يطول نحو ١٥ سم. ويعرض نحو ١٠ سم. شراخه يطول نحو ٣٠ سم. يتونه صيوان قطره نحو ٨ سم. يضم من ٦٠ إلى ٧٠ زهرة قرمزية اللون، فارقة البتلات. تنوره يستمر طوال شهر أيار.

٣٠٠٣٧ - هَمْشَقُ بَهِيّ

Haemanthus magnificus (S). *Haemanthe magnifica* (F).

نوع من الحمّنتس. دوفسته مستطيلة الشكل. أوراقه طرفية الانتشاب تتركز على ساق جعدة، نصلها يطول من ٣٠ إلى ٤٠ سم. ويعرض من ٨ إلى ١٠، عروقه شععية الترتيب بارزة، ثنائية أو عشادية الأزواج. شراخه الأزهرى يطول من ٤٠ إلى ٦٠ سم. صيوانه كبير القطر يراوح من ٢٥ إلى ٣٥ سم. انصافه كثيفة التجميع لوها إلى البرتقالي الأرجواني المالح. || تنوره يستمر من حزيران إلى أيلول.

٣٠٠٣٨ - هَمْشَقُ زُجْجَرِيّ

Haemanthus cinnabarinus (S). *Haemanthe cinabre* (F).

نوع من الحمّنتس. دوفسته مستديرة الشكل. أوراقه قرصية الانتشاب، شععية المد الذي يراوح من ٤ إلى ١٦ نصلها شيق الصفحة يطول من ١٥ إلى ٢٥ سم. شراخه الأزهرى يتوسط الأوراق ويطول نحو ٣٠ سم. صيوانه يد من ٣٠ إلى ٤٠ زهرة جملة اللون الأحمر للعناق الاصفر المالح. تنوره يستمر طوال شهر نيسان.

٣٠٠٣٩ - هَمْشَقُ كَثِيرِ الزَّهَرِ

Haemanthus multiflorus (S). *Haemanthe multiflora* (F).

نوع من الحمّنتس. دوفسته سيدة الساق الشمرانية. أوراقه وزية، ثلاثية أو خاسية. نصلها يارز العروق السداسية أو الثمانية الأزواج، يطول من ١٥ إلى ٣٠ سم. شراخه الأزهرى يطول من ٣٠ إلى ٦٠ سم. يكمله صيوان قطره يراوح من ١٥ إلى ٢٥ سم. يضم من ٧٠ إلى ١٢٠ زهرة قرمزية اللون، حجة البتلات. || تنوره يستمر طوال شهر نيسان.

٣٠٠٤٠ - هَمْشَقُ لِيْثْدَنْ

Haemanthus lindeni (S). *Haemanthe de Linden* (F).

نوع من الحمّنتس. دوفسته كالاروية. أوراقه بمنقة دائمة الخضار. نصلها أطيحي الشكل، سناني الزام الاخير، يطول من ٢٠ إلى ٣٠ سم. ويعرض من ١٢ إلى ١٤ سم. شراخه الأزهرى يطول نحو ٤٥ سم. يتونه صيوان قطره نحو ٢٠ سم. يضم نحو ١٠٠ زهرة أرجوانية اللون. تنوره يستمر طوال شهر أيار.

٣٠٠٤١ - هَمْشُشُ أَخْضَر

Chironomus tendens (S). *Chironome vert* (F).

حشرة من الحموش طولا يراوح من ٧ إلى ٨ سم. لوها إلى الخضار الاصفر المالح. قربها الاستعمارية مركبة ١٤ إلى ٢٠ حقة عند الذكر ومن ٧ حقة عند الانثى. ابراغها الامامية مهدية مستطيلة || رقتها تلم أوراق النباتات المائية.



هَمْشَق



هَمْشَق



هَمْشُشُ أَخْضَر

انواعها المعروفة قليلة العدد منها بعض اصناف الشرق الاوسط والبرقية الشرقية والشمالية || سوقها مزرقة مستطيلة مستدلة الانشعاب. أوراقها مركبة وقرصية التجميع. وريقاتها صغيرة بيضوية النصال المستطيلة. ازهارها ذهبية اللون أو أرجوانية. تنورها ديمي.

٣٠٠٤٨ - هَمْشَقِيّ

Tiareella (S). *Tiarella* (F).

جنس نباتات جذموية معمرة من فصيلة الفلييات. انواعها المعروفة قليلة العدد. سوقها عشوية منتصبة فراء. أوراقها مركبة، مستطيلة الاصل، لا لياسة للتفريش والتسكين. نصلها إلى الخضار الزاهي. ازهارها عشوية التجميع، صغيرة القد، بيضاء اللون أو صفراء. ثمارها جراء لا متساوية المصارع. || تنورها يستمر من نيسان إلى أيار.

٣٠٠٤٩ - هَمْشَلَج

Hybride (F). *Hybrid* (E).

هو الهجين النباتي. ج. هاليج.

٣٠٠٣٠ - هَمْشَلَجَة، رَهْوَكَة

Amble (F).

ضرب من سير. الدواب.

٣٠٠٣١ - هَمْشَق

Marcescence (F).

Marcescence, Withering (E).

حالة كل زهرة أو نبات في طور الذبول أو التجماع.

٣٠٠٣٢ - هَمْشَقُ

Haemanthus (S).

Haemanthe (F).

جنس نباتات دوفسية من فصيلة الزججيات. انواعها عديدة، مهدا البلاد الحارة والاستوائية. سوقها شمرانية تنهي بازهار صيواني التجميع يرتكز على شمران عديد المصارع. ثمارها فردية الخدر. عنية الشكل، وسيدة الزرة. || اعرف انواعها واشهرها ما يتبع.

٣٠٠٣٣ - هَمْشَقُ أَبْيَض

Haemanthus albus (S). *Haemanthe blanc* (F).

نوع من الحمّنتس. دوفسته مستديرة صغيرة القد. أوراقه رباعية المد، خمية التركيب، صفعية الشكل، نصلها يطول من ١٥ إلى ٣٠ سم. ويعرض من ٦ إلى ٨ سم. حطاره مهدب الحافة. شراخه الأزهرى يطول نحو ٢٠ سم. صيوانه صغير الحجم قطره نحو ٧ سم. ازهاره كثيفة التجميع بيضاء اللون. || تنوره يستمر طوال شهر حزيران.

٣٠٠٣٤ - هَمْشَقُ أَحْمَر

Haemanthus coccineus (S). *Haemanthe ponceau* (F).

نوع من الحمّنتس. دوفسته صغيرة القد، ثنائية الأوراق الكبيرة التي تطول من ٥٠ إلى ٦٠ سم. وتعرض من ١٥ إلى ٢٠ سم. شراخه الأزهرى يطول نحو ٢٠ سم. صيوانه صغير الحجم، قطره نحو ٨ سم. ازهاره كثيفة التجميع حراء اللون. || تنوره يستمر من آب إلى تشرين.

٣٠٠٣٥ - هَمْشَقُ أَرْجَوَانِيّ

Haemanthus puniceus (S). *Haemanthe écarlate* (F).

نوع من الحمّنتس. دوفسته مستديرة الشكل. أوراقه قرصية الانتشاب ثنائية. نصلها جميل الخضار الزاهي، ضيق الصفحة، يطول من ١٥ إلى ٣٠ سم. ويعرض من ٥ إلى ١٢ سم. شراخه الأزهرى يتوسط الأوراق ويطول نحو ٢٠ سم. يكمله صيوان يحمل من ٤٠ إلى ٥٠ زهرة جملة اللون الأرجواني. || تنوره يستمر من حزيران إلى أيلول.



هَمْشُوش رَيْشِي



هَمْشِيَّة صَيْبِيَّة



هَمْشِيَّة الْبَنْ



هَمْشِيَّة

٣٠٠٤٢ - هَمْشُوش رَيْشِي *
Chironomus plumosus (S). Chironome duvetoux (F).
حشرة من الهمشوش طولها يراوح من ٩ إلى ١٢ م. ثوبها
احمر اللون يغطيها غط اسود ويمتدحه جميع اسف. ارجلها
سيفاتها صفراء اللون. ارجلها الامامية مهدية مستطيلة.
يرقبها حمراء اللون تمش على النباتات المائية وقد تلثم اوراق
بعضها.

٣٠٠٤٣ - هَمْشُوشِيَّات *
Chironomidae, Tendipadidae (S). Chironomidae (F). Midge (E).
Zuckmücken (D).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين. اجناسها وانواعها
كثيرة المدد جميعها صغيرة القدد قريبة الشبه من الهمشوش.
اجسامها عديمة الحراشف. قرونها الاستشعارية ريشية.
ورؤوسها صغيرة. اعينها وتوابيعها قصيرة لا تمكنها من
انقاص الدم. تكثر على الاعشاب المائية وعلى المواد
العضوية المختصرة قرب مجاري الماء. تعتبر من الهمشوش
المزعجة غير الضارة.

٣٠٠٤٤ - هَمْشِيَّة
Dette non réglée (F).
كل دين لم يدفع بتاريخ استحقاقه.

٣٠٠٤٥ - هَمْشِيَّة صَيْبِيَّة *
Hemitea aestivaria (S). Hémichée estivale (F).
Hemitea aestivaria (E).

حشرة من فصيلة الاريات حرشيات الاجنحة. موطنها
بعض الامساق المعتدلة الحرارة من الشرق الاوسط والاندلس
واروپة. فراشها جارية قوتها رقيق الانذار. سرقتها
تمش على اوراق السديان. جسمها قصيف يطول نحو
١٠ م. يسطها نحو ٣٠ م. رأسها معتدل الحجم. عينها
ناشرتان. زباناها مشطان عند الذكر، غيطيان. عند
الانثى. جوفها ويطها الى الخلف الازرق الغليظ المواجه
وراشها عند الشقين الى الخلف الازرق الاسمر المواجه
يتوسطه خط مشرقى حطلي ويعلوه عند الذكر تسع نقط
حارية حمراء اللون، وسبع نقط حارية عند الانثى. لها
جبل واحد في الحبل. تظهر الفرفة في حزيران وتبقى
حتى اواخر تموز. تسرح في الليل. تماثل بعد ظهورها
بضع ستة اسابيع وتمتد لكن لطفاً صغيرة مربعة على
الصفحات السفلى من نصال الازراق. السرقة عند بلوغها
الكامل تطول نحو ٢٢ م. جسمها شبه اسطوانى الشكل،
مقوس المؤخر. ثوبها الى السرة الازرقية المواجه تعلوها ريشة
فرداء وسبع خطوط متعرجة جزوية. رأسها الى الجلوة
رواجها البطينية الوسطى ماسحة مما يحملها تقويس عند
الانقاع. طوط الاكمال الذي يسمر نحو ١٥ يوماً
يتقوى تحت القشور وبين قشور الجلد ضمن صلابة
شالوية تحببها السرقة بالقل من اربعة ايام.

٣٠٠٤٦ - هَمْشِيَّة *
Hemileia (S).
جنس فطور مجهرية من فصيلة السحاميات. تتميز بنحماها
الانقباضية التي تلب فيها الاشكال المردنية والبرمية.
ميشها يمش ويتكاثر في التسج النباتية السطحية.
هيفها مجهز بمرواشف خضرة. نكاتها حزبية التصنيع،
اسطوانية الشكل او صوانية. انواعها المعروفة ٢٣
جميعها من فطور البلاد الحارة والاستوائية. اعرها
واشهرها هَمْشِيَّة الْبَنْ.

٣٠٠٤٧ - هَمْشِيَّة الْبَنْ *
Hemileia vascatrix (S).
Rouille du caféier (F).

فطر مجهرى يصيب اوراق البان فيطها ويشعل عليها
التصغيرى الواجب يؤخذى الشجرة ويهوى الى حلقها
وانتاجها. مظهره الخارجى يقع صغيرة مستديرة قطرها
يراوح من ١ الى ١٥ م. تركيب مبدرة اللون ثم تتكاثف
صفحاتها السفلى. تبدر مبدرة رتقالية اللون ثم تتكاثف
وتتلف بفشاء حلى الشكل، لزج المادة، يسبب جفاف
النسج ويهوى. يكافح باستعمال سائل بوردو المركز
من ١ الى ٢ ٪ على ثلاث او اربع مرات ابتداء من
نهاية فصل الشتاء.

٣٠٠٤٨ - هَمْشِيَّة
Marcascibia (F).
الحديد ما كان قابلاً للذوب.

٣٠٠٤٩ - هَمْشِيَّة *
Haminea (S).
Haminée (F). Haminea (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات مملات الارجل
وفصيلة الغاليات. انواعها المعاصرة المعروفة متوسطة المدد،
منتشرة في معظم بحار العالم. اصداها شبه بيضيه
الشوذه، شفاقة، ماسة، متساوية الالوان الوبيدة
الخضاب. اجسامها فضفاضة الرداء اللاصق.

٣٠٠٥٠ - هَمْشِيَّة
Hémione (F).
هو فراء الثبت، نوع من الحمر الوحشية وفصيلة الخيليات.

٣٠٠٥١ - هَمْشِيَّة
هو السراج الشبكي، اطلبه.

٣٠٠٥٢ - هَمْشِيَّة
Pédoncule (F). Peduncle (E).
هو ملاق الثمرة ويقال له إهان. ج. أمن.

٣٠٠٥٣ - هَمْشِيَّة
Sirens (F). Sirene (E).
رتبة حيوانات قازية من صف الضفدييات. لها، حتى
الآن، فصيلة واحدة تشمل ثلاثة انواع. جميعها من
مستقرات الخياض. اجسامها مستطيلة ثنائية القوائم،
رباعية الاصابع. تمش على صفات المستنقعات وبجاري
الماء. بلاعيطها مائية. قوتها الديدان والبرديات الصغيرة.

٣٠٠٥٤ - هَمْشِيَّة
Lavande spic (F).
هو الخزامى الذكرية، اطلها.

٣٠٠٥٥ - هَمْشِيَّة
Anon (F).
هو الجيش ابن الاثان.

٣٠٠٥٦ - هَمْشِيَّة
Moqueur (F). Mocking-bird (E).
جنس طير كان في التصنيف الماضي ينتمي الى فصيلة
الضفدييات وهو في التصنيف الحديث ينتمي الى فصيلة
مستقلة تسمى هنريات. انواعه المعروفة ١٢ اعطاتها
المناطق الاستوائية. مظهرها افريقي وبعضها اسوي
وامريكي. تتميز بطول مناقبها المحدودة وباستطالة
اذنابها الرتاجية الريش. اجنتها قصيرة تكاد لا تلتصق
قائمة الافنيك. جميعها تألف الغابات والحراج. قوتها
الحشرات اعصها الخنافس والارض والديدان والجراد والنمل
والضفدييات والسناكب وبعض الثآليل البرية. اشهر
انواعه المختبر الاحمر المخفاد.

٣٠٠٥٧ - هَبْرَ أَحْمَرُ الْمُتَقَار *

Irisor erythrorhynchus (S). Moqueur à bec rouge (F).

نوع من الحبث. موطنه أواسط أفريقية. جسمه أبيض أبيض بطول نحو ٤٥ سم. ثوبه إلى الزرقاء السماء يعلوها ملح يراوح من الأبيض إلى الأخضر اللامع. جناحاه وذنبه مبنجة بالأبيض. عيناه صليتان. منقاره وساقه إلى الحمرة. || يألف القبابات والأراج الكثيفة. سربه بعد من ٤ إلى ١٠ أزواج. قوية الحشرات والديدان وتلت الحبث || يدين منه في تجاويف الأشجار. انشاء تحفن ٨ بيضات نحو ١٦ يوماً.

٣٠٠٥٨ - هَبْرَيات *

Mimidae (S). *Mimidae* (F). *Mimidae* (E).

فصيلة طير من لافقات التمل ورتبة الجواثم. اجتماعها المألوفة عديدة. معظمها من طيور القنطرة الأمريكية وبعضها الإفريقي وأسيروى || التسم الذي يستوطن أمريكا الجنوبية آبد في مناطقه. أما التسم الذي يستوطن أمريكا الشمالية فإنه من القواطع التي تجرب البلاد في طبل الحبث والماشى || أشهر اجتماعها الحبث.

٣٠٠٥٩ - هَبْرُوع

نوع من الطيور يتوكل على الحبوب.

٣٠٠٦٠ - هَبْرُون

هو الجبل الشائع، الطليه.

٣٠٠٦١ - هَبْرُجُل

جنس حيوانات قازية من فصيلة الحبليات. أنواعها المعروفة ثلاثة. موطنها بعض مناطق أمريكا الشمالية وكندا. تألف غشاف مجاري المياه المائية. تعيش معظم حياتها في الماء || أجسامها شبه قريشة الشكل بطول من ٣٥ إلى ٧٥ سم. رؤوسها قصيرة. أسنانيها. أعطاشها مستمرة الاشدق. عينها شديدة الصغر. أعناقها مجهرية بأطراف مجمدة وبشرة. وهي مجهرية أيضاً بقاعين فقط. قاعها صغريتان. أمابيتا الارتكاز || قوتها الكبدان والديدان الصغيرة.

٣٠٠٦٢ - هَبْرُجِيَّات *

Sirenidae (S). *Sirenidae* (F). *Sirenidae* (E).

فصيلة حيوانات قازية من رتبة الهنابل. كانت، قبل التصنيف الأخير الذي يمتد إلى ١٩٦٥، تنتمي إلى رتبة السرفقيات. أما الآن فهي الفصيلة الوحيدة التابعة إلى رتبة الهنابل || أنواعها المعروفة ثلاثة موطنها بعض مناطق أمريكا الشمالية وكندا.

٣٠٠٦٣ - هَبْرَدَا

Tricyrtis (S). *Tricyrtis* (F). *Tricyrtis* (E).

جنس نباتات جذموية جاذبة مصرة من فصيلة الزنبقيات. أنواعها المعروفة سبعة مهددا شرق الأقصى || سوقها غمرائية مرققة. أوراقها حافصة متعاقبة سانية التصل. أزهارها طرفية يضاء اللون أو مرققة بالبنفسجي || تزهر للزهرين ولا تخفى البرد. ترطب في الإترية المعتدلة الاندماج. || التسوية التركيب المنصري، الذنية بالمواد الضوئية والأزوت || أشهر أنواعها الهنداء الشائكة والمزينة والمستطيلة الزئبد.

٣٠٠٦٤ - هَبْرَدَا شَائِكَة *

Tricyrtis hirsuta (S). *Tricyrtis hirsuta* (F).

نوع من الهنداء. مهددا اليابان. ساقها متعصبه كثيفة

المحب اللين الشائك، ترتفع من ٣٠ إلى ١٠٠ سم. أوراقها حافصة متعاقبة بطول من ١٥ إلى ١٥ سم. نصالها سانية، ذرية، مرققة الصفحات العليا. أزهارها يضاء اللون مرققة بالبنفسجي، قطرها نحو ٣ سم. || تنويرها ديبى أو غريفي.

٣٠٠٦٥ - هَبْرَدَا هَبْرِيَّة *

Tricyrtis pilosa (S). *Tricyrtis pilosa* (F). *Tricyrtis pilosa* (E).

نوع من الهنداء. منبها الهند. ساقها خلية السواء، قليلة الفروع، ترتفع من ٦٠ إلى ١٢٠ سم. أوراقها حافصة متعاقبة، خلية التصل السانية الشكل || أزهارها إلى الأبيض الماجي، قطرها نحو ٢٥ سم. تنويرها يستمر طول شهر أيار.

٣٠٠٦٦ - هَبْرَدَا مُسْتَطِيلَة الزَّيْدَة *

Tricyrtis macropoda (S). *Tricyrtis long pedicella* (F). *Tricyrtis long pedicella* (E).

نوع من الهنداء. منبها الصين. ساقها غليظة الخمل والزغب ترتفع من ٥٥ إلى ١٠٠ سم. أوراقها متعاقبة مسننة؛ نصالها أحليجية مائلة بطول من ١٥ إلى ٢٠ سم. || أزهارها مستطيلة الزئبد، قطرها نحو ٣ سم. لونها إلى الأبيض الماجي يعلو تمسح برتقالي ينصرف نيا بعد إلى الأصفر || تنويرها ديبى.

٣٠٠٦٧ - هَبْرَدَا * طَرَحَقُون

Taraxacum dens leontis, *T. officinalis*, *T. vulgare*, *Leonodon taraxacum* (S). *Pissenlit officinal*, *P. commun*, *Dent-de-lion* (F). *Dandelion*, *Blow-ball*, *Canker-wort* (E). *Echte Kuhlbiene*, *Löwenzahn* (D). *Tarassaco*, *Tarassaco*, *Dente di leone* (I).

نبات عشبي بري مسمر من فصيلة المركبات. ينبت في جميع الأراضي المزروعة ويحتر من النباتات الكاسية الضارة. جلوره غليظة أسفلية. أوراقه قرصية الانتشاب ضحية. أزهاره رؤسية التجميع. أوراقه اللينة مأكولة عديدة للثانف الصحية || محروبه الزراعية البقلة المشهورة نحو ٨. يتكاثر بالبذور. تبرز حشائه من أوائل الربيع إلى أواسط الصيف. تدرس للشرق في مستقروا على أبعاد تراوح من ٤٠ إلى ٥٠ سم.

٣٠٠٦٨ - هَبْرَدَا * هَبْرَدَا

Cichorium endivia (S). *Chicorée endive*, *Endive* (F). *Endive*, *Batavian endive* (E). *Endive*, *Endivien*, *Endivienwegwarte* (D). *Endivia*, *Cicoria degli orti* (I).

نبات يقل من فصيلة المركبات السنية. أصرامه عديدة تجمع إلى ضربين الهنداء الجيدة والهنداء الخسنة. جلوره غليظة حرازية الشكل. أوراقه قرصية الانتشاب. أزهاره إلى الزرقاء السانجورية.

٣٠٠٦٩ - هَبْرَدَا بَرِّيَّة * هَبْرَدَا مَرَّة *

Chichorium intybus (S). *Chicorée sauvage*, *Ch. amère* (F). *Succory*, *Wild chicory* (E). *Zichorienwegwarte*, *Zichorienwurz* (D). *Cicoria*, *C. amara*, *C. da toglia*, *Radichio* (I).

نوع من الهنداء وهو نبات يقل بري وزراعي. محروبه المشهورة عديدة فواربها الممدرة شكلية، خواصها الصحية والطبية واحدة. جميعها تلتئ الدم. جلورها حرازية مستطيلة. سوقها غمراء تعلو نحو ٢٠٠ سم. أوراقها



هَبْرَ أَحْمَرُ الْمُتَقَار



هنداء شائكة



هندب



هندب



هندب بَرِّيَّة

٣٠٠٨١ - هندسة ريفية
Génie rural (F). Rural engineering (E).
علم يتناول التشييد الزراعي على اختلاف أنواعه من الابنية الى الاقنية .

٣٠٠٨٢ - هندسة زراعية
Génie agricole (F). Agricultural engineering (E).
علم يتناول التربة والنبات والحيوان والاسثمار .

٣٠٠٨٣ - هندسة سطحية
Géométrie plane (F). Plane geometry (E).
علم يبحث في السطوح ذات البعدين ويشمل دراسة خصائص الخطوط والزوايا والأشكال من مثلثات ومربعات ودوائر .

٣٠٠٨٤ - هندسة فترافية
Géométrie dans l'espace (F). Geometry of space (E).
علم يبحث في الاشكال ذات الابعاد الثلاثة اي الاجسام كالكرة والمكعب والمهرم .

٣٠٠٨٥ - هندسة كهربائية
Génie électrique (F). Electric engineering (E).
علم يتناول انتاج طاقة الكهرباء واستثمارها .

٣٠٠٨٦ - هندسة معيارية ، هندسة مدنية
Génie civil (F). Engineering (E).
علم يتناول البناء باكمل معانيه .

٣٠٠٨٧ - هندسة ميكانيكية ، هندسة آليّة
Génie mécanique (F). Mechanic engineering (E).
علم يتناول الميكانيكا وما ينتج منه من آليات .

٣٠٠٨٨ - هندس
Connaissance (F).
Counoisserie (E).
المتخصص من كان علمه أو اختصاصه يمكنه من تحليل ومعرفة الشيء المطلوب . ج هندسة .

٣٠٠٨٩ - هندسة
الحفنة منزل من منازل القصر الشامية وهي مجموعة من حسة كوابك يقال لأجزاء الرز والثاني الميسان . وفي ثقبه بشكلها الألف الكوفي في رقيب الحفنة يدعى النام .

٣٠٠٩٠ - هنيكة
Volvula (S).
Volvule (F). Volvule (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات مدنيات الاربل وفصيلة البايغات . انواعها المعاصرة المرفوقة عديدة منتشرة في معظم بحار البلاد المعتدلة الحرارة اصبانها شبه اسطوانية الشكل ، صلبة القذ ، وسيد الألوان السوية . فوائدها مستطيلة الفلوج القاطبة .

٣٠٠٩١ - هنيكة المروج
Paroplia scamia (S).
Paroplie des prairies (F).
حشرة من فصيلة اليزيديات ورتبة متجانسات الاجنحة . جسمها شديد الصغر يقطر من ٣ الى ٤ مم ، اذ فورها حطلي اللون تملوه رقيقة سوداء تمتد من الرأس الى اواسط الظهران . رأسها عريض . خطمها مستدل الطول . عينها صغيرتان . زباناها شديدة الصغر والذقة . كوسلها يلحف القسم الاكبر من الرأس ، مسجتها بحمرة . ظهرانها كابل

مستطيلة مفرقة . ازدهارها الى الزرقاة الزاهية اذ زراعتها تستوجب بعض العناية اخصها الطمر بالثقل او بالمواد الدبالية للحصول على اوراق عادمة الحبيب .

٣٠٠٩٠ - هندباء جديدة
Chlorée frisée (F).
حرب من الهندباء الزراعية المأكولة . اوراقها قرصية لينة مجمدة النصل الكثير التشرم والتسنين .

٣٠٠٩١ - هندباء خضراء
Escarole, Scarole, Scarole (F). Endive (E).
حرب من الهندباء الزراعية المأكولة . اوراقها نازقة مستعرضة متراكبة . نصلها متجم الصلصة ، مفروض الحمار .

٣٠٠٩٢ - هندباء زرقاء
هي الطليسية ، اطلبا .

٣٠٠٩٣ - هندباء وثولف
Witloof, Chlorée de Bruxelles (F). Witloof (E).
نوع من الهندباء الزراعية تتميز بجلودها الحرجلية الشكل والقد وباورقها الضمية المنتصبة . راجع وثولف .

٣٠٠٩٤ - هندرسونولا
Hendersonula (S).
جنس فطور مجهرية من فصيلة الصنبيات . انواعها قليلة لا مؤذية . ونباتها سمراء اللون تحسن القصات البكيدية التي تخترقها فتقوب الحق . بوفاتها اعليجية الشكل ، عديدة الخلايا حطية اللون .

٣٠٠٩٥ - هندرسونولا
Hendersonia (S).
جنس فطور مجهرية من فصيلة الصنبيات . انواعها المرفوقة زهاء ٢٠٠٠ معلنها يبي علم الاذني او قليله ا يتكندباتها كروية الشكل او مغلطة ، محصورة الارتكاز او شارقة . جودها طعم التسج اسمر الصفصة الخاضعية . بوفاتها رشيعة ، مؤثرة ، حطية اللون ا اشهر انواعها ما يتبع .

٣٠٠٩٦ - هندرسونولا إبرية
Hendersonia acicola (S).
فطر مجهرى من الهندرسونية يركب اوراق الاجاص فيوشها برقشة حطية لا نظامية الشكل والحجم والترتيب تنس الى النصل اذا اتمتها العوامل الطبيعية وتسبب الاحبال الباكر .

٣٠٠٩٧ - هندرسونولا اجاصية
Hendersonia picicola (S).
فطر مجهرى من الهندرسونية يركب اوراق الاجاص والفطريل والتفاح فيوشها برقشة مزوانية الشكل سمراء اللون تسبب تقسيم تسج النصل والاحبال الباكر .

٣٠٠٩٨ - هندرسونولا وردية
Hendersonia canina (S).
فطر مجهرى من الهندرسونية يصيب اخضار الورد وثمار . مظهره الخارجى بقع صغيرة مزوانية مبشرة سوداء اللون تملأ الاضغان والبار دون ان تقع بها شديدة الاذى .

٣٠٠٩٩ - هندسة الإلكترونية
Génie électronique (F). Electronic engineering (E).
علم يتناول الاكترونيك وتجهيزاته .

٣٠١٠٠ - هندسة تحليلية
Géométrie analytique (F). Analytic geometry (E).
علم يبحث في تطبيق القواعد الجبرية على الهندسة .



هنيك



هَوَك



هَوَجَر



هَوَجَل

٣٠٠٩٨ - هَوَكِيّ ، اَيُرُوِيّ
Aérobique (F).
Aerobic (E).
نمت تعريفى يطلق على جميع الاحياء المجهرية التي لا تستطيع الحياة والتكاثر بعيداً عن الهواء .

٣٠٠٩٩ - هَوَاكِيّ الجُدُر
Exorhize
نمت تعريفى يطلق على كل نبات ينشعب جذبه في الهواء اي خارج التربة .

٣٠١٠٠ - هَوَالِيّ ، اَيُرُوِيّ
Aérobale (F).
Aerobe (E).
صفة للكائنات المجهرية الحية التي لا تستطيع النبش متقطعة عن الهواء .

٣٠١٠١ - هَوَاكِيّ
Pulsatilla (F).
هي شقيق النيران ، اطليه .

٣٠١٠٢ - هَوَبَر * ، عَطَج
Rhinopithecus (S).
Rhinopithecus (F).
جنس قرد من فصيلة المباديات . انواعه قليلة العدد ، موطنها بلاد التبت . تعيش في الاجراج الجبلية التي ينمها الثلج نحو ازمة شهر || اجسامها متصلة الجسم تطول من ٦٥ الى ٧٥ سم . ويوها الى الخضار الاصفر . مناسيرها زينة الاربعة . اذنيها طويلة الشعر المزمري الشكل والقد ، لونه الى الزينة الصنابية ، اكبه القاعدة اصفر الطرف يعلو مواج فضي . اذنيها جللة تطول نحو ١٠٠ سم . || تعيش جماعات كبيرة يراوح عددها من ٦٠ الى ١٠٠ قوتها التبار والاحتساب والجوار والبرام والتولي . انثاهما تنضج جرواً اسعداً ترضعه نحو ٦ شهور .

٣٠١٠٣ - هَوْتَة
الارض المنخفضة .

٣٠١٠٤ - هَوُتْسَنَرَا
Hutchinsia (S).
Hutchinsia (E).

نبات معقود التصريف على اسم العائلة الايرلندية السيدة هوتسنر . عشبة صغيرة معمرة من فصيلة الصليبيات . اعطائها تشمل بعض اقاليم البحر الايضر المتوسط || ساقها فرعاء قصيرة ، تملو نحو ١٠ سم . اوراقها متناوبة مركبة ، وثرية البد ، خاسية او سباعية او تساعية الوريات السنتانية الصغيرة . ازهارها متفرقة التجميع . ازهارها بيضاء اللون || تنموها يستمر من ايار الى آب .

٣٠١٠٥ - هَوْتِين
Motinus (S).
Motine (F). Motinus (E).

جنس حشرات واثمة من نصفيات الاجنحة المتجانسة وفصيلة البرانيات . انواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها تحت من الهنت الى الصين . تألف القباب والجلات قروياً وحقوق الازهار || اجسامها متصلة اللد تطول من ٣١ الى ٣٦ سم . رؤوسها صغيرة . عينها صغيرة نادرة . قربها الاستعمارية دقيقة ، شديدة الصغر ، سفلية الانتساب ، مركزها تحت الايمن . جبالها نائقة تمتد كالقرون المتصلة الشفاقة . اذنيها متباينة الالوان تكثر فيها السمرة الصنابية المزاج . وراثتها لاسطة مبيضة بالاعصر والاصفر .

٣٠١٠٦ - هَوَجَل *
Hugonia (S).
Hugone, Hugonie (F). Hugonia (E).

جنية طيبة برية معمرة من فصيلة الكتيانيات . مهدا

الحنجية ، لاسح ، حنطلي اللون ، اسمر المروق . وراثتها خشاكيان ، شفافان . بطنها الى الحنطلي ، يسر في الصفحة السفلى ويصغر في العليا . قوتها حنطلية سمراء سرعها المروح والمراعي . قوتها النسخ .

٣٠٠٩٢ - هَوَيْكَة ، هَوَيْكِيّ
Heniochus (S).
Hénioque, Cocher (F). Whip-fish (E).

جنس اسماك بحرية من شالكات الزمانف وفصيلة الصليبيات . انواعها المعروفة قليلة العدد جميعها من اسماك عمار اليلاد الحارة || اجسامها مبططة ، رفيعة الظهور ، تطول من ٢٥ الى ٣٥ سم . بطونها دالقة المنظر . زمانها الظهيرة لتنتهي برق غفيري المادة يشبه سوط الخوي . اذنيها الى الزبد الخضراء او الزبد الفضية يعطها تجديع متعرج اسود || حولها مأكولة ، متوسطة الصنت .

٣٠٠٩٣ - هَوَك
هو ما ينشقه كل حي لحياته . وهو مادة غازية مركبة تنفذ سطح الكرة الارضية فتكون السكالك او السحاح ، وتقل كتالها كالأثمة من سطح البحر . وين المسلم به ان نصف مجموع الهواء الارضي يقع في المنطقة الكائنة بين مستوى سطح البحر او مرمى المنح وارتفاع ٦٠٠٠ م . اما العناصر التي يتكون منها الهواء ونسبها فهي :
ازوت نحو ٧٨ جزءاً
اكسجين نحو ٢١ جزءاً
ثم النيز من الاثرون وبغاز الكربون والازوت والنيون والكريتون والهليوم ، الخ . وهو يحتوي ايضاً على بخار مائي يعرف بالرطوبة النسبية .

٣٠٠٩٤ - هَوَاكِيّ
Sylviadés (F).
في الدخليات ، اطليه .

٣٠٠٩٥ - هَوَاكِيّ
Saprophage (F).
Saprophagous (E).
الحشرات المواك في التي تعيش على المواد النباتية للتحلة .

٣٠٠٩٦ - هَوَاكِيّ *
Caloramphus fuliginosus (S).
Caloramphus fuligineux (F).

طائر من المستلغات وفصيلة البقائيات . موته بعض اصقاع الهند والبلاد المجاورة . يألف الادخال والحراج البمتر الانجار ولا يستقر في مكان اكثر من خمس دقائق . ملبسته الخالي جمالي ، فوسه قليل العدد لا يتجاوز خمسة ازواج || جسمه معتدل القد يطول نحو ٢٥ سم . رأسه كبير الجرم . منقاده شبه مخروطي الشكل ، كبير الحجم ، ارتفاعه عند القاعدة يفوق عرضه . جناحاه صغيران ، ذلقان . ذنبه معتدل الطول ضيق النرس ، مغطوم الطرف . ثوبه الى السمرة الساجية المتفردة الماجات . منقاده وقامتته الى السمرة الزرقية || صوته مزيج طنان . قوته الحشرات على اختلاف فصائلها وانواعها والثار النسية البرية || يدن عشه في غنايب الانجار . الانثى تحضن رسدها من ٣ الى ٤ بيضات بينا الذكر يولن لها الغذاء .

٣٠٠٩٧ - هَوَاكِيّ
Aérhydrique (F).
نمت تعريفى يطلق على ما يتنقل بالهواء والماء او يسمل بالهواء والماء .

المنه . جلودها ولحاء ساقها وفاندها مرقمة وتدر البول .
ساقها فراء تملو نحو ثلاثة امتار . انثاءها فردية او
ثنائية الحوائج . اوراقها متناحية ، متعقة . نصلها اهلجية
الشكل ، سنانية الاطراف . ازهارها حلقى التجميع ،
عمودي الانكناز وطرفي . ازهارها صغرة اللحم
النباتات ، وردية اللون . ثمارها سيقية تلصص صلبة
صغرة عذمة السطح . ازهارها وجلودها عطرية العرف
المستحب الشبيه بالبنفسج .



هود البطباط

Phaeostilbaceae

٣٠١١١ - هَوَئِيَا ٥

عارة بطور مجهرية من فصيلة الكحيويات . تتميز بأعضائها
الموازية المتباينة الألوان . تشمل عدة أنواع تنتمي إلى
ثلاثة اجناس : الارايوبسيس والسيزانوس والشلفة .

Ranelia (S).

٣٠١١٢ - هَوَئِيَا ٥

Ranelia (F). Ranelia (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مغطيات الاربل
وفصيلة اليسويات . انواعها المعاصرة المعروفة عديدة
منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة اخصها المحيط الهندي ||
اصنافها شبه اهلجية الشكل محاذية يعلوها جذبان
جانبيان ضخمان او مائلان او شاككان يكتنفانها من
طرف الفتحة الى العقب .

Stigmatopelia (F).

٣٠١١٣ - هَوَئِيَا ٥

طائر من فصيلة الحاميات قريب الشبه بالثلثة . مهد
المناطق الحارة من العالم القديم يجرى في طلب المرتع
والصيد والتمسك || جسمه متوسط القد ، يطول نحو
٢٧ سم . ثوبه الى الطلعة الصنانية المورج تسر في الرأس
والظهر والجناح والذنب ، وقدر في المنصر والعنق والصدر
والبلع والافتيك . متفاد حنلي اللون . رجلاه الى السرة ||
يدن عنه في الانجار المتوسطة الارتفاع . حشنته بيضتان .
الانثى تقوم بالترميم اما الذكر فيقوم لها القوت .

Surnia funerea (S).

٣٠١١٤ - هَوَئِيَا ٥

Surnia, Chouette-épervier (F).

طائر من البويات وعماراة الفناديات . ثوبه الى البياض
الاكعب يطو تسليج اسمر يطوق العين والاذن . رأسه
عادم العظمة مستعرض وقصير . منصره لاطي . القوس
منصره قوي البهرة . سقطه كبير القد منفرج الزاوية .
ذنبه منصف الريش ، مستطيل . ارساغه ومخالبه قصيرة كاسية .
موطنه تسبح الاربعاء يشمل معظم المناطق المعتدلة . يألف
اسراج الصنوبر والملاز . يسرح في النهار وفي الليل يستريح
من الساعة العاشرة الى الرابعة من بعد الظهر ومن العاشرة
ليلا الى الثالثة بعد نصف الليل . || يدن عنه في تجاريف
الاجار وحقائيف الصنوبر . الانثى تضع من ٤ الى ٨
بيضات تحضنها بمنوبة الذكر . || يرقت الجرد والغار
والحشرات حل اختلافها . ج هود .

٣٠١١٥ - هَوَئِيَا ٥

ولد القرد .

Monstruosité (F).

٣٠١١٦ - هَوَئِيَا ٥

Monstrosity (E).

الانحداد المشبهين عن الشكل المألوف ان في الحيوان
او في النبات .

Etang naturel (F).

٣٠١١٧ - هَوَئِيَا ٥

Natural pond, N. pool (E).

بحيرة صغرة تفيض بها مياه غياض وأجام فتتسع .
ج اهور .

Haworthia (S).

٣٠١١٨ - هَوَئِيَا ٥

Haworthia (F). Haworthia (E).

جنس نباتات لحمية مرقمة معمرة من فصيلة الزنبقيات .

Heodes phlaeas (S). هَوَئِيَا ٥

Cuivré de l'oseille (F). Heodes phlaeas (E).

حشرة من فصيلة القنليات وردية حشرقيات الاجتمعة .
مولتها منه من الشرق الاوسط الى اوروبا . فرائها جارية
قوتها رحيق الازهار . سرقها تعيش على اوراق البطباط
والحميض || جسمها صغير القد يطول نحو ١١ م .
سبطها نحو ٢٨ م . رأسها صغير الجرم . عينها ناشزتان .
زبانها شبه صولجانين . جوفها حنلي اللون كسنتي
المورج سبطها كسنتي اللون || روشنها الاماين الى الصهبة
المنجية يعلوها سبع نقط كسنتية وحاربي من اللون
نفسه . روشنها الخلفيان الى السرة الكسنتية النوراء المورج
يعلوها قرب الطرف الخارجى جدة مقلبة الاطراف لونها
الى الصهبة المنجية || لها جيلان في الحول . تظهر فراشة
الجيل الاول في نيسان وتظهر فراشة الجيل الثاني في آب .
تسرح في النهار . تماثل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع
وتتبع للمكن ميحاديلا نصال اوراق الغائل || السرة عت
يعلوها الكمال تطول نحو ١٥ م . جسمها اهلجي الشكل ،
المنصر والقدر . كيف الحمل القصير . ثوبها الى الخضراء
الامس يعلو خط قاطب اسمر وتسمه اطواق سكية بطورية
اللون . رأسها ارجواني اللون . منها ورواجبها الى الطلعة
السمره || طور الاكمال الذي يستمر في الجيل الاول
نحو ثلاثة اسابيع ، يستمر في الجيل الثاني نحو ٢٢ اسبوعا .

٣٠١١٨ - هَوَئِيَا ٥

Heodes virgaurea (S).

فراشة من فصيلة القنليات . طولها نحو ٣٣ م . ذكرها
اسمر الجسم خفيف الصدر مستدق البطن . رواشته الى الصفرة
الحمره المورج يطوقها حمار اسمر ويعلوها تنقيط لاقياسي
الحمره والبيهر . انثاءها سمره الجسم خفيفة الصدر والطن
رواشها الى الصفرة الخفيفة يطوقها حمار اكعب ويعلوها
تنقيط اسمر اسود || يألف المناطق والمراعي . يسرح
من حزيران الى آب . يرقت خاضلة تركب اوراق الحامض .

٣٠١١٩ - هَوَئِيَا ٥

Heodes chryseis (S).

فراشة من فصيلة القنليات . طولها نحو ٣٢ م . ذكرها
اصهب الذوب يعلو مورج ملهب . رواشته الى الحمره
الصنانية يعلوها تنقيط اسمر وتمشخ ازرق . حشارها حابن
اللون ، ابيض الطرف . انثاءها سمره الجسم ، حنطية الراوش
المزخمة بالاصفر والاخضر ويعلوها تنقيط اسود ويعلوها
حمار اسمر || يألف المناطق والمواقع الرطبة . يسرح من
حزيران الى تموز . يرقت تركب اوراق معظم النباتات
المنجية .

٣٠١١٠ - هَوَئِيَا ٥

Heodes doritis (S).

فراشة من فصيلة القنليات . جسمها مخروطي الشكل اسمر
اللون يطول نحو ٣٠ م . ذكرها كسنتي الراوش المنقطعة
بالاسود . انثاءها خضمة الشكل ، رواشها الى الصهبة الخضراء



هود الحامض



هود المتابع



هودمة



هودلة



هودة

مهدا بعض مناطق افريقية الجنوبية . سوقها متدعة لا إثر لها . اوراقها صغيرة الجرم ، خضية النصل . ازهارها بيضاء اللون || تزدهر القريتين ضمن الليوت . تربي في الارضية المعتدلة الاندماج ، والرافرة الخصب ، القنية بالمواد الغذائية العضوية والمعدنية || انواعها عديدة اشهرها التالية :

٣٠١٢١ - هَوْرَتِيَا جَامِدَة (S) Haworthia rigida (S) Haworthia rigida (F).

نوع من الهورثيا . اوراقها مشقعة ، خضية الصفوف ، عسوية الارتكاز ، تطول من ٧ الى ١٢ سم . نصلها شديدة الصلابة ، بحرية الخضار ، يطولها موج اسمر . ازهارها بيضاء اللون || تنويرها يستمر من ايار الى حزيران .

٣٠١٢٠ - هَوْرَتِيَا سَوْدَاء Haworthia acrovirens (S) Haworthia noirâtre (F).

نوع من الهورثيا . اوراقها متصببة ، ضيقة النصل ، غززية الشكل ، تطول من ١٥ الى ٢٠ سم . وتعرض من ٨ الى ١٠ سم . نصلها مثاقلة ، منشارية الخفاف . لونيا الى الخضار الالامس الشديد السمرة . ازهارها بيضاء اللون || تنويرها يستمر من ايار الى حزيران .

٣٠١٢١ - هَوْرَتِيَا لَوْرَجَة Haworthia viscosa (S) Haworthia visqueuse (F).

نوع من الهورثيا . اوراقها مشقعة ، ثلاثية الصفوف النظامية الترتيب ، عسوية الارتكاز ، تطول من ١٥ الى ٢٠ سم . وتعرض من ٣٠ الى ٣٥ سم . عفتها شالكة . عصارة نصلها لزجة . ازهارها بيضاء اللون || تنويرها يستمر من ايار الى حزيران .

٣٠١٢٢ - هَوْرَتِيَا مَزْرَدَة Haworthia fasciata (S) Haworthia zébrée (F).

نوع من الهورثيا . اوراقها مشقعة اقية الارتكاز ، تطول من ٣ الى ٤ سم . وتعرض من ١٥ الى ٢٠ سم . نصلها نالس الصفحة العليا ، لولزي الخطوط المتعرجة النظامية الشكل والترتيب ، خشن الصفحة السفلى . ازهارها بيضاء اللون ، تبينة الموج || تنويرها يستمر طوال شهر حزيران .

٣٠١٢٣ - هَوْرَتِيَا مَشْبَكَة Haworthia reticulata (S) Haworthia réticulée (F).

نوع من الهورثيا . اوراقها مشقعة ، اقية الارتكاز ، مقطعية الرؤوس ، تطول نحو ٢٥ سم . وتعرض نحو ٧ سم . نصلها محدودة الصفحات العليا ، محددة السفل . لونيا الى الخضار الزاهي تملوه خطوط متشابكة سمراء اللون . ازهارها تبينة اللون يطولها موج اخضر || تنويرها يستمر طوال شهر حزيران .

٣٠١٢٤ - هَوْرَسِيَا Rhacophorus (S) Rhacophorus (F).

جنس حيوانات قازبة شائعة من الضفادع وفصيلة الهورسيات . انواعها المعروفة نحو ٣٠ اعطائها تمتد من الهند الى الصين واليابان وجزيرة مدغشكر || اجسامها متباعدة القد يكثر فيها الحجم البسيط . اثنائها ثمانين البيئة التي تعيش فيها . اصابع قوائمها مقبدة بحبل رسيحة تمتد

حتى الاطراف المهذبة بلبب عجينة تمكثها من تسلق السطوح المائلة ومن التفتز شلجياً من شجرة الى شجرة .

٣٠١٢٥ - هَوْرَسِيَا Rhacophoridae (S) Rhacophoridae (F) Rhacophoridae (E).

فصيلة حيوانات دوداء قازبة شائعة من لمه الحديديات وربة السونيات وربة البترافات . اجناسها وانواعها المعروفة نحو ٨٠ مهدا البلاد الاسيوية والافريقية ومدغشكر . جميعها من الضفادع المعتدلة الحجم || اجسامها متصببة القد . اثنائها مختلفة الالوان يكثر لها الاخضر . تتميز بمائة البيئة التي تعيش فيها وتتميز ايضا بمساحة سطح خلسي قوسها الصدري في مركز قناتها ، وبجلو قرة العجز من التناوتات المنظمة الجانية . فكرها العليا مسنة . اصابع قوائمها مقبدة بحبل متباعدة الرحابة والانداد . اطراف اصابعها مزينة بلبب عجينة تمكثها من تسلق السطوح المائلة || تعيش معظم حياتها على الاشجار وتختلف النباتات || اثنائها تنسأ في مخاض خاصة تخلطها بمزوجة الذكور على خفاف المتعلق والتدافع فوق مستوى الماء ينمو ١٠ سم . ثم تحله نقعاً ثانياً متحدرًا من المحسن الى سطح الماء . الاثان عند التفرقة تقرر اولاً مادة رقيقة قوارة تمسحها ثلة الدليل المولدة من ٤ الى ٦ ديلة . ويقيم للدليل ضمن هذه الرقعة التي تكون له الرطوبة حتى التفت فيزلزل اذ ذاك على سطح الشجر وينفوس في الماء .

٣٠١٢٦ - هَوْرَسَة Aphomia sociella (S) Aphomia sociata (R).

فراشة من فصيلة التاريات وربة حرشيات الاجنحة . الاثان اكبر قدماً من الذكر . يسطها نحو ٣٥ سم . وبطة الذكر ٢٦ سم . جميعها الى البياض الخشن الموج . ريشها الاماميان الى الثيرة الشهاب في القرائين الاولين ثم الى الطحلة الخضراء تدرجها خطوط سمرة ونقط سود تتناهم الاصاب . ريشها الخلفيان الى البياض الاخير . اهداب ورائتها فضية تتركز على جده سوداء قليلة العرض || يربها الى الطحلة الصفراء تملوها ثمل سمرة . رأسها جفوي اللون || تعيش في غشاء بعض الحشرات من غشائيات الاجنحة وقد تدخل المنازل والمكاتب ويستودعات الورق ففرض الورق والكذب والقليل ...

٣٠١٢٧ - هَوْرَسَة لَاهِر Falae (F) Chiff (E).

حور مجلدسي مطلف من ارتقام امواج البحر . ج هوراع ولواجر .

٣٠١٢٨ - هَوْرَن Huron (F).

حيوان لاحم مفترس يده فزود ، اطلبه .

٣٠١٢٩ - هَوْرَة Hura (S) Hure, Sablier (F) Sandbox, Poesumwood (E) Sandblückenbaum (D) Sablier blanc (I).

جنس اشجار برية وحرجية من فصيلة القريونيات . انواعها المعروفة ٥ اعطائها البلاد الاستوائية والحارة . اوراقها متفكة متتالية نغيفة . نصلها قليلة الشكل ، مدبية القصبة . ثملها مجموعة من الفصوص الثنائية التلغة تحسن زوراً ليها جعالي المادة الفعالة . والثار عند انفلاقها يند الاذراك التام تحدث دورياً يشبه دوري الانفجار . يستخرج من عصارة سوقها ومن لباب ثملها مادة قلووية جعالية شديدة التلشط .



هورس



هورة

٣٠١٣٦ - هَوْرِيَا مُدَمِّسِيَّة

Heuchera sanguinea (S). *Heuchère sanguine* (F). *Coral bells*, *Crimson bells* (E). *Alranwurz*, *Rote Alunwurz*, *Purpurglockchen* (D). *Eucera sanguinea* (I).

نوع من الهوريرا ، شاربغها تملو من ٢٠ الى ٤٠ سم. اورانها مدارة خماسية او سباعية الفصوص المسنة المهدبة. نصلها مائل البشرة على صفحتيه ، ازهارها متفوية التجميع ، لونها ال احمر الدامية || تنورها يستمر من ايار الى تموز .

٣٠١٣٧ - هَوْرِيَّة
Hovenia dulcis (S). *Hovénia*, *Hovène sucré* (F). *Japanese raisin tree*, *Ground squirrel*, *Gopher* (E). *Hovanien*, *Zieseln* (D). *Ovenia* (I).

نبات وحيد الجنس والنوع من فصيلة البنيات . هذه الشرق الاقصى من اليابان الى الصين . شجرته تملو حتى ٢٠ م. اورانها متفوة متعاقبة مائلة ؛ نصلها قلبي الشكل يطول حتى ١٦ سم. ويعرض نحو ٩٩ صفحته مائلة البشرة ، مسنة الحافة . ازهاره خشوية التركيب ، صغيرة القد ، رتيلاها وقناياتها لبابية المادة ، حمراء اللون ، مأكولة ، سكرية المذاق ، طعمها كالزبيب . ويستخرج منها ومن الاوراق عطر مرغوب فيه شائع الاستعمال || تنورها يستمر طول فصل الصيف .

٣٠١٣٨ - هَوْرَقَل
Spermophilus (S). *Spermophile* (F).

جنس حيوانات لبونة قانصة من فصيلة السنجابيات. انواعه نحو ٦٠، منها ١٥ موطنها العالم القديم و٥٥ موطنها امريكا الوسطى والجنوبية . جميعها صغيرة القد طولا يراوح بين ٢٥ و٢٠ سم. واذنانها من ٦ الى ٨ سم. || اجسامها مستطيلة رشقة . رؤوسها اجنينية الشكل . حيوتها كبيرة . اذنانها مستديرة . جرمها الامامية رباعية الاصابع اما الخلفية فعشاسيس . اذنانها تقصار جيليات الصفوف . اذواها سوية اللون رؤوسها واطراف جرائزها الى الجفوة الصنانية . ظهورها الى الريدة . بطونها الى الصفار الشبي . وفي بعض الانواع الامريكية الثوب غططة وسها مؤذرة . تأثف الادغال والحقول المزروعة . تقسقل الانجار بشفة ، لكنها تقضي حياتها على الخفيض . ججورها حشرات فسيحة مستديرة عديدة الاتفاق تتركزها في الحوم على امحال تراوح بين ١٥٠ و٢٠٠ سم. قوتها البزور والحليب والجندور والفار والوزغ والطير . انائها تنفع من ٣ الى ٦ ادناس تبهر وتكتسي بعد اسبوع .

٣٠١٣٩ - هَوْرَان
Semnopithèque (F). نوع من القردو الخمسة يدي هبار ، اطلبه .

٣٠١٤٠ - هَوْرِيَّات
Sphingidae (F). هي فصيلة الصليبات من حرشفيات الاجنحة .

٣٠١٤١ - هَوْرِيَّة
Protoparce (S). *Protoparce*, *Sphinx d'Amérique* (F). *Horn worms*, *Horn blowers* (E).

جنس حشرات من فصيلة الصليبات او الموريات . انواعه المعروفة خمسة . جميعها فراشات كبيرة القد لا يقل طولا عن ٦ سم. وبسطةا تراوح من ١٠ الى ١٢ سم. اذواها مسنة مائلة المواجه يملوها بتجمع وتبيج اسمر . رؤوسها الامامية وأخلفية مزرققة وبزرشكة بالاسفر والاحضر

Horia (S). *Horie* (F). *Horia* (E).

جنس حشرات منطقة طيبة من همدات الاجنحة وفصيلة الذراحيات . انواعه المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم المناطق الاستوائية من المالين القديم والجديد . الجملانة منها خاضعة والشم ، اما البرقة فقاتضة وبعضها يتطفل على غشائيات الاجنحة || اجسامها كبيرة تطول من ٤٠ الى ٤٥ سم. رؤوسها كبيرة نافذة . ملاسها الشفوية قانصة . قرونها الاستعمارية صرطانية مقنفة . كسلها اصعب من الرأس واطين . احمادها جنية الشكل . اذواها متباينة الاوان يكثر فيها الاخر الحصري والجفوي ، بعضها مطوق القدم بطيقن ، قاعدي وطري || جميعها نافعة تستعمل استحال الزراع .

٣٠١٤١ - هَوْرَب
Gyps des Indes (F). هو الغشام الهندي ، اطلبه .

٣٠١٤٢ - هَوْرَنْ
Ketupa جنس طير من البويات وحمارة البويات . انواعه المعروفة اربعة . موطنها يمتد من الصين الى الهند وبلاد فارس . جميعها كبيرة القد ، قريبة الشبه من الببو . طولا يراوح من ٥٠ الى ٦٠ سم. اذواها الى الطلعة يملوها رقعة سوداء . تأثف النابات القليلة القانصة على مجاري الماء . سرعها دجوي يمتد من النسق الى الفجر . قوتها المستحب الاسماك والقرشيات || تدن في تجاريف الانجار . حضنتها تراوح من ٤ الى ٦ بيضات || اشهر انواعه هورن جبارا وهورن سرتيب .

٣٠١٤٣ - هَوْرِيَا
Heuchera (S). *Heuchère* (F). *Heuchera* (E). *Alunwurz* (D). *Eucera* (I).

نبات معقود التحريف على اسم الطبيب النساوي حور (١٦٧٧-١٧٤٧) وهو جنس نباتات عشبية رية ورتينية من فصيلة القليات . انواعها نحو ٤٢٠ جميعها جلسورية معمرة . اورانها جلعية الانتساب لا قياسية الاشكال والتفصيص . ازهارها صغيرة القد لا نظامية التجميع ، منها المتفوية والسنبلية والشكولية . جميعها تركز على شاربغ منتسبة رطبة .

٣٠١٤٤ - هَوْرِيَا امْرِيْكِيَّة
Heuchera americana (S). *Heuchère d'Amérique* (F).

نوع من الهوريرا . شاربغها تملو نحو ٥٠ سم. اورانها مدارة خماسية او سباعية الفصوص المسنة الحافة . نصلها خل البشرة على صفحتيه . ازهارها متفوية التجميع ، صغيرة القد ، تبدو الى الخضار الباهت ثم تنحرف الى الحنطي . تنورها يستمر من ايار الى حزيران .

٣٠١٤٥ - هَوْرِيَا صَمِيْرَة الزَّهَر
Heuchera micrantha (S). *Heuchère à petites fleurs* (F).

نوع من الهوريرا . شاربغها تملو نحو ٦٠ سم. اورانها مدارة خماسية الفصوص المسنة . نصلها مائل البشرة على صفحتيه . ازهارها متفوية التجميع يبيض البتلات ، خضر الكؤوس ، في المابر || تنورها يستمر من ايار الى حزيران .



هوري



هورن



هشرا



هوفية



هول



هولة

٣٠١١٩ - هوميروكولا الحصاب (S). *Homeria collina* Homérie des collines (F).

نوع من الميوية. منبتها الحصاب المشرفة على البحر. ساقها شراخية ترتفع من ٤٥ إلى ٦٠ سم. ورقها وسيقانها مستطيلة النصل. أزهارها تطلق الشرارات وهي إلى الحمرة السعفاء أو الحمرة الموهجة بالبرقائي في تنويرها صيفي.

٣٠١٢٠ - هوميروكولا أنيقة (S). *Homeria elegans* Homérie élégante (F).

نوع من الميوية. ساقها شراخية ترتفع نحو ٣٠ سم. ورقها وسيقانها مستطيلة. أزهارها تطلق الشرارات وهي إلى الصفار الكبريتي تعلو رقعة زرقاء في تنويرها صيفي.

٣٠١٢١ - هوميريات (S). *Humiriaceae* Humiriacées (F).

نصيلة نباتية من ذوات الفلقتين مستقلة الفصائل رقيقة المبيض. اجناسها ثلاثة وأنواعها نحو ٤٥ أعطتها البلاد الاستوائية اخصها امريكا الجنوبية إلى نباتاتها شجيرات وجنيات. أوراقها بسيطة، متعاقبة، عادية الزوايا، جلدية النصال. أزهارها عشكوي التجميع، طرفي الاذنكاز. أزهارها خشوية، نظامية، خلبية الاجزاء. ثمارها نوية إلى اشهر اجناسها الميوي.

٣٠١٢٢ - هوهو، كوكو مذهب (S). *Chrysococcyx auratus* Chalcid doré, Coucou doré (F). Gilded cuckoo (E).

طائر من القوقليات وقصيلة القيقويات. أصله افريقي الشرقي من البحر الاحمر الى الموزنيك. يألف الغابات الكثيفة. يحسه الاخصان الاقنية الاذنكاز في الانجبار الباقية وهو من القوقليات التي تجوب الغابات في طلب الرزق. جسمه متوسط القد بطول نحو ٣٠ سم. نوبه إلى السمرة الخفيفة يميلها مزاج اسفع في الجناسين ومابة ذهنية في ريش سائر الجسم إلى قهقهة الخشرات والاساربع اثناء كاشي القوقل لا تحضن البيض بل تقعه في شاش غيرها من الطير اغصها عشاش العصافير الحاشرة.

٣٠١٢٣ - هويبا (S). *Hoya* Hoya, Hoyer, Quadrille (F). Freshy leaved, Wax flower plant (E). Felschige Hoya, Porzellanium (D). Fior di cara, Fiore della cara (I).

جنس نباتات زينة معمرة من فصيلة الصقلابات. جميعها جنات مستطيلة حاشية فروع. أوراقها متعاقبة مستطيلة بيضة الشكل. نصلها جامد الصفة، قائم الخصار. أزهارها صيرالي التجميع للسنوي الشكل ايلي الاذنكاز. أزهارها صغيرة القد عاجية اللون يتوسط بلباتها دائرة حمراء. تنويرها يستمر طوال الربيع والصيف.

٣٠١٢٤ - هوييس (S). *Lophiomyx d'Inhous* حيوان لبون قاصم يدمي الدم، اطليه.

٣٠١٢٥ - هيياد (S). *Hyas* Hyade (F). Hyas (E).

جنس حيوانات بحرية من القشريات شاربات الاجرل قصيرات القليل الحركات ونصيلة المراجيات. انواطه المعروفة قليلة البد منتشرة في جميع بحار العالم باستثناء القطبية اجسامها محرمة، مستطيلة التبطيط، مثقلة الصفة العليا، تقطن من ٥ إلى ١٠ سم. ملاقطها نشطة، قوائمها



هوميروكولا



هويبا



مباد

والاصفر والاحمر الجليوي. تظهر الفرائشات وهي وحيدة أو ثنائية الجليل الجليوي في اوائل حزيران فتتأمل ثم تمتع مكها على اوراق الصغ وسائر نباتات القصيلة الباذنجانية فينتفج بعد متحه بحجمة أيام ويكون ذلك عند اواخر الوتيرة الثانية من حزيران. رقتها لكسي اللبوة القرية إلى رقاتها غفرار اللون، سماء اللب، كبيرة القد، حجمة الجوانب، تحمل في أصل مؤخرها زائدة صغية التركيب تشبه القرن. وهي تبلغ سجيها البتالي بعد نطقها بأربعة اسابيع فيأورح اذ ذلك طولها من ٨ إلى ٩ سم. اصفرار كبيرة لانها تلثم النصال مع مرقها ولا تبقي الا حل الاصلاح الشخنة إلى تكاتف تغيرا أو نفسا باستعمال اخضر باريس أو زوليخات الرساس أو الكريوليت أو الأندرين.

٣٠١٢٦ - هوم (S). *Sous-eol* الهوم هو بطنان الارض لا يظاله حرث أو نقب.

٣٠١٢٧ - هوم الجوس (S). *Humus*

« هجرة شبيهة باليامين فيها بعض الحلاوة وأجود زهرها الاخضر الذي يملو صفرة ويكون سدينا وسيت هوم الحرس لأن عبدة النار يستعملونها في صبادتهم ويسبون لها منافع عجيبة.

٣٠١٢٨ - هومات (S). *Humate*

ملح يتأتى من الحامض الدهالي.

٣٠١٢٩ - هومس (S). *Humus*

هو الدهال، اطليه.

٣٠١٣٠ - هومي أنيقة (S). *Humea elegans* Humée élégante (F).

جملة سبوتية زينة معمرة من فصيلة المركبات. مهدا استوائية. ساقها فروع تملو من ١٠٠ إلى ٣٠٠ سم. أوراقها متعاقبة حاشية. نصلها اعليجي الشكل، جميل الخصار، خلي الصفة، بطول من ١٥ إلى ٢٥ سم. رائحته، عند اللس، حلوة العرف. أزهارها رؤسية التجميع، صغيرة القد، كثيرة العدد، تقطن من ٨ إلى ١٠ سم. لونها يختلف مع الفرب، منها القرمزي والياقوتي والاشقر الحظي والايض. أزهارها هرمي الترتيب. تنويرها يستمر من حزيران إلى تشرين. تتكاثر بالبرر ويجود في جميع الاطربة المعتدلة الاندماج والارطوبه.

٣٠١٣١ - هوميرو (S). *Humirum* Humiria, Humirita (F).

جنس نباتات جنينة معمرة من فصيلة الهوميريات. انواعه المعروفة نحو ٢ مهدا امريكا الاستوائية. ساقها معتدلة التفنيد. أوراقها بسيطة، نظامية، متعاقبة، جامدة النصال. أزهارها عشكوي التجميع، طرفي الاذنكاز. أزهارها بيضاء اللون أو تنية أو وردية.

٣٠١٣٢ - هوميروكولا (S). *Homeria* Homérie (F). Homeria (E).

جنس نباتات عشبية دوفصية برية وزراعية زينة معقودة التعريف على اسم هوميروس. منبتها بعض اصفاق الشرق الاذن وافريقي الشمالية. ساقها شراخية. أوراقها فردية غنية النصال الباقية. أزهارها جملة الشكل، متساوية البلات، ملتصقة الاسدية التي تصبح كالانبوب وهي من فصيلة السوسليات. انواعها قليلة العدد اشهرها ثنائية.



هيب

البرقة عند بلوغها الكمال تطول نحو ٣٩ سم. جسمها اسطواني الشكل. نوها الى الحلقة القنبراء ملوفا بتدبير اسود وبخطوط قاطبة ومتفرعة صفراء اللون وشعول جانبية مهدية. رأسها شديد البسرة. تحمل في اهل متعها زائدة صغيرة هيئة نارية اللون تنشر عند الانقضاض وتقلع منها رائحة حريفة مزجية. وراؤها وبها الى البسرة || ملور الاكامل يستمر نحو ٢٨ اسبوعا. تحضنها الحادة متدلية برباط المشن تمضده الحفصية.

٣٠١٧٦ - هَيْمَة
Aiglon (F). Eagle (E).
هو فرخ العقاب لا يزال بحماية ابيه واه.

٣٠١٧٧ - هَيْمَة
بقلة من النجيل (للسان).

٣٠١٧٨ - هَيْمَة
Etiolation (F). Etiolation (E).
اصفرار النبات وتحوله. راجع فضالة.



هيام

٣٠١٧٩ - هَيْمَة
Nycticebus tardigradus (S).
Nycticebe tardigrade, Loris cardigrade (F).
Kukang Loris, Slow-paced Loris (E).

حيوان لبين وحيد الجنس والجنس من فصيلة البوريات موطنه يمتد من الهند الى صين. يألف الفئران والارحاج الميمنة الاشجار التي يتسلقها بشفة معدنة. ملهته الحياتي جامعي. جماعته قليلة العدد التي يراوح من ٥ الى ٢٠ سرسه دجوي يستمر من نعمة الليل الى الفجر العميق. قوته اوراق الاشجار وزمناتها والارحاج البقانة واغشرات والمصافير ويضها || يصير من الحيوانات الشاجرة لانه يخفي معظم حياته على الاشجار. جسمه قصيف صغير يطول نحو ٣٨ سم. يتميز بالندام الذنب. رأسه شبه مكور الشكل صغير الحبل والانس. عيناه كيرتان مستديرتان. اذناه صغيرتان، مستديرتان، كاسيتان. شعره جمل بالغ النعومة خالي للمس. نوبه الى الصبغة الصفراء المواج يطوها تمشيع ادنسى الى الايطان ويملو خط قاطب كسني يمتد من الحاجبين الى قمة الرأس تخرج الظهر فالسرم. عيناه ملوحتان بالاسود الادنسى. قصبة انفه غبراء اللون. ولونه هذا يتنور مع العمر اذ تملو نمشة فضية تزداد مع مرور الايام || الاثني تتحل يثوب الذكر الا انه اجهت ماجة وهي ثنائية الثدي. يحملها يستمر نحو سبعة اشهر تقفع في تمامه جروا واحدا.



هيام الزراند

٣٠١٨٠ - هَيْدَب
Cumulus
هو الصير، نوع من اليوم الماطرة المتوسطة الارتفاع.

٣٠١٨١ - هيدرات
Hydrate
جزء ماء استبدلت منه ذرة الهيدروجين القاعدية بذرة اخرى موجبة الكهربائية.

٣٠١٨٢ - هيدرات الكربون، هيدروكربونيل
Hydrates de carbone, Matières hydrocarbonées (F).
Hydrocarbon (E).

مركبات عضوية من الكربون والاكسجين والهيدروجين، منها الخلاصات غير الاثرية كالنشا والسكر ومنها المواد اللعنية وغيرها.

٣٠١٨٣ - هيدروبيكليات
Hydroptilidae (S).
Hydroptilidae (F). Hydroptilidae (E).
فصيلة حشرات من رتبة حبلونات الاجنحة. اجناسها وانواعها الممرقة قليلة العدد منتشرة في بعض مناطق البلاد



هيج

٣٠١٧٠ - هَيْمَة

Fibigia (S).
Fibigia (F). Fibigia (E).
جنس نباتات نجمية او هشيبة معمرة بيرة من فصيلة الصليبيات. انواعها الممرقة قليلة العدد، جميعها من ثبوت حوضي البصر الابيض المتوسط || سوقها غبراء. اوراقها متدنية، سنانية النصال. ازهارها شبه منبلي التجميع. ازدهاء صغيرة صفراء اللون. ثمارها سفهاء، شبه يبيضة اللون، مبطلة الجرم، خلية النفا، ثنائية البزور المفلطحة المستديرة || اعرف انواعها واشهرها الثلاثة التالية:

٣٠١٧١ - هَيْمَة جُوبِيَة
Fibigia clypeata (S).
Fibigia à bouclier (F).

نوع من الهيمية، نجمة صغيرة. اوراقها الجلدية سنانية النصال المستطيلة. اوراقها العليا غيطية. تنويرها صيفي.

٣٠١٧٢ - هَيْمَة صُليبة التمر

Fibigia eriocarpa (S). Fibigia laineux (F).
نوع من الهيمية. شبة معمرة. اوراقها الجلدية ريمية النصال المستطيلة المسنة الحطار. اوراقها العليا عصفية الشكل قصيرة. ثمارها مستطيلة الحبل الذي ييسر الكسوف تنويرها صيفي.

٣٠١٧٣ - هَيْمَة مَشْخِصِيَة
Fibigia rostrata (S).
Fibigia éperonné (F).

نوع من الهيمية. شبة معمرة. اوراقها كدوك الجيوبية. ثمارها كثيفة الحبل المتوسط الطول، تنتهي بنمسا حادة. تنويرها صيفي.

٣٠١٧٤ - هَيْمَة م *

Zerynthia (S).
جنس حشرات فراشية من عمارة المذاهبات. انواعها عديدة جميعها متوسطة القد، بسطها تراوح من ٤٦ الى ٥٢ سم. اجسامها اسطوانية الشكل، حنطية اللون. بطونها ملوثة يكثر فيها الاحمر والخطوط القاطبة. رواشها الى الصفرة تملو زركشة سوداء وتبيج احمر وارزق || تظهر في اوائل الربيع، تمتع مكنتها على مختلف النباتات البرية. يتقنف من رقات غاضلة تميش على اوراق النبات. يرقاتها اسطوانية الشكل غبراء اللون منشة بالاسود.

٣٠١٧٥ - هَيْمَة الزَرَاوَنْد *

Zerynthia polyxena - creusa (S).
Zerynthie du littoral, Thais, Cassandre (F).
Zerynthia polyxena - creusa (E).

حشرة من فصيلة الفراشيات رتبة حرشفيات الاجنحة. موطنها البلاد الحارة وبعض اقالي حوض البحر الابيض المتوسط. فراشها راضمة قوتها مغر الازدهار، سرعتها تميش على اوراق النباتات البرية واغصانها الزراند || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٩ سم. بسطها نحو ٤٨ سم. رأسها كسني اللون. صيها كيرتان ناضرتان. زباناها صرغياتان. جوشها كسني اللون. يطها الى الخنطى العناني يملو تنقيط جانبي اصفر وخطوط قاطبة ومتفرعة كسنية || رواشها، عنه الشقن الى الصفرة تملو زراکش وتراويق سود ويغ نقط حر وزرق || لما جيل واحد في الحول. تظهر القرائة في مطلع الربيع تسرح في النهار. تعاقل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع ويضع للكن مباحدا || نصل اوراق النباتات البرية واغصانها الزراند ||

Hydrologie (F).
Hydrology (E).

٣٠١٩٢ - هيدرولوجية
علم خصائص المياه وتوزيعها .

Hydromys (S).
Hydromys (F).

٣٠١٩٣ - هيدروميس *

جنس حيوانات لبونة قاضية من فصيلة الفأريات . أنواعه قليلة موطنها أستراليا ، جميعها قاذية . أجسامها مسطوية . طولها الكامل يراوح من ٤٥ إلى ٦٥ سم . رؤوسها مدوية الشكل . ذلقتها مقطوعة . أذنانها مستديرة . جرابها قصيرة ، أصابعها خاسية غشائية القاعدية || تألف شطوط البحر وغشاف الأنف والبيمرات ، تسبح وتطفس بسهولة فائقة . فئتها المواد النباتية والأسماك الصغيرة والقشريات .

Nectria (S).

٣٠١٩٤ - هيدكة *

جنس فطور مجهرية من السنجانيات وفصيلة الفطريات . أنواعه عديدة بعضها شديد الأذى || يوهها الخاريجي اعطليبي الشكل ، صغير القند ، رمحي الارتكاز . أعصابها فضحة ، نولية السطح ، مرجانية اللون ، ترتكز على ونبية ناتئة || بورخ نكتاتيا ثنائي الجها تشطرو ونيرة متعرجة الى جزئين || ملاسوين العلوي اكبر من السفلي || اعرف انواعه واضرها البتة التالية .

٣٠١٩٥ - هيدكة حمراء *

Nectria cinnabarina, Tubercularia vulgaris (S). Nécrose du bois (F). Coral spot (E). Rotpustelkrankheit (D).

فطر مجهرى يمتري بعض الانجبار المشمرة والحرجية انضغها الاجاص والبتلا والبنقد والتوت والجوز والحوار والخلاف والخوان والحوار والدردار والزنان واليزوريق والشرم والصنغرياء والصنوبر والعنبر والفيبريا والقرويين والقيقب والكتيبة والبلابل والمران والمغث واليق والهدال الخ ... فيغطها وقد يسبب يسهها || مظهره الخاريجي يشور جزئية اللون لا قياسية البعثة تركب الانضغ والافانان من الربيع الى الشتاء تنضبط البشرة واللحاء وتقضي على الشكير عند انتشاب البراعم فينبو الخشب حاريا من القشور تملو كسفة حمراء || يكالغ في الانجبار المشمرة مكافئة الهيدكة الخنطية .

٣٠١٩٦ - هيدكة حنطية * ، آكلة التفاح

Nectria galligena, Cylindrocarpum mali (S). Chancres du pommier, Ch. des arbres fruitiers à pépins (F). Apple canker (E). Apfelbaumkrebs, Nectriakrebs (D).

فطر مجهرى يصيب التفاح والاجاص فيسبب اوامع المعروف بآكلة التفاح || مظهره الخاريجي يشور مقرسة لا قياسية الشكل والحجم تركب الانضغ والافانان والثار || ييبو على الافاناد والافانان يقع جزئية تركب بشرة اللحاء ، عند انتشاب البرعمة ، فصيغها وتقضي عليها وعلى ما دونها من اللحاء حتى الشكير . وقد تمتد الى البرعمة فنضطها || وهو على الثار يقع مدنية تركبها قبل الإدراك وعنده وقتل السوط ونمجه بعد البشرة والقشرة . يذبل الشمر ويسقط او يفسر ويبقى كالموياء تكتنفه طبقة غروية لزجة لا تخلو من بعض التجاويف الخملية . يتكافى اولاً بقطر الانضغ المسامة ويتبعثر الجروح إما بسلفات الحديد اخلول ٢٪ واما بالمركب التالي : سلفات النحاس ١ ، كلس يافض ٢ ، زيت كتان محروى ٢ . ثانياً باستعمال سائل بورود اخلول من ٢ الى ٣٪ او غيره من الفواطير الفعالة على ان تنضغ الانجبار في الخريف

المتعددة الحرارة || اجسامها شديدة الصفر ، حمراء اللون . بسطة اجنتحها تراوح من ٦ الى ٨ سم . اجنتحها الامامية كثيفة الخلد مميعة || ملجها الحياتي جاعي . افواجها كثيرة العدد . طيارتها سريع الحركة . تخلق فوق مجاري الماء من العصر الى فحة الليل || اساريها تعيش في المياه الزائكة ملحوة بمجاليب بسطة او قعية الشكل ، حرورية النسيج || اشهر اجنتها :

Hydroptila (S).

الهيدروبتلا

Agrytes (S).

الآغريلا

Oxyethira (S).

الأكسيثيرا

٣٠١٨٤ - هيدروبيسيكيات *

Hydropsychidae (S). Hydropsychidés (F).

Hydropsychidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة جملوزيات الاجنحة . اجنتها وانواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها متوسطة القند ، وبداء اللون . بسطة اجنتها تراوح من ٢٥ الى ٣٢ سم . اجنتها قليلة الزناوين ، شبه شفافة ، مهدبة الحواف الخلفية . ملاسها الفكية مسطوية عند الشقين || اساريها طليقة ، تعيش في المياه الجارية بين الاعشاب المائية والصخور . بعض اجنتها مفرس يصنع شباك يحكمها بين الاعشاب فيقتسر ما يلقن من حويينات || اشهر اجنتها :

Hydropsyche (S).

الهيدروبيك

٣٠١٨٥ - هيدروجين ، هيدروجين ، هيدروجين

الهيدروجين . Hydrogen (E). Hydrogène (F). مولد الماء . غاز شديد الاشتراك عادم اللون والشم والرائحة يوجد في الماء وفي جميع المواد العضوية . رمزه (H-٢) . وزنه الذاتي ١.٠٠٨ - راجع ايدروجين .

Hydrographe (F).

٣٠١٨٦ - هيدروغراف

Hydrographer (E).

العالم بالمياه السطحية ويسأولها .

Hydrographie (F).

٣٠١٨٧ - هيدروغرافية

Hydrography (E).

علم المياه السطحية ووصفها .

Hydrophidae (S).

٣٠١٨٨ - هيدروفيديات *

Hydrophidés (F). Hydrophidae (E).

فصيلة حيات مميعة سامة من امانيات الاحادية . اجنتها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم عمار البلاد الحارة . جميعها تقرب الشطوط في زمن التساقط لانها تفسر يعضها في الرمل . وبها انواع تقسم الاغوار وتسير بعيداً في الأنهر || اعرف اجنتها واشهرها الهيدروبيك المعروف بحية الماء والمقام والبرداس والتجافة .

Hydrophilis (F).

٣٠١٨٩ - هيدروفيس

اطلب نية الماء .

Hydrocarbons (F).

٣٠١٩٠ - هيدروكربور

Hydrocarbon (E).

الهيدروكربور تألف كيميائي يتركب من الكربون والهيدروجين .

Hydrocoryle (F).

٣٠١٩١ - هيدروكوتيل

Pennywort (E).

هي فصعة الماء ، اطلبها .



هيدروبيك



هيدكة حمراء



هيدكة حنطية

أصقاع العالم . سوقها فردية تنشعب عند القمة . اورثاها جذرية الانتشاب . أزهارها وريسية صغيرة ملونة || أعرف أنواعها وأشهرها ما يلي .

٣٠٢٤ - هيراسيوم أژيب ، عطفوة

Hieracium pilosella (S). Piloselle, Vélutée, Oreille de rat (F). Mousse ear hawkweed, Mousse ear (E). Kleines Habichtskraut, Maudschrän (D). Pelosella, Pilosetta (I).
نوع من الهيراسيوم البري . جلوده طيبة يقال أنها تستعمل في بعض العلاجات الصدرية . ساقه مزينة بطلع نحو ٣٠ سم . اورثاها جذرية الانتشاب ، ينيضة الشكل ، نصلها أژيب البشرة على سطحه . أزهار فردية ، صفراء اللون . ذهنية الخواص .

هيدكة سوداء



هيدكة صئوبية



هيدكة قمرزية



هيدكة مرجانية



هيراسيوم



هيردان



هيمية

٣٠٢٥ - هيراسيوم برنقالي

Hieracium aurantiacum (S). Epervière orange (F).
نوع من الهيراسيوم البري . ساقه تعلو من ٢٠ إلى ٥٠ سم . اورثاها جذرية الانتشاب باستثناء واحدة أو اثنتين . نصلها اعليجي الشكل ذات الزام الاخير لونه الى الحمرة الداكنة . رؤسائه الزهرية برنقالية اللون ، عابكة المراج ، كثيرة القعد الذي يراوح من ٥ إلى ١٥ || تنوره يستمر من حزيران الى تموز .

٣٠٢٦ - هيراسيوم صوفي

Hieracium villosum (S). Epervière à toison (F).
نوع من الهيراسيوم البري . ساقه تعلو من ٢٠ إلى ٤٠ سم . اورثاها الجذرية منتقة ، ستانية الشكل ، تطول من ٧ إلى ١٠ سم . وتعرض من ١ إلى ٢ سم . اورثاها الجذرية لائقة ، قلبية الشكل ، صفيرة قلند ، جميعها بحرية اللون بعلوها موج اذرق . نصلها مستطيل الزنب المبش . رؤسائها الزهرية فردية التجعج او ثلاثية ، نرسا الى الصفار القزحي || تنوره يستمر من تموز الى ايلول .

٣٠٢٧ - هيردكان

Falcaria (S).
Falcaria, *Critama* (F). *Falcaria* (E). *Sicheldolide* (D). *Falcaria* (I).
جنس نباتات شقية برية من فصيلة النجيليات . انواعها المعروفة اربعة ، منها الحقل والبراري . سوقها فراء منتشة . اورثاها كدية مستطيلة الاثناك والفصوص اصبغة . أزهارها صيولي . أزهارها صئرية القذ ودية اللون او ليلية .

٣٠٢٨ - هيرية

Hyria (S).
Hyria (F). *Hyria* (E).
جنس حيوانات مائية من الرخويات صفيحات الحياشيم وفصيلة التبادات . انواعها المعروفة قليلة العدد ، اعطتها انهر وميجرات امريكية الجنوبية واصغها نهر الامازون || اصداها كبيرة القذ ، متساوية المصارع الاذنية ، تطول من ٨ الى ١٢ سم . غشاء اصفاها من الداخل معتدل السماكة للزلي المادة || تبيض في اسماك الصفاق وينها انواع تقترب من الاغوار || لحوبها مأكولة ، متوسطة الصفت .

٣٠٢٩ - هيس

Age (F). *Plough-beam* (E).
هو السلب اي الجزء الجانح لاثار اجزاء الحراث .

بعد الاعبال || هذا مع العلم ان القفاح او الاجاص المرص لهذا الوسم هو الموجود في الموانع الرطبة والمرويس على اعماق تقود ٥٠ سم . وفي تربة كثوم او تربة كثرت فيها نسبة المادة الكلسية .

٣٠١٩٧ - هيدكة سوداء ، آكله الزان

Nectria ditissima, *Cylindrocarpon willkommii*, *Fusidium candidum* (S). *Chancro du hêtre* (F).
فطر مجهري يصيب الزان بانثاله اللغنية فيمطها . مظهره الخارجي لطلع قدية الشكل سوداء اللون دائرية الانتشار يراوح طولها من ١ الى ٢ سم . تصيب بشرة الانسان وتتشتر عرضا الى ان تطبقها تفضي على اللحم وعلى التبادل البشري . وقد تسبب قروصا لثاثة تعلق الخشب كما في القفاح والاجاص والخور .

٣٠١٩٨ - هيدكة صئوبية ، آكله الصئوبريات

Nectria cucurbitula, *Cylindrocarpon cylindroides tenue* (S). *Chancro des conifères* (F).
فطر مجهري يركب بعض الاشجار الصئوبية اصغها الصئوب والنبوب || مظهره الخارجي يقع مهدية الخار لا قياسية الشكل والحجم لونها الى الحمرة الفراء . اعطها يبيض قصار لا متسارية الانتشار والكثافة ، تشري الانسان المجروسة وتكثر في الاغصان المقطوعة المطروسة حل التربة الرطبة || اغصان زعيدة لا تستلزم المكافحة .

٣٠١٩٩ - هيدكة قمرزية ، آكله الخور

Nectria coccinea, *Cylindrocarpon candidum* (S). *Chancro du peuplier* (F).
فطر مجهري يصيب الخور فيصيب الوسم المعروف بآكله الخور وقد يصيب القيقب والاسفندان والزان والسندبان . مظهره الخارجي يقع لا قياسية الشكل والحجم ، قمرزية اللون . يركب بشرة القيقب والانسان نصلها يد ان تقرح اللحم والشكر . ويصيب الخشب || يكافح في الخور مكافحة الهيدكة الخطيفة ومن المستحسن تحفيض التربة لتخفيف رطوبتها .

٣٠٢٠٠ - هيدكة مرجانية ،

Nectria ribis, *Tubercularia confinis* (S).
فطر مجهري يركب الكشيش والاجاص والزيزون والوردار . مظهره الخارجي يباس ضبابي يحل ببعض افئاد الشجرة ثم يعقب ظهور بطور منتفخة لا قياسية الحجم لونها الى الوردي ثم يتعرف الى المرجاني || يكافح بقطع الاغصان المصابة عند ظهور البياض وباستعمال الطرق المذكورة في مكافحة الهيدكة الخطيفة .

٣٠٢٠١ - هيركل

Hyrrae (F).
حيوان لاسم مقترن يدهى فرزون ، اطليه .

٣٠٢٠٢ - هيرازماج

Menhe crispae (F).
هو التمتع الجمعي ، اطليه .

٣٠٢٠٣ - هيراسيوم ، حشيشة الغرب

Hieracium (S). *Epervière*, *Oreille de souris* (F). *Hawkweed*, *Hawk's eye* (E). *Habichtskraut*, *Distelkraut* (D). *Ieracio*, *Orecchio di topo* (I).
جنس نباتات عشبية معمرة برية ويترتبة من فصيلة المركبات . انواعها المعروفة زهاء ٣٠٠ منتشرة في معظم

Choléra des poules (F). **هَيْشَمَةُ الطير** ٣٠٢٢٠
هي كوليرا الدجاج ، اطلها .

٣٠٢٢١ - **هَيْشَمَان * ، فُجَل انخيل**

Cochlearia armoracia (S). Ralfort, Grand ralfort, Ravenelle, Cran des Anglais, Cranson, Radis à cheval, Moutarde des Allemands, Armoracia(F). Common horse-radisch (E). Meerrettich Löffelkraut, Meer-Rettig (D). Ramolaccio, Armoraccia, Erba forte, Barba forte, Rafano (I).

جلس نباتات عشبية طيبة برية ممررة من الهيفانيات وفصيلة الصليبيات . جلورها غليظة مسطيلة يشبه اللوز خردلية الطعم . اوراقها متعاقبة متفتحة سنانية الشكل ، ازهارها صغيرة القد ، يشبه اللوز ، سنطيلة التجميع ، هامة الانكاز . ثمارها خريشبات دقيقة مسطيلة . يزورها مستدرة حمراء اللون ، يتحصر منها زيت طيار يشبه زيت الخردل ، يدهي زيت خردل الزوايا او الخردل الابناني . وهو مضاد لداء الحفر ، يدر اللسان والبول . وفيه الامراض العصبية المزمنة .

Raphanées (F). **هَيْشَمَانِيَّات** ٣٠٢٢٢
سبط من فصيلة الصليبيات يشمل بعض الاجناس اشهرها الهيفان والفجل .

Oryx de Nubie (F). **هَيْطَلَة** ٣٠٢٢٣
هي الاربع السديلي ، اطلها .

Molossinés (F). **هَيْعَرَات *** ٣٠٢٢٤
عمارة من فصيلة الرامسيات . اجناسها اربعة ، تتميز باذانها المنفصلة عن الفناء الجذلي || أما اجناسها الاربعه فهي : الزرداب والصفوح والفور والميرة .

Molosse (F). Molossus (E). **هَيْعَرَة *** ٣٠٢٢٥
جلس غفاقيش من عمارة الهيمرات . موطنه البرازيل والاقليل . انواعه عديدة . اجسامها صغيرة القد رمية . رؤوسها غليظة . فرائسها مستعرضة رافعة . اذانها كبيرة ، قلبية الشكل || يعيش جماعات متوسطة العدد . يسرح في اوائل الليل واواخره . قوته الحشرات . يألف تجاوبف الانجار الحرجية والمغاور والكهوف .

Vent du Nord-Est (F). **هَيْف** ٣٠٢٢٦
North-East wind (E).
رياح مهبها بين الشمال والشرق وجهاها بين الجنوب والغرب . وهي رياح حارة نكاه تهيج النبات وتؤذيها .

Hyphales (F). **هَيْفَانِيَّات *** ٣٠٢٢٧
مرتبطة فطور مجهرية من رتبة الزوايات . تتميز بهيئتها السطحي الانكاز ، الندي الشكل . كنانها تملو كرمياتها الثؤادية || فصالها اربع : الكنتيات والكسبيات والطحيات والوطيات .

Hypha (F). Hypha (E). **هَيْفَلَة *** ٣٠٢٢٨
ج . هيف . مجموعة خيوط نباتية صاعدة الخيطية يتألف منها هيكل الفطر والحزاز .

٣٠٢٢٩ - **هَيْفَل ، جَرِيح**
Forsythia (S). Forsythie (F). Golden bells (E). Glockenstrauch, Forsythie (D). Forsythia (I).

جلس جنبات برية وزينية من فصيلة الزيتونيات . انواعه

Histogenèse. **هَيْسْتُوجِنِيَة** ٣٠٢١٠
Histogénie (F). Histogeny (E).

الهستوجنية علم يبحث في تكوين الانسجة العضوية .

Histographie (F). **هَيْسْتُوجْرَافِيَة** ٣٠٢١١
Histography (E).

الهستوجرافية وصف الانسجة العضوية .

Histon **هَيْسْتُون ، هَيْسْتُون** ٣٠٢١٢
عصر فرضي يقال انه اساس المواد النووية الخلية .

Roncraie (F). **هَيْشَة** ٣٠٢١٣
Brake, Brambly ground (E).

هي دخل السيلق او منته وكل ارض كثر فيها هذا النبات .

٣٠٢١٤ - **هَيْشَر** هو الحرف ، اطلها .

٣٠٢١٥ - **هَيْشَرِيَّات**

Carducées, Carduinées, Cynarées, Cynarocéphales, Flosculeuses (F).

سبط من فصيلة المركبات ، اجناسه وانواعه كثيرة العدد معظمها بري وبضها زراعي || اشهر اجناسه : الارضي شوكي والقرطم والقتنرين والضمياء والكارارين واللاتيون وربي الايل والورلة .

٣٠٢١٦ - **هَيْشَمَ هَرَمِي ، كُوشِيَة هَرَمِيَة ، مَكْنَسَة الحنكة**

Kochia trichophylla (S). Kochia-cyprus (F). Mock-cypress, Summer-cypress (E). Sommer-Cypresse (D). Cipresso d'estate (I).

نوع من الميثم وهو عشبة سولية زينية هرية الشكل . ساقها فروع ناع . اوراقها مشرعة خلية ليدة تبلو جملة الخضار الاصفر الزاهي ثم تتحرف الى الصنابي وتستقر على الاحمر الى ان تلوي في اواسط الخريف .

٣٠٢١٧ - **هَيْشُور**

الميشور والميشوم واسد . قيل و نبات رغو فيه طول على راسه برصوة كانه عتق الرأل || وقال ابو حنيفة : ومن المشب وله ورقة شاكه منها شوك غسقي وهو يسق ، وزهره صفراء وتقلل ، له قصبه في وسطه حتى تكون اطول من الرجل (اللسان) .

٣٠٢١٨ - **هَيْسُ ، هَيْسُ ، ذَنْقِي**
Fiente (F).
Dung, Droppings (E).

هو رجيع الطير من اي جنس كان وهو من الاصداء العضوية الشبيهة بالامادة الاثرية || يقال حاص وهاض وذلق وذائق الطائر : ربي بربيحه .

٣٠٢١٩ - **هَيْسُور ***

Sisor
سمكة بحرية مستطيلة وصيدة الجنس والتور من مفتوحات الخانة وفصيلة السالوريات . اصطناعها المياه الخفية . تتميز بفراية جسمها المردني الشكل اللين الطرف . رأسها مقنوم الخلف . تحمل في فكها عذبات مستطيلتان ، زعانفها كبيرة القد . زعنفتها الخشبية تنهي بايل فتيق كالباس طولها يعادل طول الجسم .



هيسور



هيفان



هيرة



مِفْلُومِ اسط



مِفْلُومِ تَوَحِي



مِفْلُومِ حَرَمِي



مِفْلُومِ رَحْمِي



مِفْلُومِ قَرِيدِي



هَيْفَة

ساقه مستدلة الجرم ، ناشرة الطوق بيشاء اللون . نكته كالتوبج قطرها نحو ٤ سم . لونها الى الصفار الاسقع اللامع . اطراسه الى الوردي المايق .

٣٠٢٣٦ - هَيْفَلُومُ حَرَمِي * Hypholoma fascicularis (S). Hypholoma fasciculé (F).

نوع من الميفلوم . يعيش على خاء الجلولو المنطوية . ساقه رفيعة ، خفيفة ، موصية ، صفراء اللون . نكته قطنسوية الشكل ، رطلة ، قطرها نحو ٤ سم . لونها لون الساق . اطراسه خفيفة ، نحولة ، زيتونية اللون . لحيته صفراء اللون ، مرة المذاق .

٣٠٢٣٧ - هَيْفَلُومُ زَنْجَارِي * Hypholoma serotinosum (S). Hypholome vert de gris (F).

نوع من الميفلوم . يوجد في غابات السديان والمليل . ساقه لزنية ، مستطيلة ، ربادية اللون ، رقيقة الطوق . نكته دقيقة ، مظلية الشكل ، قطرها نحو ٦ سم . لونها الى الرمادي الزنجاري المواج . اطراسه الى البني الزنجاري .

٣٠٢٣٨ - هَيْفَلُومُ قَرِيدِي * Hypholoma sublateralium (S). Hypholome brique (F).

نوع من الميفلوم . يعيش على الارويات والجلولو النشرة . ساقه موصية مستدلة الارتفاع والطلاقة ، قليلة الاستدارة ، شبه مبطلة . نكته صبيانية الشكل ، قريبية اللون ، قطرها نحو ٨ سم . لحيته بيشاء اللون ، مرة المذاق .

٣٠٢٣٩ - هَيْفَات * Hyphomycetes (F). Hyphomycetes (E).

ظهور مجهرية خفيفة ، عارية الزود ، ظاهرة الخيط الكفيفة التجميع ، تنبري ساء الانجار والجلود والورق وفيها ... قشيب نوعاً من العفن القشار .

٣٠٢٤٠ - هَيْفِيَّة * ، شَجَرَةُ المَطَاط ، مَطَاط Hevea (S). Hévéa, Arbre à caoutchouc (F). Caoutchouc tree (E). Kautschukbaum (D). Eves (I).

جنس انجار حربية وزراعية من التينويات السويبات . انواعه قليلة العدد . اوراقها مستطيلة ، معتمة ، املجية ، مستطيلة النصل الجادة . يستخرج من سيقها بالخر مصارة لزجة مطاطة لها استعمالها الصناعي || اشهر انواعه هيفية البرازيلي وهيفية الفريزان .

٣٠٢٤١ - هَيْق ، هَيْقَم ، هَيْكَل الحيق والحيقم : ذكر النعام . يقال أشم من هيق واحد من يحمل .

٣٠٢٤٢ - هَيْكَل Ossature (F). Framework (E).

مجموعة الاعضاء الجادة الصلبة الرضية التي يرتكز عليها الجسم والتي .

٣٠٢٤٣ - هَيْكَل عَظَمِي Squelette (F). Skeleton (E).

مجموعة العظام التي يرتكز عليها الجسم الحيواني .

المعروفة ، مهدبا عند من اليابان الى اوروبية . سيقها فرواه . اوراقها متعابلة مابلة . ازهارها رباعية الفسل ، لجاسية البلات المتندمة القاعدة ، ثنائية السداة ، جملة الشكل ، ذهبية اللون ، تنور قبل انبلاج الورق .

٣٠٢٣٠ - هَيْفَلُومُ أَخْضَرُ الشُّرُومِ Forsythia viridissima (S). Forsythie vert franc (F).

نوع من الميفل التريزي ، جنبته تملو من مرتين الى ثلاثة امتار . ساقه فرواه . فروعه مجوفة السلايات ، متحصية ، عسراء اللون . اوراقها مستطيلة سنائية الشكل ، نصلها جامد الصفحة يطول من ٦ الى ١٥ سم . ويعرض من ٢ الى ٤ ، ازهاره لا قياسية التجميع الذي يراوح من ١ الى ٣ ، لونها الى الصفرة الباهة || تنوره يستمر من اذار الى نيسان .

٣٠٢٣١ - هَيْفَلُومُ أُرُوبِيَّة Forsythia europaea (S). Forsythie d'Europe (F).

نوع من الميفل التريزي ، جنبته تملو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . ساقه فرواه . فروعه متحصية عمراء اللون . اوراقه مستطيلة بيضية الشكل ، نصلها جامد الصفحة متبادلة التسين يطول من ٤ الى ٨ سم ، ويعرض من ٢ الى ٤ سم . ازهاره لا قياسية التجميع الذي يراوح من ١ الى ٣ ، يتلاها ملتفة الاطراف ذهبية اللون || تنوره يستمر من اذار الى نيسان .

٣٠٢٣٢ - هَيْفَلُومُ مَدَّتِي الْأَزْهَار Forsythia suspensa (S). Forsythie à fleurs pendantes (F).

نوع من الميفل التريزي ، جنبته تملو من ٢ الى ٤ م . ساقه فرواه . فروعه مجوفة السلايات ، نحيلة اللون ، قشيب مستقيمة متحصية ثم تنطفت وتتل . اوراقه مركبة ثلاثية التخرم ، وريقاتها جامدة النصل مشارية الحافة . ازهاره مستدلة ، لونها الى الصفار المذهب المايق . تنوره يستمر من شباط الى اذار .

٣٠٢٣٣ - هَيْفَلُوم * Hypholoma (S). Hypholome (F).

جنس ظفور من فصيلة الفلاريقونيات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطائها بعض غابات المناطق المعتدلة الحرارة والحارة . تعيش على جذوع الانجار واريقاتها وعلى التريل والدبال . معظم انواعه كاعن الصنف غير معروف فيه . اعرف انواعه واشهرها الخمسة التالية :

٣٠٢٣٤ - هَيْفَلُومُ أَمْعَط * Hypholoma depilectum (S). Hypholoma pelé (F).

نوع من الميفلوم . يوجد في حراج الصنوبر . ساقه خفيفة ، صفعة ، دقيقة ، تنتهي بطوق مستعرض الحاشية ، لونها الى الطحلة يطولها تمسح اذرة . نكته كبيرة ، شبه مستديرة ، لزجة ، قطرها نحو ١٢ سم . لونها الى الطحلة الصفراء . اطراسه تندر ليلكية ثم تحمر نحو الحفرة الابوانية .

٣٠٢٣٥ - هَيْفَلُومُ ثَوْنِي * Hypholoma coronillum (S). Hypholome petite couronne (F).

نوع من الميفلوم . يوجد على التريل في المواقع الرطبة .

٣٠٢٤٤ - مَيْكَلَة °

Scalétophage (F).
Sculétophagy (E).

الميكلة علم يبحث في المياكل العظمية ، من حيث التركيب والشكل ، عند الانسان والحيوان .

٣٠٢٤٥ - مَيْل ، أَبْقُود ، نَكِير °

Hille (F).
Hilum (E).

نقرة صغيرة في الزرة لا قياسية الشكل والموقع تكون عادة نقطة الاتصال بأغشية الثمرة .

٣٠٢٤٦ - مَيْلَانِيُوم ° ، هِيلَانِيَة

Helenium (S). Hélénie (F).

جنس نباتات عشبية سريرية من فصيلة المركبات . انواعه عديدة معظمها امريكي المنيث . اوراقها متعاقبة ساجدة . ازهارها وريسية مستعرضة السينات المسنة . تحمضها بيسية الشكل . يلدوها خماسية الثلور الهديئة او المسنة . اعراف انواعها واشهرها ما يتبع .

٣٠٢٤٧ - مَيْلَانِيُوم اَمْرِيكِي °

Helenium nudiflorum (S). Hélénie nudiflore (F).

نوع من الميلانيوم المعمر . ساقه مزينة فروع تملو من ٥٠ الى ١٠٠ سم . اوراقها حاضنة ساجدة سنانية النصل . رؤوساته الزهرية جوية اللون عادمة السينات || تنوره يستمر من تموز الى ايلول .

٣٠٢٤٨ - مَيْلَانِيُوم خَرِيفِي °

Helenium autumnale (S). Hélénie d'automne (F).

نوع من الميلانيوم المعمر . ساقه سرحة فروع تملو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . اوراقها ساجدة ساجدة سنانية النصل المنسج الحار . رؤوساته الزهرية مذهبة القروس ، كبيرة السينات الثلاثية او الخماسية التفريضة || تنوره يستمر من آب الى تشرين الاول .

٣٠٢٤٩ - مَيْلَانِيُوم نَحِيلُ اللُّرَى °

Helenium tenuifolium (S). Hélénie à feuilles grêles (F).

نوع من الميلانيوم الحولي او الحول . ساقه فروع تملو من ٤٠ الى ٥٠ سم . اوراقها خيطية النصل الذي يمرض نحو ١ م . رؤوساته الزهرية حشوكية التجميع ، صفر الاقراص ، يرض السينات الشارفة المفرضة || تنوره يستمر من آب الى تشرين الاول .

٣٠٢٥٠ - مَيْلَسْتُ الصَّنَوْبَر ° ، هَيْلَسْتُ اَسْوَد °

Hylastes ater (S).

Hylastes des pins (F).

حشرة من الكراشيات ، طولها نحو ٤ م . جسمها مستطيل الشكل اسود اللون ، تركب مع ريقاتها بطور الصنوبر فضلتها وتقيها .

٣٠٢٥١ - مَيْلَسْتُ النَقْل °

Hylastinus obscurus (S). Hylaste du trèfle (F).

حشرة صغيرة من الكراشيات ، طولها يراوح من ٢ الى ٣ م . قوبها الى السمرة النحمة يلدوها خل الحمل . مرتها يختلف من مرتع سائر انواع جنسها لانها تعيش على النباتات النحمة بدلا من الاشجار . يرض مع ريقاتها تركب النفل في جلوره تفلنها وتقضي عليها .



ميلانيوم



هيلست الصنوبر



ميلست النفل



هيلوت سداسي الخطوط



هيلود

٣٠٢٥٢ - هَيْلَمَة القَح °

Hylemyia coarctata (S). هي ذبابة الحنطة ، اطليا .

٣٠٢٥٣ - هَيْلَمَة المَلْفُوف °

Hylemyia brassicae (S). هي ذبابة الملفوف ، اطليا .

Hylemyia cana (S). هي ذبابة البزلاء ، اطليا .

٣٠٢٥٥ - هَيْلَمَة رَمَاصِيَة °

Hylemyia brunescens (S). هي ذبابة القرنفل ، اطليا .

Anthomyidae (S). هي حشرات من فصيلة الالبانيات ورتبة ذوات الجناحين .

اجناسها وانواعها عديدة جميعها ضارة تؤذي النبات . رابع ذبانيات .

Hylobate (F). هي حشرات من فصيلة الالبانيات ورتبة ذوات الجناحين .

٣٠٢٥٧ - هَيْلُوبَات °

هو الجلب ، اطلي .

٣٠٢٥٨ - هَيْلُوتُ سُدَاسِي الخطوط °

Melotes sexlineatus (S). Héloé à six lignes (F).

سمكة بحرية من شائكات الزعانف وفصيلة القرشيات . اعطانها تمتد من الحنك الى اسنانية || جسمها شبه وشي الشكل ، مستطيل التبطيط ، يطول نحو ١٧ سم . قوبها الى الرتبة الزرقاء الموج ، تشتت زرقته عند الظهر وتتقلص في البطن القضي الموج ويلدوها ستة خطوط سود قاطبة تمتد من الرأس الى القنب . زعنفتها الظهرية مستطيلة ، القسم الاول منها هربي الشكل ، ذرب المناسخ ، القسم الثاني حاد المناسخ . زعنفتها الذيلية مقعرة || لحها جيد الصنف ، مرغوب فيه .

Hylotrupe (F). هي حشرات من فصيلة الالبانيات ورتبة ذوات الجناحين .

٣٠٢٥٩ - هَيْلُورُوب °

هو زعنوق الاعدة ، اطلي .

Hyloides (S). هي حشرات من فصيلة الالبانيات ورتبة ذوات الجناحين .

Hyloide (F). Hyloides (E).

جنس صفاد شجرة من فصيلة الكدانيات . انواعها المعروفة قليلة البدن مهدا امريكية الاستوائية || اجسامها صغيرة القد تطول من ٤ الى ٥ سم . عند الذكور وين ٥ الى ٦ سم . عند الاناث . رؤوسها مستدلة الطول والعرض . عينها مستديرة جاحظة . فكوكها السفلى عادمة الاسنان . اصابع قوائمها الامامية والخلفية عادمة الخطاب مجوز يطابق بحجمية تتكلم من تسلق السطح المائلة || تعيش كامل حياتها التي لا تقل عن عشر سنوات منتقلة من نبات الى نبات ومن شجرة الى شجرة . قوتها الحشرات والاساريد والحوام || الانثى تترأ ديلها احاديلا ولا تطرحه في الماء بل في المواقع الرطبة تحت النباتات المسطحة وتحت الاوراق وبين الحجارة . صغارها عند التقف لا تغلو من القوائم البقية النحيلة ولكنها تتدبر بوجوه الذئب الذي لا يتغضم قبل مرور اربعة اسابيع .

٣٠٢٦١ - هَيْلُوفِيلَة ثَانِيَة اللون °

Hytophila bicolorana (S). Hytophila bicolor (F).

حشرة من فصيلة النسيقيات ورتبة حشرشيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الادنى الى اوروبا . فراشها واسعة



Dressé (F). Erect (E).

٣٠٢٧٥ - وَاكْد

هو الشيء القائم السوي، الانتصاب، يقال قرن وَاكْد وساق وَاكْد.

Watsonia (S). **وَاتْسُونِيَّة، وَطْصُونِيَّة**.
Watsonia (F). Bugle lily, Watsonia (E). Watsonia (D). Watsonia (I).

جنس نباتات معقودة التعريف هل اسم الطبيب البريطاني وَاكْسُون (١٧١٥-١٧٨٧) وهي عشية دولسية من فصيلة السيليات. أنوعها المعروفة نحو ٢٥ مهدا أفريقية الجنوبية. سوطها قرصية الانتصاب. أوراقها عصفية النصل. أزهارها جميلة الشكل متعددة الألوان || أشهر أنواعها ما يتبع.

٣٠٢٧٧ - **وَاتْسُونِيَّة أَرْجَوَانِيَّة**

Watsonia coccinea (S). Watsonia écarlate (F).

نوع من الواتسونية البرية، شراخها الزهري يعلو من ٢٥ إلى ٣٥ سم. أوراقها عصفية النصل. أزهارها سليل التجميع يمد من ١٥ إلى ١٦ زهرة. أزهارها ناشرة القصباب المستنق، لونها إلى الأرجواني الأزهي || تنورها يستمر طوال شهر حزيران.

٣٠٢٧٨ - **وَاتْسُونِيَّة قَصِيرَةُ الْوَرَق**

Watsonia brevifolia (S). Watsonia à courtes feuilles (F).

نوع من الواتسونية البرية، شراخها الزهري يعلو من ٢٥ إلى ٣٥ سم. أوراقها عصفية الشكل قصيرة النصل. أزهارها سليل التجميع يمد من ٨ إلى ١٢ زهرة. أزهارها عينة القصباب القمية الأطراف. لونها إلى البياض الموشع || تنورها يستمر طوال شهر أيار.

Descendant (F).

٣٠٢٧٠ - **وَايِط، هَايِط**

هو نفيس الصاعد. Descendant, Deascending (E).

٣٠٢٧١ - **وَايِل**

هو المطر الشديد الغشم القطر، والويل أيضاً.

٣٠٢٧٢ - **وَاتْ**

Watt

وحدة مقياس قوة التيار الكهربائي.

Xylophia (S).

٣٠٢٧٣ - **وَات، جَوْزَةُ الشَّرَاكْ**

Xylopie (F).

جنس الشجار وشجيرات برية وزراعية من فصيلة القشديات. أنوعها المعروفة قليلة، مهدا الحبيشة، وقد انتشرت في أكثر المناطق الأفريقية. أوراقها متعاقبة ممتدة كاملة، نصلها جامد الصفحة قصير الزناد. أزهارها بسيطة أو محورية الانتكاز عديدة البتلات الأبيض. ثماره عتية. يزود حريقة السهم فكهة مقوية تستعمل استعمال البهارات. أشهر أنوعها وات الحبيشة.

٣٠٢٧٤ - **وَات حَبِيشَة*، فِلْغِل السُّودَان**

Xylophia aethiopica (S). Xylopie d'Ethiopie, Poivre d'Ethiopie (F). African pepper tree (E). Athiopischer Pfefferbaum, Mohranpfeffer (D). Pepe d'Ethiopie (I).

نوع من الوات الزراعي يكثر في الحبيشة وقد تمت زراعته معظم الاقطار الأفريقية الحارة. شجرته متوسطة القد. أوراقها متعاقبة ممتدة. نصلها أهليلجي الشكل جامد الصفحة. أزهاره فردية التجميع، بسيطة الانتكاز. ثماره عتية مستطيلة تلتف صفاً واحداً من البزور الاجانية الشكل || ثماره وبزود من التوابل المنشطة الشامة الاستعمال.



وات الحبيشة

٣٠٢٧٩ - وَأَسْطُولِيَّةٌ كَثِيْفَةُ الزَّهْرِ

Watsonia densiflora (S). *Watsonie à épi dense* (F).
نوع من الواسطونية الزيبينية البروقية . شراخها الزهري
يعلم من ٦٠ إلى ٩٠ سم . أوراقها صفية متصل تطول
من ٤٥ إلى ٦٠ سم . وترى نحو ١٢ م . حنارها سيمك
الحاشية تبني اللون . أزهارها سبلي التجميع كثيف الترتيب
يعد من ٤٠ إلى ٥٠ زهرة . أزهارها محجنة القصالب
المستطيلة ، قصيرة البلات ، لونها إلى الوردي ومنها
فروب يفس || تنورها يستمر من أواسط أيار إلى
أواسط حزيران .

٣٠٢٨٠ - وَأَسْطُولِيَّةٌ مَرِيَالِيَّةٌ

Watsonia meriana (S). *Watsonie mérianie* (F).
نوع من الواسطونية البروقية . شراخها الزهري يعلم من
٣٠ إلى ٦٠ سم . أوراقها سبيلة الشكل ترض نحو ٣ م .
أزهارها سبلي التجميع ، وعلى الترتيب ، يعد من ١٢ إلى
٣٠ زهرة . أزهارها محجنة القصالب مستطيلة البلات . لونها
إلى البياض الناصع ومنها فروب وردية وموهجة || تنورها
يستمر طوال شهر أيار .

٣٠٢٨١ - وَأَسْطُولِيَّةٌ مُنْتَصِبَةٌ الزَّهْرِ

Watsonia strictiflora (S). *Watsonie à fleurs dressées* (F).
نوع من الواسطونية الزيبينية . شراخها الزهري يعلم من
٣٠ إلى ٥٠ سم . أوراقها صفية متصل المستط . أزهارها
سبلي التجميع يعد من ١٢ إلى ١٨ زهرة . أزهارها مستقيمة
القصالب المنتصب التي تطول نحو ٤ سم . بتلاتها مستدلة لقد
حراء اللون تتوسط كل منها نجمة بنفسجية اللون قرمزية
المزاج || تنورها يستمر طوال شهر حزيران .

٣٠٢٨٢ - وَأَسْطُولِيَّةٌ وَرْدِيَّةٌ

Watsonia rosea (S). *Watsonie rose* (F).
نوع من الواسطونية الزيبينية البروقية . شراخها الزهري
متشعب الفروع يعلم من ١٠٠ إلى ١٥٠ سم . أوراقها
صفية متصل . أزهارها محجنة القصالب . قصالب وبتلاتها
متساوية في الطول ، لونها إلى الوردي الأزلي || تنورها
يستمر من تموز إلى أيلول .

٣٠٢٨٣ - وَأَلِنٌ

Albiz (F). *Trade-winds* (E).
اسم يطلق على الرياح السائدة المختطة التي تهب بين دارتي
الانقلاب من الشرق إلى الغرب . وهما وإتان ، وأثن الشال
الذي يهب من الشمال الشرقي ويجه نحو الجنوب الغربي
وآثن الجنوب الذي يهب من الجنوب الشرقي ويجه نحو
الشمال الغربي . وآثنان تستعمل أيضاً بمعنى الصفة أو
الشم .

٣٠٢٨٤ - وَأَلَجٌ

Zoophage (F). *Zoophagous* (E).
الواضع ويدي اللام - كان قوله اللحم سنواناً كان أم
دوية أم سفرة .

٣٠٢٨٥ - وَأَجِبٌ

Débet (F). *Debit* (E).
هو ما يلزم دمه بعد الحامية .

٣٠٢٨٦ - وَأَجِبٌ الْأَدَامُ

Exigible (F).
هو ما كانت المطالبة به ممكنة .

٣٠٢٨٧ - وَأَحَسٌ

Oasis
بقعة خضراء نظرة تفر لها الماء ومصب التربة في وسط
صحراء قاحلة .

٣٠٢٨٨ - وَأَحِيفٌ

جناح كثير الريش .

٣٠٢٨٩ - وَأَحِلٌ

Limicole (F).
نمت تعريفني يطلق على الديدان والحلوانات الدنبا الشاملة
التي تعيش في الطين والأوساخ .

٣٠٢٩٠ - وَأَكْرَثٌ

Héritier, Noir (F). *Heir* (E).
هو أحد اقرباء الميت اللذين يحق لهم شرعاً أخذ نصيب
معين من تركته .

٣٠٢٩١ - وَأَكْشٌ

Hétérotrophe (F).
Heterotroph (E).
هو كل نبات يعيش طفلياً على المواد الغذائية التي يحورها
وعطها النبات الشاح .

٣٠٢٩٢ - وَأَرْفٌ

Verdoyant (F). *Verdant* (E).
ورف النبات : نسر واهزّ فهو وارف أي ملجّج أو
ناصر .

٣٠٢٩٣ - وَأَرْقٌ

Frondicole (F).
الورق : ما كانت حياته مستمدة من الورقة أو أنه يعيش
عليها .

٣٠٢٩٤ - وَأَزْعٌ

Chien de berge (F).
Shepherd's dog (E).
الوازع هو كلب الراعي لانه يرعّ الوض من الثمن .

٣٠٢٩٥ - وَأَشَعٌ ، وَأَشَعَةٌ

Floricole (F).
هي الجاصة ، الحشرة التي تعيش على الأزهار .

٣٠٢٩٦ - وَأَشَحٌ

Anthophage (F).
Anthophagus (E).
من يعيش على الأزهار ومنها ، راجح جامس .

٣٠٢٩٧ - وَأَشِلٌ

Cryptandre (F).
لعت تعريفني يطلق على كل ذكر من الحيوان طلاس
أشوار الشفي .

٣٠٢٩٨ - وَأَشْنُورِيَّةٌ

Wachendorfia (S).
Wachendorfia (F).
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة المهادريات .
انواعها المعروفة أربعة . مهدها منطقة رأس الرجاء الصالح
في اطراف افريقية الجنوبية || جميعها تزيبينية . أوراقها
لاطحة ، كبيرة ، مستطيلة اتصال الحفدة المنحنية الاطراف .
شراخها الزهرية تنتهي بمجموعات من الأبرار سبيلة
التركيب . أزهارها سداسية البتلات ، مستحبة الدرف
أخلفت ، حيلة الألوان الزاهية .

٣٠٢٩٩ - وَأَشْنُورِيَّةٌ

Washingtonia, *Pritchardia* (S). *Washingtonie*, *Pritchardie* (F).
جنس أشجار زيبينية من فصيلة النخليات معقودة التصريف
على اسم واشنطن رئيس الولايات المتحدة || أنواعها



واشندرية



واشندرية

٣٠٣٠٧ - وَاقِ الشَّجَر * ، هُرَابِ اللَّيْلِ

Nycticorax nycticorax (S). Bihoreau, Héron bihoreau (F). Night heron (E).

طائر من البشريات ، جسمه متوسط القد يطول نحو ٥٦ سم. ثوبه متباين الألوان ، أسود الرأس والرق ، أخضر الظهر ، أخضر الصبر والذنب . يعمل على رأسه بعض الريش الدقيق الطويل الشديد البياض .

٣٠٣٠٨ - وَاقِ صَغِير * ، مِلْبَحِيَّة

Ixobrychus minutus (S). Blongios nain (F). Little bittern (E).

طائر من البشريات ، جسمه صغير القد يطول نحو ٣٧ سم. ثوبه متراكب الألوان ، ظهره اسمر يلعب بالأخضر ، بطنه إلى الصهبة ، باطن جناحه أبيض ، متفارع أصفر الجسم اسمر المثنى . ساقه إلى الخضار البحري .

٣٠٣٠٩ - وَاقِيَّة

Événement (F).

الواقعة هي الحادث ، عطية .

٣٠٣١٠ - وَاقِل

Balæna japonica (S).

Baleine du Japon (F). Whale of the Japan (E).

نوع من البال ، موطنه شمال المحيط الهادي وقد شوهد قرب كاليفورنيا وجزر ألوشيا . جسمه كبير القد ، رمعي الشكل ، يطول من ١٤ إلى ١٨ م. ثوبه نفي اللون ، رصاصي الموج ، يميح مع اقترابه من ثوب الخضر ويغير عند البطن . أثناء تقصير جرواً وأسدأ ترصمه نحو الحول .

٣٠٣١١ - وَاقِيَّة

Talles (F). Suckers (E).

الواقية هي فراخ الزرع الناتجة من الاشتهاء ، راجع شطه واشطاه .

٣٠٣١٢ - وَالْبَرِيَّانِ أَخْرَ

Valériane rouge (F).

هو الوشمة الحمراء ، عطية .

٣٠٣١٣ - وَاقِم

Sarre (F).

هو المصري ، عطية .

٣٠٣١٤ - وَاقِك

الواكك ، الواككن ، نمت تمريني يطلق على كل طائر حاشين .

٣٠٣١٥ - وَاقِيْف

Verdoyant (F). Verdant (E).

النباتات الواظفة المهترئة من كثرة الأوراق الخضراء .

٣٠٣١٦ - وَاقِيَّاتِ الْمَتَاظِير

Lévirostras (F).

Lévirostrata (E).

مرتبة من الطيور الجوارح التي تتميز بصفتها متناظرة الكبيرة . فصائلها وأجناسها عديدة . أشهر فصائلها الخضاريات والشرقيات والاركوبيات .

٣٠٣١٧ - وَاقِيِي

Chacal (F).

هو ابن آوى ، عطية .

٣٠٣١٨ - وَتَاءَ - وَتَوَاتَن

Epidémie, Epiphytie, Epizootie (F). Epidemic, Epizooty (E).

كل مرض شديد العدوى سريع الانتشار يصيب الإنسان أو الحيوان أو النبات وينتقل من مكان إلى مكان ومن

المعرفة حمة جميعها اسطوانية السوق الليفية المائلة المنتصبة . اوراقها مرسية الشكل جميلة الخضار الفسقي ، كروها مستطيل البود دقيق شالك ، شوكة صدر القد عجين . ازهارها عكولي التجميع ، كبير القد ، كثير التشعب . ازهارها خشوية التركيب . ثمارها ثنوية جامدة اللب الماد المائلة . بزورها خشبية صلبة لا تصلح لني || مهدها كاليفورني وجزر الايتيانوس الهادي . أشهر انواعها ، الواشطوتية القوية والواشطوتية الليانية .

٣٠٣١٠ - وَاشْطُوتِيَّة قَرِيَّة

Washingtonia robusta (S). Washingtonia robusta (F).

نوع من الواشطوتية . جلدها عمودي الانتصاب ، غليظ القاعدة ، مستقيم الطرف ، يطول من ٦ إلى ١٠ أمتار . اوراقها دنيئة مرسية قطرها نحو ٢٠٠ سم. ثوبها إلى الخضار الفسقي اللامع الموج . كروها شديد الخضار يطول نحو ١٠٠ سم. شوكة أصفر اللون صغير القد شديد التجميع || مهدها شواطئ نهر سكومتو في كاليفورنيا . تهيئ ويهيئ أيتها زويت بشرط أن لا تنخفض الحرارة من ست درجات ستفتراد وأن يمين لها الري الوافي عند الحاجة .

٣٠٣١١ - وَاشْطُوتِيَّة لَيْفَالِيَّة

Washingtonia filifera, Pritchardia filifera (S). Washingtonia filamentosus (F).

نوع من الواشطوتية . جلدها اسطوانية مستقيم يرتفع من ٤ إلى ٦ أمتار . اوراقها دنيئة مرسية قطرها نحو ١٥٠ سم. ثوبها إلى الخضار الفسقي الزاهي يعلوها خيوط ليفية شقراء اللون تشبه الشعر . كروها دقيق متين شالك طوله نحو المتر || مهدها كاليفورني ، تحصل الحرارة المنخفضة حتى الست درجات ولا تقصف العطش . تهيئ في جميع الأتربة لكنها تفضل الخوازة حيث تهيئ وتتمو بسرعة .

٣٠٣١٢ - وَاقِسِم

Pathogène (F). Pathogen (E).

كل متعض أو كائن حي يسبب مرضاً ما .

٣٠٣١٣ - وَاقِدَة

Grippe (F). Influenza (E).

هي الانفلونزا ، مرض معد يصيب الحيوان ولا سيما الخيل .

٣٠٣١٤ - وَاقِي

Préventif (F). Preventive (E).

٣٠٣١٥ - وَاقِي *
Botsurus stellaris (S).

Butor étoilé (F). Bittern, Common bittern (E).

طائر من فصيلة البشريات ، طويل العنق والمتنار والرجلين والاعافر ، قصير الزنكي ، أصفر الزنكي ، أصفر الريش المرقش الموش .

يجب الزولة فيخفي في النهار بين الأسل ويكثر الصباح في الليل . قال الشاعر مرقش السديري :

ولقد حدثت وكنت لا أعود على واق وسحاتم

فاذا الاضام كالآيا من والأيمان كالأضام

وكذلك لا خير ولا شر على أحد بدائم

٣٠٣١٦ - وَاقِي أَبْيَض ، سَيْبِيَّة

Ardeola rallioides (S). Héron crabier (F).

Boatbill (E).

طائر من البشريات ، صغير القد طوله نحو ٤٢ سم. ثوبه إلى البياض الإبري يعمل على رأسه طرة من الريش المستطيل النقي الأبيض والأسود . متفارع إلى الزرقعة ، اسود المثنى والقاعدة .



واق



واق الشجر



واق صغير

٣٠٣٣١ - وَبِيرَةِ ٥ Calonectria (S).

جنس فطور مجهرية من الساعيات وفضيلة الشبوات .
أصنافها غشبية ، بحبة السطح ، مرجانية اللون ، تتركز
على ريشة نائقة . تكاثرت صفة الشكل . بعضها عديد
الخلايا البثرية الانقسام المتوالي || أنواعها المؤذية قليلة
أعرقها وبلة الزرع .

٣٠٣٣٢ - وَبِيرَةِ الزَّرْعِ ٥

Calonectria graminicola, C. nivalis, Fusarium nivale, F. miniatum, F. loliae (S). Moisissure nivale des céréales, Fusariose des céréales (F). Snow mould of cereals (E). Schneeschimmel (D).

فطر مجهرى يركب الزرع وأصعبها التيلم والحلقة والشريان
وبعض التيليمات البرية || مظهره الخارجي يكتن على
شكلين : الأول عندما يصيب الزرع في أبان حبه فيقبلو
ككتلة من القطن المنفوش تلتصق بنواحي الزرع ويصفه
كالخلفة || والشكل الثاني عندما يصيب الزرع بعد حبه
فيولد ذلك لمطفاً خلية لا تقياسه الشكل والحجم ، لونها
الذئبة تملو الصف والاحاد والسلايات || أعراضه
منطقة مبطونة التربة والعوامل الجوية الملائمة || يكافح
بتطهير البذار بواسطة أحد الفطاطير الناجمة ومنها أملاح
الذئب .

٣٠٣٣٣ - وَبِيرَةِ ٥ Phacelia (S).

Phacelia (F). Phacelia (E).
الاسم العلمي من اليوناني يعني « حنة » . جنس نباتات
عشبية ، حولية أو محولة من فصيلة التيميات . أنواعها
المعروفة عديدة منها المناطق الحارة من المليون القديم
والجديد || بعض أنواعها الحولية مرغوبة لزراعة
والانعام . سوقها خلية الصفاء ، فراء . أوراقها متعاقبة ،
ريشية . أزهارها سبلي التجميع . أزهارها رحيقية يجربها
التنل وهي زرقاء اللون أو بنفسجية أو ليلية أو بيضاء ||
اشهر أنواعها التالية .

٣٠٣٣٤ - وَبِيرَةِ جَرِيْسِيَّةِ ٥

Phacelia campanularia (S). Phacelia campanulée (F).
نوع من الويرة الزرقية . عشية حولية تملو من ١٥ إلى
٣٥ سم . أوراقها اعليجية للشكل مغرفة وسنفة . أزهارها
بيضاء اللون . توجعها مغرفة جريسية الشكل ، لونها إلى
الزرق المائقة يطولها عند قواعدها خمس نقط سود ||
تنويرها يستمر من حزيران إلى أيلول .

٣٠٣٣٥ - وَبِيرَةِ لَسِيدَةِ ٥ Phacelia congesta (S).

Phacelia congesta (S).
نوع من الويرة الزرقية . عشية حولية تملو من ٣٥ إلى
٥٥ سم . ساقها وفروعها مزينة بالأحمر . أوراقها ثلاثية
أو خاسية أو سباعية التثريب القوي . أزهارها كبيرة القند
قطرها نحو ٦ سم . لونها إلى الزرق المائلة . توجعها خلية
البشرة ، فصلها سنانية الشكل . استينها قليلة النشور ||
تنويرها يستمر طوال شهر حزيران .

٣٠٣٣٦ - وَبِيرَةِ لَرَجَةِ ٥ Phacelia viscidula (S).

Phacelia viscidula (S).
نوع من الويرة . عشية حولية تملو من ٣٥ إلى ٦٥ سم .
أوراقها شبه قلبية الشكل ، طولها نحو ٦ سم . نساها
لينة ، مسننة الحثار . أزهارها مستدة الحبر ، قطرها
نحو ٣ سم . لونها إلى الزرق تتصلها بقبة ابروانية ||
تنويرها يستمر من تموز إلى آب .

منطقة جغرافية إلى أخرى . وهو بذلك يتنوع عن الأمراض
المعدية التي لا تنتقل من منطقة جغرافية إلى أخرى .

٣٠٣٣٩ - وَبِيرَةِ مُؤْصِفِيٍّ ٥ Enzootia (F). Enzooty (E).

هو الوباء المحدود الانتشار الذي لا يتجاوز المزرعة أو
المنطقة الجغرافية .

٣٠٣٤٠ - وَبِيرَةِ ٥ Epidémiologie (F).

Epidemiology (E).
الوباء علم يبحث في ماعية الأمراض الوبائية وفي أسبابها .

٣٠٣٤١ - وَبِيرَةِ ٥ Adaptation

من وباء المكان : أقال . الوباء هو الألياء الموق
الناجم .

٣٠٣٤٢ - وَبِيرَةِ ٥ Tridax (S). Tridax (F).

مجلسة عشية حولية برية من فصيلة المركبات . ساقها
مخزمية الفروع تملو نحو ٩٠ سم . أوراقها متعاقبة مطقة
انفصوص المدية الشائكة . أزهارها كثيف التجميع .
رويساتها الزهرية صفراء اللون ، شائكة السينات المثلثة
الحسك . بزورها ريشة التديب . تنويرها يستمر طوال
شهر حزيران .

٣٠٣٤٣ - وَبِيرَةِ ٥ Rabourissement (F).

Stunted (E).
هي حالة كل حيوان أو نبات شذ يجتنبه وقلة نموه عن
معدل نموه || أما الحيوان أو النبات الذي يشذ يصغر
جسمه عن معدل نموه فهو أضعف وهي زبواه .

٣٠٣٤٤ - وَبِيرَةِ ٥ Disproportion

الويد هو نقص الجسموري المائب ، ج أوباد .

٣٠٣٤٥ - وَبِيرَةِ ٥

هو الزلم ، حيوان من السمانيات ، اطلبه .

٣٠٣٤٦ - وَبِيرَةِ ٥ Poil, Duvet (F). Hair, Down (E).

الوبر هو للابل وللأرنب ونحوهما كالصوف القتم .
وهو إحدى غامات النسيج المشهورة يستخدم في صنع
للمنسوجات المختلفة وصيور أهركات التي تنمض فرطية .

٣٠٣٤٧ - وَبِيرَةِ ٥ Cathcartia villosa (S).

Cathcartia villosa (F).
نبات عشبي حولي بري وزرعي من فصيلة الخشخشيات .
ساقها فراء كثيفة الذهب المستطيل تملو نحو ٣٥ سم .
أوراقها بيضية الشكل مستعرفة . نصلها عشن الصفحة ،
خلى البشرة ، مهدب الاطراف . زفها وأعدابها جزوية
اللون . أزهارها ناجية فردية كبيرة القند ، قطرها نحو ٥ سم .
لونها إلى الصفر الكبريتي الزاهي || تنويرها يستمر
طوال شهر حزيران .

٣٠٣٤٨ - وَبِيرَةِ زَهْيِيٍّ ٥ Tomentaux (F).

Tomentous, Downy (E).
نمت تعريفي يطلق على أجزاء النبات والحيوان المغطاة
وبر قصير نام .

٣٠٣٤٩ - وَبِيرَةِ ٥ وبص الجرو : قنع عليه .

٣٠٣٥٠ - وَبِيرَةِ ٥ Rut, Chaleurs (F). Rut, Heat (E).

طلب الضأن أو بالآخرى لتناج لسفاد .

مفتول، أما إذا انهدم فبدى الصفاق كما في عضلات الظهر. أما وظيفته فهي التوسط بين أطراف العظام والمضلات أو بين المضلات نفسها.

٣٠٣٤٧ - **وَتْر** (F). Impair (F). Odd, Uneven (E).
الوتر ما لم يتقلف من العدد.

٣٠٣٤٨ - **وَتْر التماس** (F). Corde de contact (F).

٣٠٣٤٩ - **وَتْر الزوكية القليصة** (F). Hypoténuse (F).
Hypotenuse (E).

٣٠٣٥٠ - **وَتْرِيَة ، فَرْدِيَة** (F). Imparité (F).
Imparity (E).
كون الشيء غساً أو فرداً.

٣٠٣٥١ - **وَتْرِيَة التركيب** (F). Imparipennée (F).
نعت وسمي يطلق على الأوراق المركبة المنتهية بورقة فردية واحدة.

٣٠٣٥٢ - **وَتْر** (F). Waltzia (S). Waltzie (F).
جنس نباتات حولية برية وتربيتية من فصيلة المركبات. أنواعها المعروفة نحو ١٢ شكلها شكل السرخس. سويها فرعاه. أوراقها متعاقبة جامدة النصل. أزهارها رؤسية. بزورها مجزأة بامتداد متقادي الشكل || أحرف أنواعها وأشهرها ما يلي.

٣٠٣٥٣ - **وَتْرَة بَيْضَاء** (S). Waltzia nivea (S).
Waltzie blanche (F).
نوع من الوتر، عشبه تملو نحو ٥٠ سم. رؤسياتها الزهرية كثيرة العدد. أزهارها إلى الصغار الكبريتي، قناباتها مدببة الأطراف || بيضاء اللون || تنورها يستمر طوال فصل الصيف.

٣٠٣٥٤ - **وَتْرَة عَشْكَرِيَة** (S). Waltzia corymbosa (S). Waltzie en corymbe (F).
نوع من الوتر، عشبه تملو نحو ٦٠ سم. أزهارها عشكورية التجميع، لبه الترتيب. رؤسياتها الزهرية كثيرة العدد. أزهارها وريدية اللون قناباتها مستطيلة لسة بيضاء اللون. تنورها يستمر طوال فصل الصيف.

٣٠٣٥٥ - **وَتْرَة مَهْدَبَة** (S). Waltzia aurea (S). Waltzie dorée (F).
نوع من الوتر، عشبه تملو من ٥٠ إلى ٧٠ سم. أزهارها عشكورية التجميع، على الترتيب المتتابع. رؤسياتها الزهرية كبيرة القليلة العدد. أزهارها وقناباتها ذهبية اللون || تنورها يستمر من آب إلى أيلول.

٣٠٣٥٦ - **وَتْلُوف** (S). Cichorium intybus (S). Witloof, Chicorée à grosse racine (F). Witloof (E).
نوع من المهنداه الزراعية الخنزارية. وهي بقلة مأكولة الجذر والأوراق تكثر زراعتها في البلاد الأوروبية. ترطب في الأرضية الخوارة المنخفضة الانسجام الفنية بالمواد العضوية. زراعتها تتطلب بعض العناية أعصها طمر الأوراق عند ازدياد الارتفاع الأولى منها || أما الوتلوف فهو يحوي ما قدره :

من الماء	٩٣,٠٠ ٪
من المواد الأزوتية	١,٢٢ ٪
من المواد الدهنية	٠,٤٧ ٪
من المواد المستخلصة	٥,٣١ ٪

٣٠٣٥٧ - **وَبِيرَة مُهْدَبَة** (S). Phacelia purshii (S).
Phacelia frangée (F).

نوع من البورية. عشبة حولية تملو من ٢٥ إلى ٥٠ سم. أوراقها السفلى مدقة طول نحو ١٠ سم. وتتسم إلى ١٥ سكة. أوراقها العليا لاطئة، خاسية السك. أزهارها صلبة القدر قطرها نحو ١٥ سم. لونها يراوح بين الأزرق والبيجي. تلق توجيهاً مهدبة الأطراف || تنورها يستمر من أيار إلى حزيران.

٣٠٣٢٨ - **وَبِيلَة ، وَبِيل** (F). Fagot (F). Faggot (E).
سزنة الخطب الدقيق الميدان.

٣٠٣٢٩ - **وَت** (F). Cri du palombe (F).
الوت والوت : صياح الورشان.

٣٠٣٤٠ - **وَتَح ، كَبَشُون** (S). Capnodium (S).
جنس فطور مجهرية من فصيلة الترحيات. أنواعها عديدة، منتشرة في معظم انظار العالم، تركب الحشيشات والريثون والصنصناف والسنديان الخ... أعصانها مكورة ترتكز على أمن دقيقة تنشب في وثبات المشج. أبيضها الزرقية مؤفورة التركيب قتيبة الشكل سمراء اللون || وهو ركب لحاء السرق والأصضان ويشرة الاقتان ولا يعترى الأوراق. منظره الخاصي وشاح كالصمام لا قياس الكثافة والسك، لزج للمس، اسمر اللون.

٣٠٣٤١ - **وَتَح المَهِلُون** (S). Zopfia rhtzophila (S).
فطر مجهرية يدى من الترحيات ركب جهور المهلون والسفدر فيؤفها وقد يقضي عليها. أعصانه سيد كروية الشكل. زته يعطي مذهب الرأس والمغلب، مشعود الوسط يحسن ٨ أبواغ ثنائية البويضات المائلة.

٣٠٣٤٢ - **وَتَحِيَّات** (S). Capnodiaceae, Perisporiaceae (S). Périssporiacées, Capnodiaceae (F). Perisporiaceae, Capnodiaceae (E).
فصيلة فطور مجهرية تنتمي إلى رتبة الترحيات. ألقاها محصورة مراكية منفلقة سمراء اللون. يوهها يتحمر عند نضج الإنسان، من مرق رأسى لا نظامي الانشقاق وهو كثير العدد أسطواني الشكل أو يشبهه، غيراته لا قياسية العدد || أجنتها وأنياعها كثيرة أما التي تركب النبات وتظلل عليه فقليلة، أشهرها الوتج والشان.

٣٠٣٤٣ - **وَتَدَة** (F). Pile, Stake (E). Pilot (F).
عمود من عشب منوط الخلافة والطول يستعمل للرز في الملتح.

٣٠٣٤٤ - **وَتَدَكَة** (F). Tragus
هنة مثلفة الزوايا مركزها عند فجة صمخ الأذن.

٣٠٣٤٥ - **وَتَر** (F). Chord (E).
جسم محيطي مرن يستعمل في بعض الآلات الموسيقية المعروفة بالآلات الوترية. تصنع الأوتار عادة من أمعاء بعض الحيوانات ومن اسلاك معدنية. ويجب أن يكون الوتر منسوب الغداء والكثافة في كامل طوله.

٣٠٣٤٦ - **وَتَر** (F). Tendón, Sinew (E). Tendon (F).
الوتر صغيرة من الألياف تتكون من الحبيبات العضلية التي تم تحوّل نبالاً إلى نسج عضلي. وهو عادة مستدير



وتج المهلون



وتلوف



ونيش



ونف



وثير

٣٠٣٧١ - وكتة ٥

Ampullacera (S).

Ampullacera (F). Ampullacera (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مهدبات الابريل .
انواعها المعروفة قليلة العدد جميعها من طفر زيلنا الجديدة ||
تألف الخلدان حيث تكثر التنبوت البحرية التي تعيش
عليها || اصداؤها شبه اجاصية الثورن ، متباينة الحجم ،
كبيرة القوية ، ملونة ، يكثر فيها الجلوي والكتني
التي المواج || جعلها مأكولة ، مرغوبة فيه .

Structure

٣٠٣٧٢ - وكتل

الزؤل هو البنية ، راجعها .

٣٠٣٧٣ - وكتل

Sélectionner (F). To improve (E).

وئل الحيران والنبات : أصله ويمكن فيه مبادئ الاستغاب .

٣٠٣٧٤ - وكتن

Parenchyme (F). Parenchyma (E).

هي نسيج الاختفاء والخضيب في نصل الورقة من كل

نبات .

٣٠٣٧٥ - وكيح ، وكيم

المكتثر لحماً من المواشي .

٣٠٣٧٦ - وكير ، وكطارية

Gaultheria (S).

Gaulthérie (F).

جنس نباتات معمرة من فصيلة الخلنجيات . انواعه عديدة ،
مهدبا بلاد الشرق وأمريكا . معظمها جنبات صغيرة القند
متوفرة . اوراقها متعاقبة ، بيضيه ، حرة . ازهارها كروية
الشكل . ثمارها لحية ، مأكولة ، حبة القالب والتركيب ،
خامسة الخدور || أشهر انواعها ما يتبع .

٣٠٣٧٧ - وكير شلون

Gaultheria shallon (S).

Gaulthérie Shallon (F).

نوع من الوثير وهو جنبية متصبغة فراءه تملحو نحو ١٠٠ سم .
اوراقها كبيرة القند تطلو من ٨ الى ١٠ سم . نصلها جلدي
الصفحة سنن الخمار . ازهارها عتقوي التجميع ، تاجي
الارتكاز . ازهارها صغيرة القند يضاء اللون أو وردية .
ثمارها ال الممرة الزرقاء المواج . كمايرها لحية مأكولة .
تنورها يستمر من ايار الى حزيران .

٣٠٣٧٨ - وكير مدأد ، وكطارية كندية ، عيب

Gaultheria procumbens (S).

Gaulthérie procumbens (F).

جنس من الوثير وهو نبات عارض مداد . اوراقه تملحو نحو
٥ سم . وتعرض نحو ٣ ، نصلها جلدي الصفحة سنن
الخمار . ازهارها فردية الترتيب ، ابطية الارتكاز ، نوباً الى
اللباس المشمش بالورد . اوراقه تشتمل امتثال الشاي
لانها طرية الرائحة ولا تملحو من بعض المنافع الصحية وقد
يستخرج منها طعم « الفانلان » || تنورها يستمر طوال
فصل الصيف .

٣٠٣٧٩ - وكير ونشي

Gaultheria vitchiana (S).

Gaulthérie de Veitch (F).

نوع من الوثير وهو جنبية متصبغة فراءه تملحو نحو ١٠٠ سم .
اوراقها اهليجية مدنية القاعدة تطلو نحو ٨ سم . نصلها
جامد الصفحة ، سنن الخمار ، حليبي التسنين ، حلي المروق .
ازهارها عتقوي التجميع . ازهارها يضاء اللون ،
صغيرة القند ، ثمارها حنطية اللون برتقالية المواج . كمايرها
لحية مأكولة || تنورها يستمر من ايار الى حزيران .

Autochtone (F).

Autochthonous (E).

نمت تعريفي يطلق على كل من كان مقبلاً في وطن اسلافه .

٣٠٣٥٨ - وكن

وكن الماء : دام ولم ينقطع .

٣٠٣٥٩ - وكن

الوكن هو بروز الخلق عند الولادة في وضع خاص

يختلف من الوضع الطبيعي .

٣٠٣٦٠ - وكينسة

Mét (F). Meatus (E).

الفجوة بين خلايا النسيج النباتية . ج وقع وثقالح .

٣٠٣٦١ - وكينسدة

Pal, Pieu (F). Pale, Stake (E).

ما رز في الأرض أو الخاطو من خشب .

٣٠٣٦٢ - وكير

Rasier blanc (F).

هو الوردة الأبيض ، اطلبه .

٣٠٣٦٣ - وكيركة

Décade (F). Decade (E).

اسم لعقد المظرة .

٣٠٣٦٤ - وكينسة ٥

Mycetopus (S).

Mycétape (F). Mycetopus (E).

جنس حيوانات مائية من الرخويات صفيحات الخلدان
وفصيلة التبادات . انواعها المعروفة قليلة العدد معظمها
من طفر انهر وبحيرات امريكا الجنوبية || اصداؤها شبه
بيضية الشكل ، زغبية التعلدب ، تطلو من ٦ الى ١٢ سم .
وهي متساوية المصاريع ، لاتساوية الاصلح . تميز
بامتلاط الابريل المنجية بلقراض كتنكاف الفطور تنشب
في حنور الجبرات والانهرو وفي الحصى ايضا || تعيش
جمجموات كبيرة العدد . لحوها مأكولة ، متوسطة الصف .

٣٠٣٦٥ - وكناجة

كثرة اللحم .

٣٠٣٦٦ - وكناكة

كثرة الشحم .

٣٠٣٦٧ - ولفاية

في الياس ، اطلبه .

٣٠٣٦٨ - وناكة ٥

Tectologie (F). Tectology (E).

الوثالة البحث الشوزي الصرف للهيكلية الضوية .

٣٠٣٦٩ - وناكة

Collisdonia (S).

Colladonia (F). Colladonia (E).

جنس نباتات حشوية معمرة برية من فصيلة الخيميات .
انواعها المعروفة متوسطة العدد اعطائها بعض مناطق البلاد
الحارة والمعتدلة الحرارة || سفلها فراءه متفاندة الارتفاع .
اوراقها متعاقبة ، لايابسية الشكل ، منها الرجمة المستطيلة
والقلبية والمقصصة والريشية . ازهارها صوبلي التجميع ،
طرني الارتكاز . ازهارها صفراء اللون . أشهر انواعها :

٣٠٣٧٠ - وثامة صغيرة الثمر

C. microcarpa (S).

٣٠٣٧١ - وثامة مجنحة

C. alata (S).

٣٠٣٧٢ - وثامة مشرمة

C. crenata (S).

٣٠٣٧٣ - وكثر

الور : الذي خلا من الحويثات النوية .

٣٠٣٩٦ - **وَجِين** الوجين هو شط الوادي المزروع .

٣٠٣٩٧ - **وَحَاف** Banc (F). Layer bed (E).

هو الطبقة من الرمل أو الساف من الصخر أو الوصيف من المرجان الخ...

٣٠٣٩٨ - **وَحَال** Terrivome (F).

الرحال قاذف الوحل أو التراب . بركان وحال .

٣٠٣٩٩ - **وَحْدَانِي** Sporadique (F). Sporadic (E).

هو من النبات من ألف النيش منفرداً .

٣٠٤٠٠ - **وَحْدَة** United (F). Unity, Unit (E).

اصطلاح يستخدم في العلوم الطبيعية أساساً للقياس . في النظام الفرنسي للقياس الاطوال والمساحات والاحجام ، يعتبر المتر والمتر المربع والمكعب وحدة هذه المقاييس وينجزها ومضاعفاته اشتقت المقاييس الأخرى . وفي الاوزان يعتبر الغرام وأجزاؤه ومضاعفاته وحدة القياس . وفي النظام الانكليزي يعتبر البرد وحدة لقياس الاطوال والمساحات والاحجام ، والباوند وحدة الاوزان . وفي الهندسة تعتبر الدرجة وحدة القياس وهي الزاوية الناتجة من تقسيم الدائرة الى ٣٦٠ قسماً متساوياً . وفي علم الحرارة تعتبر السرة وحدة القياس ويبر عنها بكمية الحرارة اللازمة لرفع حرارة غرام واحد من الماء النقي من درجة ١٥ الى ١٦ مئوية . وفي الكهرباء يعتبر الأمبير وحدة التيار ويبرر الاوم وحدة للمقاومة . وفي الضوء ، وحدة القياس هي الشعة . وفي علم الصوت فوسدة القياس هي البرل .

٣٠٤٠١ - **وَحْدَة غِذَائِيَّة** Unité nutritive (F).

Nutritive unity (E). هي عنصر الغذاء الرئيسي أو الفيتة الغذائية القابلة التشثيل الموجودة في مادة معينة أو شكك مقرر . لذلك نقول ان التشكيم الصحيح يجب ان يركز على محوى العناصر الغذائية وما ينتج عنه من وحدات . راجع جدول الملف .

٣٠٤٠٢ - **وَحْرَة** Nycteria (S). Nyctère (F).

جنس حيوان من فصيلة الحوريات . أنواعه سبعة ، تتميز بتجويف قصبة الأنف وبالزوائد الجلدية التي تملأ حناجر التجويف الأيمن والأيسر . اجسامها صغيرة القد . طولها يراوح من ٧ الى ٩ سم . بما فيه الذنب الذي يطول من ٣ الى ٤ سم . انسابها الى الصفة الخطية المختلفة المواجه ، بطونها زاهية . موطنها افرقية الشرقية والحبيشة والسودان ومصر وليبيا وتونس والجزائر ومراكش . تألف الكهوف والمغاور والبيوت الخربة . تعيش جماعات قليلة العدد . قوتها الحشرات والدوريات والمفولم .

٣٠٤٠٣ - **وَحْرِيَّات** Nycteridae (S).

Nyctéridés (F). فصيلة من الخفاشيات مركزها بين الخفاشيات والمماشيت . أنواعها ١١ ينتمي الى جنسين السرة والمطبات . من ميزاتها الخاصة زوائدها المنخرية المركبة وكبر آذانها الزائدة القاعدة الملموسة . اناتها تضع جرراً واحداً تحمله دائماً حتى يلوذه . موطنها افرقية الشرقية ويسلاد الحبيشة .

٣٠٣٩٠ - **وكيرة** Clotson (F).

هي الحاجز الخليوي .

٣٠٣٨١ - **وكيكة ، مَشْتَدَة** Document

هي في القانون التجاري كل معاملة خاصة بالبنسائق المسافرة ان صادرة او واردة .

٣٠٣٨٢ - **وكيكة التأمين** Police d'assurance (F).

Insurance policy (E). هي البقد الحرر الذي يثبت العقد التأمين وشروطه .

٣٠٣٨٣ - **وكيكة** Pierre à briquet (F). Flint (E).

حجر القداسة . ولا والذي اخبر النار من الويرة .

٣٠٣٨٤ - **وكيكة مُحَدَّدة** Aclius sulcatus (S).

Aclius sillonné (F).

حشرة مائية قاصمة من فصيلة المكنوزيات ورثة غديات الاجنحة . موطنها بعض مناطق البلاد الممتدة الحرارة . تألف المنطق والندران . تعيش في الماء . تلتصق كل ما تيسر لها من الحشرات الدنيا والارالي ولا تترك الماء الا في زين الكوم والتمسكة لانها تمتص المكن على الصفحات السفلى من فصال الاوراق التي تلتصق سطح التربة . جسمها شبه بيضي الشكل بطول نحو ١٨ مم . ثوبها الى الخلفي الاسمر المواجه . ظهراتها مائل الصفرة عند الذكر ، وعندها عند الانثى . لها جبل واحد في الحول . ويقتها تسمى الى الماء بعد التفت بنحو اربعة ايام وهي قاصمة كالشرة الجملانة .

٣٠٣٨٥ - **وَج** هو عيد الوج ، اطلبه .

٣٠٣٨٦ - **وجان** Chenil (F). Dog-Kennel (E).

الوجان . ج. أوبرة ويرير . هو مأوى الكلب ويكون عادة من خشب . في الاصل هو سرب الفصيح والكلب والطلب ونحو ذلك .

٣٠٣٨٧ - **وَجَب** الوجب هو انعقاد البيا في الفرع .

٣٠٣٨٨ - **وَجْبَة** Cure, Fourmée (F).

Batch, Baking (E).

ما يستويجه الخفاف من قلع على دفعة واحدة .

٣٠٣٨٩ - **وَجَر ، وَكْر** Garenne (F). Warren (E).

هو مأوى القواقع .

٣٠٣٩٠ - **وَجَن** Morsine (F).

حضر على طانية جلدية .

٣٠٣٩١ - **وَجْه** Face (F).

٣٠٣٩٢ - **وَجْهِي** Facial (F).

٣٠٣٩٣ - **وَجُوب الأده** Exigibilité (F).

Exigibility (E). هو ان يصبح الدين واجباً ادائه الى الدائن .

٣٠٣٩٤ - **وَجَّيَات** Acorées (F).

سيط من فصيلة القنقلبات .

٣٠٣٩٥ - **وَجِيد** Terrain plat (F). Level ground (E).

ما استوى من الارض . ج. وبيدان .



ويرة غندة



وسرة

Monopétale (F). **وَحِيد البَتَلَة**
Monopetalous (E).
نعت تعريفي وصفي يدل على التوزيع الوحيد البتلة .

Monorchide (F). **وَحِيد الخَيْصَة**
Monorchid (E).
من الحيوان ما كان ذا خصية واحدة .

Monocellulaire, Unicellulaire (F). **وَحِيد الخَلِيَّة**
Monocellular, Unicellular (E).
مركب من خلية واحدة ، أو ذو خلية واحدة .

Monostomique (F). **وَحِيد الدَوْرَة**
Monostomic (E).
مركب من خلية واحدة ، أو ذو خلية واحدة .

Uniflore (F). **وَحِيد الزَّهْرَة**
Uniflorous (E).
ذو زهرة واحدة .

Unicaula **وَحِيد السَّاق**

Monandre (F). **وَحِيد السَّدَأَة**
Monandrous (E).
من النبات ما كان ذا عضو تدكير واحد .

Monostigmaté (F). **وَحِيد السِّمَة**
Monostigmatic (E).
ذو سيم واحد أو أطولية واحدة .

Unifabré (F). **وَحِيد الشِّفَة**
Unilabiate (E).
ذو شفة واحدة .

Unisexué (F). **وَحِيد الشَّخْص**
Unisexual (E).
ذو أعضاء تناسلية ذكورية أو أنثوية .

Monoploïd **وَحِيد العِصْرَة**
هو كل نبات قوام تركيبه الخلائي عَصْرَة بسيطة .

Unilobé (F). **وَحِيد الفِص**
Unilobate (E).
نعت تعريفي يطلق على كل لصل ورقة وسيد الفص .

Monosépale (F). **وَحِيد البَتَلَة**
Monosepalous (E).
نعت تعريفي يطلق على كل لصل ورقة وسيد البتلة .

Monocotylédone (F). **وَحِيد السَّلَكَة**
Monocotyledonous (E).
اسم أو صفة كل نبات من ذوات البتلة الواحدة .
والنباتات وسيدات البتلة تولد أحد قسمي مستورات البزور .

Monocéros, Licorne (F). **وَحِيد القَرْن**

Monoceros (E).
كوكبة نجوم جنوبية المنطق مركزها بين الكلب الأكبر والكلب الأصغر والجبار والشمس الأثني . وهي تمثل حيوان غرائي له جسم الفرس وبني رأسه قرن واحد ||
نجومها متفاوتة الأشكال والألوان وأقرب عددها ٣١ .

Unipolaire (F). **وَحِيد القُطْب**
Unipolar (E).

Bête sauvage (F). **وَحْش**
Wild animal (E).

Bête féroce (F). **وَحْش فَهَار**، **سَبُع**
Carnivorous animal (E).

Férin (F). **وَحْشِيَّة**
نعت تعريفي يطلق على كل ما هو متصل بالحيوانات الوحشية .

وَحْشِي
الوحشي الجانب الخارجي أو الأيمن من الرشفة ومن كل شيء يقابله الأثني أي الجانب الداخلي أو الأيسر .

Pustule (F). **وَحْشَة**
Pustule, Pimple, Blotch (E).
هي البثرة تركب اللسع الحيوانية والنباتية . ج وحش .

وَحْف
الوصف : النبات الريان من أي فئة كان .

Terre noire (F). **وَحْفَاءَة**
Black soil (E).
التربة السوداء وتسمى بالبيجور .

Rocher noir (F). **وَحْفَة**
Black rock (E).
هي الصخرة السوداء .

Fange, Boue, Bourbe (F). **وَحْل**
Mud, Mire, Silt (E).

مزيج من الطين وبض المواد العضوية يربس في المنابع وعلى ضفاف مجاري الماء .

Loess **وَحْن** ، **لُؤْس**
رواسب طينية رملية عادمة الأحماض تغطي بعض الأودية في مواقع معينة . أما كلمة لوس فن وضع الأمير مصطلق الشهادة .

Chalcopalis atra (S). **وَحْرَح ***
Chalcopalis africana (F).

طائر من الزمل . أعطاه تيمت من أفريقية الشرقية إلى البالية || جسمه صغير القد ، يطوي نحو ٢٠ سم . رأسه إلى الصبهة الرمادية . ظهره وذنبه إلى السمرة الكستانية المورج . أنفكه أسود . جشته أحر . يعلو إلى البياض الأفيبر . جناحه إلى السمرة السوداء . حلقة عينه كالقنوت . منقاده أسود . ويحلاه إلى الجزء || ملجته الخيالي جمالي . سره يمد عطران الأزواج . يألف البياض وضفاف مجاري الماء . قوته البزور وألحوب || يلدن حش في الأبدال الالفة . الأثني تضع من يبعثن إلى ثلاث بيضات تحضنها بمناوبة الذكر .

Monocarpien (F). **وَحِيد الإِزْهَرَار**
Monocarpous (E).

نعت تعريفي يوصف به النبات الذي يزهر ويثمر مرة واحدة .

Monobasique (F). **وَحِيد الأسَّاس**
Monobasic (E).



وَحْش

انواعها المعروفة نحو ١٥ اعطانها تمتد من الجزيرة العربية الى اوروبا الجنوبية وافريقية الشمالية || تأت الرمال والقياني . قوتها اللباب والحلم والحشرات والديدان || اجسامها صغيرة ، نحيلة ، رشيقة ، تطول من ١٨ الى ٢٢ سم . ألوانها بلون الرمال وقد تمتاز البيئة التي تعيش فيها .

Osmia (S).

* ٣٠٤٤٩ - ونعاش *

Osmia (F). Osmia (E).

جنس حشرات جارية من الحُمويات غشائيات الاجنحة وفصيلة المشعليات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم مناطق البلاد المعتدلة الحارة والمنخفضة نحو البادية || اجسامها صغيرة ، قريبة الشبه من النحل ، تطول نحو ١٥ سم . ألوانها قائمة تكثر فيها السمر السواد المائج والسمر السفاد . قشورها كثيف الحلب اللينق الناعم اشعث اللون او اخضر || ملحيها الحياتي انزالي . تشبه غشائيات في جلوع الاشجار النخرة وفي حيطان الخراف . قوتها رقيق الازهار واللعل وما تجتمع من حسل في تخاريجها المسددة الاصلع . الواحدة وضاعة .

Cerceris (S).

* ٣٠٤٥٠ - ونعاش *

Cerceris (F). Cerceris (E).

جنس حشرات قانصة وانجمه ناعمة من الحُمويات غشائيات الاجنحة المصورة وفصيلة الالقيات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار البلاد المعتدلة الحارة || اجسامها متوسطة القد معتدلة الحيات . ألوانها ملونة يكثر فيها الاسود المجلع بالاصفر والاسود المجلع بالابخر || تصفر في المواطن الرملية . اصغافها رداء فضية متركبة خلجايا المحجورة المتفصلة || قوتها بعض غدييات الاجنحة اغصها السوس والزقزقوت تقطنها وتغندرها وتنقلها الى اصغافها زادا لها وليرقاتها .

Fluctuation

٣٠٤٥١ - ونخط *

حالة علم الاستقرار الشوزي التي تتعرض لها الحُبن في طور استنساخها .

٣٠٤٥٢ - ونحف ، ونحفيف ، نلغ

Macération (F). Maceration (E).

مرث التي . بالماء لاستخلاص مواده .

Ochina (S). Ochine (F).

* ٣٠٤٥٣ - ونعشة *

جنس حشرات غشائية من فصيلة الغفريات . انواعها قليلة جميعها صغيرة القد طويلا براوح من ٧ الى ٤ سم . ألوانها غشائية اللون يملوها تجلجيع اسود || رقاتها حمة تركب لطاء وشكير مختلف النيات المتلقة العارضة احصها للابلاب .

Sphaerostilbe (S).

٣٠٤٥٤ - ونعشيش *

جنس فطور مجهرية من السنانيات وفصيلة المشعليات . يتميز باعسانه الجاهية الانتساب المركزة على ونية مدلية لاجولية . يوفها ثمالى العدد ، ثنائي الخلية ، تجتمع تكات صغية الشكل || له نوعان مؤذيان ونعشيش الموز ونعشيش مفاجى .

٣٠٤٥٥ - ونعشيش الموز *

Sphaerostilbe musarum, Calostilbella calostilbe (S).

Unipétale (F).

٣٠٤٣٤ - ووحيد النعالة

Unipetalous (E).

اسم يطلق في علم النبات على كل زهرة توحيها ووحيد البتلة او النعالة .

Monostylé (F).

٣٠٤٣٥ - ووحيد القلم

Monostylous (E).

احادي خيط عفر التأنيث .

Monochrome

٣٠٤٣٦ - ووحيد اللون

Homocentrique (F).

٣٠٤٣٧ - ووحيد المركز

Homocentric (E).

Monolique,

٣٠٤٣٨ - ووحيد المسكن

Uniloculaire (F). Monocleous, Unilocular (E).

كل نبات تكون ازهاره ووحيد الشق والحسل اي ان النبتة الواحدة لا تحمل سوى ازهار جلدية واحدة ان ذكرية او انثوية .

Univalve

٣٠٤٣٩ - ووحيد المصراع

ويده ووحيد الصام . هو ما كان ذا مصراع او صام واحد .

Monovalent

٣٠٤٤٠ - ووحيد المكافاة

Monotocardes (F).

٣٠٤٤١ - ووحيديات الاجهزة

رتبة من الرغويات مدييات الابل . فصائلها واجناسها وانواعها عديدة . بعضها من متصبرات الازنة القابرة والبعض الآخر محاصر . جميعها من الرغويات الوحيدة الخيشوم والاذنية والكلية .

Monotogrades (F).

٣٠٤٤٢ - ووحيديات الازنين

رتبة حيوانات من الرغويات المدينة الاماميات الحياتية .

٣٠٤٤٣ - ووحيديات الاصداف *

Monoplacophores (F).

شعبة من الرغويات صغيميات الخياشيم تتميز باصدافها الفردية . انواعها المعروفة قليلة الممد لا تتجاوز عشرة .

Monomyaires (F).

٣٠٤٤٤ - ووحيديات الفصائل *

شعبة من الرغويات صغيميات الخياشيم . فصائلها واجناسها وانواعها كثيرة العدد جميعها وريدة الفصيلة القافلة .

Monotremes (F).

٣٠٤٤٥ - ووحيديات التسليك

Monotremata (E).

رتبة من الثدييات الالاشمسيات ، تعتبر ادنى رتب اللبوانات منها علة الماء والتفناض .

Monosperme (F).

٣٠٤٤٦ - ووحيدة البزوة

Monospermous (E).

صفة كل نبات ثماره احادية البذرة .

Monogyns (F).

٣٠٤٤٧ - ووحيدة الخبياء

Monogynous (E).

اسم تعريفي يطلق على كل زهرة وريدة الخياء او الكرييلة .

Eremias (S).

٣٠٤٤٨ - وحيركة *

Erémie (F). Eremias (E).

جنس حيوانات بويضة من اللطاء وفصيلة الضبايات .



ونعاش



ونعاش



وخنة

خاصة بتحويل الوداح واكثرها وباستناده الاملاخ والشهوة الجنسية .

٣٠٤٦٢ - وَدَحِي، وَدَكَان، وَدُوقِي

Rut des solipèdes (F). Rut of the solipeds (E).

شهوة اناث ذات الحافر الالتمل او الزين الذي تطلب فيه الاناث فحولها السفاد .

٣٠٤٦٣ - وَدَحَج

هو السيب والوسيلة .

٣٠٤٦٤ - وَدَحَج، قَانَايَا، قَوْنِيَا، عَوْدُ الصليب

Pasania (S). Pivoine, Peonia (E). Peony (E). Pasania (D). Peonia (I).

جنس نباتات شبيهة معمرة من فصيلة الشفاريات. انواعها نحو ٢٠، معظمها بري وبهها زينة. جلودها خضراء، لحسية، خيلقة. اوراقها متعاقبة. ازهارها كبيرة القند، لحسية الفص، عديدة البتلات، لا قياسا للكرابل. اشهر انواعها ما يلي .

٣٠٤٦٥ - وَدَحَج جِلْدِي الْوَرَقِي

Pasania coriacea (S). Pivoine à feuilles coriaces (F).

نوع من الودح، ساقه شبيهة بجذوة اللوز تملو من ٤٠ سم الى ٧٠ سم. اوراقه قليلة التفريض المستعرض، تصلها جلدي النصفمة، عاكب العليا بحري السفلى. زهرته حامية الاوتكاز وسيدة، تعرض من ١٠ الى ١٢ سم. لونها الالويدي او الالبيض || تنوره يستمر طوال شهر حزيران.



ودح صيني

٣٠٤٦٦ - وَدَحَج شَاذِي

Pasania anomala (S). Pivoine anomala (F).

نوع من الودح الزينبي، ساقه شبيهة تملو من ٦٠ الى ٧٠ سم. اوراقه كبيرة القند كثيرة التفريض والتشريح والبرون والقرابين، عرقها وشرايينها خلية البشرة. زهرته حامية الاوتكاز وسيدة، تعرض نحو ١٠ سم. لونها الالويدي . تنوره يستمر من ايار الى حزيران .

٣٠٤٦٧ - وَدَحَج شَجَرِي

Pasania moutan (S). Pivoine en arbre (F).

نوع من الودح الزينبي، ساقه خشبية تملو نحو ١٥٠ سم. اوراقه كبيرة القند ثلاثية او لحسية التفريض، صلها عاكب النصفمة العليا بحري السفلى. ازهارها كبيرة القند تعرض من ١٥ الى ٢٥ سم. لونها يختلف مع الضروب، منها الالبيض والودي والاحمر والقرمزي || تنوره يستمر من اوائل ايار الى اواخر حزيران .

٣٠٤٦٨ - وَدَحَج صَغِيرِي الْوَرَقِي

Pasania tenuifolia (S). Pivoine à feuilles menues (F).

نوع من الودح . ادمته ركوبية . ساقه شبيهة تملو نحو ٥٠ سم. اوراقه قليلة متعاقبة تملو من ١٠ الى ١٢ سم. جميعها صغيرة القند كثيرة التفريض والتشريح . زهرته حامية الاوتكاز وسيدة ، تعرض من ٨ الى ١٠ سم. لونها الالقرمزي الباقين المراجع || تنوره يستمر من اواسط ايار الى اواسط حزيران .

٣٠٤٦٩ - وَدَحَج صِينِي * وَدَحَ عَطِر

Pasania albillora (S). Pivoine odorante, P. de Chine, P. à odeur de rose (F).

نوع من الودح، فروبه الزينية عطيفة . ساقه شبيهة بجذوة اللوز تملو نحو ١٠٠ سم. اوراقه كبيرة القند

Maladie de Bonnygate du bananier (F).

نظر مجهري يصيب الموز من جلوره الى اوراقه فيعمله ويحيطه || يميلو على الاوراق عصاب شديدة مستطيلة لونها الى السمرة الداكنة تصطب التسج وتسبب يباسه . ويبدو على انحاء الازوية لطبق عفنة لونها الى السمرة تحويها اهداب حر تحوي مشج القطر الذي ينخر التسج ويرقي انقياً من نخذ الى نخذ يسلمه حتى انقلب || وهو في الجلود عند انتشائها بؤرة حفر تقود التسج الى الانحلال . واذا اعترها عند اطرافها او بعيداً من زاوية انتشائها فهو بقعة سمراء اللون مهدبة بالاحمر || يكثف باقتلاخ وطمر الموز المربوه بعد تغديره بالكلس الحراق ومن الواجب تطهير البيش ايساً قبل طمره .

٣٠٤٦٩ - وَعِيش مُفَاجِي

Sphaerostilbe repens, Stilbum (S).

نظر مجهري شديد الالذي يسبب حفر الجلود في بعض الانواع النباتية اعصها المطاط واليباية والرطلة والاهركاتية، وقد شرد على جلور البوم الحامس || مظهره الخارجي حفر خل الشكل ليد التسج لونه الى الجلود السمره وهو كثير المرمصات القسحة الحجم || اغزاره جسيمة لانه يمت الاجبار بعد ان يقضي على جرادة جلوره . يكثف باقتلاخ وسرق الاجبار المربوه ويظهر مواتها وتخفيض التربة . ومن الانسب اجتناب التربة الرطبة الكثوم لانها تارم انتشار هذا الوسم .

٣٠٤٧٠ - وَدَا، قَدَن

Aplanir, Nivelor (F). To smooth, To level (E).

رداً الارض او فدتها : بسط سطحها وسواه انقياً .

٣٠٤٧١ - وَدَاب

Alcadium (S). Alcadiun (F). Alcadiun (E).

الوداب فطر ينمو على جلود واعصان الاجبار اليابسة . النخرة : الحفنة .

٣٠٤٧٢ - وَدَاج، وَدَحَج، شَرِيَان سُبَايِي

Carotide (F). Carotid (E).

شريان في العنق وهما وداجان او ودجان : شريانان غليظان عريضان من بين ثفة النسر ويساها .

٣٠٤٧٣ - وَدَاس

Enoplateuthis (S). Enoplateuthis (F). Enoplateuthis (E).

جنس حيوانات بحرية مفترسة من الرشيوات ورؤاسيات الازويل ، مزدجيات الخياشيم ، مشاريات الجرامز وفصيلة العنودريسات . انواعها المرفوعة ستة ، اعطائها معظم المناطق المعتدلة الحارة من المحيط الهادي والمحيط الاطلسي والبحر الالبيض المتوسط || اجسامها اسطوانية متباينة الاستطالة التي تزداد الى النحر . اصفر الانواع وهو وداس المتوسط يطول نحو ثلاثة امتار . اما الانواع الكبيرة كوداس اقيانية فيطول نحو عشرة امتار . وداس جزر الزانج يطول نحو ١٢ متراً || رؤوسها كبيرة وعيونها كذلك . زعانفها طرفية الاوتكاز . منها قليلة الشكل ومنها -زوانية . جرابها صمغية ، متساوية الطول باستثناء الزوج القريب فانه شديد الطول ، ينتهي برسى ستانية الشكل تملوها الحامب الكبيرة والكلايب القفزية اللادة .

٣٠٤٧٤ - وَدَاقِي

Spermatopé (F).

نعت تعريفية توصف به الاغنية الخاصة او المزموم انها

Mouillage (F).
Soaking, Wetting (E).

٣٠٤٧٩ - وَدَن

٣٠٤٨٠ - وَدَن الْأَسَدِ

هو الصلج، نبات عشقولي من البرباريسيات .

٣٠٤٨١ - وَدَن السَّيْلِ

شجيرة برية تدعى ككتولوب كينو، اطلبه .

Pousse (jeune) (F).
Shoot (young) (E).

٣٠٤٨٢ - وَدِيَّة

هي القثوث جاز اقتلاعه . ج. ودي .

Ophiorhiza (S).
Ophiorhize (F).

٣٠٤٨٣ - وَدِيَّة

جنس نباتات عشبية من فصيلة الفويات . أنواعها المعروفة نحو ٥٠ منها الخولية عظمها والمعمرة . أعطائها بعض مناطق البلاد الحارة مثلها من نباتات الهند وماليزية وبعضها الآخر من نباتات أمريكا الجنوبية || سوقها متباينة : الارتفاع . أوراقها متقابلة ، متعقبة ، سنائية . النصال . أزهارها عسي التجميع ، محوري الارتكاز وطرفي . أزهارها مستطيلة الكؤوس خاصة البتلات ، مخططة الألوان يكثر فيها الاصفر ثم الوردى ثم الأبيض . ثمارها جراد ثنائية الخدر . بزورها سوداء اللون مكدرة تستعمل كدافعة الحصى . ومنها نوع هندي المنبت يدعى ودحة ترياقية (Ophiorhize mitréole) جلدها ترياقية تستعمل ضد سم الافاعي .

٣٠٤٨٤ - وَدَيْس يبيض المشب من أي جنس كان .

٣٠٤٨٥ - وَدِيَّة Triosteum (S). Triostée (F).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الجانيات . أنواعها المعروفة قليلة العدد منها البرية والنباتية . سوقها غبراء تملو من ٣٠ الى ١٢٠ سم . أوراقها متقابلة ، سنائية النصال . أزهارها متباينة الأشكال . أزهارها عديدة الألوان || أشهر أنواعها التريونية الثلاثة التالية :

٣٠٤٨٦ - وَدِيَّة تَحَلِيَا

Triosteum Himalayanum (S).
Triostée de l'Himalaya (F).

نوع من الوديسة التريونية . ساقها كثيرة الفروع تملو من ٢٠ الى ٤٠ سم . أوراقها حاضرة ملتصقة الاذيات ، سنائية النصل ، تطلو من ٦ الى ١٠ سم . وتعرض من ٢ الى ٣ سم . || أزهارها سنبل التجميع . أزهارها صغيرة ، سفيتية اللون . ثمارها عنبية صفراء || تنويرها يستمر طوال فصل الصيف .

٣٠٤٨٧ - وَدِيَّة شَيْبَةَ الْوَرَقِ

Triosteum angustifolium (S).
Triostée à feuilles étroites (F).

نوع من الوديسة التريونية . ساقها تملو من ٤٠ الى ٩٠ سم . أوراقها حاضرة ، سنائية النصل ، تطلو من ٨ الى ١٤ سم . وتعرض من ٢ الى ٤ سم . أزهارها محورية الانتشاب ، فردية ، صفراء اللون || تنويرها يستمر من أيار الى آب .

قليلة التفريش المستعرض . نصلها متجميع الصفحة جبل الخضر الباقى . خلي البشرة السفل . ازهارها هامي الارتكاز يمد من ٣ الى ٥ اذهار . زهرته فواصة العرف المطري ، كبيرة القند ، يبيض اللون او مخضبة || تنويره يستمر من أيار الى اواخر حزيران .

٣٠٤٧٠ - وَدَحْ مَخْرُفِي * Paeonia officinalis (S).
Pivoine officinale, P. des jardins, Rose de Sérae, R. de Notre-Dame (F).

نوع من الودح التريبي ، ساقه عشبية جلوية اللون تملو من ٥٠ الى ٨٠ سم . أوراقه كبيرة القند ثلاثية او خماسية التلصيص ، نصلها مائل الصفحة المتجمعة مضرب العروق . أزهارها كبيرة القند تعرض نحو ١٥ سم . بتلاتها مهدبة الاطراف ، لونها الى الحمرة المختلفة المواج || تنويره يستمر من أيار الى حزيران .

٣٠٤٧١ - وَدَحْ مَرَجَانِي Paeonia corallina (S).
Pivoine corail (F).

نوع من الودح ، ساقه عشبية جلوية اللون تملو نحو ٧٠ سم . أوراقه قليلة التفريش المستعرض ، نصلها جامد الصفحة جبل الخضر . زهرته هامية الارتكاز وسيدة ، تعرض نحو ١٥ سم . لونها كالمرجان . كرايلها خلية القشور . بزورها تبدو قرمزية وتنتهي عند تمام الادراك ، بالسواد اللامع . تنويره يستمر من نيسان الى حزيران .

٣٠٤٧٢ - وَدَر Trier (F). To pick (E).
نحى ما لا يلجم مع غيره .

٣٠٤٧٣ - وَدَس Défaut (F). Flaw (E).
العيب البين ان في الحيوان او في النبات .

٣٠٤٧٤ - وَدَعَة * مسفكة Porcelaine (F).
ج. ودع . الودع ، اصداق بحرية ونهرية من ذوات الصراع الواحد تكون لبعض الحيوانات الرضوة كالقواقع وغيرها . وهي صغيرة القند مختلفة الاشكال زلالوان يكثر فيها الشكل الحلزوني .

٣٠٤٧٥ - وَدَعِيَّات Cypridae (S).
Cypréides (E). Cypréide (F).

فصيلة حيوانات بحرية من الرضويات مبدات الارجل اميات الحليج المشطية . اجناسها وانواعها عديدة منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة وبعض البلاد المتوسطة الحرارة || جميعها مفترسة ، يضيية الاصداق الصغيرة القامة . فوياتها مستطيلة مقعرة الجوانب اليسرى . محدبة البنى المسنة الخدار الداخلي ، المتشققة الخدار الخارجي || أشهر اجناسها الودع .

٣٠٤٧٦ - وَدَف Sperma (F). Sperm (E).
الودف والوداف هو من الحيوان .

٣٠٤٧٧ - وَدَك Lard (F). Bacon (E).
هو اللحم الذي يتكون تحت جلده بعض الحيوانات كالتنوير مثلا ...

٣٠٤٧٨ - وَدَك Animaux ruminants (F).
Ruminant animals (E).

الودك ما يجتر من الحيوان الوشي ، وما لا يجتر فهو الزهم .



ودح مخري



ودحة



ودجة

٣٠٤٨٨ - وَدَيْعَةُ مَثْقُوبَةِ الْوَرَقِ ٥

Triosteum perfoliatum (S).

Triostée perfoliée (F).

نوع من الوديسة الأريينية. ساقها تعلو من ٦٠ إلى ١٢٠ سم. أوراقها حاشية ملتصقة الإزديتات تفسد كالشعيرة. نصالها بيضية الشكل تطول من ١٠ إلى ٢٢ سم. وتعرض من ٥ إلى ١٢ سم. أزهارها محورية الالتشاب، ضمية التجميع، صغيرة القند، أرجوانية اللون || تنويرها يستمر من أيار إلى تموز.

Dépôt (F). Deposit (E).

قد يتسلم به شخص متقولا بملكه شخص آخر ليحفظه حيناً كما يحفظ ماله الخاص ويرده متى طلبه صاحبه.

٣٠٤٩٠ - وَدَيْعَةُ عَيْدُولَةٍ ٥

Liparis noetris (S).

Liparis commun (F).

سكة بحرية من ثلاثات الزمائف وفصيلة الشحاريات موطنها بعض بحار البلاد المعتدلة الحرارة || جسمها شبه وشي الشكل، ضخم المقدم، دقيق الخنصر، يطول نحو ١٦ سم. مسكها عادم السهف، نزع. رأسها مستطيل الجرم، قصير الخط، كبير الشفق. ضبابها ماحتان. زعنفتها الظهرية مستطيلة قاطبة تمتد حتى قاعدة الذيلية. للرجلية تقابل الظهرية وتماثلها. زعانفها الصدرية والحوضية مدندغة قناع الرأس عند فكها. زعنفتها الذيلية صغيرة شبه مزاوية الشكل. ثوبها إلى السمرة الحنطية الملوحة بالأسود. يطنها إلى الغبرة الزرقاء المواج || لحمها متوسط الصفت، مأكل.

٣٠٤٩١ - وَدَيْعَةُ ٥

Odontites (S). Odontite (F).

جنس نباتات شبيهة بيرة، حولية من فصيلة الخنازيريات. أنواعها المروفة قليلة العدد منتبها معظم مناطق البلاد المعتدلة الحرارة || سويها قليلة الفروع. أوراقها متعاقبة. نصالها اهليلجية متجمعة. أزهارها صغيرة حراء اللون || تنويرها ربيعي.

٣٠٤٩٢ - وَدَيْعَةُ جَمَيْعَلَةٍ ٥

Enidella speciosa (S).

Enidelle élégante (F).

حشرة من فصيلة الدلفاسيات ورتبة متجانسات الإجنسة. جسمها صغير القند يطول من ١ إلى ٧ مم. || ثوبها إلى الحنطي الاشعث المواج يطول بتدريج في الظهران. رأسها معتدل العرض، نافر الفافوخ الذي يبدو كالقرن. ضبابها كبيرتان. زبابانها مستطيل الفصل الأول والثانية. كويله قصير، حجبها محرسة. ظهرانها كامل الحنجية. شارب، بين المروق. ورشها خشائيان، شفافان. بطنا معتدل التبطيط. الزوج الخلفي من قوائمها مجهز كسائر الدلفاسيات || شكلها صفات مجاري الماء.

٣٠٤٩٣ - وَدَيْعُ ٥

Mouillable (F). Wetable (E).

٣٠٤٩٤ - وَدَيْعَةُ الْقَتُوبِ ٥

Glistochilus quadripunctatus (S).

حشرة من الوديسات، صغيرة القند بيضية الشكل، طولها براوح من ٥ إلى ٦ مم. ثوبها إلى السواد اللامع يطولها في كل من محبها تريمية ونقطة بترقالية اللون، زبابانها وأرجلها شقر. تعيش تحت لحاء التنوب. قوتها ما تقتصره من الكراشيات.

٣٠٤٩٥ - وَدَيْعَةُ الْبَارِ الْجَالَةِ ٥

الْبَارِ الْجَالَةِ ٥

Carpophilus hemipterus (S). Carphophile des frutes secs (F).

حشرة من الوديسات، صغيرة القند، تطول نحو ٣ مم. عذها لا يطينان كامل ظهرها. ثوبها إلى البني اللامع. تركيب البار الناجمة الساطعة ثم الجافة اصعبها التين والشمش.

٣٠٤٩٦ - وَدَيْعَةُ السَلْبَجَمِ ٥

Meligethes viridescens (S). Mélégethe du coiza (F).

حشرة من الوديسات، صغيرة القند، طولها براوح من ٢ إلى ٣ مم. ثوبها إلى الخضار الأزرق المواج. زبابانها وأرجلها شقر. تركيب مع ريقها جميع النباتات الصليبية واصعبها السليم.

٣٠٤٩٧ - وَدَيْعَةُ الْمَلْفُوفِ ٥

Meligethes aeneus (S). Mélégethe du chou (F). Pollen beetle (E). Rapsgranzkäfer (D).

حشرة من الوديسات، صغيرة القند، طولها نحو ٣ مم. ثوبها إلى الخضار الزرجدي، زبابانها وأرجلها سود. تركيب هي ريقها معظم النباتات الصليبية اصعبها الملفوف.

٣٠٤٩٨ - وَدَيْعَةُ حَنْطِيَّةٍ ٥

Carpophilus dimidiatus (S). Carphophile brune (F).

حشرة من الوديسات، صغيرة القند، تطول نحو ٣ مم. ثوبها إلى الحنطي الاسمر المواج. تركيب البار الجافة قنصرها مع ريقها وتنطها.

٣٠٤٩٩ - وَدَيْعَةُ غَبَرَةٍ ٥

Soronia grisea (S). Soronie grise (F).

حشرة من الوديسات، طولها براوح من ٢ إلى ٥ مم. ثوبها حنطي اللون يطول بتدريج ويتجمع اسمر. زبابانها وأرجلها حنطية. تعيش تحت لحاء الاشجار الحرجية والشمرة.

٣٠٥٠٠ - وَدَيْعَاتُ ٥

Nitidulidae (S).

Nitidulidés (F). Nitidulidae, Sap-feeding beetles, Sour bugs (E). Glanzkäfer (D).

فصيلة حشرات من رتبة عذبات الإجنسة. اجناسها وأنواعها عديدة جميعها صغيرة القند بيضية الشكل مغلطة. قرونها الاستثمارية صولجانية مركبة من ١١ قاسلة. ارسافها خالية أو مخلفة الأجزاء. تعيش على الانعاز وتحت لحاء الاشجار وعلى المواد العضوية الحيوانية والنباتية الجافة.

٣٠٥٠١ - وَدَيْعَةُ ٥

Protoplasme (F). Protoplasm (E).

هي البروتولازيا، المادة التي تتكون منها سميرة أو غلية الاجسام الحية.

٣٠٥٠٢ - وَدَيْعُ ٥

Protoplasmique (F).

Protoplasmic (E).

ما هو متعلق بالودعة أي بالمادة الأولية الحمرورية أو الخليلوية.

٣٠٥٠٣ - وَدَيْعَاءُ ٥

Bréhaïne (F). Barren (E).

الوذاء العائر. نعت ترفي يطلق على كل اثنى عائر من الحيوان.

٣٠٥٠٤ - وَدَيْعَةُ ٥

Edème (F). Edema (E).

هي الايديما أي الاستسقاء الوضي.



ودَيْعَةُ مِلْدَلَةٍ



ودَيْعَةُ التَّنَبْرِ



ودَيْعَةُ الْبَارِ الْجَالَةِ



ودَيْعَةُ السَّلْمِ



ودَيْعَةُ الْمَلْفُوفِ



ودَيْعَةُ حَنْطِيَّةٍ



ودَيْعَةُ غَبَرَةٍ

٣٠٥١٤ - وَرْدَةُ الصَّبَاغِين *

Serratula tinctoria (S). *Sarrette des teinturiers* (F). نوع من الورود، ساقها منتصبة سرحة تملو من ٥٠ إلى ١٠٠ سم. أوراقها لا قياسية التفريص. رؤيساتها الزهرية متشكولة التجميع، كثيرة العدد، تطلو من ١٥ إلى ٢٠ سم. يتفرص من ١٥ إلى ٢٠ سم. أزهارها متساوية اللد قمرية اللون. قنابات قلائها خضر الصفحات الخارجية حر الموج. وهي نبات خصباتي يستخرج من أزهاره وسوقه وجذوره صبغات لثون مغروبو فيه || تنويرها يستمر من تموز إلى تشرين الأول.

٣٠٥١٥ - وَرْدَةُ خُحَايَةِ التَّفْصِيس

Serratula quinquefolia (S). *Sarrette à 5 folioles* (F). نوع من الورود، بجلتها فروع الساق تملو من ١٠٠ إلى ١٥٠ سم. فروعها منتصبة زباه اللحاء. أوراقها خماسية تفصيص. فصوصها المتقابلة سنانية الشكل صغيرة اللد، فصوصها الأخير كبير اللد مستط القواعد، نصلها مائل الصفحة سنن الحافة. رؤيساتها الزهرية طرفية الارتكاز، فردية || تنويرها يستمر من تموز إلى آب.

٣٠٥١٦ - وَرْدَةُ شَعَاعِيَّة

Serratula radiata (S). *Sarrette radiée* (F). نوع من الورود، بجلتها صغيرة اللد فروع تملو من ٤٠ إلى ٩٠ سم. فروعها منتصبة زباه اللحاء. أوراقها غليظة التفريص، فروعها تعد من ١٩ إلى ٢١، جميعها مسننة الحافة. رؤيساتها الزهرية طرفية الارتكاز، فردية التجميع، شعاعية التركيب والشكل. أزهارها حراء اللون قمرية الموج. تنويرها يستمر من تموز إلى آب.

٣٠٥١٧ - وَرْدَةُ عُرْطِيَّة

Serratula centauroides (S). *Sarrette centauree* (F). نوع من الورود، بجلتها تملو من ٨٠ إلى ١٢٠ سم. ساقها فروع. فروعها سرحة. أوراقها كبيرة اللد عرطية الشكل، كثيرة التفصيص. نصلها سنن الحافة، أخضر الصفحة العليا للمالسة، أحمر السفلى المزغبة. رؤيساتها الزهرية طرفية الارتكاز، فردية التجميع، كبيرة اللد، قطرها بأرجح من ٦ إلى ٧ سم. لونها إلى البياض الناصع. قنابات قلائها حنطية اللون مهدبة الحنار || تنويرها يستمر من تموز إلى أيلول.

٣٠٥١٨ - وَرْدَةُ مُتَوَجِّجَة

Serratula coronata (S). *Sarrette couronnée* (F). نوع من الورود، بجلتها منتصبة قليلة الفروع تملو من ٥٠ إلى ١٥٠ سم. فروعها سرحة. أوراقها مفصصة لا قياسية الترتيب. نصلها مائل الصفحة، سنن الحافة. رؤيساتها الزهرية طرفية الارتكاز فردية التجميع. أزهارها قمرية اللون، الخارجية منها أطول من الوسطى والوسطى أطول من المركزية. قنابات قلائها زغبية البشرة على صفحاتها الخارجية || تنويرها يستمر من تموز إلى آب.

٣٠٥١٩ - وَرْدُ هُو الْقَطِيع من الطير .

٣٠٥٢٠ - وَرْدُ Llion du Guzerat (F).

هو اسد الهند ، اعليه .

٣٠٥٢١ - وَرْدُ جُلِّي Rosa (S).

Rosier (F). Rose-tree, Rose-bush (E). Rose (D).

Rosa, Rosajo (I). جنس نباتات جنينة معمرة من فصيلة الورديات . أنواعه

Ultra-violet

٣٠٥٥٥ - وَرْدَةُ النَّفْسَجِي

Hérédité (F). *Heradity* (E). وَرْدَةُ هي انتقال صفات الآباء إلى النسلهم وسلالاتهم إلى الحيوان والنبات تبعاً لنظام خاص يعرف بقانون الوراثة. وتعتبر الوراثة من العلوم الحديثة التي احتلت مكاناً هاماً في ديس الاحياء ويميز الفصل في لفت الانظار إليها إلى أبحاث العلامة مندل .

٣٠٥٥٧ - وَرْدَاة

Bembex (S). *Bembex* (F). *Bembex* (E). جنس حشرات قانصة وأجنحة ناعمة من الحويوات غشائيات الاجنحة المنحوسة وفضيلة الأتقيات. أنواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها متباينة الحجم، منها الصغيرة والوسطى والكبيرة. أفرانها ملونة يكثر فيها الاصفر الملهج بالاسود ثم الاصفر الأخضر المبلج بالاسود || جميعها تصفن في التربة. اصنافها رداء متجمعة متراكبة الخلايا المسلمة السطح تغور من ٣ إلى ٧ سم. ملغخلها انبوبية متحرفة نحو سطح التربة || قوتها الذباب والحوام والصغير من ذوات الجناحين تقتنصها فتخدرها وتثقلها إلى اصنافها زائداً لها وليرقاتها .

٣٠٥٥٨ - وَرْدَاقِي Feuillaison (F). Foliation (E).

وقت خروج الورق .

٣٠٥٥٩ - وَرْدَان Urania (S).

Uranie (F). *Urania* (E). جنس حشرات فراشية من حرشفيات الاجنحة وفضيلة الورديات. أنواعه المعروفة قليلة العدد موطنها يمتد من تهايم البسر الاخر إلى بعض مناطق افريقية الشرقية وجزيرة مدفسكر || جميعها كبيرة اللد، ملونة الراوش الخلفية، جميلة الزخارف والاولان للجهة المتداخلة || يرقاتها إلى البياض الكبيرتي الموج تملو نمشة سوداء. رؤوسها صفراء اللون أو حراء || اجسامها الحولية ثلاثة .

٣٠٥١٠ - وَرْدَالِيَّات Uranidae (S).

Uranidés (F). *Uranidés* (E). فصيلة حشرات فراشية من رتبة حرشفيات الاجنحة . اجناسها وأنواعها المعروفة قليلة العدد ، منتشرة في بعض مناطق افريقية الشرقية وجزيرة مدفسكر || جميع أنواعها كبيرة اللد، متراكبة الألوان الزاهية اللامعة || اعرف اجناسها واشهرها الوران .

٣٠٥١١ - وَرْدَب الورب : وبار الوشي .

٣٠٥١٢ - وَرْد Trou de plantation (F).

الوردة : الحفرة الصغيرة المدة لاحتفال الفرس .

٣٠٥١٣ - وَرْد Serratula (S).

Sarrette, Serrate, Serratule (F). *Saw-wort, Dyer's savory* (E). *Färbescharte* (D). *Serratsola, Sarretta, Serretta* (I).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة المركبات . أنواعه عديدة، معظمها بري وبعضها زرعيني. أوراقها شوكية لا قياسية التفريص. رؤيساتها اسطوانية. أزهارها أنبوية. زهورها قمرية القطب. تعيش في جميع الارربة الزراعية ولتكاثر بالبرر. اعرف أنواعه واشهرها ما يلي .



وردة الصباغين

الخضار الأزرق. أزهاره شكولي التجميع. أزهاره عادية العرف. حمار اللين، صغيرة القد، قطرها يراوح من ٣ إلى ٥ سم. || تنوره يستمر من حزيران إلى آب.

٣٠٥٢٦ - وَرْدْ أَصْفَرْ * ، وَعَاط

Rosa lutea (S). Rosier jaune (F). Austrian briar (E). Gelbe Rose (D). Rosa canina lutea, R. c. fectida (I). نوع من الورود البروتي. جنته مدادة تطول من ٢ إلى ٤ أمتار. ساقه وفروعه متبادعة المناسخ الجالسة أو القليلة الإحديداب. أوراقه لا قياسية التركيب تتألف من ٥ أو ٧ أو ٩ وريقات. وريقاته أهليجية الشكل. نصلها مسنن الحافة بارز المرق. أزهاره صفراء اللون كروية الرائحة، قطرها نحو ٧ سم. || تنوره يستمر طوال شهر تموز.



ورد احمر

٣٠٥٢٧ - وَرْدْ الْبَيْضْ

Rosa Banksian (S). Rosier de Banks (F). نوع من الورود الجاحد الذي يتطلب مياقم خاصة، ممرضا الجنوب. جنته تطول من ٣ إلى ١٠ أمتار، فروعه نحلة عادية الشوك. أوراقها خاسية أو سباعية التركيب غرزية الزنمات. وريقاتها مائلة لامة. نصلها مسنن الحافة خفي الضلع. أزهارها ضمي التجميع. أزهارها صغيرة القد، بنفسجية العرف، صفراء اللون || تنوره يستمر من حزيران إلى تموز.

٣٠٥٢٨ - وَرْدْ الْحَمْلُ ، وَرْدْ مَدَاد

Rosa arvensis (S). Rosier rampant, R. d'Ayrshire (F). نوع من الورود الجاحد. جنته مدادة تطول من ٢ إلى ٤ أمتار. فروعه دقيقة مستطيلة، مناسخها متوسطة التصديق. أوراقها ثلاثية أو خاسية أو سباعية التركيب، وريقاتها أهليجية سنانية، نصلها ماقن اللون، حوض اللثة، خفي الضلع. أزهارها متوسطة القد، قليلة العرف، حمار اللون أو وردية || تنوره يستمر من أيار إلى حزيران.

٣٠٥٢٩ - وَرْدْ الْحَبَا ، وَرْدْ الْهَبْ

Buphrasme fétide (F). نوع من الورود البروتي. جنته مدادة تطول من ٢ إلى ٤ أمتار. ساقه وفروعه متبادعة المناسخ الجالسة أو القليلة الإحديداب. أوراقها لا قياسية التركيب تتألف من ٥ أو ٧ أو ٩ وريقات. وريقاته أهليجية الشكل. نصلها مسنن الحافة بارز المرق. أزهاره صفراء اللون كروية الرائحة، قطرها نحو ٧ سم. || تنوره يستمر طوال شهر تموز.

٣٠٥٣٠ - وَرْدْ الزَّوَاتِي ، وَرْدْ الْهَبْ

Kermie de Syrie (F). نوع من الورود البروتي. جنته مدادة تطول من ٢ إلى ٤ أمتار. ساقه وفروعه متبادعة المناسخ الجالسة أو القليلة الإحديداب. أوراقها لا قياسية التركيب تتألف من ٥ أو ٧ أو ٩ وريقات. وريقاته أهليجية الشكل. نصلها مسنن الحافة بارز المرق. أزهاره صفراء اللون كروية الرائحة، قطرها نحو ٧ سم. || تنوره يستمر طوال شهر تموز.

٣٠٥٣١ - وَرْدْ السَّيَّاه ، وَرْدْ الْهَبْ

نوع من الورود البروتي. جنته مدادة تطول من ٢ إلى ٤ أمتار. ساقه وفروعه متبادعة المناسخ الجالسة أو القليلة الإحديداب. أوراقها لا قياسية التركيب تتألف من ٥ أو ٧ أو ٩ وريقات. وريقاته أهليجية الشكل. نصلها مسنن الحافة بارز المرق. أزهاره صفراء اللون كروية الرائحة، قطرها نحو ٧ سم. || تنوره يستمر طوال شهر تموز.

٣٠٥٣٢ - وَرْدْ السَّيَّاه ، وَرْدْ الْهَبْ

Rosa agrestis, R. sepium (S). Rosier des haies (F). نوع من الورود البروتي الجاهل. جنته تملو من ١٠٠ إلى ٣٠٠ سم. ساقها وفروعها كثيفة المناسخ المتساوية القد، القليلة الإحديداب. أوراقها خاسية أو سباعية التركيب، وريقاتها ثنائية التسنين؛ نصلها ماقن اللون، صفحة ماقن الخضار. أزهارها صغيرة القد، بيضاء اللون أو وردية، مستحبة العرف الطري || تنوره يستمر طوال شهر حزيران.

٣٠٥٣٣ - وَرْدْ الشَّاه ، وَرْدْ الْهَبْ

Rosier thé (F). نوع من الورود البروتي. جنته مدادة تطول من ٢ إلى ٤ أمتار. ساقه وفروعه متبادعة المناسخ الجالسة أو القليلة الإحديداب. أوراقها لا قياسية التركيب تتألف من ٥ أو ٧ أو ٩ وريقات. وريقاته أهليجية الشكل. نصلها مسنن الحافة بارز المرق. أزهاره صفراء اللون كروية الرائحة، قطرها نحو ٧ سم. || تنوره يستمر طوال شهر تموز.

٣٠٥٣٤ - وَرْدْ الشَّمْسْ

نوع من الورود البروتي. جنته مدادة تطول من ٢ إلى ٤ أمتار. ساقه وفروعه متبادعة المناسخ الجالسة أو القليلة الإحديداب. أوراقها لا قياسية التركيب تتألف من ٥ أو ٧ أو ٩ وريقات. وريقاته أهليجية الشكل. نصلها مسنن الحافة بارز المرق. أزهاره صفراء اللون كروية الرائحة، قطرها نحو ٧ سم. || تنوره يستمر طوال شهر تموز.



ورد اصفر

المعروفة زهاء ٥٥٠، شروبه وأصرامه وجهته لا تقل عن ١٧٠٠٠ سقها ثلاثية منصبة أو مدادة، شوكها أو مناسخها غروبية الشكل مدبية الحمة المنجبة. أوراقها مركبة متبادعة. أزهارها طويلة الارتكاز، فردية أو شكولية التجميع. كلورسها لا قياسية التخصيص يكثر فيها الخميس. بكتلات توجيحاتها لا نظامية العدد منها الرباعية والخامسة والكثيرة العدد. أسديتها عديدة. خضورها طليقة وسيدة المساكين. بزورها بيضيه صغيرة خلية البشرة. يستمر الورود من أشهر النباتات التي يذيقها وأصحابها للإنسان وأزهارها. يجمع في جميع الأثرية القليلة الاندماج. رغب في الخسبة ولا يصر كبريا في الرمية. يتكاثر بالفسائل والمقل والبذر والتطعيم. يستخرج من زهر بعض أنواعه، بالتقطير، دهن الورود ويأه أورد || أشهر أنواعه ما يلي:

٣٠٥٢٢ - وَرْدْ أَيْدْ

Rosa sempervirens (S). Rosier toujours vert (F).

نوع من الورود الرقة، جنته مدادة تطول من ٢ إلى ٦ أمتار. فروعه سرعية مستطيلة. أوراقها أبيض، خاسية أو سباعية التركيب. وريقاتها جلدية التصل اللامع العادم الحقل. أزهارها عطرية العرف، كبيرة القد، قصيرة التصل، بيضاء اللون أو قشدية || تنوره يستمر من أيار إلى حزيران.

٣٠٥٢٣ - وَرْدْ الْبَيْضْ ، وَرْدْ الْهَبْ

Rosa alba (S). Rosier blanc (F). White rose, Single white rose (E). Weisse Rose, W. Gartenrose (D). Rosa bianca, R. angiola, R. carnicina (I).

نوع من الورود البروتي. جنته تملو من ٢ إلى ٤ أمتار. ساقها منصبة، فروعه متبادعة. مناسخها لا قياسية التركيب والخميس والتجميع. أوراقها سباعية التركيب. وريقاتها بيضيه للشكل، نصلها أخضر اللون، ماقن الصفحة العليا، خفي الضلع. أزهارها نوردي التجميع. أزهارها كبيرة القد، بيضاء اللون، مستحبة العرف || تنوره يستمر طوال شهر حزيران.

٣٠٥٢٤ - وَرْدْ أَحْمَرْ * ، وَرْدْ الْهَبْ

Rosa gallica (S). Rosier de France, R. de provins, R. rouge (F). French rose, Common rose (E). Gallic Rose (D). Rosa domestica, R. incarnata, R. d'orto (I).

نوع من الورود البروتي. أصرامه وجهته كثيرة العدد. سقها وفروعها مستطيلة. مناسخها كثيفة التجميع لا قياسية الارتكاز، حادة الحمة المهدودة. أوراقها ثلاثية أو خاسية التركيب. وريقاتها كبيرة القد مستطيلة؛ نصلها خشن الملمس مسنن الحافة. أزهارها كبيرة القد، قطرها يراوح من ٨ إلى ١٠ سم. || تنوره يستمر من أيار إلى تموز.

٣٠٥٢٥ - وَرْدْ أَحْمَرْ الْوَرْدِي ، وَرْدْ الْهَبْ

Rosa rubrifolia (S). Rosier à feuilles rouges (F).

نوع من الورود البروتي الجاهل. ساقه تملو من ١٠٠ إلى ٣٠٠ سم. مناسخها متساوية القد، مبرحة التجميع. فروعه جزوية اللون، خلية اللحاء، متبادعة المناسخ الجالسة أو القليلة الإحديداب. أوراقها خاسية أو سباعية التركيب وريقاته حر الزنمات والأخن والفسلوع، نصلها ماقن الصفحة، خفي الضلع الناشز، لونه أبيض.

منها دهن الورد وياه الورد. || تنوره يستمر من الربيع الى اواخر الخريف .

٣٠٥٤٣ - وَرْدَ حَرَشِ *

Rosa rugosa (S).

Rosier rugueux (F).

نوع من الورد السبروتي. اصراعه كثيرة العدد ، ساقها منتصبه تملو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم. مناسها متباعدة ، ثنائية الترتيب ، قليلة التجميع . فروعه زياء الصماء متقاربة المناسن اللانسياسة الحجم . اوراقها لا نظامية التركيب ، ورتية التجميع ، تتألف من ٣ الى ٩ وريقات نصلها لا تتجمع الصفحة ، باث اللون ، خلي البشرة السفلى . ازهارها فردي او ثلاثي التجميع . ازهارها حطرة متفارة اللد تختلف باختلاف الاصرام ، قطرها يراوح من ٩ الى ٩ سم. ثمارها كروية الشكل كبيرة اللد لها الى الحفرة الزاحية . تنوره يستمر من ايار الى حزيران .

٣٠٥٤٤ - وَرْدَ خَلِي

Rosa villosa, *R. pomifera* (S). *Rosier velouté* (F).

نوع من الورد السبروتي المبلول . جنبته مدادة تطلو نحو ٤ امتار ، ساقها وفروعه متباعدة المناسن المتساوية اللد القليلة الاحديداد . اوراقها مركبة تتألف من ٧ او ٩ او ١١ وريقة ؛ نصلها خلي البشرة على صفحته . ازهارها حطرية الرف حراء اللون ، قطرها يراوح من ٣ الى ٦ سم. نصلها ورمها حلبة البشرة || تنوره يستمر من حزيران الى آب .

٣٠٥٤٥ - وَرْدَ صَغِيرِ الْوَرْدِ

Rosa microphylla (S). *Rosier à petites feuilles* (F).

نوع من الورد ، ساقه منتصبه تملو من ١٠٠ الى ١٢٠ سم. فروعه عادمة الزنب ، ثنائية المناسن المستقيمة السواء اللون . اوراقه ايدة ، مركبة ، تتألف من ١١ او ١٣ او ١٥ وريقة . نصلها جامد الصفحة اخضر اللون . ازهاره وردية اللون او بيضاء ، قطرها يراوح من ٦ الى ٧ سم. || تنوره يستمر من آب الى تشرين .

٣٠٥٤٦ - وَرْدَ عَجَسِي

Rosa persica (S). *Rosier à feuilles d'épine-vinette* (F).

نوع من الورد السبروتي ، يمتلئ تملو نحو ٦٠ سم. ساقه وفروعه قليلة المناسن المتباعدة . اوراقه كاملة بسيطة ، نصلها مسن الحافة ، مجري اللون على صفحته ، يطول من ١٥ الى ٣٠ سم. ويرى من ٥ الى ١٥ . ازهاره طرفية فردية ، لها الى الصغار المشع بالاحمر || تنوره يستمر طول شهر حزيران .

٣٠٥٤٧ - وَرْدَ فِيرَجِيَّةِ

Rosa virginiana, *R. fraxinifolia*, *R. blanda* (S). *Rosier de Virginie* (F).

نوع من الورد السبروتي . هذه البلاد الامريكية . جنبته تملو من ٢ الى ٣ امتار . ساقها وفروعه جزوية السواء ، مناسها لا قياسية الحجم والترتيب والتسجين . اوراقها خاسية او سباعية التركيب ، وريقاتها صغيرة اللد اعليجية الشكل ، نصلها جامد الصفحة ، متعاد السنين ، قليل الزنب على الجهة السفلى . ازهارها كبيرة اللد حراء اللون لا نظامية التجميع || تنوره يستمر من حزيران الى تموز .

٣٠٥٤٨ - وَرْدَ فِينِي

Rosa phaenicia (S). *Rosier de Phénicie* (F).

نوع من الورد البري المبلول في جبال لبنان والموليين .

Rose de Chine (F).

٣٠٥٤٥ - وَرْدَ الصَّيْنِ

هو الابجر الهندي ، اطله .

Rosa setigera (S).

٣٠٥٤٦ - وَرْدَ التَّرَاحِي

Rosier de la prairie (F).

نوع من الورد السبروتي . جنبته مدادة تطلو من ١٠ الى ٩ امتار ، فروعه سريعة ، مناسه غليظة جالسة . اوراقه ثلاثية او خاسية التركيب . وريقاته اعليجية مسنة ؛ نصلها اخضر الصفحة العلوية ، خلي السفلى البراء اللون . زيات اوراقه واعناها حلبة المختار . ازهاره عثوكلي التجميع . ازهاره عادمة الرف بيضاء اللون او وردية . تنوره يستمر طول شهر تموز .

٣٠٥٤٧ - وَرْدَ الْفَيْسِلِ

Pastel des taincuriers (F). هو رسة الصباغين ، اطله .

٣٠٥٤٨ - وَرْدَ الْهِنْدِ، وَرْدَ الْشَّامِ، عُرْشِي

Rosa indica (S). *Rosier de l'Inde*, *R. ché* (F).

نوع من الورد السبروتي الشام الزراعة . اصراعه وجهته كثيرة العدد . ساقه منتصبه تملو من ٥٠ الى ٢٠٠ سم. اوراقه ثلاثية او خاسية او سباعية التركيب . وريقاته اعليجية مدبة ، نصلها لامع البشرة عايق الخصار . ازهاره متوسطة اللد قطرها يراوح من ٥ الى ٧ سم. لها تحتل باختلاف الصرم والشملاج ، يكثر فيها الاصفر والبرتقالي والاحمر ومشتقاتها . || تنوره يستمر طول فصل الربيع والصيف والخريف .

Eglantier (F).

٣٠٥٤٩ - وَرْدَ بَرِّي

هو الشرين ، اطله .

Rosa pimpinellifolia (S).

٣٠٥٤٠ - وَرْدَ بِلَافِي

Rosier pimpinelle (F).

نوع من الورد السبروتي . جنبته تملو من ٣٠ الى ١٠٠ سم. ساقها وفروعه كثيرة المناسن والحلب . اوراقها لا قياسية التركيب تتألف من ٥ او ٧ او ٩ او ١١ وريقة . وريقاتها ثلاثية الشكل . نصلها خلي الصفحة السفلى ، فسي المراج . ازهاره صغيرة اللد قطرها يراوح من ٣ الى ٥ سم. لها يختلف باختلاف الصرم منه الابيض والوردي والاصفر . تنوره يستمر من ايار الى حزيران .

Rosa gigantea (S).

٣٠٥٤١ - وَرْدَ جَبَّارِ

Rosier géant (F).

نوع من الورد السبروتي العاشر . جنبته تطلو من ١٠ الى ١٢ م. ساقه وفروعه عادمة الشوك . اوراقه خاسية او سباعية التركيب . وريقاته اعليجية الشكل نصلها مائل البشرة على صفحته . ازهاره كبيرة اللد قطرها يراوح من ١٠ الى ١٢ سم. لويسا الى اليباس التي او الاصفر الباهت . تنوره يستمر طول شهر ايار .

٣٠٥٤٢ - وَرْدَ جَوْرِي، وَرْدَ بَلَدِي، وَرْدَ شَامِي

Rosa damascena (S). *Rosier de Damas*, *R. des quatre saisons* (F). *Damask rose* (E). *Damaszenrose* (D).

Rosa damaschina, *R. della quattro stagioni* (I). نوع من الورد السبروتي المبلول . جنبته تملو من ٩٠ الى ١٨٠ سم. ساقها وفروعه كثيفة الشوك . مناسها حادة الحمة المنجدة . اوراقها خاسية او سباعية التركيب وريقاتها يضيئة الشكل ، جامدة النصل المسن الحافة . ازهارها وردية اللون ، كبيرة اللد ، فواحة الرف العطري ، يستعطر



ورد حرش

لونها الى الازرق او الوردي ؛ فصلها تلمي، زركته وريّة، تنوره يستمر من ايار الى تموز .

٣٠٥٤ - **وَرْدٌ مَسْكِيٌّ** *
Rosa moschata (S).
Roser musqué (F). Muskatrose, Blumrose (D). Rosa muschata (I).

نوع من الورد . ساقه منتصبة تملو نحو ٣ أمتار ، فروعه مستطيلة مثلية . اوراقه خنسية او سباعية او ثنسية التركيب . وريقاته بيضه سناينة ؛ فصلها مائل للصفحة العليا ، خلي السفلى . ازهارها متكوني التجميع . ازهاره مسكية العرف ، قطرها يراوح من ٤ الى ٥ سم . لونها الى البياض الاصفر || تنوره يستمر من تموز الى تشرين .

٣٠٥٥ - **وَرْدٌ كَلْبِي**
Colombi-moineau (F).
نوع من فصيلة الحماميات . انواحه قليلة العدد جميعها ربة الجسم ، صغيرة الرأس ، قصيرة المنق ، مثلية الجناح ، مستديرة الاذنك القصير ، نحلة المنقار ، مارية النزع || اشهر انواعه الورداني المطوق .



ورد كبير الزهر

٣٠٥٦ - وَرْدٌ كَانِي مَطْرُوقِي

Chamaepelia passerina (S). Colombi-moineau passerina, Pigeon de terre (F). White-throat (E).
نوع من الورداني وهو طائر متوسط القد . طوله نحو ١٨ سم ، ثوبه الى الصفه الزبادية . رأسه وقرنيه وصفه زرق المراج . صفة مطوق بالابيض . جناحه اعم ارشفة تملو وشفة حمراء صفراء المراج . قوائمه وابناؤه حمر الاطراف الخارجي . بيض الداخل . عيناها برتقالية اللون ، منقاره وساقه حمر . يألف المراعي والسهول المزروعة والحدائق والبساتين . سريره يمتد من ١٠ الى ١٦ م . قوته الحبوب والبزور على اختلافها . يهتن في الجبال والادغال . انثاه تحضن ستويا من مرتين الى ثلاث مرات ، حضنتها يهتنان .

٣٠٥٧ - **وَرْدٌ كَالْبَتِ**
Blattopteroidea (F).
طريقة من الحشرات تنتمي الى شعبة البرقانيات ولفافسة المنحنيات اصل . وتنبها الحالية ثلاث : السرغانيات والطفانيات والسرغانيات . اشكالها واحجامها عديدة ومختلفة . تتميز بارسافها المركبة التي يلب فيها الشخص .

٣٠٥٨ - **وَرْدَةٌ**
Rosa (F).
زهرة الورد . اشكالها واسماها وعدد بتلاتها واورانها وعرفها تختلف باختلاف النوع والصمم .

٣٠٥٩ - **وَرْدَةٌ أُرَيْحِيٌّ** هي كف العلواء ، اطليا .

٣٠٥٩ - **وَرْدَةٌ تَيْسِيٌّ** هي لوس التيل ، اطلب .

٣٠٥٩ - **وَرْدَةٌ حَيْنَدِيٌّ** هي الحنينة المنقصة ، اطلبا .

٣٠٥٩ - **وَرْدَةٌ كَالْبَتِ** هي الكايبه ، اطلبا .

٣٠٥٩ - **وَرْدِيَّات**
Rosaceae (S). Rosacées (F). Rosaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين مديدة القناملات . انواعها المعروفة زهاء ١٠٠٠ تنتمي الى ٧٠ جنسا جميعها عذ اسباط . نباتاتها مجموعة كاملة من الاشباب والجبال والشجيرات والاشجار . اوراقها متضيقه مختلفة الاشكال والتركيب . ازهارها نوري التجميع . ازهارها غشوية . ثمارها متجانسة الاشكال والاحجام والالوان . وهي تشمل

ربط في المواقع الربطة . جنبته منتصبة حزيمة الفروع تملو من ٨٠ الى ٢٥٠ سم . مناسها متينة مجنبة مجنبة لا قياسية التجميع . اوراقها ثلاثية او خنسية التركيب . وريقاتها احليلجية الشكل . فصلها اذن البشرة على صفحتيه . ازهارها متكوني التجميع . ازهارها صغيرة القد . بيضاء اللون عابطة العرف || تنوره يستمر من ايار الى آب .

٣٠٥٩ - **وَرْدٌ كَلْبِي**
Rosa bracteata (S). Rosier bractéolé (F).

نوع من الورد الجاهل الذي يتطلب موقع معينة معرفها الجنوب . جنبته تملو من ٣ الى ٤ أمتار . ساقه وفروعه مزينة النعاء ، مبرقة المناسخ المهيبة . اوراقه ثنسية التركيب ، زنجارها مفردة مهدية الخمار . وريقاته احليلجية الشكل ، فصلها لاص الصفحة العليا خلي السفلى الصفراء اللون . ازهاره كبيرة القد ، ممشية العرف ، بيضاء اللون ، مطقة بقذلة من القباب || تنوره يستمر طوال شهر تموز .

٣٠٥٥ - **وَرْدٌ كَثِيرُ الزَّهَرِ** *
Rosa multiflora (S). Rosier multiflore (F).

نوع من الورد السبروتي الملاد . جنبته تملو من ٤ الى ٦ أمتار . فروعه سرعية مستطيلة . اوراقه خنسية او سباعية او ثنسية التركيب . وريقاته احليلجية الشكل ؛ فصلها مائل للصفحة العليا خلي السفلى . زنجارها مهدية التكوين المشطي . ازهاره هومي المتقوية . ازهاره متوسطة القد ، كثيرة العدد ، بيضاء اللون او وردية || تنوره يستمر من اوائل حزيران الى اوائل تموز .

٣٠٥١ - **وَرْدٌ كَرُولِيْنِيٌّ**
Rosa carolina (S). Rosier de la Caroline (F).

نوع من الورد السبروتي ، ربط في المواقع الربطة . جنبته منتصبة اساق تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . ساقه وفروعه جزوية اللون ، ثنائية المناسخ المهيبة . اوراقه لا قياسية التركيب منها الثلاثية والخنسية والسباعية والثنسية . وريقاته احليلجية الشكل ؛ فصلها منشاري الحافة خلي البشرة السفلى . ازهاره فردية ، وردية اللون ، كثيرة العدد ، قطرها يراوح من ٤ الى ٧ سم . || تنوره يستمر من تموز الى آب .

٣٠٥٢ - **وَرْدٌ كَلْبِي**
Rosa nitida (S). Rosier brillant (F).

نوع من الورد . جنبته صغيرة القد ، ساقها تملو من ٤٠ الى ٦٠ سم . مناسها ثنائية ، متقاربة ، جالسة الانتصاب ، كثيرة الحب . اوراقها لا قياسية التركيب ، وردية التجميع ، تتألف من ٣ الى ٩ وريقات ؛ فصلها مائل البشرة على صفحتيه ، شديد الزهراء واللحم ، مسن الحافة . ازهارها عادمة العرف ، قطرها يراوح من ٣ الى ٦ سم . لونها الى الحمرة الزاهية البراقة || تنوره يستمر طوال فصل الصيف .

٣٠٥٢ - **وَرْدٌ مَعْلَتُ الْأَوْزَاقِي**
Rosa laevigata (S). Rosier trifoliolé (F).

نوع من الورد الجاهل الذي يتطلب موقع خاصة معرفها الجنوب . جنبته مستطيلة تملو نحو ٤ أمتار ساقها وفروعه كثيرة الشوك ، غليظة المناسخ المهيبة . اوراقها ثلاثية التركيب ، غززية الزنات . وريقاتها سناينة مستطيلة المنقصة المدية . فصلها مسن الحافة لاص البشرة المنسرة على صفحتيه . ازهارها قليلة القد قطرها نحو ٧ سم .



ورد مسكي

des bois (F). Wood pigeon, Ring-dove (E). Ringeltaube (D).

نوع من الحمام البري ، كبير الحجم ، طوله نحو ٤٥ سم. رأسه وصنقه وزنجهما إلى الرمادي الأزرق . ظهره وجناحاه إلى الرمادي الأصفر . ذوره وصدره وبطنه متراكبة الألوان فيها الرصاصي والرمادي والأزرق والأحمر والبنفسجي . جميعها سلعاء الموضع . صروبه حديثة معظمها من القواطع يحوم البلاد في طلب المصيف والمشي . أوبده قليلة أصطافها البلاد الحارة . وهو يألف الإصراع والثايات . يعيش أسراباً كبيرة العدد . قوته الثأر والحبوب والبزور . يدشن في إلاتجار . يعيش ويبيض من مرة إلى مرتين في السنة . ج وراشين وورشان .

٣٠٥٧١ - وَرْطُورَة Epilatre de Germanie (F).
هي الطائس الجرماني ، أغلبه .

٣٠٥٧٢ - وَرَقْ ورق النبات : نسر واهتر فهو وارث أي ناسر راف شيد الخصرة .

٣٠٥٧٣ - وَرَقْ Sideroxydon (S).
Sideroxylo, Bois de fer blanc, Bois de sable (F). Iron wood (E). Eisenbaum (D). Bumelia, Legno ferro (I).

جنس نباتات شرجية وزراعية من فصيلة الطليحات . أنواعه زهاء ٨٠ منها الأشجار الكبيرة الشائعة والمتوسطة القد والصغيرة . أوراقها متعاقبة مستطيلة جلدية النصل . أزهارها أبغية الارتكاز ، صغيرة القد ، قصيرة الأزناد ، صفراء اللون . ثمارها لوزية الشكل والتسد ، بعضها مأكول أو دهي المصارة الصناعية وبعضها لا يصلح للهي . أخشابها شديدة الصلابة ، تلبه اللون ، بدورها غشب الخديسد الأبيض . قشورها طيبة مضادة للحميات .

٣٠٥٧٤ - وَرَقْ Morceler, Partager (F).
ورق الأرض : قسمها . To parcel out, To divide (E).

٣٠٥٧٥ - وَرْطِيلَة Urvillea (S).
Urvillea (F). Urvillea (E).

جنس نباتات عارشة ، صمرة ، برية وتربيتية من فصيلة السابنديات . أنواعها المعروفة ثمانية ، مهدا بعض مناطق أمريكا الجنوبية الحارة . سوقها مزرية اللحاء ، فراءه أوراقها متعاقبة ، مركبة ، ثلاثية الوريقات الكتلية المخرفة . حوائطها مستطيلة ، متشعبة . أزهارها عنقودي التجميع ، أبغية الارتكاز . أزهارها صغيرة القد ، رباعية البتلات المستطلة ، متباينة الألوان ، منها الأبيض والأصفر والوردي والأحمر المختلط الماجات . ثوبورها ديبهي أو صبيحي .

٣٠٥٧٦ - وَرَقْ Papiers (F). Papers (E).
صائف ورقية رقيقة مصقولة تصنع من مختلف المسواد النباتية ، أخشاب الخشب ، بعد تحويلها إلى عجينة يمكن مدها وتوطيدها وصقلها .

٣٠٥٧٧ - وَرَقْ ، مَشَقْ Effaillage (F).
Stripping of the leaves (E).
ورق الشجرة : انزع ورقها .

أكبر مجموعة من الأشجار الزراعية المثمرة وما لا يستأن به من النباتات العطرية والطبية . أسباطها ما يتبع :

Pirées, Pomacées (F).
إجاصيات ، ثلاجات
Chrysobalanées (F).
بلاليات
Rosées (F).
جليات
Dryadées (F).
دندسيات
Spirées (F).
عراويات
Rubées (F).
طليحات
Fragarées, Potentillées (F).
فراويات ، فيلكيات
Quillaées (F).
كلاجيات
Amygdalées, Prunées (F).
لوزيات
Neuradées (F).
نورديات

٣٠٥٦٤ - وَرْدِيَّة Rhododendron (F).
هي النسل ، أغلبه .

٣٠٥٦٥ - وَرْسِي ورس النبات أخضر . وورس الصخرة في الماء : ركبها الحث .

٣٠٥٦٦ - وَرْسِي * ، غُمرْكة Memecylon tinctorium (S). Mémecyle tinctorial (F). Cayton cornal tree (E). Safranbaum, Beerbaum (D). Cornio (I).

شجرة برية وزراعية من الفرسيات وفصيلة القرانيات . أوراقها متعاقبة متقابلة . نصلها سناني الشكل ، جامد الصلابة . أزهارها ضمية التجميع محورية الارتكاز متقابلة التصفيف . أوراقها غضائية مشهورة يستخرج منها صباغ أحمر اللون .

٣٠٥٦٧ - وَرْسِي مَشَقْ هو القنيل ، أغلبه .

٣٠٥٦٨ - وَرْسِي * Pelopus (S). Pelopo (F).

طائر من الحمام الوحشي شبيه بالترفة . موطنه يمتد من الهند إلى جزر القباية . ينحدر من الفلوب التي تجرب البلاد في طلب الرزق . ملجئه الحيائي جامي . جعاهاته مستطلة العدد . قوته البازور وبعض الحشرات . جسمه متدل القند يطول نحو ٣٢ سم. ثوبه أخضر الرأس والأرداء والجناح والذنب ، صتالي الصدر المشوي بالأحمر ، أصفر البطن المشوي بالوردي . يدشن عده في الأشجار القليلة الانتفاع . الانثى تحضن بمناوبة الذكر من مرتين إلى ثلاث مرات في الحبل ، حضنتها يبيضتان . الترخيم يستمر نحو ١٣ يوماً .

٣٠٥٦٩ - وَرْسِيَّات Mémecylées (F).
سبط من فصيلة القرانيات . اجناسه وأنواعه عديدة منها الأشجار والشجيرات والجنات . جميعها من نباتات المناطق الحارة . أوراقها سنانية متعاقبة متقابلة . أزهارها عنقودية التجميع ، محورية الارتكاز ، متقابلة الترتيب ، صغيرة القد . ثمارها عنقية تتكون بعضها مأكول بعضها الطعم . ومنها أنواع صناعية صبغية الإزراق أشهرها الورس .

٣٠٥٧٠ - وَرْشَانْ * Columba palumbus (S).
Colombe ramier, Grand ramier, Palombe, Pigeon



ورس



ورسي



ورشان



ورق



ورقية

٣٠٥٧٨ - رَوَقُ النَّقْدِ

Billet de banque (F).
Bank-note, Bank-bill (E).

هو من السندات التي تصدرها مصارف الإصدار وتلتزم بها أن تلغ نقدًا حاملها لدى الإطلاع مبلغًا معينًا فيها .

٣٠٥٧٩ - رَوَقُ شَاحِيلٍ

Papier filtre (F).
Filter paper (E).

٣٠٥٨٠ - رَوَقَاءُ *

Chalcophaps (S).
Chalcophaps (F).

طائر من الصواري ينتمي إلى فصيلة الحماميات . موطنه جند من الجزيرة العربية إلى الصين واليابان . ينتقل مع فصل السنة من مكان إلى مكان . ملجئه الحياتي زويبي الأ في زمن الرحيل . يألف الإحراج والبراري . يبدو على الأرض بشفة ويظهر بسرعة فائقة . قوته الحبوب والبرور البرية وبهض المشرات || جسمه محتدل القد ، طويل نحو ٤٢ سم . ثوبه متداخل الشبهة والريدة والكهبة ، جميعها لسماء المروج ، ويمطو في أواخر الظهر غطان أخضران ، ذنبه محتدل الطويل ، مستدير الطرف . متقاده وثاقتهاد وأصابعه إلى الصرة الزيتية || يذئن حشه في الأشجار الرقيقة . الانثى تحضن بمناوبة الذكر من مرتين إلى ثلاث مرات في العام . حضنتها يبعثان نقط .

٣٠٥٨١ - رَوَقَةُ ، إِصَاد ، شَيْد

Chape (F).
Cope (E).

هو ما طلي به الحائط ونحوه .

٣٠٥٨٢ - رَوَقَةُ

Feuille (F). Leaf (E).

هي في النبات عضو التمثيل والتنفس والتيع الذي يستمد طاقته الفعالية من الضوء والهواء . تتتركب الورقة من ثلاثة أجزاء : النصل والعتق والقاعدة . فالنصل هو الصحيفة الخضراء التي يملؤها الخشب ، يتكون هيكله من ضلع وعروق وأعصاب تختلف وضعها وتوزيعها وشبكها باختلاف الفصيلة والجنس والنوع . أما العتق فهو امتداد الضلع وهو صلة الوصل بين الساق والنصل أو الفرع والنصل . ومن الأوراق ما كانت عادمة البت وتعرف باللاطة والجالسة والحاضنة الخ ... وأما القاعدة فهي موضع اتصال العتق أو النصل بالساق أو الفروع وقد تكون هذه القاعدة لملولية كما في الكروية أو لاحقة الساق كما في التيجليات أو قرصية مخترقة كما في الأبليل . وقد تنمو من القاعدة وريقة تدعى الإذنيات || وتنقسم الأوراق إلى أبيدة أو هرودة أي دائمة الخضرة وإلى عابدة أو نافضة وهي التي تسقط في الخريف . أما أشكال الأوراق وتوزيعاتها لمعددة فخص منها بالذكر اسمها وهي التالية :

ورقة إبرية

Feuille aciculaire

ورقة إسفينية

Feuille cunéiforme

ورقة إهليلجية

Feuille oblongue

ورقة زلزلة

Feuille pédalée

ورقة بسيطة

Feuille simple

ورقة بيضبة

Feuille ovale

ورقة بيضبة منكسكة

Feuille obovate

ورقة لولبية التصريح

Feuille trifide

ورقة لولبية التصريح

Feuille tripartite

ورقة ثنائية التصريح

Feuille bifide

ورقة ثنائية التصريح

Feuille bipartite

Feuille crépue

ورقة جمدهاء ، مجمدة

Feuille alguë

ورقة حادة ، مدببة

Feuille auriculée

ورقة حاشية

Feuille curvinnervée

ورقة حدهاء العروق

Feuille verticillée

ورقة حلزنية

Feuille linéaire

ورقة عيطية

Feuille peltée

ورقة درلية

Feuille peltinnervée

ورقة ذرفية العروق

Feuille acylclique

ورقة دوارية

Feuille lyrée

ورقة ربابية

Feuille mucronée

ورقة رهاية

Feuille pennée

ورقة ريشية

Feuille penninnervée

ورقة ريشية العروق

Feuille pennatifide

ورقة ريشية مخزومة

Feuille pennatifpartite

ورقة ريشية مشرمة

Feuille pennatiséquée

ورقة ريشية ملفلفة

Feuille lancéolée

ورقة سنانية

Feuille sagittée

ورقة سهمية

Feuille spinuleux

ورقة شوكية

Feuille entière

ورقة صحيحة ، كاملة

Feuille hastée

ورقة طبرزينية

Feuille engainante

ورقة غمدية

Feuille roncinée

ورقة لأرية

Feuille décurrenre

ورقة نقفاد

Feuille palmée

ورقة كفية

Feuille palmatinervée

ورقة كفية العروق

Feuille palmatifide

ورقة كفية مخزومة

Feuille palmatifpartite

ورقة كفية مشرمة

Feuille palmatiséquée

ورقة كفية ملفلفة

Feuille sessile

ورقة لاطنة

Feuille spiralee

ورقة لولبية

Feuille connée

ورقة متصلة

Feuille alterne

ورقة متعاقبة

Feuille opposée

ورقة متعاقبة

Feuille décuissée

ورقة متقاطعة

Feuille boursofflée

ورقة متجمعة

Feuille perforlée

ورقة مشقوبة

Feuille dentée

ورقة مخزومة ، مسننة

Feuille subulée

ورقة مخزومة

Feuille composée

ورقة مركبة

Feuille rectinnervée

ورقة مستقيمة العروق

Feuille lacinée

ورقة مشرشرة

Feuille pétiolée

ورقة منقطة

Feuille crénelée

ورقة مغرقة

Feuille séquée

ورقة ملفلفة

Feuille émarginée

ورقة مفروقة

Feuille tronquée

ورقة مقطوعة



ورقاء

٣٠٦٥٦ - **وستاريه**
Wistaria (F).
هي البيلة ، ثبات عايش زيني ، اطلبها .

٣٠٦٥٧ - **وستي**
Oulsteti (F).
هو الحبال ، من القرد الذبية ، اطلبه .

٣٠٦٥٨ - **وسد**
Biffonner (F). To ridge (E).
وسد الثرية توسيداً : اقام فيها الاكلام .

٣٠٦٥٩ - **وسطى**
Médius (F). Middle finger (E).
الوسطى من الاصابع ما بين السبابة والبصر .

٣٠٦٦٠ - **وسف**
Décortiquer (F).
To decorticate (E).
قشر . الثمار الموصفة هي الثمار المششرة وقد يكثر استعمال التوسيف في اللوز والصنوبر والجوز .

٣٠٦٦١ - **وسف**
Palure (F).
Peel, Skin, Paring (E).
الوسف القشرة الخارجية التي تلحف لب بعض الثمار كالجوز والوز والبطاطا والبنورة ... اما قشرة الدراق والتفاح واللاجاص والخوخ الخ ، فتدعى حشاة . اطلبها .

٣٠٦٦٢ - **وسكي**
Whisky (F). Whisky (E).
مشروب كحولي مسكر يصنع من منتخل الشعير والخمير والشم . تكثر صناعاته في بلاد الانكليز . يقال ان القليل منه يفيده الجسم البشري .

٣٠٦٦٣ - **وسم**
Ferrade (F). Branding (E).
كَي الحيوان بعلامه فارقة منمأ لفرقة .

٣٠٦٦٤ - **وسم**
Etiqueter (F).
To ticket, To label (E).
وسم الثبات : وضع له سمه من خشب او غيره من المواد كتب عليها التعريف المميز .

٣٠٦٦٥ - **وسمة ، وسمة ، عظم**
Istis (S). Pastel (F).
جنس نباتات عشبية محولة من فصيلة السليبيات . انواعها المعروفة نحو ٣٠ جميعها من نباتات المناطق الحارة والعتلة . معظمها بري وبعضها صناعي وعلمي . اوراقها كاملة مستطيلة . ازهارها حامي . ازهارها صفراء اللون . ترفب في الاراضي الجصية . ازهارها وسمه الصباغين .

٣٠٦٦٦ - **وسمة الصباغين ، ورد النيل**
Iscia tinctoria (S). Pastel des teinturiers, Guède (F).
Wood, Ash of Jerusalem, Dyer's wood (E). Firber waid, Wilder indigo (D). Pastello, Giastro, Guado (I).
لوع من الوسمه ، يملحو المرق ، يزرع لاستخراج مواد الصبغة المحبوبة في اوراقه . اوراقه متعاقبة ، السفلى منها اهليلجية ولعليها سهمية ، نصلها جامد الصفحة عاكس الخضار || ينمو في اوائل الربيع . تنترج اوراقه تباعاً ، عند ازدياد نضالها ، وتجفث في البائل ثم تسحق وتحضر .

٣٠٦٦٧ - **وسيتات ، فسيتات عاقرة**
Myccella stellaris (S).
مرتبطة تطور مجهرية من رتبة الزويديات . انواعها عديدة جميعها خمسة اجناس : الازويديوم ، الركونديوم ، الرزكونديوم ، السايروسيوم والمونيزيوسيس || معظمها

٣٠٦٦٧ - **وزيم**
Gynécée (F). Gynaecium (E).
جهاز اخية الزهرة ، يشمل المبيض والسمه والقلم . راجع منفص .

٣٠٦٦٨ - **وزيمكة**
Botte (F). Bundle, Truss (E).
ما حزم من البقول والثن على اعطالها .

٣٠٦٦٩ - **وزين**
حسب الخطاط المطحون .

٣٠٦٧٠ - **وسابي**
Wasabi (F).
نبات يقل مشهور باسم يربوه ، اطلبها .

٣٠٦٧١ - **وساجكة**
Pelor (S). Pélor (F).
سمكة من الجلاخ الشالكاكات الزمائف . اصنافها تمتد من المحيط الهندي الى البحر الاحمر . جسمها مخروطي الشكل صغير القد ، ينتهي زعنفة مستديرة مجذمة بالاسمر الجفوي . زعانفها كبيرة ملونة وسنفة كاللشار . الظهيرة منها تمتد من الرأس الى الذنب . رأسها مخروطي الكسم تملوه التزويق النافرة المستعيرة . عيناها ناشزتان مستديرتان متقاربتان . ثوبها الى السمرة الطصاة تعرضه بعض الخطوط الجفوية وهو يقيق مع اقرباه من الظهور ويبيض منه البطن .

٣٠٦٧٢ - **وسادة**
Empodium

٣٠٦٧٣ - **وسان**
Stenopis gracilis (S).
Loris grêle (F). Slender loris (E).

حيوان لين وحيد الجنس والنوع من فصيلة القيروديات . موطن سرنيديا والهند . يالغ الاجراع والنايات ويتسلق الاشجار بشفة . ملجته الحياتي جامي . جماعته قليلة العدد قلما يتجاوز خمسة . مسرحه دجوي يستمر من النشفة الى الفجر المبقي . قوته الجنادب والجراد وجميع انواع الحشرات والثار السكرية والسمل والصافير الصغيرة وبعض الاعشاب وورق الاشجار || جسمه قصير مستدير بطول نحو ٢٢ سم . يتزين باستدارة الرأس وبصر الاثف وتجلو مؤخره من الذنب . عيناه كبيرتان مستديرتان . اذناه صغيرتان ، مستديرتان الاطراف المرءاء النادمة الوبر . شعره ناعم ، لبد التجميع ، حريري المنس . ثوبه الى الصمرة الشهباء يملحو مواج ادس في الظهر وقفي في سائر اقسام الجسم . حياء مطوقتان بالاسود . قصبة انفه وتقدم سطحه الى البياض الاخضر . نحرة واطراف قوائمه الى الرعدة القراء || الاثنى ثنائية الكندي ، رباحية الحلمات الصغيرة الثقيلة . مجهله يستمر نحو سمية اشهر تقص في تمامه من جروين الى اربعة اجراء .

٣٠٦٧٤ - **وسب**
Flaveria (S). Flavérie (F).
جنس نباتات عشبية برية من فصيلة المركبات . انواعها المعروفة قليلة العدد جميعها اعشاب حولية . سوقها سرسة اوراقها مفردة متتالية مائسة البيرة . ازهارها رؤسية نورية التجميع || اشهر انواعه وسب الخش .

٣٠٦٧٥ - **وسب الخش**
Flaveria contrayerba (S). Flavérie du Pérou (F).
Peruvian dyers weed (E). Flaveria (D). Flaveria (I).
نوع من السب وهو عشبة برية طرية يقال انها تستعمل كشادة لسم الاقاعي . ساقها منتصبه قراء . اوراقها مفردة ، خطية التشرج ، بحرية اللون . رؤسياتها الزهرية كبيرة القد . ازهارها انبوبية الشكل يضاء اللون .



وساجة



وسان



وسب الخش



وسمة الصباغين



وسيم



وسيم



وشاعة



وشاعة



وشاعة

صغيرة ، ثلاثية الفصل . كورالها شبه اسطوانية . بطونها غرومية ، تنتهي بمرزات ذرية . كورالها وبطنها مبيطة الملب الاسمر . رواشها باضة الخفاب ، مجعدة بالاسمر || الحشرة الجملانة واشنة اما البرقة فذاتة او ثائلة || اشهر انجناسها الوسيمية .

٣٠٦٧٥ - وسيمكة *

Anisophylla (S).

Anisophyllidae (F).

جنس اشجار وشجيرات حرجية من فصيلة القراصيات . انواعها المعروفة قليلة العدد منتبها بعض الاصناف الاستوائية الاسيوية والافريقية || اشجارها كبيرة ، ريفية ، متباعدة الفروع . اوراقها منتقة ، متضالقة ، سنانية الاتصال . ازهارها ابيض الازكاز ، سنبل التجميع . ازهارها صغيرة بيضاء اللون او صفراء . ثمارها عتية ، بذورها عادمة الالح || اعشابها صناعية ، متوسطة الصلابة .

٣٠٦٧٦ - وشاعة *

Radiolites (S).

Radiolites (F).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات صفحيات الخياشيم وفصيلة الرشاخيات . انواعها المعروفة قليلة العدد جميعها من متحجرات الطبقة الطباشيرية || اصنافها شبه مخروطية الشكل ، لامتساوية المصاريع ، الملوي منها صغير القد ، جلوني الشكل ، مسطحة الصفحة الخفدة ، اما السفلي فمخروطي موشح .

٣٠٦٧٧ - وشاعيات *

Radiolitidae (S).

Radiolitidae (F).

فصيلة حيوانات بحرية من الرغويات صفحيات الخياشيم ، عادات الرغوس . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد ، جميعها من متحجرات الطبقة الطباشيرية || تتميز انواع هذه الفصيلة بالتباين القائم بين ممراري اصنافها اذ ان المصراع الاسمر سفاطي الشكل في حين ان الامين شبه مخروطي || اعرف اجناسها واشهرها الرشاعة .

٣٠٦٧٨ - وشالة *

Asticot (F).

Maggot (E).

هي دوسمة ذبابة اللحم . تركب التسج الحية فتؤذيها لانها مقومة لاحة .

٣٠٦٧٩ - وشاعة *

Exostemma (S).

Exostème (F).

جنس اشجار وجنيات برية ، طيبة ، من فصيلة القواميات . انواعها المعروفة ١٢ مهددا البلاد الاستوائية || اوراقها متقابلة ، منتقة . فصالحا يضيء الشورن او اهليحيه او سنانية . ازهارها طرني او عمودي الازكاز ، عطي التجميع . ازهارها انبوية التجميع ، بيضاء اللون او وردية . ثمارها حقة ، ثنائية الخدر . تحوي العديد من البذور الصغيرة المفلطحة || اشهر انواعها الاثنان التاليان :

٣٠٦٨٠ - وشاعة كبيرة الزهر *

Exostemma grandiflora (S).

Exostème à grandes fleurs (F).

نوع من الشاعة . منتبها فزويلا . ساقها ترتفع نحو عشرة امتار . قشورها مرة المالح دافعة للحس وسهلة المعلة .

من الفطور الزمية التي تعيش في التربة على المواد النباتية المتحللة وبمضها طفيل يبيض على النباتات المائلة ينقلب التسج ويرفسها دون ان يقع بها شديد الاذى .

٣٠٦٨١ - وسيمط *

Catalyseur (F).

Catalyser (E).

هو المسعالم ، جسم يحدث التحليل باللماسة .

٣٠٦٩٩ - وسيمط *

Remisier (F).

Half-commission man (E).

هو من يتوسط في انعقاد صفقة بين العميل والسعالم او بين البائع والمشتري .

٣٠٦٩٠ - وسيمطة * معشكة

Milieu de culture (F).

Medium culture (E).

الوسط الملائم لزراع الميكروبات والفطور .

٣٠٦٩١ - وسيمكة *

Moyen (F).

Plea (E).

هي السبب او الريمه القانوي او القبطي تنبى عليه الدعوى ويدلل عليه امام المحكمة .

٣٠٦٩٢ - وسيم *

Callista (S).

Calliste (F).

جنس طير من فصيلة التسنريات . انواعه المعروفة نحو ٦٠ جميعها من طيور امريكة الوسطى والجنوبية . تألف الكذابات والحراج التي يكثر فيها التعل . نظامها الحيواني جاعي . اسرارها متفاوتة العدد ، تكثر فيها القلة || اجسامها صغيرة القد ، ريشة القوام ، تظل من ١٤ الى ١٧ سم . مناقيدها مخروطية الشكل تنتهي بمقاطع صغيرة ذرية . اجنتها منتدلة الخيم . اذنانها متوسطة القد ، مقنونة الاطراف . اسرارها ريفية دقيقة . اصابعها منتدلة الخيم . اثوابها جميلة الالوان الساطعة فيها الازرق والاحمر والاصهب والاسود || جميعها تعيش على البلور وبعض التار العتية || تدفن اشعاشها في الادغال على ارتفاع بعض الاندام عن سطح التربة . اناثها تنضع من ٤ الى ٦ بيضات تحضنها بمناوبة الذكور نحو ١٤ يوما .

٣٠٦٩٣ - وسيمكة *

Palloptera (S).

Palloptère (F).

Palloptera (E).

جنس حشرات من فصيلة الوسيميات وذرية ذوات الجناحين . انواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها بعض مناطق البلاد الحارة والمتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة ، هيفاء ، هيفاء اللون او صفراء ، تظل من ٣ الى ٤ سم . رؤوسها شبه مكورة . هيوتا صغيرة ، فارقة عند الشقين . قرونها الاستشعارية قصيرة ، ثلاثية الفصل المتدفقة . اعطائها منتدلة الطول . ملامسها صغيرة . كورالها شبه اسطوانية بطونها مخروطية تنتهي بمرزات ذرية . رؤوسها وكورالها وبطنها والمخاذا مبيطة الملب الدقيق . رواشها باضة الخفاب مجعدة بالاسمر الجفوي || جميعها واشنة تألف كل مكان تكثر فيه الازهار . يرقاتها خاضعة او دامت .

٣٠٦٩٤ - وسيميات *

Pallopteridae (S).

Pallopteridés (F).

Palloptérines (E).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم مناطق البلاد المتدلة الحرارة . تألف المراعي والبراري والحراج || اجسامها صغيرة هيفاء ، تظل من ٣ الى ٦ سم . رؤوسها شبه مكورة ، هيوتا فارقة عند الشقين . قرونها الاستشعارية

٣٠٦٨٧ - وَشَعْمَةٌ غَيْثِيَّةُ الْوَرَقِ

Centranthus angustifolius (S). *Centranthe à feuilles étroites* (F).

بجيلة سبروتية معمرة تملو نحو ٨٠ سم. أوراقها ساقية ملتصحة ضيقة، طويلاً يراوح من ٨ إلى ١٥ سم. وعرها من ٢ إلى ٥ سم. نصلها حبيك الصفحة بحري اللون. أزهارها عتقودي التجميع. أزهارها وردية زاهية، متوسطة الدابة || تنورها يستمر من أيار إلى تموز.

٣٠٦٨٨ - وَشَعْمَةٌ غَلِيظَةُ السُّوقِ

Centranthus macrosiphon (S). *Centranthe à grosses tiges*, *Valériane à grosses tiges* (F).

شبة سبروتية حولية عديدة الاصرام. ساقها غمية غليظة مجوفة كثيرة الفروع تملو من ٣٠ إلى ٥٠ سم. أوراقها ساقية ملتصحة لائثة، نصلها بحري اللون. أزهارها عتقودي التجميع، غارث القمة. أزهارها وردية اللون أو بيضاء أو موهجة في بعض الاصرام || تنورها يستمر من حزيران إلى آب.

٣٠٦٨٩ - وَشَعْمَةٌ نَحِيلَةٌ

Centranthus calcitrapa (S). *Centranthe chaussetrap* (F).

شبة سبروتية حولية نحيلة الساق تملو نحو ٣٠ سم. أوراقها ساقية ملتصحة ريشية مخمرة. أزهارها عتق التجميع، هامي الاكناز. أزهارها وردية اللون قصيرة الدابة. تنورها يستمر من أيار إلى تموز.

٣٠٦٩٠ - وَشَعْمَةٌ

Fusiforme (F). *Fusiform* (E). نمت وصني يندل على الشكل المغزلي المسكوب الجسم المذهب الطرف.

٣٠٦٩١ - وَشَقِّ

الوشق كوكبة نجم شمالية الموقع مركزها بين الدب الأكبر والنمات || عدد نجومها ٤٦ معظمها من المراتب الخامسة والسادسة والسابعة ونها نجم من المراتب الرابعة مركزه في اواسط الدب.

٣٠٦٩٢ - وَشَقِّ

جلس حيوانات مفترسة من فصيلة السنوريات ودبة اللوام. انواعها عديدة بعضها اصفر قلد من الفهد، بجيلة الشكل، متناسبة التكوين، قصيرة الدب مخروطية الاذن، يملو طرف اذنانها جم من الور الاسود. قوتها ما استطاعت اليه سبيلا من الحيوان والطير || اعرف انواعها واشهرها ما يتبع.

٣٠٦٩٣ - وَشَقِّ أَحْمَر

Lynx rufus (S). *Lynx rous* (F). *Red lynx* (E). نوع من الوشق الامريكي. جسمه متوسط القند يطول نحو ٨٥ سم. وذنبه ٣٠. ثوبه امفر اللون احمر يملو توشم امسح وتوشيع اسمر.

٣٠٦٩٤ - وَشَقِّ أُرْوِي *

Lynx vulgaris (S). *Lynx vulgaire*, *L. d'Europe* (F). *Common lynx*, *European lynx* (E).

نوع من الوشق، كبير القنص، شديد الاذن موطنه اوروبا. وهو كبير الجفة طوله نحو ١٢٠ سم. وذنبه ٢٠ أما ارتفاعه فتحو ٦٥ سم. اطوار اطوار السنور، يتسلق الاشجار. قوته الطير وصغير الحيوان.

٣٠٦٨١ - وَشَاكَّةٌ كَثِيرَةُ الزُّهْرِ

Exostemma floribonda (S).

Exostème floribonde (F).

نوع من الوشاكَّة، منبتها الاثليل، ساقها ترتفع نحو خمسة امتار. غواصها الطيبة كنفاوس الوشاكَّة الكبيرة الزهر.

٣٠٦٨٢ - وَشَاكَّةٌ *

Cynogale (S). *Cynogale* (F). حيوان وحيد الجنس والذعر من فصيلة الزباديات. موطنه

جزر التنايج. يلاحق البيرات ويحاري الماء. يلاحق الحياني فردي لا يتجمع الذكر والاثني الا في زمن الوداق والكوم || جسمه مستطيل الشكل، صغير القد، قصير القوائم، يطول نحو ٧٥ سم. بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ١٥ سم. راسه شبه مخروطي الشكل، مسط الجرم. عيناه صغيرتان لوزيتان. اذناه صغيرتان مستديرتان. مخارجه مجهز بقلق ينطلق عند الحاجة. سباله كثيف الملبس الطويل الاشقر. قوائمه خاسية الاصابع. ذنبه واخر الورب اليه المجلل. ثوبه الى الكوبة السوداء يمتد في الرأس والظهر ويبدى في الصدر والبطن || يسبح ويغوص في الماء ويمدو على الارض بسرعة وينساق الاشجار. قوته الاسماك والسرطان وكل ما استطاع اليه سبيلا من الطير والحيوان.

٣٠٦٨٣ - وَشَع

Fleurs des légumes (F). الوشع : زهر البقول.

٣٠٦٨٤ - وَشَعُ الْمَاءِ *، وَكَيْسَتَارِيَّة

Valisneria (S). *Valisnérie*, *Valisnérie*, *Valisnère* (F). *Eel grass*, *Tape grass* (E). *Sumpfschraube* (D). *Valisneria* (I).

جنس نباتات عشبية ثديية مائية المسكن من فصيلة كلديات الماء. تعيش وتتكاثر في المياه العذبة الراكدة وفي الاحواض. أوراقها صفية تطول من ٣٠ إلى ٨٠ سم. وتعرض من ٦ إلى ١٢ م. أزهارها صغيرة القد، الذكرية منها ثنائية السداة تنفصل من قاعدتها وتطفو على سطح الماء بانتظار الزهرة الاثني المرتكزة على زناد لولبي نابض يوجه الزهرة عند ادراكها التناسل باتجاه الريح العالم.

٣٠٦٨٥ - وَشَعْمَةٌ

Centranthus (S). *Centranthe* (F). جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة النارديةيات. انواعها المعروفة ستة، موهجا حوض البحر المتوسط. سقها دسرة، أوراقها متعابلة، أزهارها سوية اللون الاحمر او الالبيض، غواصها الطيبة لا تختلف عن غواص ساتر النارديةيات لكنها اصغر منها بالمناصر المعلقة || اشهر انواعها واعماها زراعة ما يتبع.

٣٠٦٨٦ - وَشَعْمَةٌ حَمْرَةٌ *، وَالْيَرِيَّانُ أَحْمَر

Centranthus ruber (S). *Centranthe rouge*, *Valériane rouge*, *Behen rouge*, *Barbe du jupiter*, *Lilas d'Espagne* (F). *Red spur-valerian*, *Jupiter's beard*, *Fox's brush* (E). *Baldrian*, *Rota Spornblume* (D). *Valeriana rossa*, *Barba Giove* (I).

بجيلة سبروتية معمرة طيبة وزينية تملو من ٥٠ إلى ١٠٠ سم. اصرامها الزراعية عديدة. سقها موهجة. أوراقها بيضية ذرية، نصلها كامل الصفحة مسنن الحافة جميل انقشار يطول من ٨ إلى ١٢ سم. ويعرض من ٢ إلى ٤ سم. أزهارها عتقودي التجميع، صيواني القمة. أزهارها ملطرية السرف، مستطيلة الدابة، ارجوانية اللون || تنورها يستمر من أيار إلى آب.



وشاكَّة



وشع الماء



وشع ماء



وشق أروبي

٣٠٦٩٥ - **وَشَقُّ الْفَقْرِ** هو عشاق الأرض ، اطلبه .

٣٠٦٩٦ - **وَشَقُّ الْمَنَاقِبِ * ، حَيْب**

Lynx chaus (S). Lynx des marais (F). Chaus (E).
نوع من الشوق ، طولُه نحو ٦٥ سم. وذنبه ٢٢. ثوبه
ألمع اللون إلا في البطن ، أكله العين ، اسمر
المخاض . موطنه شاسع الأطراف يعم الحبيشة والنبوة
وبصر ولبنان وسورية وأمراق وبلاد فارس حتى بحر
فردوس .

٣٠٦٩٧ - **وَشَقُّ حَيْبِي * ، حَيْب**

Lynx caligatus (S). Lynx botté (F). Booted lynx (E).
نوع من الشوق ، طولُه نحو ٦٧ سم. وذنبه ٣٠. ثوبه
أغمر اللون أبيض المتق اسمر الخلد . وشة الذكر عاقبة
لامعة ويظهر زرقاء المواج . وشة الانثى باهية وفيرتها وودية
المواج . موطنه افريقية الشرقية وبلاد فارس والهند . يكثر
في الحبيشة .

٣٠٦٩٨ - **وَشَقُّ قَهْدِي * ، نَهْ ، فُتَجُلْ**

Lynx pardinus (S). Lynx pardé (F). Pardine lynx,
Southern lynx, Spanish lynx (E).
نوع من الشوق ، موطنه الشرق الاوسط وادوية الجنوبية .
وهو أصغر جثة من الشوق الاوربي وأغرس علفاً . ثوبه
كثوب القهد لوناً ووشة . راجع نته .

٣٠٦٩٩ - **وَشَقُّ كَنْدِي * ، حَيْب**

Lynx canadensis (S). Lynx du Canada (F). Canada lynx, Peeshoo (E).
نوع من الشوق الأمريكي ، أصغر جثة من الاوربي واكبر
من القهدي . طولُه نحو ١٠٥ سم. وذنبه ٥١. موطنه كندا
وبعض ارجاع ايركية الشمالية . ثوبه ألمع اللون ،
عظمي المواج ، اسمر الرقبة . ذنبه اغمر اللون آخر المواج
أسود الطرف .

٣٠٧٠٠ - **وَشَكْل**

Suint (F). Yolk (E).
هو تتوع أو مصالة صوف النعم . راجع نص .

٣٠٧٠١ - **وَشَكْلِي * ، حَيْب**

Ambulacraire (F). Ambulacrum (E).
الجهاز الوشي عجيبة اقنية متشابكة تسمح بمرور الغذاء
عند الشوكيات .

٣٠٧٠٢ - **وَشَم**

أول ظهور النبات على سطح التربة . ج وشوم وشام .

٣٠٧٠٣ - **وَشَمِيَّة * ، حَيْب**

Mastigosporium (S).
جنس فطور مجهرية من الرطحيات يتميز بجريه الكتيبة
الاسطوانية ، القصيرة ، المتنامية ، الشفافة التي تحمل في
اطرافها كنانة فردية ، مدنية ، ودية الانقسام الوشي .
بويضاته مستطيلة عليية || انواعه قليلة ، اعرفها وشية
التجبل ووشية الترس .

٣٠٧٠٤ - **وَشَمِيَّةُ الْفَرَسِ * ، حَيْب**

Mastigosporium lupini (S).
فطر مجهرى يركب اوراق الفرس فيسبب ذبولاً واحكاماً
الباكر || مظهره الخارجي لطخ شقيقة مستطيلة سمراء
اللون ، زيتونية المواج ، تركب الاوراق فتظفها وتغدها
الى الذبول والاحبال || ينشط في الموامق الظليلة الرطبة .

٣٠٧٠٥ - **وَشَمِيَّةُ التَّجِيلِ * ، حَيْب**

Mastigosporium calvum (S).
فطر مجهرى يصيب اكثر التجيلات البرية في اوراقها

عليها ويلوحها || مظهره الخارجي لطخ مستطيلة مبهمة
لطفاً يراوح من ١ الى ٨ سم. لوناً الى الجزية العاقبة .
تركب نصل النصف فقرته وتلقوه || ينشط في الموامق
الرطبة وتزيد نشاطه العوامل الجوية الملائية .

٣٠٧٠٦ - **وَشَن**

Etiage (F). Low-water mark (E).
وشن وشن الماء : قل . زين الشين هو زين البروس اي
قلة المياه النابتة او الجارية .

٣٠٧٠٧ - **وَشَنَة**

Griotte (F). Morello cherry (E).
اسم شامل يطلق على مختلف ثمار غروب الكرز العادي
التي تتميز بصفرها وحوضها .

٣٠٧٠٨ - **وَشَه**

طائر من الصقور وهو غريب من الشامين او عرق منه .
كل ما قيل فيه : « طائر شبه الشامين وليس به » .
٣٠٧٠٩ - **وَشَيْج ، هَيْكِلِيَا**

Heficonia (S). Héliconie (F).
جنس نباتات عشية مسرة من فصيلة الموزيات . انواعه
المعروفة ٩ ، اصلها البلاد الاستوائية والحارة . تزود
للتزين وهي قريبة الشبه من الموز تمل من ١٠٥ الى
٤٠٠ سم. اوراقها كبيرة القد ، نصلها اعليجي الشكل
مالس الصفحة الجامدة الزاهية الخضار . كيانها كبيرة
القد تطلو من ٤٠ الى ٨٠ سم. انواعها متراكبة ، كثيرة
البعد ، مختلفة الالوان الجمية .

٣٠٧١٠ - **وَشَيْجَة**

Racine secondaire (F). Secondary root (E).
من الجذور الثانوية التي تنشعب عن الرئيسة . ج وشائج .

٣٠٧١١ - **وَشَيْج**

سياج من قصب او قضبان متشابكة وكل ما غرس او
وضع حول الحديقة من الشجر والشوك والاسلاك منسج
للباحة الدخول .

٣٠٧١٢ - **وَشَيْج**

هو سقف البيت وهو ما يمس وسقط من ورق الشجر .
ج وشائج .

٣٠٧١٣ - **وَشَيْجَة**

Fusasu (F). Spindilla (E).
شكل تشدبب ميكل شائع الاسماك في بعض انواع الانجار
المشردة . والشكل الرشي يكون عادة ابيض قاعدة من لدرني
واقط ارتفاعاً منه .

٣٠٧١٤ - **وَشَيْجَة**

Allantoida (F). Allantoid, Allantoic (E).
ملحق جنسي يظهر في اول الحمل ويستمر حتى تحقن يوا
ثم يتلاشى .

٣٠٧١٥ - **وَصَامَة * ، حَيْب**

Pathologie (F). Pathology (E).
علم يبحث في اسباب الامراض واعراضها .

٣٠٧١٦ - **وَصَامَة نَبَاتِيَّة * ، حَيْب**

Pathologie végétale (F). Vegetale pathology (E).
علم يبحث في اسباب الامراض النباتية وعوارضها .



وشق المناقب



وشق جنسي



وشق جنسي



وشق كندي

Tuteur de fait وصي خاص
Tuteur légal وصي شرعي
Tuteur ad hoc وصي فعلي
Cotuteur وصي مع غيره

٣٠٧٢٧ - وصية ، موصى به
Legs, Testament (F), Legacy, Will (E).
هو كل موقوف في وصية مكتوبة .

٣٠٧٢٨ - وصية عهدية ، وصية إستثنائية
Fidécummissa (F), Fidel-commissum (E).
هي الوصية التي يشترط فيها دفع المال الموقوف الى شخص
ثان بعد مدة معينة . فالوصي له الاول يدعى المهدى أو
المكلف والموصى له الثاني يدعى المستحق المهدى .

٣٠٧٢٩ - وصيد
Athermane, Athermique (F), Athermanous (E).
نمت تعيش فيطلق على كل مادة لا تحتفظها الحرارة المشعة .

٣٠٧٣٠ - وصيد
Dru (F), Thick (E).
الزروع الوصيد هو الزروع المتقارب الاصول . والزراعة
الوصيدة : المتقاربة النبات .

٣٠٧٣١ - وصيدة
حظيرة من الهجرة تتخذ المال بيتا المظيرة تكون من
القصبة .

٣٠٧٣٢ - وصينغ
Cri des oiseaux (F).
صوت الصائير . راجع صقب .

٣٠٧٣٣ - وصيف
هو كريمة البر ، اطلها .

٣٠٧٣٤ - وضاء
Radiation nocturne, Rayonnement nocturne (F).
Nocturnal radiation, N. radiance (E).
ونهم من قال الرضاء الليلي ، هو اطلاق الحرارة التي كانت
قد تجتمعت في النهار .

٣٠٧٣٥ - وضام
Rémanence (F), Remanence (E).
خاصة تتميز بها بعض المشاعر التي يستمر انفعالها برهة
من الزمن بعد زوال السبب الباعث .

٣٠٧٣٦ - وضع ، ولادة
Mise bas, Part, Parturition (F), Parturition (E).
غروج الجنين من رحم الانثى في نهاية مدة الحمل .

٣٠٧٣٧ - وضع الحدود
Abornement, Bornage (F), Delimitation, Fixing
limits (E).
وضع علامات بين ارضين للالة على الخط الذي يفصلها .

٣٠٧٣٨ - وضع اليد
Mainmise, Occupation, Possession (F), Seizure,
Possession (E).
الملك في المباح انما يثبت بالاستيلاء عليه . والاخذ هو
الاستولي أو الغافل . راجع استيلاء .

٣٠٧٣٩ - وضعية
Assiette (F), Posture, Seat (E).
هي حالة الانس التي تقوم عليها بعض الامور .

كوصية الحق
Assiette de droit (F).

٣٠٧١٧ - وصاية
Tutelle (F), Tutelage (E).
نظام قانوني لحماية القمتر .

٣٠٧١٨ - وصع ، وصع
Troglodytes parvulus (S), Troglodytes mignon (F).
Wren (E).
عصفور ابد من الجوارح . جسمه صغير القد يطول نحو
١٠ سم . مقامه دقيق حاد الطرف . جناحه قصيران .
ذهبه متوسط الطول . فهو الى الرتبة السراء يطولها تجليج
معرض اسود . يأنف الحداثق والادفال والوسج والساجاجات .
قوته الديدان والناكب والذباب والحوام . يدخن في الادفال
والاجنات الكثيفة . اثناء تحنن مرتان في السنة . حفنتها
تراوح من ٦ الى ٨ بيضات وتستمر ١٣ يوما .

٣٠٧١٩ - وصعيات
Troglodytidae (F), Troglodytidae (E).

لصيلة طير من الجوارح لاقتنا التمل سنيات المناخير .
اجناسها وافرانها المعروفة نحو ٦٠٠ صنفها يشمل معظم
مناطق القاروين القديمة والجديدة || معظم طيورها صغيرة
القد ، نحيلة الانثاقيد القليلة الانعطاف . قصيرة الاجنحة
والاذناب المستديرة الاطراف . دقيقة الارصاع الزرقية ||
تألف الادفال . طيراتها قصيرة الشوط كثير التصعيد
والتهبيط . تسرح على الارض خفة وتسلو بسرعة . قوتها
التمل والحشرات الصغيرة والدويبات || اشهر اجناسها
اطلافا الوصع .

٣٠٧٢٠ - وصف ، تعريف
Signalement (F).
Description (E).
تحديد اشكال الحيوان وعلاماته الفارقة بعد ذكر اسمه
او رقه وتحدده وسلالة وعمره .

٣٠٧٢١ - وصف ، تحت
Qualification (F).
Qualification, Title (E).
هو في القانون المدني تحديد طبيعة العلاقة القانونية . وهو
في القانون الجنائي تعيين وضع الجريمة في نطاق النطاق
وموجبات القانون .

٣٠٧٢٢ - وصل
Récépissé (F), Receipt (E).
محرد يدون فيه تسليم اوراق او اشياء للاطلاع او الحفظ .

٣٠٧٢٣ - وصم
Maladie (F), Disease (E).
الوصم هو المرض . ج . وصوم ووصام .

٣٠٧٢٤ - وصم سكو
Mal secco
هو سنادارية الحمضيات ، اطلها .

٣٠٧٢٥ - وصصيات
Périnosporées (F).
Peronosporae (E).

عمارة تطور بجرهية من فصيلة الصنانيات . تتميز بمشيجها
المريضي الخيطوي الدائلي الذي لا يخرج من دعاماتها .
تكاثرها بيئي خارجي || اجناسها ستة . اربعة منها
تركب النبات فتؤذي به في التسنه والصنائه والصنيل واللائحة .
واثنان لا يؤذيان .

٣٠٧٢٦ - وصي
Tuteur (F), Guardian (E).
هو الذي صار قيمته لسهل على مصلحة القاصر وادارة
اموله وتقبله امام القضاء وهو قد يكون :

وصي بالوصية
Tuteur testamentaire



وصع

وضعية الرهن
وضعية الضريبة
وضعية العقار
٣٠٧٤٠ - وَصَم
خشفة الجزار يقطع عليها اللحم .

٣٠٧٤١ - وَصِيحِي
هو أرغ الجزيرة ، اطلاله .

٣٠٧٤٢ - وَطَ
هو صوت مجنحات الايدي من وطواط وخفاش وسحابة الخ .

٣٠٧٤٣ - وَطَارُ *
طائر وحيد الجلس والزرع من كثبات القدم وفضيلة
مضيفيات الخنازير || ملجئه الحياتي جماعي . يكثر وجوده
في جزر المحيط الهادي ، جسمه متوسط القد . جسمه سم
البطة الصغيرة . راسه معتدل الجرم . يتميز برسابة الزند
الذي ينفذ الصفحة العليا من المنقاد . عتقه معتدل
الطول . جناحه كبيران لاسفان . ذنبه قصير مقطوع
الطرف || ثوبه الى الزبدة تعلوها ماجات بنفسجية وزرقاء
بطنه الى البياض الاخير .

٣٠٧٤٤ - وَطَالَة حَرْبَاء *
Stratiomyia chamaeleon (S).
Stratiome caméléon, Mouche armée (F).

حشرة من فصيلة البطافيات . تألف المواقع الرطبة . جسمها
متوسط القد ، بطول من ١٤ الى ١٦ سم . رأسها كبير
الجرم ، قليل التشوؤ . عينها فارتقتان . زباناها مرققيان .
صدرها كثيف الحمل . حبيبتها صفراء اللون ، ثنائية
المنافس الحادة . ثوبها الى الزرقاء السمره يملوها في بطنها
تتجصص اصفر هندسي الشكل || يرقبها دودية ، غبراء
اللون ، سمره الرأس .

٣٠٧٤٥ - وَطَالِيَّات *
Stratiomyidae (S).
Stratiomyidés (F).

فصيلة حشرات من ذوات الجناحين قصيرات القرون .
اجناسها وانواعها كثيرة العدد ، منتشرة في جميع اصقاع
العالم || اجسامها لمجنبة ، متوسطة القد او صغيرة ، شبيهة
بالذباب . رؤوسها شبيهة مستديرة . عينها لقياسية الاثنا عشر
مناكها حشة لا تصلح للسم . قرونها الاستشعارية متجانسة
الاشكال ، تكثر فيها الاستقامة ، حدد فصلها يراوح
من ٤ الى ٨ . صفورها ملحومة بصل قصير ملهب اللون
او لفي . حبياتها شاذكة او سرسة . قوائمها حريافة .
بطونها خاسية او مداسية السكم الواضحة . رواشتها نضيفة ،
شفافة ، مطبقة الاسترغال عند الراحة || اناثها اكبر من
ذكورها . يرقبها دودية الشكل ، غبراء اللون ، فسيمة
الرووس التي تنقبض في مقدم الجوشن . جميعها ناعمة
تمعيش على المواد النباتية والمضوية || اشهر اجناسها
الوطافة والبرية والسمننة .

٣٠٧٤٦ - وَطَامَاة *
Monotoma (S).
Monotome (F). Monotome (E).

جلس حشرات من فصيلة البطافيات ورثبة مخدات
الاجنحة . انواعها المروفة نحو ٣٠ منتشرة في بعض
اصقاع البلاد الباردة والمتدلة الحرارة || اجسامها صلبة
تطول من ٢ الى ٣ سم . رؤوسها مخروطية الشكل . عينها

صغيرة ، ناشرة . تأثيرها وفكرها نظامية . قرونها
الاستشعارية ديسية الاطراف . كواسلها مستطيلة الشكل ،
مسنة الخثار . الحامدا وشمية ، لا تلتف كاسل البطن .
اثوابها ورسية اللون ، يكثر فيها الاسمر والاصفر ||
جميعها داسنة تعيش على المواد النباتية المنحلة والساخرة الى
الانحلال .

٣٠٧٤٧ - وَطَامِيَّات *
Monotomidae (S).
Monotomidés (F). Monotomidae (E).

فصيلة حشرات من مخدات الاجنحة . اجناسها وانواعها
المروفة قليلة العدد منتشرة في بعض اصقاع البلاد المعتدلة
الحرارة || اجسامها صغيرة تطول من ٢ الى ٥ سم . رؤوسها
صغيرة ، مخروطية الشكل . عينها بارزة . تأثيرها وبلاسها
نظامية . قرونها الاستشعارية ديسية الاطراف ، تساعية
الفصل . كواسلها مسنة الخثار . الحامدا شبيهة بمجنبة
الشكل ، لا تلتف كاسل البطن . قوائمها نضيفة . ارساها
رباعية العقل . اثوابها ملونة || جميعها داسنة . بعضها
يعيش في قري التلل اعصها النمل الاكثف || اشهر
اجناسها البطامة .

٣٠٧٤٨ - وَطَاوِيط
Mégachiroptères, Grandes chauves-souris (F).
Mégachiroptères (E).

مرئية حيوانات من مجنحات الايدي ، تشمل فصيلة
الوطاويط والمديد من الاجناس والانواع . تتميز بأذانها
الارثدية ، بأنفها الارثرفية وبأذانها ، عند وجودها ،
المركزة تحت الشفاء الجلفي والقاعدة النضيفة .

٣٠٧٤٩ - وَطَب
هو الفصر العظيم في البقر والدنم والماخر .

٣٠٧٥٠ - وَطَبَاء
الوطباء : النظيفة الفصر كدوك بقرة ولباء او عز ولباء .

٣٠٧٥١ - وَطَحَاتِيَّات *
Mucédinées (F). Mucedinina (E).

عارية فطور مجهرية من فصيلة الكنتيات . تتميز ببوطها
الشفاف او القليل التلون || اجناسها عديدة ، فوارقها
مركزة على تركيب شكل الكنتيات . اعرافها من الرسبة
الاقتصادية الزراعية حسة : الخردن ، اللندام ، السليمية ،
الكتن وانكتنية .

٣٠٧٥٢ - وَطَحِيَّات *
Mucedinaceae (S).
Mucedinacées (F). Mucedinaceae (E).

فصيلة فطور مجهرية من مرئية الحياتيات ودبة الزوحيات .
تتميز ببوطها اللاتياشي الترتيب والتضبيب فهو غسي
التجميع او ميسر وهو عادم اللون شفاف او مشع التضبيب
الزاهي . كئالها متعددة الاشكال والاولون . اجناسها
وانواعها كثيرة العدد جميعها غس مزارات ، الزيكيات
والطليات والفيتيات والمالمصيات والقيسيات والمبريات .

٣٠٧٥٣ - وَطَدَ *
Tasser (F). To compress (E).
وطد الارض شرجبا بالبطلة لتصلب لاساس بناء
او غيره .

٣٠٧٥٤ - وَطَمُونِيَّة
هي الواسونيا ، اطلها .

٣٠٧٥٥ - وَطَنَ
راجع بده .



وطار



وطانة

٣٠٧٥٦ - وَطَاط

Chauve-souris (F).

Bat, Fliettermouse (E).

اسم شامل عام يطلق على جميع حيوانات رتبة عثحات الادي.

٣٠٧٥٧ - وَطَاطَة

سمكة بحرية تسمى شفين العمق ، اطبا .

٣٠٧٥٨ - وَطَاطِيَّات

Pteropodidae (S).

Pteropodidae (F). Pteropodidae (E).

فصيلة من الرطالوط . اجناسها ٨ وانواعها ١١٠ جميعها ثامرة ، كبيرة ومتوسطة القد . تتميز بقوق أذنبا البوقي الشكل . انثاها تضع جرراً واحداً تحمله دائماً وترضعه في انثاء طيراتها . اما اجناسها الثانية فهي : الحير ، الحيرس ، الرذاعة ، السرحاب ، السطوم ، الشقاعة ، اللثانة والساعة . (اطباها في مواسمها) .

٣٠٧٥٩ - وَطِيب *

Isocardia (S).

Isocardia (F). Isocardia (E).

جنس حيوانات بحرية من فصيلة الطيريات ورتبة الرغويات صفيحات الخياشيم والارجل . انواعها المعروفة عديدة اطاحتها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . اصداها شبه قلبية الشكل معتدلة الحجم او صغيرة ، مائسة الصفة او خافتة التخليد التحيل ليلها غشاء ليفي المادة دقيق تعيش في رمال وامحار مصبات الانهر .

٣٠٧٦٠ - وَطِيبَة

Utricule (F). Utricule (E).

تجويف كالغرة يوجد في جذوة الطلع يستوعب المادة الغضبية .

٣٠٧٦١ - وَطِيبَة

Assise du mur (F).

وطيبة ج ومالدة : هي قواعد البنيان أي اساسه .

٣٠٧٦٢ - وَطِيبَة

حياء الاثنى من ذوات الحافر .

٣٠٧٦٣ - وَطِيب

Canon (F). Shin (E).

عضو من قوائم أخيل وهو في الفرس بين الركبة والحوشب في القانتين الاماميتين ، وبين المرقوب والحوشب في القانتين الخلفيتين .

٣٠٧٦٤ - وَهَاء

Vaisseau (F). Duct (E).

هو الانبوب الكائن في نسج النباتات الزهرانية ، وهو يتبع على اشكال مختلفة اشعيها الحلزوني والشبكي والمفقط .

وهاء حلزوني

Vaisseau spirale (F).

Spirally duct (E).

وهاء شبكي

Vaisseau réticulé (F).

Reticulated duct (E).

وهاء منقط

Vaisseau ponctué (F).

Punctuated duct (E).

٣٠٧٦٥ - وَهَات *٥

Melyris (S).

Mélyris (F). Melyris (E).

جنس حشرات من فصيلة الوريانيات ورتبة غديات الاجنحة اتواها المعروفة نحو ٣٠ اطاحتها معظم مناطق حوض البحر الابيض المتوسط . اجناسها شبه اعليجية الشكل ، معتدلة الاسديباب ، طولها من ٨ الى ١٦ م . رؤوسها مستترضة ، قليلة التشوؤ . عيونها صغيرة ، بارزة .



رطب



وهات

تأثيرها وملاسها نظامية . قرونها الاستشعافية قلادية . كواسلها مقيبة الشكل . احماها لاسفة ، ثنائية الفلوع الناشرة القاطية . قوائمها نشيطة . ائوئها ملونة تكثر فيها الحرة والصمحة . جميعها وائمة ومفترسة تعيش على رقيق الازهار وما تقتنصه من صغير الحشرات . يرقاتها مفترسة .

٣٠٧٦٦ - وَهَاتِيَّات *

Melyridae (S).

Mélyridae (F). Melyridae (E).

فصيلة حشرات من غديات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد . اطاحتها بعض مناطق افريقية الشالية وبعض البحر الابيض المتوسط . اجناسها شبه اعليجية الشكل ، طولها من ٩ الى ١٨ م . رؤوسها مستترضة ، قليلة التشوؤ . عيونها صغيرة ، بارزة . تأثيرها وملاسها نظامية . قرونها الاستشعافية قلادية ، مركبة من ١١ فصلة . كواسلها مقيبة . احماها لاسفة ، ثنائية الفلوع القاطية ، قليلة الرخافة ، معتدلة الصلابة . قوائمها نشيطة . ارساها خماسية المعقل . ائوئها ملونة . جميعها وائمة ومفترسة ، تعيش على رقيق الازهار وما تقتنصه من صغير الحشرات . يرقاتها مفترسة . اشهر اجناسها الوصات .

٣٠٧٦٧ - وَهَاط

Rosier jaune (F).

هو الوردة الاصفر ، اطبه .

٣٠٧٦٨ - وَهَاتِيَّات البُذُور

Angiospermes (F).

Angiospermes (E).

وهاتيات البذور او مستورات البذور او النباتات مغطاة البذور هي احد قسمي باديات الزهر . وهذا القسم يشعل النباتات التي تكون بيضغها في مبيض ويزدها في غمرة .

٣٠٧٦٩ - وَهَاتِيَة

Vascularisation (F).

تغير فيزيولوجي ، راجع قَسَوِيَة .

٣٠٧٧٠ - وَهَب

Terrain plat et vaste (F).

الموضع الواسع المستقر من الارض ، ج وهاب .

٣٠٧٧١ - وَهَت

Epiphytis (F). Epiphyty (E).

وهوت النبات : علها واصحابها في منطقة معينة .

٣٠٧٧٢ - وَهَتَة

Coleosporium (S).

جنس فطور مجهرية من فصيلة الوشيات يتميز بانثاده المتراكبة المتشابهة وبدعاماته الاسطوانية المستطيلة الدقيقة القاعدة . انواعها قليلة تنطفل على نباتات الفصيلة الصنوبرية فتركب الاهداب وكؤفاها . مظهرها الخارجي بطور مستترضة مبرزة متفرقة لونها الى الجؤرة يبيضها اطار بنفسجي ، تثبت على التنصل نحو السنة ثم تنطور بعد ذلك الى حوصيلات ملطحة القاعدة العريضة ، مستديرة القمة ، طولها من ١ الى ٢ م . لونها الى البياض التي يرضع منها عند اكمال دورها الفطري وبعد انتاجها نقطة من الراتنج . اغزارها زهيدة لا تستوجب للمكافسة .

٣٠٧٧٣ - وَهَاتِيَّات *٥

Coleosporiaceae (S).

Coléosporiacées (F). Coleosporiaceae (E).

فصيلة فطور مجهرية من رتبة الدعاميات تتميز بركائياتها التي تحضن الدعامات ، دعائياتها عمودية الانغلاق ، رباعية الانحية ، شمعية الانقسام ، غليظة الجراب البوقي . اجناسها قليلة ، اعزها الوهة والسبع .

٣٠٧٨٣ - وَعَلَّ المَصْرِي الهَارِي*

Dactylopius adonidum (S). Pou blanc des serres (F).
حشرة صغيرة من القرميزات. محارية الشكل، صفراء اللون، مركزية السرة، غبرار الرأس الشمعي. تركيب نباتات المصاري وقنفذ بها.



وعف التين

٣٠٧٨٤ - وَعَلَّ صَيْتِي

هو قمرزية فوريوزا، اطلبها.

٣٠٧٨٥ - وَعَلَّ مَعَارِي

هو قمرزية التفاح، اطلبها.

٣٠٧٨٦ - وَعَلَّ ، وَعَلَّ ، تَيْسَ الجَبَلِ

Bouquetin (F). *Steinbok* (E).
جنس حيوان بري جبل. يجتر من فصيلة التيتيات. قريب الشبه من الماعز التي تحدثت عنه. أنواعه عديدة، جميعها ريمة الجثة، كبيرة القرون الفليطة المنحنية القوية. الانثى ثنائية الاختلاف تضع جنيناً واحداً في أواخر حزيران يتبع أمه بعد الوضع بثلاث أو أربع ساعات || اعرف أنواعه وأشهرها : أوبل واليند والتيتيل والماغور والميرز. ج اوماك وويل.



وعف المصري البطل

٣٠٧٨٧ - وَعَلَّ أُرُوبِي * ، وَعَلَّ الألب

Capra ibex (S). *Bouquetin des Alpes* (F). *Steinbok of the Alps* (E).

نوع من الوعل. موطنه جبال الألب. جسمه ربع الجثة مسنوب القالب بطول ١٥٠ سم. يعلو نحو ١٠٠ وزن ٧٥ من ١٠٠ كيلو. لونه سوي اللون يخطف مع العمر ربع ضلي الصيف والشتاء. وهو أرواح بين الشبهة الصنابية والصمرة. خط ثيابه أكهب اللون. ابتلاء وبطنه أبيض من ظهره. قرواه ضليخان منحنيان كسيفين أحدين. الأنثى أصغر قرناً من الذكر.

٣٠٧٨٨ - وَعَلَّ القَفَقَاس ، ثُرُ

Capra cylindricornis (S). *Bouquetin du Caucase, B. à cornes cylindriques, Tur* (F).

نوع من الوعل قريب الشبه من الغنم. موطنه جبال القفقاس. طولك يراوح من ٦٥ إلى ٦٥ سم. وأرقلاته كذلك. قرنه يطول نحو ٦٠ سم. وهو يشبه قرن الكبيش شكلاً وأمتداداً. ثوبه إلى الكعبة، لحته قليلة الشعر سواد اللون. إجله يعد من ٦ إلى ١٠ أرواح.



وعف المصري الهاري

٣٠٧٨٩ - وَعَلَّ حَبْتِي

Capra wail (S). *Bouquetin d'Abysinie* (F).
نوع من الوعل. موطنه جبال بلاد الحبشة من ارتفاع ٢٠٠٠ إلى ٤٠٠٠ م. وهو صغير الجثة أحسن القرن محدب الجبهة. إجله يعد من ٧ إلى ١٥ زوجاً.

٣٠٧٩٠ - وَعَلَّ سَيِّيرِي

Capra sibirica (S). *Bouquetin de Sibirie* (F).
نوع من الوعل. موطنه شاسع الأطراف يمتد من حلايا إلى شرقي سيبيريا. جسمه كبير القند قدره قدر الوعل الأوروبي إلا أنه أفتح لوناً وهو كحيث البقية مستطيل القرن. إجله يعد من ١٢ إلى ٢٠ زوجاً.



وعف أروبي

٣٠٧٩١ - وَعَلَّ عَرَكِي

ويُدعى أيضاً وعل التوبة، هو البذن، اطلبه.

٣٠٧٩٢ - وَعَلَّ قَارِصِي

هو البزل، اطلبه.

٣٠٧٧٤ - وَعَسَّ وَعَسَّ

Dryandra (S). *Dryandre* (F).
جنس جنيات أليفة معمرة من فصيلة القضييات. أوراقها لا نظامية الترتيب بها المتعاقبة والفصية والبمترية. أزهارها رويسية الجميع تحفظها قاذلة من القناب القروطي الشكل. اعرف أنواعه وأشهرها ما يتبع.

٣٠٧٧٥ - وَعَسَّ لَشَجِي

Dryandra nives (S). *Dryandre blanc de neige* (F).
نوع من الوص، جنيته تملو نحو ١٠٠ سم. أرونها مادة. فروعها قصيرة عقدة. أوراقها مفصصة، نصلها بطول من ١٠ إلى ٢٠ سم. مسحة السفل خلية البشرة فضية اللون. رؤوسها الزهرية بيضيه الشكل. أزهارها بيضاء اللون، قناباتها خلية البشرة حنطية اللون والمواج. ثمره يستمر من آذار إلى أيار.

٣٠٧٧٦ - وَعَسَّ قَاعِير

Dryandra formosa (S). *Dryandre magnifique* (F).
نوع من الوص، جنيته تملو نحو أربعة أمتار، ساقها عقدة. فروعها أطرونية منتصبه مستطيلة. أوراقها ضيقة متراكبة، نصلها ضيق الصفحة بطول من ١٢ إلى ٢٠ سم. ويعرض من ٦ إلى ٨ سم. رؤوسها الزهرية بيضيه الشكل. أزهارها برتقالية اللون، قناباتها حر || ثمره يستمر من أيار إلى تموز.

٣٠٧٧٧ - وَعَسَّ كثير الزهر

Dryandra floribunda (S). *Dryandre multiflore* (F).
نوع من الوص، جنيته تملو من ١٠٠ إلى ٢٥٠ سم. ساقها قراء. فروعها لينة العود الخشن. أوراقها متعاقبة؛ نصلها اهليلجي الشكل، مسن الحافة، مائل البشرة على مسطحه. أزهارها صفراء اللون، قناباتها حنطية. ثمره يستمر طوال فصل الصيف.

٣٠٧٧٨ - وَعَسَّاء

الرملة البنية يصعب فيها المشي. ج وعاس وأوعاس.

٣٠٧٧٩ - وَعَسَّ أَرْجَوَانِي

هو قمرزية الحمضيات، اطلبها.

٣٠٧٨٠ - وَعَسَّ التَيْن *

Lepidosaphes minima, *L. conchyiformis*, *Mytilaspis minima* (S). *Cochenille virgute du figuier* (F).
حشرة صغيرة من القرميزات، جسمها كروي الشكل تلوها يراوح من ٢ إلى ٣ سم. ثوبها أبيض اللون، رتمها الشمسي قليل المادة والانتشار. جملها الحولي واحد. تمتع مكثاً بتدريجها فلول غير نبيان فينف من يرقات تبني انشلاخاتها في أواخر الصيف. ألقبها سوس البحر المتوسط. تركيب اثنين دين سواء تتوزده إذا كثرت لأنها تفتي الساق والأغصان.

٣٠٧٨١ - وَعَسَّ الحُمْضِيَّات

هو قمرزية الحمضيات، اطلبها.

٣٠٧٨٢ - وَعَسَّ المَصْرِي المَبْطُط *

Eucalymnatus tessellatus, *Locanum tessellatum* (S). *Cochenille plate des serres* (F).
حشرة صغيرة من القرميزات، جسمها بيضي الشكل مبطط يعطون من ٣ إلى ٤ سم. ويعرض نحو ٢. ثوبها إلى البني الاسمر. أطرافها غبرار اللون مسنة، جانباها شامغان. تركيب مسطع نباتات المصاري اعصها التخليلات والسحليات.

Engraissement (F). **وَعْنَنٌ** - ٣٠٨٠٢

Fattening (E).

توسعت اللحم ولايقار : بلغت غاية السمن .

Lacérîte (F). **وَعْنَكَة** - ٣٠٨٠٣

شكل من التراب الصلصالي الاحمر اللون .

Latérítique (F). **وَعْنِيَّة** - ٣٠٨٠٤

صفة ائومة وهي التراب الصلصالي الاحمر اللون .

Chacal du Sénégal (F). **وَعْوَع** - ٣٠٨٠٥

رابع ابن آوى الافريقى .

٣٠٨٠٦ - **وَعَال**

البقال وكل ياتح يغلي ثمن الاشياء .

Aubergine (F). **وَعْد** - ٣٠٨٠٧

هو الباذنجان ، اطليه .

Imperméable (F). **وِلَاص** - ٣٠٨٠٨

Impermeable, Impervious (E).

الطافس : المكان يحسك الماء . والتربة الطافس هي التي تحفظ الماء ولا تسرب .

Eplucher (F). To pick (E). **وَقَلَّ** - ٣٠٨٠٩

وقل وقول الشيء : قشره فهو واقل .

Philodendron (S). **وَقِيل** - ٣٠٨١٠

Philodendron (F).

الواحدة وقيلة . جنس نباتات جلدورية مادة معمرة من فصيلة التوتليات . انواعها المعروفة نحو ١٠٠٠ منها نباتات بعض مناطق البلاد الاستوائية اغصنها امريكة الجنوبية || بعضها جلدورية مادة . اوراقها متعاقبة ، متفكة ، كبيرة القذ ، شبه قلبية الشوزن ، جامدة التصل الغرض والمشرم . ازهارها ملطمة كما في النخل . ازهارها شديدة الصفرة ، عريفة ، مستحبة الازيج || تزروع التزين في المراكن داخل المساكن .

Exatbuminé (F). **وَقِين** - ٣٠٨١١

نعت تعريفى يطلق على كل بذرة او ثفلط عادم الراح اي الابوين .

Crl de la pie-grièche (F). **وَقِيَّ** - ٣٠٨١٢

الوق هو صباح الصرد .

Chronomètre (F). **وَقَات** - ٣٠٨١٣

Chronometer (E).

جهاز بسيط دقيق الصنع يستعمل لتحديد الوقت الذي استرجيه العمل المطلوب .

Chronométrie (F). **وَقَاتَة** - ٣٠٨١٤

Chronometry (E).

Combustible **وَقَاد** - ٣٠٨١٥

ما توقد به النار ، اطلب وقود .

Certhiola (S). Certhiote (F). **وَقَال** - ٣٠٨١٦

جنس طير من الجولثم ريقات الخاتير وفضيلة المغريات . انواعها المعروفة نحو عشرة منتشرة في معظم المناطق الحارة . اغصنها امريكة الجنوبية || اجسامها مخططة القذ .

Commelina (S).

Commeline, Commelyne (F). Blue spiderwort (E).

Commeline (D). Commelina (I).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة البولانيات . انواعها زهاء ٨٠ منظرها يري وبضها طيب وزينى . سوقها منتصبة او مدادة . اوراقها لا قياسية الشكل تكثر فيها الاستطالة . ازهارها لا نظامية التجميع ، سوية الالوان تلب فيها الزرقاء || اعرف انواعها واشهرها ما يتبع .

٣٠٧٩٤ - **وَعَلَّانُ الْجَنَّةِ**

Commelina banghalensis (S). Commeline du Bengale (F).

نوع من الوعلان ، ساقه وفروعها مدادة تنصب عند اطرافها . اوراقه بيضبة مقطوعة ، تصلها الى الخضار الزاهي ، اعقادها موحدة بالاخر . ازهارها كثيرة العدد ، بتسجية اللون ، صبرية القذ || تنوره يستمر طوال فصل الصيف .

٣٠٧٩٥ - **وَعَلَّانُ سَيَّوِيَّ**

Commelina coelestis (S). Commeline céleste (F).

نوع من الوعلان ، قاعدة ساقه دوفضة الجئت المستطيل . ساقه فرعاء زياء تملو من ٣٠ الى ٥٠ سم . اوراقه لاطة اهليجية الشكل . تصلها خلى الصفحة العليا ، املط السفل . ازهارها الى الزرقاة السابحية ، قطرها يراوح من ١٥ الى ٢٥ م || تنوره يستمر من حزيران الى ايلول .

٣٠٧٩٦ - **وَعَلَّانُ فِيرَجِينَة**

Commelina virginica (S). Commeline de Virginie (F).

نوع من الوعلان ، ساقه منتصبة فرعاء تملو من ٥٠ الى ٩٠ سم . اوراقه سنائية الشكل ، تصلها جامدة الصفحة بطول من ٧ الى ١٣ سم . ازهارها الى الزرقاة المايقة الزاهية ، قطرها يراوح من ٢٠ الى ٣٠ م || تنوره يستمر من حزيران الى ايلول .

٣٠٧٩٧ - **وَعَلَّانُ مُنْتَصِب**

Commelina erecta (S). Commeline dressée (F).

نوع من الوعلان ، ساقه منتصبة قليلة الفروع تملو من ٤٠ الى ٦٠ سم . اوراقه محدبة ضيقة التصل تقول من ٨ الى ١٥ سم . وكعروض من ١٠ الى ٢٥ سم . تحملها خلى البشرة بطول من ١٥ الى ٢٥ سم . ازهارها الى الزرقاة الجسيلة ، قطرها يراوح من ١٥ الى ٢٠ م . || تنوره يستمر من آب الى تشرين .

٣٠٧٩٨ - **وَعَلَّانِيَّات**

Commelinaceae (S).

Commelinacées (F). Commelinaceae (E).

فصيلة نباتية من رسيديات الفلقة . اجناسها وانواعها عديدة مجمها من نباتات المناطق الحارة . اشهر اجناسها الوعلان والمكايبة والزبرية والطينيسيا .

Bouquetin femelle (F). **وَعِلَة** - ٣٠٧٩٩

Cow-bouquetin (E).

الوعلة اثنى الودل .

Gazelle femelle (F). **وَعْنَة** - ٣٠٨٠٠

Cow-gazelle (E).

الوعنة اثنى الغزال .

Fourmillière délaissée (F). **وَعْن** - ٣٠٨٠١

الوعن قرية النمل المهجورة . ج وعنان .



وعلان



وقيل



وقل

٣٠٨٢٧ - **وتسيتات** °
Gymnoscaecae (S).
Gymnoscaecés (F).
فصيلة تطور مجهرية تنتمي الى مرتبة التفسيتات ورتبة الزقيات . تتميز بأوراق مرصاة تلحمها خلفة السن البين الموجه || أجناسها وأنواعها عديدة تصبها ثلاث عمارات: الترفيزات والتفليات والمجويات .

٣٠٨٢٨ - **وتف**
Wakf
هو سبب العين ورصد ريعها على الوقف وذريه أو من يوصيه .

٣٠٨٢٩ - **وتف**
Suspension
٣٠٨٣٠ - **وتف الأثر**
Surannation (F).
وقت أثر العقد المؤقت المفسول عند أجل ما إذا هو لم يحدد في حينه .

٣٠٨٣١ - **وتفيل** ° ، **كثيريوس**
Chamaerops (S).
Chamérops (F).
جس اشجار ليفية برية ورتبية من فصيلة النخلات . منها البلاد الحارة . أنواعها عديدة منهاها أسوي المنبت ومنها الأفرني والأمريكي . سوقها جالسة تملو من متر الى عشرة أمتار . أوراقها مدوارة ، كبيرة القد ، جميلة الخفسار ، مستطيلة الزناد || أشهر أنواعه الزينة ما يلي .

الوقل الخافض
Chamaerops humilis (S).
الوقل الشائك
Chamaerops hystrix (S).
الوقل الصلب
Chamaerops mardiana (S).
الوقل الفاخر
Chamaerops excelsa (S).
الوقل الكونشيني
Chamaerops cochinchinensis (S).
الوقل المنفوط
Chamaerops fortunei (S).
الوقل المنشاري
Chamaerops serrulata (S).

٣٠٨٣٢ - **وتفيل خافض** ، **مروحة**
Chamaerops humilis (S). Chamérops humble, Palmier éventail, P. nain (F). Dwarf palm, European fan-palm (E). Hanfpalme, Schirmpalme, Europäische Zwergpalme (D). Palma camerops, P. minore, P. femina (I).
نوع من الوقل لا ينش البرد العادي يعيش على نظم شطوط المتوسط . ساقه قصيرة . أوراقه مروحية جميلة الخفسار الزيني المروج . يزود الثوبين ويخرج من أوراقه الياف قوية تصلح لصناعة الحبال . يتكاثر بالبذر .

٣٠٨٣٣ - **وتفن**
Dénicher (F).
To take out of the nest (E).
وقن وأوقن : اخذ الطير من محاضها .

٣٠٨٣٤ - **وتفنة**
Nid (F). Nest (E).
الوقنة : محض الطائر دثن في الشجرة .

٣٠٨٣٥ - **وتوقاق** ° ، **توقاق**
Cuculus (S).
Cuckoo (F). Cuckoo (E).
جس طير من عمارة الوقواقيات وفصيلة الوقواقيات . أنواعه نحو ٧٥ منهاها متوسط القد قدوة قدر الحماة . ألوانها قريبة الشبه من ثوب الباشق مع ابدانه وريشه وحسن تبيجه . تألف الإحراج . قوا الحشرات . لا تحسن بيضها ولا ترق فراشها بل تضع بيضها غلطة في أوكان

منقادها مستطيلة . أغانها مستطيرة الأطراف . ألوانها جميلة الألوان الزاهية يكثر فيها الأحمر والأزرق البنفسجي المروج || قوا الحشرات وبعض الثار الباقية .

٣٠٨١٧ - **وقاليد**
Tablettes en pierre (F).
الوقاليد : الحجارة المفرشة في الخدائق والممرات ؛ وأسدما وقيد وقيدة .

٣٠٨١٨ - **وقاليد الدهوي**
Points de fâle (F).
في البيان بأحدها المتقابين والحوادث التي نشأت عنها الدهوي .

٣٠٨١٩ - **وقاية**
Prophylaxie (F). Prophylaxis (E).
في جماع وسائل الحمية والعناية الممكنة اتخاذها لئلا تال الأراض . راجع انتقاء واستراز .

٣٠٨٢٠ - **وقب** ، **حجاج العين**
Orbite (F).
Orbit, Socket (E).
في نقرة العين شبه هرية الشكل رياعية السطح . وما الثنات .

٣٠٨٢١ - **وقبة**
Orbitale (F). Orbital (E).
راجع مدارة .

٣٠٨٢٢ - **وقبي**
Orbital (F). Orbital (E).
راجع مداري .

٣٠٨٢٣ - **وقبيات** °
Arcifères (F). Arciferous (E).
لقة من مرتبة النسلات عديمات الذنب سليات الأسنان . أنواعها الممرقة كثيرة المدد جميعها خمس فصائل : الشرفيات والمجويات والصفاجيات والكدياميات والفكريات || تتميز جميع صفاد هذه اللمة بدم مسالوة سطح غليظ قويمها الصلدي في مركز تلافيا || أشهر صفاد هذه اللمة المعلوم والشرفوف .

٣٠٨٢٤ - **وقفر**
Charge (F). Load (E).
هو ثقل الحمل الذي يقع على اعمدة وقوف وجدران المباني . وهو يقسم الى ثقل ميت مستقر وثقل حي متروك . ونظراً لكثرة الدوامل التي تدخل في حسابه فالخير قد يكون :

وقر الكسر
Charge de rupture (F).
Breaking load (E).

وقر متحرك
Charge mobile (F).
Travelling load (E).

وقر مستديم
Charge permanente (F).
Permanent load (E).

وقر لامركزي
Charge excentrique (F).
Essentric load (E).

وقر منطرد
Charge isolée (F).
Concentrated load (E).

وقر موزع بالتساوي
Charge uniformément répartie (F). Uniformly distributed load (E).

٣٠٨٢٥ - **وقركة**
Cicatrice (F). Scar (E).
هي الأثر في الجسم من أي سبب كان . ج. وقرات .

٣٠٨٢٦ - **وقس**
Gale (F). Scab, Scurf (E).
اسم شامل يطلق على جميع أنواع الجرب التي تتركب الحيوان والنبات . ومن قاربه الجرب نهو مقوس وهي مقوسة .



وقل



وقواق

Curatelle (F). **ولاية** ، **قائمة** ٣٠٨٦٤
Guardianship, Trusteeship (E).
هي إدارة شؤون وأموال المجهور عليه .

٣٠٨٦٥ - **وَلَث** الولث هو القليل من المطر .

Herbes effluées (F). **وَلَع** ٣٠٨٦٦
الولع هو الشب المستطيل .

Lapement (F). **وَلَع** ، **وَلْعَان** ، **وَلْعُوع** ٣٠٨٦٧
Lapping (E). شرب السباح بالسنتها .

Vivipara (F). Viviparous (E). **وَلَوْد** ٣٠٨٦٨
مدلول التكاثر التسلل بالولادة ، بماكسها يبيض .

٣٠٨٦٩ - **وَلَوَل** ، **بُوسَة الأَطْلَال**

Otus ascalaphus (S). Hibou ascalaphe (F).
طائر من البوم ينتمي إلى عائلة البوميات ، موطنه إفريقية
الشالية ويبيض مناطق حوض البحر المتوسط . جسمه
صغير فقد يطول نحو ٣٠ سم - ثوبه أبيض من ثوب البومة
وأكتف برفقة . يألف الأطلال والاحراج ولا يقرب إلا ما كان
الأكلة إلا عند سبب الحاجة . ينس قوته في الليل . يصيد
جميع أنواع القوارض والحشرات .

٣٠٨٧٠ - **وَكِسْتَكِيَة** هي رشع الماء ، اطلبه .

Pollen **وَكِين** ٣٠٨٧١
هو الصلح ، اطلبه .

Pollinique (F). Pollinic (E). **وَكِينِي** ٣٠٨٧٢
اطلب طلي .

Braula coeca (S). **وَمَاشَة النَّحَل** ٣٠٨٧٣
حشرة راشنة مؤذية من فصيلة الباشيات ورقة ذوات
الجناسين || جسمها شديدة الصغر يطول نحو ١ سم . تعيش
كامل حياتها الحشرية معلقة بالنحل || مكثها شديدة
الصغر تحتمل الاثنى فرداً في الخلاء فيقتف من يرقاات
متناحية الصغر والذقة تعيش على السكر الفزون والتخاروب .

Braulidae (S). **وَمَاشِيَات** ٣٠٨٧٤
Braulidae (F). Braulidae (E).

فصيلة حشرات راشنة مؤذية من رتبة ذوات الجناسين .
لها ثوبان يصعبها جنس واحد || اجسامها صغيرة ، صلبة ،
شبه بيضيه الشكل ، تطول من ١ إلى ١.٥ سم . رؤوسها
صغيرة ، مبطلة . حيرتها دقيقة فائقة . قربها الاستعمارية
صغيرة ، قصيرة ، ثلاثية الفصل . كوالسها وبطنها
متناسقة . وهي عادمة الجناح والزراان . قوائمها قوية ،
مشعبة الاطراف || اشهرها وماشة النحل .

Asterocystis (S). **وَمَحَة** ٣٠٨٧٥
جنس فطور مجهرية من فصيلة الصمغيات . تكاثرها
لاشي . تتميز بنمطها البيضي المستطير الشكل المدمر للرباط .
تنقل على عدة نباتات زراعية فتركب جلودها وتؤذيها
وقد تميتها .

Asterocystis radialis **وَمَحَة الجُدُر** ٣٠٨٧٦
نوع من الفطيرة تركب جلود بعض النباتات اخصها
الكتان والسلمج واللفت والنس والكرات والشوان والفتن

Partade (F). Pairing (E). **وَكَم** ٣٠٨٥٧
الوكع هو مفاد الطيور الالهية . واكم انديك السباحة :
سبحها . وكمت الحاملة والباطة : خضمت لسفاد الذكر .

Vice (F). Defect, Viciousness (E). **وَكُف** ٣٠٨٥٣
هو العيب الظاهر في الشيء . ج اوكاف .

٣٠٨٥٤ - **وَكَن**
الوكن والوكنة : هي محض الطائر في حضر او جدار .

Menon (F). **وَكِين** ٣٠٨٥٥
الكيش او الشاة تلبها النعم .

Mandataire (F). Mandatory (E). **وَكِيل** ٣٠٨٥٦
هو من استأنت آله الوكالة .

Régisseur (F). **وَكِيل** ، **جَرِي** ٣٠٨٥٧
Manager, Bailiff (E).
هو الذي يدير المزرعة ويقوم بشؤونها بدلاً من صاحبها .

Contramaître (F). **وَكِيل** ، **مَحُولِي** ٣٠٨٥٨
Overseer, Foreman (E).
هو رئيس العمال في ورشة مينة .

٣٠٨٥٩ - **وَكِيل التَّكْلِيْسَة** ، **مُتَدَبِك**
Syndic de faillite (F). Syndic of bankruptcy (E).
هو الوكيل القانوني من كلمة الدائنين ويصيره القانون
وكيلاً ايضاً عن للمفسر ليدبر امواله ويصلحها .

Macropus (S). Wallabee (F). **وَلَاب** ٣٠٨٦٠
جنس حيوانات لبونة عاشية من فصيلة القنقرات .
انواعه المعروفة نحو ١٢ موطنها استرالية وتبانية . تألف
الاجام واللبايس والادخال . ملجئها الحيائي جماعي ||
اجسامها مستدلة القدر تطول من ١٦٠ الى ١٨٠ سم .
فيه الذئب الذي يطول من ٦٠ الى ٧٠ سم . انثواها الى
الطبعة المتفاوتة السمرة . انثاها رباعية الاغلاف ||
اعرف انواعه واشهرها :

Wallabee à cou rouge (F). **ولاب احمر العنق**
Wallabee à queue noire (F). **ولاب أسود الذئب**
Wallabee agile (F). **ولاب رشيق**

Mise bas (F). **وَلَادَة** ٣٠٨٦١
هي الوضع أي خروج الجنين من رحم الانثى في نهاية
مدة الحمل .

Parthenogénèse (F). **وَلَادَة العَدَكْرَى** ٣٠٨٦٢
Parthenogenesis (E).
هي الولادة التي لم يستيقها كرم ؛ فقد تحصل في بعض
الحشرات منها الارق .

٣٠٨٦٣ - **وَلَانَة**
Aveliata (S).
Aveliata (F). Aveliata (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مليات الازدجل
وفصيلة الجبيديات . انواعها المعاصرة المعروفة قليلة العدد
منتشرة في بعض بحار البلاد المحيطة بالحرارة وأخصها البحر
الابيض المتوسط . تألف الشطوط الحسبة والربلية .
اصداؤها بتدقيق الشكل واللقد ، مستديرة الفموة الثلاثية
الاسنان . مالة الصفة المستدلة الساكة ، الجسدية
الالوان الزاهية ، يكثر فيها الجلودى .



ول

للاستعمال إلا بعد مرورها بعدة مراحل تحضيرية وتغييرية تستلزم الوقت الطويل الذي يراوح من ٨ إلى ٩ أشهر .

٣٠٨٨٩ - وَكِيلِيْن Vanilline (F). Vanillin (E).
عطر الزبالية يستخرج من الثَّار التي تحوي ما يقارب ٢٪ من وزنها .

٣٠٨٩٠ - وَكِيْمَكَة Sclérote, Stroma (F).
مشيمة نباتية سلبة المادة تتكون من بعض الفطور فتضخمها وتقوِّمها . ج . وُم .

٣٠٨٩١ - وَهَاجَة Photomorphose (F).
Photomorphosis (E).
الوهاجة تأثير الضوء على النمو والانتشار عند الكائنات الحية .

٣٠٨٩٢ - وَهَانَة Sénescence (F). Senescence (E).
هو التور الذي يسبق الذبول في النج الحية أن سيولانية أو نباتية .

٣٠٨٩٣ - وَهَجِيْكَة Photologie (F).
Photology (E).
الوهجة علم يبحث في وهج الضوء ونواتبه ومطابقته .

٣٠٨٩٤ - وَهْد Terrain bas, encaissé (F).
الوهد والويدة : الأرض المنخفضة أينما كان مؤدها .
ج . الوهد ووهدان يروها .

٣٠٨٩٥ - وَهْر
الوهر : توهج وقع الشمس على الأرض حتى ترى له اضطراباً كالخباز .

٣٠٨٩٦ - وَهْص Emasculation
هو انتزاع الخصيتين لانسداد عمل التناسل في ذكر الحيوان .
الناية منه حث الحيوان على التوحيث .

٣٠٨٩٧ - وَهْط Bocage (F). Copse, Basket (E).
غابة صغيرة ظليلة وكل حرجية من عسر .

٣٠٨٩٨ - وَهْف Feuilleage (F). Foliage, Leafage (E).
جاء أوراق الشجرة .

٣٠٨٩٩ - وَهَق Lasso
هو حبل في طرفه انشطة يطرح في حقل الناية للقبض عليها . يقال صاده بالوق . ج . أرقاق .

٣٠٩٠٠ - وَهْلِيْبَرْجِيْكَة Wahlenbergia (S).
Wahlenbergia (F). Wahlenbergia (E).
جنس نباتات عشبية حولية أو معمرة من فصيلة الجريسيات .
كسما وأوراقها متباينة الأشكال والاحجام . أزهارها مختلفة الألوان ، يكثر فيها الأزرق || أنواعها المعروفة عديدة ، أشهرها التالية .

٣٠٩٠١ - وَهْلِيْبَرْجِيَّة صَعْبَرِيَّة الزَّرَق Wahlenbergia serpyllifolia (S).
Wahlenbergia à feuilles de serpolet (F).
مهدا البلقان . ساقها قصيرة تملو نحو ١٠ سم . أوراقها

والفصاة || مظهرها الخارجي يقع كستنية اللون مستطيلة الشكل تنشق الجلود عند انتشارها . وعند تفتح شراها تطب الأوراق وتسبب يباسها .

٣٠٨٧٧ - وَمَكَة الورد والويدة : شدة حر الليل .
٣٠٨٧٨ - وَمَسَّ ويس وروس المسب : لأن وقرب النضج

٣٠٨٧٩ - وَمِيْش Fulguration (F). Fulguration (E).
لثمان كالبرق يظهر في الطبقات العليا من السحاب لا يقبه رعد .

٣٠٨٨٠ - وَنْشِير * Winters (S). Wintère (F).
جنس نباتات برية وتربينية من فصيلة الونثريات .
أنواعها المعروفة خمسة . جميعها جنبات معمرة فراء .
أوراقها معتقة ، جامدة النصال السنائية الشكل ، الجسيلة الخضراء اللامس . أزهارها ساجلة ، كبيرة ، خاسية أنبيلات الملوثة ، مهددة الأسدية الصفراء اللون || تنويرها يستمر طوال فصل الصيف .

٣٠٨٨١ - وَنْشِيرِيَّات Winterraceae (S).
Wintéracées (F). Winterraceae (E).
فصيلة نباتية من فوات الفلفتين مستقلة الفصالات .
اجناسها وأنواعها المعروفة قليلة الممد أعطائها جزر الزايج ||
جميع نباتاتها شجيرات ونباتات فراء . أوراقها معتقة ، متعاقبة ، نصالها سنائية جامدة . أزهارها عشكولي التجميع ، طرفي الارتكاز . أزهارها كبيرة جميلة القالب ملونة || أشهر اجناسها الونثير .

٣٠٨٨٢ - وَنْس هو المفاس للتعرج ، اطليه .

٣٠٨٨٣ - وَنْكَ وَنْكَ حَقْنٌ Couver (F).
ونك الطائر : حقن الأبيض .

٣٠٨٨٤ - وَنْكَا هي القضاة ، اطليه .

٣٠٨٨٥ - وَنْكَه وَكِيْم سلع اللذاب .

٣٠٨٨٦ - وَنْكَه وَنْكَه Vanille (F). Vanilla (E).
فم الزبالية وهي حل شكل سفة مستطيلة يستخرج منها عطرها المشهور الشائع الاستعمال .

٣٠٨٨٧ - وَنْكَه وَنْكَه Vanilla (S).
Vanillier (F). Vanilla-plant (E).
جنس نباتات مدادة عارضة من فصيلة السعليات .
أنواعها عديدة ، أعطائها المناطق الحارة ، مطمها بري وبعضها رَبي وسماحي || أشهر أنواعها الزراعية الزبالية المنسطة الورق .

٣٠٨٨٨ - وَنْكَه مَنَسَطَة الزَّرَق * Vanilla planifolia (S).
Vanillier commun (F). Common vanilla-plant (E).
Echter Vanille (D). Vaniglia, Vanigliero (I).
أشهر أنواع الزبالية وأهمها زراعة . جنبها قصفة مازحة متقلبة .
سواقلها مدقة متعاقبة متقلبة منسطة الصفحة قليلة النصل .
سواقلها دقيقة مستطيلة تقابل الأوراق . أزهارها متفردية التجميع محوري الارتكاز . أزهارها كبيرة القند عطرية المرف . ثمارها سقية الشكل مستطيلة لا تصلح



ونثير



زبالية منسطة الورق



وهلبرجة

۳۰۹۰۶ - وَهَيْجِيَّةٌ ٥
Faculaire (F).
نمت منسوب الى وهيجة الشمس .

۳۰۹۰۷ - وَئِكْلَر ٥
Carrière de terre glaise (F).

Quarry of clay (E).
هو محفر الطين الذي تلاط به الحياض وفيها منشا لمرشح الماء .

۳۰۹۰۸ - وَجِيَّة ٥
الويه طائر يعرف بالطيطوى الخيسال ، اطيه . وهي ايضا نبات غزام الصباغين .

۳۰۹۰۹ - وَئِج ٥
Age de la charrue (F).
Plough-beam (E).
هو سلب المحراث الجامع لساثر ايجزاله .

۳۰۹۱۰ - وَئِرَاكُونِيْن ، وَئِرَاكُونِيْن ٥
Vérastine (F).
Verastine, Verastria (E).

مادة نباتية شبه قلوية تستخرج من بلور الحريق الابيض . تستعمل طبياً ضد الحيات والانهابات .

۳۰۹۱۱ - وَئِشْدِيَّةٌ ٥
Wigandia (S).
Wigandie (F). Wigandia (E).

نبات معقود الثريف عل اسم الطبيب « وئشد » . بجلة معمرة وسيدة الجنس والنوع من فصيلة التجمجات . مهدها بعض مناطق بوليفيا || بجلتها تملو نحو ثلاثة امتار . ساقها قليلة الفروع متكاثفة الغماء الجماء الشائك . اوراقها متعاقبة ، معتقة ، متعوجة النصال الكبيرة التي يبلغ طولها نحو ٩٠ سم . ويرضها نحو ٥٠ سم . صفحتها العليا الى الخضار البحري . صفحتها السفلى كثيفة الحمل ، فضية اللون || ازهارها مستقيمة قرق . ازهارها كبيرة ، عقرية الشكل ، بنفسجية اللون ، خليصة التويج || تنويرها يستمر طوال شهر نيسان .

۳۰۹۱۲ - وَئِنْ ٥
Raisin noir (F). Black grapes (E).
هو العنب الاسود اللون من اي ضرب كان .

كأوراق الصنوبر تملو نحو ٢ سم . نصالها خالية فضية الملاج . ازهارها بنفسجية التويجات ، حر الكلوس ، قطرها يراوح من ٢ الى ٣ سم . || تنويرها يستمر طوال فصل الصيف .

۳۰۹۰٤ - وَهْلَنْبَرْجِيَّةٌ عَشَقِيَّةُ الْوَرَقِ ٥

Wahlenbergia hederacea (S).
Wahlenbergia à feuilles de Herre (F).

منبتها يمتد من الشرق الاذن الى اوروبا ، يكثر وجودها في المناطق ومن الصفات الرملية . ساقها نجيلية مستقيمة تملو نحو ٣٠ سم . اوراقها كأوراق المشقة شكلها وقعا . ازهارها فردية ، مستقيمة المالحق ، زرقاء اللون ، قطرها من ٢ الى ٤ سم . || تنويرها يستمر من حزيران الى تشرين الاول .

۳۰۹۰٣ - وَهْلَنْبَرْجِيَّةٌ عَصَلِيَّةٌ ٥

Wahlenbergia graminifolia (S).
Wahlenbergia à feuilles de graminées (F).

مهددا يمتد من البلقان الى حوض البحر الابيض المتوسط . ساقها تملو من ١٥ الى ٢٠ سم . اوراقها صفية الشكل كأوراق النجيليات وتملو نحو ١٦ سم . ازهارها زرقاء اللون ، قطرها نحو ٣ سم . || تنويرها يستمر من حزيران الى آب .

۳۰۹۰٤ - وَهْلَنْبَرْجِيَّةٌ كِرَوَاتِيَّةٌ ٥

Wahlenbergia croatica (S).
Wahlenbergie de Croatie (F).

مهددا كرواتية ودلاسيه . ساقها تملو نحو ١٠ سم . اوراقها سنانية خفيفة تملو من ٣ الى ٥ سم . ازهارها بنفسجية التويجات والكلوس ، صغيرة القد ، قطرها نحو ٢ سم . || تنويرها يستمر طوال فصل الصيف .

۳۰۹۰٥ - وَهَيْجِيَّةٌ ٥
Facule (F). Facula (E).

الويجة بقعة اكثر تأجباً ولعناً من غيرها في القراص الشسي . ج وهائج .



وئشدية



ي

٣٠٩١٨ - ياسم ، قعّو ، وثاليفة ، نَوَّار أُنْبُض

Ligustrum (S). Troène, Prûne, Bois noir (F). Privet, Privy, Prim (E). Gemeiner Liguster, Liguster, Gewöhnliche rainweide (D). Ardivela, Baclare, Ligustro, Lamitra, Rovistca, Olivella, Mimolo (I).

جلس نباتات برية وريضية من فصيلة الزيتونيات . انواعه نحو ٢٠ معظمها بري وبعضها زريسي . نباتاتها مختلفة الاحجام منها الشجيرات والجنبايات والجنبايات . سوقها فراء فناء . اوراقها منقطة متقابلة ابيدة صغيرة النصل اهليلجية الشكل . ازهارها مستحبة العرف صغيرة القذ متكررة التجميع تاجية الارتكاز او هامة || تزرع في الحدائق والبساتين لتسييج وحل جوانب الممرات . وهي سهلة الانقياد تأخذ جميع الاشكال المطلوبة وتصلح لصد الرياح حتى ارتفاع ثلاثة اشر || اشهر انواعه الزيزينية ما يتبع .

٣٠٩١٩ - ياسم بيضي الورق

Ligustrum ovalifolium (S). Troène à feuilles ovales (F).

جنية صغيرة القذ فناء . اوراقها بيضية الشكل عابلة ، نصلها جميل الخضار الاصفر المواج . تكثر زراعتها في المراكن وفي الحدائق المرتبة المصممة الاشكال والالوان . تتكاثر بالتعجيل .

٣٠٩٢٠ - ياسم صيني

Ligustrum sinensis (S). Troène de Chine (F).

شجيرة سريضة فناء تملو نحو ٤ اشر . تصلح للزئين ولصد الرياح . اوراقها ابيدة ، نصلها سناني الزام الاخير ، جميل الخضار المايق || تتكاثر بالتعجيل وبالبرور .

٣٠٩٢١ - ياسم صيني الورق

Ligustrum angustifolium (S). Troène à feuilles étroites (F).

جنية متوسطة القذ تملو نحو ٢٥٠ سم . ساقة فناء . اوراقها

Hortensis (F).

٣٠٩١٣ - يابانية

نبات زريسي يدعى ايرلسيا ، اطلبه .

Baoris zelleri (S).

٣٠٩١٤ - ياروؤ الأوز

حشرة من الحسيريات ، فراشها صغيرة القذ تطول نحو ٣٠ م . لونها ال الي الزبي المواج . وراشها الامامية مبقعة بالابيض . وراشها الخلفية خطية اللون برتقالية المواج || يكثر وجودها في الربيع والصيف . رقاتها تنقف حل صف الازرق فتلهم النصال وتؤدي النبات .

Adopaea ectaeon (S).

٣٠٩١٥ - ياروؤ المزكي

حشرة من الحسيريات ، فراشها تطول نحو ٢٨ م . جسمها مردي الشكل كسني الثوب . وراشها خطية اللون زيتية المواج زهو في الذكور وتبقى في الاناث || يكثر وجودها من حمز ال آب . رقاتها تركب الزروع والمراعي فتؤذيها اذا كثر عددها .

Adopaea lineola (S).

٣٠٩١٦ - ياروؤ التجليات

حشرة من الحسيريات فراشها صغيرة القذ تطول نحو ٢٦ م . في الذكور والانات . جسمها مردي الشكل كسني الثوب . وراشها برتقالية اللون خطية الحنار والتسليج . يكثر وجودها من حمز ال آب . رقاتها تركب صف النجيليات فتؤذيها .

Termite famella (F).

٣٠٩١٧ - ياروؤش

She termite (E).

هي الارضة الانثى الكاملة الاعضاء التناحلية . وظيفتها منع المازن لاستمرار وجود الرمية .



ياروؤ الارز



ياروؤ المزكي



ياروؤ التجليات

عروة. نصلها ضيق الصفحة، أخضر اللون، جوي الملمح. تتكاثر بالتعقل وبالبزور.

٣٠٩٢٢ - ياسمين كثيف الورق

Ligustrum compactum (S). *Troène compact* (F).
جنية زيبية صغيرة القد كثيفة الأوراق. أوراقها دائمة
أهليلجية الشكل، نصلها جبل الخضار المبين || تتكاثر
بالتعقل وبالبزور.

٣٠٩٢٣ - ياسمين معروف

Ligustrum vulgare (S). *Troène commun* (F).
جنية سبروتية شامة الاستعمال التزييني. ساقها فرعاء فناء.
أوراقها أبيضه أهليلجية الشكل مدهبة الطرف، جميلة الخضار
القائم الجوي الملمح || تتكاثر بالتعقل وبالبزور.

٣٠٩٢٤ - ياسمين ياباني

Ligustrum japonicum (S). *Troène du Japon* (F).
جنية سبروتية شامة الاستعمال التزييني ولصده الرياح.
ساقها فرعاء فناء تملو نحو ثلاثة أمتار. أوراقها أبيضه
نصلها أهليلجي الشكل، لسن الزام الأخير، أخضر اللون.
فستى الملمح || تتكاثر بالتعقل وبالبزور.

٣٠٩٢٥ - ياسمين

هو الياسمين، اطلبه.

٣٠٩٢٦ - ياسمين * ياسمين

Jasminum (S). *ياسمين* (S). *Jasmin* (D). *Gelsomino* (I).
جنى نباتات ممرية وزراعية من سبط الياسمينيات
وفصيلة الزيتونيات. أنماؤه زهاء ١٠٠ منظرها بري
وبعضها زراعي تزييني وصناعي || ساقها فرعاء عارضة.
أغصانها جالسة الالتصاف. أوراقها متقابلة مركبة، وريقاتها
لا قياسه التجميع والشكل. أزهارها جميلة المنظر خفيفة
اللون يكثر فيها الأبيض ثم الأصفر والآخر. بعضها
فولح العرف المعطري يستخرج منه دهن فاخر الصفت
مرفوف فيه || يتكاثر الياسمين بالتعقل والترقيد. يجيد
في جميع الأتربة أعصها الخفيفة المتوسطة الاندماج لانه
يغنى الرطوبة المتسككة || أشهر أنماؤه ما يتبع.

٣٠٩٢٧ - ياسمين أبيض، ياسمين مخنوق،

ياسمين مخنوق

Jasminum officinale (S). *Jasmin commun*. *J. blanc* (F).
Jasmine of poetry. *White flowered Jasmine* (E).
Echter Jasmin. *Weisser Jasmin* (D). *Gelsomino*
bianco (I).

نوع من الياسمين السبروتي الملبول. أقلية البلاد المختلة
الحرارة المنحرفة نحو المالح. جنته متقلبة تملو نحو
أمتار. فروعه متقابلة مضلفة المقطع والزاويا. أوراقها
متقابلة، وريقاته وريته الترتيب لا قياسه التجميع والعدد
مها الخامسة والسباعية والستاعية. لونها الى الخضار المبين.
نصلها دلي الصفحة || أزهارها عذكري التجميع محوري
الارتكاز. أزهارها متوسطة العرف المعطري المنصب، لونها
أبيض بلق || تنوره يستمر من أيار الى أيلول.

٣٠٩٢٨ - ياسمين أزغب

Jasminum pubigerum (S). *Jasmin à duvet* (F).
نوع من الياسمين السبروتي. يعيش في جميع الأقاليم المختلة.
بجته منتصبة تملو نحو ١٥٠ سم. أغاندها مضلفة الزوايا.
أوراقها متقابلة، مركبة، وريته الترتيب، خماسية أو سباعية
أو تساعية الوريقات. وريقاتها أهليلجية الشكل، نصلها
أزغب الصفحة السفلى، غلي العليا. أزهارها عذكري

التجميع. عذكوها يد من ٥ الى ١٥ زهرة. زهرتها صغيرة
القد، صفراء اللون، خاتمة العرف || تنورها يستمر من
أذار الى تشرين الأول.

٣٠٩٢٩ - ياسمين إسباني، ياسمين كبير الزهر

Jasminum grandiflorum (S). *Jasmin d'Espagne*. *J. à*
grandes fleurs (F).
نوع من الياسمين السبروتي. زراعته الصناعية شامة
لاستخراج دهنه المعطري. جنته تملو نحو ٣ أمتار أوراقها
متقابلة، وريقاته وريته التجميع لا قياسه العدد. لونها
الى الخضار اللامع. نصلها جامد الصفحة. أزهارها
عذكري التجميع، محوري الارتكاز. أزهارها كبيرة القد،
لونها الى الأبيض الموشح بالوردي، عريها فولح الرائحة
الاعاذة || تنوره يستمر من حزيران الى تشرين.

٣٠٩٣٠ - ياسمين أصفر، ياسمين البر

Jasminum frutescens (S). *Jasmin à feuilles de cyprès*.
J. frutescent (F).
نوع من الياسمين الملبول. جنته تملو نحو ٢٠٠ سم. أوراقها
متقابلة مركبة. وريقاتها زراعية الشكل صفيرة القد تملو
نحو ٢ سم. نصلها جامد الصفحة || أزهارها صفراء اللون،
شفمية الترتيب، ثنائية أو رباعية التجميع || تنوره
يستمر من أيار الى حزيران.

٣٠٩٣١ - ياسمين أصوري

Jasminum azoricum (S). *Jasmin des Açores* (F).
نوع من الياسمين، أقلية البلاد المختلة المشجرة نحو
الحارة. جنته عارضة. فروعه متقابلة أسطوانية المقطع.
أوراقها مركبة ثلاثية. وريقاته شبه قلبية الشكل. نصلها
جامد الصفحة الامعة. أزهارها عذكري التجميع محوري
الارتكاز. أزهارها بيضاء اللون، متوسطة القد، فواحة
العرف المنصب || تنوره يستمر من حزيران الى آب.

٣٠٩٣٢ - ياسمين صيني

Jasminum beesianum (S). *Jasmin de Bees*. *J. de*
Chine (F).
نوع من الياسمين السبروتي وهو بجلة ممرية صغيرة القد
تملو من ٧٠ الى ١٠٠ سم. أوراقها بيضيه الشكل،
سنانية الزام الأخير؛ نصلها يطول من ٢٥ الى ٣٠ سم.
وهو جامد الصفحة فستى اللون. أزهارها عطرية العرف،
حراء اللون، متوسطة القد، ثلاثية التجميع أو فردية.
تنورها يستمر طوال شهر حزيران.

٣٠٩٣٣ - ياسمين عطري

Jasminum odoratissimum. *J. suaveolens* (S). *Jasmin*
suaui. *J. jonquille* (F).
نوع من الياسمين السبروتي. منته جزر كناري وبادريا.
جنته تملو من ٢٠ الى ٢٠٠ سم. ساقها وفادها
أسطوانية المقطع. أوراقها متقابلة، مركبة، وريته الترتيب،
ثلاثية أو خماسية التجميع، وريقاتها أبيضه، نصلها
بيض الشكل مقطوع القاعدة. أزهارها ثلاثية التجميع،
صفراء اللون، فواحة العرف المنصب || تنورها يستمر
من نيسان الى تشرين الثاني.

٣٠٩٣٤ - ياسمين آخر

هو الكبركليت، اطلبه.

٣٠٩٣٥ - ياسمين الليل

هو شرخات الليل، اطلبه.

٣٠٩٣٦ - ياسمين زنبقي

هو القل، بجلة زيبية عطرية، اطلبه.



ياسمين صيني



ياسمين معروف



ياسمين

٣٠٩٣٧ - ياسمين عزائلي

هو صريمة الجدي الشائعة ، اطلبها .

٣٠٩٣٨ - ياسمين هندي

هو النفتة ، اطلبها .

٣٠٩٣٩ - ياسمينيات

Jasminacées, Jasminées, Jasminiacées, Jasminidées, Jasminaridées (F).

سبط من فصيلة الزيتونيات ، اجناسه وانواعه عديدة اشهرها آليامين . نباتاته جنبات وجنوبيات قرعاء السوق . ازهاره جميلة الشكل ثنائية السداة ، خاصة التركيب ، بعضها عطر فروع العرف المستحب .

٣٠٩٤٠ - ياستقوس

Jacinthe (F).

هو الجاست ، اطلبه .

٣٠٩٤١ - ياشكيد

Azoon (F).

جنس نباتات برية وتربيتية من فصيلة الظهوريات مشهور باسم حنظل ، اطلبه .

٣٠٩٤٢ - ياعزال دوزر

Erodion cloutin (F) دوزر

هو ابرة السجود ، اطلبها .

٣٠٩٤٣ - يالغ

Adulte (F). Adult (E).

ياغم ، بالغ ، ملك ، شوب ، نفوت تعريفية لمق واحد يوصف به طور الاستقرار الحياتي القائم بين طوري الفتوة والشيوخة .

٣٠٩٤٤ - يالغوش

Fontanelle (F).

فرجة غشائية في الجسم . Fontanel, Fontanelle (E).

٣٠٩٤٥ - يالغوش

Sinclud

هو قرة الرأس يقابله التفن .

٣٠٩٤٦ - يالغوش

Ephémère (F).

سفرة تعرف بأية يوم ، اطلبها .

٣٠٩٤٧ - يالغوشيات

Procephemera (E).

Procéphémères (F).

رتبة حشرات صغيرة القند تحلج الجسم من طبقة البيويات . فصائلها واجناسها وانواعها عديدة ، جميعها من الحوام التي تقضي حياتها البرية في الماء .

٣٠٩٤٨ - يالغوش

Corindon (F). Corundum (E).

حجر كريم غشاف ، صلب الجسم رزينة ، اجوده اصفر . وهو مختلف الالوان فيه الاحمر والاصفر والاخضر والازرق .

٣٠٩٤٩ - يالغوش

هو اللؤلؤ ، اطلبه .

٣٠٩٥٠ - يالغوش زعفراني

Hyacinthe (F).

عشرب من سيليكات الزئبق ، وهو حجر كريم زعفراني اللون يبيد عادة في بعض قطع الكباركين .

٣٠٩٥١ - يالغوش

Polymnia adulta (S).

Yacon (Poire de terre) (F).

نبات حولي من فصيلة المركبات قريب الشبه من اللؤلؤ . منته البلاد الحارة الامريكية . جذوره صوفية ، ساقه قرعاء . اوراقه متعابلة ممتدة سنائية النصل المزواني الحافة . يستخرج من عسائله مادة نشوية مأكولة وصناعية يستعمل منها بعد تحميرها بعض الكحول الشائعة الاستعمال .



يانوف



يالغوش



يالغوش



يانوف النجيليات

٣٠٩٥٢ - يالغوش

Dextrose (F). Dextrose (E).

يامن م . يامنة . تمت تعريفه يطلق حل كل ساق نباتية متسلقة دورتها الاولى من اليسار الى اليمين .

٣٠٩٥٣ - يالغوش

Capreolus capra, Cervus capreolus (S). Chevreuil (F). Roebuck, Roaddeer (E). Rahwid (D).

حيوان لبرن يجير من فصيلة الابلديات . جسمه يطول نحو ١١٥ سم . ويصلو ٧٤ سم . أما ذنبه فهو ٢٠ سم . ثوبه الى الحمرة الخطفية المواج وهو اغمر البطن ، ابيض العنبر . قرنه مثلث الشبب ينصله كالأليل . موطنه ارجاع الشرق الاوسط واروبه الغربية والوسطى . يعيش جماعات قليلة العدد . اجله مؤلف من ذكر وثلاث او اربع اناث . الاثني تسمى ه اشهر وتضع من يصفور الى ثلاثة .

٣٠٩٥٤ - يالغوش

Anis (F).

هو الاليسون ، اطلبه .

٣٠٩٥٥ - يالغوش بري

هو الكمين الحيشي ، اطلبه .

٣٠٩٥٦ - يالغوش

Mature, Mûr (F). Mature (E).

تمت تعريفه يوصف به جميع المحاصيل الزراعية التي اجازت دور الاذراع وبشكل في دور الانباع .

٣٠٩٥٧ - يالغوش

Pamphila (S).

جنس حشرات فراشية من فصيلة المسيريات . انواعه الموزنية قليلة . اجسامها تحلج القند تطول نحو ٢٨ مم . في الذكور والاناث . رواشن ذكورها حطية اللون يبيض

التجديد والزرشفة . رواشن اناثها بنية اللون هو التبييض والتجديد || يكثر وجودها من ايار الى حزيران . رفاقها تركيب النجيليات دون ان تقضي شديدة الاذى .

٣٠٩٥٨ - يالغوش النجيليات

Pamphila sidæ (S). Pamphile des graminées (F).

Pamphila sidæ (E).

حشرة من فصيلة المسيريات ورتبة حشرات الاجنحة . موطنها الشرق الاقصى وبعض الاصقاع الاربوية . فراشتها جارية قوتها رقيق الازداد . سرقتها تمسح على عصف النجيليات || جسمها متوسط القند ، مدني الشكل يطول نحو ١٤ مم . بسطها نحو ٢٩ مم . رأسها كبير اطيرم ، بني اللون . عيناها كبيرتان نافرتان . زبانها صرطانيان . جوشنها ويطها الى الحطية الشديدة السرة . زغب طوقها السرمي الى الشفوية || رواشن الذكر الى الحطية يطول تقييح وزرشفة صناعية . الزوج الاسامي اكثر زرشفة من الخلفي الذي يتميز بنقطة كبيرة تطوقها نقط صغيرة جميعها الى السرة القاتمة . رواشن الاثني الى البني يطول تقييح احمر وتقيح اشقر اكلس وبعض نقط صغيرة

شراء اللون || لها جبل واحد في الحيل . تظهر الفراشة في ايار . تسرح في النهار . تماثل بعد ظهورها بنحو سمة اسابع وتفتح المكان مبيدا على الصفحات السفلى من نصال الارواح || السرفة عنه بلونها الكمال تطول نحو ٢٢ مم . جسمها شبه اسطواني الشكل ، مستقيم الوسط ، يسحر الهلب ، ارمك اللون يطول تمسح اسم . رأسها ونديها ودواجها سود || طور الاكمال الذي يستمر نحو خمسة اشهر ينقضي داخل صلجة تحببها السرفة بين اوراق الاشجار الابيدة .



نباتية



يد



بروح مخزني



يترومه

٣٠٩٦٦ - يَبْرُوح، لَفَّاح، مَسَد رَجُورًا، مَسَد رَاك لَفَّاح المَجْنِين، لَفَّاح المَجْنُون

Mandragora (S). *Mandragora* (F). *Mandrake*, *Devil's apple* (E). *Alraun*, *Hundspieß* (D). *Mandragora*, *Mano di gloria* (I).

البروح هو التاريخ: أصل الاسم علمي من لغز واطين ويلفظ مندرافور. أما لفظة بروج فهي برابانية ومعناها ناقص الروح وذلك لأن شكل جلد هذا النبات يشبه جسم الإنسان. وقد ورد ذكر البروح كسكن في بعض الأساطير القروسية المألفة إلى نحو ٢٠٠٠ سنة قبل الميلاد. وقد استعمل منبأ عند الآشوريين وصنعت منه مرهم مخدر في عصر الولادة وآلام الإنسان. وكان القدماء يستعملون الجذور والأوراق كمنبر للاصصاب في العمليات الجراحية وفي بعض جبر الكسور المقلية. ويطلق أن جلوده المشددة إذا تقطعت في الخلق كانت مقوداً جنسياً عظيماً. وكان أيضاً شائع الاستعمال في السرور وفي طقوس الفريديت. **تعلية العلمية:** جنس نباتات مقوية، عشية، طيبة، مرة، برية وزراعية من فصيلة الباذنجانيات. أنواعه خمسة جميعها من نباتات حوض البحر المتوسط. سوقها جلود لينة لينة تلبس فيها الأزواجية. شكلها شكل جسم الإنسان. أوراقها قرصية الأرنكاز، كبيرة القذ، معتمة. نصلها رافعة الصفصعة، متباعدة الحافة. أزهارها متصلة القذ، كبيرة المدد، فردية التجميع تقوم على مائلين قرصية الانتساب. البؤتها غلظلة مبيد الأبيض والأزرق والآخر والبنيضجي. ثمارها باذنجانية مستديرة. جلودها وثمارها وأوراقها بحوى مادة مخدرة عنصرها كمنصر الأرويين أن لا يمكن أنفل || اعرف أنواعه وأشهره البروح المخزني.

٣٠٩٦٧ - يَبْرُوح مَخْزُون

Mandragora officinarum (S). *Mandragora officinalis* (F).

نوع من البروح وهو نبات مقوي طيب بري وزراعي. مهدد القدر الشرق الأوسط. ساقه جلدية، حزنانية الشكل، قرقة، لوناً إلى الخلفي الاسمر. أوراقه قرصية الانتساب، معتمة، كاملة، مستطيلة. نصلها مبيك الصفعة متباعدة الأطراف. أزهار فردية التجميع، قصيرة المائلين للخشبة. بيضاء اللون، خضراء الملوخ. ثمار مستديرة، كبيرة القذ. راجع خواصه الطبية في المادة السابقة.

٣٠٩٦٨ - يَبْرُوحِي

Picrasma (S). *Picrasma* (F). *Picrasma* (E).

جنس اشجار حرجية طيبة وتزيينية من فصيلة السروبيات. مهدد الشرق الأقصى. ساقها ملساء الباهاء حراء اللون. ميقينة بالأصفر، ترتفع نحو عشرة امتار. أوراقها مركبة. وديقاتها تطول نحو ١٠ سم. وتعرض نحو ٤ سم. أزهارها علفي التجميع. أزهارها الذكرية رباعية الفصص والنباتات والإسدية. أزهارها الانثوية خماسية الياصم. اعفاها صلبة صفراء اللون. لحاء السرق والاصنام مرة الطعم طيبة.

٣٠٩٦٩ - يَبْرُومَة، *، وِسَابِيَة

Eutrema wasabi (S). *Wasabi* (F).

نبات يلقى معمر من فصيلة الصليبيات. مهدد اليابسان. ساقه حزنانية مستطيلة. أوراقه قرصية الانتساب، غلظلة الإصلاح، كبيرة النصال القليلة لشكل. شراخه الزهري يملو نحو ١٠٠ سم. أزهاره عشقودي منتصب. أزهاره

٣٠٩٦٩ - يَبْرُومَة * *Potamogeton velox* (S). *Potamogeton velox* (F).

حيوان وحيد الجلس والنوع من فصيلة البيايات. اصطناع بعض مناطق افريقية الشالية || جسمها كثيف البربر النام، يطول نحو ٦٠ سم. بما فيه الذنب الذي يطول نحو ٣٠ سم. رأسها شبه مخروطي الشكل، مستدير الخلف. اسنانها صغيرة، مرقاة، حادة الأطراف، عددها ٤٠. ساقها مستويبة الكثافة واللطف. عينها كيزتان لوزيتان. أذناها مستديرتان صغيرتان. ذليها شبه مردي الشكل جلل البربر. قوائمها قصيرة. ثوبها إلى السرة يطولها في الرأس والظهر موالج ارجواني. ابطاها ويطنها إلى البياض التي تميز بجلود هيكلا الطهي من الترقوة || تألف صفاف مجاري الماء. قوتها الاسماك والظاء والافاعي والغشرات الكبيرة.

٣٠٩٦٩ - يَبْرُومَات * *Potamogeton* (S). *Potamogeton* (F). *Potamogeton* (E).

فصيلة حيوانات لبونة حاشرة وسيدة الجلس والنوع تشبه القفصاة تعيش على صفاف مجاري الماء || نوعها الوحيد اليابسة.

٣٠٩٦٩ - يَبْرُومَات * *Dothideaceae* (F). *Dothideaceae* (E).

عمارة فطور مجهرية من فصيلة الشفويات ودية الزئيات. تتميز بأساقها المركبة المحبقة القائمة على زنبقة لاجولية. انفلاتها يحصل في من ساقها المستديرة || اجناسها التي تم الاقتصاد الزراعي قليلة وهي التبيكة والديويرون واللبينة.

٣٠٩٦٩ - يَبْرُومَة * *Sesleria* (S). *Sesleria* (F).

جنس نباتات عشية مرقوبة من فصيلة النجيليات. أنواعه قليلة المدد. سوقها خماسية أو سداسية الاشطاء، دقيقة القصب، ثنائية أو ثلاثية السلايات. صفها فريد النصل المستطيل. ساقها اسطوانية الشكل، صغيرة القذ. يكثر وجودها في الاراضي الجبلية الكلسية للامحاء. اشهر أنواعها ما يتبع.

٣٠٩٦٩ - يَبْرُومَة لُزُوق * *Sesleria coerules* (S). *Sesleria* (F).

نوع من اليبس البروتي المبلول. صفحة سداسية الاشطاء تملو من ٢٠ إلى ٥٠ سم. صفها مستطيل النصل المحين يمرض نحو ٤ م. ساقها قصيرة القذ اسطوانية الشكل تطول نحو ٣ م. قطرها ٧ م. ساقها إلى الزرق الجميلة. يوجد في الارربة الكلسية القليلة أو المتوسطة الرطوبة.

٣٠٩٦٩ - يَبْرُومَة فِضِي * *Sesleria argentea*, *S. nitida* (S). *Sesleria* (F).

نوع من اليبس البروتي المبلول. صفحة خماسية الاشطاء تملو من ٣٠ إلى ٨٠ سم. صفها مستطيل النصل المققص يمرض نحو ٢ م. ساقها تطول نحو ٥ م. قطرها ١٢ م. ساقها مستطيلة لوناً إلى الزرق الداكنة يطولها موالج في.

٣٠٩٦٩ - يَبْرُومَة * *Feuille de vigne* (F).

البقرة ورقة البكرة. ج يرق. وتدعى أيضاً الخليلب.

الارتكاز. ازهارها وردية اللون مشبعة بالارجواني. بتلاتها مهدبة الخمار || تنويرها يستمر طوال شهر حزيران.

٣٠٩٨٠ - **يُخْمُومٌ عَطِيرٌ** (S). *Adenandra fragrans*
٣٠٩٨١ - **يُخْمُومٌ عَطِيرٌ** (F). *Adenandra odorante*

نوع من اليخوم الزينبي. ساقه تملو من ٨٠ الى ١٠٠ سم. اوراقه اعليجية مستطيلة. نصالها منبسطة مرطاة جميلة الخضار الزاهي. ازهارها عتيق الجميع، طرفي الارتكاز. ازهارها مستطيلة المالحق، وردية اللون، مفرسة الفصل والتلات، عطرية العرف المستحب || تنويره يستمر طوال شهر ايار.

٣٠٩٨١ - **يُخْمُومٌ قَرْدِيّ الزَهْرَة**

Adenandra uniflora (S).
Adenandra à fleurs solitaires (F).

نوع من اليخوم الزينبي. ساقه ترتفع نحو ٤٠ سم. اوراقه سنائية الشكل، مهبية، شاذكة. نصالها ملتفة الاطراف. ازهارها فردية الجميع، طرفية الارتكاز. يضاء اللون من الداخل، وردية من الخارج || تنويرها يستمر طوال شهر حزيران.

٣٠٩٨٢ - **يَحْجُوجٌ** (F). *Halophile*
نمت تمرني يطلق على النباتات التي تعيش وتتكاثر تلقائياً في الارربة المالحة.

٣٠٩٨٣ - **يَحْجُوبُورٌ** (mille). *Ourarde*
ذكر الحباوى.

٣٠٩٨٤ - **يَحْجُوبُورٌ**
قد يكون اليامور. قال الجاحظ في وصفه: وداية وحشية نافرة لما قران طولان كأنهما مشاران. وقرونه كقرون الأيل وفي صماته لا تجويف فيها وهو اسرع من الأيل.

٣٠٩٨٥ - **يَحْجُوبُورٌ** (F). *Hémoglobine*
٣٠٩٨٦ - **يَحْجُوبُورٌ** (E). *Hemoglobin*
مادة آسية يتألف منها غضاب دم الفقريات.

٣٠٩٨٦ - **يَحْجُوبُورٌ**
طائر من اللقن، يلى القليق المدى، اطلبه.

٣٠٩٨٧ - **يَحْجُوبُورٌ** (F). *Oena*
هو الحنسة، طائر من الحاميات، اطلبه.

٣٠٩٨٨ - **يَحْجُوشٌ** (S). *Erythrinus*
٣٠٩٨٩ - **يَحْجُوشٌ** (F). *Erythrin*

الواحدة عيشية. جلس اسمك نهرية من مفتوحات الماشاة وفضيلة القراصنيات. انواعها المعروفة اربعة موطنها انهر وبحيرات امريكة الاستوائية || اجسامها مستطيلة، شبه اسطوانية الشكل، تطول من ٣٠ الى ٤٠ سم. رؤوسها مستطيلة مقطوعة كبيرة الاشداق. زعانفها الظهرية كبيرة متباعدة بزعيميات ضخمة صغيرة. زعانفها الذيلية مستديرة الاطراف. ازواجها تراوح من الخضار الالى الى الخضار الاسفح. بطونها فضية || لحمها مأكولة، متوسطة الصنف.

٣٠٩٨٩ - **يَحْجُوشٌ** (F). *Gazon*
هو الخضير والخضرة. ج. يخاضير.

صغيرة القند، يضاء اللون. ساقه واوراقه مأكولة || يتكاثر باليزر والفصال. يرغب في المواتع الرملية التللية وفي الارربة الصصلالية الرملية الوارفة العناصر الغذائية.

٣٠٩٧٠ - **يَتُومٌ** هو الفريون، اطلبه.

٣٠٩٧١ - **يَتُومٌ السُحُور**
هو فريون الفجر، اطلبه.

٣٠٩٧٢ - **يَتُومٌ المَحْشِك**
هو الفريون الاسريكي، اطلبه.

٣٠٩٧٣ - **يَتُومٌ هِنْدِيّ**
هو فريون الاقديمن، اطلبه.

٣٠٩٧٤ - **يَتُومُعات** (Euphorbiaceae)
لعصيلة نباتية تعرف بالفريونيات. اطلها.

٣٠٩٧٥ - **يَتُمَك** (S). *Michauxia*
جلس نباتات عشبية برية وزراعية محولة ومعمرة من فصيلة الجربسيات. انواعها المعروفة قليلة منها الشرق الادنى. ساقها متعصية. اوراقها متعاقبة متباعدة قليلة العدد. ازهارها ابوية الارتكاز، كبيرة القند ملتفة التلات. اعرف انواعها واشهرها ما يتبع.

٣٠٩٧٦ - **يَتُمَكَة لِوَرْنِيَّة** (S). *Michauxia levigata*
٣٠٩٧٧ - **يَتُمَكَة سُورِيَّة** (S). *Michauxia fuscocampanula*

(F). *Michauxia à tige lisse*
نوع من اليشة المحولة. مهدبا بلاد ايران، ساقها مرطاة غرماء تملو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم. اوراقها جامدة النصل الازيب. ازهارها يضاء اللون، فردية الجميع، ابوية الارتكاز تملو الساق والفروع. تنويرها يستمر من تموز الى آب.

٣٠٩٧٧ - **يَتُمَكَة سُورِيَّة** (S). *Michauxia campanuloides*
(F). *Michauxia fuscocampanula*
نوع من اليشة المحولة، مهدبا الجبال السورية واللبنانية. ساقها غرماء تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. بشرتها حلوية الزغب الشاذك. اوراقها جامدة النصل الازيب. ازهارها وردية او بنفسجية اللون، فردية الجميع، ابوية الارتكاز، مبيضة على الساق والفروع. لتويرها يستمر من حزيران الى آب.

٣٠٩٧٨ - **يَتُمُومٌ** (S). *Adenandra*
٣٠٩٧٩ - **يَتُمُومٌ** (E). *Adenandra*

(F). *Adenandra*
جنس جنبات برية وتزينية معمرة من فصيلة السذابيات. موطنها بعض مناطق افريقية الجنوبية والشمالية. ساقها غرماء قصيرة تملو من ٤٠ الى ١٠٠ سم. اوراقها ابوية متباينة الاشكال. ازهارها خاسية النصل والتلات، عشارية الاسدية || انواعها المعروفة قليلة العدد، اشهرها الثلاثة التالية.

٣٠٩٧٩ - **يَتُمُومٌ صِيَوَانِيّ**
Adenandra umbellata (S).
Adenandra en ombelle (F).

نوع من اليخوم الزينبي. ساقه تملو من ٤٠ الى ٦٠ سم. اوراقه سنائية الشكل صغيرة القند تطول من ٢ الى ٣ سم. وتعرض من ٤ الى ٦ سم. نصالها مهدبة الاطراف، حلبة الصفحات السفلى. ازهارها سيواني الجميع، طرفي



بَشْوَش



بُذَّ الحِجْرَاءِ



بُذَّ الحِجْرَاءِ



بُذَّ الحِجْرَاءِ



بُذَّ الحِجْرَاءِ

الاجنحة . تألف الاماكن التي يكثر فيها الحلزون والبزاق والبريط . تتميز بلين القشار وبالنضام في الظلام وبفارق الشكل الخارجي بين الذكر والانثى ، ذكرها بجنية ، انثاها ماري || جسمها متوسط القد ، يطول عند الذكر من ١١ الى ١٣ سم . يطول عند الانثى من ١٤ الى ١٦ سم . نوبها الى البني الاسمر ، ينصرف الى الجزوي عند الذكر ويجهت عند الانثى . رأسها صغير الحجم كالحمار ذريان . عينها صغيرتان . زباناها خيطان صغيران . ظهورها عند الذكر مستطيل القصد وهو عند الانثى جعدة تركيز على الترتبة الاولى . ارسافها خماسية النقل || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اوائل الربيع وتمتد حتى اواسط الصيف . تسرح في الليل . تساقط في اوائل حزيران تمتع المكان ميحادها تحت الجلالة والحجارة || البرقة مبطلة الشكل ، سداسية الرواجب ممرءة اللون ، تمسح في اول عهدا على المواد الضوية ثم ما تقترسه من البزاق والحلزون .

٣٠٩١٧ - بِرَبُودَةٌ شَرْقِيَّةٌ ، حُبَابِيَّةٌ شَرْقِيَّةٌ ، بَصْبُوسُ اللَّيْلِ الشَّرْقِيَّ

Luciola orientalis (S). *Luciola orientalis* (F).
Orient Fire-fly, Orient Glow-worm (E).

حشرة مفترسة نافعة من فصيلة البرابيات ورتبة مندقات الاجنحة . تألف الاماكن التي تترادها البرقة الضجوية وهي اكثر انتشاراً منها واثق بصيصاً في الظلام وانثاها بجنية كالذكر || جسمها متوسط القد يطول عند الذكر نحو ١٤ سم . يطول عند الانثى نحو ١٦ سم . نوبها ثنائي اللون ، جزوي الرأس والظهران ، حطلي الكورل والجانحة والجرازم . رأسها صغير الحجم ملوحي بالاكورل . زباناها مستطيلان . عينها صغيرتان بارتان . ظهورها يلبس كامل البطن . بطنها مبطط . اسمر اللون . ارسافها خماسية النقل || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اواخر آذار وتمتد حتى اواخر آب . تسرح في الليل . قوتها البزاق والحلزون والبريط . وهي كالبرقة الضجوية تحارس الحفص الاستباتي فتسحق فضيتها برضاب ذفاقي للمادة ثم تمسح بالليل ليزني يحل النسخ ويزيد بها لتشفها بفكها الاجنحي || البرقة مبططة الشكل ، سداسية الرواجب ، ممرءة اللون ، طوله المخرج وهي كالحشرة الجملانة لا تخلو من الجهاز الضوئي || طور الاكمال الذي يستمر نحو ٦٠ يوماً ينقضي في التربة تحت الحجارة .

Lampyridae (S).
Lampyridae (F). *Lampyridae*, Fireflies, Glowworms, Lightning beetles (E). *Leuchtkäfer* (D).

فصيلة حشرات مفترسة من مندقات الاجنحة ، ليات البقرة ، صليات القد ، مستطيلة الشكل ، تسحق في الظلام لان تراجتهن الطرية تحصل دغداً لفسورية بصيصها يشع في الظلمة . اجنحتها المبرقة نحو ٥٠ أما اوتامها فعدة مئات . معظمها من حشرات المناطق الحارة . تتميز بذكرها الحشنة وانثاها للمباري . وهي تتميز من الحشرات النافعة لانها تقضي على بعض البزوبات الفاسدة بالزراعة .

Cychmen (F).
٣٠٩٩٩ - بِرَبُودٌ
هو السكك ، الحلبه .

Rhizothorus (S).
Rhizothorus (F). *Rhizothorus* (E).
طائر من العجايبات وفصيلة التدرجات ، موطنه ماليزية .

Baudrier d'Orion (F).
٣٠٩٩٠ - بِرَبُودَةٌ
بذ الجوزاء ثلاثة كواكب وباصنة من كوكبة الجوزاء .
راجع تقار الجوزاء .

٣٠٩٩١ - بِرَبُودٌ
Idiocerus tremulae (S).
حشرة من فصيلة الزيديات ، طولها يراوح من ٥ الى ٦ سم . جسمها مخروطي الشكل . رأسها مستعرض . زباناها خيطية قصيرة . نوبها حطلي اللون . رأسها واخراف جناحها الى الحصار الاطلس البات . مدنها حطلي اللون اسمر الحمار والظرف . تركب الحور من اذار الى تشرين .

٣٠٩٩٢ - بِرَبُودٌ
Idiocerus ustulatus (S).
حشرة من فصيلة الزيديات طولها يراوح من ٤ الى ٦ سم . جسمها مخروطي الشكل . رأسها مستعرض . زباناها خيطية قصيرة . نوبها الى الحصار الاسمح الموج . مدنها اسمر تركب الصفات دون ان تؤويه .

٣٠٩٩٣ - بِرَبُودٌ
Idiocerus socialis (S). *Idiocerus socialis* (F).

حشرة من فصيلة الزيديات ورتبة متجانسات الاجنحة . جسمها صغير القد يطول نحو ٥ سم . رأسها مستعرض ، قليل النتوء اصفر اللون . خطمها معتدل الطول . عينها كبيرتان . زباناها صغيرتان ، نحيلان . كورلها قليل الاحتداد اصفر . حشيتها حمرة صفراء . ظهورها كامل الحشية ، لاصف ، حطلي اللون يملو موج اسمر . وثنائها غشائيات ، شفافة . بطنها اصفر اللون على صفحته . قوائمها كيفية الملب الشائك || تألف جميع المواقع التي يكثر فيها الاصاب والاشجار . قوتها التسحق تحمص من الاوراق .

٣٠٩٩٤ - بِرَبُودَةٌ
Idesia (S). *Idesia* (F).

شجرة برية ورتبة من فصيلة النضيات . مهدا الصين واليابان . ساقها منتصبة تملو من ١٢ الى ١٧ م . افسانها فائرة نظامية الارتكاز . اوراقها عابلة ، متعاقبة ، معتقة ، رقيقة الشكل ، مستطيلة المنق . نصلها جامد الصفحة بحري اللون . ازهارها وسيدة الشق ، عادية القلمة ، صغيرة القد ، خضراء اللون . ازهارها عشكولي التجميع ، بحوري الارتكاز . حثاكلها متدلية . ثمارها حنية الشكل والقد برتقالية اللون || تنورها يستمر طوال شهر ايار .

٣٠٩٩٥ - بِرَبُودَةٌ ، حُبَابِيَّةٌ
Lampyrus (S). *Lampyrus*, Ver luisant (F). *Firefly* (E).

جنس حشرات مفيدة ، صغيرة القد ، مستطيلة الشكل ، مبططة الجسم ، من فصيلة البرابيات . انواعها المبرقة نحو ٩٠ جميعها من ليات البشرى يفسق في الظلام . معظمها من حشرات المناطق الحارة . ذكرها تسرح في الليل للاحتداد الى انثاها للمباري . اوتوبا مختلفة الالوان يكثر ليسا الرادي والبي .

٣٠٩٩٦ - بِرَبُودَةٌ دُجُوجِيَّةٌ ، حُبَابِيَّةٌ دُجُوجِيَّةٌ ، بَصْبُوسُ اللَّيْلِ
Lampyrus noctiluca (S). *Lampyrus nocturne*, Ver-luisant (F).
Fire-fly, Glow-worm (E).
حشرة مفترسة نافعة من فصيلة البرابيات ورتبة مندقات

جوري الرقطة الصنائية التديب . رقطة له لقياسة الحجم والشكل صدره وبطه الى البياض الناصع || موطنه عند ايران والانفان واخذت الى التبيت . يالغ الجبال العالية من ارتفاع ٣٠٠٠ الى ٦٠٠٠ م .

٣١٠٠٧ - **يرعونم** *
Parcnoptère mâle (F).
Ha percnopterus (E).
اليرعونم واليرشم واليرغوم هو الذكر من الرشم .

٣١٠٠٨ - **يرد** *
Yard
وسدة قياس الكايزية تساوي ٠٩١٤٣٨٣ م . يقال اخذت من طول سيف الملك هنري الاول || كسور البرد القدم والبوصة . القدم او الفوت يساوي ٣٠٨ سم . والبوصة او اللانش تساوي ٢٥٨٤ م . فاليرد يساوي اذا ثلاثة اقدام او ٣٦ بوصة .

٣١٠٠٩ - **يردوروم** *
Monstera (S). Monstèra (F). Ceriman (E). Kœstlicher, Kolbenriesse (D). Monstera (I).
جنس نباتات عشبية متسلقة من فصيلة الفاسيات . انواعه المعروفة ١٢ ، مهددا البلاد الامريكية . منظرها حول وبعضها معمر . اوراقها مزخرفة المتصفيف . ازهارها سربة . ازهارها صغيرة لائقة وسيدة الشق . ثمارها لوزية مأكولة القشوري في بعض الانواع .

٣١٠١٠ - **يرز** *
Pinasse (F).
هو الصنوبر البري ، اطلبه .

٣١٠١١ - **يرسون** *
Erycina (S).
Erycène (F). Erycina (E).
جنس حيوانات بحرية من الرغويات صفحيات الخياشيم وفصيلة الرسونيات . انواعها المعروفة كثيرة العدد ، جميعها من متحجرات الطليقات المسائية والبيسانية . اصداها يضيئة الشوزن او عرسمة ، معتدلة التبليط ، رقيقة ، مالة .

٣١٠١٢ - **يرسونيات** *
Erycinidae (S).
Erycinidés (F). Erycinidae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرغويات صفحيات الخياشيم . اجناسها وانواعها عديدة ، منها الماهرة وهي من متحجرات الاراضي الثلاثية . ومنها الماهرة || تتميز باصداها الصغيرة الرقيقة الشائعة . جميعها ثنائية المصارع ، مستطيلة الارجل القابضة الانحناء || اعرف اجناسها واشهرها البرسون والبتين والقلبية والمخطوة .

٣١٠١٣ - **يرع** *
Tragelaphus scriptus (S). Tragelaphe acris, Guib (F). Bush buck, Hornessed antelope (E).
نوع من الجهل صغير القد حجمة حجم الماعز . اصفاؤه البلاد الافريقية من جنوب الصحراء الكبيرة الى الحيفة . ثوبه امركيت يعلو بخطوط ابيض وتبقيج اسمر لا نظامي الترتيب ولا قياسي الشكل . راجع نباح .

٣١٠١٤ - **يرغونم** *
Eriogonum (S). Eriogone (F).
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة البطباطيات . انواعه عديدة ، منظرها بري وبعضها زخبي . سورها متعصبة عادة الفروع . اوراقها غمية التجميع لقياسة الارتكاز يكثر وجودها عند قاعدة الساق . ازهارها صغيرة القد شذوية الانقسام ثنائية او رباعية التجميع متلفها قلافة جرسية الشكل او اسطوانية || اعرف انواعها واشهرها ما يتبع .

يألف البراري والادغال . ملجئه الحياتي حصاي ، جماعته قليلة العدد . قوته الحشرات والقمل والذبور البرية || جسمه معتدل القد قريب الشبه بالجمال الا انه اطول عنقا ومنقادا واصفر رأسا . جناحه مستدير الاطراف . ذنبه صغير القد ، غرطلي الشكل . ثوبه الى البردة الزرقاء المزاج يعلوها قرشم ابيض واسمر . زوره ومنذره وبطه الى البردة السمره يعلوها مزاج وردي || يثنى اضموصه الى البرة بين البياض المتشابهة . الاثنى تحضن وحدها من ١٤ الى ١٦ بيضة . الترخيم يستمر نحو ثلاثة اسابيع . الذكر يثين الفداء والحماية .



يربوع

٣١٠٠١ - **يربوع** *
Dipus (S). Gerboise (F). Jerboa, Jaculus (E).
جنس حيوانات لينة قاضية جاسة من فصيلة اليربوعات . انواعه عديدة موطنها جميع الاساقع الصحراوية الحارة والمتعددة الحرارة || شكله كمثل فأرة كبيرة . طوله نحو ١٧ سم . وذنبه ٢٠ . حيناه جاحظتان . اذناه كبيرتان متنتحلتان وهو طويل الرجليين قصير اليدين جدا وله ذنب مستطيل ريمه صعدا يحمل في طرفه خصلة صوف لونها يخالط من لون ثوبه || ثوبه الى الصبهة الصفراء . ظهره بلون الرمل ، بطه ابيض || يالغ القفاني والناظر الجافة يتخذ بجمعه من نثر الارض . انثاه تحمل ثمانية اطباء وتضع اربع مرات في السنة في كل مرة من ٤ الى ٦ ادراس . قوته المواد النباتية عل اختلاف انواعها وصادها والحشرات والجراد || اعرف انواعها واعماها ما يتبع .



يرليس

٣١٠١٢ - **يربوع تدعري** *
Dipus macrotarsus (S). Gerboise macrotarse (F).
موطنه البلاد السورية . ثوبه بلون الرمل . طوله نحو ١٦ سم . وذنبه ١٩ || يكثر في البادية .



يردوم

٣١٠١٣ - **يربوع ذو ريشة** *
Dipus sagitta (S).
Gerboise flèche (F).
موطنه العراق وركية واروبة . ثوبه بلون الرمل . ظهره عاين اللجج . ذنبه اسود الخصلة ، ابيض النورة .



يرسون

٣١٠١٤ - **يربوع مصرى** *
Dipus aegyptius (S).
Gerboise d'Egypte (F).
موطنه فسيح الاجزاء يمتد من الجزائر الى تونس وليبيا ومصر والنوبة ولسطن وشمال الجزيرة البرية || ثوبه الى الصبهة الصفراء . ظهره بلون الرمل الرطب . بطه ابيض . خصلة ذنبه سمراء . طرفها اخبر .



٣١٠٠٥ - **يربوعيات** *
Dipodidae (S).
Dipodidés (F). Dipodidae (E).
فصيلة حيوانات لينة قاضية جاسة من مرتبة قردنيات الشوزب ورتبة القوارض . اجناسها وانواعها عديدة تتميز باستطالة جوامعها القلبية وقصر الامامية . رؤوسها غليظة . اذانها ملغية الشكل متعصبة . اعناقها قصيرة . اذنانها طويلة || موطنها العالم ، تألف القفاني والقيمان . قوتها الاشباب والجلود والثار || اعرف اجناسها اليربوع والزيبود والعولاة والمائل .



يرع

٣١٠٠٦ - **يربوع** *
Fells uncia (S). Snow leopard, Irbis (E).
حيوان مفترس من فصيلة السنوريات . يشبه النمر ككوتنا وعظما . يقال انه ضرب منه . طوله نحو ٢٣٢ سم . بما فيه الذنب الذي يطول نحو ١٠٠ سم . ثوبه ابيض الاساس

٣١٠٢٢ - يَرْغُونُ تَاحِمُ الْهَلَبِ *

Ericulus setosus (S). *Ericula soyeux* (F).
حيوان لبين حاشر من فصيلة الذفاليات. موطنه جزيرة مدغشقر. يألف الحشبات والنباتات التي تكثر فيها الأعشاب سرسحة دجوي. قوته الحشرات والديدان || جسمه صغير القد، قريب الشبه بالفتند، يظل نحو ٢٤ سم. جلده مستطيل الخشونة، عديم الحبال. ثوبه إلى السمرة السوداء || الاثنى ثلثون تقص في كل رصص من ١٥ إلى ١٢ جرراً || يياته الشتوي يستمر نحو أربعة أشهر.

Larvale (F). Larval (E).

٣١٠٢٤ - يَرْبَبُ

راجع ديموي.

Pierre calcaire molle (F).

٣١٠٢٥ - يَرْبَعُ

هو كل حجر كلسي عديم الصلابة أو سريع الانفتاح.

Asperge (F).

٣١٠٢٦ - يَرْبَعُ

هو الحليون المعروف ج رابع، اطلبه.

Sparmannia (S).

٣١٠٢٧ - يَرْغُومُ

Sparmannia (F). Sparmannia (E).

جس جنات وشجيرات برية وزراعية تربيتية من فصيلة التريزوفيات. منبتها البلاد الافريقية. سطحها مستعصية تعلق من متر إلى ستة أمتار. أوراقها شجائية الاشكال. ازهارها صيوانية التجميع، طرفي الارتكاز. ازهارها صغرية لثدي يبيض اللون || انواعها المعروفة قليلة العدد، اشهرها التالية:

٣١٠٢٨ - يَرْغُومُ اَفْرِيقِيّ

Sparmannia africana (S). *Sparmannia d'Afrique* (F).
نوع من البريوم. ساقه تعلق نحو ستة أمتار. أوراقه ثقلية الشكل تعلق من ١٢ إلى ١٥ سم. وترصص من ٨ إلى ١٠ سم. تصلحها مسنة الحفاف، مزينة البشرة على المفتحين العليا والسفل. ازهارها صغرية الحجم، يبيض اللون || تنويرها يستمر طويلاً شهر ايار.

٣١٠٢٩ - يَرْغُومُ كَفِيّ الْوَرَقِ

Sparmannia palmata (S). *Sparmannie palmée* (F).
نوع من البريوم. ساقه تعلق من متر إلى اثنين. أوراقه كفية الشكل، خماسية الفلق المستطيلة المختار. تصلحها عديم الزغب، بحري الخضار. ازهارها يبيض اللون، صغرية الحجم || تنويرها يستمر من آذار إلى تموز.

Henné (F).

٣١٠٣٠ - يَرْبَغَا

هي الحناء، اطلبه.

Pédète cafre (S).

٣١٠٣١ - يَرْبَبُ *

Pédète cafre. Lièvre sauteur (F).

حيوان لبين قاضم وحيد الجنس والنوع من فصيلة الدافيات. موطنه بعض الاسواق الافريقية. طوله نحو ٤٠ سم. يذنبه ٤٠. رأسه كراس الانب. عيناه كبيرتان جاحظتان. ذنبه جنل الصوت. جرائمه قصيرة، خماسية الاصابع، قوية الاظفار القوية. جرائمه الخلفية مستطيلة، رباعية الاصابع، قوية الاظفار القصيرة المستقيمة || ثوبه إلى الصبغة السوداء. بطنه رشواني يبيض. يعيش جماعات كثيرة العدد || جحره ردة فضية تكتنفها اربعة اناق مصالبة مستطيلة. قوته الاعشاب والجذور والحبوب.

٣١٠١٥ - يَرْغُونُ أَصْفَرُ *
Eriogonum flavum (S). *Eriogone jaune* (F).

نوع من اليرغون التريبي. ساقه زياة تعلق نحو ٣٠ سم. أوراقه متعقة ملقبة الشكل تعلق من ٢ إلى ٨ سم. تصلحها خلية البشرة على صفحتها. ازهارها حامية الارتكاز، صيوانية التجميع، خلية البشرة، صفراء اللون || تنويره يستمر من حزيران إلى ايلول.

٣١٠١٦ - يَرْغُونُ خَمِيسِيّ *

Eriogonum umbellatum (S). *Eriogone en ombelle* (F).

نوع من اليرغون الجليلي المنبت. ساقه تعلق من ١٥ إلى ١٥ سم. أوراقه متعقة ملقبة الشكل. تصلحها بحري الصلابة العليا، خلية السفلى. ازهارها حامية الارتكاز، خصية التجميع، صفراء اللون || تنويره يستمر من حزيران إلى ايلول.

٣١٠١٧ - يَرْغُونُ عِدَقِيّ *

Eriogonum corymbosum (S). *Eriogone en corymbe* (F).

نوع من اليرغون التريبي. ساقه مزينة تعلق من ١٥ إلى ٢٠ سم. أوراقه متعقة اهليلجية الشكل، تصلحها خلية البشرة، متعق الاطراف. ازهارها حامية الارتكاز، ملقبة التجميع، لونها إلى البياض الموشح بالوردي || تنويره يستمر من تموز إلى ايلول.

٣١٠١٨ - يَرْغُونُ مَرْسَبِيّ *

Eriogonum compositum (S). *Eriogone composite* (F).

نوع من اليرغون التريبي. ساقه مرءاء تعلق من ٣٠ إلى ٤٠ سم. أوراقه ييشية الشكل، ثقلية القاعدة، تصلحها اخضر الصفصفة العليا خلية السفلى. ازهارها حامية الارتكاز، خصية الشكل، مركبة الصفوف المتراكبة. لونها إلى البياض الاغبر || تنويره يستمر من تموز إلى ايلول.

Pterostyrax

٣١٠١٩ - يَرْفِيلُ *

جس نباتات برية وتربيتية من فصيلة الاصطركيات. انواعها المعروفة قليلة العدد منها الاشجار والشجيرات. سطحها منتعصبة فراءه. أوراقها عابلة متعقة-متصافية. تصلحها اهليلجية جامدة الثقل، مسنة الحوافي. صفحتها السفلى كثيفة الخمل الاطلل. ازهارها صغرية الارتفاع، عنقودية التجميع. ازهارها ربيعي. ثمارها جرداء برصية الشكل، رباعية الاجنحة.

Ictère, jaunisse (F).

٣١٠٢٠ - يَرْكَانُ

Icterus, jauntyce (E).

حال مرضية تمرى لسج الحيوان تنفسه، سببها العدائي تعلق الصفراء من بلوغ المني بسهولة تختلط بالدم.

Chlorose (F).

٣١٠٢١ - يَرْكَانُ - يَرْكَانُ

Chlorosis (E).

ومنهم من قال أركان. حلة فيزيولوجية تصيب النبات فتسبب اصفرار الارواق ونقصانها من القيام بعملها التنشيطي على الزينة الاكلا كما يؤدي إلى تخثر النسج والذبول الباكر. وينقال للارواق والنباتات المصابة باليرقان مبرقة.

Larve (F).

٣١٠٢٢ - يَرْكَا - يَرْكَا

هي الدعوص، اطلبه.



يرغون تاحم الهلب



يربب

الاستشعارية قصيرة ، ثنائية الفصل . أخطاها قصيرة . ملاسها دقيقة . كواسلها وبطنها شبه أسطوانية الشكل . رواشتها معتدلة الحجم ، شفافة . قوائمها نشيطة || تألف المواقع الجافة والمنازل الريفية . قوتها المواد العضوية المنحلة . يرقاتها - عادمة البصر ، نائلة ودائمة .

٣١٠٤١ - يثوريكيات *
Scenopinidae (S). Scénopinidae (F). Scenopinidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . أجناسها وأولواها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . تألف المواقع الجافة وتفضي المسكن الريفية || أجناسها صغيرة تطول من ٢ الى ٨ م . رؤوسها كبيرة . عيونها متقاربة ، مثائلة عند الشقين . قرونها الاستشعارية قصيرة ، ثنائية الفصل . أخطاها صغيرة . كواسلها وبطنها شبه أسطوانية الشكل . رواشتها شفافة ، قوائمها قوية || يرقاتها كومة ، دودية الشكل . بعضها وأجنح والبعض الآخر دامن || أشهر أجناسها اليزكة .

٣١٠٤٢ - يثوريك *
Georyssus (S). Géorysse (F). Georyssus (E).

جنس حشرات من فصيلة اليزوميكيات ورتبة غدييات الاجنحة . أنواعها المعروفة نحو ٢٥ جميعها من حشرات المناطق الباردة والمعتدلة الحرارة || أجناسها عادمة الراشح صغيرة القدة ، بيضية الشكل ، تطول من ٢ الى ٥ م . رؤوسها صغيرة ، مملوكة . عيونها بارزة . أخطاها مستطيلة . تأثيرها وملاسلها نظامية . قرونها الاستشعارية قصيرة ، دبوسية الاطراف . كواسلها شبه مخروطية . مقطوعة المقدم . المالحدا لاهقة قنقلها خيطوط من التفرقات الدقيقة . قوائمها نشيطة . أثوابا وحيدة اللون يكثر فيها الاسود وبشتقاته والجزوي والكسني || تألف غشقات المتاعق ويجاري الماء حيث تنعم في الوبال والامسال الرطبة . قوتها المواد العضوية المنحلة وما تستطيع اقتناصه من حشرات وهوام .

٣١٠٤٣ - يثوريكيات *
Georyssidae (S). Géoryssidés (F). Georyssidae (E).

فصيلة حشرات متفرقة من غدييات الاجنحة . أجناسها وأولواها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم مناطق البلاد الباردة والمعتدلة الحرارة || أجناسها عادمة الراشح صغيرة القدة ، بيضية الشكل ، تطول من ٢ الى ٥ م . رؤوسها صغيرة ، مملوكة . عيونها بارزة . تأثيرها وملاسلها نظامية . قرونها الاستشعارية قصيرة ، كساعية الشكل ، تلحف الرأس . المالحدا لاهقة . قوائمها نشيطة ، أثوابا سوية الالوان || تألف الرياشح وصفات المتاعق ويجاري الماء . تميش على المواد العضوية المنحلة وما يستطيع اقتناصه من دوبييات وهوام || أشهر أجناسها اليزوميك .

٣١٠٤٤ - يثوريك *
Ben (F). - يثوريك ، يثوريك .

٣١٠٤٥ - يثوريك *
Scenopinus (S). Scénopine (F). Scenopinus (E).

جنس حشرات من فصيلة اليزوميكيات ورتبة ذوات الجناحين . أنواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم مناطق البلاد

٣١٠٤٦ - يثوريك *
Ostryer (F). - يثوريك .

هي النابتة للشهورة بصلابة غشبا .

يسرح في الليل ويبعث في النهار . انثاء تحمل اربعة اطياف وتضع اربعة ادراس مرة واحدة في السنة .

٣١٠٣٢ - يثوريك *
Eriophyllum (S). Eriophylle (F).

جنس نباتات عشبية مصرمة من فصيلة المركبات . أنثاه عديدة ، مغطاه بري وبعضها زبني . سطحها فراء مستطيلة الزغب الذي يشبه ندف القطن . أوراقها متعاقبة وريشية غمرية . أزهارها رؤوسية صفراء اللون . يزورها منجبة بقشبة || أشهر أولواها ما يتبع .

٣١٠٣٣ - يثوريك عديتي ، نديكية عديكية
Eriophyllum confertiflorum (S). Eriophylle à corymbes (F).

نوع من البروتيفلم ، عشبه تلو من ٣٥ الى ٦٥ سم . أوراقه صغيرة القدة ثلاثية التفرخ أو خماسية . رؤوساته الزهرية كثيفة التجميع ، قصيرة الاذن ، هرية اللون . أزهاره يستمر من المراتل حزينان الى ايساط تموز .

٣١٠٣٤ - يثوريك يثوريكي ، نديكية يثوريكية
Eriophyllum conspitosum (S). Eriophylle gazouillant (F).

نوع من البروتيفلم ، عشبه تلو من ٣٥ الى ٥٥ سم . أوراقه السفل خماسية التفرخ . رؤوساته الزهرية كبيرة القدة ، متوسطة العدد ، مستطيلة الاذن || أزهاره يستمر طوال شهر تموز .

٣١٠٣٥ - يثوريكي *
Yurumi (F). حيوان لبون اريد مشهور باسم يثوريك عديتي ، اطلبه .

٣١٠٣٦ - يثوريك *
Sperme des animaux féroces (F). يثوريك .

البرون صعد الحيوانات المفترسة .

٣١٠٣٧ - يثوريك *
Yurumi (F). دماغ الفيل .

٣١٠٣٨ - يثوريكيات *
Spermaphytes (F). تعريف يطلق على جميع النباتات التي تلتف بزور حقيقي من أي قسم كانت أن من المستورات أو المريانات أو التسميرات .

٣١٠٣٩ - يثوريك *
Bioplane (S). Bioplane (F).

جنس حشرات لافظية من فصيلة البشيات ورتبة مفدمات الاجنحة . أنواعها المعروفة خمسة مهددا الترق الاذن يكثر وجودها في بعض مناطق سورية الداخلية || أجناسها صغيرة تطول من ٨ الى ١٢ م . أثوابا وحيدة اللون منها الاسود والجزوي والاسفر والكسني والبي . رؤوسها صغيرة مستديرة . قرونها الاستشعارية دبوسية الشكل ، كواسلها معدودة ، ناشرة الاطراف الامامية . المالحدا غفدة ، مقطوعة الاطراف لا تلحف كامل الجسم || تألف المرح وزرالب البقر والقمح والمانز . تميش تحت الكش على المواد العضوية والنابتة المنحلة .

٣١٠٤٠ - يثوريك *
Scenopinus (S). Scénopine (F). Scenopinus (E).

جنس حشرات من فصيلة اليزوميكيات ورتبة ذوات الجناحين . أنواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم مناطق البلاد المعتدلة الحرارة || أجناسها مستطيلة تطول من ٣ الى ٦ م . رؤوسها كبيرة . عيونها متقاربة عند الشقين . قرونها



يثوريك



يثوريك

تركب النباتات المرعوية والمتعمية || أشهر أنواعها أليف المزمار ويسف فرموزا .



يسف أليف



يسف ثنائي اللون



يسف فرموزا



يسف هزاز



يسع

Chenille (F).

٣١٠٤٧ - يَسْرُوع
هو الاسروع ، اطلبه .

٣١٠٤٢ - يَسْرُوع *
Tritonia (S). Tritonie (F). Tritonia (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات مدهبات الاربل غلفيات الخياشيم فصيلة اليسويات . انواعه المرعوية كثيرة العدد منتشرة في معظم بحار العالم . تعيش على التنبوت البحرية || اجسامها عراطة اهلجية لشكل شبيه بالبراق . رؤوسها قصيرة مقبوضة ، ثنائية الافراس الجاحسة . خياشيمها طهرية الانكاز ، ثنائية الصف ، متشعبة . افواهها ثنائية الفكوك القرنية المسنة الاطراف . الارباع ملونة بكثر فيها الاحمر والازرق والاصفر .

٣١٠٤٤ - يَسْرُوعِيَّات *
Triconilidae (S). Triconilidae (F). Triconilidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرغويات مدهبات الاربل غلفيات الخياشيم . اجسامها وانواعها المرعوية مدهبة منتشرة في معظم بحار العالم . اكثراها يبي وبعضها يقترب من الطوط . اسرارها متفردة العدد || اجسامها مستطيلة عادية الصف . رؤوسها ثنائية او رباعية اللامس . خياشيمها متشعبة ، مركزها فوق الرءاء على الظهر او على الجانبين || اعرف اجناسها واشهرها اليسوع والبرادة وغلوكس .

٣١٠٥٥ - يَسْرُوعِيَّات *
Pimpinella (S). Pimpinella (F). Pimpinella (E).

جنس نباتات عشبية من فصيلة الخيميات . انواعه المرعوية عديدة منها الحولية والحرولة والعمرة والشمره الايسون || سواها متصبية فراء . اوراقها مركبة . ازهارها حيوية التجميع ، ابطي الانكاز او تاجية . ازهارها بيضاء اللون . غمارها يزود صغيرة || أشهر انواعها :

P. anisum (S). يسون انيسي ، آيسون
P. cretica (S). يسون اكرتي
P. viridis (S). يسون اعصر
P. puberula (S). يسون زهبي
P. anthriscoides (S). يسون سرلي
P. eriocarpa (S). يسون صدقي اللدر
P. corymbosa (S). يسون ملدي

٣١٠٥٦ - يَسْبِقِيَّة
Jaspe (F). Jasper (E).

حجر اليشب حجر صواني مختلف الانواع له من حجر الحك الاسود اي مصادق الصاف .

٣١٠٥٧ - يَسْبِقِيَّة ، كَوَسْبِة افريقية
Agathes amelloides, Aster capensis (S). Agathes, Aster d'Afrique, A. du Cap, Marguerite bleue (F). Cape daisy, Cape aster (E). Afrikanischer Agath (D). Aster d'Africa (I).

بجلة ترينينية معمرة من فصيلة المركبات . مهدا افريقية الجنوبية وقد حمت زراعتها معظم حقائق العالم . ساقها فراء ملون من ٧٠ الى ١٢٠ سم . اوراقها متعاقبة ، حافسة ، ملقطة الاطراف . نصلها يفيض الشكل ، خلي الصفحة . ازهارها رؤوسية ، فردية التجميع ، مستطيلة الزناد ، زرقاء اللون . ازهارها يستمر طوال الصيف .

Ortalis formosa (S). Ortalis elegante, Otile elegant (F).

حشرة ذبابية من ذوات الجناحين وفصيلة اليسفيات . جسمها صغير القد بطول من ٧ الى ١١ م . رأسها كبير ، شبه مخروطي الشكل ، حطلي اللون ، اقفر المخرج . جبهتها برتقالية اللون . خطمها مستدل الطول ، صناعي اللون . عينها مكورقان ، فاشقان ، اربواليايسان ، مطويان بالفضي . زباناها قصيران . رؤسهاا كيران ، صناعيان ، مشجان بالاسمر المابق . قوائمها الى الحطلي . صدورها صناعي اللون ، فضي العمل ، تقطبه بعض الخطوط السر . بطنها يرسمي الشكل ، صناعي الخصب ، اصفر المخرج ، ملوكة ستة اطواق سم || تظهر الحشرة الجملانة من حزيران الى ايلول . مرتها المرامي والاعشاب المتعمية حيث تقترس مختلف انواع الارق والحوام || يرقاتها غاصلة تركب الارواق وتعيش عليها حتى الاكمال .

٣١٠٤٩ - يَسْبِق ثنائي اللون *
Ortalis bicolor (S). Ortalis bicolor (F).

حشرة ذبابية من ذوات الجناحين وفصيلة اليسفيات . جسمها صغير القد بطول من ٤ الى ٧ م . رأسها محبب الشكل ، صناعي اللون . خطمها مستدل الطول . زباناها صغيران ، متجان . عينها كبيرتان ، ذهبيتان . صدورها الى انخضار اللامس . بطنها يرسمي الشكل ، ازرق اللون ، اسنق المخرج . مرزا الى السمرة الخفيفة الباقية . رؤسهاا كيران ، مفاغان . قوائمها الى السمرة الكتسية || تظهر الحشرة الجملانة من اواسط نيسان الى اواسط تشرين الاول . مسرهما يشمل كل مكان حتى الاماكن للمحولة || قربها الحوام . يرقاتها نائلة .

٣١٠٥٠ - يَسْبِق فرموزا *
Ortalis formosa (S). Ortalis elegante (F).

ذبابة من اليسفيات صغيرة القد ، طولها يراوح من ٧ الى ١١ م . رأسها وقوائمها الى الحطلي الاقشر . حريتها نضية . جبهتها برتقالية . تسرح من حزيران الى ايلول . مرتها المرامي الزلطة والاعشاب المتعمية حيث تلتهم مختلف انواع الحوام || يرقاتها غاصلة تركب الارواق وتعيش عليها .

٣١٠٥١ - يَسْبِق هزاز *
Seoptera vibrans (S). Ortalis vibrans (F).

ذبابة من اليسفيات صغيرة القد ، طولها يراوح من ٥ الى ٧ م . جسمها ازرق اللون . رأسها الى الشقرة الباقية . قوائمها سود . اصافها حطلية كتني بامتداد اعزاز جناحيها . تسرح من حزيران الى آب . مرتها الاقهار والمرامي حيث يكثر الارق والحوام || يرقاتها هواكة مضاعفة عند الحاجة .

٣١٠٥٢ - يَسْبِقِيَّات *
Ortalidae (S). Ortalisidae (F).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . انواعها المرعوية نعا ٤٠٠ منتشرة في جميع اصقاع العالم . حشرات ذبابية الشكل . اناثها مسلحة بأثرة حادة تستعملها لوضع ائوفاها عديدة الالوان الزاهية المتراكبة || يرقاتها دامة او غاصلة

Chevreau (F).

Small goat, Young roe (E).

٣١٠٦٤ - يَغْر

هو الجدي والحلام والراغلة .

Diplax, Sympetrum (S). ٣١٠٦٥ - يَغْرُوس

جنس حشرات من فصيلة اليسوييات، أنواعه عديدة جميعها مفترسة تقتضي على الحوام . طول اجسامها يراوح من ٣٠ إلى ٤٠ سم . وبسطة اجنحتها يراوح من ٤٢ إلى ٦٠ سم . ألوانها المتعددة إلى الخشن الصنابي المالح . اجنحتها وردية الجسم ، صفر القواعد يعلوها في أول زواياها الاشارة خطوط متفرعة صنابية اللون . برقاها عادية حامدة الهلب مستطيلة الاربعين تعيش في رسوئ المنائق ويحاري الماء .

Orchethrum (S).

٣١٠٦٦ - يَغْس

جنس حشرات مفترسة من فصيلة اليسوييات ، أنواعه عديدة، طول اجسامها يراوح من ٣٥ إلى ٤٧ سم . وبسطة اجنحتها يراوح من ٥٥ إلى ٧٠ سم . ألوانها إلى الزرق . روثها خضر . انثاها ابيض ثوبها وجعنا . برقاها زياه الجسم تعيش في الاسمان .

Libellula (S).

٣١٠٦٧ - يَغْسُولِب

Libellule (F). Dragon fly (E). جنس حشرات من فصيلة اليسوييات، أنواعه عديدة، اجسامها مستطيلة ، طولها يراوح من ٣ إلى ٤٦ سم . وبسطة يراوح من ٥٥ إلى ٧٦ سم . ألوانها خضية أو كستية اللون . اجنحتها شفافة شرجية التزاويق . جميعها مفترسة، بعضها يحمل على النمل .

Libellulidae (S).

٣١٠٦٨ - يَغْسُولِيَّات

Libellulides (F). Libellulidae, Dragon flies (E). فصيلة حشرات من رتبة العراشات . اجناسها وانواعها كثيرة العدد، جميعها مفترسة تألف المنائق ويحاري الماء . كدودها اصفر قدا من انثاها واولئ لونا سها . انثاها تقف بمكانها فرديا على سطح المنائق وعلى صفحة الماء . تنفث عن دمابص جاسة تعيش كامل حياتها البرقية في الماء او في الرسل . حشراتها الكاملة تتميز بعدم الطلاق اجنحتها في الاستراحة والرقاد || اشهر اجناسها اليمسوب واليسس واليعروس والكرولون .

Stachyurus (S).

٣١٠٦٩ - يَغْشِيل

Stachyure (F). Stachyurus (E).

جنس جنات ممررة برية وزراعية تربيتية من فصيلة اليسوييات . سقها تملو من مرتين إلى اربعة اعمار . اوراقها عايلة متعاقبة ، مسنة الحصار ، تظهر بعد الانزهار . ازهارها سنبلية التجميع . ازهارها صغيرة يضاء اللون أو صفراء ، رباعية الفصل والبتلات والياسم و ثمانية الاسدية . ثمارها متينة صغيرة || اعرف ألوانها واشهرها التالية :

٣١٠٧٠ - يَغْشِيل بِكُورِي

Stachyurus praecox (S). Stachyurus précoce (F).

نوع من اليغشيل . جنته تربيتية تملو نحو ثلاثة اعمار . ساقها متصبية . افئداه قضيفة مرنة . اوراقها اليليجية طولها نحو ١٨ سم . وثمره نحو ٩ سم . تصالحا رقيقة ، مسنة الحصار ، جميلة الحصار الزاهي . ازهارها سنبلية التجميع ، متدلية ، صفراء اللون || تنويرها يستمر من شباط إلى نيسان .

Jade (F).

٣١٠٥٨ - يَسْم

حجر صواني التركيب شديد الصلابة .

Echtes (S). Echitès (F).

جنس نباتات برية طيبة من فصيلة الخليات . انواعها المعروفة قليلة . جميعها امريكية المبت . معظمها لولبي متسلق وبعضها جنبي . سقها سرسة مالة . اوراقها متقة ، يصفية ، متعاقبة . ازهارها كبيرة القذ زامة الالوان منها الالبيص والاصفر والاحمر . ثمارها جرابية الشكل نجيلية القذ || يستخرج من سقها بالحرق عصارة لبنية يضاء اللون ، حريقة الطعم ، جمالية المادة لها استعمالها الطبي || اعرف انواعها واشهرها .

Echites biflora (F).

يغش ثنائي الزهر

Echites à feuilles verticillées (F).

يغش فسي الورق

Echites à corymbes (F).

يغش علني الزهر

٣١٠٦٠ - يَغْشُورَةُ الْبَاذَنْجَان، نَارِيَةُ الْبَاذَنْجَان

Euzophora osseatella (S). Euzophore de l'aubergine (F).

فراشة من الناريات ، صغيرة القذ . بسطها نحو ١٧ سم . روثها الاماميان إلى السمرة يتوصلها تبيج اسود داكن . روثها الخلفيان مفضضان . رقتها مستعدة الجسم ، خبارة اللون ، كستية الرأس . تركب نباتات الفصيلة الباذنجانية اغصانها الباذنجان والبقيلة والبطاطا تنشب السوق وتدخلها مع جمام التربة وتتابع نخرها وأذاها صمدا ما استطاعت .

٣١٠٦١ - يَسَار

Raire (F). Trost of the deers (E). صوت الأيل . واليثار شميرة في الصحراء تأكلها الأيل (السان).

٣١٠٦٢ - يَغْشَمِيَّي

Psophia (S). Agami (F). جنس طير من طوال الساق . أنواعه المعروفة قليلة العدد تجمع بين التفلق والتلق . اصطنها صفاف نهر الامازون . اجسامها ربة . اعناقها متوسطة الطول . روثها كبيرة . مناقبها غرولبية ذرية حادة الملاقط . اجنحتها قصيرة . انانيتها شديدة القصر . ارسافها جيفية مستطيلة . ارياشها ناعمة رملة . روثها واعناقها وبلوتها خلية الريش والرقن || اعرف انواعها واشهرها اليمسي اللجب .

٣١٠٦٣ - يَغْشَمِيَّيْجِب

Psophia crepitans (S). Agami bruyant, Oiseau-trompette (F).

نوع من الياجيم صوته ككتلين البوق يردده أكثر من ٢٠٠ مرة في النهار . وهو طائر كبير القذ طوله يراوح من ٥٢ إلى ٦٥ سم . ثوبه شديد السمرة اللامعة . رأسه وصفته وظاهره وصدريه وبلطه واثنيكه سود . جناحه إلى الجفولة السمراء يعلوها موج أزرق وأخضر . حلقه حبه غرولبية . زلفه وصفاه حمر . منقاره البس || اصطنها صفاف نهر الامازون اغصانها الصفاف الثالية . يعيش زمرأ واسرابا يراوح عدد افرادها من ٣٠ إلى ٢٠٠٠ وأكثر قوته البار والبلود والطرقات واللبدان . يمش في الخوص للفسوي الشكل يلفه بالحشاش الناعمة ويطويه بجوار القش والطين . أثناء تفتش من ١٠ إلى ١٢ بيضة تحضنها نحو ٣ اسابيع || يلبس بدن عناء وإذا عاش مع البيل والأرز والذجاج والحش حافظ عليها كالحارس الأمين .



يشيت



يمسي جب



يعروس



يمس



يعسوب

٣١٠٧١ - بُغْيِيل صِينِيّ *

Stachyurus chinensis (S). *Stachyura de Chine* (F).
نوع من البغْيِيل. جنينة تزيينية تملو نحو أربعة أمتار .
ساقها متراكبة الإفاد المنبسطة . أوراقها أحليجية ، ذلقة
إزاهم الأخير ، تطلو نحو ٢٠ سم . تصالها جملة الخضار
المالين ، مسنة الحار . أزهارها سبلي التجميع . أزهارها
بيضاء اللون ، صغيرة القد || تنويرها يستمر من أيار
إلى تموز .

٣١٠٧٢ - بُغْيِيلَات *

Stachyuraceae (S). *Stachyuracées* (F). *Stachyuraceae* (E).
فصيلة نباتية من ثنائيات الفلقة مستقلة القامات
اجناسها وانواعها المروقة قليلة العدد مهدها بعض مناطق
الشرق الاقصى والجزر . جميع انواعها شجيرات وجنبتات
معظمها بري وبعضها زراعي تزييني || أشهر اجناسها
البغْيِيل .

٣١٠٧٣ - بُغْيِيلَات التَّجِيلَات *

Isosoma graminicola (S). *Isosoma des graminées* (F).
حشرة خاضعة من فصيلة السوسيليات ورتبة غشائيات
الاجنحة المفسورة . موطنها بعض مناطق البلاد المعتدلة
الحارة والمنسوحة نحو الحارة || جسمها صغير القد يطول
نحو ٣ سم . رأسها مستعرض . جوشها مستطيل . يطنها
ضامر وقصير . زريقيتها الاخيرة عحرائية الشكل . مرزها
مدبب وقصير || تتطفل على التجيليات ونها القمح
تؤذيها .

٣١٠٧٤ - بُغْيِيد * ، بُغْيِيدِيض

Leontodon (S). *Leontodon*, *Dent de lion* (F). *Haw-
ble*, *Lion's tooth* (E). *Löwenzahn*, *Kuhblume* (D).
Tarassaco, *Dente di leone* (I).
نبات طبي بري معمر من فصيلة المركبات . أوراقه
كبيرة مفروسة زهادا الماشية وتسن عليها . أزهاره رؤسية ،
صغيرة القد ، كثيفة التجميع ، لونها إلى الصفار الكبريتي .
مصارتة لزجة ، مرة الطعم ، طبية .

٣١٠٧٥ - بُغْيُور *

Hère (F). *Young deer* (E).
صغير الابل لا يزال يتبع أمه .

٣١٠٧٦ - بُغْيُوب *

هو الحجل الرومي ، اطليه .

٣١٠٧٧ - بُغْيُوبِيَّة *

Jacobaea (S). *Jacobée*, *Herbe de St Jacques* (F). *Jacoby* (E).
Jacobablume (D). *Giacobaea* (I).
نوع من الشروفة من فصيلة المركبات . وهو نبات عشبي
بري معمر يبدل في معظم المناطق المعتدلة من العالم القديم .
ساقه تملو نحو ٧٠ سم . أوراقه سافنة متعاقبة ، تصالها
مفروض الصلصة المستطيلة . أزهاره رؤسية صفراء اللون .
يقال انه من النباتات النافعة . مصارته تملد الجرح .
ونهم من قال انه يغيد القرحة .

٣١٠٧٨ - بُغْيِيلِيَّة *

Pragmatisme (F). *Pragmatism* (E).
البيعية مذهب فلسفي محوره معرفة الحقيقة في قدر
تأنيجه العملية .

٣١٠٧٩ - بُغْيُور

الجدي والصغير من الفأن . ج يماير .

٣١٠٨٠ - بُغْيِيلِيَّة

Rhubarbo grosselle (F).
هو الرأوند الرأبيسي ، اطليه .

٣١٠٨١ - بُغْيُوس *

Callichromis (F). *Callichromus* (E).
جنس حشرات من غديات الاجنحة طوال القرون وفصيلة
الزعنقيات . انواعها المروقة كثيرة العدد منتشرة في جميع
اصقاع البلاد الحارة . جميعها نائلة ودامتة تعيش على
المواد العضوية والنباتية المنسطة || تتميز باستطالة الاجسام
والقرون الاستشعارية والقوائم الخلفية . اجسامها معتدلة
التطيل تطلو من ٢٥ الى ٤٥ سم . كولاسها مكورة
مخسورة . عيونها بارزة . اهدتها بحزة لاحقة . ألوانها
عديدة الالوان السوية ، يكثر فيها الاخضر الاسع
والكستني الافتح المالح .

٣١٠٨٢ - بُغْيِرَة

Coleonema (S). *Coléonème* (F). *Coleonema* (E).
جنس نباتات جنينة معمرة من فصيلة السذابيات . منها
بعض مناطق افريقية الجنوبية والشرقية . سيقها ترتفع
٣٠ الى ١٠٠ سم . أوراقها ابيدة متعاقبة خيفة التصال
المسنة الاطراف الجامة . اهدارها خامية الفصل والنباتات ،
عشارية الاحدية ، خضفلة الاوراق والتجميع || انواعها
المروقة قليلة العدد ، أشهرها التالية :

٣١٠٨٣ - بُغْيِرَة بَيْضَاء

Coleonema album (S). *Coléonème blanc* (F).
نوع من البغْيِرَة التزيينية . ساقها تملو من ٣٠ الى ٦٠ سم .
أوراقها تطلو نحو ١ سم . وعرض نحو ١ سم . اهدارها
بيضاء اللون ، فردية التجميع ، طرفية الاوتكاز ، مهدبة
التويج والفتحات ، مقطوعة البتلات || تنويرها يستمر
طوال فصل الربيع والصيف .

٣١٠٨٤ - بُغْيِرَة قَاصِرَة

Coleonema pulchrum (S). *Coléonème superbe* (F).
نوع من البغْيِرَة التزيينية . ساقها فراء تملو نحو ١٠٠ سم .
أوراقها سنائية التصال تطلو من ٢ الى ٥ سم . مقصتها
مدنية شاذكة . اهدارها ثلاثية او رباعية التجميع ، طرفية
الاوتكاز ، حراء اللون ، خافتة العرف الطري || تنويرها
يستمر طوال فصل الخريف .

٣١٠٨٥ - بُغْيُورِب *

Hygrobia (S). *Hygrobie* (F). *Hygrobia* (E).
جنس حشرات مائية مقترنة من فصيلة البغْيُوريات ورتبة
غديات الاجنحة . انواعها المروقة قليلة العدد منتشرة في
بعض مناطق العالمين القديم والجلد || اجسامها صغيرة ،
شبه بيضية الشكل ، تطلو من ٨ الى ١٠ سم . رؤوسها
صغيرة ، مستعرضة المؤخر . عيونها صغيرة ، بارزة .
قربها الاستشعارية عيطية . تأشيرها وفكوكها ولباسها
معطشة القد . كولاسها مستعرضة ، قليلة الطول . اهدارها
مهدبة ، لاحقة . قوائمها شديدة اللش . ألوانها وحيدة
اللون . تكثر فيها البصرة المحفدية للمالح || تألت المناطق
والاواور والياها الراكدة . تعيش على النباتات المائية وفي
الاصال ، قوتها كل ما تتسلح قنصه من دوبيات .

٣١٠٨٦ - بُغْيُورِيَّات *

Hygrobiidae (S). *Hygrobiidés* (F). *Hygrobiidae* (E).
فصيلة حشرات مائية من غديات الاجنحة . اجناسها



بصوم التجيئات



بغْيِيد



بغْيُوية



بغْيوس



بغْيوب

٣١٠٩٣ - يَكْن

اليكن: هو البعل اذا اربع. ج. يكن.

٣١٠٩٤ - يَكْنَة

هي البقرة الحامل لأول مرة. ج. ينفات.

٣١٠٩٥ - يَكْطَاو

Strepers

Strepers, Réveilleur (F).

جنس طير من الجواثم وفصيلة الغرابيات. انواعه المعروفة قليلة العدد موطنها بعض مناطق استرالية. تألف الغابات وصفات الانهر. ملجئها الحياتي جماعي. افواجها تدم من ٣٠ الى ٨٠ زوجاً. قوتها الثمار والبذور والخشرات والوديات || تتميز بكثرة تعيها المزعج الذي تردده عند الصباح الباكر || اجسامها شبيهة باجسام الشقوة او غراب الزرع. مثاقيدها مخروطية جالسة. اجنحتها لافحة. اذناها شبه مخروطية. اطيها الى السواد الاسمر وبعضها الى السواد الازرق المزاج. اقفاها واجنحتها مبلقة ومطوقة بالابيض || تدئن في الايام الباسقة. انثاها تضع من ٦ الى ٧ بيضات تحضنها بمفردها بينا الذكور تولى لها الغذاء.

٣١٠٩٦ - يَكْصُوم

جنس حشرات من فصيلة القيصوميات ورتبة ذوات الجناحين انواعه المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم اقطار البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة تطول من ٥ الى ٨ م. رؤوسها شبه موزانية الشكل. مستقلة. حيوتها كبيرة، فارقة عند الشقين. قرونها الاستشعارية قصيرة، ثلاثية القصل. تأشيرها صغيرة. ملابسها ثنائية العقل. كراسلها ضيقة. بطونها مستطيلة، صغيرة المراتز الخلفية شديدة رواشتها تبتية الخضاب. اغخاذ قوائمها الخلفية شديدة الضخامة || تألف الحراج والغابات. قوتها طلع الانعار وصيقها. يرقاتها وانجته تقترس ما تستطيع من دويبات.

٣١٠٩٧ - يَكْصُومِيَّات

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار العالم. تألف الغابات والحراج || اجسامها متفاوتة القد، تطول من ٥ الى ١٢ م. رؤوسها موزانية. حيوتها فارقة عند الشقين. قرونها الاستشعارية ثلاثية القصل. تأشيرها صغيرة. ملابسها ثنائية العقل. كراسلها شبه اسطوانية. بطونها مستطيلة. رواشتها شائعة عند معظم الاجناس. الغذاء قوائمها الخلفية مستضخمة || يرقاتها وانجته، شبه دودية الشكل || اشهر اجناسها القيصوم.

٣١٠٩٨ - يَكْطِين

هو القرقع، اطلبه.

٣١٠٩٩ - يَقْطِين اقْرَع * ، قَاوُون الميز

Cucumis melopepo (S). Pétison, Mélépépon, Bonnet d'électeur (F). Squash (E). Melon-Kürbis (D). Melopopeo (I).

نوع من القرقع وهو نبات عشبي حولي زراعي شائع الاستعمال. ساقه مدادة لا قياسية الطول والبرقع ويتناسل ثماره متوسطة قلنسوية الشكل مستديرة اخضر الشقين المفروض. لياها جامد المكسر، متوسط الحرارة، جيد الصنت يطيخ ويريب || زراعته لا تستوجب عناية خاصة.

وانواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض مناطق العالمين القديم والجديد || اجسامها صغيرة، شبه يضية الشكل، تطول من ٦ الى ١٥ م. رؤوسها مستقلة، مستقلة. قرونها ناشرة. قرونها الاستشعارية عيطية، مركبة من ١١ فصلة. كراسلها مستديرة، قليلة الطول. اغماها لافحة. قوائمها شديدة النشط || جميعها مفترسة وداسة تعيش في ايمان المياه الزركدة || اشهر اجناسها القيرروب.

٣١٠٩٧ - يَقَاع

هو القحمة، اطلبها.

٣١٠٨٨ - يَكْروُ

جنس حشرات صغيرة القد من فصيلة الورديات. انواعه عديدة، اعطانها العالم، مرتمها اعشاب المراعي. اجسامها يضية الشكل تطول من ٣ الى ٤ م. رؤوسها مثقلة الزوايا. الياها ملونة يكثر فيها التجميع للمترس. اغمرارها زيدة لا تستوجب المتكاملة.

٣١٠٨٩ - يَكْروُ الرِياض

Aphrodes histrionicus (S). Aphrode comédien (F). حشرة من فصيلة الورديات ورتبة متجانسات الاجنحة. جسمها صغير القد يطول من ٣ الى ٤ م. || رأسها كبير الجرم، لونه الى اخضر الالاس تملو زرققة يضاء. عظمها ممثل الطول. عينها كبيرتان. زبانا قصيران. كراسلها مستطيل الشكل، ابيض اللون، اخضر الخثار الذي يتماخ الحصىة. حقيقتها مخرومة، بنية مجتمعة بالاسود. ظهورها كامل الخنسية، لافح، ابيض اللون، يني التجميع والتدبيج. روستها غشائين شفافان. يلقها اسم. قوائمها كثيفة الملح الشاك || تألف الرِياض والمروج. قوتها التسع.

٣١٠٩٠ - يَقَعَة

Raphiolepis (S). Raphiolepis (F). جنس شجيرات برية وزراعية ثريزية من فصيلة الورديات. مهدا يعتد من الشرق الاذن الى اليابان. سيقها فروع، مبيضة الاقتان، تملو من متر الى ثلاثة امتار. اوراقها ابيدة، اهليلجية الشكل او سائنة. نصلها جامدة، حيلة الخضار المايق. ازهارها عطرية العرف، عتقودية التجميع او متشككة، مختلفة الالوان. ثمارها حنينة سوداء اللون || انواعها المعروفة قليلة، اشهرها التالية.

٣١٠٩١ - يَقَعَة البَحْثَال

Raphiolepis indica (S). Raphiolepis du Bengale (F). نوع من اليفة الزيزينية. ساقها تملو من مترين الى ثلاثة امتار. اوراقها ابيدة، اهليلجية، مستطيلة القاعدة والطرف. نصلها جميل الخضار اللامع. ازهارها يضاء اللون يعلوها تمسح وردية واجر. اسديتها بنية اللون || تنورها يستمر من ايار الى حزيران.

٣١٠٩٢ - يَقَعَة عَيْمِيَة

Raphiolepis umbellata (S). Raphiolepis à ombelles (F). نوع من اليفة الزيزينية. ساقها تملو من متر الى ثلاثة امتار. اوراقها ابيدة، يضية متمكة تطول نحو ٩ م. وتعرض نحو ٥ م. نصلها جلدية التسج، مستديرة الاطراف تبدو كجسومة من الخيام. ازهارها يضاء اللون عطرية العرف، صغيرة القد، ظهرا من ١٥ الى ٢٠ م. || تنورها يستمر من ايار الى حزيران.



يفرو



يَقَاو



يقطين اقرق

إيطلي الأرتكاز أو طرقي. ازهارها قرمزية اللون ، قطرها نحو ٢٥ سم. || تنويرها يستمر طوال فصل الصيف .

lochroma (S).

lochroma (F). lochroma (E).

جنس جنينات معمرة من فصيلة الباذنجانيات. مهدها بعض مناطق امريكة الجنوبية. سفها تملو من متر الى ثلاثة امتار. اوراقها كاملة ، متعاقبة. ازهارها زرقاء اللون أو حراء || تزروع للترين في الحدائق وهي من النباتات السريوية التي تجود في جميع الاثربة || انواعها المعروفة عديدة ، أشهرها التالية .



بَغْيَانَة

٣١١٠٩ - بَغْجُورِي أَنْبُوبِيَّة

lochroma tubulosum (S). lochroma tubuleux (F).

نوع من البكرورية. منبتها كولومبيا. ساقها تملو من ١٥٠ الى ٣٠٠ سم. اوراقها احليجية متعاقبة. نصالها حلقة البشرة. ازهارها طوق التجميع ، محوري الارتكاز. ازهارها مستطيلة المالحق ، متدلية ، لونها الى الزرقاء الجليدة. توريحاتها انبوبية الشكل تطلو من ٣ الى ٤ سم. || تنويرها يستمر طول شهر آب .

٣١١١٠ - بَغْجُورِي سَفَانِيَّة

lochroma lanceolatum (S). lochroma lancéolé (F).

نوع من البكرورية. منبتها بلاد الشيل . ساقها ترتفع من ١٢٠ الى ٢٥٠ سم. اوراقها سنائية الشكل تطلو من ١٢ الى ١٥ سم. وتعرض من ٤ الى ٦ سم. نصالها كثيفة الخمل الاخرى اللون. ازهارها شبه صيولي التجميع ، محوري الارتكاز. ازهارها بنفسجية اللون ، توريحاتها تطلو نحو ٥ سم. || تنويرها يستمر طوال فصل الصيف .

٣١١١١ - بَغْجُورِي قِرْمِزِيَّة

lochroma coccineum (S). lochroma écarlate (F).

نوع من البكرورية. منبتها بعض مناطق امريكة الوسطى . ساقها مزينة الصماء تملو من متر الى مترين . اوراقها سنائية الشكل مستطيلة الطرف . نصالها حلقة الصفحات السلس . ازهارها شبه صيولي التجميع ، محوري الارتكاز. ازهارها قرمزية اللون متوسطة القد ، قصيرة المالحق . توريحاتها تطلو نحو ٥ سم. || تنويرها يستمر طوال فصل الصيف .

٣١١١٢ - بَغْجُورِي كَبِيرَة الزَهَر

lochroma grandiflorum (S).

lochroma à grandes fleurs (F).

نوع من البكرورية. منبتها جبال البرير . ساقها تملو من مترين الى ثلاثة امتار. اوراقها احليجية الشكل تطلو من ١٥ الى ١٧ سم. وتعرض من ٧ الى ٩ سم. نصالها عادية التملو حل الصفحات العليا ، مزينة الصفحات السفلى . ازهارها كبيرة القد ، لونها الى الزرقاء الساليجينية. توريحاتها تطلو من ٥ الى ٦ سم. || تنويرها يستمر من الصيف الى الخريف .



بكرورية

٣١١١٣ - بَغْجُورِي

Camphorifère (F).

Camphoriferous (E).

نمت تحريفي يطلق حل كل ما يشج الكافور .

Citrouille, Courge (F).

Pumpkin, Gourd (E).

هي القرعة ثمرة القرع أو البقلين . اشكالها واحجامها عديدة متباينة . اوراقها متضاربة ترأص من كيلو واحد الى ٥٠ كيلو . لبها غلاطي يطبخ ويريب ، متوسط ما يحوي من مواد :

ماء	٩٥,٩٠ %
مواد ازوتية	٠,٢٨ %
مواد دهنية	٠,٢٥ %
مواد استخلاصية	٣,٨٧ %

٣١١١٤ - بَغْجُورِيَات هي القرعيات ، فصيلة لبانيّة .

٣١١١٢ - بَقْجِي

البقي : جبار التمثل . القطعة منه يثقة .

٣١١١٣ - بَكَاكَة

Sphaeralcea (S).

Sphéralcée (F). Sphaeralcea (E).

جنس نباتات جنية أو عشية من فصيلة الخيازيات. مهدها بعض اصقاع امريكة الجنوبية ، اقلها اقل البرتقال . ساقها فراء تملو من ٥٠ الى ٣٠٠ سم. شكلها شكل الخيانة . اوراقها مهدبة النصال ، حراء اللون أو بنفسجية || انواعها المعروفة قليلة العدد ، أشهرها التالية .

٣١١١٤ - بَكَاكَة حَرَاء

Sphaeralcea miniata (S).

Sphéralcée rouge (F).

نوع من البكاسة . جنية تزينية معمرة مهدها بلاد الاربيتين . ساقها فراء تملو نحو ١٠٠ سم. اوراقها ثلاثية الفلق للشعارة المختار . نصالها حلقة البشرة ، بحرية الخصار . ازهارها فردية حراء اللون زنجفيرة الموحج || تنويرها يستمر من تموز الى تشرين الثاني .

٣١١١٥ - بَكَاكَة صِيَالِيَّة

Sphaeralcea umbellata (S).

Sphéralcée en ombelle (F).

نوع من البكاسة . جنية تزينية معمرة مهدها المكسيك . ساقها رفيعة تملو نحو ثلاثة امتار . اوراقها خاصة أو سباعية الفلق المدامة التستين . نصالها بحرية الخصار . ازهارها صيولي التجميع ، محوري الارتكاز . ازهارها بنفسجية اللون ، كبيرة القد ، قطرها نحو ٦ سم. || تنويرها يستمر طوال فصل الخريف والشتاء .

٣١١١٦ - بَكَاكَة قَبْجِيَّة الْوَرَق

Sphaeralcea acerifolia (S).

Sphéralcée à feuilles d'érable (F).

نوع من البكاسة . جنية تزينية معمرة مهدها بعض مناطق كاليفورنيا . ساقها فراء تملو نحو ١٠٠ سم. اوراقها ثلاثية أو خاصة الفلق ، قريبة الشبه بوق القيقب . ازهارها فردية ليكية اللون أو بيضاء ، قطرها نحو ٣ سم. || تنويرها يستمر طوال فصل الصيف والخريف .

٣١١١٧ - بَكَاكَة مَنُورُو

Sphaeralcea Munroana (S). Sphéralcée de Munro (F).

نوع من البكاسة . شبة تزينية سريوية مهدها بلاد كولومبيا . ساقها فراء تملو من ٥٠ الى ٦٠ سم. اوراقها ثلاثية الفلق المسنة الاطراف . ازهارها متفويدي التجميع ،

Ullucus tuberosus (S).

Ulluco, Ulluque (F).

نبات عشبي حولي وحيد الجنس والنوع من فصيلة السرمقيات. اصطناعه البلاد الأمريكية يكثر في الأند وبوليفيا والبرو وفراغله الجديدة. جذوره صفراء. ساقه عشبية حمراء اللون. أوراقه متعاقبة منعقة، نصلها قلبي الشكل غليظ الصفرة. أزهاره صغيرة القند عقودية التصميم بحورية الارتكاز. || مسالكه تستعمل أشتال البطاطا في اجاصية الشكل، جوزية الحجم، وردية اللون، صفراء اللون. يكثر بالبذور وبالصلصال.

Columba intermedia (S).

Biset, Bizet, Petit ramier (F). Rock-dove, Stock-

dove (E). Hohltaube (D).

نوع من الحمام البري الخفيف الطيران. يقال ان الحمام الداجن ينحدر منه ومن الحيدوان، طوله نحو ٣٠ سم. لونه الى الرمادي الخفيف. اجنته مغطاة بالاسود، أقدامها بيضاء. رأسه شديد السمرة عايق الموج. صدره جوي. منقاره جانبي دقيق. افئدة امر الانتساب، حنطي الطرف. موطنه فسح الارياض يسم الشرق وأروية وأفريقية. يأنف المناطق البرية القليلة الانجرار. يعيش أرباباً صغيرة يروح عدد أفرادها من ٨ الى ٣٠. قوته الجيوب والبذور. يذئق منه في تجاريف الاشجار وأقارب الصخور. اناته تحسن من مرتين الى ثلاث مرات في السنة. حشفتها بيضاء.

Phascolomys (S). ٣١١٢٢ - مُبَاط ٥

Phascoloma, Wombat (F). Wombat (E).

جنس حيوانات لبونة جامة من فصيلة السباعيات اي الجرذان الجرابية || أنوعه المعروفة ثلاثة موطنها أستراليا والجزر المجاورة. اجسامها رمية، قصيرة القوائم والذنب، تطول من ٦٥ الى ٧٥ سم. رؤوسها شبه مخروطية الشكل، قصيرة الاطراف المقعوية. حوزتها صغيرة. اذنانها قصيرة متصببة. اوبارها ناعمة. أنوارها تراوح من الصفرة الى السمرة السوداء. اخافيرها قوية تمكئها من حفر التربة || الاتي تحمل رضيعها في جراب رجب الب من مركزه في مؤخر البطن || تسرح في الليل وتبيت في النهار داخل افاق تحفروها في التربة || قوتها الاعشاب البرية والجلود. اما الانواع الثلاثة فهي :

Phascolomys uraius (S).

Wombat ourson (F).

Phascolomys latifrons (S).

Wombat à front large (F).

Phascolomys vulgaris (S).

Wombat commun (F).

Phascolomyidés (F). ٣١١٢٣ - مُبَاطِيَّات ٥

فصيلة حيوانات لبونة جامة تسمى جرذان جرابية، اعطيا.

Abeille mâle (F). ٣١١٢٤ - يُمُخُور ، رُحَل

Drone (E).

اليسفور او الرحل الذكر من النحل. وهو كاس الشوار الشقي، عادم الشداد اللاس، اطول قدماً من النحلة العاملة واعظف جسماً منها. يحكم الملكية، اي الاتي الكاملة الاعضاء التناسلية والمعروفة ايضاً بالجل، مرة واحدة في حياتها وذلك قبل ان تهاجر متع المازن، ثم يموت على أثرها. ج يساخير ورسال.

Ortalis (S).

Ortalide (F). Ortalis (E).

بُكُوس هو الاسم البرازيلي. جنس طير من رتبة الدجاجيات وفصيلة البترنايات. انواعه المعروفة نحو ٢٠ منتشرة في معظم مناطق أمريكا الاستوائية. تألف الغابات والاحراج الظليلة القريبة من الماء. ملجأها الحياتي جامي. باعائها لامتدافية العدد الذي يراوح من عشرة أزواج الى مئة زوج وأكثر. قوتها التار والجوب والبذور والخرطرات المختلفة الصنائل والافان || اجسامها مستطيلة رفيعة. رؤوسها صغيرة. مناليدها كبيرة، جالسة، مدبة الملاط. اعناقها مستطيلة. اجنتها مستديرة. اذناها كبيرة مزرونية الاطراف || أنوارها تختلف مع الانواع، ويكثر فيها الخضار الزيتي والشفية والشفة || النانها أصغر قدماً من ذكورها وتصل بنفس الاثواب || تدث اعشاشها في الاجار الرقيقة. انانها تحسن وسعها من ٤ الى ٥ بيضات على مرتين في الخط. الترخيم يستمر نحو اربعة اسابيع. الذكور تزين الحامية والنداء || تعتبر من الطرائد المزيمة. لحومها فاخرة الصنف، مرغوب فيها || أشهر انواعها وأمرها:

Ortalis ruficeps (S).

Ortalis motmot (S).

Ortalis veluta (S).

Lantzia (S).

Lantzia (F). Lantzia (E).

جنس حيوانات متعينة من الرخويات مديات الارجل وفصيلة القننات. انواعه المعروفة قليلة العدد اعطتها بعض جزر المحيط الهادي. تعيش في المناطق قوتها المواد النباتية والاشباب || اصداها صغيرة القند، محلزة، قصيرة القوائم الاشد. رؤوسها بيضية مقعوية. لواسها مبطلة سبانية الشكل، ارجلها وحيدة مستعرضة.

Fallenia (S).

Fallénie (F). Fallénie (E).

جنس حشرات من فصيلة القرمصات ودية ذوات الجناحين انواعها المعروفة خمسة اصطناعها بعض المناطق الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها ضخمة، شبه بيضية الشكل، كثيفة السلي، تطول من ٩ الى ١٦ م. رؤوسها مستعرضة، قليلة النشور، حوزتها كبيرة، فارقة عند الشقين. قرونها الاستشافية صغيرة، ثلاثية الفصل. ملابسها نحيلة. اصطناعها صغيرة. كواسلها محبوبة. يطونها مستعرضة، شبه مقعوية المؤخر. رؤسها شبه شفافة، شفاها غضاب تني باحت. قوائمها متعددة الطول || جميعها وائمة تألف الغابات والمروج حيث تكثر الانجرار. يرقاتها خاضلة ودائمة وبعضها نائل.

Unone odorant (F).

٣١١١٧ - يَلاَنج

هو البون، اعطيه.

٣١١١٨ - يَلاَنج

اليلق: الهمية البيضاء من عز ار بقرة. ج يلق.

٣١١١٩ - يَلاَنج

هو عيد الد، اعطيه.

Bots d'Aloès (F).

بُكُوس

يلوكو

يَلاَنج

يَلاَنج

Source (F). Spring (E).

هو الماء الذي ينبع من الأرض. والنباتات حبيطة الاشكال تختلف باختلاف مصادرها واسرارها. منها الشجيرة والمتقطعة وللمسرة والرقية والارزوازية، الخ.

Fontinal (F).

نمت تعريفي يطلق على ما يعيش في الينابيع أو على ما تحويه مياهها من املاح ورواد معدنية.

Lalpoa ٣١١٣٥ - يَمُور

جنس طير من فصيلة الشقيانيات. انواعه قليلة جميعها كبيرة الجثة قمرها قدر الحية. رأسها كثري الريش المستطيل. منقارها صغير وضعيف. اجنتها عريضة مستديرة. ذنبها متوسط الطول. اسنانها قوية. اذنوا الى الزرقاء الزرقية. اجنتها الى الزرقاء الباقية عليها تخطيط متعرج فيه الابيض والاريد والاسود. ريش عنقها وريشها ابيض الانتشاب اسود الجسم || تألف السهل المنبسطة الكثيرة الادغال، القليلة الشجر. تميش ذكرًا وأنثى كالحمام. اسرارها متوسطة المدد يراوح عددها من ١٢ الى ٢٠ زوجًا. قوتها الحبوب والخشرات من نصليات الاجنحة ويستقيها || انثاها لا تحسن البيض بل تضعه في محض من الرمل والورق تحضره على شكل قلة صغيرة قطرها يراوح من ٤٠٠ الى ٥٠٠ سم. وعلاها من ١٠٠ الى ١٥٠ سم. تصرف بيضها في القلة على عمق ٣ او ٤ سم. صغرها متتابعة ابتداء من الاسفل. وهي تعيش في موطنها الحولي الذي يستمر نحو خمسة اشهر من ١٠ الى ١٢ بيضة بحدل بيضة واحدة كل ١٣ يومًا. أما البيضة فتختلف بعد وضعها ياسويين من فرخ نشيط كاسي الريش يدر امر نفسه يدور عنه.

Onychiurus, Lipura (S). ٣١١٣٦ - يَمُور

Onychiure, Lipure (F).
جنس حشرات دامت من فصيلة النخوريات. انواعه المعروفة متوسطة المدد، منتشرة في بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة، مستطيلة الشكل، مبدرة الحلق، تطول من ٢ الى ٣ م. اذنوا تراوح من الرمكة السمراء الى البياض الاغبر المواج. رؤوسها مفلطحة متخرقة الى الاسفل. حيزها طامسة. بطونها مفلطحة خفية المؤخر. قوتهاها قصيرة. اسرارها ثنائية الاقطار للزرقاء الازرقية للاستوائية || مبدولة في المواقع الرطبة ونمت الحجابة وفي الجلالة.

Onychiuridae, Lipuridae (S). ٣١١٣٧ - يَمُوريات

Onychiuriidae, Lipuriidae (F).
فصيلة حشرات دامت من رتبة النخوريات. اجنتها وانواعها المعروفة قليلة المدد منتشرة في معظم اقطار البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة، مبدرة الحلق، تطول من ٢ الى ٤ م. رؤوسها مفلطحة، مائلة. حيزها طامسة. قرنها الاستشعادية صغيرة رباعية القصل. صدورها ثلاثية المقلات الاستشعادية، اصغرها الكحول. بطونها سداسية السكم. قوتهاها قصيرة. اسرارها ثنائية الاقطار للزرقاء الاستوائية للقه || اشهر اجنتها النخور.

Triton (S). ٣١١٣٨ - يَمُور

Triton (F). Trumpet-shell (E).
جنس دويبات بحرية من الرغويات وفصيلة الينوسويات.

Hymenanthra (S). ٣١١٣٥ - يَمُور

Hymenanthra (E).
جنية معمرة برية وزراعية تربيته من فصيلة الينوسويات. شكلها قريب الشبه بالبرنج. ساقها تملو نحو ١٠٠ سم. افتادها مضطبة السك. اوراقها صغيرة متعالية جلدية الاتصال الخروطية الشكل تطول من ٣ الى ٤ سم. ازهارها محورية الارتكاز، قصيرة المالحق، خاسية التركيب، يفساه اللون، يطولها موج اصفر. ثمارها جنية يصير الحمص، لونها الى البنفسجي الموشح بالابيض || تنويرها ربيعي.

Ormosis (S). Ormosie (F). ٣١١٣٦ - يَمُور

جنس اشجار حرجية من فصيلة القرنيات القراقية. انواعها المعروفة نحو ٢٠ منها بعض المناطق الحارة والاستوائية من القارة الاسيوية والريكة الجنوبية || سيقانها متعالية، فراء. فروصها شبه افقية الانتشاب. اوراقها مركبة، ريشية، ازهارها عنقودي التجميع. ازهارها كبيرة، جيلة اللولون المراكبة. مستحبة العرف الخافت.

Androme (F). ٣١١٣٧ - يَمُور

Andromous (E).
نمت تعريفي يطلق على الاسماك التي ترك البحر الى التبر في زمن التسرة.

Andromie (F). ٣١١٣٨ - يَمُور

Andromy (E).
اليمتورية فريضة الاسماك التي تبحر المياه البحرية الى الهيرة العذبة في زمن للتسرة.

Pélagique (F). ٣١١٣٩ - يَمُور

Pelagic (E).
نمت تعريفي يوصف به كل ما له علاقة مباشرة بالم كقولك العظم اليمية والنبوت اليمية.

Pélagisme (F). Deep-sea life (E). ٣١١٤٠ - يَمُور

اليمية حياة الكائنات الضخامة في خضم الم.

Anagyris (S). ٣١١٤١ - يَمُور

Anagrye (F).
جنس نباتات برية جنية ويمية من فصيلة القرنيات القراقية. ازهارها قليلة منها شواطي البحر المتوسط والبلاد العربية ويميز كثاره. الواحدة ينبوت || اشهر انواعها اليبوت الثن.

Anagyris (S). ٣١١٤٢ - يَمُور

أنابورس طيب، خروب الخشخوش، جرد
Anagyris foetida (S). Anagrye fétide, Bole puant, Pudis (F). Bean-clover, Sinking wood (E). Sclinkbaum, Sclinkholz (D). Anagride foetida, Fascolaria, Laburno foetido (I).

نوع من اليبوت وهو جنية برية طيبة تعلم من ٢٠٠ الى ٤٠٠ سم. اوراقه مركبة عابلة، وريقاتها ثلاثية التجميع، لفصلها سناني الصفحة، خلى البشرة، يطول نحو ٨ سم. ويعرض نحو ٢. ازهارها عنقودي الترتيب. ازهارها كبيرة اللد صفراء اللون. سفاتها عنقودية تطول من ١٢ الى ١٥ سم. وتعرض نحو ٢ سم. يزورها بفسية اللون جسمية المادة || القليل من لقع ازهارها وأوراقها ينشط الاصلاح والياه، والكثير منه مقي.



يبوت ن



ينح

اصطابها بحار البلاد الحارة والمتندلة الحارة || اصداها ببقية الشكل ، حلزونية ، ذرابة الاطراف ، جميلة الالوان المرششة والمجددة || اشهر اجناسها اليسوع والفردعة .

٣١١٤٦ - يَنْطُوبَة شَهْبَاء *

Achroia grisella (S).

Petite teigne des ruches (F).

ولهى أيضاً حطوية شهباء || فراشة من فصيلة الناريات ودية حرشفات الاجنحة . طولها يراوح من ١٨ الى ٢٠ مم . روشاشا الاماميان رجوشها الى الصبهة الشهباء اغالية من التنشيط والتجملع . روشاشا الخلفيان وربطها الى الذرة الحطوية المالح || الاثنى اكبر قدماً من الذكر || البرقة عاجية اللون ، سمراء الرأس ، تعيش في غلايا النحل من ايار الى تشرين وتقتل ما يلقعه حول النحل من اذى واصرار || وهي من الحشرات الناحية المؤذية لانها تدخل المنازل لتفترس الفراء والجلود والقرطاسية والفلين ...

٣١١٤٧ - يَنْتَع ، يَنْتَع (F). *Maturité* (F). *Maturité* (E). هو بلوغ الثمرة كالها الجسودي وقد يتم هذا اللور من حينها بعد الادراك وقبل النضج .

٣١١٤٨ - يَنْتَع

ضرب من المقيق ، حركه جوية الموالج يطولها توشع اصفر .

٣١١٤٩ - يَنْتَع *Telopea* (S). *Telopée* (F).

جنية برية وزينية معمرة من فصيلة القضييات . ساقها قرعاء تملو من ٢٠ الى ٣٠ سم . اوراقها معتقة ، نصلها اعليجي الشكل ، غرولي الزام الاخير ، يطول من ١٥ الى ٢٥ سم . ويمرض من ٣ الى ٦ سم . ازهارها عقودية التجميع ، طرفي الارتكاز . ازهارها أرجوانية اللون ، كبيرة القدة ، ثنائية الترتيب || تنورها يستمر من نيسان الى حزيران .

٣١١٥٠ - يَنْتَع هو السط الصفي ، اطبله .

٣١١٥١ - يَنْتَع *Podanthum* (S). *Podanthe* (F).

جنس نباتات عشبية عولة او معمرة من فصيلة الجريسيات . انواعها المعروفة عديدة ، بعضها من نباتات حوض البحر المتوسط . ساقها خشبية يكثر فيها التضيق . حزازية الشكل او لفتية . اوراقها مستطيلة النصل لا قياسية . ازهارها عقودية التجميع او سلبية ، تاجية الارتكاز ، جريسية الشكل ، زرقاء اللون || اشرف انواعها واشهرها ما يتبع .

٣١١٥٢ - يَنْتَع بَيْشَاء

Podanthum canescens (S). *Podanthe blanchâtre* (F). نوع من البينة الممطرة ، ساقها دقيقة خلية البشرة تملو من ٦٠ الى ١٠٠ سم . اوراقها لاطة ، بيضية الشكل ، سنائية الزام الاخير . نصلها غلي البشرة حل صفحته السطلي . ازهارها عقودية التجميع ، بيضاء اللون . تنورها يستمر من حزيران الى آب .

٣١١٥٣ - يَنْتَع جَبَارَة

Podanthum giganteum (S). *Podanthe géant* (F). نوع من البينة المحولة ، مهدا جزر اليونان . ساقها مسطحة قليلة الفروع تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . جدوها وتدي الشكل . اوراقها معتقة سنائية النصل جامدة الصلصة المسنة المختار . ازهارها سبلي التجميع ، هامي الارتكاز .

انواعها المعروفة عديدة مشتركة في معظم بحار البلاد الحارة والمتندلة الحارة || اصداها ببقية حلزونية تطلو من ٨ الى ٥٠ سم . الوانها جميلة مرششة ومجددة || اشرف انواعها واشهرها اليسوع اليسوعي .

٣١١٣٩ - يَنْتُوع *Tritonia* (S). *Tritonie* (F).

جنس نباتات دوفسية عشبية من فصيلة السوسنيات . انواعها عديدة برية وزراعية زينية . ساقها شراعية تنشيط بالازهار الالائي التجميع . اوراقها صفة سيفة الشكل او عيطية . ازهارها صغيرة القدة او متوسطة ، الوانها عديدة تختلف باختلاف النوع || زراعتها لا تتطلب عناية خاصة وهو يرب في الاربة للمسوية التركيب ، للمتندلة الانساج ، الغنية بالمواد الازوتية || اشهر انواعها ما يتبع .

٣١١٤٠ - يَنْتُوع زَعْرَافِي * *Tritonia crocata* (S).

Tritonie safranée (F).

نوع من اليسوع الزيني . ضروبه الزراعية عديدة . شراخه الزهري يملو من ٦٠ الى ١٠٠ سم . صفة سبي الشكل مستطيل النصل يمرض من ١٢ الى ١٥ سم . ازهاره سبلي الترتيب . ازهاره رباعية التجميع ، ثنائية التصنيف المتقابل لونها الى الصفار الزعفراني || تنوره يستمر طوال شهر حزيران .

٣١١٤١ - يَنْتُوع عَصَلِي الزَهَر *Tritonia scillaris* (S).

Tritonie à fleurs de scille (F). نوع من اليسوع الزيني . شراخه الزهري يملو نحو ٣٠ سم . صفة عيطي النصل محين الطرف . ازهاره سبلي التجميع . ازهاره صغيرة القدة ، ودية اللون متراكبة البلات للفتة الاطراف || تنوره يستمر طوال فصل الصيف .

٣١١٤٢ - يَنْتُوع مَدَهَب *Tritonia aurea* (S).

Tritonie dorée (F).

نوع من اليسوع الزيني السبروتي الشائع الزاعة . شراخه الزهري يملو نحو ٦٠ سم . صفة سبي الشكل يمرض من ١٨ الى ٢٠ سم . ازهاره سبلي التجميع . ازهاره كبيرة القدة لطرفا نحو ٦ سم . لونها الى البرتقالي الزاهي . تنوره يستمر من اواسط الصيف الى اواسط الخريف .

٣١١٤٣ - يَنْتُوع مَقُوس *Tritonia securigera* (S).

Tritonie arquée (F).

نوع من اليسوع الزيني . شراخه الزهري يملو نحو ٤٠ سم . صفة سبي الشكل يمرض نحو ١٦ سم . ازهاره سبلي التجميع ، مقوس الشكل . ازهاره متوسطة القدة تطلو نحو ٣ سم . وطرفا ٤ سم . لونها الى البياض العاجي . تنوره يستمر طوال شهر ايار .

٣١١٤٤ - يَنْتُوع يَنْسُوي * *Trizon tritonis* (S).

اشهر انواع اليسوع . يملو طوله نحو ٥٠ سم . يكثر وجوده في المحيط الهندي .

٣١١٤٥ - يَنْسُويَات * *Tritonides* (S).

Tritonides (F). *Tritonidae* (E).

فصيلة دوبيات بحرية من الرضويات محيطات الارجل امانيات الهاشم . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة .



يسوع زعفراني



يسوع يسوعي



ينطوية شهباء

ازهارها ضام متناهية لونها الى الزرقاء المائلة يعلوها مواج بنسجي . تنورها يستمر من ايار الى حزيران .

٣١١٥٤ - بَيْتَة خَمْلِيَّة النَّاج

٣١١٦١ - بَيْتَة الْكُفْر *Antholyza ciffra* (S).

Antholyssa cafre (F).

نوع من البقلة التريينية . شراعتها الزهري يعلو من ٥٠ الى ٦٠ سم . شرافتها مستعدة التصل المستطيل . ازهارها سنبل التجميع . ازهارها ثنائية الارتكاز تمتد من ١٢ الى ٢٠ زوجاً . لونها الى الحمرة الازرقاوية || تنورها يستمر طوال شهر حزيران .

٣١١٦٢ - بَيْتَة عُنْكَوِيَّة

Antholyza paniculata (S). *Antholyssa en panicule* (F).

نوع من البقلة التريينية . شراعتها الزهري يعلو نحو ٩٠ سم . شرافتها تعلو من ٤٠ الى ٦٠ سم . وتقرض من ٦ الى ٨ سم . نصلها لا نظمي الانسجام والتسحين . ازهارها عشكولي التجميع . ازهارها كبيرة القذ فريدة الارتكاز . لونها متراكب الصفرة والحمرة البفسجية || تنورها يستمر من حزيران الى تموز .

٣١١٦٣ - بَيْتَة كُونُو

Antholyza cunonia (S).

Antholyssa de Cuno (F).

نوع من البقلة التريينية . شراعتها الزهري يعلو من ٤٠ الى ٦٠ سم . شرافتها مستعدة التصل المستطيل . ازهارها سنبل الترتيب . ازهارها فريدة التجميع متعاقبة الارتكاز ، لا يفوق عنحا ٦ ولا يتقص من ٤ . الوانها متراكبة ، انابيبا كبيرة الصفار ، بتلاتها الى الحمرة الزاهية . تنورها يستمر من ايار الى حزيران .

٣١١٦٤ - بَيْتَق

Monsonia (S). *Monsonia* (F).

Monsonia (E). *Monsonia* (D). *Monsonia* (I).

جنس نباتات عشبية مسمرة من فصيلة الفربيقيات . انواعه عديدة ، مهدها بعض اكوار افريقية الجنوبية انحصا منتقلة رأس الرجاء الصالح . سوطها مفصلي مستطيلة . اورقها متعاقبة ساجنة . ازهارها جملة الشكل ، ضغلة الالوان ، ذكية الطرف الحامات || معظمها نبات بري وبعضها ترابي يزدهج في المزارك والحدائق . يتكاثر بالبسرود والتعقيل .

٣١١٦٥ - بَيْتِير ٥

Anomalurus (S).

Anomalure (F).

جنس حيوانات قاضية من فصيلة البيريات . الانواع المعروفة تسعة موطنها البلاد الافريقية الحارة || اجسامها متوسطة الحجم ، طولها يراوح من ٣٠ الى ٤٠ سم . وذانها من الشكل . اذانها جلطة الصف . جوارها قصير ، اطرافها حادة مستطيلة . روافلها الجانبية منحرفة . الارباع سوية اللون قراوح بين الصفرة والحمرة || تألف اللغات ، تتسلق الاجار وتطير من واحدة الى اخرى . طيرانها دائم الانحراف نحو الارباع ، سوطها لا يفوق ٣٠ . || قوتها جميع المواد النباتية || احرف انواعها واشهرها :

٣١١٦٦ - يَحْمَرِيل ٥

Anomalurus pelei (S).

Anomalure de Pele (F).

نوع من البير ، موطنه افريقية الشمالية . ثوبه الى السمرة تميم مع اقاربها من ثوب الظهر .



يشون



بير

ازهارها ضام متناهية لونها الى الزرقاء المائلة يعلوها مواج بنسجي . تنورها يستمر من ايار الى حزيران .

Podanthum trichocalyctum (S). *Podanthe à calice velu* (F).

نوع من البقلة المصرة ، مهدها اليونان . ساقها فراء تعلو من ٥٠ الى ٨٠ سم . جذرها لقي الشكل والمامدة اورقها بفسجية . نصلها لا قياسي التسنين المتبادل . ازهارها متفردية الشكل ، ثلاثية الترتيب ، طرفية الارتكاز ، زرقاء اللون ، خلية الناج ، قصبة الاذن . تنورها يستمر من حزيران الى تموز .

٣١١٥٥ - بَيْتَة عَرِيَالَة

Podanthum virgetum (S). *Podanthe à cige nue* (F).

نوع من البقلة المصرة الهولندية في جبال لبنان . ساقها عريالة ، غليظة ، مضطمة الزوايا ، فراء ، تعلو من ٣٠ الى ٤٠ سم . فروعها قصيرة منتصب . اورقها ضامة التجميع ، مركزها في أسفل الساق وفي سانية التصل ، جامدة الصفرة ، متبادعة التسنين . ازهارها بنفسجية اللون ، قصيرة الاذن ، فريدة او ثلاثية التجميع . تنورها يستمر من ايار الى حزيران .

٣١١٥٦ - بَيْتَة مَشْطِيَّة

Podanthum pinnatum (S). *Podanthe penné* (F).

نوع من البقلة المصرة . مهدها الشرق الاذن . ساقها منتصب فراء . جذرها سنزاي الشكل ، مأكول المادة . اورقها مشطية التصل ، ثلاثية او خلية التضامير الاقاياسي التفريص . عقابها الزهرية رملة التجميع . ازهارها الى الزرقاء الزاهية . تنورها يستمر من حزيران الى آب .

٣١١٥٧ - بَيْتُونِيَّة ، بَيْتُونِيَّة ، دَمْبُوز

Inoeite, Dambosa

مادة سكرية توجد في صفلات الجسم وفي اللوياء المفردة وفي مسمار النبق وورق الجوز والفتح .

٣١١٥٨ - بَيْتُون ٥ ، بَيْتُون

Cananga (S).

Canang des Molluques, Unona odorant (F). *Ylang-ylang tree* (E). *Canangebaum* (D). *Cananga* (I).

جنية برية وزراعية من فصيلة القشديات . ساقها منتصب فراء تعلو نحو ٣ اذراع . اورقها متعاقبة اهليلجية التصل . ازهارها جملة الشكل ، متوسطة القذ ، نارية اللون ، فواحة العرف المسحب . يستخرج منها بالتقطير ادمان عطرية لاذعة الصنف شائعة الاستعمال . هاد ساقها وفروعها ليلي التركيب مثير البقلة الناعمة اللدنية يستعمل في صناعة بعض الاوتار الموسيقية .

٣١١٥٩ - بَيْتَة ٥

Antholyza (S). *Antholyssa* (F).

جنس نباتات دوسية ضمنية من فصيلة السولنيات . انواعها عديدة ، برية وتريينية . سوطها شراعية تنهي بالازهار الاقاياسي الترتيب . اورقها شرفلية الشكل . ازهارها قريبة الشبه من ازهار الدلبوث || زراعتها لا تتصلب متناهية غاصة لكنها تفقد الاربعة الدالية البازرة العنصر الازدري || احرف انواعها واشهرها ما يتبع .

٣١١٦٠ - بَيْتَة اَثْيُورِيَّة

Antholyza aethiopica (S). *Antholyssa éthiopienne* (F).

نوع من البقلة التريينية . شراعتها الزهري يعلو من ١٠ الى ١٢٠ سم . شرافتها مستطيلة تعرض من ٢ الى ٣ سم .

٣١١٧٩ - **يوكا** *Yucca (S). Yucca, Yuque (F).*
Yucca, Bear grass (E). Palmenlilie (D). Iucca (I).
 جنس نباتات ممررة من فصيلة الزنبقيات. انواعها عديدة
 بعضها عشوية تملو مع العمر وتوالي السن. اوراقها
 جلدية ضمة التجميع. ازهارها متفرد يرتكز على شاربغ
 منتصبه مستطيلة. ازهارها كثيرة القد متدلية الازهار
 لا يتباينة الالوان تلبف فيها الغيرة || اشهر انواعه
 الزنبقية المحكن غرسها في اقاليم المتوسط ما يتبع .

٣١١٨٠ - **يوكا الوبية** *Yucca aloifolia (S).*
Yucca à feuilles d'aloès (F).
 نوع من اليوكا، منبتها البلاد الامريكية. ساقها نخيلة
 مستنقة منتصبه تملو نحو ٥ امتار. اوراقها الوبية الشكل
 تطول من ٣٠ الى ٦٠ سم. وتعرض من ٣ الى ٤، فصلها
 جلدي الصفحة، باحت الخضر البادي، يحري النقصه،
 ينتهي بشوكه جفوية اللون سادة الطرف. ازهارها يضاء
 اللون تطول من ٤ الى ٥ سم. ازهارها متفردية الشكل،
 كثيف التجميع، يملو من ٣٠ الى ٦٠ سم. ثمارها حقة،
 لحسية السوقة، لا مأكولة. تنورها يستمر من اوائل آب
 الى اواخر ايلول .

٣١١٨١ - **يوكا بحرية** *Yucca glauca (S).*
Yucca glauque (F).
 نوع من اليوكا، منبتها امريكية الجنوبية. ساقها منتصبه
 قصيرة. اوراقها جلدية النصل، بحرية اللون، جفوية
 الخنار، تمتد من ٢٥ الى ٣٠ طولها من ٦٠ الى ٩٠ سم.
 وعرضها من ٦ الى ١٢ سم. ازهارها الى البيضاء الاخضر
 المارج. ازهارها متفردية، كثيف التجميع، يملو من ٦٠
 الى ١٠٠ سم. ثمارها حقة جافة. تنورها يستمر من
 ايار الى حزيران .

٣١١٨٢ - **يوكا وجمل الفيل** *Yucca elephantipes, Y. guatemalensis (S).*
Yucca pied d'éléphant, Y. du Guatemala (F).
 نوع من اليوكا، منبتها الفواتيالا. ساقها منتصبه رافعة
 القاعدة الغليظة، طول من ٥ الى ٦ امتار. اوراقها
 جلدية الصفحة، حيلة الخضر، يضاء اختار المسنن.
 فصلها يطول من ٦٠ الى ١٠٠ سم. ويعرض من ٥ الى
 ٨ سم. ازهارها تطول من ٦ الى ٨ سم. لونها الى البيضاء
 الماسجي. ازهارها متفردية، هربي الشكل، يطول من ٧٠
 الى ١٠٠ سم. ثمارها حقة لحسية السوقة لا مأكولة.
 تنورها يستمر من آب الى اواخر ايلول .

٣١١٨٣ - **يوكا عينية** *Yucca baccata (S).*
Yucca à baies (F).
 نوع من اليوكا، منبتها امريكية الشالية. ساقها منتصبه
 تملو نحو ٣ امتار. اوراقها جلدية النصل غليظة الصفحة
 تطول من ٥٥ الى ١٠٠ سم. وتعرض نحو ٤ سم. ازهارها
 جرسية الشكل تطول من ٥ الى ٨ سم. لونها الى البيضاء
 الماسجي. ازهارها متبدل المتفرد يملو من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم
 ثمارها بلحية الشكل، قرمزية اللون، تطول من ٨ الى ١٢ سم
 وهي مأكولة منتصبه الطعم. تنورها يستمر من نيسان
 الى حزيران .

٣١١٨٤ - **يوكا ليفية** *Yucca filamenteux (F).*
 راجع ابرة آدم .

٣١١٧٧ - **يَهْر زَاهِر** *Anomalurus fulgens (S).*
Anomalure éctant (F).
 نوع من الير، موطنه افريقية الوسطى ابتداء من الصحراء
 الكبرى. ثوبه يرتقالي اللون. حمره وبيته بيض .

٣١١٦٨ - **يَهْر فِرَازُو** *Anomalurus fraseri (S).*
Anomalure de Fraser (F).
 نوع من الير، موطنه الفايون. ثوبه الى الوبية الحمراء.
 صدره وبيته الى الصهبة الصنابية .

٣١١٦٩ - **يَهْرِيَات** *Anomaluridae (S).*
Anomaluridés (F).
 فصيلة حيوانات لبونة قاضية. انواعها تسمة لتنتي الى
 جنس واحد || موطنها البلاد الافريقية تتميز بزوالدها
 الجلدية الجناحية الشكل القائمة على كامل حوصها من
 ساعد الجرموز الامامي الى مفصل ربيع الجرموز الخلفي .

٣١١٧٠ - **يُود** *Iode (F). Iodine (E).*
 جسم بسيط من اشباه المعادن شائع الانتشار في مياه
 البحر وفي بعض النباتات البحرية اصعبا الفرع .
 صفائحها بلورية سريعة الغلب. لونه الى الجفوة الكتينية
 البنفسجية اللؤلؤج. اثره على الجلد اصفر الخضراب. رمزه
 (I). وزنه الذاتي ١٢٦,٩٢. ثقله النوعي ٤,٩٨
 ينصهر في ١١٣°س ويغلي في ١٧٥°س. يذوب
 في الماء بمعدل ١ الى ٢٠٠٠ ويذوب في الاثير والكحول.
 يستعمل في تطهير الجروح .

٣١١٧١ - **يُودَات** *Iodato (F).*
 هو ملح حمض اليوديوك .

٣١١٧٢ - **يُورُص** *Virus (F).*
 هو الفيروس، اطليه

٣١١٧٣ - **يُورِيَتَا** هي القريض، اطليه .

٣١١٧٤ - **يُوزْبَاشِي** *Roi des rouges (F).*
 سكة بحرية تدعى ملح احمر، اطليه .

٣١١٧٥ - **يُوسْت أَفْتَدِي** *يُوسْتِي*
 هو اليومن الافندي، اطليه .

٣١١٧٦ - **يُوسِي** *Hieraciden (S). Iéracide (F).*
 جنس طير من حارة الصدور. انواعه المروفة اربعة.
 واحد افريقي وثلاثة امريكية واسترالية. جميعها من القواطع،
 اجسامها دبة. اثوابها نيرة لريش، فراء البطون. سواتطها
 مستطيلة. مناسرها حادة البهرة الحدية. ارسافها دقيقة.
 خالبها قوية. تعيش جهاجات كبيرة سرها نحو المئة.
 قوتها صغير الحيوان والمغذ والاناخي. تدن اوكارها في
 اعلى الاشجار الشاخة. حشنتها من ٣ الى ٤ رفقات
 ترصها الاناث دون الاكور .

٣١١٧٧ - **يُوسَا** *Yoga (F). Yoga (E).*
 اليوسا نخط جديدي هندي يرتكز على قواعد صوفية زهدية
 وتعارين عقلية وجسدية .

٣١١٧٨ - **يُوسِيَهِيَه** *Yogisme (F). Yogism (E).*
 الوبية مجموعة المصلحات التقنية الصوفية الزهدية والتارين
 العقلية والجسدية التي يمارسها اليوسي .



٣١١٩ - يوكا

Dlaire (F). Dally (E).

تمت تعريف يوكا على كل ما لا يدوم أكثر من يوم واحد.

٣١١٩١ - يوكا

Ephéméroptères (F). Ephemeroptera (E).

طبقة حشرات صغيرة اللد تحية تعيش في المناطق وحلى غفاف الماء. اجناسها وانواعها كثيرة المدد جميعها عدة فصائل تنتمي الى ريتين: الزنبرقيات وباليوفيات. جميعها من الحشرات التي لا تطول حياتها الاقراية اكثر من بضعة ايام في حين ان مدة حياتها البقية تبلغ الثلاث سنوات. اجناسها دقيقة مستطيلة. قوتها الاستجمارية قصيرة، اجناسها الامامية كبيرة اللد والحللية صغيرة. مؤنثها ينتهي بمخيطين في الاكبر وبثلاثة خيوط في الاثلاث. اؤنثها الى الياض الاخير تشوبه غضرة او صفرة كبيرة.

٣١١٩٢ - يوكا

lonidium, Hybanthus (S).

lonide, lonidie, Hybanthe (F).

جنس نباتات برية معمرة من فصيلة البيلنجسيات انواعها المعروفة عشرة، منها البلاد الامتواية والحارة اخسها امريكة الجنوبية || بعضها اشباح نفاذة والبيض الآخر جنات فرعاء. مظهرها ينبت في رمال الشواطئ البعيدة عن مرض المروج || جميعها طيبة جلورها مهددة.

٣١١٩٣ - يوكا

Cystoderma (S).

Cystoderma (F). Cystoderma (E).

جنس فطور عشائية من فصيلة التاروقيات. انواعها المعروفة قليلة المدد منها بعض سفوح جبال المناطق المعتدلة الحرارة || تعيش على الدبال وعلى المواد النباتية المتحللة. جميع انواعها صغيرة اللد، كاهنة الصنف، لأكولة || تتميز باخشيتها التي تلحف الساق كالاركان من القاعنة حتى اوائل الزمان الثالث || الوانها نباتية منها الاشجع والامفر والاصفر والاطمل.

٣١١٩٤ - يوكا

Wouwou

هو الجبون الربادي، اطليه.

٣١١٩٥ - يوكا

الجراد، أبو رباح، حيركاي، هكرو

Falco lithofalco, F. Gsalon (S). Faucon-émérillon, Emerillon, Rocher (F). Martin (E).

طائر من الكونج وفصيلة الصقريات. كنيه أبو رباح ويحكي الجمل جنتاسه وسرعة انقضائه وهو سر المزاج، قوي الشكية، بطاش نباح. جسمه صغير اللد، وجيل القالب، قصير الذنب. ثوبه اجس امر. صدره ويظه الى الياض الاخير الصف المروج تملو رشفة قياسية الترتيب سرء. رأسه مستعرض الشكل، عيناه كالياقوت يكتنفها اطار اصفر || وهو من القراطع محب البلاد في طلب القوت والمصيد والحق || قوته الطير والقواضم والنساء والجراد. يلدن وكه في اوطاب الصخور وفي قن الاشجار اليابسة. اناءه تبيض وتضفن من ٥ الى ٦ رفقات، ترعيتها يستمر نحو اربعة اسابيع.

٣١١٩٥ - يوكا مسجيدة *

Yucca gloriosa (S).

Yucca magnifica (F).

نوع من اليوكا السبرية المبلولة على خطوط المتوسط. ساقها منتصبة تملو نحو ٣ امتار. اوراقها جلدية النصل كثيرة المدد تطول من ٥ الى ١٥٠ سم. وتعرض من ٥ الى ٨ سم. لونها الى الخضار الباهت. حناها قليل العرض، جزوي اللون. ازهارها متوسطة اللد، يضاء اللون تملوها رشفة حمراء. ازهارها ليد التجميع يطول من ١٢٠ الى ٢٥٠ سم. ثمارها حقية جافة. تنويرها يستمر من نحو الى اواخر ايلول. سرورها واصرامها عديدة اشهرها القلعة والمقرة والحرة، جميعها جميلة القالب تعيش في المراكن.

٣١١٩٦ - يوكا مسجيدة *

Yucca arborescens (S).

Yucca arborescent (F).

نوع من اليوكا، منها اريزونه وكليفورنيا. ساقها غليظة منتصبة تملو من ٦ الى ٩ امتار. قطرها يراوح من ٢٠ الى ٦٠ سم. اوراقها جلدية النصل، بحرية اللون، شاككة المقصبة تطول من ١٥ الى ٣٠ سم. وتعرض من ٦ الى ١٠ سم. ازهارها الى الياض الاخير للمراج. ثمارها حقية الشكل، جافة السدق، حمراء اللون، تطول من ٥ الى ٨ سم. تنويرها يستمر طوال الصيف.

٣١١٩٧ - يوكا مسجيدة *

Yucca radiosa (S).

Yucca rayonnant (F).

نوع من اليوكا، منها بلاد الاريزونه. ساقها منتصبة تملو من ٥ الى ٧ امتار. اوراقها جلدية النصل، رادية اللون، تعد من ١٥٠ الى ٢٥٠ طولها يراوح من ٤٥ الى ٦٠ سم. عرضها من ٣ الى ١٠ سم. ازهارها بحرية الشكل خيرة اللون، طولها نحو ٥ سم. يحمها شراخ يراوح طوله من ٨٠ الى ١٢٠ سم. ثمارها حقية جافة. تنويرها يستمر طوال الصيف.

٣١١٩٨ - يوكا مسجيدة *

Yucca rostrata (S).

Yucca à bec (F).

نوع من اليوكا، منها المكسيك. ساقها منتصبة تملو نحو ٦ امتار. اوراقها جلدية النصل، بحرية اللون، صفراء المراج، مسلة الحمار، شاككة المقصبة، تطول من ٥٠ الى ١٥٠ سم. وتعرض من ١٥ الى ٢٥ سم. ازهارها خيرة اللون خفس المراج. ثمارها حقية الشكل، جافة السدق، تنتهي بمشمار غشي المادة احسن الطرف.

٣١١٩٩ - يوكا

Jour (F). Day (E).

اليوم هو مدى اربع وعشرين ساعة تحسب من نصف الليل الى نصفه. وله يحسب اليوم من شروق الشمس الى غروبها فهو النهار ولا يجوز تنفيذ المهام او اعلان اكثر المعبد الا خلاله. وفي اعتبار الايام يمكن تحديدها كما يتبع:

Jour de planche (F).

Jour utile (F).

Jour félicé (F).

Jour ouvrable (F).

Jour franc (F).

Jour fixe (F).

يوم الصحن والتفرغ

يوم صيح

يوم عطلة، بطالة

يوم عمل

يوم كامل

يوم معين



يوكا مجيدة




يوكا



يوكا

مُلِحَقُ الْمَجَلَّاتِ الثَّلَاثَةِ
أ - ي

ملحق



عنصر معني نادر. يوجد في بعض الأثرية الخاصة. ومزه
(Er) وزنه الانومي ١٦٧,٢٠ املاحه ورنية اللون.

Syngoides

٣١٢٠٣- آوزان

اطلب عومران.

Homozygote (F).

٣١٢٠٤- إسكالة

Homozygosity (E).

الاسالة هي تماثل العوامل الوراثية عند الحيوان والنبات.
راجع جنيس.

Strophisme (F). Strophism (E). ٣١٢٠٥- إسكاس

طسم خاص بعض النبات يقود نصال الاوراق في
الالتواء الكامل.

Méiotique (F).

٣١٢٠٦- إنيدكوي

راجع موزي.

Catabolisme (F).

٣١٢٠٧- إنهدام، إنفاهض

Catabolism (E).

الانهدام تفاعل كيميائي يسمح بتحويل المواد السائلة في
الأسمية الحية الى طاقة جهد. وهو بذلك يشكل، في
معاوضات الايض، الطور المعاكس لانهدام.

Catabolique (F).

٣١٢٠٨- إنهدامي، إنفاهضي

Catabolic (E).

نعت تحريفي يطلق على كل ما له صلة بمنشع الانهدام او
الانقراض.

Anabolisme (F).

٣١١٩٦- إنفناء، تشيد

Anabolism (E).

هو تحويل المواد المغذية الى نسج حية. وهو ما يشكل
الطور الرئيسي من معاوضات الايض.

Anabolique (F).

٣١١٩٧- إنفانسي، تشيدي

Anabolic (E).

نعت تحريفي يطلق على ما هو منحص بالانفناء او التشيد.

Plasmogamie (F). Plasmogamy (E). ٣١١٩٨- إنالة

الانالة حالة تأهب اعصابي يكون نوى الونات
شديد التقارب.

Plasmétique (F).

٣١١٩٩- ألي، بلاسمي

Plasmatic (E).

كل ما هو مشتق من الالة او ناجم عنها.

Macroptère (F).

٣١٢٠٠- أوني

نعت تعريفي يطلق على كل حشرة طويلة الجناح او
الروشن او الغد. م. دواء.

Aragonite (F). Aragonite (E). ٣١٢٠١- أراغونيت

الاراغونيت في علم المعادن صخر متبلور من كربونات
الكلسيوم. تبلوره معني قائم. ثقله النوعي ٢,٩٥ وهو
ضرب من الكلسيت الثنائي الشكل المتبلور. يستعمل في
الزخرفة المعمارية والتزيينية.

Erbium (F). Erbium (E).

٣١٢٠٢- إريوم

Protistologie (F). Protistology (E). **٣١٢١٦ - بَرِيَّةِيَّة**
البريكية علم يبحث في اول وابسط الكائنات الحية .

Exondation (F). Emergence (E). **٣١٢١٧ - بَرَاغَة**
البرازغة حصيليا هي البروز فوق سطح الماء . وهي ظهور الحفوض او التربة بعد تقلص مياه الغمر .

Exondé (F) **٣١٢١٨ - بَرِغ**
نعت تعريفي يطلق على ما برز فوق سطح الماء . يقال اراض برقية وصخور برقية .

Surrection (F). **٣١٢١٩ - سُورَى**
هو الشخصوس ، اطلبه .

Paliopilus (S). **٣١٢٢٠ - سَمَلَاڤ**
Paliopile (F) Paliopilus (E).
جنس طحالب صرخوية صغيرة القد تتميز بحوائها الحويية الشكل | أنواعه المعروفة قليلة العدد منبتها بعض الاصقاع الباردة اعشها الشالية .

Cerastophylaceae (S). **٣١٢٢١ - سَرَسْتَفِيَاة**
Cérastophyllacées, Cérastophyllées (F).
Cerastophylacées (E).
فصيلة نباتات عشية مائية من ثنائيات الفلقة . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد . جميعها عشية ، مائية ، مسخرة ، عاصمة الجذور ، ضمية الاوراق الحلقية . ازهارها وحيية السكن | اعطانها البلاد المعتدلة الحرارة تعيش في المنافع والاهوار والمغاضى والتضائق المائية الماء | اعرفت أنواعها واشهرها بشت القرد المعروف ايضا بحامول الماء ونضوش الحوت .

٣١٢٢٢ - سَمَالَة
المعالة من الحشرات والنباتات هي الاشئ التي تقضي على بطنها فور الانتهاء من البال او الكوم كاسرودة والحرب والرتيلةاء ...

Plasmétique (F). **٣١٢٢٣ - پلاسَمِي**
راجع انلي

Béllidé (F). **٣١٢٢٤ - بِلْدُوس**
حيوان لون من الجرابيات الشاجرات يدعى بروس ، اطلبه .

Hypopharynx (F). **٣١٢٢٥ - هُڤَفَرِيْخ**
Hypopharynx (E).
الجزء الداخلي من فم الكثير من الحشرات . وهي امتداد للبلعوم . وعلى هذه البلعمة ، الناشزة عند غشيات الاجنحة وتستقيمتها ، يوجد الكثير من العقد العصبية متا يلى علي انها مركز احساس خاص لا يزال مجهول الغاية حتى الآن .

Mésozoïque (F). **٣١٢٠٩ - أَوْسْتِيْبِي**
Mesozoic, secondary stratum (E).
نعت تعريفي يطلق على ارضين الاباج الثاني المعروف ايضا بالاوسط .

Blastoceros (S). **٣١٢١٠ - اَبِلُ الْفَالِكِي**
Blastocère (F).
حيوان لون مجز من فصيلة الابلات . موطنه فاني امريكة الجنوبية . يعيش جماعات قليلة العدد . اجله مؤلف من ذكر مانع وثلاث او اربع اناث مع ارشادها | جسمه بطول نحو ١٢٠ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ ٥ سم . ارتفاعه ٧٥ سم . ثوبه الى الشقعة السمره السفلى المواجه - عينه مطوئة بالابيض . قرنه مصمت ، ثلاثي الشعب ينصله كل عام | الاثنى جسماء ، ضرعها ثنائي الاختلاف ، تحمل نحو ٥ اشهر وتضع من مغفور الى مغفورين .

Petsurus, Belideus (S). **٣١٢١١ - پَتُوس ، بِلْدُوس**
Pétaure, Béliidé (F).
جنس حيوانات لينة من الجرابيات الشاجرات وفصيلة الفلجربيات . انواعه المعروفة ثلاثة موطنها استراليه والجزر المجاورة . جميعها سحوية المسرح . تألف الغابات والحراج ، تنبت في النهار اما في تجاوب الأشجار النخرة او على قننها | اجسامها صغيرة . آذانها كبيرة . انذابها مستطيلة منقطة الاطراف - قوائمها الامامية أقصر من الخلفية - اصابعها خماسية حادة الاطراف . اصرانها ناعمة ، لينة . اغشيتها الابطلية جلدية تمتد من الايدي الى الارجل . انانها مجهزة بجواب عند اسفل البطن تقيم فيه الرضيع حتى الفطام | اما انواعها الثلاثة فهي :
- پَتُوس أسترالي
- پَتُوس سنجابي
- پَتُوس قصير الرأس

P. australis (S).
P. asiurus (S).
P. breviceps (S).

Bathydrique (F). Bathydric (E). **٣١٢١٢ - بَئِد**
نعت تعريفي يطلق على كل كائن يعيش في غور الماء | تقول العلم الشدية والنوب البئدة .

Inné (F). Innée (E). **٣١٢١٣ - بَئَوِي**
نعت تعريفي يطلق على ما هو اثل في المنطوق . وهو بذلك يرادف عقيقي (Congenital) يقال صفة بئوية وعامة بئدة .

Bathyblus (F). Bathyblus (E). **٣١٢١٤ - بَئِدِيَّة**
اسم يطلق على كتل ملامية توجد في قاع البحر . يقول فيها العالم دوكسلي وبعض علماء الطبيعة انها الحالة الاولى من المادة الحية .

Protiste (F). Protiste (E). **٣١٢١٥ - بَوِي**
كائن حي وحيد الخلية . جسمه وسومه المصقفة حتى الآن تجعله متارجما بين النبات والحيوان . ومن العلماء من قال انه اقرب الى النبات منه الى الحيوان .

٣١٢٣٨ - **تَاسَايَة** (F). Isostasy (E).
نظرية حصيلية ترتكز على تعامل القوى المحركة النابذة والمماسية.

٣١٢٣٩ - **تَكْيُس** (F). Enkystement (F).
Encystation, Encystment (E)
التكيس، في علوم التاريخ الطبيعي والبيولوجية والطب، هو الالتصاف الكلي بشيء معين يسمى كَيْسًا.

٣١٢٤٠ - **تَائِي الْأَوَّلِي** (F). Mésozoone (F).
Mésosoon (F).
كان مركزه بين الأولى والثواني، يتركب من حبيرة مركزية تغلفها حبيرات مسطحة حلزانية. أما الرضيلة فلا وجود لها.

٣١٢٤١ - **جَلِيم** (F). Loricée (F).
تتمتع تعريفى يطلق، في علم النبات، على كل حبة أو بذرة غلافها الخارجي جامدة و يطلق في علم الزولوجية على كل جسم تغلفه صفاق عظمية.

٣١٢٤٢ - **جَزْر** (F). Troncature (F).
حالة الشيء المقطوع جزء منه.

٣١٢٤٣ - **جَزْرُوق** (S). Lithocranus Walleri (S).
Lithocrane, Généruk, Gazelle-Girafe (F).
جزرئوق هو الاسم الصومالي. حيوان لبون من الغنم، وحيد الجنس والنوع. موطنه يمتد من الصومال إلى شرقي الكونغو. ملجئه الحياتي جماعي. أجله يمد من ١٧ إلى ١٥ يرسه ذكر مانع أو ذكران وما تبقى ثالث وظلى. لونه الأشباب خضراء وباهية، وأوراق بعض الأشجار أحصنها المستطاح | شوته يشبه الطرافة جسمه بطول نحو ١٦٥ سم. ارتفاعه ١٠٠ سم. قرنا الذكر منقفا الطرف المنحني. عناء كبيرتان، متوجتان بقبضة بيضاء. أذناه صغيرتان جالستان. عنقه شديدة الطول. حاروكه أرفع من كفه كما في الطرافة. ذنبه قصير ورفيق، ينتهي بخصلة من الشعر. الأثني جساء، ثنائية الإخلاف، لرفية الطلى | ثوبه إلى الفضة السوداء. رأسه وفقره شديدة السمرة. الأثني إلى السمرة السوداء باستثناء البطن الأبيض الأغبر.

٣١٢٤٤ - **جَزْرُوق** (F). Adéphage (F).
تتمتع وصفي يطلق على كل مقررر يتميز بالشرامة إن حيوان أو حشرة.

٣١٢٤٥ - **جَزْرَانِي** (F). Caroténols (F).
Carotenoid (E).

تتمتع تعريفى يطلق على كل ما له صلة بالكاروتين المعروف أيضًا بالجزرين. الشقاقات الجزرانية شفاحات صفراء وبرتقالية وحمرها اللون يكثر وجودها في النبات والحيوان. وهي غير قابلة الانحلال في الماء إنما تذوب في بعض الشحومات.

٣١٢٣٦ - **بُوغَنَة** (F). Sporogonie (F). Sporogony (E).
البوغنة، في علم الزولوجية، طريقة تلقيح خاصة ببعض التوالى.

٣١٢٣٧ - **بُوغِيَّة** (F). Sporophyte (F). Sporophyte (E).
طور من أطوار التكوين الشوئي عند النباتات اللاشعوية من نباتات البوغ وهي بذلك تكمس النمامة عند النباتات الشعية.

٣١٢٣٨ - **بُوغِيَّة** (F). Sporose (F). Sporose (E).
البوغية في علم النبات هي إبراز البوغ ونشره عند السراخس ولشامها.

٣١٢٣٩ - **كَبَائِن مَشْرِي** (F). Hétérothallisme (F).
Heterothallism (E).
التباين المشري، في علم النبات، حالة تكون فيها الغامات الذكرية والأنثوية ثنائية من هيامات مختلفة الشعية أيضًا.

٣١٢٣٠ - **كَبُك** (F). Autochtonie (F).
Autochtony (E).
صفة الشيء الموجود طبيعيًا وأساسًا في مكان جنائى معين.

٣١٢٣١ - **تَجْرِيم** (F). Accouage, Accouage (F).
Lighterage (E).
التجريم هو نقل البضاعة من رصيف الميناء إلى السفينة أو من السفينة إلى رصيف الميناء. لذلك فالتجريم يعني الشحن ويعني التفريغ أيضًا.

٣١٢٣٢ - **تَرِيَّة** (F). Terrigène (F). Terrigenous (E).
تتمتع تعريفى يطلق على الرسوب المتركمة في قعر البحار والمالحة إلى انصحات وانجحات الأتربة القارية.

٣١٢٣٣ - **تَسَاوِي مَشْرِي** (F). Homothallisme (F).
Homothallism (E).
التساوي المشري، في علم النبات، حالة تكون فيها الغامات الذكرية والأنثوية ناتجة عن هيامة واحدة.

٣١٢٣٤ - **تَسْمِيد** (F). Placétation (F).
هي السخدة، أطلها.

٣١٢٣٥ - **تَغْيِيد** (F). Anabolisme (F).
اطلب ابتناء

٣١٢٣٦ - **تَغْيِيدِي** (F). Anabolique (F).
راجع ابتنائي.

٣١٢٣٧ - **تَكَايَلِي** (F). Isoetatique (F). Isoetatic (E).
تتمتع تعريفى يطلق، حصيليًا، على كل ما له صلة بالتعادلية الأرضية | وهو ميكانيكا الأتزان المتبادل في الخطوط والسطوح.



جزرئوق

Abomasum (F). Abomasum (E). **٣١٢٥٣ - حَافِصَة**
الحافضة الجيب الرابع من معدة المجترات .

Cénozoïque (F). **٣١٢٥٤ - حَقِيبَة**
اطلب سنويزي

Monécie (F). **٣١٢٥٥ - حِصَاوَة**
الحصاوة حالة فيزيولوجية عند المشرّبات تُسمّ بفرديّة الخلطة .

Pédologue (F). Pedologist (E). **٣١٢٥٦ - حِصْلَام**
هو صاحب الاختصاص في الحصلة اي في علم الاربة الزراعية من حيث تكوينها وطرق استثمارها .

Ovula (S). Ovule (F). **٣١٢٥٧ - حَيْدَاء**
جنس حيوانات بحرية من الرخويات مغطّيات الأرجل وفصيلة الودعيات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة | اصداؤها متوسطة القد ، شبه بيضية الشكل ، كظرة ، مقشرة الظهر ، فصيلة الصدفة الخارجية ، بيضاء اللون | اشهر انواعها حيداء الزابج Ovula ovum (S). طولها نحو ١٠ سم . لونها الى الالباس الحاجي الاسفع المواج .

Charophytes (F). Charophytes (E). **٣١٢٥٨ - حَيَّاق**
فئة من النبات معظم انواعها يعيش في المياه العذبة الراكدة وبعضها في الماء الاجاج | خضابها الى الخضار القاتم ويخرج منها عند لمس صلبة كروية | وهذه الفئة من النبات تشكل صلة الوصل بين المشرّبات والطحليّيات .

Céramiste (F). Céramist (E). **٣١٢٥٩ - حَزَاف**
الحزاف من تعاطى صناعة الخزف من نَحَار ومطلي وصني .

Céramique (F). Céramie (E). **٣١٢٦٠ - حَزَاف**
فن صناعة الآنية الخزّافية وشيها .

Ginglymostoma **٣١٢٦١ - عَطَاشَة سَوِيَّة اللون**
concolor (S). Ginglymostome concolor (F).

Ginglymostome concolor (E).
سمكة بحرية من السفنقات الاشلاق . اعطانها تمتد من البحر الاحمر الى المحيط الهندي | جسمها وشي الشكل بطول نحو ٢٠٠ سم . تتميز بزغفتها الظهرية المتأخرة الاركانز والمتقابلة مع البطنية والشرجية . ثوبها سوي اللون الاصفر .

Cryptogènes (F). **٣١٢٦٢ - عَقِيَّات الجِين**
Cryptogenous (E).

نعت تعريفي يطلق على الكائنات الحية ، من حيوان ونبات ، التي تتصف بالتنسل اللامتطور .

Caryogamie (F). Caryogamy (E). **٣١٢٦٣ - غِلَاط**
الحلاط هو اعادة نشاط الاخصاب اللاشقي عند

Dermoptera (S). **٣١٢٦٤ - جِلْبَنَات القَوَائِم**
Dermoptères (F). Dermoptère (E).

مرتبة من الحشرّيات . تسبوا في الزمن الماضي الى المهوريات ثم الى مجنّحات الايدي . ووجدوا اخيرا انها اقرب الى الحشرّيات | وهذه المرتبة تضم فصيلة واحدة تدعى كوبنّيات وجنسا واحدا يدعى كوبن .

Gymnura (S) Gymnure (F). **٣١٢٦٧ - جِمْنُور**
جنس حيوانات لينة من فصيلة الغنظنّيات ورتبة الحشرّيات . انواعها المعروفة ثلاثة موطنها جزر الزابج | اجسامها شبه اسطوانية الشكل تطول نحو ٦٥ سم . بها فيه الذنب الذي يبلغ نحو ٣٠ سم . رؤوسها مخروطية الشكل . عيونها صغيرة . اذانها مستديرة . اعناقها قصيرة . قوائمها محسنة الطول . اصابعها مجعّزة باظافر حادة . اذنيها الى النوبة الصنائية المواج . ويرها ليد ناعم يتخلّله حلب جامد شائك . اذنيها جرداء عارية | اناتها امزق فم ذو ذكورها وابنت ثوبها منها ، قوتها الحشرات والديدان والزحافات الصغيرة .

Paritétiens (F). **٣١٢٦٨ - جُولِي**
نعت تعريفي يطلق على كل نبات ينتمي الى فئة الجوليات .

Paritétiens (F). **٣١٢٦٩ - جُولِيَّات**
فئة نباتات من ثنائيات الفلقة مشيمتها تأوي الى جدار الصدقة كما هي الحال عند البضجيات والالانيات وغيرها .

Gymnorhinus (S). **٣١٢٧٠ - جِمْنُورِين**
Gymnorhine (F). Gymnorhine (S).
جنس طير من الجوائم سنّيات المنابر وفصيلة الغرابيات .
انواعها المعروفة ثلاثة اعطانها استرالية وجزر الزابج | اجسامها متوسطة القد . تطول من ٤٠ الى ٤٥ سم . مناقيرها مخروطية الشكل . اجنحتها لاحة ، زلقة . اذنيها مزعزعة | اشهر انواعها الجمنورين الزّباب (F). G. floteur طولها نحو ٤٥ سم . ثوبه اسود اللون يطوه تبيّج ابيض في القفن والجنّاح | يأنف حياة الاسر ويقلّد جميع الانعام والاصوات .

Ginkgoes (E). **٣١٢٧١ - جِنْكَوَات ، مَمَائِل**
قسم من عريانات البزور يعود ظهورها الى الحقبة البليونية من الاباح الاول | كانت ، في الماضي البعيد ، تعدّ الكثير من الانواع التي اضمحلت مع مرور الزمن ولم يبق منها في عصرنا الحاضر سوى النوع المعروف بشجرة المعبد او الجينكو وهي شجرة مقدّسة عند البوئين .

Actualisme (F). Actualien (E). **٣١٢٧٢ - حَافِيزِيَّة**
الحافيزية نظرية حصيلية تُعسّر المناشع والتطورات الارضية الغابرة بالمناشع الحاضرة مع اعتبار هذه التطورات مستمرة العمل الطبيء | والحافيزية بمفهومها الحصيلي تماكس النظرية الجليّة .



جمنور



جمنورين



عقادة سوية اللون

Danaide, Danaïs (F).

جنس حشرات فراشية من رتبة حرشفيات الاجنحة وفصيلة الدنيسيات. انواعها المعروفة نحو ٣٠ اعطانها المناطق الحارة من العالم القهم باستثناء اربعة انواع، ثلاثة منها تعيش في امريكا الوسطى ونوع واحد اعطائه تشمل حوض البحر الابيض المتوسط وتمتد حتى اورنوبه الوسطى، يدعى تنسمة بحريزيب D. Chrysalpus (S) جسمها كبير القد، ووشانها الى الصغار الاضلل تلوه زخارف بيض وسود واطار اسود منبج بالابيض | اساربعها باهتة الضمار تعيش على اوراق الصفليات.

Ptérôdespermès (F).

٣١٢٧٣ - دوشريبات
فئة من السراخس المتقرفة التي كانت شارها بزور نيلة مجنحة بدلا من وبغة.

Diatomite (F). Diatomite (E).

٣١٢٧٤ - دياتومييت
صخور صوانية نباتية الاصل تكونت من تراكم وتكتسب روبات الضفريات العائنة الى المشطورات.

Dinantien (F).

٣١٢٧٥ - دينانتيني
ساف من الحقبة الكربونية يدعى ايضا كلمي، اطله.

Melanocetus (S).

٣١٢٧٦ - دخالطة
Melanocetus (F). Melanocetus (E).

جنس اسماك بحرية لينة من شاكيات الزافات وفصيلة الكوالحات. المعروف منها حتى الآن نوعان مشتريان في لبحج المحيط الاطلسي والبحر الابيض المتوسط | اجسامها قصيرة، شبه صلبة الشكل، تطول نحو ٤٠ سم. تتميز برووسها المستفصنة وباشفاقها الكبيرة الفائرة وبكثرة اسنانها الحادة وبانباتها الناضرة المستقيمة. سنها عرياط عادم السهف. عيونها علوية الارتكاز تحتل ثمة الرأس. ويطولها في مقدم خطمها ملمس مستطيل، غضروفية المانة ينتهي ببلرة صغيرة تستصله الدخالطة لاجتذاب الاسماك.

Acutangulè (F). Acutangular (E).

٣١٢٧٧ - اقونجولي
نمت تعريفي يطلق في علم النبات على كل عضو او شكل ضيق الزوايا.

Germigène (F). Germigen (E).

٣١٢٧٨ - زالميم
راشم او راشمة نعت تعريفي يطلق جيسوريا، اي في علم الفيزيولوجية، على غنبدية في الجهاز الهضمي تحضن علية الجبلية حتى الانصباغ وذلك عند المهزات والمضغيات والمنطقيات.

Manubrium (F). Manubrium (E).

٣١٢٧٩ - روفون
الاسم الفرنسي والانكليزي من اللاتيني بمعنى رذن وكيم. والرذنين، في علم النبات، خلية من المشن التي ترتب منه اثيرة الخيفيات من الخيفيات الضضر | وهو في علم الحيوان، شبه انبوب اديم التركيب مركزه في وسط مظلة المموس يحمل في طرفه قم الحيوان.

وحيدات الخلية وذلك باتحاد نوى الوذاف المتقاربة.

Dermatogène (F). Dermatogen (E).

٣١٢٨٤ - دوديمية
الدريمة هي نسج الطبقة الخارجية من غلاف التيط في النبات.

Desmidiées (F).

٣١٢٩٥ - دوسيدييات
عسامة نباتات مائية من فصيلة البمضات التابعة الى الخيفيات الضضر. اجناسها المعروفة قليلة الحد جميعها من وحيدات الخلية تعيش في المياه العذبة | اشهر اجناسها الفسمية.

Périlème (F). Perilem (E).

٣١٢٩٦ - دويلية
الدشينة. هي نسج الطبقة الوسطى من غلاف التيط. مركزها بين الدريمة والكلمية.

Aerogénie (F). Aerogamy (E).

٣١٢٩٧ - دعالطة
الدعاطلة، في علم النبات، تطور بطرا على الانبوب الطلي فيدخل البهضة من المسم.

Alléiomorphisme (F).

٣١٢٩٨ - دعالشة
Alléiomorphism (E).

الدعاشة، في علم النبات، طور من اطوار التناسل الباتي يتميز بالتقابل الشكلي والتخالف الوراثي.

Pérolème (F). Perolème (E).

٣١٢٩٩ - دوكيمية
الدلمية هي نسج الطبقة الداخلية من غلاف التيط في النبات.

Bombylidae (S).

٣١٢٧٠ - دناتيات
Bombylides, Bombyliides (F).

فصيلة حشرات من نوات الجناحين قصورات القرون. اجناسها وانواعها المعروفة نحو ٢٥٠ منتشرة في جميع اقطار العالم اخصها المناطق الحارة | اجسامها مبطة صغيرة القد او متوسطة. رووسها صغيرة ويرة، مستطيلة الاضطام الماصة. كولسلها ويطولها مزورة. قرونها الاستشمارية قصيرة ودقيقة. اجنحتها ضيقة مستطيلة | يوقانها طفيلية تعيش في خشاوات واصقان ومحاجر غشائيات الاجنحة | اشهر اجناسها: الدانة، المترس، الماسة.

Danaidae (S). Danaidés (F).

٣١٢٧١ - دنيسيات
فصيلة حشرات من رتبة حرشفيات الاجنحة صولجانيات القرون. اجناسها وانواعها المعروفة كثيرة العدد اعطانها المناطق الحارة في جميع اقطار العالم | اجسامها رشقة، متوسطة القد او كبيرة. ووشانها مزورة، جميلة الالوان، مستهيرة الاطراف. قرونها الاستشمارية صولجانية الشكل | اساربعها غاصلة تعيش على اوراق النبات | اشهر اجناسها الدنيسية.

Danae (S).

٣١٢٧٢ - دنيسية



ذخالطة

ولو كان جزئياً ، الحاصل في البلاد السكتانية منذ تَلَفُّص السبك او هبوطه .

Ontogénétique, Ontogénique (F). **رَوْدَكِي** ٣١٢٨٩ -
Ontogenetic (E).

نعت تعريفي يطلق على كل ما له صلة بالروضة اي بشوهِ الكائنات .

Glyptognose (F). **رَوَقْشَة** ٣١٢٩٠ -
Glyptognosy (E).

الروقة هي معرفة وتمييز الحجارة المنقوشة القديمة العهد .

Cinérîtes (F). **رَوَقْد** ٣١٢٩١ -
الرومد رمد بركاني مُنْقَد .

Sorculus (S). Soriculus (F). **رُؤَيْبَة** ٣١٢٩٢ -
Soriculus (E).

جنس حيوانات لئونة من فصيلة الزبائيات وربة الحشرات . انواعها المعروفة خمسة اعطائها المناطق الجبلية الاسيوية اخصها الهنـ والصين || جميعها صغيرة القد ، مستطيلة الذنب . قوتها الحشرات والديدان .

Abortif (F). Abortive (E). **رُوحِين** ٣١٢٩٣ -
نعت تعريفي يطلق في علم المواليد والنبات على الاعضاء والثمار التي تسقط قبل اكتمال نموها .

Pyrhocoris **رُوحَاَلَة** ٣١٢٩٤ -
جنس حشرات ناعمة من نصفيات الاجنحة وفصيلة الزغاليات . انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم

قطار العالم || اجسامها اهليجية ، مبططة ، طولها ٧ الى ١٢ مم . رؤوسها معتدلة الجرم . عيونها صغيرة ناشزة . قرونها الاستشعارية رباعية الفصـ المسططة . بطونها سوداء اللون او حمراء . اجنتها ملونة بكثـ فيها التبقيع والتنجيع || تألف بمظهرها الحياة الجماعية . شراندها تذ بعض الحشرات . قوتها اوراق النبات وما تستطيع اقتراسه من حشرات وهوام .

Pyrhocoridae (S). **رُوحَاَلِيَّات** ٣١٢٩٥ -
Pyrhocorides (F).

فصيلة حشرات من رتبة نصفيات الاجنحة المختلفة | اجنتها وأنواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم اقطار البلاد المعتدلة الحرارة .

اجسامها اهليجية او بيضية الشوزن ، معتدلة التنبيط ، طولها من ٧ الى ١٥ مم . رؤوسها صغيرة . عيونها بارزة . قرونها الاستشعارية رباعية الفصـ اعطائها مستطيلة ثلاثية الطل || اجنتها متقاوـ الطول ، معظمها نصفية وبعضها يلحف اكثر من زامين || قوائمها نشيطة معتدلة القد || معظم انواعها ناهـ قوته النبات وما يستطيع اقتراسه من حشرات || اشهر اجناسها الزخالة .

Dlécia (F) **رُوكَاوَة** ٣١٢٩٦ -

الزكاوة حالة فيزيولوجية عند المشرّبات تسم بازنواجية الخلطة .

Mécatable (F). Mécatable (E). **رُوسِس** ٣١٢٨٠ -
نعت تعريفي يطلق فيزيائياً وكيمائياً على كل نظام او تركيب ثباته الظاهري يشكو من ندّة الوجود .

Lycopodiales (F). **رُوسِيَّات** ٣١٢٨١ -
فئة من النبات عاشرت بانواعها العديدة المختلفة الاشكال جميع الازمنة الحصلية منذ الحقبة الديفونية || انواعها المنقرضة شملت الكثير من الاشجار التي كان ارتفاعها يراوح من ٢٠ الى ٢٥ م . والتي كانت تشكّل معظم غابات مناطق الحقبة الكربونية || وما طبقات الفحم الحجري سوى بقايا هذه الاشجار المنصودة || اما الانواع المعاصرة فجميعها عشبية تبسجها فصيلة النضريات .

Batholite, Batholith (F). **رُوسِيْمَة** ٣١٢٨٢ -
اسم يطلق في علم الحصلية على كتل كتلة من الطخ او الصخور الثوّارة لا تيسية الشكل اما مستعرضة القاعدة .

Périgyns (F). Périgynous (E). **رُغِيل** ٣١٢٨٣ -
نعت تعريفي يطلق على توجـ الزهرة واسبتها عندما تكون متبجعة في الكأس حيث تشكل طوقاً يحوق بالمبيض .

Périgynique (F). Périgynio (E). **رُغِيْلِي** ٣١٢٨٤ -
نعت تعريفي يطلق على شكل من اشكال امتزاج الاسمية في كمّ الزهرة او حول المبيض .

Enicurus (S). Enicure (F). **رُؤَيْبَة** ٣١٢٨٥ -
Enicurus (E).

جنس طير من الجوائم سبّات المناقير وفصيلة الذعريات . انواعها المعروفة عشرة اعطائها نعتاً من الهند الى المازية || اجسامها معتدلة القد ، طولها ٢٥ الى ٢٨ سم . بما فيه الذنب الفارق المستطيل الرّفال || ثوبها سوداء اللون ، مبلّقة بالابيض || تألف ضلف مجاري الماء . قوتها الحشرات والديدان || تتغنّ لماحصرها في المواقع الوعرة المنيمة الشارئة على مجاري الماء . انثا تبسج من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها بتناوبة الذكور نحو ١٤ يوماً .

Glyptographe (F). **رُغَاَش** ٣١٢٨٦ -
Glyptographe (E).

الرغاش من تماطي الرقاشة اي علم الحجارة المنقوشة القديمة العهد .

Glyptographie (F). **رُغَاَشَة** ٣١٢٨٧ -
Glyptography (E).

الرغاشة هي علم الحجارة المنقوشة او المحفورة القديمة العهد .

Epirogénique (F). **رُكَاَجِي** ، **رُكَاَجِيَة** ٣١٢٨٨ -
Epirogenic (E).

نعت تعريفي يطلق على الحركة العمودية التي تصيب بعض اجزاء الكتل الثوّارة . مثالنا على ذلك الارتفاع المستمر .



ريلة



زينة

٣١٣٠١ - زُمَّة (F). Étations (F).

اسم يطلق على رباح خاصة تهب فوق البحر الأبيض المتوسط وصفات حوضه. مصدرها تلوبي من الشمال ومن الجنوب، يحركها التهب الشديد فوق الماء ودرجة حرارة الصحاري، من الصحراء الكبرى إلى الجزيرة.

٣١٣٠٢ - سَحْلَدَة (F). Piceation (E).

السحلبة في النبات هي كيفية الفراج السند داخل المبيض. وقد تكون على ثلاثة أشكال: محورية أو جولية أو مركزة.

٣١٣٠٣ - سَحْرِي (F). Aboral (F).

نعت تعريفي يطلق في علم الزولوجية على ما هو كان في الناحية المقابلة للقدم عند الحيوانات النابتا.

٣١٣٠٤ - سَعَارَة (F). Géothermie (F).

السعارة هي حرارة الأرض.

٣١٣٠٥ - سَعَارِي (F). Géothermie (F).

نعت تعريفي يطلق على كل ما له صلة بحرارة الأرض.

٣١٣٠٦ - سَفِيل (F). Sphenophyllum (S).

جنس نباتات متحجرة من فئة السفيليات. جميع أنواعها جذموية، عشبية، موقرة. منبتها المنابع والغدران.

٣١٣٠٧ - سَفِيلِيَّات (F). Sphénophylées (F).

فئة نباتات متحجرة ظهرت في الحقبة البليونية وانقرضت في البرمية من الأماج الأول إلى آخره. ينال ان الانسوحات سوية البوغ تنحصر منها تلك لأن نقط الشبه بينها لا تقل عن ٨٥٪.

٣١٣٠٨ - سَلَّة (F). Pinnule (F).

السلة ورقة لا تيمس الشكل، غالباً مستطيلة.

٣١٣٠٩ - سَبِيل (F). Sapropel (F).

السبيل حمأة تننت تعود إلى بقايا حيوانات مجهرية رست في قعر البحار ففسختها البكتيريا.

٣١٣١٠ - سَبِيلِي (F). Sapropelique (F).

نعت تعريفي يطلق على المادة المصفوبة المماثلة إلى العلم والنبت التي فسختها المياه النابتة.

٣١٣١١ - سَبِيلَك (S). Cimbex (S).

جنس حشرات ماصة من غشائيات الاجنحة وصفلة السبيليات. انواعها المعروفة نحو ٢٠ اعطانها بعض مناطق البلاد المصقلة الحرارة. تألف الغابات والحراج الطويلة اجسامها كبيرة، شديدة النشط. اعطاهم ماصة، لزوجها الاستعمارية صفة الاطراف. انوابها

٣١٢٩٧ - زُمَّة (F). Melipona (S).

جنس حشرات ماصة من غشائيات الاجنحة وصفلة الزمميات. انواعها المعروفة نحو ٦٠ اعطانها المناطق الاستوائية والحرارة اجسامها معتدلة القد أو صغيرة، محبة البطون، خفيفة القشار، عادية الشذام. ملجنها الحياتي جماعي كالنحل. لولها يتكون من ثلاث فئات: الانثى ثم الذكور ثم فئة الماملات المماثلة الشوار الشقي. انثيا تطول، حسب الانواع، من ١٢ الى ٢٧ سم. ذكورها تطول من ١٠ الى ١٤ سم. اما عاملاتها فتطول من ١١ الى ١٥ سم كوزارتها او مجاجرها محرسه، شبه هرمية الشكل، لواعدها سطوحها. نخاريها صفوف افقية الارتكاز تستعملها الانثى لمتح السرد. اما رحيق الزهار التي تنجبه الماملات فتتخاربه اجرة بصفة الشكل مركزها في الزام الاول اي الاسفل من الكوزارة عسلها يختلف مع اختلاف الانواع والمراعي. اما الإنتاج الحولي فيفروج من ٢ الى ٦ كيلو اعرف انواعها واشهرها الثلاثة التالية:

- زُمَّة النَّزَارِل (S). Melipona scutellaris (S).

أكبر انواع الزمزع واعلمها انتشاراً. عسلها جيد الصنف، ضربي العرف، مستحب الطعم. انتاجها الحولي نحو ٦ كيلو.

- زُمَّة النَّزَارَوَاي (S). Melipona fluvipes (S).

متوسطة القد والانتشار. عسلها جيد الصنف، عطري العرف، مستحب الطعم. انتاجها الحولي نحو ٥ كيلو.

- زُمَّة أَتْكَسَوِي (S). Melipona exul (S).

متوسطة القد. ترى في كوزارات خاصة تعلق على الاشجار. عسلها طيب، مقو، ناعظ، مستحب الطعم. انتاجها الحولي نحو ٣ كيلو.

٣١٢٩٨ - زُمِّيَّات (F). Meliponidae (S).

فصيلة حشرات من رتبة غشائيات الاجنحة. اجسامها وانواعها المعروفة متوسطة العدد. اعطانها بعض المناطق الاستوائية والحرارة من المالمين القديم والجديد اجسامها شبيهة اجسام النحل لكنها اصغر قد ولا غشام لها. جميعها ماصة. معظمها يقيم كوزارته في جذوع الاشجار النخرة | ملجنها الحياتي جماعي كالنحل. لولها يتألف من اثني كاملة الشوار الشقي وظليقتها متح السرد. ومن بعض الذكور وظليقتها كوم الانثى المماثلة. ومن عاملات عادية الشوار الشقي تنشد الكوزارات وتربي فيها النخاريب وتجنو الرحيق والطلع | أشهر اجسامها الزممة والصواعة.

٣١٢٩٩ - زَبَلَف (F). Spermate (F).

الزبلف اسم يطلقه علماء النبات على البوغ الخارج، الخيطي الشكل، عند بعض الطيور والخفيات.

٣١٣٠٠ - سَبِيلَارِيَّات (F). Sigillariées (F).

مجموعة نباتات متحجرة قريبة الشبه بالهشوميات. تميزت بسهولة الفصمة الكبيرة وبأوراقها المركبة المنتظمة التصيق الطولي.

الزمنية عن رباطه الخفي في بعض الألفيات أحصاها المشطورات.

Stèle (F). Stèle (E).

٣١٣٢٠ - **سُطَاب** ◊
الشطاب، في علم النبات، هو الجزء الداخلي من الجذر أو الساق الذي يشمل الأوعية الخشبية وافية النجب.

٣١٣٢١ - **سُطَاخ** ◊
Acrogène (F). Acrogenous (E).

نمت تعريفي يطلق على كل فطر نوعة ساقه وأرسته رأسية السخاخ.

٣١٣٢٢ - **سُطَاكَة** ◊
Hétérozygotie (F). Heterozygosity (E).

الشبابية هي عدم تماثل العوامل الوراثية عند الحيوان والنبات | ومنهم من قال اختلائية الأزواج. راجع اشيب.

٣١٣٢٣ - **سُطَاوَج** ◊
Travertin (F).

حجر من الفليس الجبسي يصلح للبناء.

٣١٣٢٤ - **سُطَام** ◊
Pétrographie (F). Petrograph (E).

السُطَام من تعاطى الصنامة أي علم الصخور.

٣١٣٢٥ - **سُطَلَر** ◊
Halietur (S). Halistur (F). Halistur (E).

جنس طيور من الكوليسر وفصيلة الصقريات. أنواعه المعروفة ثلاثة أعطانها الهند وآسية الشرقية وأستراليا | أجسامها شبيهة بأجسام الحبان إلا أنها أصغر قدًا. أطوالها تراوح من ٥٠ إلى ٦٠ سم. أتلوانها نثائية اللون. رؤوسها واعتاقها وصورها بعض. أربيتها وسواطها وأطراف بطونها وانخادها وأتلوانها إلى الشقعة السمر، أواجها يختلف مع اختلاف الأنواع | تألف السطوط البحرية والموائي. تطغس في الماء كاللورس. قوتها الأساك وكل ما تيسر لها من مواد عضوية.

٣١٣٢٦ - **سُطَاوَعَة** ◊
Trigone (S). Trigone (F).

جنس حشرات مسالة من غشائيات الأجنحة وفصيلة الزمغيات. أنواعها المعروفة قليلة العدد أعطانها المناطق الاستوائية | أجسامها شبيهة بأجسام النحل لكنها أصغر قدًا ولا شدام لها إنما تعض وعضتها مؤذية | ملجئها الحياتي جعاعي كسائر أنواع الزمغيات. شديد كزارتها على الأشجار وعلى الصخور. تنهبها بالطين وتغلفها بمختلف المواد النباتية. مداخلها فريدة أنوبية الشكل، تسمع بمرور صواعة واحدة. نشاربها ألتية الارتكار. أجرة الصل بيضيه الشكل، صغيرة القد، تحتل الزام الأول والثاني من الكوارة | عملها دون الوسط. أتلانها الحولي نحو ٥ كيلو.

٣١٣٢٧ - **سُطَوَيْي** ◊
Phylétique (F). Phyletic (E).

نمت تعريفي يطلق على التسلسل الكينوني في الحيوان والنبات.

ملونة، يكثر فيها الأصابر | يرقاتها خاضعة ثلثهم أوراق معظم الأشجار الحرجية باستثناء الصنوبريات. وريقاتها هذه تفتت، عند الذئاع عن النفس، بسائل أخضر اللون كالو. طور الإكمال يقضي ضمن فليجة سمره اللون تحببها على الأتافد أو على الأوراق المروية.

٣١٣٢٨ - **سُطَكِيَّات** ◊
Cimicidae (S). Cimicidés (F).

فصيلة حشرات من رتبة غشائيات الأجنحة. أتلانها وأنواعها المعروفة متوسطة الحد منتشرة في معظم أقطار البلاد المعتدلة الحرارة. يكثر وجودها في اللبابات والحراج الجبلية | أجسامها متوسطة القد أو كبيرة، مغطيتها ماصة. قرونها الاستشارية مسددة الطول، صلبة الأطراف | يرقاتها خاضعة، مؤذية عند كثرتها | أشهر أتلانها السنبك.

٣١٣٢٩ - **سُطَقْس** ◊ ، **سُطُور** ◊
Suncus (S). Pachyura (F).

جنس حيوانات لبونة جاسة من فصيلة الزبابيات ورتبة الحشرات. أنواعه المعروفة نحو ٢٠ أعطانها بعض مناطق العالم القديم أعضها الهند وأريقية وجزيرة مدغسكر | أجسامها صغيرة القد تطول من ٧ إلى ١٢ سم. رؤوسها مخروطية الشكل. عيونها خريزية. أذنها صغيرة. جرامزها مسددة الطول. أصابعها مجهزة بأظافر حادة. أتلانها طويلة. أتلوانها متباينة الألوان السوية تكثر فيها البسة والسمره القاتمة | أتلانها أميز قدًا من ذكورها وأتلانها ثوبًا منها | قوتها الحشرات والديدان.

٣١٣٣٠ - **سُطَوُي** ◊ ، **سُطَوُي** ◊
Cénozoïque (F). Cénozoic (E).

نمت تعريفي يطلق، حصليًا، على برهة من الزمن تشمل الأحقاب التي توالى منذ الحقبة النيواليتية إلى المعاصرة.

٣١٣٣١ - **سُطَوِي اللَّوْن** ◊
Concolor (F). Self-coloured (E).

نمت وصفي يطلق على ما كان ثوبه متساوي اللون الواحد.

٣١٣٣٢ - **سُطَوِي اللَّوْن** ◊
Isosporé (F). Isosporous (E).

نمت تعريفي يطلق على كل نبات من مستورات الزهر الوعائية بوجه متجانس الشق والشكل.

٣١٣٣٣ - **سُطَوِي** ◊
Atypique (F). Atypic (E).

نمت تعريفي يطلق، في علم النبات، على كل تسلسل علوي يذ عن القش الثاني.

٣١٣٣٤ - **سُطَوُوس** ◊ ، **سُطَوُوس** ◊
Surrection (F). Upheaval (E).

الشخصوس، حصليًا، هو الارتفاع الذي يطرأ على مكان معين من سطح الأرض.

٣١٣٣٥ - **سُطَوُوسَة** ◊
Frustule (F). Frustule (E).

جسم صواني التركيب. شديد الصغر، فصلته الموامل



سُطَر

الاولان المزخرفة الجيلة | مسرحها بحار المناطق الحارة. يكثر وجودها قرب وحاف وحشاف المرجان والرجان.

Blague (F). Tobacco-pouch (E). صَبْوَة
الصَبْوَة كيس من جلد يستعمل لحفظ التبن، التبغ المدروم، صغير اللد يوضع في الجيب.

Pangium (S). ٣١٣٣٦ - طَهَب
Pangie (F) Pangium (E)

جنس اشجار حرجية من فصيلة الطيهانيه، منبتها البلاد الحارة، يكثر وجودها في جاوا | سونها فروع. اورثاتها متعاقبة، متباعدة، ازهارها ثنائية السكن. ثمارها صلبة لينة | اشهر انواعها الطيهانيه المأكولة. P. edule (S). منبتها جاوا. جميع اجزائها من خشب ولحاء وقشور واوراق وثمار جميعها المائدة والفراغ الحامض السانديريكي | ثمارها مأكولة بحدتها ٨ ساعة في الماء. ويستخرج من بزرورها بعد تنمها ايضا مادة زيتية سهلة شائعة الاستعمال | اما اشجارها فشميدة الصلاة فاخرة الصنف.

Enicognathus (S). ٣١٣٣٧ - صَبْرَة
Enicognathe (F). Enicognathus (E).

جنس طير من المتصلات وفصيلة البغاوات، انواعه المعروفة قليلة العدد اعطائها البلاد الحارة اخضها الهند وامريكا الجنوبية | ملجنها الحياتي جماعي، قوتها الثمار البرية وبعض الحشرات | اجسامها معتلة اللد. تتميز بمنافرها المستطيلة الالاك العليا المخروطة الشكل | اشهرها فجيرة الشيلي ثوبها الى الخضار الاسفغ الموج. قمت رأسها واطراف قوائمها الى الزرق المابقة. محسوها وذنها الى الحرة القرمزية.

Pangiacae (S). ٣١٣٣٧ - طَهَبَات
Pangiacae (F) Pangiacae (E).

فصيلة نباتية من ثنائيات الفلقة. اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد منبتها البلاد الحارة والاشترائية من العالم القديم | اعرف اجناسها واشهرها الطَهَب والتَصْرَة.

Delphinula (S). Delphinula (F). ٣١٣٣٨ - صَبْرَة
جنس حيوانات بحرية من الرخويات معيات الارجل وفصيلة الصرسيات. انواعها المعاصرة المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض بحار المناطق الحارة من العالم القديم | اصداها شبه مخروطية الشكل، لؤلؤة الصنجات المائية، كثيرة التضاريس والتوتوات الشائكة من الخارج | اشهر انواعها الصرسيه المعروفة D. laciniata (S) التي يكثر وجودها في بحار الصين.

Andrena (S). Andrena (F). ٣١٣٣٩ - عَذْرِين

جنس حشرات حورية من فصيلة الخريبات. انواعه المعروفة عديدة معظمها من عظم المناطق الشالية. ملجنها الحياتي فردي. اوكرها محاجر تحفرها في التربة | اجسامها صغيرة شبيهة باجسام النحل. لؤلؤها ثنائية منها السوية اللون ومنها المنحصة والمجعة | قوتها رحيق الازهار وطعمها تختزن بعض في تخاريف ورثة المائدة تنمها في محاجرها كغذاء لدها قبل ان تتحول الى حشرات جلالة سارحة | اشهر انواعها واعماها اشجارا Andrena cineraria العذرية الوردية Andrena fulva والعذرية الصفراء

Delphinulidae (S) ٣١٣٣٩ - صَبْرَات
Delphinulidés

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات معيات الارجل اماميات الخياشيم الجحفية. اجناسها وانواعها المعاصرة المعروفة عديدة منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة | اصداها شبه مخروطية الشكل، كثيرة التضاريس والاطانات والتوتوات الشائكة. نوحاتها مستديرة. اجسامها صغيرة، راحة الاردية، معتلة الارجل | اشهر اجناسها الصرسيه.

Andrenidae (S). ٣١٣٣٩ - عَذْرِينَات
Andrenidés (F)

فصيلة حشرات من الحوريات ورثة غشائيات الاجنحة. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة، اعطائها المناطق الشالية وبعض الاقاليم المعتلة المنرفة نحو الياردة | اجسامها صغيرة شبيهة بالنحل. لؤلؤها ملونة تكثر فيها السمرة المتخلطة الماجة وبعضها اصفر او منخضب بالاصفر الاخضر | ملجنها الحياتي فردي. الذكر يعيش حتى زمن السحاب فيكون الاش وبلاشي. الانثى تنح مكثها في تخاريف غشاهها التي تنمها في محجر تحفرها في التربة | اعرف اجناسها واشهرها العذرين والسكود.

Stationnel (F). ٣١٣٣٩ - طَائِي
نمت تعريفي يطلق، في علمي الحيوان والنبات، على كل هجين ستر الصفات.

Paralique (F). Paralique (E). ٣١٣٣٩ - طَائِي
نمت تعريفي يطلق على كل ما هو خاص بالشطوط البحرية.

Glyptogénée (F). ٣١٣٣٩ - طَائِي
Glyptogenesis (E)

طور من اطوار المنافع الحصلية حيث العوامل الطبيعية الناقضة، اخضها الماء والرياح، قوتها معام القشامة الاولى.

Pluricellulaire (F). ٣١٣٤٠ - عَدِيد الخَلَايا
Pluricellular (E).

نمت تعريفي يطلق على كل كائن حي مركب من تكتل الخلايا.

Aconuridae (S). ٣١٣٤٠ - طَائِي
Aconuridés (F). Aconuridae (E).

فصيلة اسماك بحرية من شائكات الزماعات، اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد جميعها صغيرة اللد، وراعي

Lipotyphle (S). ٣١٣٤١ - عَدِيمَات المِرْعَة
Lipotyphles (F). Lipotyphia (E).

مرتبة من الحشريات تتميز بخلو اسماها من المِرْعَة وشبه



فجرة

طَرِيئة. ثمارها عتية لوبية. أشهر أنواعها العصرة السامة (S) *H. venenata* ثمارها سامة دافعة.

٣١٣٤٨ - عِنَاكَة
Gonochloriame (F).
Gonochloriam (E).

العنَاكة هي الانفصال الشقي. وهي بيولوجيا عكس العنثية.

٣١٣٤٩ - عَيْك (E) Gonochlorique (F).
نعت تعريفي يطلق، بيولوجيا، على كل كائن وحيد الشق
إن في الحيوان أم في النبات.

٣١٣٥٠ - عَوْس (E).
Eos (S). Eos (F). Eos (E).
جنس طير من المستقلات وفصيلة الببغاوات. أنواعه
المعروفة نحو ١٠ موطنها يمتد من الهند الصينية إلى جزر
الزباب. ملجنها البهائي جماعي. أفواجها تراوح من ٢٠
إلى ١٠٠ زوج. أجسامها معتدلة القد. ألوها تراوح من
الحمرة الأرجوانية إلى البرتقالية. أعراف أنواعها
واشهرها:

— العَوْسُ البَاوُوي
Eos rubra (S)
— العَوْسُ الكُوْشَنِيْني
Eos Cochinchinensis (S).

٣١٣٥١ - عَوْمَرَان، آوَرَان (F).
Synergides (F).
الموربان أو الآرران اسم يطلق على خثيثين تَوْجَان نَصَّ
المك أو ينتهي بهما جراب الطلع.

٣١٣٥٢ - عَشَارِيَات (F).
Pallophytales, Profilicales (F).
فئة من النبات تنتمي إلى مستورات الزهر الوعائية.
مركزها التسليل يأتي بعد المبرشات وبين الخثيثات
والطحليات. وهي من النباتات البسيطة التركيب العادة
الجذور الحقيقية.

٣١٣٥٣ - عُلْجِيَّات (F).
Galeidae (S).
Galeidae (F). Galeidae (E).

فصيلة أسماك بحرية من السنفاقيات. أجسامها المعاصرة
المعروفة ثلاثة، جميعها من الأشكال الوشعية الشكل. أشهر
تتميز بنمساها المغلوة بأغشية سادة متحركة. أشهر
أجسامها وأعمها انتشارًا الطوروس.

٣١٣٥٤ - غُلَيْتُون (F).
Glyptodon (F).
Glyptodon (E).

جنس حيوانات اسطورية من اللبونات البد. أحافيرها
تعود إلى الأجاج الرباعي. جميعها من المفترسات الأمريكية
المهد. أجسامها ضخمة، كبيرة، مغطاة بذبال عظيمة
سُمُة الزوايا، أطولها بما فيه الرأس والذنب نحو ثلاثة
أمتار. يقال أنها كانت تعيش حياة التانو أو المنزع.

٣١٣٥٥ - عُثْلِيل (F).
Dentalium (S). Dentale (F).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات الزورقيات وفصيلة
الغليليات. أنواعه المعروفة عديدة منتشرة في جميع بحار
العالم. أصدانها بوقية الشكل أو مردنية. منها الجالسة
والمستقلة والمحسنة. صفتها الخارجة مخدنة السطوح.

انعدام مرتقتها الحوضي. وهي تضم سبع فصائل
الربايات والبطوبيات والبيبايات والفتقدات والمذاليات
والمكسيات والصربيات.

٣١٣٤٢ - عُشْرَب (F).
Chrysochloris (S).
Chrysochlore (F).

جنس حيوانات لبونة من فصيلة الصربيات. أنواعه
المعروفة عديدة منتشرة في معظم اصقاع افريقية الشرقية
والجنوبية. شكله قريب الشبه بالخط. جسمه بطول من
١٢ إلى ١٦ سم. رأسه مخروطي الشكل، ذلق الخطم.
عيناه صغيرتان مغلقتان بخشاة من الجلد متحركة. أذناه
صغيرتان، ملستان، لاقوية التركيب. عنقه شديدة
القصر. ذنبه جعدة. جوارزه قصيرة، مسلحة بأظافر
ضلعية. جلسته. الامامية منها رباعية الأصابع. التطفية
خصستها. ثوبه قسطنطي اللون كثيف اللور الناعم
القصر. الأثني ابر قدا من الذكر. قوته الحشرات
والبدان والزحافات الصغيرة. أشهر أنواعه:

— العُشْرَبَةُ المَذْبُوبَة
Chrysochloris surra (S).
Chrysochlore doré, Taupe-dorée (S).
موطنه افريقية الجنوبية. ثوبه قسطنطي اللون، ذهبي
المواج.

٣١٣٤٣ - عُشْرِيَّات (F).
Chrysochloridae (S).
Chrysochloridés (F). Chrysochloridés (E).

فصيلة حيوانات لبونة حشرة من عديمات المعرفة ورتبة
الحشریات. أنواعه المعروفة عديدة جميعها جنس واحد
الصرب. أجسامها مكروسة، اسطوانية الشكل، صغيرة
القد. رؤوسها مستغلفة، مخروطية، ذلقة الاخطام.
عيونها صغيرة مغلوة بخشاة جلدي متحرك. أذناها
صغيرة، ملسة. جوارزها الامامية مسلحة بأظافر
تشطية. جلسته. الزوايا قسطنطي اللون، جميلة الماجات
المتراكبة، كثيفة اللور الناعم القصير. أثلها أكبر قدا من
ذكورها.

٣١٣٤٤ - عَصِيم (F).
Holometabole (F).
Holometabole (E).

نعت تعريفي يطلق على كل حشرة تامة التطور الاكمالي.
م عصيمة.

٣١٣٤٥ - عَصِيد (F).
Tractus (F). Tractus (E).

اسم يطلق على الخيوط والحزم اللبينة الموجودة في وثن
النسج النباتية والحيوانية.

٣١٣٤٦ - عَصْبُون (F).
Nevrax (F). Nevra (E).

اسم يطلق على الجهاز العصبي المركزي الذي يشمل
الدماغ والنخاع الشوكي.

٣١٣٤٧ - عَصْرَبَة (F).
Hydnocarpus (S). Hydnocarpe (F).

جنس اشجار حرجية من فصيلة الطهيبات. أنواعها
المعروفة ستة. منهاها البلاد الحارة والاستوائية. اشجارها
كبيرة دائحة. اوراقها متعاقبة. ازهارها محورية الاركان،



عُشْرَب



عَوْس



غُلَيْتُون

Gal. tigrinus (S).

قُرُصُوبٌ تَاجِي
يكثر وجوده في المحيط الهندي. طوله نحو ١٥٠ سم.
ثوبه بين الصبغة والشفقة المروشة بالسرعة المألوفة. جلته
الى الشبهة المألوفة.

Phyllite, Phyllithe (F).

Phyllite (E).

ورقة متحجرة او حجر نقشه الاوراق بوسوما.

Astrophysique (F).

Astrophysical (E).

الفيزياء الكوكبية علم يبحث في طبيعة الكواكب وفي
التماثل والاساليب التقنية الخاصة بها.



لُطْرُس

Bathyal (F). Bathyal (E).

٣١٣٦٥ - قَاجِي
نعت تعريفي يطلق في علم الحفلة (الجولوجية) على
المنطقة البحرية التي يراوح عمقها من ٢٠٠ الى ١٠٠٠ م
[من ميزات هذه المنطقة: عدم اضطراب المياه وتقلقلها.
استقرار الحرارة وتساويها. عدم نفاذ التور. لثة وجود
النوت في الطبقة العليا وانحائها في الطبقتين الوسطى
والسفلى. عظمها مصورة بالرخويات رؤسيات الأرجل
والقشريات والاسماك المقترسة والسلمة التي تعيش على
المداد العضوية المائعة الى البحث الراسية] اما الاثرية
الكثائية او الشسئية المنتشرة على سطح الارض فهي
بمعظمها تنوي الى الغبار او الصلصال القاعي الذي كان
راسيا على هذه الاعماق في الاباح الاول.

Xerophilie (F). Xerophily (E).

٣١٣٦٦ - قَنَانَة
القنانة منشع طبيعي يقود النبات القن، الذي يرغب في
المنحدرات الجافة، الى تكاثف الائمة واغوار الخلايا
السفية في داخلها.

Dryopithecus (S).

Dryopithecus (E).

٣١٣٦٧ - قُرْدُ الطَّص
الاسم العلمي من اليوناني بمعنى قرد الطص. جنس قرد
مقرضة تنود احاطتها الى الزمن البشري من الحقبة
البوجينية [حيكلها العظمي شبه بهيكل القورلي وشبهه
البامة من حيث القد] وقد ثبت الآن ان لا صلة بينه وبين
السلالات البشرية.

Crocopus, Neomys (S).

Crocopus (F).

٣١٣٦٨ - قُرُصُوب
حيوان ليون وحيد الجنس والنوع من فصيلة الزبائيات
ورتبة الحفريات. اعطاه تيم من الصين الى ارضية.
يألف ضلالت النهار، يوم وينس في الماء فيلتصم
الحشرات المائية واساريمها والارباب وسره الاسماك
وبلاعيها [جسمه صغير القد، شبه بالزبابة. طوله ما
فيه الذنب نحو ٢٠ سم. رأسه مخروطي الشكل، نلق
الحطم، عنانه صغيرتان، مستديرتان، عتقه قصيرة.
توالله كعكة الاطراف، عاندة الاصابع، حناها حلب لب
جامد. ذنبه الذي يبلغ طوله نحو ٨ سم. شبه بجناحي
الشكل، يطوقه حنا من الهلب القصير الجامد. ثوبه الى

اجسامها اسطوانية. ارنبتها قليلة الرحابة. ارجلها
قصيرة، ثلاثية اللقى [تعيش منفردة في الرمال والاسمال.

Dentalides (S). Dentalidés (F).

٣١٣٦٩ - عُثَيَّات
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات الزورقيات.
اجناسها وانواعها كثيرة العدد منتشرة في جميع العالم.
اكبرها قدما ابداها غورا [اصنافها كسبية المانة، متباينة
الاشكال والحجوم، منها المردنية والوثقية والانوبية
والكبيرة والصغيرة. جميعها مفتوحة الطرفين. صحناتها
الخارجية مضطدة السطح او ماسية، الداخلة صقيلة
اشهر اجناسها القليل.

Gametophyte (F).

Gametophyte (E).

٣١٣٧٠ - عُثَامَة
العيامة، في علم النبات، طور من اطوار الانخاب
الشري، يبتدى مع التحويل الكروماتيني وينتهي عند
الانخاب.

Anisotrope (F).

Anisotrope (E).

٣١٣٥٨ - غَيْرُ مُسَاوِيِ الْإِجَاهَة
نعت تعريفي يطلق، فيزيائيا، على كل مائة صفاتها
الحكمية او الميكانيكية لانسوية الاتجاه.

Chlamyde (F).

٣١٣٥٩ - قَحِيح
اسم يطلق على كل زهرة ثنائية الكم. ويطلق ايضا على
كل عضو يشبهه غلات خارجي.

Tuniciers, Urochordés (F).

Urochordata (E).

٣١٣٦٠ - قُصَبَيَّات
صفت حيوانات بحرية ركنية او طوحية ملحونة يشبه
لقلقة [فصلها وانواعها المعاصرة متوسطة العدد.
اجسامها صغيرة القد، مستطيلة الشكل. تتميز بجهازها
العصبي الظهري الاركان وهو مؤلف من مكك شوكي
يمتد لتمداد الجسم. اما التنفس فتؤمنه فروع خيشومية
مركزها في جانبي البلعوم.

interstellaire (F).

interstellaire (E).

٣١٣٦١ - قَدَاسٌ عُثَاسِي
اسم يطلق على الفضاء القائم بين النجوم والمجرات.

Galeocerde (S).

Galeocerde (F). Galeocerde (E).

٣١٣٦٢ - قُطْرُوس
جنس اسماك بحرية من السفليات وفصيلة الطلجيات.
انواعها المعاصرة المعروفة ثلاثة اما المقرضة المتحجرة في
الاراضي الطباشيرية والثلاثية فاربعة [اجسامها وشبهه
الشكل تنطول من ١٥٠ الى ٢٥٠ سم. تتميز بانسانها
المحززة والتساوية العدد في التكنين [لشهر انواعها
المعاصرة قطروس الشمال والقطروس الهري

Gal. Arcticus (S).

قُطْرُوسُ الشَّمال
يكثر وجوده في بحار الشمال. ثوبه الى الزرقة الخضراء.
طوله من ٢٠٠ الى ٢٥٠ سم.

٣١٣٧٣ - قنيسيات ^٥
Bittacidae (S). Bittacidae (F).
نصيلة حشرات قانصة من رتبة شارات الاجنحة
عصيات الجناح. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة
منتشرة في جميع اصقاع العالم باستثناء المناطق الشمالية
اجسامها تضيق متباينة الطول. قوائمها دقيقة مستطيلة.
اجنحتها ضيقة، مستديرة الاطراف | قوتها كل ما
استطاعة قصه من ذباب وهوام وحشرات. يرقاتها
بأكثريتها دائمة نائلة ومنها الواجبة والفرضامة | أشهر
اجناسها القنصاة.

٣١٣٧٤ - قنيسية ^٥
Xenophora (S). Xénophore (F).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات مهنات الأرجل
امامتات الخياشيم ونصيلة القنيسيات. انواعها المعروفة
قليلة العدد منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة | اصداؤها
شبه مظلة الشكل، كسبة المادة، متراكبة الاطراف
المتباينة الاشكال والالوان | اعرف انواعها واشهرها :

— القنيسية المحيطة
X. lithophora (S).
— القنيسية المصفدة
X. corrugata (S).

٣١٣٧٥ - قنيسيات ^٥
Xenophoridae (S). Xénophoridés (F).
نصيلة حيوانات بحرية من الرخويات مهنات الأرجل
امامتات الخياشيم. اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة
العدد منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة | اصداؤها
صغيرة القد، مظلية الشكل او صويانية. صفحاتها
الداخلية عاصمة المادة اللؤلؤية اما الخارجية فندبة
بالزخارف والاطراف المتباينة الاشكال والالوان | أشهر
اجناسها واعرفها القنيسية.

٣١٣٧٦ - قنيسية ^٥
Nomade (S). Nomade (F).
جنس حشرات حموكة من غشائيات الاجنحة وفصيلة
القنيسيات. انواعها المعروفة نحو ١٢٠ منتشرة في جميع
اقطار العالم | اجسامها رشيقة هيفاء متوسطة القد او
صغيرة. انواها متباينة تغلب فيها الشقة فالصبة
والتنجيع بالاصفر او الزنجفري | الحشرات الجملانة
تمشي على رجليها الاقدام واطرافها. يرقاتها طفيلية تعيش في
محاجر الصرغيات والنوريات وغيرها.

٣١٣٧٧ - قنيسيات ^٥
Nomadidae (S). Nomadidae (F).
نصيلة حشرات حموكة من رتبة غشائيات الاجنحة.
اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع اصقاع
العالم | نظامها الحياتي فريد. انثاهما تمتع المكان قرب
مداخل محاجر غيرها من غشائيات الاجنحة اخصها
الصرغيات والهكسوسيات والنوريات، فصرح البرقات
فور نفاها الى داخل المحاجر حيث تعيش كامل حياتها
البرقية على ما تبنيه العوائل | أشهر اجناسها القنيسية.

٣١٣٧٨ - قنيسي ^٥
Phénotypique (F). Phenotypic (E).

ويدعى النمط الظاهري. نعت تعريفي يطلق على كل ما له
صلة بالقنيس. التتسلل القنيسي لاورثي.

الشبهة السمراء تشبه سموتها في الظهر وتغير في الصدر
والطن | الانثى اميز قنًا من الذكر وتحتل بالثوب نفسه.

٣١٣٦٩ - فرضامة ^٥
Crocodura (S). Crocodile (F). Crocodile (E).
جنس حيوانات لبونة من فصيلة الزبابات ورتبة
الحشرجات. انواعها المعروفة نحو ٦٠ اعطانها البلاد
الحارة والمنتقلة الحارة من العالم القديم. جميع انواعها
جلسة قوتها الحشرات والديدان | اجسامها طول من ١٢
الى ٢٦ سم. رؤوسها مخروطية، ذلقة الاضطام. عيونها
صغيرة، مستديرة. اذنانها مسحة. جرامها معتدلة القد،
خصاسية الاصابع، مستطيلة الاظفار الحادة. الثوبها
تتراوح من السمرة الحديدية العواج الى السمرة العابقة |
انثاهما اميز قنًا من ذكرها، يعتقد ان حملها يوم نحو
٢٠ يوما تضع في تمامه من ٣ الى ١٠ ايراص وذلك
حسب الانواع.

٣١٣٧٠ - قرط ^٥
Embletonia (S). Emblétonie (F).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات مهنات الأرجل،
خلقيات الخياشيم، خلقيات التنفس. انواعها المعروفة
قليلة العدد منتشرة في بحار النصف الشمالي من الكرة
الأرضية | اجسامها صغيرة، عريضة، عاتية
الاصدا، مستطيلة الشكل | عديدة التواسم القنوية
الاهليجية، المبطلة | معظم انواعها يعيش على
الصخور الميدة للغور.



فرضامة

٣١٣٧١ - قنيسيات ^٥
Xyridaceae (S). Xyridacées (F). Xyridacées (E).
نصيلة نباتية من وحدة الفلقة. اجناسها وانواعها المعروفة
متوسطة العدد. مهجها بعض الاصقاع الاسيوية
والامريكية. جميعها من ثوب المناطق والمواقع الرطبة |
نباتاتها جذموية ممتدة. اوراقها قرصية الانتشاب عصفية
الشكل او منضبة. تنورها شمراخي. سننلي التجميع،
هامي الارتكاز. ازهارها خضوية، كبيرة القد، ملونة.
اكمامها منضقة الراسات. ثمارها جراء ثلاثية الفلق.
يزورها آحية، تشوبه المائدة.

٣١٣٧٢ - قنصاة ^٥
Bittacus (S). Bittaque (F).
جنس حشرات قانصة عصبية الجناح من فصيلة
القنصيات. انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم
اقطار العالم | اجسامها تضيق مستطيلة القوائم والاجنحة.
يكثر وجودها في المواقع الرطبة وقرب مجاري الماء |
جميعها ممتدة قوتها الذباب والهوام. يرقاتها دائمة نائلة
تعيش في الجلالة وتحت المدر.

القنصاة القنصة ^٥
B. tipuloides (S).
اعطانها شرقي حوض البحر الابيض المتوسط
القنصاة الافريقية ^٥
B. capensis (S).
اعطانها معظم مناطق افريقية الجنوبية.
القنصاة البرازيلية ^٥
B. Blancheti (S).
اعطانها البرازيل وخاصة حوض الامازون.

Colloïde (F). Colloid (E).

٣١٣٨٦ - كُولِيد

اسم يطلق في علم الكيمياء على كل جسم لا يذوب في الماء كاستماع شبه المتلورات .

Prothalle (F).

Prothallium, Prothallus (E).

٣١٣٨٧ - كُودِيَّة

تنوء صغير ، صفحي الشكل غالباً ، يطو بويضة مستورات الزهر الوعائية ، تنمو عليه الاثيرة والسمن .

Condutrya (S). Condylure (F). ○

٣١٣٨٨ - كَنْدُلْ

حوان لون جاش وحيد الجنس والنوع من فصيلة الطوبينيات ورتبة الحشرات ، موطنه امريكا الشمالية | جسمه صغير القد ، اسطوانتي الشكل ، بطول نحو ٢٤ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ١١ سم . رأسه مخروطي الشكل ينتهي بقنطرة صلبة بطولها اكمل من الشعاع اللامعة الغضروفية التركيب . عيانه خريزتان . اذناه طلسان . ذنبه مبطر الهلب القصير . جرابه خاصية الاصابع المجهزة باظفار قوية ، مستطيلة . ثوبه ابيض اللون ، اشجع الموج | الاثنى ابيض قدا من الذكر ولها ثوب منه . تحمل مرة واحدة في العام وتضع من يرصين الى خمسة افراد من قوت الحشرات واليدان . يعيش في تقف يخطه على عمق يراوح من ٣٠ الى ٦٠ سم .

Terre non cultivée (F).

٣١٣٨٩ - كَنْكُث

الكثكث كل تربة غير مزروعة مستحالة كانت او غير مستحالة .

Exothermique (F).

Exothermic (E).

٣١٣٩٠ - لَاحِش

نعت تعريفي يطلق على كل غاغل كيميائي يند الحرارة الناجمة عن تفاعله او توكبه .

Bressolis (S). Bressolis (F).

٣١٣٩١ - لُجَائِيَّة

جنس حشرات فراشية صولجانيات القرن من فصيلة اللجائيات ورتبة حشرات الاجنحة | انواعها المروعة متوسطة العدد اعطائها البلاد الحارة . اجسامها كبيرة القد . روافدها مقلقة جميلة التضبيب . قوتها الانتشارية صولجانية الشكل | اسرارها خاضعة . ملجها الحياتي جاسي . مجموعاتها تد بعض المات . تعيش في جراب واحد غشائي المات . تخرج في الليل وتعود في جرابها في النهار . تلثم اوراق الكثير من النبات ومنها الموز فتؤذبه اشد الاذى .

Bressolidae (S).

Bressolidae (F).

٣١٣٩٢ - لُجَائِيَّات

فصيلة حشرات من رتبة حرشنيات الاجنحة . اجسامها وانواعها المعروفة متوسطة العدد اعطائها البلاد الحارة | الافريقية والامريكية | جميع انواعها كبيرة القد ، جميلة الالوان والتقيج والزخرفة | اسرارها خاضعة قوتها اوراق النبات . جميعها شرذمية الملج الحياتي تعيش مع بعضها البعض في اجرة كبيرة غشائية الماتة تبيت فيها من

Bathymétrique (F).

Bathymetric (E).

٣١٣٩٤ - قِيَاسِي

نعت تعريفي يطلق على كل ما له صلة بالقياصة .

Castridae (S).

Castridae (F). Castridae (E).

٣١٣٩٥ - كَسْرِيَّات

فصيلة حشرات فراشية من حرشنيات الاجنحة مختلفات القرون . اجسامها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع المناطق الاستوائية اعطتها الامريكية | جميع انواعها متوسطة القد او كبيرة . تتميز بجسم روافدها الخشيلة القشار الساطعة الالوان . وتتميز ايضا باسترسال روافدها ، عند الراحة ، على شكل جملون | اشهر اجسامها الكسنية .

Castria (S). Castrine (F). ○

٣١٣٩٦ - كَسْرِيَّة

جنس حشرات من حرشنيات الاجنحة وفصيلة الكسنيات انواعها المعروفة عديدة اعطائها معظم الاقاليم الاستوائية | اجسامها كبيرة القد بطول من ٣٥ الى ٤٥ سم . وبمساحتها تراوح بين ١٠٠ الى ١١٥ مم . روافدها خشيلة القشار جميلة الالوان الساطعة الموج يكثر فيها الاسمر الحنطي يطوه جميع وتقيج يراوح ، حسب الانواع ، من الاصفر الكبريتي الى الاحمر القرميدي | اسرارها مؤذية تخلف سوق الموز والانتاس والصابار وغيرها من النباتات اللينة .

Atta (S). Atta, Atte (F).

Atta (E).

٣١٣٩٧ - كُطْبِيَّة

جنس حشرات من غشائيات الاجنحة وفصيلة التمليات . انواعها المعروفة قليلة العدد ، معظمها امريكية المهد . ملجها الحياتي جاسي كسار انواع النمل | اجسامها معتدلة الجرم لكنها تتميز بكبر وبخلاطة رؤوسها ، فكوكها حادة فاضمة ، حماتها ذرية تهريق مائة مخترة .

Calamiridae (F).

٣١٣٩٨ - كَلَمَارِيَّات

فئة نباتات متشجرة يهود ظهورها الى الحقبة الكربونية . نباتاتها قريبة الشبه بالكنائيات . سوتها ليفية ، مضفوشة ، مسجونة ، بطول من ٤ الى ١٠ امتار اوراقها حلقية الانتساب ، عصبية الشكل ، مستطيلة . اعرف نباتاتها الكليمات والبصرقيات .

Culm, Dinantien (F).

Culm, Oinan (E).

٣١٣٩٩ - كَلِمِي ، كَلِمَانِي

كلمي من كولم اسم موقع في المانية . ودينامي من ديبان اسم موقع في بلجيكية | سات او طبقة من الحطب - الكربونية تتميز بشسها الكثير الماتة النباتية .

Calamite (F). Calamite (E).

٣١٣٩٥ - كَلِمِيَّة

جنس نباتات متشجرة يكثر وجودها في الحقبة الكربونية من الاباح الاول | تتميز بالجيكية | سات او طبقة من الحطب - المتقرضة . شكلها قريب الشبه باليوس . ارتفاعها يراوح من ٧ الى ٨ امتار .



كندل

٣١٣٩٧ - **لُورَنْتِيَّة** [○] Laurentien (E). Lawrentien (E).
نمت تعريفي يطلق على الطبقة السفلى من الحبة السميكة
العائقة إلى الأجاج ما قبل الكمبري.

٣١٣٩٨ - **ليثوزيات** [○] Lithosidae (S).
Lithosidés (F).
فصيلة حشرات من رتبة حرشفيات الأجنحة. أجناسها
وانواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها جبال البلاد المعتدلة الجبلية
والأقاليم الباردة من العالم القديم | أجناسها كيفية العمل ،
شبه لسطوانية الشكل ، تطول من ٢٢ إلى ١٨ مم . سبطنها
تراوح من ٤٢ إلى ٥٢ مم . رؤوسها مزوانية الشكل .
عيونها صغيرة . ملابسها ومراسفها دقيقة . قرونها
الاستشعارية خيطية . رواشنها الأمامية ضيقة . اثوابها
عائقة الزعرقة ، الوانها تختلف مع اختلاف الأنواع
| أشهر أجناسها الليتوزية .

٣١٣٩٩ - **ليثوزيه** [○] Lithosia (S).
Lithosie (F). Lithosia (E)
جنس حشرات فراشية من فصيلة الليتوزيات . أنواعها
المعروفة نحو ٣٠ اعطائها جبال البلاد المعتدلة الحرارة
من العالم القديم | أجناسها متكاثفة العمل الناعم تطول
من ١٥ إلى ١٨ مم . سبطنها تراوح من ٤٥ إلى ٥٢ مم .
رؤوسها معتدلة الجسم ، صغيرة العين ، دقيقة الملابس
والمراسف . أزيتها خيطية الشكل . رواشنها الأمامية
ضيقة . مقطوعة الأطراف . رواشنها الخلفية رحيه
الانفراج ، مستديرة الأطراف | أساريها تعيش على
الحزاز .

٣١٤٠٠ - **مَاحِش** [○] Endothermique (F).
Endothermic (E).
نمت تعريفي يطلق على كل تفاعل كيميائي يمتص الحرارة
الناتجة عن تفاعله | معظم المتفجرات من العناصر
الماحشة .

٣١٤٠١ - **مَكانِيحُ المَشر** [○] Hétérothallique (F).
Heterothallic (E).
نمت تعريفي يطلق في علم النبات على كل جهاز عضوي
يجاري منشع اللبائن المشري .

٣١٤٠٢ - **مَساوي المَشر** [○] Homothallique (F).
Homothallie (E).
نمت تعريفي يطلق في علم النبات على كل جهاز عضوي
يجاري منشع التساوي المشري .

٣١٤٠٣ - **مَثلوث** [○] Triquête (F).
نمت تعريفي يطلق في علم النبات على كل سطح مستدير
تلوه ثلاث زوايا ناشرة تتخللها ثلاث زوايا غائرة .

٣١٤٠٤ - **مُحَاك** [○] Vitellogène (F). Vitellogen (E).
مُحَاك أو مُحَاكَة نمت تعريفي يطلق في علم الفيزيولوجية
على غنية تنشأ منها الخلايا المحيية المزودة بالمواد
الغذائية عند المنطقات والمنطقات .

الصباح إلى الغروب لانها تروح في الليل سمياً وراء الزاد
| أشهر أجناسها اللجاجة .

٣١٣٩٣ - **لُحَازَة** [○] Cuterebra (S). Cutérèbre (F).
جنس حشرات من رتبة نوات الجناحين وفصيلة
اللحازيات . أنواعها المعروفة نحو ٢٠ منتشرة في بعض
أقطار العالم أخصها أمريكا الجنوبية والشرق الأقصى |
أجناسها مكرمة ، شبه أسطوانية الشكل . رؤوسها وعيونها
ناشزة . أزيتها نحيلة ونصيرة . أخطامها صفيحة . اثوابها
ملونة ، مجذعة الكوسل والبلون | أناتها تمتع المكن على
جلود معظم الحيوانات الوحشية والداجنة فينقت عن
يرقات دقيقة تنقب جلد المائل حيث تعيش كامل طورها
الربوي . طور الأكمل ينقضي في التربة وينتهي بظهور
الحشرة الجميلة .

٣١٣٩٤ - **لُحَازِيَّات** [○] Cuterebridae (S).
Cutérèbrides (F). Cuterebridae (E).
فصيلة حشرات من رتبة نوات الجناحين قصيرات
القرن . أجناسها وأنواعها المعروفة نحو ٦٠ تألف الحراج
والغابات والمراعي . محطها أمريكي المهدي وبعضها
أسوي | أجناسها صغيرة مكرمة . رؤوسها معتدلة
الضخامة ، ناشزة . عيونها كبيرة . قرونها الاستشعارية
قصيرة ونحيلة . أخطامها صغيرة اللد ، صفيحة . اثوابها
مجزعة | أناتها تمتع المكن على جلود الحيوانات البرية
والأليفة فينقت عن يرقات صغيرة ، دقيقة تنضج في جلد
المائل تقصّب له قروح ودمامل وتبقى حتى يحين زمن
الأكمل فتخرج عواظها إلى التربة حيث تتحول إلى
حشرة جميلة | أشهر أجناسها اللحازة .

٣١٣٩٥ - **لُحَاسَة** [○] Gracilaria, Caloptilia (S).
Gracilaire (F).
جنس حشرات فراشية من حرشفيات الأجنحة وفصيلة
اللحاسيات . أنواعها المعروفة نحو ٤٠ اعطائها معظم
أقاليم البلاد المعتدلة الحرارة | أجناسها صغيرة نحيلة
تطول من ٤ إلى ٦ مم . سبطنها تراوح من ١٠ إلى ١٤
مم . قرونها الاستشعارية خيطية مستطيلة . مراسفها
وملاسلها نشطة . رواشنها جميلة التخضيب الزاهي ،
مستعرضة التهذيب المتحاري | أساريها تعيش على أوراق
الأشجار العائقة أخصها اللبّك والحوور والمزيزفون
والنولا .

٣١٣٩٦ - **لُحَاسِيَّات** [○] Gracilaridae (S).
Gracilaridés (F).
فصيلة حشرات من رتبة حرشفيات الأجنحة . أجناسها
وانواعها المعروفة متوسطة العدد اعطائها معظم مناطق
البلاد المعتدلة الحرارة | أجناسها صغيرة اللد ، مستطيلة
الزباني الخيطية الشكل ، مهذبة الرواشن الجميلة
التخضيب . تتميز برؤوسها المزوانية الشكل ومراسفها
النشطة وبملابسها اللطيفة القوية | أساريها تعيش على
أوراق الأشجار النفضية أخصها الحرجية والليزيئية |
أشهر أجناسها اللحاسة .

جنس اسماك بحرية من شائكات الزعانف وفصيلة الفرغيات. انواعها المعروفة عديدة اعطانها بحار البلاد الحارة اجسامها مستعرضة، مسطحة، تطول من ١٥ الى ٢٥ سم. رؤوسها صغيرة. عيونها مستعرة، جاحظة. اخطائها ناشزة الفك الاسفل. اوتابها فضية اللون يطوها تصبغ مخترض اسود. زعانفها الظهرية والشرجية شائكة. زعانفها الذيلية فارقة لاجسامها ما كوكلة.

Ginkgoles (F).

٣١٤١٣ - مَمْرُغِيَّات

اطلب جينكولات.

Bathomètre, Bathytmètre (F).

Bathometer, Bathytmeter (E).

٣١٤١٤ - مَمْرُغِيَّات

المقياس جهاز يتركز على القفل النوعي يستعمل في سبر اغوار البحار.

Syngamie (F). Syngamy (E).

٣١٤١٥ - مَمْرُغِيَّات

المكاثمة في علم النبات هي اتحاد الاشجار في التتسلل الشقي.

Autochtonie (F).

٣١٤١٦ - مَمْرُغِيَّات

راجع تيك.

Solenodon (S). Solénodon (F). مَمْرُغِيَّات

Solenodon (E) جنس حيوان لبون من فصيلة الكيسيات. له نوعان

يخشان في جزر الايتل. والمكيس هو اسمه في تلك البلاد | جسمه يطول نحو ٦٠ سم. بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ٢٥ سم. شكله شكل الجوز الا انه اسفني الرأس الذي ينتهي بخرطوم قصير. وهو كيف الهلب الجاد، عري الذنب | ملجته الحياتي فريدي. يسرح في الليل، قوته الحشرات والديدان والزحافات الصغيرة وبعض الفار البرية والجذور | اما نوعا فهما مكيس الايتل S. Cubanus (S) ومكيس كوبا. S. Paradoxus (S). مكيس الايتل كان كثير الوجود في جزيرة هايتي الى حين اغلوا على الجزيرة بعض النخوس للقضاء على الاتاعي نقلت على الاتاعي والمكيس.

Enkytse (F). Encyotse (E).

٣١٤١٨ - مَمْرُغِيَّات

المكيس، في علوم البيولوجية والطلب والنبات، هو ما كان موجودا ضمن كيس.

Solenodontidae (S).

٣١٤١٩ - مَمْرُغِيَّات

Solenodontidae (F). Solenodontidae (E). فصيلة حيوانات من الثدييات عيشات المرغة وربة الحشرات. المعاصر منها الآن جنس واحد يدعى مكيس يشغل على نوعين مهدهما جزر الايتل الكبرى والصغرى.

Menotyphie (S)

٣١٤٢٠ - مَمْرُغِيَّات

Ménotyphie (F). Menotyphie (E). مرتبة من الحشرات تتميز حيواناتها بوجود المرغة

Endothermicité (F).

Endothermicity (E).

٣١٤٢٠ - مَمْرُغِيَّات

المحاشية، كيمياء، هي امتصاص الحرارة الناتجة عن تفاعل بعض الاجسام او العناصر.

Panspermie (F). Panspermy (E).

٣١٤٢١ - مَمْرُغِيَّات

المناداة، بيولوجيا، نظرية افتراضية تبحث عن اصل الحياة ومصدرها. ملخصها ان الحياة على الارض تعود الى جراثيم كونية انتقلت في الفضاء من بعض الكواكب | الثقافة العلمية الحديثة تنفي هذه النظرية ذلك لأن لشعة ما وراء البنفسجي التي تهديس على الفضاء الخارجي لا تسمح بالحياة لأي جرثومة كانت.

Marattiaceae (S). Marattiaceae (E).

Marattées (F). Marattiaceae (E).

فئة نباتات من مستورات الزهر الوعائية تنتمي الى الشرنبات. انواعها المعروفة عديدة، معظمها من متحجرات الازمنة الغائرة. اما المعاصر منها فنحو ٥٠ جميعها من نبوت المناطق الحارة | سوقها قصيرة، بونصية الشكل، منتصبة. اوراقها ضيقة الارتكاز، تاجية الانتساب، كبيرة اللد، تطول من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم. نصالها مستعرضة يغلب فيها التفرص الريشي ثم الكتي.

Cipolin (F). Cipolin (E).

٣١٤٢٨ - مَمْرُغِيَّات

جبر من الجنس المتطور تخترقه عروق من الطلق (ميك) مشتركة المركز. يستعمل استعمال الرخام وهو اصلب منه.

Tactisme (F). Tactism (E).

٣١٤٢٩ - مَمْرُغِيَّات

تفاعل او ارتكاس الخلية الحية من جراء تأثيرات مختلفة المصادر، كيميائية، حرارية، كهربائية، الخ ... تأثيرات قد تكون جاذبة او دافعة تدعى لجاذبية او سلبية.

Thalloide (F). Thalloid (E).

٣١٤٣٠ - مَمْرُغِيَّات

هو في النبات ما كان تركيبه وشكله كالشعر.

Crossopterygians (F). مَمْرُغِيَّات الزعائيف

Crossopterygii (E).

فئة من الاسماك اللامعات يعود ظهورها الى الحقبة الباليوئية. اجسامها مسطيلة الشكل تتميز بزعانفها الموضعية والبطنية الشاذة عن الفتوس المألوفة وذلك بانتسابها عند مؤخر الصدر والبطن، وبارتكازها على مادة حريشية ناصلة. زعانفها الذيلية مدببة ومصلبة | فصائلها واجتماسها وانواعها المعروفة قليلة العدد، معظمها من متحجرات الحقبة الباليوئية وما يليها. النوع الوحيد المعاصر والمعروف حتى الآن يدعى «لا نيمره» وهو من عظم ارتخيل الكومور في المحيط الهندي. يعيش بين منطقتان الصخري وفي تجاويلها على اعناق يراوح غورها بين ٣٠٠ و ١٢٠٠ م.

Glyphisodon (S).

٣١٤٣٢ - مَمْرُغِيَّات

Glyphisodon (F). Glyphisodon (E).



مَمْرُغِيَّات



مكيس

- 31427 - **مُوزِي** [○] ، **إِنْدِيكاي** Méiotique (F).
Meiotic (E)
نمت تعريفي يطلق على كل ما له صلة بالموزة أو الانقذار.
- 31428 - **نَاجِد** [○] Propodite
اسم يطلق على النصلة قبل الأخيرة من قوائم القشرينات عشاريات الأرجل.
- 31429 - **نَاسِج** [○] Allométrique (F) Allometry (E).
نمت تعريفي يطلق في علم البيولوجية على كل عضو يتميز بنوعة لا تتسجم مع نوعة سائر الأعضاء الأخرى.
- 31430 - **نَيبِث** [○] Cocolithe (F).
النبيت جسم مجوهر من كربونات الكالسيوم مشبع بالمواد العضوية يرسب في قاع البحر.
- 31431 - **نَيْلِ البَوِغ** [○] Hétérosporé (F).
Heterosporous (E).
نمت تعريفي يطلق على كل نباتات من مستورات الزهر الوعائية كمختمه متباينة البوغ المختلف الشق.
- 31432 - **نَظَائِد** [○] Gamétangie (F). Gametangy (E).
الثلاثة طريقة انخصاب شائعة عند الفطور وبعض العنثيات. قوامها التحام الثلاث الذكرية بالانثوية واتماجها قناتها واخصابها.
- 31433 - **نَظَائِدَة** [○] Gamétange (F). Gametange (E).
النبتة في علم النبات هي الخلية الأم أي أم الغامات عند النباتات الدنيا ومنها الفطور وبعض العنثيات.
- 31434 - **نَسَاج** [○] Histogène (F) Histogenous (E).
اسم يطلق على العناصر والمواد الحيوانية التي تتكون منها الأنسجة الحية.
- 31435 - **نَسَاجَة** [○] ، **هَيْسُوتُوجِيَّة** Histogénèse, Histogénie (F). Histogenesis, Histogeny (E).
قسم من النطارة، علم الاجنة، يبحث في تكوين النسيج الحية وفي تطورها.
- 31436 - **نَسَاجِي** [○] Histogénique (F). Histogenie (E).
نمت تعريفي يطلق على كل ما له صلة بالنساجة.
- 31437 - **نُصُوج** [○] Allométrie (F). Allometry (E).
خاصة جسمورية يتمتع بها عضو من الأعضاء ينسج نشاط نوعته أو بانفصافها بالنسبة إلى سائر أعضاء الجسم. وهو ما يميز عنه بالنسوج الإيجابي أو السلبي.
- 31438 - **نُصَلَّة** [○] Chète (F).
زائدة دقيقة إبرية الشكل تطلو زجان الحشرة في فصلته الأخيرة. يقال ان وظيفتها تماثل وظيفة الهلب الذي يعلو الفصّل عند بعض الحشرات.
- والمرتق المائي أو الحوضي. وهي تضم فصيلة الجناديات وفصيلة الطواجيات.
- 31421 - **مُتَدَوِّلَةٌ** [○] Monedule (S). Monédule (F).
جنس حشرات قانصة من الحوات وفصيلة الوراشيات. أنواعها المعروفة نحو 30 معظمها أمريكية المهد | أجسامها متوسطة القد أو كبيرة، قربة الشبه بالزنابير. أتبائها ملونة تكثر فيها الصفرة المجذعة بالأسود أو الأسمر | تنهم أصفانها في مهاجر تحفرها في التربة الرملية على أعماق تراوح من 5 إلى 7 سم | قوتها ما تستطيع اقتناصه من حشرات انحصها الذباب والهوم ولا تفت عن المناكب والنحل.
- 31422 - **مِيزُورُون** [○] Mésozoaire (F).
راجع ناتي الاوالي.
- 31423 - **مِيكْرُوجَنِيَّة** [○] Microénergétique (F).
Microenergetic (E).
علم من علوم الفيزياء يبحث في بُد (كوانتا) الطاقة أو الجهد.
- 31424 - **مِيكْرُوفِيزِيَاء** [○] Microphysique (F).
Microphysics (E).
قسم من علوم الفيزياء يبحث في الذرة.
- 31425 - **مِيَمَار** [○] Mymar (S) Mymar (F).
Mymar (E)
جنس حشرات مقلدة من غشائيات الاجنة وفصيلة الميماريات. أنواعها المعروفة قليلة لا تتجاوز السبعة منتشرة في بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة | أجسامها شديدة الصغر تطول نحو 0.6 مم. تتميز بأجنحتها المتباينة الشكل والحجم، الامامية منها مجدافية مهيبة الاطراف، الخلفية ضيقة، مقلدة الشكل، عادمة التزنين. زباني ذكورها مخيطية، زباني ائتها صولجانية | جميع أنواعها مقلدة تمشى على مكن الحشرات المختلفة الفضائل.
- 31426 - **مِيَمَارِيَّات** [○] Mymaridae (S).
Mymaridés (F) Mymaridae (E)
فصيلة حشرات من رتبة غشائيات الاجنة المخسورة. اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة | أجسامها شديدة الصغر تطول من 0.5 إلى 0.8 مم. رؤوسها مستعرضة، مقطوعة الاقنية. قرونها الاستشعارية مستطيلة، عديدة الفصل، من 8 إلى 13. زين الاناث صولجانية الاطراف. اعناقها دقيقة. صورها شبه بيضية. نصوصها انبوبية، مستطيلة عند معظم الانواع. بطونها شبه مردنية. أجنحتها الامامية مجدافية الشكل، مهيبة الاطراف، مستطيلة الاهداب. أجنحتها الخلفية مقلدة، ضيقة. قوامها مستطيلة | جميعها مقلدة تمشى على مكن الحشرات من مختلف الفضائل والرتب. ومنها التي تفوص في طلب مكن الحشرات المائية | يرقاتها مرقاة وعادمة الرؤوس والمنافذ القوية، تتنذى بالانتفاذ | أشهر اجناسها واعرضها الميمار.

جنس حشرات من الحُمَوِيَّات وَفَصْلَةُ الْهَلِكُوسِيَّات .
انواعها المعروفة نحو ١٣٠ منتشرة في معظم مناطق البلاد
المعتدلة الحرارة حتى في جبالها | اجسامها مستطيلة
الشكل ، متوسطة القد او صغيرة ، ذكورها اميز قداً من
اناثها . اوابها قليلة التباين بين الانواع ، تكثر فيها الشهية
والشفقة والتزهر البطني بالاصفر او الالوان الاسمر |
جميعها تصنف في محاجر تحفرها في التربة . قوتها رحيق
الازهار وطلها | أشهر انواعها الهلكتوس المداسي الزناتير
H. exoratus . انويه الى السمرة السوداء الموج ، زنايره
البطنية طحلاء اللون ، ثلاثية الأزواج .

٣١٤٤٨ - هَلِكُوسِيَّات (F) Helictidae (S)
فصلية حشرات من رتبة غشائيات الاجنحة .
اجنسها وانواعها المعروفة عجيبة منتشرة في جميع اصقاع
البلاد المعتدلة الحرارة | اجسامها متوسطة القد او صغيرة .
ذكوها اغلظ من اناثها واطول منها . قوتها رحيق الازهار
وطلمها | تقيم اصنافها في محاجر تحفرها في التربة | أشهر
اجنسها الهلكتوس .

٣١٤٤٩ - هَلِكُونِيَّات (F) Heliconiidae (S)
فصلية حشرات من رتبة حرشفيات الاجنحة . اجنسها
وانواعها المعروفة نحو ١٦٠ جميعها من عظم امريكا
الجنوبية | اجسامها دقيقة مستطيلة او معتدلة الطول .
رواشنها كبيرة ، مستعيرة الاطراف ، جميلة الالوان الزاهية
والزخرفة المنسقة | معظم انواعها يفرز عند الدفاع عن النفس
مادة سائلة صفراء اللون كريهة الرائحة | اساريها تعيش
على اوراق النبات | أشهر اجنسها الهلكتونوس .

٣١٤٥٠ - هَلِكُونِيَّات (F) Heliconius (S)
جنس حشرات من حرشفيات الاجنحة وفصلية
الهلكتونيات . انواعها المعروفة نحو ٩٠ اعطائها امريكا
الجنوبية | اجسامها دقيقة طول من ٢٢ الى ٢٨ مم .
سبطها تراوح من ٣٤ الى ٤٢ مم . رؤوسها شبه مكررة .
عيونها بارزة . قرونها الاستشعارية ثلاثية الفصل . مخاطمها معتدلة
رواشنها كبيرة ، مستعيرة الاطراف ، جميلة التضبيب
والزخرفة | جميع انواع هذا الجنس تفرز ، للدفاع عن
النفس ، مادة سائلة صفراء اللون ، كريهة الرائحة تهد
عنها الطير والحشرات المفترسة | أشهر انواعها واعشها
انتشاراً هلكونوس البرازيل H. euoreta . انويه اصفر
اللون صنابي الموج مجذع ومزخرف بالاحمر .

٣١٤٥١ - هَلَوَايْت (F) Helioyidae (E)
تسليكات الالومنيوم الطبيعي النمو .

٣١٤٥٢ - هَوْرِي (F) Lacustrine, Lacustran (E)
نمت تعريفي يطلق على كل حيوان او نبات يعيش في
الاموار والبحيرات والغدران | ويطلق حصلياً على تكوين
خاص او تربة خاصة فتقول كوين هوري وتربة هورية |
ويطلق اركيولوجياً على الساسك والقرى التي كانت تشاد
فوق الماء على ركائز واثاد مفروزة في القاع .

٣١٤٣٩ - نُشْ Bipartition (F). Bipartition (E).
النش في علم النبات هو الانقسام الى شطرين متساويين .

٣١٤٤٠ - نُشُوء ذَاتِي Abiogenée (F).
Abiogenesis (E).
النشوء الذاتي نظرية بيولوجية قديمة كانت تسلم بنشوء
الحياة من مواد طبيعية خام .

٣١٤٤١ - نَقْلَة Pénépaine (F).
نقطة ج نقال اسم يطلق على الجبال القديمة العهد التي
قضت عليها العوامل الارضية السحقة فاصبحت
منبسطة كالسهول | أشهر هذه النقائف وارحها اتساعاً
سهول فنلندة في شمالي اوروبا ونجد البحيرات الكبرى في
كندا .

٣١٤٤٢ - نُكْلَة Nucleus (F). Nucleus (E).
اسم يطلق ، في علم التشريح ، على نواة الحجرة الحيوانية
او الخلية النباتية .

٣١٤٤٣ - نُيْق Intendeis (F). Intendeis (E).
اسم يطلق على كتلة الجليد التي تلحف الاراضي القطبية |
النبيق الذي يلحف بعض اجزاء الغرولند يقدر بنحو مليون
كيلومتر مربع | النبايق التي تلحف اراضي القطب
الجنوبي يقدر بملايين الكيلومترات المربعة | أما سماكة
هذه النبايق فتتراوح من متر واحد الى ٣٠٠٠ متر وأكثر .

٣١٤٤٤ - هَوْرِي Volle (S). Volla (F).
جنس حشرات قانصة من تصفيات الاجنحة وفصلية
الهوروسيات . انواعها المعروفة نحو ١٥ منتشرة في جميع
انظار العالم | اجسامها صغيرة تطول من ٧ الى ٩ مم .
رؤوسها مخروطية الشكل ، قليلة البروز . عيونها صغيرة
ناشزة . قرونها الاستشعارية ثلاثية الفصل . مخاطمها معتدلة
الطول ثلاثية العقل . اجنحتها متباينة الاشكال والحجوم .
قوائمها الخلفية مستقيمة الانحناء . اوابها ملونة | يكثر
وجودها في المناطق والاموار وعلى ضفاف مجاري الماء .
جميعها قانصة تسرح على سطح الماء . قوتها الهوام وكل ما
استطاعت اله سبلا من حشرات .

٣١٤٤٥ - هَوْرِيَّات Velidae (S). Velidae (F).
فصلية حشرات من رتبة نصفيات الاجنحة المختلفة .
اجنسها وانواعها المعروفة متوسطة الحد منتشرة في جميع
اصقاع العالم | تألف النامق ومجاري الماء وضفاف
الانهر . تسرح على سطح الماء برشاقة الشايرات . قوتها
الهوام والحشرات الصغيرة | أشهر اجنسها الهوروسية .

٣١٤٤٦ - هَرَسِيْنِي Hercynien (F). Hercynian (E).
نمت تعريفي او اسم يطلق على اقدم التضخينات التي
حصلت في القشرة الارضية وما نجم عنها من سلاسل
حبلية .

٣١٤٤٧ - هَلِكُوس Halictus (S). Helicto (F)
هَلِكُوس

Enzoique (F). Enzoic (E).

٣١٤٦٠ - يُحْطُورِي

نعت تعريفي يطلق على كل موقع أو ارض تكثر فيها الاحافير الحيوانية أو النباتية.

Ammomanes (S)

٣١٤٦١ - يُؤْمَل

Ammomane (F).

جنس طير من الجوامع مخروطيات المنابر وفصيلة القُربيات. انواعه المعروفة قليلة العدد اعطائها الصحارى والبلاد الحارة. تألف الواحات والمواقع المبهرة الاشجار وبعضها يرغب في البراري القاحلة || اجسامها شبيهة باجسام القُور ، تطول من ١٤ الى ١٨ سم. مناقيرها مخروطية نرية. اجنعتها ممثلة الطول ذلقة. اذناها فارقة. اتواها الى الصهبة المنمشة والمرفوشة بالاطحل والاسمر || ملجها الحياتي جماعي. جميعها من الضواري التي تجوب البلاد في طلب الرزق. قوتها الحشرات وبعض البزور والثمار || افواجها متوسّطة العدد إلا في زمن القطاع حيث يتألف السرب من عدة مئات || اناها تلتقن في التربة بين الاعشاب المتراكبة. حضنتها تراوح من ٣ الى ٥ بيضات. ترعيها يستمرّ نحو ١٤ يوماً تقوم به الانثى بمناوبة الذكر || اعرف انواعه واشهرها البرملة الانيقة

Am. dincture (S). Am. élégante (F).

اعطائها تمتد من الصحراء الكبرى الى جبال الاطلس ، تجوبها كل عام.

Cassia (S). Casque (F).

٣١٤٦٢ - يَلِكَة

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معنّيات الارجل مشطيات الخياشيم وفصيلة الخنوثيات. انواعها المعروفة عديدة ، معظمها من متحجّرات الاراضي الثالثية ، المعاصرة منها الآن نحو ٥٠ متشّرة في بعض بحار البلاد الحارة والمعتلة الحرارة. تتميز بشعانة اصدانها الخنوتية الشكل المتراكبة الاطوانات والزخارف والالوان.

Lillialea (F).

٣١٤٦٣ - يُلْسِيَّات

النباتات مجموعة نباتية من وحدات الفلقة تضمّ خمس فصائل وهي الزنبقيات والزمراريات والوعلاتيات والقصورسيات والزغليات.

Corynmethe Yohimba,

٣١٤٦٤ - يُوْهْمِبَة

Pausinyatalie Yohimba (S).

Yohimbé (F). Yohimbehe (E).

شجرة حرجية طينية ، كبيرة الحجم ، دائمة ، من فصيلة الفوفيات. منتبة بعض مناطق البلاد الاستوائية اعضها الكاربون والغابون والكونغو || ساقها متنبية ، رفيعة ، عتية الاغصان. اوراقها معنقة ، متقابلة ، اهليلجية النصال. ازهارها عتكوئي التجميع ، طرفي الارتكاز. ثمارها جراء شبه بيضية الشكل تلتف العديد من البزور الصغيرة || يستخرج من لحاء ساقها واغصانها مادة اليوهيمين المشهورة بخواصها الشابة.

Lépidodendrées (F).

٣١٤٥٣ - هَيْسُومِيَّات

مجموعة نباتات متحجرة قريبة الشبه بالخنثريات. اجناسها المحققة متوسّطة العدد جميعها من نوات الحقبة البفونية والكربونية المعاصرة الى الاباج الاول || تميّزت هذه النباتات بسخامة سوقها المستطيلة ان كان قطرها يراوح من ٨٠ الى ١٢٠ سم. وارتفاعها من ١٠ الى ١٥ متراً.

Achlamydeé (F)

٣١٤٥٤ - وَالَّةَة

اسم يطلق على كل زهرة عادمة التويج والكأس. جهازها وزيم وعطيل.

Monodelphes (F).

٣١٤٥٥ - وَحِيدَات الرِّحْم

Monodelphia (E).

اسم يطلق على جميع الثدييات التي تضع اولادها كاملة الخلقة بخلاف نوات الرّحمين أو الجرانيات التي تنتقل اولادها من الرحم الباطني الى الجيب الخارجي المعروف ايضا بالجواب حيث تقيم فيه حتى الاكتمال فالظلام.

Bembecidae (S).

٣١٤٥٦ - وَرَّاشِيَّات

Bembécidées (F).

فصيلة حشرات من الحويّيات ورتبة غشائيات الاجنحة المخسورة. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة متشّرة في جميع اصقاع العالم خاصة في البلاد الحارة والمعتلة الحرارة || اجسامها متباينة الحجم ، منها الصغيرة والوسطى والكبيرة ، جميعها قريبة الشبه بالثعل والزناير. اتواها ملونة بكثر فيها الاسفر المجزع بالاسود || جميعها تصقن في التربة. محاجرها رداء فضيحة تخور نحو ١٠ سم. مناخها افاق انبوبية الشكل منحرفة نحو السطح. اصغاتها متراكبة الخنازيب المسنسة السطوح || قوتها الذباب والهوم والصخير من نوات الجناحين تقتنصها فتتحررها وتنقلها الى اصغاتها زائداً لها وليرقاتها || اعرف اجناسها ولشهرها الورشة والمنقولة.

Achlamyde (F).

٣١٤٥٧ - وَالِيَّت

نعت تعريفي يطلق على كل نبات عتي من نوات الالباف المحسوبة بخلاف واحد بدلاً من غلاتين.

Ytterbium (F). Ytterbium (E).

٣١٤٥٨ - يَتْرِيُوم

عنصر معنني بسيط. رمزه (Yb) وزنه الاتومي ١٧٣,٠٤ رقه الاتومي ٧٠ يستخلص من الاثربة الاربية. اول من اكتشفه ماريتاك عام ١٨٧٨.

Yttrium (F). Yttrium (E).

٣١٤٥٩ - يَتْرِيُوم

عنصر معنني بسيط. رمزه (Y) وزنه الاتومي ٨٨,٩٢ رقه الاتومي ٣٩ اول من اكتشفه غانولان عام ١٧٩٤.



يرمل

*L'Encyclopédie des Sciences de la Nature
se compose de quatre volumes, dont le dernier
comprend les lexiques des termes
allemands,
anglais,
français,
grecs,
italiens et
latins.*

Edouard Ghaleb
Ingénieur agronome

ENCYCLOPEDIE DES SCIENCES DE LA NATURE

ENCYCLOPEDIA OF NATURAL SCIENCES

Agriculture, Botanique, Zoologie, Ornithologie,
Ichtyologie, Entomologie, Parasitologie, Bactériologie,
Microbiologie, Affections animales et végétales.

Termes techniques:

(Physique, Chimie, Mathématiques, Géologie, Astronomie, Droit)

Volume III

2ème ÉDITION REVUE ET AUGMENTÉE

**ENCYCLOPEDIE DES
SCIENCES DE LA NATURE**

**ENCYCLOPEDIA
OF NATURAL SCIENCES**



Dar el-Machreq sarl
Boite Postale 946 Beyrouth, Liban

Distribution :



Librairie Orientale - Boite Postale 1986
Beyrouth, Liban



ARTICLES ET INDEX
en arabe, anglais, français
allemand, italien, latin et grec

Edouard Ghaleb **ENCYCLOPEDIE DES
SCIENCES DE LA NATURE**

Agriculture • Botanique • Zoologie • Géologie

**ENCYCLOPEDIA
OF NATURAL SCIENCES**

2420 pages • 31464 articles
6962 illustrations • 24 planches en couleurs

Agriculture • Botany • Zoology • Geology



DAR EL-MACHREQ
BEYROUTH